Catálogo *de las* Plantas Vasculares *del* Cono Sur

(Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)

VOLUMEN 1

Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledonea

Fernando O. Zuloaga, Osvaldo Morrone y Manuel J. Belgrano, editores

BOLIVIA
REGIÓN CENTRAL-OESTE
BRASIL
(Central-Western Brazil)
PARAGUAY
SUR DE
BRASIL
(Southern
Brazil)
ARGENTINA
URUGUAY
CHILE
20°
30°
40°
50°
80°
70°
60°
50°
40°
Área del Proyecto: Países
Project Area: Countries
0 1000 2000km
N
O
E
S


Andes Húmedos Nor-Centrales
(North-Central Wet Andes)
Cerrado
Cerrado
Desierto
Chileno-
Peruano
(Chilean-
Peruvian
Desert)
Andes Secos
Sur-Centrales
(South-
Central
Dry Andes)
Chaco
Bosque Atlántico
(Atlantic Forest)
Pampas
Chile
Mediterráneo
(Mediterranean
Chile)
Regiones Biogeográficas
Biogeographic Regions
Monte
Pacífico
Templado
Húmedo
(Wet
Temperate
Pacific)
Patagonia
20°
30°
40°
50°
80°
70°
60°
50°
40°
0 1000 2000
N
O
E
S

Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur

(Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)

QK1
.M83
200
v.107
c.3

Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur

(Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)

Volumen 1

Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledoneae

Fernando O. Zuloaga, Osvaldo Morrone y Manuel J. Belgrano, editores

Clodomiro Marticorena (Chile) y
Eduardo Marchesi (Uruguay), editores asociados

Prólogo por Peter H. Raven

Missouri Botanical Garden

IBODA
CONICET
ANCEFN

Missouri Botanical
Garden Library

Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur
(Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)

Volumen 1

Catalogue of the Vascular Plants of the Southern Cone
(Argentina, Southern Brazil, Chile, Paraguay, and Uruguay)

Volume 1

ISBN 978-1-930723-70-2 (Entire Work)
ISBN 978-1-930723-74-0 (Volume 1)
Library of Congress Control Number 2008929777

Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden
Volume 107
ISSN 0161-1542

Published November 2008.

Cover photos:
Front: Chile, IX Región de la Araucanía, Volcán Lonquimay [by Osvaldo Morrone]. Back, top left: *Alsophila setosa* Kaulf. [by Manuel J. Belgrano]; back, top right: *Alsophila setosa* Kaulf. [by Manuel J. Belgrano]; back, bottom left: *Gavilea odoratissima* Poepp. [by Osvaldo Morrone]; back, bottom right: *Araucaria araucana* (Molina) K. Koch [by Manuel J. Belgrano].

Scientific Editor and Head: Victoria C. Hollowell
Managing Editor: Beth Parada
Associate Editor: Allison Brock
Editorial Assistant: Tammy M. Charron
Press Coordinator: Cirri R. Moran

Technical Editors for series: Kay Yatskievych and Sandra Arango-Caro

Cover design by Gobberdiel Strategic Communications, St. Louis, Missouri

Copyright © 2008 by Missouri Botanical Garden Press
P.O. Box 299
St. Louis, Missouri 63166-0299, U.S.A.
www.mbgpress.org

All rights reserved. Printed in the U.S.A.

Tabla de Contenido

PRÓLOGO ix

AGRADECIMIENTOS xii

INTRODUCCIÓN xiii
ÁREA DEL PROYECTO xiv
REGIONES BIOGEOGRÁFICAS xvi
- Andes Húmedos Nor-Centrales xxi
- Andes Secos Sur-Centrales xxii
- Bosque Atlántico xxiv
- Cerrado xxv
- Desierto Chileno-Peruano xxvii
- Chile Mediterráneo xxviii
- Chaco xxix
- Pampas xxx
- Monte xxxii
- Patagonia xxxiii
- Pacífico Templado Húmedo xxxiv

RESULTADOS xxxvii
- Riqueza de Taxones xxxvii
- Endemismo lxvii
- Endémicos en Relación a las Regiones Biogeográficas lxviii
- Formas de Vida lxxvii
- Introducidos lxxvii

CONSERVACIÓN Y ÁREAS PROTEGIDAS lxxviii
- Andes Húmedos Nor-Centrales lxxix
- Cerrado lxxx
- Bosque Atlántico lxxx
- Desierto Chileno-Peruano lxxxi
- Andes Secos Sur-Centrales lxxxii
- Pampas lxxxii
- Chile Mediterráneo lxxxiii
- Monte lxxxiii
- Patagonia lxxxiv
- Chaco lxxxiv
- Pacífico Templado Húmedo lxxxv

FORMATO DEL CATÁLOGO lxxxvi
- Ejemplos y Explicación del Formato lxxxvi
- Información Adicional del Formato lxxxvii
- Otras Abreviaturas lxxxix

Table of Contents

FOREWORD ix

ACKNOWLEDGMENTS xii

INTRODUCTION xiii
PROJECT AREA xiv
BIOGEOGRAPHIC REGIONS xvi
- North-Central Wet Andes xxi
- South-Central Dry Andes xxii
- Atlantic Forest xxiv
- Cerrado xxv
- Chilean-Peruvian Desert xxvii
- Mediterranean Chile xxviii
- Chaco xxix
- Pampas xxx
- Monte xxxii
- Patagonia xxxiii
- Wet-Temperate Pacific xxxiv

RESULTS xxxvii
- Richness of Taxa xxxvii
- Endemism lxvii
- Endemics with Relation to the Biogeographic Regions lxviii
- Life Forms lxxvii
- Introduced lxxvii

CONSERVATION AND PROTECTED AREAS lxxviii
- North-Central Wet Andes lxxix
- Cerrado lxxx
- Atlantic Forest lxxx
- Chilean-Peruvian Desert lxxxi
- South-Central Dry Andes lxxxii
- Pampas lxxxii
- Mediterranean Chile lxxxiii
- Monte lxxxiii
- Patagonia lxxxiv
- Chaco lxxxiv
- Wet-Temperate Pacific lxxxv

FORMAT OF THE CATALOGUE lxxxvi
- Examples and Explanation of Format lxxxvi
- Additional Information about Format lxxxvii
- Other Abbreviations lxxxix

ACRÓNIMOS PARA PAÍSES. *ACRONYMS FOR COUNTRIES.* xc
BIBLIOGRAFÍA. *BIBLIOGRAPHY.* xci
AUTORES Y REVISORES. *AUTHORS AND REVIEWERS.* xciii

PTERIDOPHYTA 1
Aspleniaceae 1
Azollaceae 9
Blechnaceae 9
Cyatheaceae 21
Davalliaceae 25
Dennstaedtiaceae 26
Dicksoniaceae 31
Dryopteridaceae 33
Equisetaceae 49
Gleicheniaceae 51
Hymenophyllaceae 62
Isoëtaceae 75
Lomariopsidaceae 76
Lycopodiaceae 84
Marattiaceae 96
Marsileaceae 97
Oleandraceae 98
Ophioglossaceae 99
Osmundaceae 101
Parkeriaceae 102
Polypodiaceae 102
Psilotaceae 114
Pteridaceae 115
Salviniaceae 136
Schizaeaceae 137
Selaginellaceae 140
Thelypteridaceae 145
Vittariaceae 160
GYMNOSPERMAE 162
Araucariaceae 162
Cupressaceae 163
Ephedraceae 164
Pinaceae 166
Podocarpaceae 167
MONOCOTYLEDONEAE 169
Agapanthaceae 169
Agavaceae 169
Alismataceae 169
Alliaceae 175
Alstroemeriaceae 193
Amaryllidaceae 203
Anthericaceae 226
Aponogetonaceae 227
Araceae 227
Arecaceae 235
Asparagaceae 244

Asphodelaceae 245
Asteliaceae 245
Bromeliaceae 245
Burmanniaceae 291
Cannaceae 293
Centrolepidaceae 295
Commelinaceae 295
Corsiaceae 301
Costaceae 301
Cyclanthaceae 301
Cymodoceaceae 302
Cyperaceae 302
Dioscoreaceae 400
Eriocaulaceae 411
Gilliesiaceae 417
Heliconiaceae 417
Hemerocallidaceae 418
Herreriaceae 418
Hyacinthaceae 419
Hydrocharitaceae 421
Hypoxidaceae 423
Iridaceae 423
Juncaceae 453
Juncaginaceae 465
Laxmanniaceae 466
Lemnaceae 466
Limnocharitaceae 469
Marantaceae 470
Mayacaceae 471
Najadaceae 472
Orchidaceae 472
Philesiaceae 609
Poaceae 609
Pontederiaceae 967
Potamogetonaceae 971
Restionaceae 974
Ruppiaceae 974
Ruscaceae 975
Smilacaceae 976
Tecophilaeaceae 978
Triuridaceae 979
Typhaceae 980
Velloziaceae 980
Xyridaceae 981
Zannichelliaceae 983
Zingiberaceae 983
Zosteraceae 983

Mapas y Tablas

MAPAS

Argentina xvii
Sur de Brasil xviii
Uruguay xviii
Chile xix
Paraguay xx

TABLAS

Tabla 1. Resumen del número de taxones en el *Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur* xxxviii
Tabla 2. Riqueza de familias, géneros, especies y taxones infraespecíficos por país xxxviii
Tabla 3. Riqueza de familias, géneros, especies; indice de biodiversidad taxonómica xxxix
Tabla 4. Familias en orden descendiente según su número de especies xli
Tabla 5. Géneros en orden descendiente según su número de especies xlv
Tabla 6. Especies y taxones infraespecíficos compartidos entre países lxviii
Tabla 7. Géneros endémicos, número de especies y presencia en los distintos países lxix
Tabla 8. Número de especies endémicas de cada país lxxiv
Tabla 9. Especies y taxones infraespecíficos totales lxxix

Maps and Tables

MAPS

Argentina xvii
Southern Brazil xviii
Uruguay xviii
Chile xix
Paraguay xx

TABLES

Table 1. Summary of numbers of taxa in the *Catalogue of the Vascular Plants of the Southern Cone* xxxviii
Table 2. Richness of families, genera, species, and infraspecific taxa per country xxxviii
Table 3. Richness of families, genera, species; taxonomic biodiversity index xxxix
Table 4. Families by decreasing number of species xli
Table 5. Genera by decreasing number of species xlv
Table 6. Species and infraspecific taxa shared between countries lxviii
Table 7. Endemic genera, number of species, and presence in the different countries lxix
Table 8. Number of species endemic in each country lxxiv
Table 9. Total species and infraspecific taxa in each country lxxix

Prólogo

El Missouri Botanical Garden se enorgullece de haber participado en la producción del *Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)*, la primera compilación de información sobre las plantas de esta área extensa y fabulosamente interesante. Felicitamos a sus editores por haber llevado este complejo trabajo a feliz término! Este catálogo será una importante herramienta para la comunidad botánica, incluyendo investigadores en florística y sistemática, para quienes trabajan en manejo de la tierra y ciencias agrarias, para aquellos que toman decisiones gubernamentales o están involucrados en la conservación de la biodiversidad de esta notable región.

El *Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur* presenta una lista crítica de todas las especies y taxones infraespecíficos de las plantas vasculares que crecen nativas o introducidas en Argentina, Sur de Brasil (en los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul), Chile, Paraguay y Uruguay. Esta vasta región incluye casi todas las áreas subtropicales, templadas y templado frías de América del Sur. Se extiende entre los 17°30' y 56°30' de latitud Sur y desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, cubriendo un total de 4.708.617 km^2, lo que representa aproximadamente el 26% del área total de América del Sur. El Cono Sur comprende regiones biogeográficas únicas, como Chile Mediterráneo, Pacífico Templado Húmedo, Patagonia, Monte y las Pampas.

Este *Catálogo* es uno más de los catálogos y listas críticas que han contado con el apoyo del Missouri Botanical Garden, los cuales han tratado previamente las plantas de Ecuador, Perú, Argentina, Costa Rica, ciertas regiones de Colombia y Panamá y próximamente Bolivia. Asimismo, representa una importante contribución a la lista crítica de las plantas del mundo, actualmente en preparación.

El presente *Catálogo* incluye un total de 17.693 especies aceptadas, documentadas y ordenadas alfabéticamente por familias (308) y géneros, comenzando con las Pteridophyta, seguida de las Gymnospermae y finalizando con las Angiospermae (Monocotyledoneae y Dicotyledoneae); un total de 7.691 especies (43.47% de las especies aceptadas) son endémicas. Adicionalmente, se tratan críticamente más de 42.300 sinónimos nomenclaturales y taxonómicos.

Foreword

The Missouri Botanical Garden is proud to have played a role in the production of the *Catalogue of the Vascular Plants of the Southern Cone (Argentina, Southern Brazil, Chile, Paraguay, and Uruguay)*, the first synthesis of information concerning the plants of this large and fabulously interesting area. We congratulate its editors for having brought this complex work to a successful completion! It will be an important tool for the botanical community, including researchers in floristics and systematics, and for workers in such fields as land management and agricultural sciences, as well as for government decision-makers and those concerned with the conservation of the unique biodiversity of this key region.

The *Catalogue of the Vascular Plants of the Southern Cone* presents a critical list of all species and infraspecific taxa of vascular plants that occur as natives or introduced in Argentina, southern Brazil (the states of Paraná, Santa Catarina, and Rio Grande do Sul), Chile, Paraguay, and Uruguay; this region includes nearly all of the subtropical, temperate, and cold-temperate areas of South America. It extends from 17°30'S to 56°30'S latitude, and from the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean, covering a total of 4,708,617 km^2, representing approximately 26% of the total area of South America. The Southern Cone includes several unique biogeographical units, such as Mediterranean Chile, Wet Temperate Pacific, Patagonia, the Monte, and the Pampas.

This *Catalogue* joins previous catalogues and checklists supported by the Missouri Botanical Garden, which have treated the plants of Ecuador, Peru, Argentina, Costa Rica, regions of Colombia, Panama, and, soon, Bolivia. It is an important contribution to the organization of a world checklist of known plant species, currently under preparation.

A total of 17,693 accepted species are included in the present *Catalogue*, documented and ordered alphabetically by families (308) and genera, beginning with the Pteridophyta, followed by the Gymnospermae and finally by the Angiospermae (Monocotyledoneae, Dicotyledoneae); a total of 7691 species (43.47%) are endemic. Additionally, over 42,300 nomenclatural and taxonomic synonyms are critically treated.

Este trabajo comprende tres volúmenes: Volumen 1. Introducción, Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledoneae; Volumen 2. Dicotyledoneae: Acanthaceae-Fabaceae (*Abarema-Schizolobium*); Volumen 3. Dicotyledoneae: Fabaceae (*Senna-Zygia*)-Zygophyllaceae.

Los taxones incluidos han sido revisados sobre la base de la bibliografía disponible y a través del estudio de especímenes de herbario, principalmente aquellos pertenecientes a las abundantes colecciones depositadas en las instituciones del área del proyecto. Como resultados de estos estudios, este Catálogo presenta información nueva y, en algunos casos, incluye notas que permiten clarificar la nomenclatura o brindar información relevante. Se incluye sinonimia, citas bibliográficas, sinónimos, tipificación, distribución geográfica, estatus nativo o introducido, hábito y límites altitudinales, así como también especímenes de herbario que documentan los taxones tratados.

La ejecución de este proyecto utilizó la base de datos IRIS©, creada y desarrollada en el Instituto de Botánica Darwinion, la cual se basó originalmente en TROPICOS. Esta base de datos incluye los nombres aceptados para taxones de la región, con sus citas bibliográficas, sinónimos, tipificación, distribución geográfica, estatus nativo o introducido, hábito, y límites altitudinales, así como especímenes de herbario de referencia para documentar los taxones tratados.

Este proyecto se inició en 2001 y fue coordinado desde el Instituto de Botánica Darwinion, Buenos Aires, Argentina (SI), en colaboración con el Missouri Botanical Garden, St. Louis, Estados Unidos de América (MO), y con la participación del Herbario de la Universidad de Concepción, Concepción, Chile (CONC), el Herbario de la Facultad de Agronomía, Montevideo, Uruguay (MVFA), el Herbario de la Facultad de Ciencias Químicas, Asunción, Paraguay (FCQ), el Departamento de Botánica de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Pôrto Alegre, Brasil (ICN), y es el resultado del trabajo de unos 220 colaboradores de diferentes centros de investigación botánica.

Este *Catálogo* fue generado de forma similar al *Catálogo de las Plantas Vasculares de la República Argentina* (Zuloaga et al. 1994; Zuloaga & Morrone 1996, 1999). Además, aparecerá en formato electrónico en los sitios Web del Instituto de Botánica Darwinion

This work comprises the following three volumes: Volume 1, Introduction, Pteridophyta, Gymnospermae, and Monocotyledoneae. Volume 2, Dicotyledoneae: Acanthaceae–Fabaceae (*Abarema–Schizolobium*). Volume 3, Dicotyledoneae: Fabaceae (*Senna–Zygia*)–Zygophyllaceae.

The taxa included have been critically reviewed bibliographically and through the examination of herbarium specimens, principally those rich collections that are deposited in the institutions of the project area. As a result of these studies, this *Catalogue* presents new information and, in some instances, includes notes intended to clarify the nomenclature or other relevant information. It includes synonymy, bibliographic citations, habit, native or introduced status, elevation, and distribution by country (including provinces, states, departments, or regions in each country), with at least one voucher specimen cited per country.

Execution of this project utilized the database IRIS©, created and developed at the Instituto de Botánica Darwinion, originally based on TROPICOS. This database includes the names of accepted taxa from the region, with their bibliographical citations, synonyms, typification, geographical distribution, native or introduced status, habit, and altitudinal limits, as well as reference herbarium specimens to document the taxa treated.

This project began in 2001; it was coordinated at the Instituto de Botánica Darwinion, Buenos Aires, Argentina (SI), in collaboration with the Missouri Botanical Garden, St. Louis, United States of America (MO), and with the participation of the Herbario de la Universidad de Concepción, Chile (CONC), the Herbario de la Facultad de Agronomía, Montevideo, Uruguay (MVFA), the Herbario de la Facultad de Ciencias Químicas, Asunción del Paraguay (FCQ), the Departamento de Botánica de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Pôrto Alegre, Brazil (ICN), and is based on the work of some 220 collaborators from many different centers of botanical investigation.

This *Catalogue* was generated in a form similar to that of the *Catálogo de Plantas Vasculares de la República Argentina* (Zuloaga et al., 1994; Zuloaga & Morrone, 1996, 1999); in addition, it will appear in electronic format on the Web sites of the Instituto de Botánica Darwinion (http://www.darwin.edu.ar) and

(http://www.darwin.edu.ar) y del Missouri Botanical Garden (http://www.mobot.org). Su información florística se actualizará continuamente, a medida que se publiquen nuevas revisiones taxonómicas o nuevos registros de distribución.

La visión general y el análisis de la vegetación del Cono Sur presentada en la introducción de este *Catálogo* proporcionan los primeros pasos hacia una metodología nueva y útil en el análisis de catálogos y listas críticas, la cual es igualmente aplicable a floras completas u otro tipo de inventarios florísticos. Aunque la composición florística de esta región al oeste de los Andes está casi completamente separada por una de las regiones desérticas más inclementes del mundo, se extiende a través de la vegetación semiárida hasta alcanzar la región subtropical hacia el norte. Por esta razón, el porcentaje de endemismo, aproximadamente del 43.5% es más bajo que en áreas comparables en el sur de África y Australia, donde las barreras de migración hacia y desde el norte son mucho más completas que en el caso de América del Sur.

La rápida degradación de los ecosistemas naturales en esta vasta región es el resultado de la destrucción de los hábitats e invasión de especies exóticas, y se incrementará aún más debido al fenómeno de cambio climático. Frecuentemente, los tratamientos florísticos regionales avanzan lentamente debido a problemas económicos u otra índole, haciendo que sea una necesidad urgente contar con un tratamiento confiable y abarcarcativo de las plantas del área. Esperamos que este *Catálogo* proporcione bases sólidas para la protección y el uso sustentable de las plantas de la región. Esta obra ofrece un marco de referencia para otros proyectos en la región, constituye un recurso esencial para la educación y para el manejo apropiado de los recursos naturales. Esperamos que estimule y facilite investigaciones en curso sobre la fascinante flora del Cono Sur, por botánicos dentro y fuera de la región, como así también para que la información aquí presentada se acreciente y enriquezca en el futuro.

Peter H. Raven, President
Missouri Botanical Garden

of the Missouri Botanical Garden (http://www.mobot.org). Its floristic information will be updated continuously as taxonomic revisions are made or new distribution records of the plants are published.

The overview and analysis of the vegetation of the Southern Cone in the *Catalogue's* introduction provide the first steps towards a new and useful methodology for analyzing catalogues and checklists that is equally applicable to complete floras or other floristic inventories. Although the floristic assemblages within this region west of the Andes are almost completely cut off by one of the world's harshest desert regions, those to the west grade through semiarid vegetation into subtropical regions to the north. It is for this reason that the percentage of endemism, approximately 43.5%, is much lower than that of comparable areas of southern Africa or Australia, in which the barriers to migration to and from the north are much more complete than is the case in South America.

The rapid degradation of natural ecosystems in this vast region results particularly from habitat destruction, invasion by alien invasive species, and, increasingly, from climate change. Regional floristic treatments often proceed slowly because of economic and other problems, making it a matter of urgent necessity to have a reliable, comprehensive treatment of the plants of the area. We hope that this *Catalogue* will provide sound basis for the protection and sustainable use of the plants of the region. It forms a comparative framework for other projects in the region, and provides an essential resource both for education and for informed resource management. We expect that its availability will stimulate and facilitate ongoing research on the fascinating flora of the Southern Cone by many botanists both within and outside of the region so that the level of knowledge presented here may grow continuously and be improved in the future.

Peter H. Raven, President
Missouri Botanical Garden

AGRADECIMIENTOS

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a las siguientes personas e instituciones: al Missouri Botanical Garden y a su director el Dr. Peter H. Raven, por su estímulo y apoyo para hacer posible esta publicación; y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina (CONICET). Asimismo, deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento a los más de 200 autores y revisores del presente tratamiento sin los cuales esta obra no hubiera sido posible; a Paul Berry, Cecilia Ezcurra y Lorenzo Ramella por los comentarios enriquecedores de la introducción; a Mariana Valente y Claudio Libertelli por su valiosa colaboración en la preparación final del manuscrito para su publicación; y a las autoridades y curadores de los diferentes herbarios consultados durante el desarrollo de este trabajo.

ACKNOWLEDGMENTS

We wish to express our gratitude to the following persons and institutions: to Missouri Botanical Garden and its director, Dr. Peter H. Raven, for his stimulus and support to make this publication possible; to the Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas of the Republic of Argentina (CONICET). Additionally, we wish to express our sincere gratitude to the more than 200 authors and reviewers of the present treatment, without whom this work would not have been possible; to Paul Berry, Cecilia Ezcurra, and Lorenzo Ramella for useful comments on this introduction; to Mariana Valente and Claudio Libertelli for their valuable collaboration in the final preparation of the manuscript for publication; and to the authorities and curators of the different herbaria that were consulted during the development of this work.

I. INTRODUCCIÓN

El *Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur* presenta una lista crítica de las especies y taxones infraespecíficos que crecen en Argentina, sur de Brasil (estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul), Chile, Paraguay y Uruguay, incluyendo en su mayor parte las áreas subtropicales y templadas a templado-frías de Sudamérica.

En este *Catálogo* se citan 17.693 especies aceptadas, documentadas y ordenadas alfabéticamente por familia y género, comenzando por las Pteridophyta, luego las Gymnospermae y finalmente las Angiospermae (Monocotyledoneae, Dicotyledoneae). También se incluyen más más de 42.300 sinónimos nomenclaturales y taxonómicos, 702 taxones que se consideran excluidos del área del proyecto, 184 citas dudosas y 1034 nombres dudosos. Los nombres fueron revisados críticamente sobre la base de la bibliografía disponible y la revisión de especímenes de herbario, principalmente de las colecciones depositadas en instituciones del área del proyecto. A raíz de estos estudios, en este *Catálogo* se incluye nueva información y en algunos casos se añaden notas para aclarar la nomenclatura u otra información relevante.

Este proyecto comenzó en 2001 y fue realizado en el Instituto de Botánica Darwinion, Buenos Aires, Argentina (SI), en colaboración con el Missouri Botanical Garden, St. Louis, Estados Unidos de América (MO), y con la participación del Herbario de la Universidad de Concepción, Chile (CONC), el Herbario de la Facultad de Agronomía, Montevideo, Uruguay (MVFA), el Herbario de la Facultad de Ciencias Químicas, Asunción, Paraguay (FCQ) y el Departamento de Botánica de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Pôrto Alegre, Brasil (ICN), junto con numerosos colaboradores de diferentes centros de investigación botánica (véase lista de autores y revisores de los tratamientos). En relación a Paraguay, cabe mencionar que el Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève (G) en Suiza, estuvo asociado al inicio de este proyecto en vista de las importantes colecciones allí conservadas para la taxonomía de la flora de Paraguay (Balansa, Hassler, etc.). Sin embargo, la redacción de una *Flora del Paraguay* (Spichiger et al., 1983–2006; Stauffer & Ramella, 2007) dio prioridad a otros proyectos en G como el catálogo de las colecciones de Paraguay en G y una lista anotada para el país, paralelamente a la publicación de la Flora. Los datos de estos proyectos están accesibles a medida que se procesan en http://www.ville-ge.ch/cjb/bd.php.

Para la ejecución de este proyecto se utilizó la base de datos IRIS© creada y desarrollada en el Instituto de Botánica Darwinion, la cual relaciona los nombres de los taxones aceptados con sus sinónimos, tipificación, distribución geográfica, estatus, hábito y rangos altitudinales, estando todos estos datos relacionados con citas bibliográficas y especímenes de herbario de referencia.

I. INTRODUCTION

The *Catalogue of the Vascular Plants of the Southern Cone* presents a critical list of the species and infraspecific taxa that grow in Argentina, southern Brazil (states of Paraná, Santa Catarina, and Rio Grande do Sul), Chile, Paraguay, and Uruguay, including the major parts of the areas that are subtropical and temperate to cold-temperate in South America.

The *Catalogue* lists 17,693 accepted species, documented and ordered alphabetically by family then genus, beginning with the Pteridophyta, followed by the Gymnospermae, and finally by the Angiospermae (Monocotyledoneae, Dicotyledoneae). Also included are more than 42,300 nomenclatural and taxonomic synonyms, 702 taxa that are considered excluded from the project area, 184 doubtful citations, and 1034 dubious names. Names were critically revised using the available bibliographic database and by revision of herbarium specimens, principally those collections deposited in institutions within the project area. On the basis of these studies, the *Catalogue* includes new information and, in some cases, notes are added to clarify the nomenclature or other relevant information.

This project began in 2001 and was done at the Instituto de Botánica Darwinion, Buenos Aires, Argentina (SI), in collaboration with the Missouri Botanical Garden, St. Louis, United States of America (MO), and with the participation of the Herbario de la Universidad de Concepción, Chile (CONC), the Herbario de la Facultad de Agronomía, Montevideo, Uruguay (MVFA), the Herbario de la Facultad de Ciencias Químicas, Asunción del Paraguay (FCQ), and the Departamento de Botánica de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Pôrto Alegre, Brasil (ICN), along with numerous collaborators from various centers of botanical research (see list of authors and reviewers). Regarding the work in Paraguay, it should be mentioned that the Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève (G) of Switzerland was associated at the beginning of the project due to the importance of botanical collections kept at G for the taxonomy of vascular plants in Paraguay, i.e., those of Hassler, Balansa, and others. However, the preparation of the *Flora of Paraguay* (Spichiger et al., 1983–2006; Stauffer & Ramella, 2007) gave priority to other projects at G, including a catalogue of collections from Paraguay at G and a checklist for the country, together with the continuation of the flora project; all data of these projects are available at http://www.ville-ge.ch/cjb/bd.php

This project used the database IRIS©, which was created and developed at the Instituto de Botánica Darwinion and relates the names of the accepted taxa with their synonyms, typification, geographical distribution, status, habit, and elevational ranges. These data also relate to bibliographical citations and reference herbarium specimens.

Para el ordenamiento de las familias y géneros de Angiospermae se siguió la estructura establecida en Angiosperm Phylogeny Group (http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/), salvo en casos particulares en que autores de diversos tratamientos mantuvieron la clasificación tradicional en algunas familias. Para helechos y grupos emparentados se siguió el sistema taxonómico de R. M. Tryon and A. F. Tryon (1982).

Este *Catálogo* se generó en forma similar al *Catálogo de Plantas Vasculares de la República Argentina* (Zuloaga et al., 1994; Zuloaga & Morrone, 1996, 1999) y aparecerá también en formato electrónico en Internet en el sitio web del Instituto de Botánica Darwinion (http://www.darwin.edu.ar) y del Jardín Botánico de Missouri (http://www.mobot.org). La información florística existente en la base de datos se mantendrá en continuo progreso, actualizándose a medida que nuevos cambios taxonómicos o nuevos registros de las plantas del Cono Sur sean publicados. Consecuentemente, este *Catálogo* con información ingresada hasta octubre de 2006, podrá ser modificado en el futuro en los dos sitios web. Por estos motivos, estaremos muy agradecidos de recibir nueva información para el *Catálogo* para incluirla en su versión de Internet. Esperamos que los datos aportados estimulen la investigación botánica en el Cono Sur facilitando la compilación de más información sobre taxonomía, morfología, anatomía, filogenia y distribución de las plantas vasculares de la región.

II. ÁREA DEL PROYECTO

Como se mencionó anteriormente, el área que abarca el presente proyecto incluye el extremo sur de Sudamérica, los territorios de Argentina, el sur de Brasil (estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul), Chile, Paraguay y Uruguay. Esta área, que se ha denominado "Cono Sur," se extiende al sur del paralelo 20°S desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico, excepto por la República de Bolivia y los estados brasileños de Mato Grosso do Sul y São Paulo. Los límites latitudinales se corresponden con la extensión norte-sur de Chile continental (17°30'S y 56°30'S), y los longitudinales se encuentran aproximadamente entre los 48°O y 75°O. Este territorio cubre un total de 4.708.617 km^2, lo que representa aproximadamente el 26% de la superficie total de América del Sur (véase mapa en la guarda anterior).

En el territorio sudamericano la República Argentina se extiende de norte a sur por 2.791.810 km^2. En el norte limita con las Repúblicas de Bolivia y Paraguay; su punto extremo está en la confluencia de los Ríos Grande de San Juan y Mojinete, en la Provincia de Jujuy (21°46'S, 66°13'O). Al sur limita con la República de Chile y el Océano Atlántico, hallándose su extremo austral en el Cabo San Pío, situado en la isla Grande de Tierra del Fuego (55°03'S, 66°31'O). Al este limita con la República Federativa de Brasil, República Oriental del Uruguay y el Océano Atlántico. El punto extremo oriental se encuentra

Ordering of the families and genera of Angiospermae follows the structure established by the Angiosperm Phylogeny Group (http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/), except for those cases in which authors of diverse treatments maintained the traditional classification of some families. For ferns and fern allies the ordering followed the taxonomic system of R. M. Tryon and A. F. Tryon (1982).

This *Catalogue* is generated in a form similar to the *Catálogo de Plantas Vasculares de la República Argentina* (Zuloaga et al., 1994; Zuloaga & Morrone, 1996, 1999) and will appear in electronic format on the Internet on the websites of the Instituto de Botánica Darwinion (http://www.darwin.edu.ar) and of the Missouri Botanical Garden (http://www.mobot.org). The floristic information in the database will be continually updated with new taxonomic changes or new distribution records for the plants in the Southern Cone as they are published. Consequently, the data published here now, updated through October 2006, will be modified in the future on the two websites. We would be very grateful to receive updated information to include in the Internet versions of the *Catalogue*, and we hope that the resultant information will stimulate the botanical investigation of the Southern Cone facilitating the compilation of more information on taxonomy, morphology, anatomy, phylogeny, and distribution of vascular plants in the region.

II. PROJECT AREA

As mentioned previously, the area defined in the present project includes the southern extreme of South America, the territories of Argentina, southern Brazil (states of Paraná, Santa Catarina, and Rio Grande do Sul), Chile, Paraguay, and Uruguay. This area is known as "Cono Sur" and extends south of parallel 20°S from the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean, except from the republics of Bolivia and the Brazilian states of Mato Grosso do Sul and São Paulo. The latitudinal limits of the study region correspond to the north-south extension of continental Chile (17°30'S and 56°30'S), and the longitudinal limits between 48°W and 75°W. This territory covers a total of 4,708,617 km^2, which represents approximately 26% of the total surface of South America (see map on front endpaper).

In South America the territory of the Republic of Argentina extends, north to south, for 2,791,810 km^2. In the north it is bordered by the Republics of Bolivia and Paraguay, whose extreme southern point is situated on the confluence of the Río Grande de San Juan and Río Mojinete, adjacent to the province of Jujuy (21°46'S, 66°13'W). To the south it is bordered by the Republic of Chile and the Atlantic Ocean, exhibiting its southern extreme in the Cabo San Pío, situated on the island of Tierra del Fuego (55°03'S, 66°31'W). To the east it is bordered by the Federated Republic of Brazil, the Eastern

situado al nordeste de la localidad de Bernardo de Irigoyen, en la Provincia de Misiones (26°15'S, 53°38'O). Al oeste limita con la República de Chile. El punto extremo está ubicado entre el Cerro Agassis y el Cerro Bolados (en el cordón Mariano Moreno) y en el Parque Nacional Los Glaciares, Provincia de Santa Cruz (49°33'S, 73°34'O) (Mapa 1).

Entre las islas más importantes de la Argentina se encuentran las Islas Malvinas y la Isla de los Estados. Cabe destacar que el territorio argentino en el continente antártico e islas adyacentes, no ha sido considerado para el presente proyecto.

El sur de la República Federativa de Brasil comprende los tres estados más australes de ese país al sur del paralelo 22°S: Paraná (199.709 km^2), Santa Catarina (95.443 km^2) y Rio Grande do Sul (282.062 km^2). Estos tres estados tienen una superficie total de 577.214 km^2. La región sur de Brasil limita al norte con los estados de São Paulo y Mato Grosso do Sul, Brasil, al oeste con la República de Paraguay y las provincias de Misiones y Corrientes, Argentina, al sur con la República Oriental del Uruguay y al este con el Océano Atlántico (Mapa 2).

La República Oriental del Uruguay tiene una superficie de 175.016 km^2. Se encuentra al sudeste de América del Sur entre los 30°S–35°S y los 53°O–58°O. Al norte limita con el estado de Rio Grande do Sul, de la República Federativa del Brasil, al sur y sureste con el Río de La Plata, límite con la Argentina y al oeste el Río Uruguay la separa de las provincias de Entre Ríos y Corrientes, Argentina (Mapa 3).

La República de Chile ocupa en su porción continental una superficie de 756.206 km^2. Se ubica entre los 17°30'S y 56°30'S y se encuentra alineada en torno a los 70° de longitud oeste, con una longitud norte-sur de unos 4300 km. Chile posee una serie de islas integradas a su dominio, lo que se conoce como Chile Oceánico o Insular. Estos territorios incluyen, entre las más importantes, a las islas de Pascua, Sala y Gómez, Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk y Santa Clara (estas tres últimas pertenecientes al Archipiélago Juan Fernández), San Ambrosio y San Félix (Desventuradas). La isla de Pascua (163,6 km^2) está situada a una distancia de 3700 km del continente y pertenece a Oceanía; por este motivo y considerando su composición florística diferencial, no ha sido incluida en el presente *Catálogo*, como tampoco la Isla de Sala y Gómez (Mapa 4).

Finalmente, la República del Paraguay posee una superficie de 406.635 km^2. Al norte limita con la República de Bolivia y el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, por el Río Apa, el arroyo Estrella y la Cordillera de Maracayú. Al este está separada de Brasil por el Río Paraguay, la Cordillera de Amambay, el Salto del Guairá y el Río Paraná hasta encontrar al Río Iguazú, que la separa de los Estados de Matto Grosso do Sul y Paraná de Brasil. De la Argentina está delimitada por el mismo Río Paraná, a la altura de la provincia de Misiones. Al sur, el Río Paraná la separa de las provincias Argentinas de Misiones y Corrientes, y el Río Pilcomayo de la provincia de Formosa. Al oeste limita con el departamento Santa Cruz de la

Republic of Uruguay, and the Atlantic Ocean. The eastern extreme is situated to the northeast at the locality of Bernardo de Irigoyen, in the province of Misiones (26°15'S, 53°38'W). To the west it is bordered by the Republic of Chile. The extreme point is located between the Cerro Agassis and the Cerro Bolados (in the Mariano Moreno range) and in the Los Glaciares National Park, province of Santa Cruz (49°33'S, 73°34'W) (Map 1).

Among Argentina's most important islands are the Islas Malvinas and the Isla de los Estados. The Argentinean territory in the Antarctic continent and its southern islands has not been considered for the present project.

The project area includes the southern region of the Federal Republic of Brazil, which is comprised of the three southernmost states south of parallel 22°S: Paraná (199,709 km^2), Santa Catarina (95,443 km^2), and Rio Grande do Sul (282,062 km^2). These three states have a total surface area of 577,214 km^2. The southern region of Brazil is bordered on the north by the Brazilian states of São Paulo and Mato Grosso do Sul, on the west by the Republic of Paraguay and the provinces of Misiones and Corrientes, Argentina, on the south by the Republic of Uruguay, and on the east by the Atlantic Ocean (Map 2).

The Eastern Republic of Uruguay contains a surface area of 175,016 km^2. It is located in southern South America between 30°S–35°S and 53°W–58°W. On the north and northeast, it is bordered by the Federal Republic of Brazil (state of Rio Grande do Sul), on the south and southeast by the Río de La Plata, and on the west by the Río Uruguay, which separates it from the provinces of Entre Ríos and Corrientes, Argentina (Map 3).

The Republic of Chile in its continental portion occupies a surface area of 756,206 km^2. It is located between latitudes 17°30'S and 56°30'S, a north-south distance of approximately 4300 km. The relatively narrow east-west width lies longitude 70°W. Chile includes a series of islands that are known as Chile Oceánico or Insular. Among the most important are the islands Easter, Sala y Gómez, Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk, and Santa Clara (these last three pertaining to the Juan Fernández Archipelago), San Ambrosio and San Félix (Desventuradas). Easter Island (163.6 km^2) situated at a distance of 3700 km from the continent pertains to Oceanía, because of this and because of its different floristic composition, is not included in the present *Catalogue*, nor was the island Sala y Gómez (Map 4).

The Republic of Paraguay has a surface area of 406,635 km^2. To the north it is bordered by the Republic of Bolivia and the state of Mato Grosso do Sul, Brazil, by the Río Apa, the arroyo Estrella, and the cordillera of Maracayú. To the east it is separated from Brazil by the Río Paraguay, the Cordillera de Amambay, the Río Paraná, and the Salto del Guairá until encountering the Río Iguazú, which separates it from the states of Matto Grosso do Sul and Paraná of Brazil. From Argentina it is separated by the same Río Paraná, at the level of the province of Misiones. To the south, the Río Paraná separates it from the

Sierra, Bolivia. Es necesario destacar que para los fines del presente trabajo, los actuales departamentos de Boquerón y Alto Paraguay fueron tratados como un único departamento denominado arbitrariamente Alto Paraguay. Este ordenamiento se debió a las diversas modificaciones del orden departamental de Paraguay en los últimos años, lo que dota de cierta ambigüedad los datos de etiqueta de los ejemplares de herbario y citas bibliográficas para estos departamentos (Mapa 5).

III. REGIONES BIOGEOGRÁFICAS

En el área del Cono Sur las investigaciones sobre plantas vasculares y su distribución han utilizado, en líneas generales, la clasificación propuesta por Cabrera (1976, 1994) para la Argentina, o de Cabrera & Willink (1973, 1980) al nivel de América del Sur. No obstante, estos sistemas han sido debatidos recientemente por diversos autores (Morrone 1999, 2002). Un resumen de esta controversia puede hallarse en Ribichich (2002), autora que acertadamente expresa que "la aplicación de una u otra clasificación podría motivar diferentes recomendaciones prácticas". Por ello, y con el objeto de analizar los resultados aquí obtenidos y su relación con los patrones observados en el sur de América del Sur, en esta contribución se presenta una breve descripción de las diferentes regiones biogeográficas encontradas en el Cono Sur, con el objeto de proveer una primera aproximación al área de estudio desde el punto de vista de sus diversos ambientes, climas y vegetación. Para ello se ha seguido tentativamente, y con algunas modificaciones, el esquema propuesto por Josse et al. (2003) *Ecological Systems of Latin America and the Caribbean*. Igualmente se han considerado los trabajos clásicos de fitogeografía para América Latina y otros especializados para cada región (véase mapa en la guarda posterior). En algunos casos se indican también las denominaciones utilizadas localmente o de uso frecuente en la bibliografía. Cabe mencionar que por cuestiones editoriales se ha omitido indicar la sigla del autor(es) de los taxones mencionados en la descripción de las regiones biogeográficas, a excepción de aquellos que crecen fuera del área del proyecto y que no han sido tratados. Estas siglas pueden consultarse en el cuerpo propio del *Catálogo*. Tal como señalara el Dr. Angel L. Cabrera en 1953 (cita tomada de Ribichich, 2002), "la fitogeografía de un país...debe ser precedida por un estudio florístico completo de las diferentes zonas, y de una investigación detenida sobre el área geográfica de las especies más características. Toda división fitogeográfica del país deberá, entre tanto, considerarse como provisional o aproximada. Podrán expresarse opiniones, pero discutir divisiones, límites o nomenclatura, o tratar de imponer ideas en forma dogmática, será solo gastar tiempo y papel sin mayor provecho para la ciencia".

Argentinean provinces of Misiones and Corrientes, and the Río Pilcomayo separates it from the province of Formosa. To the west it is bordered by the department of Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. With regard to the present work it is necessary to point out that the departments of Boquerón and Alto Paraguay were treated as a single department, labeled arbitrarily as Alto Paraguay. This ordering is due to the diverse modifications that have occurred with respect to the departmental boundary circumscriptions of Paraguay, and that gives a certain ambiguity to the data on labels of the herbarium examples and bibliographical citations (Map 5).

III. BIOGEOGRAPHIC REGIONS

Distribution of vascular plants in the Southern Cone has traditionally followed the classification proposed by Cabrera (1976, 1994) for Argentina or Cabrera & Willink (1973, 1980) for South America. These systems had been modified recently in several contributions (Morrone, 1999, 2002); a summary of these different approaches can be found in Ribichich (2002), who emphasized that the application of any of these classifications can lead to different practical recommendations in term of conservation. Accordingly, when analyzing here the results obtained with this checklist, and the relationship with the distributional patterns present in the Southern Cone, in this contribution we summarize the major biogeographic regions present, with the objective of providing a first approach to the study area from the point of view of different environments, climates, and vegetation. For this purpose, we tentatively followed, with minor modifications, the scheme proposed by Josse et al. (2003), *Ecological Systems of Latin America and the Caribbean*. The classical phytogeographical treatments for Latin America were considered as well, along with others specialized for each unit (see map on back endpaper). In some cases, local or frequently used bibliographic denominations are indicated. It should be mentioned that for editorial considerations the indication of the taxon author(s) for taxa mentioned in the description of the units have been omitted (except for those that grow outside of the study area and have not been treated in this *Catalogue*). These can be found in the main body of the *Catalogue*. As Dr. Angel L. Cabrera clearly indicated in 1953 (citation from Ribichich, 2002), "the phytogeography of a country ... must be done having a complete floristic study of the different regions, and also by a detailed research of the geographic distribution of the most characteristic species. All phytogeographic divisions must, in the meantime, be considered as provisional or approximate. Opinions can be made but discuss divisions, limits or nomenclature, or to try to impose dogmatic ideas, will be a waste of time or paper without major benefits for science."

Mapa 1. República Argentina. Se indican los nombres de las provincias seguidos de los acrónimos usados en el *Catálogo*. *Map 1. Republic of Argentina. Names of provinces are indicated, followed by the acronyms used in the* Catalogue.

Mapa 2. Estados del sur de la República Federativa de Brasil. Se indican los nombres de los estados seguidos de los acrónimos usados en el *Catálogo*. *Map 2. Southern states of the Federative Republic of Brazil. Names of states are indicated, followed by the acronyms used in the* Catalogue.



Mapa 3. República Oriental del Uruguay. Se indican los nombres de los departamentos seguidos de los acrónimos usados en *Catálogo* para designarlos. *Map 3. Republic of Uruguay. Names of departments are indicated, followed by the acronyms used in the* Catalogue.

Mapa 4. República de Chile. Se indican los nombres de las regiones seguidos de los acrónimos usados en el *Catálogo.* No están incluidos los archipiélagos Juan Fernández y Desventuradas ni la Isla de Pascua. *Map 4. Republic of Chile. Names of regions are indicated, followed by the acronyms used in the* Catalogue. *Juan Fernández and Desventuradas archipelagos are not indicated.*

Mapa 5. República del Paraguay. Se indican los nombres de los departamentos seguidos de los acrónimos usados en el *Catálogo*. Los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay son tratados como uno único (APY). *Map 5. Republic of Paraguay. Names of departments are indicated, followed by the acronyms used in the* Catalogue. *Boquerón and Alto Paraguay departments are combined (APY).*

Andes Húmedos Nor-Centrales (Selva Tucumano-Boliviana o Yungas)

En el área del proyecto, esta unidad comprende las selvas de montaña del noroeste de Argentina que se extienden también por el sur de Bolivia, y comúnmente son denominadas "selvas tucumano-bolivianas" o "yungas". Estas selvas ocupan las laderas orientales de los Andes cubriendo una superficie cercana a los 25.000 km^2 en territorio argentino, ocupando diversos pisos altitudinales entre los 400 y 2500 a 3500 m s.m. (Cabrera, 1976; Brown, 1995).

El clima es templado y muy húmedo a causa de una abundante precipitación que se da en la temporada estival, y las neblinas que cubren frecuentemente las montañas principalmente durante el otoño. Estas neblinas favorecen los altos niveles de humedad en el aire y el suelo. La precipitación media anual varía entre 1000 y 2500 mm y la temperatura media anual oscila entre 14°C y 26°C. La marcada estacionalidad climática asegura la existencia de una elevada diversidad de especies con gran plasticidad fenotípica como resistencia a heladas, tolerancia a temperaturas mayores a 30°C, o a estrés hídrico (Brown, 1995.

Florísticamente es afín a la región Amazónica con la que comparte géneros como *Cedrela, Inga, Miconia, Nectandra, Ocotea* y *Trichilia* entre otros. Además, al encontrarse en el corredor andino, estas selvas poseen también elementos Holárticos como los géneros *Alnus, Berberis, Ilex, Juglans, Myrica, Prunus, Rhamnus, Rubus, Sambucus* y *Viburnum*, y Gondwánicos como *Blechnum, Escallonia, Fuchsia, Gunnera, Podocarpus, Roupala* y *Weinmannia* (Brown, 1995).

En función de la elevación y la precipitación diferenciales en cada piso altitudinal puede observarse:

a) Entre 400–600 m s.m. se desarrollan selvas de piedemonte conformadas por dos comunidades características: la "selva de palo blanco y palo amarillo" (*Calycophyllum multiflorum* y *Phyllostylon rhamnoides*) y la "selva de tipa y pacará" (*Tipuana tipu* y *Enterolobium contortisiliquum*).
b) Entre 600–1500 m s.m. se encuentra la porción altitudinal de máxima precipitación (1500–3000 mm anuales) y máxima biodiversidad. Aquí se desarrollan selvas montanas en las que pueden distinguirse dos sectores de acuerdo con la distribución de las especies arbóreas: un sector septentrional (Oranense) con especies características como *Croton piluliferus, Inga edulis, I. saltensis, Lonchocarpus lilloi* y *Tabebuia lapacho* junto con poblaciones de helechos arborescentes de *Alsophila odonelliana* entre 1000 y 2000 m s.m.; y otro (Tucumanense) que incluye las selvas montanas de las sierras de las provincias Argentinas de Jujuy, sur de Salta y una porción de Tucumán.
c) Entre los 1500–2500 m s.m. se encuentran los denominados bosques montanos en que se distinguen tres comunidades características:

North-Central Wet Andes (Tucumán–Bolivian Forest or Yungas)

In the area of the project, this unit comprises the mountain forests in northwestern Argentina, and also extends to the south of Bolivia, commonly denominated as "tucuman–bolivian forests" or "yungas." These forests occupy the western slopes of the Andes covering a surface about 25,000 km^2 in Argentine territory and occupying diverse elevational levels between 400 and 2500 to 3500 m (Cabrera, 1976; Brown, 1995).

The climate is temperate and very wet due to the abundant precipitation during summer, and the presence of mist that frequently covers the mountains, mostly during fall. Mist is important to ensure high levels of humidity in the air and the soil. Annual precipitation varies from 1000 to 2500 mm and the average temperature between 14–26°C. The marked climate seasonality ensures the existence of a vast diversity of species with great phenotypic plasticity such as resistance to frosts, tolerance to temperatures greater than 30°C, or to water stress (Brown, 1995).

Floristically it has affinity to the Amazon region, with which it shares the genera *Cedrela, Inga, Miconia, Nectandra, Ocotea*, and *Trichilia,* among others. Furthermore, since they are found in the Andean corridor, these forests also possess Holarctic elements such as the genera *Alnus, Berberis, Ilex, Juglans, Myrica, Prunus, Rhamnus, Rubus, Sambucus,* and *Viburnum,* and Gondwanan elements such as *Blechnum, Escallonia, Fuchsia, Gunnera, Podocarpus, Roupala,* and *Weinmannia* (Brown, 1995).

As a function of the elevation and differential precipitation, differences in elevational range categories can be observed:

a) Between 400–600 m, piedmonts are found of two characteristic communities: the "selva de palo blanco y palo amarillo" (*Calycophyllum multiflorum* and *Phyllostylon rhamnoides*) and the "selva de tipa y pacará" (*Tipuana tipu* and *Enterolobium contortisiliquum*).
b) Between 600–1500 m is found the elevational portion of maximum precipitation (1500–3000 mm annually) and maximum biodiversity. Here, mountain forests are developed, among which can be distinguished two sectors based on the distribution of arboreal species: a northern sector (Oranense) with species such as *Croton piluliferus, Inga edulis, I. saltensis, Lonchocarpus lilloi,* and *Tabebuia lapacho,* together with populations of arborescent ferns of *Alsophila odonelliana* between 1000–1200 m; and another (Tucumanense) that includes the mountain forests of the sierras of the Argentinean provinces of Jujuy, southern Salta, and a portion of Tucumán.
c) Between 1500–2500 m are found mountain forests in which there are three characteristic communities: "bosque de pino del cerro" (*Podocarpus*

"bosque de pino del cerro" (*Podocarpus parlatorei*), "bosque de aliso" (*Alnus acuminata*) y "bosquecillos de sauco y de queñoa" (*Sambucus nigra* var. *peruviana* y *Polylepis australis*). Estas comunidades no son climáxicas sino que comprenden un gradiente sucesional: *Alnus acuminata* y *Sambucus nigra* var. *peruviana* se comportan como especies pioneras. Sobre estos bosques comienzan a aparecer representantes del bosque maduro como *Podocarpus parlatorei*. Posteriormente estos bosques son invadidos por especies de la selva conformándose el bosque clímax con varios estratos arbóreos y abundantes epífitos. Entre las especies dominantes están *Blepharocalyx salicifolius, Cedrela lilloi, Cinnamomum porphyrium, Crinodendron tucumanum, Juglans australis, Oreopanax kuntzei* y *Podocarpus parlatorei* (Brown, 1995). Por encima de los 2000 m de elevación, y en particular más allá de los 2500 m, se encuentra lo que Cabrera (1976) denominó "pastizales de altura" y asoció con la vegetación predominante en las Yungas. Estos pastizales de altura poseen una rica flora dominada por gramíneas como *Anthaenantiopsis fiebrigii, Deyeuxia colorata, D. polygama, Festuca hieronymi, Lamprothyrsus hieronymi, Nassella tucumana* y *Paspalum candidum*. Otros autores han cuestionado la pertenencia de estos campos de altura a las Yungas, señalando su relación con porciones húmedas de la Puna (Brown, 1995).

Andes Secos Sur-Centrales

En esta unidad se incluyen las denominadas Puna y Prepuna, junto con las comunidades vegetales que ocurren en las altas montañas de la Cordillera de los Andes.

Puna es el nombre con que se conoce al enorme altiplano que se extiende entre las altas montañas de la Cordillera Real al este, y los picos de la Cordillera de los Andes al oeste, entre los paralelos 15° y 27° de latitud sur, desde el sur de Perú, por el oeste-centro de Bolivia y norte de Chile hasta el noroeste de la Argentina, alcanzando en este país su límite meridional en la provincia de Mendoza. Se trata de un enorme bloque de la antigua penillanura, desprendido y elevado a gran altura durante el Terciario, con alturas medias de 3400–3800 m s.m. Sobre esta meseta se elevan cerros de origen volcánico que alcanzan los 1000 a 1500 m s.m. con orientación general norte-sur, resultando en anchos valles y cuencas cerradas. Esta falta de desagüe favorece la formación de lagunas donde se acumulan sales o salinas en sitios de clima más seco (Cabrera, 1957).

Los suelos de la Puna son pobres en materia orgánica, esqueléticos, frecuentemente arenosos o pedregosos. En cercanía de los salares se encuentran suelos ricos en sales solubles y terrenos arcillosos con capas de yeso. El clima

parlatorei), "bosque de aliso" (*Alnus acuminata*), and "bosquecillos de sauco y de queñoa" (*Sambucus nigra* var. *peruviana* and *Polylepis australis*). These communities are not climactic, but rather comprise a successional gradient: *Alnus acuminata* and *Sambucus nigra* var. *peruviana* behave as pioneer species, over these forests begin to appear representatives of the mature forest such as *Podocarpus parlatorei,* that later are invaded by species of the climax forest, with various arboreal strata and abundant epiphytes. Among the dominant species are *Blepharocalyx salicifolius, Cedrela lilloi, Cinnamomum porphyrium, Crinodendron tucumanum, Juglans australis, Oreopanax kuntzei,* and *Podocarpus parlatorei* (Brown, 1995). Above 2000 m elevation, and particularly above 2500 m, are found what Cabrera (1976) called "pastizales de altura" (high-altitude grasslands) associated with the predominant vegetation of the Yungas. These "pastizales de altura" possess a rich flora composed of grasses, such as *Anthaenantiopsis fiebrigii, Deyeuxia colorata, D. polygama, Festuca hieronymi, Lamprothyrsus hieronymi, Nassella tucumana,* and *Paspalum candidum*. Other authors have questioned the pertinence of these high-altitude grasslands to the Yungas, pointing out their relation with moister portions of the Puna (Brown, 1995).

South-Central Dry Andes

In this unit are found the Puna and Prepuna, together with the plant communities that occur in the high mountains of the Andean Cordillera.

Puna is the name used for the enormous plateau that extends between the mountains of the Cordillera Real, to the east, and the peaks of the Andean Cordillera, to the west, between the parallels 15°S and 27°S, from the south of Peru, through the central-west of Bolivia and the north of Chile to extreme northwestern Argentina. It consists of an enormous block of an ancient peneplane, broken up and uplifted to a great height during the Tertiary, up to median altitudes of 3400–3800 m. Over this mesa are raised mountains of volcanic origin that reach 1000 to 1500 m, with a general north-south orientation, resulting in wide valleys and closed basins. This lack of drainage favors the formation of lagoons where salts or salinity accumulate during drier climates (Cabrera, 1957).

The soils of the Puna are immature and depauperate in organic material, very thin, frequently sandy or stony. In the vicinity of the salt-flats ("salares") are found soils rich in soluble salts and clay terrain with caps of gypsum. The climate is cold and dry. The temperatures are less than 10°C, descending in winter to little more than 3°C and ascending in the warmest month to some 13°C. The

es frío y seco. La temperatura media es inferior a los 10°C, descendiendo en invierno a poco más de 3°C y ascendiendo en el mes más cálido hasta unos 13°C. La amplitud térmica diaria es muy grande. Al mediodía la temperatura es muy agradable debido a la intensa radiación solar, mientras que por la noche desciende a varios grados bajo cero, incluso en verano con heladas muy frecuentes. En las altas montañas la temperatura media es mucho más baja. Las lluvias son casi exclusivamente estivales y muy variables dependiendo de cada zona, disminuyendo de norte a sur y de este a oeste, de 700 a 50 mm anuales a medida que las nubes traídas por los vientos alisios se encuentran con las barreras montañosas. Esta distribución de las lluvias permite diferenciar entre una Puna más húmeda hacia el noroeste (la Puna de Jujuy) con ríos permanentes y lagunas; y otra al sudoeste (la Puna de Atacama) muy seca, sin ríos y con grandes salares.

La vegetación dominante es la estepa arbustiva. En la zona noroeste donde la precipitación supera los 400 mm anuales, predominan las estepas de *Parastrephia quadrangularis* y *P. lucida* (tola); al sudoeste más seco, predomina *Baccharis boliviensis* (chijua) o bien aparece una estepa de *Acantholippia salsoloides* (rica-rica), *Adesmia horrida* (añagua), *Fabiana densa* (tolilla) y *Nardophyllum armatum* (suriyanta), entre otras. En las laderas y quebradas entre los 3800–4300 m s.m. crecen bosquecillos de *Polylepis tomentella* (queñoa). En suelos húmedos algo salobres, aparecen pajonales de gramíneas principalmente de *Festuca villipalea;* en suelos húmedos y arenosos los pajonales son de *P. chilense.* Entre los géneros endémicos de esta region estan: *Anthobryum, Chersodoma, Eustephiopsis, Lampaya, Lophopappus, Oreocereus* y *Parastrephia* (Cabrera & Willink, 1980).

La Prepuna ocupa las quebradas y laderas del noroeste de Argentina, desde Jujuy hasta La Rioja entre los 1000–3400 m s.m. El clima es cálido y seco con lluvias exclusivamente estivales. La vegetación predominante es la arbustiva, siendo muy características *Adesmia inflexa, Caesalpinia trichocarpa, Cercidium andicola, Gochnatia glutinosa, Senna crassiramea* y *Zuccagnia punctata,* junto con cactáceas arborescentes como *Trichocereus terscheckii* y *T. atacamensis,* y otras de los géneros *Lobivia, Opuntia* y *Parodia.*

En las altas montañas de la Cordillera de los Andes, a distintas elevaciones que varían según la latitud, el tipo de vegetación dominante es el pastizal de gramíneas xerófilas, junto con plantas en cojín de diversas especies de dicotiledóneas. En zonas tropicales estos pastizales se desarrollan por encima de los 4300 m s.m. y descienden progresivamente hacia el sur, así, a 40°S se encuentran por encima de los 2000 m s.m. El clima es frío, aunque las bajas temperaturas se compensan durante los días claros debido a la intensa radiación solar. La precipitación ocurre en forma de nieve o granizo. La comunidad clímax en el noroeste de Argentina es la estepa de *Festuca orthophylla, F. chrysophylla* y *Poa gymnantha,* acompañadas por numerosas especies de *Adesmia, Senecio* y *Werneria,* en

thermic daily amplitude is very great. At midday, the temperature is very agreeable due to the intense solar radiation, whereas at night it descends to several degrees below zero, including the summer, with frosts very frequent. In the high mountains the median temperatures are much lower. The rains are almost exclusively summer ones and variable depending on the zone, diminishing from north to south and east to west, from 700 to 50 mm annually, because the clouds brought by the trade winds collide with the mountain barriers. This distribution of the rainfall permits the differentiation between a puna that is wetter toward the northwest (Puna of Jujuy), with permanent rivers and lagoons; and another to the southeast (Puna of Atacama), very dry, without rivers and with large salt-flats.

The dominant vegetation is the shrubby steppe. In the northwest, where the precipitation exceeds 400 mm annually, the steppe of *Parastrephia quadrangularis* and *P. lucida* (tola) predominates; to the southwest, drier, *Baccharis boliviensis* (chijua) predominates with a steppe of *Acantholippia salsoloides* (rica-rica), *Adesmia horrida* (añagua), *Fabiana densa* (tolilla), *Nardophyllum armatum* (suriyanta), and others appearing. On the slopes and ravines between 3800–4300 m grow small forests of *Polylepis tomentella* (queñoa). In wet, somewhat brackish soils appear tall grasslands (pajonales), mainly of *Festuca villipalea*; in wet and sandy soils the tall grasslands are of *Pennisetum chilense*. Among the genera endemic to this region are: *Anthobryum, Chersodoma, Eustephiopsis, Lampaya, Lophopappus, Oreocereus,* and *Parastrephia* (Cabrera & Willink, 1980).

The Prepuna occupies the ravines and slopes of the northwest of Argentina, from Jujuy to La Rioja, between 1000–3400 m. The climate is warm and dry, with rains exclusively vernal. The predominant vegetation is shrubby, being very characteristic *Adesmia inflexa, Caesalpinia trichocarpa, Cercidium andicola, Gochnatia glutinosa, Senna crassiramea,* and *Zuccagnia punctata,* together with arborescent cacti such as *Trichocereus terscheckii* and *T. atacamensis* and other species of the genera *Lobivia, Opuntia,* and *Parodia.*

In the high mountains of the Andean Cordillera, at distinct elevations that vary according to latitude, the type of dominant vegetation is the grassland of xerophytic grasses, together with cushion plants of diverse dicotyledonous species. In tropical zones these grasslands are developed above 4300 m and descend progressively toward the south, such that, at 40°S they appear above 2000 m. The climate is cold, although the low temperatures are compensated for during clear days by the intense solar radiation. The precipitation occurs as snow or hail. The climax community in northwestern Argentina is the steppe of *Festuca orthophylla, F. chrysophylla,* and *Poa gymnantha,* accompanied by numerous species of *Adesmia, Senecio,* and *Werneria* as cushion plants or as hemicryptophytes. Also frequent are *Azorella compacta, Oxalis compacta, Pycnophyllum molle, P. bryoides,* and

cojín o en placa. También son frecuentes *Azorella compacta, Oxalis compacta, Pycnophyllum molle y P. bryoides,* y otras hierbas más delicadas representantes de los géneros *Calceolaria, Chaetanthera, Conyza, Perezia, Stellaria* y *Valeriana*, que crecen bajo las matas de pastos al abrigo del viento y de los herbívoros, entre otras. En algunos ambientes pantanosos altoandinos conocidos como "vegas," se desarrollan asociaciones de *Oxychloë andina* o de *Distichia muscoides,* juncáceas que forman cojines compactos empapados de agua, usualmente acompañados por diversas especies de ciperáceas, gramíneas y dicotiledóneas (Cabrera, 1957).

Bosque Atlántico (Selva Paranense)

Se trata de una de las selvas tropicales más grandes del mundo, que ocupaba en el pasado más de 1.500.000 km^2; en la actualidad se estima que sólo se mantiene entre el 7%–8% de su cubierta original. Se extiende desde el nordeste de Brasil hasta el centro de Rio Grande do Sul, Brasil, nordeste de Argentina y este de Paraguay. La precipitación anual varía entre 1500–2000 mm con lluvias más abundantes durante el verano. La temperatura media anual varía entre 16–22°C. El terreno incluye el litoral atlántico y las serranías de poca altura hasta los 1000 m s.m. en el extremo sur del planalto brasileño y hasta los 2700 m s.m. en las montañas costeras de la Serra do Mar. Dentro de esta enorme región biogeográfica pueden reconocerse numerosas unidades menores (Cabrera & Willink, 1980; Cardoso da Silva & Casteleti, 2003), tres de ellas presentes en el área del proyecto:

a) El denominado Bosque Interior se extiende en Brasil desde el nordeste del estado de Minas Gerais hasta Rio Grande do Sul, Paraguay oriental y la provincia de Misiones en Argentina. La vegetación dominante es la selva subtropical siempre verde formada por árboles de 20 a 30 m de altura, con otros estratos arbóreos de menor altura. Predominan las lauráceas de los géneros *Nectandra* y *Ocotea,* y las leguminosas como *Holocalyx balansae* (alecrín), *Parapiptadenia rigida* (anchico) y *Peltophorum dubium* (caña fístula), entre otras. También son frecuentes *Aspidosperma polyneuron* (palo rosa), *Balfourodendron riedelianum* (guatambú), *Cedrela fissilis* (cedro) y *Tabebuia heptaphylla* (lapacho rosado). Las palmeras no son muy abundantes, aunque *Syagrus romanzoffiana* (pindó) es muy frecuente y *Euterpe edulis* (palmito) se encuentra restringida a algunos sectores. En estas selvas son importantes los bambúes de los géneros *Chusquea, Guadua* y *Merostachys* que hacen casi impenetrable la selva. Hay también helechos arborescentes como *Alsophila setosa* (chachí bravo) y *Dicksonia sellowiana* (chachí manso), junto con numerosas hierbas umbrófilas, lianas y epífitas (Hueck, 1972; Cabrera & Willink, 1980).

other more delicate herbs of the genera *Calceolaria, Chaetanthera, Conyza, Perezia, Stellaria,* and *Valeriana,* among others, that grow under the mats of grass, their protection from the wind and the herbivores. In some swampy high-Andean places, known as "vegas," associations develop of *Oxychloë andina* or of *Distichia muscoides,* Juncaceae, that form compact cushions imbibed with water that are customarily accompanied by diverse species of Cyperaceae, Gramineae, and dicotyledons (Cabrera, 1957).

Atlantic Forest (Paranense Forest)

The Atlantic Forest is one of the largest tropical forests in the world, occupying in past times more than 1,500,000 km^2, although presently estimated to have maintained only 7%–8% of its original vegetational cover. It extends from northeastern Brazil down to the center of Rio Grande do Sul, Brazil, northeastern Argentina, and eastern Paraguay. The annual precipitation varies between 1500–2000 mm with more abundant rains during the summer. The average annual temperature varies between 16–22°C. The terrain includes the Atlantic coastal littoral and the foothills of low elevation up to 1000 m in the extreme south of the Brazilian Planalto and up to 2700 m in the coastal mountains of Serra do Mar. Within this enormous ecological unit can be recognized several sub-units (Cabrera & Willink, 1980; Cardoso da Silva & Casteleti, 2003), three of them in the project area:

a) The Bosque Interior extends in Brazil from northeastern Minas Gerais (outside the area covered in this *Catalogue*) to Rio Grande do Sul, western Paraguay, and the province of Misiones in Argentina. The dominant vegetation is the subtropical evergreen forest formed by trees 20 to 30 m in height, with other arboreal strata of lesser height. Predominant are Lauraceae of the genera *Nectandra* and *Ocotea,* Leguminosae such as *Holocalyx balansae* (alecrín), *Parapiptadenia rigida* (anchico), and *Peltophorum dubium* (caña fístula), among others. Also frequent are *Aspidosperma polyneuron* (palo rosa), *Balfourodendron riedelianum* (guatambú), *Cedrela fissilis* (cedro), and *Tabebuia heptaphylla* (lapacho rosado). The palms are not very abundant, although *Syagrus romanzoffiana* (pindó) is frequent, and *Euterpe edulis* (palmito) is found restricted to some sectors. In these selvas bamboos of the genera *Chusquea, Guadua,* and *Merostachys* are important and make the forest almost impenetrable; there are also arborescent ferns such as *Alsophila setosa* (chachí bravo) and *Dicksonia sellowiana* (chachí manso), growing together with numerous shade-loving herbs, lianas, and epiphytes (Hueck, 1972; Cabrera & Willink, 1980).

b) Los Bosques de *Araucaria angustifolia* (pino Paraná, pino Brasil) se extienden en el planalto del Sur de Brasil entre 600–1800 m s.m., principalmente en los estados de Paraná y Santa Catarina, hasta Rio Grande do Sul y el extremo oriental de la provincia de Misiones, Argentina. El clima es húmedo, con una precipitación que varía entre 1400–2500 mm anuales, y es algo más frío, con medias anuales entre 13°C–16°C. Las heladas son frecuentes e incluso algunas nevadas ocurren en las zonas más elevadas sobre los 1000 m s.m. *A. angustifolia* es común en el estrato arboreo superior, acompañada entre otras especies de *Albizia niopoides, Cabralea canjerana, Cedrela fissilis, Holocalyx balansae, Ilex paraguariensis, Podocarpus lambertii,* especies de importancia o abundancia relativas según el sector. Son también frecuentes palmeras de *Syagrus romanzoffiana,* helechos arborescentes como *Alsophylla setosa* y *Dicksonia sellowiana,* y epífitas de los géneros *Peperomia* y *Rhipsalis* (Hueck, 1972).

c) La selva pluvial de la Serra do Mar ocupa las laderas orientales de la franja costera de Brasil desde el estado de Rio de Janeiro hasta el norte de Rio Grande do Sul. El clima es cálido y muy húmedo con una temperatura media a nivel del mar de 19°C–25°C y una precipitación anual superior a los 2000 mm, que en algunas zonas llega hasta los 4000 mm. La vegetación predominante es la selva pluvial formada por árboles de 30 a 40 m de altura, con un estrato más bajo de palmeras, con gran abundancia de lianas y epífitas principalmente de orquídeas, bromeliáceas y helechos. La composición de la selva cambia latitudinalmente. En el estado de Santa Catarina, por ejemplo, predominan *Alchornea triplinervia, Ocotea catharinensis, Pouteria venosa, Sloanea guianensis, Tabebuia umbellata, Tapirira guianensis,* etc. En la costa pueden encontrarse manglares formados principalmente por *Rhizophora mangle* y matorrales arbustivos sobre las restingas (Cabrera & Willink, 1980; Hueck, 1972).

Cerrado

El Cerrado abarca aproximadamente 2.000.000 km^2 sobre el planalto del centro-oeste de Brasil, en los estados de Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Piauí, Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo y Paraná, penetrando en pequeñas áreas del este de Bolivia y noreste de Paraguay. Posee una gran diversidad climática debido a su amplio rango latitudinal y altitudinal, que varía entre casi el nivel del mar y los 1800 m s.m. en los sectores más elevados del planalto. La precipitación anual oscila entre 800–2000 mm, con una marcada estación seca desde abril a

b) The forests of *Araucaria angustifolia* (pino Paraná, pino Brasil) are found in the Southern Brazilian Plateau, between 600–1800 m, principally in the states of Paraná and Santa Catarina, to Rio Grande do Sul, and the extreme west of the province of Misiones, Argentina. The climate is wet, with precipitations varying between 1400–2500 mm annually, and is somewhat colder, with annual medians between 13°C–16°C. Frosts are frequent and even some snow in more elevated zones, i.e., those over 1000 m. Commonly, in the upper arboreal strata *A. angustifolia* is accompanied by *Albizia niopoides, Cabralea canjerana, Cedrela fissilis, Holocalyx balansae, Ilex paraguariensis,* and *Podocarpus lambertii,* among others, with the importance relative according to sector; palm groves of *Syagrus romanzoffiana* are frequent, as are arborescent ferns such as *Alsophylla setosa* and *Dicksonia sellowiana* and epiphytes of genera such as *Peperomia* and *Rhipsalis* (Hueck, 1972).

c) The rainforest of the Serra do Mar occupies the eastern slopes of the coastal fringe of Brazil from the state of Rio de Janeiro to northern Rio Grande do Sul. The climate is warm and very wet with median temperatures at sea level of 19°C–25°C and an annual precipitation above 2000 mm, that in some zones extends up to 4000 mm. The predominant vegetation in the rainforest are trees up to 30 to 40 m in height with a lower stratum of palms, and a great abundance of lianas and epiphytes, principally of orchids, bromeliads, and ferns. The composition of the forest changes latitudinally. In the state of Santa Catarina, for example, *Alchornea triplinervia, Ocotea catharinensis, Pouteria venosa, Sloanea guianensis, Tabebuia umbellata, Tapirira guianensis,* etc. predominate. In the coastal areas, mangroves are found, primarily *Rhizophora mangle,* and shrubby vegetation is found in the restingas (Cabrera & Willink, 1980; Hueck, 1972).

Cerrado

The Cerrado contains approximately 2,000,000 km^2 on the highland plateau of central-western Brazil in the states of Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Piauí, Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo, and Paraná, extending into small areas of eastern Bolivia and northeastern Paraguay. It possesses a vast climatic diversity owing to its wide latitudinal and altitudinal range, that varies between almost sea level and 1800 m in the most elevated sectors of the plain. The annual precipitation oscillates between 800–2000 mm, with a marked dry season from April to September; average temperature varies between 18°C and 28°C. Fires are frequent and are considered one of the determinant factors of the

septiembre; la temperatura media varía de 18°C a 28°C. Los incendios son frecuentes siendo considerados como uno de los factores determinantes de la vegetación, junto con la fertilidad y drenaje del suelo y las expansiones y regresiones de su área durante el Cuaternario. Numerosas especies presentan adaptaciones al fuego: desarrollo de catáfilas, poderosos xilopodios subterráneos o gruesas capas de suber en troncos y ramas que aíslan térmicamente los tejidos internos; mientras que otras dependen del fuego para inducir la floración, o para iniciar la germinación de sus semillas en el suelo (Cabrera & Willink, 1980; Miranda et al., 2002; Oliveira-Filho & Ratter, 2002).

En sentido amplio, el Cerrado es un mosaico de diversas fisonomías de vegetación, desde amplias sabanas de gramíneas con ausencia de vegetación leñosa localmente conocidas como "campos limpios", hasta bosques abiertos de poca altura los "cerrados" en sentido estricto, y selvas marginales que se desarrollan a lo largo de los ríos conocidas como "matas ciliares", y consideradas como conexiones entre las selvas amazónicas y atlánticas (Cabrera & Willink, 1980; Ribeiro & Teles Walter, 1998; Oliveira Filho & Ratter, 2002).

Para el Cerrado se han contabilizado unos 6671 taxones de plantas vasculares nativas y unas 289 especies introducidas, siendo las familias mejor representadas las Fabaceae, Asteraceae, Orchidaceae y Poaceae (Cunha de Mendonça et al., 1998).

En los "campos limpios" son frecuentes las gramíneas de los géneros *Aristida, Axonopus, Mesosetum, Panicum, Paspalum* y *Trachypogon;* junto con *Rhynchospora* (Cyperaceae), *Cleistes, Habenaria, Sarcoglottis* (Orchidaceae), entre otros (Cunha de Mendonça et al., 1998; Filgueiras, 2002).

Entre los árboles más frecuentes que se encuentran en el "cerrado estricto", se pueden mencionar *Acosmium dasycarpum* (Vogel) Yakovlev, *Annona crassiflora, Astronium fraxinifolium, Brosimum gaudichaudii, Byrsonima coccolobifolia, Caryocar brasiliense, Connarus suberosus* Planch., *Dimorphandra mollis, Erythroxylum suberosum, Pouteria ramiflora, Qualea grandiflora, Q. multiflora, Q. parviflora* y *Tocoyena formosa*; entre los arbustos, *Casearia sylvestris, Palicourea rigida, Vellozia flavicans* Mart. ex Schult. f.; entre las hierbas, *Axonopus siccus, Echinolaena inflexa* (Poir.) Chase, *Schizachyrium tenerum* y diversas especies de los géneros *Paspalum* y *Trachypogon* (Cunha de Mendonça et al., 1998). En suelos bien drenados pueden encontrarse palmares de *Acrocomia aculeata, Attalea speciosa* Mart. ex Spreng. o *Syagrus oleracea,* entre otras. También existen algunas especies de palmeras acaules de los géneros *Allagoptera* junto con *Butia archeri* (Glassman) Glassman, *Syagrus graminifolia* y *S. petraea.* Además, existe un tipo peculiar de leñosas subterráneas, con troncos ramificados bajo tierra y ramas rastreras de hasta 50 cm de altura como *Andira humilis, Anacardium humile, Calliandra brevicaulis* y *Jacaranda decurrens.*

Entre las formaciones arbóreas de la "mata ciliar" son frecuentes especies de *Aspidosperma* (Apocynaceae),

vegetation, together with fertility and drainage of the soil and the expansions and regressions of its area during the Quaternary. Numerous species present adaptations to fire: development of cataphylls, strong xylopodia, or thick caps of cork on trunks and branches that thermally isolate internal tissues, while others depend upon fire to induce flowering or to initiate germination of their seeds in the soil (Cabrera & Willink, 1980; Miranda et al., 2002; Oliveira-Filho & Ratter, 2002).

In a broad sense, the Cerrado is a mosaic of diverse physiognomy of vegetation, from broad savannas of grasses without woody vegetation, locally known as "campos limpios," to open woodland of little stature, the "cerrados" in a strict sense, and marginal forests that develop along the length of the rivers, known as "matas ciliares" and considered connections between the Amazonian and Atlantic forests (Cabrera & Willink, 1980; Ribeiro & Teles Walter, 1998; Oliveira Filho & Ratter, 2002).

For the Cerrado there has been tabulated some 6671 taxa of native vascular plants and some 289 introduced species, the families most represented being Asteraceae, Fabaceae, Orchidaceae, and Poaceae (Cunha de Mendonça et al., 1998).

In the "campos limpios" grasses of the genera *Aristida, Axonopus, Mesosetum, Panicum, Paspalum,* and *Trachypogon* are frequently found, along with *Rhynchospora* (Cyperaceae), *Cleistes, Habenaria,* and *Sarcoglottis* (Orchidaceae), among others (Cunha de Mendonça et al., 1998; Filgueiras, 2002).

Among the most frequent trees found in the "cerrado sensu stricto" are *Acosmium dasycarpum* (Vogel) Yakovlev, *Annona crassiflora, Astronium fraxinifolium, Brosimum gaudichaudii, Byrsonima coccolobifolia, Caryocar brasiliense, Connarus suberosus* Planch., *Dimorphandra mollis, Erythroxylum suberosum, Pouteria ramiflora, Qualea grandiflora, Q. multiflora, Q. parviflora,* and *Tocoyena formosa*; among the shrubs, *Casearia sylvestris, Palicourea rigida,* and *Vellozia flavicans* Mart. ex Schult. f.; among the herbs, *Axonopus siccus, Echinolaena inflexa* (Poir.) Chase, *Schizachrium tenerum,* and diverse species of *Paspalum* and *Trachypogon* (Cunha de Mendonça et al., 1998). In well-drained soils one can find the palm trees of *Acrocomia aculeata, Attalea speciosa* Mart. ex Spreng., or *Syagrus oleracea,* among others. There are also some species of acaulescent palms of the genus *Allagoptera,* together with *Butia archeri* (Glassman) Glassman, *Syagrus graminifolia,* and *S. petraea.* Also there is a peculiar type of subterranean wood, with trunks branched below ground and viny branches up to 50 cm high, such as *Andira humilis, Anacardium humile, Calliandra brevicaulis,* and *Jacaranda decurrens.*

Among the arboreal formations of the "mata ciliar" species of *Aspidosperma* (Apocynaceae), *Nectandra* and *Ocotea* (Lauraceae), *Anadenanthera, Apuleia, Copaifera, Enterolobium, Inga* (Leguminosae), and *Apeiba* Aubl. (Tiliaceae) are frequently found. In the "bosques

Nectandra, Ocotea (Lauraceae), *Anadenanthera, Apuleia, Copaifera, Enterolobium, Inga* (Leguminosae), *Apeiba* Aubl. (Tiliaceae); en los "bosques mesófilos" se encuentran *Amburana cearensis, Anadenanthera colubrina, Cedrela fissilis, Centrolobium tomentosum, Jacaranda caroba,* etc. (Cunha de Mendonça et al., 1998).

En el estado de Paraná, Brasil, los cerrados más meridionales fueron descriptos para Jaguariaiva, al norte de Curitiba, aunque se trata de cerrados muy modificados por la penetración de árboles y arbustos de regiones vecinas. Los cerrados descriptos para Paraguay tienen aún menos afinidad florística con los verdaderos cerrados (Hueck, 1972).

Desierto Chileno-Peruano

Estos desiertos se extienden por más de 3500 km desde el norte de Perú cerca del límite con Ecuador, hasta el norte-centro de Chile a lo largo de la región costera del océano Pacífico, entre los 5°S–29°S aproximadamente. La extrema aridez de estos desiertos se debe en gran parte a la influencia que ejerce la corriente fría de Humboldt, la que conduce aguas antárticas desde el sur en dirección norte enfriando las masas de aire en la base de los cerros costeros; además, existe un sector de alta presión permanente, el Anticiclón del Pacífico Sur, que no permite el paso de las masas de aire provenientes del sur y se observa la inversión térmica de los vientos alisios que por encima de los 1000 m de altura se presentan como una masa de aire seca y estable (Cabrera & Willink, 1980; Rauh, 1985; Rundel et al., 1991; Grau, 1995; Teillier et al., 1998). En Chile se considera que la zona de desiertos se extiende hacia el sur, hasta los cerros situados al norte de Copiapó (Teillier et al., 1998). El desierto de Atacama, en el extremo norte de ese país, es uno de los desiertos más áridos del mundo, con una precipitación inferior a los 10 mm anuales. Los cielos son límpidos, la humedad relativa muy baja y raramente supera el 50%, y la temperatura media es elevada. Estos desiertos poseen un altísimo nivel de endemismo y numerosas especies con adaptaciones a las más extremas condiciones de aridez del planeta.

En algunas ocasiones caen algunas precipitaciones que favorecen el desarrollo de una vegetación efímera pero muy abundante, transformándose el paisaje desértico en extensos tapices multicolores. Este fenómeno se conoce localmente como "desierto florido" (Muñoz Pizarro, 1965). Actualmente se cree que estas precipitaciones están relacionadas con el "Fenómeno del Niño Oscilacion Sur", que favorece el desplazamiento del Anticiclón del Pacífico Sur hacia el norte. Con estas precipitaciones las semillas germinan, y los bulbos y rizomas en estado de latencia brotan para completar su ciclo en un tiempo muy breve. Las distintas especies poseen tiempos determinados para la floración de modo que suelen observarse coloridos cambiantes. Entre las especies más frecuentes se pueden mencionar diversas Alstroemeriaceae como *Alstroemeria*

mesófilos," the mesophytic woodlands, *Amburana cearensis, Anadenanthera colubrina, Cedrela fissilis, Centrolobium tomentosum,* and *Jacaranda caroba* are some of the characteristic species present (Cunha de Mendonça et al., 1998).

In the state of Paraná, Brazil, central cerrados were described for Jaguariaiva, north of Curitiba, although they are very modified by the penetration of trees and shrubs of neighboring regions. The cerrados described for Paraguay have even less floristic affinity with the true cerrados (Hueck, 1972).

Chilean-Peruvian Desert

These deserts extend for more than 3500 km from northern Peru near the border with Ecuador to central-northern Chile along the length of the coastal region of the Pacific Ocean, approximately between 5°S–29°S approximately. The extreme aridity of these deserts is due in great part to the effect of the cold Humboldt Current, which conducts Antarctic waters from the south, cooling the masses of air at the base; the presence of a sector of high permanent pressure, the Anticyclone of the South Pacific, that does not permit passage of the air masses from the south thus avoiding precipitation; and the thermal inversion of the trade winds that for over 1000 m in height present an air mass that is dry and stable (Cabrera & Willink, 1980; Rauh, 1985; Rundel et al., 1991; Grau, 1995; Teillier et al., 1998). In Chile it is considered that the desert zone extends to the lower slopes to the north of Copiapó (Teillier et al., 1998). The Atacama Desert, in the extreme northern part of this country, is one of the most arid deserts in the world with precipitation less than 10 mm annually. The skies are clear, the relative humidity is very low, rarely exceeding 50%, and the median temperatures are elevated. These deserts possess a high level of endemism and numerous species with adaptation to the more extreme conditions of aridity on the planet.

On some occasions, some precipitation falls favoring the development of an ephemeral but very abundant vegetation, transforming the desert landscape into extensive multicolored tapestries. This phenomenon is known locally as "desierto florido," signifying flowering desert (Muñoz Pizarro, 1965). Actually, it is believed that these precipitations are related to the "Fenómeno del Niño Oscilacion Sur" (El Ñino Effect) that favors displacement of the South Pacific Anticyclone toward the north. This causes the seeds to germinate and the bulbs and rhizomes in a state of latency bud to complete their cycle in a very short cycle. The species possess determinant periods for the flowering such that one can observe changing colors. Among the species most frequently mentioned are diverse Alstroemeriaceae such as *Alstroemeria graminea, A. kingii, A. werdermannii,* and *Leontochir ovallei* (belonging to an endemic genus of Chile); diverse species of *Nolana* such as *N. baccata* and *N. rupicola;* bulbous geophytes such as *Leucocoryne purpurea* and *Rhodophiala ananuca;*

graminea, A. kingii, A. werdermannii y *Leontochir ovallei* (género endémico de Chile); diversas especies de *Nolana* como *N. baccata* y *N. rupicola;* geófitos bulbosos como *Leucocoryne purpurea* y *Rhodophiala ananuca;* plantas de hojas suculentas de *Calandrinia* y *Viola,* y varias especies de *Cristaria* y *Cruckshanksia,* entre otras. Entre los arbustos xerófilos presentes están *Chuquiraga ulicina, Heliotropium pycnophyllum, Ophryosporus triangularis,* y varias especies de *Adesmia, Cristaria, Echinopsis, Oxalis,* etc. (Rauh, 1985; Grau, 1995).

En el mar se forman neblinas denominadas "camanchacas" en Chile y "garúas" en Perú, que penetran tierra adentro y forman zonas de nieblas en las laderas occidentales de los cerros de la costa entre los 300–800 m s.m., que favorecen el desarrollo de un tipo de vegetación conocido como "lomas". La zona inferior permanece generalmente seca y desértica. Estas neblinas no llegan a precipitar lluvias y cuando alcanzan la región más seca y cálida del interior se disipan en la atmósfera. Así, sobre lomas arenosas próximas a la costa crecen asociaciones de especies del género *Tillandsia,* capaces de absorber la humedad del aire a través de los tricomas de sus hojas, junto con cactus redondeados del género *Copiapoa*; sobre terrenos salinos se desarrollan gramíneas halófilas como *Distichlis spicata, Paspalum vaginatum* y *Sporobolus virginicus*. En los valles perpendiculares al mar crecen algunas especies arbóreas y arbustivas como *Acacia macracantha, Caesalpinia spinosa, Prosopis chilensis* y *Salix humboldtiana,* (Cabrera & Willink, 1980; Rauh, 1985; Grau, 1995; Dillon & Hoffmann-J., 1997; Teillier et al., 1998).

Chile Mediterráneo (Chile Central)

La zona central o zona mediterránea de Chile, que climática y fisonómicamente se asemeja a la región mediterránea europea, se extiende como una faja costera de unos 100 km de ancho al sur del Río Aconcagua hasta cerca de Concepción, entre los 32°S–37°S, ocupando un valle longitudinal (la denominada Depresión Central) entre la Cordillera de los Andes y la Cordillera de la Costa. Aquí los inviernos son relativamente lluviosos y los veranos calurosos y secos. La temperatura media anual fluctúa entre 13°C–15°C, y la media de julio alcanza los 8°C. La precipitación oscila entre los 100–800 mm anuales, incrementándose desde la costa hacia los Andes y hacia el sur (Hoffmann-J. & Herrera-McBryde, 1997). En el norte de esta región se dan nueve meses sin precipitación mientras que en el sur sólo cuatro, lo que lleva a que en este último sector la vegetación sea más rica (Grau, 1995).

La vegetación dominante está constituida por arbustos esclerófilos, alternando con bosquecillos de poca altura. En los valles llanos crecen espinares de *Acacia caven, Prosopis chilensis, Schinus polygamus;* o matorrales de *Colliguaja odorifera, Chusquea quila, Dasyphyllum excelsum, Lithraea caustica, Retanilla trinervia* y *Quillaja saponaria* (Cabrera & Willink, 1980). En quebradas

succulent leafed plants of *Calandrinia* and *Viola*; and various species of *Cristaria* and *Cruckshanksia,* among others. Among the xerophytic shrubs present are *Chuquiraga ulicina, Heliotropium pycnophyllum, Ophryosporus triangularis,* and various species of *Adesmia, Cristaria, Echinopsis, Oxalis,* etc. (Rauh, 1985; Grau, 1995).

In the sea, mists or fogs called "camanchacas" in Chile and "garúas" in Peru penetrate the inner terrain and form zones of mist or fog on the western slopes of the Cordillera de la Costa, between 300 and 800 m, that favor the development of a type of vegetation called "lomas." The interior zone remains generally dry and desert-like. These mists or fogs do not result in rainfall, and when they reach a region that is drier and warmer in the interior they dissipate into the atmosphere. Thus, over the sandy "lomas" (hills) proximal to the coast grow associations of the genera *Tillandsia,* capable of absorbing the humidity of the air through the trichomes of its leaves, along with barrel cacti of the genus *Copiapoa;* over saline soils, halophyllous grasses such as *Distichlis spicata, Paspalum vaginatum,* and *Sporobolus virginicus* develop. In the valleys perpendicular to the sea grow some arboreal and shrubby species such as *Acacia macracantha, Caesalpinia spinosa, Prosopis chilensis,* and *Salix humboldtiana* (Cabrera & Willink, 1980; Rauh, 1985; Grau, 1995; Dillon & Hoffmann-J., 1997; Teillier et al., 1998).

Mediterranean Chile (Central Chile)

The Central Zone or Mediterranean Zone of Chile physiognomically resembles the Mediterranean region of Europe. It extends as a coastal strip of some 100 km in width from south of the Río Aconcagua to around Concepción, between 32°S–37°S, occupying a longitudinal valley (called the Depresión Central or Central Depression) between the Cordillera de los Andes and the Cordillera de la Costa. Here the winters are relatively rainy and the summers warm and dry. The median annual temperature fluctuates between 13°C–15°C, and the minimum median in July reaches 8°C. The median precipitation of the region oscillates between 100–800 mm annually, increasing from the coast toward the Andes and toward the south (Hoffmann-J. & Herrera-McBryde, 1997). In the north of this region, there are nine months without precipitation, while in the south only four, which implies that in this latter sector the vegetation should be more complex (Grau, 1995).

The dominant vegetation is composed of schlerophyllous shrubs alternating with small forests or woodlands of small stature. In the llano valleys grow thorn scrubs of *Acacia caven, Prosopis chilensis, Retanilla trinervia,* and *Schinus polygama;* or "matorrales" of *Chusquea quila, Colliguaja odorifera, Dasyphyllum excelsum, Lithraea caustica, Quillaja saponaria,* and *Retanilla trinervia* (Cabrera & Willink, 1980). In ravines opening to the sea near Valparaíso there are some

abiertas al mar cerca de Valparaíso aún existen algunas agrupaciones de *Jubaea chilensis,* la "palma chilena." La mayor de estas agrupaciones se encuentra al norte de La Campana, en el valle de Ocoa (Grau, 1995; Hoffmann-J. & Herrera-McBryde, 1997).

Chaco

El Chaco se trata de una región de aproximadamente 1.000.000 km^2 que se extiende por el sur de Bolivia, desde Santa Cruz de la Sierra, el oeste de Paraguay y el norte-centro de Argentina, hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. La presencia del Chaco en Brasil ha sido verificada sólo para un sector reducido cercano a Puerto Murtinho, en Mato Grosso do Sul (Prado, 1991). Ocupa llanuras casi planas con algunas sierras de poca altura. Estas planicies consisten en la acumulación masiva de sedimentos del Cuaternario sobre el macizo de Brasilia, que se halla a gran profundidad. En el Chaco Central los suelos son pobres en materia orgánica y el horizonte húmico es relativamente poco profundo, hacia el este el horizonte puede llegar hasta 25 cm de profundidad y ser casi nulo en el oeste. En general los suelos son ligeramente alcalinos con alto grado de saturación, resultando inundados durante épocas de lluvias excesivas, principalmente hacia el este donde se observa la presencia de horizontes conformados por arcillas texturadas (Prado, 1991; Galera & Ramella, 1997). Hacia el oeste los suelos pueden ser más ácidos y arenosos, con buen drenaje.

La precipitación disminuye de este a oeste, así, en la zona oriental supera los 1.200 mm anuales, con lluvias que se distribuyen más o menos homogéneamente durante todo el año, mientras que en la zona occidental es cercana a los 500 mm con lluvias que se concentran hacia los meses del verano, llegando a ocurrir hasta seis meses de sequía. La temperatura media anual disminuye de norte a sur, entre 26°C en el norte de Paraguay y 17°C en las sierras del oeste. A excepción de una angosta franja en la zona oriental y cerca de los grandes ríos, la región chaqueña está sujeta a heladas, llegando a una frecuencia de 11 días al año en el extremo occidental de la unidad. La temperatura mínima absoluta también disminuye de este a oeste, desde –1,1°C en Corrientes hasta –7,2°C en Santiago del Estero.

El tipo de vegetación dominante es el bosque xerófilo caducifolio, con un estrato herbáceo de gramíneas, y numerosas cactáceas y bromeliáceas terrestres. Las especies arbóreas más características son los "quebrachos colorados" del género *Schinopsis,* asociados con *Aspidosperma quebracho-blanco, Caesalpinia paraguariensis, Cercidium praecox, Tabebuia impetiginosa, Zizyphus mistol* y diversas especies del género *Prosopis*. En estos bosques son frecuentes las grandes cactáceas *Opuntia quimilo* y *Stetsonia coryne* así como la palmera chaqueña *Trithrinax campestris*. En algunos sectores del centro-norte del Chaco, donde las napas freáticas son poco profundas, se desarrollan

groupings of *Jubaea chilensis,* the "palma chilena." The largest of these groupings is found north of La Campana, in the valley of Ocoa (Grau, 1995; Hoffmann-J. & Herrera-McBryde, 1997).

Chaco

The Chaco is a region of approximately 1,000,000 km^2 that extends from Santa Cruz de la Sierra in southern Bolivia to the west of Paraguay and the central-north of Argentina, to the south of the province of Buenos Aires. The presence of Chaco in Brazil has only been verified for one reduced sector near Puerto Murtinho, in Mato Grosso do Sul (Prado, 1991). It occupies plains that are almost flat with some sierras of slight altitude. These plains consist of the massive accumulation of sediments from the Quaternary over the Brazilian massif that is found to a great depth. In the central Chaco the soils are poor in organic material and the humus horizon is of relatively little depth, toward the east it can reach as much as 25 cm depth but is almost nonexistent in the west. In general the soils are lightly alkaline with a high grade of saturation, resulting in inundation during epochs of excessive rain, principally toward the east where it is observed that the soil horizons are formed of textured clays (Prado, 1991; Galera & Ramella, 1997). Toward the west the soils can be more acidic and sandy with good drainage.

The precipitation diminishes from east to west, so that in the western zone it exceeds 1200 mm annually with rains that are distributed more or less homogeneously throughout the year, whereas in the western zone precipitation is around 500 mm with rains that concentrate toward the summer months, resulting in up to six months of drought. The annual median temperatures diminish from north to south, between 26°C in northern Paraguay and 17°C in the sierras to the west. The Chaco region is subject to frosts achieving a frequency of 11 days per year in the extreme west of the unit, except for a narrow fringe of the eastern zone and along large rivers. The absolute minimum temperatures also diminish from east to west, from –1.1°C in Corrientes to –7.2°C in Santiago del Estero.

The dominant type of vegetation is the deciduous xerophytic forest with herbaceous strata of grasses and numerous Cactaceae and terrestrial bromeliads. The arboreal species most characteristic are the "quebrachos colorados" of the genus *Schinopsis,* associated with *Aspidosperma quebracho-blanco, Caesalpinia paraguariensis, Cercidium praecox, Tabebuia impetiginosa, Zizyphus mistol,* and diverse species of the genus *Prosopis*. In these forests there are frequently the large Cactaceae *Opuntia quimilo* and *Stetsonia coryne* as well as the chaqueña palm, *Trithrinax campestris*. In some sectors of the central-northern Chaco, where the aquifer is somewhat deep there are palm trees of *Copernicia alba*. In the herbaceous layer are predominantly the gramineae of the genera *Digitaria, Gouinia, Pennisetum,*

palmares de *Copernicia alba*. En el estrato herbáceo predominan las gramíneas de los géneros *Digitaria, Gouinia, Pennisetum, Setaria* y *Trichloris*. También son frecuentes las bromeliáceas espinosas como *Bromelia serra, B. hieronymi* y *Dyckia ferox,* y numerosas cactáceas de los géneros *Cleistocactus, Eriocereus* y *Opuntia.* Junto a las depresiones salinas son frecuentes algunas plantas suculentas como *Allenrolfea patagonica, A. vaginata, Heterostachys ritteriana* y *Suaeda divaricata.*

Considerando las condiciones climáticas y edáficas, la fisonomía de la vegetación y la dominancia de las especies arbóreas, pueden discriminarse las siguientes zonas dentro de lo que se conoce como el Gran Chaco:

a) El Chaco Oriental es el sector más húmedo, con una precipitación que va desde 1200 mm anuales al este, hasta los 700 mm hacia el oeste. En ocasión de lluvias intensas es frecuente el anegamiento. La temperatura media anual varía de 23°C en el norte a 19,5°C en el sur. Se caracteriza por el predominio de *Schinopsis balansae.*

b) El Chaco Occidental (también denominado Chaco Central o Chaco Verdadero) es más árido que el anterior, con una precipitación principalmente estival, que varía entre 350–650 mm anuales. La temperatura media anual oscila entre 28°C en el norte y 12 °C en el sur. La especie arbórea dominante en este sector es *Schinopsis lorentzii.* En aquellos sitios donde el suelo es más salino y los períodos de sequía más prolongados, son frecuentes los "algarrobales» de *Prosopis nigra, P. alba* y otras especies de este género.

c) El Chaco Serrano ocupa el extremo occidental de esta unidad, sobre los primeros contrafrentes de la Cordillera de los Andes. La precipitación varía entre 500–900 mm anuales. Entre los árboles predomina *Schinopsis marginata,* acompañado por grandes ejemplares de *Ceiba chodatii.*

d) Algunos autores han caracterizado el denominado Chaco Austral, hacia el sur de esta unidad, donde se desarrollan sabanas de gramíneas con ausencia de árboles. Las especies más frecuentes son *Elionurus muticus* y *Leptochloa chloridiformis,* entre otras (Cabrera & Willink, 1980).

En esta unidad se incluye la denominada provincia del Espinal (Cabrera, 1976), que a modo de arco irregular rodea a las Pampas, y actualmente es considerada un enorme ecotono entre el Chaco y la Pampa (Prado, 1991). Se trata de un Chaco empobrecido con ausencia de quebrachos colorados y preponderancia de especies arbóreas del género *Prosopis,* acompañadas por *Acacia caven, Celtis ehrenbergiana, Geoffroea decorticans, Jodina rhombifolia* y *Schinus longifolia,* entre otras.

Pampas

Las Pampas se extienden por las llanuras del centro-este de la Argentina, Uruguay y la porción austral del estado de Rio Grande do Sul, Brasil, entre los 30°S–39°S.

Setaria, and *Trichloris*. Also frequent are the spinose bromeliads such as *Bromelia serra, B. hieronymi,* and *Dyckia ferox,* and numerous cactaceae of the genera *Cleistocactus, Eriocereus,* and *Opuntia.* In the saline depressions there are frequently some succulent plants such as *Allenrolfea patagonica, A. vaginata, Heterostachys ritteriana,* and *Suaeda divaricata.*

With respect to the edaphic and climatic conditions, the physiognomy of the vegetation and the dominance of the arboreal species can be separated into the following zones within what is known as the "Gran Chaco":

a) The East Chaco or "Chaco Oriental" is the wettest section, with precipitation that ranges from 1200 mm annually in the east to 700 mm in the west. During occasions of intense rainfall inundation is frequent. The annual median temperatures vary between 23°C in the north to 19.5°C in the south. It is characterized by the dominance of *Schinopsis balansae.*

b) The West Chaco or "Chaco Occidental" (also called "Chaco Central" or "Chaco Verdadero" signifying the true Chaco) is more arid than the anterior one, with precipitation principally seasonal, which varies between 350 and 650 mm annually. The annual median temperature oscillates between 28°C in the north and 12°C in the south. The arboreal species dominant in this sector is *Schinopsis lorentzii.* In some sites where the soil is more saline and the periods of drought more prolonged, there are frequently "algarrobales" of *Prosopis nigra, P. alba,* and other species of this genus.

c) The Sierran Chaco or "Chaco Serrano" occupies the extreme western part of this unit, over the first foothills of the Andean chain. The precipitation varies between 500–900 mm annually. The trees are predominantly *Schinopsis marginata,* accompanied by large examples of *Ceiba chodatii.*

d) Some authors have characterized the so-called South Chaco or "Chaco Austral" toward the south of this unit, which is where grass savannas grow without trees. The most frequent species are *Elionurus muticus* and *Leptochloa chloridiformis,* among others (Cabrera & Willink, 1980).

Included in this unit is the province of Espinal (Cabrera, 1976), which forms an irregular arc surrounding the Pampas and is considered an enormous ecotone between the Chaco and the Pampa (Prado, 1991). It treats a Chaco impoverished by the absence of "quebrachos colorados" and with a preponderance of arboreal species of the genus *Prosopis,* accompanied by *Acacia caven, Celtis ehrenbergiana, Geoffroea decorticans, Jodina rhombifolia,* and *Schinus longifolia,* among others.

Pampas

The Pampas extend over the plains of central-eastern Argentina, Uruguay, and the southern portion of the state of Rio Grande do Sul, Brazil, between 30°S–39°S. The

El clima es templado-cálido con lluvias uniformes durante todo el año, que disminuyen de norte a sur y de este a oeste, desde unos 1200 a 600 mm anuales. La temperatura media anual varía entre los 13°C–17°C. La vegetación dominante es la estepa o pseudoestepa de gramíneas, entre las que crecen numerosas hierbas y algunos arbustos y subarbustos. Estos pastizales tienen un período de reposo durante el invierno y generalmente otro durante el verano. Existen también numerosas comunidades edáficas: estepas halófitas, comunidades hidrófilas, bosques marginales en las orillas de los ríos, asociaciones saxícolas en las serranías, bosques xerófilos sobre las barrancas del Río Paraná y los "talares" de *Celtis* sobre los bancos de conchillas paralelos a la costa de la provincia de Buenos Aires (Cabrera & Willink, 1980).

De acuerdo a la composición florística de las comunidades climáxicas y edáficas que se desarrollan en los diversos sectores pueden distinguirse:

a) En el sur de Brasil, Uruguay y las provincias Argentinas de Entre Ríos y Santa Fe, la comunidad clímax es el "flechillar" de *Nassella,* con *N. neesiana, N. tenuissima* o *N. charruana,* asociadas con *Eragrostis cilianensis, Melica brasiliana, Panicum bergii, Paspalum notatum, P. dilatatum, P. plicatulum, Piptochaetium montevidense* y *Poa lanigera,* entre otras tantas. Las comunidades edáficas son numerosas: las selvas ribereñas conformadas por elementos de la selva atlántica interior, aunque empobrecidas de norte a sur, con predominio de *Allophylus edulis, Blepharocalyx salicifolius, Nectandra angustifolia, Ocotea angustifolia, Pouteria salicifolia, Sapium haematospermum, Sebastiania brasiliensis,* etc.; bosques xerófilos sobre las barrancas de los ríos, con elementos espinosos característicos del Chaco como *Celtis ehrenbergiana, Jodina rhombifolia, Phytolacca dioica, Prosopis alba, Scutia buxifolia,* etc. Entre las comunidades hidrófilas se encuentran los "juncales" de *Schoenoplectus californicus* y los "pajonales" de *Spartina densiflora*; por último, comunidades psamófilas sobre las dunas o suelos arenosos con *Elionurus muticus, Panicum racemosum, Poa lanuginosa* y *Senecio crassiflorus.* En las serranías de Uruguay se desarrollan bosquecillos con especies arbóreas ribereñas junto con *Colletia paradoxa, Schinus lentiscifolius, Styrax leprosus,* etc. En las grietas de las rocas crecen numerosas pteridófitas y cactáceas de los géneros *Echinopsis, Gymnocalycium, Opuntia* y *Wigginsia,* e incluso un cardón de unos dos ó tres metros de altura, *Cereus uruguayanus.*

b) En el norte y este de la provincia de Buenos Aires hasta las serranías de Tandil y Balcarce, y en el sur de la misma, las especies dominantes del "flechillar" son *Bothriochloa laguroides, Nassella neesiana y Piptochaetium montevidense.*

climate is warm-temperate with uniform rainfall during the entire year that decreases from north to south and from east to west, ranging from some 1200 down to 600 mm annually. The annual median temperature varies between 13°C–17°C. The dominant vegetation is the steppe or pseudo-steppe of grasses, among which grow numerous herbs and some shrubs and subshrubs. These grasslands have a dormant period during the winter and generally another during the summer. Here also are numerous edaphic communities: halophytic steppes, hydrophytic communities, marginal forests along the riverbanks, saxicolous associations in the hills, sclerophyllous woodlands on the banks of the Río Paraná, and the "talares" of *Celtis* on the shell deposits parallel to the coast of the province of Buenos Aires (Cabrera & Willink, 1980).

Based on the floristic composition of the climax communities and the edaphic variation that develops, several diverse sectors can be distinguished:

a) In southern Brazil, Uruguay, and the Argentinian provinces of Entre Ríos and Santa Fe, the climax community is "flechillar" of *Nassella,* with *N. neesiana, N. tenuissima,* or *N. charruana,* associated with *Eragrostis cilianensis, Melica brasiliana, Panicum bergii, Paspalum notatum, P. dilatatum, P. plicatulum, Piptochaetium montevidense,* and *Poa lanigera,* among many others. The edaphic communities are numerous: riverine forests composed of elements of the Atlantic Forest interior, although impoverished from north to south, with predominantly *Allophylus edulis, Blepharocalyx salicifolius, Nectandra angustifolia, Ocotea angustifolia, Pouteria salicifolia, Sapium haematospermum,* and *Sebastiania brasiliensis,* etc.; sclerophyllous woodlands along river borders with spinose elements characteristic of the Chaco such as *Celtis ehrenbergiana, Jodina rhombifolia, Phytolacca dioica, Prosopis alba, Scutia buxifolia,* etc. Among the hydrophytic communities encountered are the "juncales" of *Schoenoplectus californicus* and the "pajonales" of *Spartina densiflora;* lastly, psammophilous communities found in dunes or sandy soils include *Elionurus muticus, Panicum racemosum, Poa lanuginosa,* and *Senecio crassiflorus.* In the foothills or low sierras of Uruguay, low forests are formed with arboreal riverine species together with *Colletia paradoxa, Schinus lentiscifolius, Styrax leprosus,* etc. Numerous pteridophytes grow in rock crevices, and Cactaceae of the genera *Echinopsis, Gymnocalycium, Opuntia, Wigginsia,* and *Cereus uruguayanus,* a cardon two to three meters in height.

b) In the north and east of the province of Buenos Aires, Argentina, up to the Sierras of Tandil and Balcarse, in the south of the aforementioned

c) En el sur de la provincia de Córdoba, nordeste de Santa Fe y noroeste de Buenos Aires los suelos suelen ser arenosos, encontrándose relieves de antiguas dunas. No hay ríos, pero sí lagunas de desagüe con frecuencia salobres. En estos sectores el "flechillar" está compuesto principalmente por *Elionurus muticus, Nassella trichotoma, N. poeppigiana, Panicum urvilleanum, Poa ligularis* y *Sorghastrum pellitum,* etc. Sobre las dunas se destacan comunidades psamófilas de *Hyalis argéntea, Panicum urvilleanum* y *Poa ligularis*.

d) En el sur de la provincia de Buenos Aires, desde las serranías de Olavarría, Tandil y Balcarce hacia el sur, hasta cerca de la ciudad de Bahía Blanca el clima es más frío y seco. Aquí, la comunidad clímax está conformada por especies de *Nassella* y *Piptochaetium,* siendo muy abundantes *N. clarazii, N. tenuis, N. trichotoma, P. lejopodum* y *P. napostaense*. En las serranías aparecen matorrales de *Baccharis tandilensis, Colletia spinosissima, Discaria americana, Dodonaea viscosa, Mimosa rocae* y *M. tandilensis*. La sierra de la Ventana es rica en endemismos, incluyendo a *Adesmia pampeana, Festuca ventanicola, F. pampeana* y *Plantago bismarckii*, entre otras.

Monte

El Monte se extiende por regiones áridas de Argentina entre los 27°S–44°S, desde Salta por áreas de precordillera de Catamarca, La Rioja, Salta y San Juan hacia el sur-sudeste, hasta el nordeste de Chubut, ocupando llanuras arenosas, mesetas y laderas bajas de montañas. En sus límites orientales forma amplios ecotonos con el Chaco. El clima es seco y cálido en la porción septentrional y más fresco en la meridional. La precipitación media anual varía entre los 80–250 mm. La temperatura media anual oscila entre 13°C–15,5°C. De composición florística homogénea, la fisonomía dominante es el matorral de 1–2 m de altura con predominio de Zygophyllaceae de los géneros *Larrea* (*L. cuneifolia, L. divaricata, L. nitida,* "las jarillas"), *Bulnesia* y *Plectrocarpa;* junto con *Bulnesia retama, Cercidium praecox, Chuquiraga erinacea, Monttea aphylla, Prosopis alpataco* y *Senna aphylla,* entre otras. Existen además diversas comunidades edáficas como "bosquecillos de algarrobos" (*Prosopis flexuosa, P. chilensis*) en las orillas de los ríos; "chilcales" de *Baccharis salicifolia* y *Tessaria dodoneaefolia* en suelos húmedos; matorrales de *Allenrolfea vaginata* y *Suaeda divaricata* en suelos salinos, etc. (Cabrera & Willink, 1980). Las estepas arbustivas semiáridas descritas por Roig (1999) se corresponden con los matorrales de Zygophyllaceae antes mencionados. El nivel de endemismo es elevado en la región (véase resultados de la presente investigación).

subsection, the dominant species of the "flechillar" are *Bothriochloa laguroides, Nassella neesiana,* and *Piptochaetium montevidense*.

c) In the south of the provinces of Córdoba, the northeast of Santa Fe, and the northeast of Buenos Aires, the soils used to be sandy, encountered as relicts of old dunes. Rivers are not present, but there are brackish drainage lagoons. In these sectors the "flechillar" is composed principally by *Elionurus muticus, Nassella trichotoma, N. poeppigiana, Panicum urvilleanum, Poa ligularis, Sorghastrum pellitum,* etc. Over the dunes dominate psammophilous communities of *Hyalis argentea, Panicum urvilleanum,* and *Poa ligularis*.

d) In the south of the province of Buenos Aires, from the low Sierras of Olavarría, Tandil, and Balcarce toward the south, up to the vicinity of Bahía Blanca, the climate is colder and dry. Here, the climax community is composed of species of *Nassella* and *Piptochaetium,* and abundant *N. clarazii, N. tenuis, N. trichotoma, P. napostaense,* and *P. lejopodum.* In the low sierras appear "matorrales" or matorral of *Baccharis tandilensis, Colletia spinosissima, Discaria americana, Dodonaea viscosa, Mimosa rocae,* and *M. tandilensis*. The Sierra de la Ventana is very rich in endemic species, for example *Adesmia pampeana, Festuca ventanicola, F. pampeana,* and *Plantago bismarckii*.

Monte

The Monte extends through arid regions of Argentina between 27°S–44°S, from Salta in areas of lower montane Catamarca, La Rioja, Salta, and San Juan toward the south-southeast to northeastern Chubut, occupying sandy plains, mesas, and lower slopes of mountains. In its eastern limits it forms broad ecotones with the Chaco. The climate is dry and warm in the northern portion and cooler in the central one. Annual median precipitation varies between 80–250 mm. The annual median temperature oscillates between 13°C and 15.5°C. The floristic composition is homogenous, the dominant physiognomy is the matorral of 1–2 m in height predominantly with Zygophyllaceae of the genera *Larrea* (*L. divaricata, L. cuneifolia, L. nitida,* the "jarillas"), *Bulnesia,* and *Plectrocarpa,* together with *Bulnesia retama, Cercidium praecox, Chuquiraga erinacea, Monttea aphylla, Prosopis alpataco,* and *Senna aphylla,* among others. There are also diverse edaphic communities such as "bosquecillos de algarrobos" (*Prosopis flexuosa, P. chilensis*) along riverbanks, "chilcales" of *Baccharis salicifolia* and *Tessaria dodoneaefolia* in wet soils, matorral of *Allenrolfea vaginata* and *Suaeda divaricata* in saline soils, etc. (Cabrera & Willink, 1980). The shrubby semiarid steppes described by Roig (1999) correspond with the matorrals of Zygophyllaceae previously mentioned. The levels of endemism are high in this region (see results below).

Patagonia

Esta unidad incluye tierras áridas o semiáridas al sur del Río Colorado en la Argentina, llegando en su extremo austral hasta la porción septentrional de la Isla de Tierra del Fuego. Hay en la Patagonia una marcada reducción de la temperatura en sentido norte-sur y este-oeste debida al aumento de la latitud y al alejamiento del Océano Atlántico, lo que favorece una mayor amplitud térmica por continentalidad. La temperatura media anual varía desde 5,5°C en Río Grande (provincia de Santa Cruz) en el extremo más frío, hasta 15,8°C en Río Colorado (provincia de Río Negro). En la mayor parte de la región la amplitud térmica anual se corresponde con aquella de zonas de climas marítimos influenciados por las masas oceánicas, así en Ushuaia la amplitud térmica es sólo de 8,5°C; contrariamente, en sectores de gran continentalidad se observan amplitudes térmicas más elevadas, como en la ciudad de Neuquén donde es cercana a los 17°C. La frecuencia de heladas es muy elevada en todo el territorio, aumentando en los mismos gradientes. Así, en el noreste el período medio libre de heladas es de unos 260 días, mientras que hacia el sudoeste es inferior a 100 días. La precipitación media anual alcanza los 270 mm. Los vientos provenientes del Oeste, originados en el océano Pacífico, al interactuar con la Cordillera de los Andes originan precipitaciones abundantes en ese sector, pero se empobrecen en humedad en su avance hacia el este atravesando el territorio patagónico casi absolutamente secos; este hecho explica la baja precipitación del sector. Estos vientos del Oeste son dominantes, y generalmente fuertes, durante todo el año. Las nevadas son comunes en la región, incrementándose igualmente hacia el sur y el oeste (Conti, 1999).

La vegetación dominante de la Patagonia es la estepa arbustiva árida o semiárida, y en las zonas occidentales y meridionales más húmedas predominan las estepas graminosas. Entre las estepas arbustivas áridas se encuentran los "eriales" de *Nassauvia glomerulosa* que ocupan la mayor extensión, desde las cercanías de la costa atlántica hasta los 900–1100 m s.m., en las mesetas al oeste y desde el centro de Chubut hasta el sur de Santa Cruz. Estas estepas constituyen la máxima expresión de aridez de la región. La precipitación es muy escasa y oscila entre 100–150 mm anuales. La cobertura de la vegetación es sólo del 10%–20% y el suelo es pedregoso y somero. Las especies que frecuentemente acompañan a *N. glomerulosa* son *Acaena platyacantha, Brachyclados caespitosus, Burkartia lanigera, Chuquiraga avellanedae, C. aurea, Ephedra frustillata, Jarava ibarii, Nardophyllum bryoides* y *Tetraglochin caespitosum*. Al sur de la provincia de Santa Cruz, principalmente entre los Ríos Chico y Coyle, se desarrollan otras estepas arbustivas dominadas por *Junellia tridens*, una especie pionera capaz de repoblar áreas denudadas (Roig, 1999).

Entre las estepas graminosas patagónicas pueden mencionarse los "coroinales" de *Festuca gracillima* que

Patagonia

Patagonia includes arid or semi-arid lands south of the Río Colorado (province of Río Negro, Argentina), extending farther down to the northern part of the island of Tierra del Fuego. In Patagonia there is a marked reduction of temperature from north-south and east-west due to the increasing latitude and distance from the Atlantic Ocean that favors larger thermal amplitude by continentality. The median annual temperature varies from 5.5°C in Río Grande (province of Santa Cruz) in the coldest extreme, up to 15.8°C in Río Colorado (province of Río Negro). In the greatest part of the region the annual thermic amplitude corresponds with that of maritime climate zones, influenced by the ocean masses, so that in Ushuaia the thermic amplitude is only 8.5°C; in contrast, in sectors of large continentality more elevated thermic amplitudes are observed, as in the city of Neuquén where it is near 17°C. The frequency of frost is very elevated throughout the territory, increasing in the same gradients, such that in the northeast the average period free of frost is some 260 days, whereas toward the southeast it is less than 100 days. The annual median precipitation reaches 270 mm. The winds come from the west, originating in the Pacific Ocean, and upon interacting with the Andean Cordillera produce abundant precipitation in this sector which lessens as they advance toward the east. As they cross the Patagonian territory, the winds become almost absolutely dry, explaining the low precipitation in the western part. These winds from the west are the dominant ones during the year and are generally strong. Snows are common in the region, increasing equally towards the south and the west (Conti, 1999).

The dominant vegetation type is the shrubby semi-arid or arid-steppe. In the western zones and wetter central ones there are predominantly grassy steppes. Within the arid shrubby steppes are found the "eriales" of *Nassauvia glomerulosa* that have their major extension from the vicinity of the Atlantic Coast up to 900–1100 m, in the low mesas to the west, and from the center of Chubut to southern Santa Cruz. These steppes constitute the maximal expression of aridity in the region. The precipitation is very scarce, oscillating between 100–150 mm annually. The vegetation cover is only 10%–20% and the soil is rocky and shallow. The species that frequently accompany *N. glomerulosa* are *Acaena platyacantha, Brachyclados caespitosus, Burkartia lanigera, Chuquiraga avellanedae, C. aurea, Ephedra frustillata, Jarava ibarii, Nardophyllum bryoides,* and *Tetraglochin caespitosum*. In the southern part of the province of Santa Cruz, principally between the rivers Chico and Coyle, other shrubby steppes are found that are dominated by *Junellia tridens*, a pioneer species capable of repopulating denuded areas (Roig, 1999).

Within the gramineous steppes are found "coroinales" of *Festuca gracillima* that form mats of 30–40 cm height occupying plains, terraces, hills, or mesas in the southern

forman matas de 30–40 cm de alto, ocupando llanuras, terrazas, colinas y mesetas en el sur de Santa Cruz hasta el estrecho de Magallanes y en la porción norte de Tierra del Fuego; y los "coroinales" de *Festuca pallescens* que cubren una angosta faja lateral al sistema andino (entre los 37°S–51°S), limitando al oeste con los bosques andino-patagónicos y al este con el erial patagónico de *Nassauvia glomerulosa* y *N. ulicina* (Roig, 1999).

Pacífico Templado Húmedo (Bosques Subantárticos)

Esta unidad se extiende sobre las montañas y valles del centro de Chile, aproximadamente desde los 35°S, en forma de fajas angostas sobre la cordillera de la costa y los primeros contrafuertes de los Andes hasta el paralelo 38°S. Desde esa latitud ingresa en territorio argentino y se extiende hacia el sur por todo el territorio chileno y la ladera oriental de los Andes en Argentina, hasta el estrecho de Magallanes, la porción meridional de la Isla de Tierra del Fuego, la Isla de los Estados e Islas Malvinas (Argentina), en el Atlántico Sur. También se incluyen las islas del Archipiélago Juan Fernández y las Islas Desventuradas (Chile), en el Océano Pacífico.

En la porción continental el clima es templado húmedo, con una temperatura media anual de 9,5°C en el sector norte y de 5,4°C en el extremo sur. La precipitación es abundante en las laderas occidentales de los Andes, alcanzando los 5000 mm anuales en algunos sectores debido a la interacción de la cordillera con los vientos húmedos del oeste, originados en el anticiclón del Océano Pacífico. Hacia el este, una vez traspuesta la Cordillera de los Andes, la precipitación disminuye rápidamente hasta los 700–800 mm. El tipo de vegetación dominante es el bosque caducifolio o perennifolio. Desde el punto de vista florístico predominan los géneros de distribución austral como *Dacrydium, Laurelia, Lomatia* y *Nothofagus*. Hay dos familias endémicas, las Aextoxicaceae y las Misodendraceae, y numerosos géneros endémicos, entre ellos, *Austrocedrus, Combera, Fitzroya, Macrachaenium* y *Pilgerodendron* (Cabrera & Willink, 1980).

En sentido norte-sur pueden discriminarse los siguientes tipos de bosques:

a) Bosque caducifolio de la región del Maule. Se extiende sobre la Cordillera de la Costa en Chile, aproximadamente entre los 35°–37° de latitud sur. Se trata de un bosque de transición donde se mezclan elementos de Chile Central y de los bosques subantárticos. Los árboles más conspicuos son *Nothofagus alessandrii, N. dombeyi* y *N. obliqua,* acompañados por *Laurelia sempervirens* (laurel), *Persea lingue* (lingue), *Peumus boldus* (boldo), entre otros, junto con arbustos de *Aristotelia chilensis, Baccharis concava, Raphithamnus spinosus,* etc. Crecen también numerosas enredaderas como *Lapageria rosea* (la flor nacional de Chile) y *Luzuriaga radicans*.

part of Santa Cruz to the Strait of Magellan and in the northern portion of Tierra del Fuego. Also found are "coroinales" of *Festuca pallescens* that cover a narrow fringe lateral to the Andino system (between 37°S–51°S), delimited to the west by the Andino-Patagonian forests and to the east by the Patagonian "erial" of *Nassauvia glomerulosa* and *N. ulicina* (Roig, 1999).

Wet-Temperate Pacific (Sub-antarctic Forests)

This unit extends over the mountains and valleys of central Chile from approximately 35°S, in the form of narrow strips on the coastal range and the first foothills of the Andes down to parallel 38°S. From this latitude it extends into the Argentinean territory and toward the south through all of the Chilean territory and the eastern slopes of the Andes in Argentina, to the Strait of Magellan, the central portion of Tierra del Fuego island, the Isla de los Estados, and the Islas Malvinas or Falkland Islands (Argentina) in the South Atlantic. Also included are the islands of the Juan Fernández Archipelago and the Islas Desventuradas (Chile) in the Pacific Ocean.

In the continental portion, the climate is warm-temperate with annual median temperatures of 9.5°C in the north sector and 5.4°C in the extreme south. The precipitation is abundant on the eastern slopes of the Andes reaching some 5000 mm annually in some sectors due to the interaction of the Cordillera with the wet winds from the west, which originate in the anticyclone of the Pacific Ocean. Toward the east, once transposed across the Andes Mountains, the precipitation diminishes rapidly to 700–800 mm annually. The dominant type of vegetation is deciduous or perennial forest. From a floristic perspective, there are predominantly genera of southern distribution such as *Dacrydium, Laurelia, Lomatia,* and *Nothofagus*. There is an endemic family, the Misodendraceae, and numerous endemic genera, among them *Austrocedrus, Combera, Fitzroya, Macrachaenium,* and *Pilgerodendron* (Cabrera & Willink, 1980).

From north to south the following types of forests can be discriminated:

a) Deciduous forests of the region of Maule, which extends over the Coastal Cordillera in Chile, approximately between 35°–37° latitude south. These are transition forests that mix elements of Central Chile and of the subantarctic forests. The most conspicuous trees are *Nothofagus alessandrii, N. dombeyi, N. obliqua,* accompanied by *Laurelia sempervirens* (laurel), *Persea lingue* (lingue), and *Peumus boldus* (boldo), among others, together with shrubs of *Aristotelia chilensis, Baccharis concava, Raphithamnus spinosus,* etc. Also growing here are various vines such as *Lapageria rosea* (the national flower of Chile) and *Luzuriaga radicans*.

b) Bosques de *Araucaria araucana* (pehuén) que se extienden por áreas discontinuas en la Cordillera de Nahuelbuta (Chile), entre los 37°30'S y los 38°40'S, y en la Cordillera de los Andes entre los 37°40'S y los 40°10'S. En estos sectores la comunidad climáxica es el bosque de *A. araucana,* una imponente conífera que puede alcanzar los 45 m de altura, que forma asociaciones con *Nothofagus pumilio* (lenga) o *N. antarctica* (ñire), junto con diversas especies arbustivas.

c) Bosque siempreverde valdiviano se extiende al sur del paralelo 37°S donde la precipitación anual aumenta significativamente, favoreciendo el desarrollo de bosques siempreverdes que se distribuyen de acuerdo con la altitud, la orientación e inclinación de las laderas montañosas. Estos bosques lluviosos alcanzan aproximadamente los 47°S, ingresando en algunos sectores del territorio argentino. Entre las especies arbóreas dominantes se encuentra *Nothofagus dombeyi* (coigüe), asociado a veces con *Aextoxicon punctatum, Dasyphyllum diacanthoides, Eucryphia cordifolia* (ulmo), *Gevuina avellana* (avellano), *Laurelia philippiana, Persea lingue* y *Weinmannia trichosperma;* o bien con *Fitzroya cupressoides* (alerce), *Pilgerodendron uviferum* (len), *Podocarpus nubigenus* (mañiu) y *Saxegothaea conspicua* (mañiu hembra). En todos estos bosques son frecuentes bambúseas como *Chusquea culeou* (caña coligüe), y entre los arbustos se destacan diversas especies del género *Berberis, Escallonia* y una especie de *Fuchsia*. El estrato herbáceo es muy rico y en él domina *Fragaria chiloensis,* junto con numerosos helechos como *Adiantum chilense* (culandrillo), *Blechnum chilense* (costilla de vaca), *Hypolepis poeppigii, Lophosoria quadripinnata* (ampe) y *Megalastrum spectabile.* Entre las lianas y enredaderas se pueden mencionar a *Cissus striata* (pilpilvoqui), *Lapageria rosea, Lardizabala biternata* (cóguil) y *Luzuriaga radicans* (quilineja). Especies del género *Misodendrum* son parásitas de *Nothofagus,* y también son importantes los bosques de *Luma apiculata* (arrayán) en las orillas de los ríos y lagos (Cabrera & Willink, 1980; Grau, 1995).

d) Bosques magallánicos que se encuentran al sur del paralelo 47° de latitud sur hasta el Cabo de Hornos, presentan un clima que es más frío y seco, y más pobre en número de especies que los bosques valdivianos. La comunidad climáxica es el bosque de *Nothofagus betuloides* (guindo), que forma asociaciones puras o mezcladas con *Austrocedrus chilensis, Drimys winteri* (canelo), *Maytenus magellanica* (maitén), *Pilgerodendron uviferum,* como también con *Nothofagus antarctica* y *N. pumilio*. Los bambúes están ausentes, siendo abundantes arbustos, hierbas y helechos.

e) Bosques caducifolios que ocupan los bordes orientales más secos de esta región biogeográfica, y

b) Forests of *Araucaria araucana* (pehuén) are found in discontinuous areas in the Cordillera de Nahuelbuta (Chile) between 37°30'S and 38°40'S, and in the Andean Cordillera between 37°40'S and 40°10'S. In these sectors the climax community is a forest of *A. araucana* (pehuén), an imposing conifer that can reach 45 m height and forms associations with *Nothofagus pumilio* (lenga), *N. antarctica* (ñire), and diverse shrubby species.

c) Valdivian evergreen forest or "bosque siempreverde valdiviano" is found to the south of parallel 37°S, where annual precipitation increases significantly favoring the development of evergreen forests that are distributed according to the altitude, orientation, and inclination of the mountain slopes. These rainforests reach approximately 47°S, extending into some sectors of the Argentinean territory. Among the dominant arboreal species found are *Nothofagus dombeyi* (coigüe), associated at times with *Aextoxicon punctatum, Dasyphyllum diacanthoides, Eucryphia cordifolia* (ulmo), *Gevuina avellana* (avellano), *Laurelia philippiana, Persea lingue,* and *Weinmannia trichosperma,* as well as *Fitzroya cupressoides* (alerce), *Pilgerodendron uviferum* (len), *Podocarpus nubigenus* (mañiu), and *Saxegothaea conspicua* (mañiu hembra). In all these forests there are frequently bamboos, such as *Chusquea culeou* (caña coligüe), and diverse shrub species of the genera *Berberis, Escallonia,* and *Fuchsia*. The herbaceous stratum is very rich, with *Fragaria chiloensis* dominant together with numerous ferns such as *Adiantum chilense* (culantrillo), *Blechnum chilense* (costilla de vaca), *Hypolepis poeppigii, Lophosoria quadripinnata* (ampe), and *Megalastrum spectabile*. Among the lianas and vines are *Cissus striata* (pilpilvoqui), *Lapageria rosea, Lardizabala biternata* (cóguil), and *Luzuriaga radicans* (quilineja). It is also necessary to make reference to the genus *Misodendrum,* whose species are parasites of *Nothofagus* and to the forests of *Luma apiculata* (arrayán) that develop along the borders of the rivers and lakes (Cabrera & Willink, 1980; Grau, 1995).

d) Magellanic forests or "bosques magallánicos," which occur south of parallel 47°S and south down to Cape Horn, have a climate that is colder, drier, and poorer in the number of species than the Valdivian forests. The climax community is the forest of *Nothofagus betuloides* (guindo) that forms pure or mixed associations with *Austrocedrus chilensis, Drimys winteri* (canelo), *Maytenus magellanica* (maitén), and *Pilgerodendron uviferum,* and also includes *Nothofagus antarctica* and *N. pumilio*. The bamboos are absent, but shrubs, herbs, and ferns are abundant.

e) Deciduous forests of the drier, eastern slopes of this biogeographic region, which are also present above

aparecen también por encima de los bosques valdivianos y magallánicos. Estos bosques están caracterizados por la presencia de *Nothofagus antarctica* y *N. pumilio,* ambas especies de hoja caduca. En los sectores más septentrionales se encuentra también *Austrocedrus chilensis,* que tolera mejor el calor y la sequía.

Dentro de esta unidad se incluye el archipiélago de Juan Fernández (Chile), compuesto por tres islas: Robinson Crusoe o Más a Tierra (48 km^2), Alejandro Selkirk o Más Afuera (50 km^2) y Santa Clara (2 km^2). Estas islas ubicadas a unos 670 km al oeste de Chile continental, son de origen volcánico, con relieve montañoso y algunos picos que alcanzan los 1500 m s.m. El clima es templado cálido y húmedo con una precipitación cercana a los 1000 mm anuales. La temperatura media anual es de 14°C (Cabrera & Willink, 1980; Grau, 1995).

La vegetación está conformada por: pastizales de gramíneas en las zonas bajas; bosques en las laderas y quebradas con *Drimys confertifolia, Fagara mayu* y *Nothomyrcia fernandeziana,* entre otras, y abundancia de helechos arborescentes en las zonas más elevadas como *Dicksonia berteroana;* y matorrales de *Empetrum rubrum, Gaultheria racemulosa* y *Ugni selkirkii* por encima del nivel de los bosques. Según el esquema fitogeográfico de Cabrera & Willink (1980), la flora del archipiélago está relacionada con la provincia fitogeográfica Subantártica, aunque carece del género *Nothofagus.* También están presentes numerosos elementos tropicales y otros típicos de las islas del Pacífico. Aproximadamente el 50% de la flora de estas islas es introducida (Stuessy et al., 1997; Marticorena et al., 1998).

Se han registrado unas 423 especies de plantas vasculares para este archipiélago con un nivel de endemismo que excede el 30% (Marticorena et al., 1998). Este posee una familia endémica, Lactoridaceae (con *Lactoris fernandeziana*), paleohierbas de unos 90 millones de años de antigüedad que crecen exclusivamente en la isla de Más a Tierra en en el bosque montano en acantilados pendientes por encima de los 500 m s.m. Entre los géneros endémicos se encuentran: *Juania* (con *Juania australis*) la única palma presente, *Thyrsopteris* un género de Pteridofita, y otros géneros de la familia Asteraceae como: *Centaurodendron, Dendroseris, Robinsonia* y *Yunquea* que son arbustos o árboles con hojas dispuestas en rosetas apicales (Cabrera & Willink, 1980).

El Archipiélago de Las Desventuradas (Chile) está integrado por dos islas principales, San Ambrosio (10 km^2) y San Félix (2 km^2), situadas a unos 950 km de la costa de Chañaral (Mapa 4, Región III). Se trata de islas de origen volcánico cubiertas por una vegetación arbustiva muy esparcida, siendo característico en ambas islas el género de Asteraceae *Thamnoseris,* con *Thamnoseris lacerata,* única especie que adquiere porte arbóreo. La flora vasculare es muy escasa y en este *Catálogo* se incluyen sólo 28 taxa.

En esta unidad se incluyen también las Islas Malvinas (Argentina), integradas por las islas Gran Malvina (4377

the evergreen Valdivian forest and the Magellanic forest, are characterized by the presence of *Nothofagus antarctica* and *Nothofagus pumilio*, two deciduous species of the genus. *Austrocedrus chilensis,* a species adapted to drier habitats and warmer environments, is common in the northern areas of this region.

Included in this unit is the archipelago of Juan Fernández (Chile), which is composed of three islands: Robinson Crusoe or Más a Tierra (48 km^2), Alejandro Selkirk or Más Afuera (50 km^2), and Santa Clara (2 km^2). Situated at some 670 km to the west of continental Chile, the islands are of volcanic origin, with mountainous relief and some peaks that reach 1500 m. The climate is warm-temperate and wet with precipitation near 1000 mm annually. The annual median temperature is 14°C (Cabrera & Willink, 1980; Grau, 1995).

The vegetation in the lower areas is composed of grasslands. On the slopes and ravines are forests with *Drimys confertifolia, Fagara mayu,* and *Nothomyrcia fernandeziana,* among others, and in the higher areas there is an abundance of arborescent ferns, such as *Dicksonia berteroana.* Above the level of the forests are matorrals of *Empetrum rubrum, Gaultheria racemulosa,* and *Ugni selkirkii.* The flora of the archipelago is related to the phytogeographic province of Subantarctica, although it lacks the genus *Nothofagus*. Also present are numerous tropical elements and other vegetation types of the Pacific Islands (Cabrera & Willink, 1980). Approximately 50% of the flora of these islands is adventive (Stuessy et al., 1997; Marticorena et al., 1998).

There have been some 423 species of vascular plants recorded for this archipelago, with a level of endemism that exceeds 30% (Marticorena et al., 1998). It possesses an endemic family, Lactoridaceae (with *Lactoris fernandeziana*), paleoherbs of some 90 million years of antiquity that grow exclusively on the island of Más a Tierra in the mountainous forests over steep cliffs above 500 m. Among the endemic genera can be mentioned: *Juania* (with *Juania australis*), the only palm present; *Thyrsopteris*, a genus of Pteridophyta; and others belonging to the family Asteraceae, such as *Centaurodendron, Dendroseris, Robinsonia,* and *Yunquea,* shrubs or trees with leaves disposed in apical rosettes (Cabrera & Willink, 1980).

The Desventuradas Archipelago (Chile) is composed of two principal islands, San Ambrosio (10 km^2) and San Félix (2 km^2), situated 950 km from the coast of Chañaral (Map 4, Region III). These islands are of volcanic origin and are covered by vegetation that is sparse and shrubby. Characteristic on both islands is the genus *Thamnoseris* (Asteraceae), with *Thamnoseris lacerata* the only species that acquires an arboreal habit. The vascular flora is very scarce, and in this *Catalogue* it includes only 28 taxa.

km²) y Soledad (6353 km²). Estas islas están situadas en el Atlántico Sur sobre la plataforma epicontinental argentina, a unos 500 km al este del continente. En las islas, la vegetación predominante es el "cortaderal" de *Cortaderia pilosa* que cubre los terrenos ondulados y pendientes de las colinas, imprimiendo su principal fisionomía. La precipitación homogénea durante todo el año (600–700 mm), junto con características edáficas especiales, aseguran las condiciones de humedad para el desarrollo de estos pastizales. Otras gramíneas nativas que participan del cortaderal son *Deschampsia flexuosa, Festuca magellanica* y *Trisetum spicatum*, y entre las especies introducidas están *Aira praecox* y *Holcus lanatus*. Entre las leñosas que integran estos pastizales están *Baccharis magellanica* y *Empetrum rubrum* (Roig, 1999).

IV. RESULTADOS

En el presente *Catálogo* se registran 17.693 especies aceptadas, nativas e introducidas, distribuidas en 2586 géneros y 308 familias, con un total de 7691 especies endémicas para el Cono Sur (Tabla 1).

En la Tabla 1 se puede observar que las Angiospermae, con Monocotyledoneae y Dicotyledoneae, comprenden el 95,54% de la flora vascular del Cono Sur, con el 24,6% y 70,94% respectivamente, e incluyen el 97,65% de las especies endémicas que ocurren en el área de estudio.

Riqueza de Taxones

El número más alto de especies se encuentra en Argentina con 9938 especies, que representan el 56,16% de las especies registradas en este *Catálogo* (considerando en este porcentaje las especies que no son exclusivas de cada país), luego sigue Brasil con 7712 (43,59%), Paraguay con 5099 (28,81%), Chile con 4985 (28,17%) y Uruguay con 2770 (15,65%) (Tabla 2).

El número de taxones en los diversos niveles taxonómicos, junto con el número de taxones endémicos, son utilizados para hacer estimaciones sobre biodiversidad a escala regional. Se calculó un índice de biodiversidad taxonómica como: $B = n_i/\ln A_i$, donde n_i es el número de taxones (en los distintos niveles taxonómicos) y $\ln A_i$ es el logaritmo natural del área considerada. Al analizar los valores obtenidos (Tabla 3) se observa que Argentina presenta las cifras más altas a nivel de familias, géneros y especies hacia el norte del país; así, las provincias de Misiones (18,25; 94,25 y 307,31) y Corrientes (15,98; 80,09 y 255,28) tienen valores elevados, al igual que las provincias del noroeste como Tucumán (17,66; 89,50 y 265,61), Jujuy (16,91; 92,44 y 279,82) y Salta (16,90; 93,69 y 287,09). Estos índices disminuyen hacia el sur de la Argentina, siendo de 8,30; 30,96 y 83,60 en la provincia de Santa Cruz y de 8,84; 28,45 y 64,58 en Tierra del

Also included in this unit are the Islas Malvinas (Argentina), composed of the islands Gran Malvina (4377 km²) and Soledad (6353 km²). These are situated in the South Atlantic over the epicontinental Argentinean platform at some 500 km east of the continent. In the islands the dominant vegetation is "cortaderal" of *Cortaderia pilosa* that covers the undulating terrain and the slopes of the hills, imprinting its principal physiognomy. The precipitation during the entire year is 600–700 mm. This together with special edaphic features ensures the conditions of moisture needed for the development of these grasslands. Other native grasses that are in the "cortaderal" are *Deschampsia flexuosa, Festuca magellanica,* and *Trisetum spicatum;* the adventitious species include *Aira praecox* and *Holcus lanatus*. Among the woody plants that inhabit these grasslands are *Baccharis magellanica* and *Empetrum rubrum* (Roig, 1999).

IV. RESULTS

In the present *Catalogue* 17,693 accepted species, native and introduced, distributed among 2586 genera and 308 families, with 7691 endemic species (Table 1) are recorded.

Table 1 shows that the Angiospermae, with Monocotyledoneae and Dicotyledoneae, comprise 95.54% of the vascular flora of the Southern Cone, with 24.6% and 70.94% respectively, and includes 97.65% of the endemic species that occur in the study area.

Richness of Taxa

The largest number of species are found in Argentina with 9938 species, 56.16% of the species recorded in this *Catalogue* (this percentage includes species that are not exclusive for each country), followed by Brazil with 7712 (43.59%), Paraguay with 5099 (28.17%), Chile with 4985 (28.81%), and Uruguay with 2770 (15.65%) (Table 2).

On a regional scale, the number of taxa (at the different taxonomical levels) together with the number of endemic taxa are used to estimate biodiversity. A taxonomic biodiversity index was calculated: $B = n_i/\ln A_i$, with n_i as the number of taxa (for each taxonomic level) and $\ln A_i$ as the natural logarithm of the involved area. Analyzing the obtained values (Table 3) shows that Argentina has the highest biodiversity at the level of families, genera, and species toward the north of the country: the provinces of Misiones (18.25, 94.25, 307.31) and Corrientes (15.98, 80.09, 255.28) have higher values, as do the provinces of the northwest, such as Tucumán (17.66, 89.50, 265.61), Jujuy (16.91, 92.44, 279.82), and Salta (16.90, 93.69, 287.09). These

Tabla 1. Resumen del número de taxones en el *Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur*, porcentaje del total de las especies tratadas y porcentaje de especies endémicas en cada grupo. *Table 1. Summary of numbers of taxa in the* Catalogue of the Vascular Plants of the Southern Cone *with percentage of total species treated and percentage of species endemic within each group.*

	Familias	Géneros	Especies	% especies	Especies endémicas	% especies endémicas
PTERIDOPHYTA	29	118	759	4,29	164	2,13
GYMNOSPERMAE	5	12	30	0,17	17	0,22
DICOTYLEDONEAE	216	1846	12.551	70,94	5828	75,78
MONOCOTYLEDONEAE	58	610	4353	24,60	1682	21,87
TOTAL	**308**	**2586**	**17.693**		**7691**	

Tabla 2. Riqueza de familias, géneros, especies y taxones infraespecíficos por país (considerando en Brasil solo los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná). *Table 2. Richness of families, genera, species, and infraspecific taxa per country (considering in Brazil only the states of Rio Grande do Sul, Santa Catarina, and Paraná).*

	Familias	Géneros	Especies	Subespecies	Variedades	Formas
ARGENTINA	274	2000	9938	227	875	68
BRASIL	243	1495	7712	155	583	39
CHILE	203	1045	4985	129	370	22
PARAGUAY	210	1231	5099	103	375	20
URUGUAY	186	929	2770	71	187	8

Fuego. Los tres estados representados de Brasil poseen altos índices de biodiversidad, siendo mayores a nivel de familia y géneros en Santa Catarina (19,36 y 105,18), y de especies en Paraná (453,43) decreciendo estos valores en Rio Grande do Sul (16,18; 88,13 y 343,19). En Chile las áreas con mayor concentración de familias corresponden al Archipiélago Juan Fernández (16,72) y en la región continental, a Chile Central, en las regiones VIII (15,50), IX (14,47) y VII (14,34). A su vez, las áreas con mayor biodiversidad a nivel de géneros se registran en las regiones V (60,38), Metropolitana (56,85), VIII (55,63) y VII (53,40); a nivel específico los índices más elevados se hallan en la Región Metropolitana (169,11), seguidos en orden decreciente por las regiones V (161,05), VIII (155,37), IV (155,19) y VII (140,32). Al analizar en conjunto los valores de biodiversidad en Chile se observa que los índices aumentan desde el norte hacia la región central, donde aparecen los valores más elevados, y luego disminuyen progresivamente hacia el sur del país. En Paraguay los mayores valores de biodiversidad se encuentran en los departamentos Central (18,18; 75,29 y 179,77), Cordillera (17,52; 73,82 y 195,61), Guairá (16,48; 65,78 y 150,58), Amambay (16,27; 70,87 y 200,37) y

values decline toward southern Argentina, where they are 8.30, 30.96, and 83.60 in Santa Cruz and 8.84, 28.45, 64.58 in Tierra del Fuego. The three states of southern Brazil possess high levels of biodiversity, the greatest at family and generic level in Santa Catarina (19.36 and 105.18), greatest at the species level in Paraná (453.43), and decreasing in Rio Grande do Sul (16.18, 88.13, 343.19). Higher concentration areas at the family level are present in Chile in the Juan Fernández Archipelago (16.72) and in the continental region in Central Chile, as well as regions VIII (15.50), IX (14.47), and VII (14.34). On the other hand, at the generic level areas with high levels of biodiversity are regions V (60.38), Metropolitana (56.85), VIII (55.63), and VII (53.40). Finally, at the specific level these values are higher in Región Metropolitana (169.11), followed in decreasing order by regions V (161.05), VIII (155.37), IV (155.19), and VII (140.32). We can conclude that biodiversity values increase from northern Chile to the central area, where higher values are present, and then decline progressively toward the south of the country. In Paraguay the higher values are found in the departments Central (18.18, 75.29,

Tabla 3. Riqueza de familias, géneros, especies; indice de biodiversidad taxonómica (B) en los distintos niveles taxonómicos; número de especies endémicas; superficies de cada país. *Table 3. Richness of families, genera, species; taxonomic biodiversity index (B) in the distinct taxonomic levels; number of endemics; surface areas of each country.*

	Familias	Géneros	Especies	(B) Familia	(B) Género	(B) Especie	Especies endémicas	Superficie (km²)
ARGENTINA	274	2000	9938	18,46	134,75	669,58	1760	2.791.810
Buenos Aires	172	824	2241	13,61	65,21	177,35	31	307.501
Catamarca	153	724	2065	13,26	62,75	178,96	43	102.602
Chaco	153	722	1802	13,29	62,73	156,57	5	99.633
Chubut	122	498	1345	9,90	40,41	109,15	19	224.686
Córdoba	155	737	1929	12,90	61,34	160,54	32	165.321
Corrientes	182	912	2907	15,98	80,09	255,28	25	88.199
Distrito Federal	52	211	403	9,81	39,82	76,06	-	200
Entre Ríos	165	783	2149	14,63	69,45	190,61	8	78.781
Formosa	151	669	1599	13,50	59,81	142,96	4	72.066
Jujuy	184	1006	3045	16,91	92,44	279,82	88	53.219
La Pampa	104	474	1010	8,76	39,92	85,06	5	143.440
La Rioja	111	549	1450	9,73	48,14	127,15	39	89.680
Mendoza	119	581	1738	9,99	48,78	145,92	53	148.827
Misiones	188	971	3166	18,25	94,25	307,31	32	29.801
Neuquén	133	594	1691	11,61	51,87	147,66	43	94.078
Río Negro	147	640	1677	12,03	52,37	137,22	15	203.013
Salta	202	1120	3432	16,90	93,69	287,09	70	155.488
San Juan	113	495	1364	9,91	43,41	119,61	26	89.651
San Luis	117	494	1097	10,40	43,92	97,53	12	76.748
Santa Cruz	103	384	1037	8,30	30,96	83,60	33	243.943
Santa Fe	157	704	1783	13,31	59,67	151,13	2	133.007
Santiago del Estero	108	449	953	9,13	37,98	80,61	4	136.351
Tierra del Fuego	92	296	672	8,84	28,45	64,58	15	33.051
Tucumán	177	897	2662	17,66	89,50	265,61	43	22.524
BRASIL	243	1494	7711	18,32	112,62	581,26	1145	577.214
Paraná	214	1265	5534	17,53	103,65	453,43	248	199.709
Rio Grande do Sul	203	1106	4307	16,18	88,13	343,19	208	282.062
Santa Catarina	222	1205	4817	19,36	105,18	420,20	250	95.443
CHILE	203	1044	4985	15,00	77,13	368,28	1963	756.206
I Región	84	343	788	7,65	31,24	71,77	48	58.698
II Región	91	369	974	7,75	31,41	82,91	82	126.444
III Región	104	367	1035	9,26	32,67	92,14	99	75.573
IV Región	135	544	1647	12,72	51,26	155,19	127	40.656
V Región	147	586	1563	15,15	60,38	161,05	41	16.396
VI Región	126	456	1127	12,99	47,00	116,15	21	16.365
VII Región	148	551	1448	14,34	53,40	140,32	48	30.302
VIII Región	163	585	1634	15,50	55,63	155,37	38	36.929
IX Región	150	538	1381	14,47	51,89	133,18	18	31.858
X Región	154	495	1257	13,86	44,54	113,12	38	66.997
XI Región	109	276	619	9,40	23,80	53,39	5	108.494
XII Región	107	315	844	9,07	26,72	71,58	10	132.033
Is. Desventuradas	13	21	28	5,23	8,45	11,27	9	12
Is. Juan Fernández	77	232	387	16,72	50,38	84,04	108	100
Región Metropolitana	135	548	1630	14,01	56,85	169,11	84	15.349
PARAGUAY	210	1231	5099	16,26	95,31	394,79	399	406.635
Alto Paraguay	136	536	1335	11,27	44,42	110,63	31	174.018
Alto Paraná	129	516	1127	13,43	53,70	117,29	12	14.895
Amambay	154	671	1897	16,27	70,87	200,37	77	12.933
Caaguazú	129	460	1098	13,80	49,21	117,46	22	11.474
Caazapá	119	397	835	12,99	43,35	91,17	15	9.496
Canindeyú	145	560	1313	15,11	58,37	136,87	24	14.667
Central	142	588	1404	18,18	75,29	179,77	8	2.465
Concepción	119	510	1171	12,14	52,04	119,48	15	18.051
Cordillera	149	628	1664	17,52	73,82	195,61	17	4.948
Guairá	136	543	1243	16,48	65,78	150,58	5	3.846
Itapuá	91	306	564	9,37	31,51	58,07	2	16.525

Tabla 3 (Continuación). *Table 3 (Continued).*

	Familias	Géneros	Especies	(B) Familia	(B) Género	(B) Especie	Especies endémicas	Superficie (km²)
Misiones	92	258	501	10,04	28,15	54,66	1	9556
Ñeembucú	60	130	204	6,38	13,82	21,69	-	12.147
Paraguarí	147	641	1648	16,20	70,66	181,66	14	8705
Presidente Hayes	120	423	937	10,72	37,78	83,68	4	72.907
San Pedro	132	469	1025	13,33	47,36	103,50	11	20.002
URUGUAY	186	929	2770	15,41	76,95	229,44	113	175.016
Artigas	87	342	639	9,27	36,43	68,08	4	11.928
Canelones	97	364	713	11,52	43,23	84,68	1	4536
Cerro Largo	91	336	668	9,56	35,29	70,16	2	13648
Colonia	99	302	551	11,36	34,64	63,21	-	6106
Durazno	59	175	258	6,30	18,69	27,56	3	11.643
Flores	44	124	200	5,15	14,51	23,40	1	5144
Florida	81	263	508	8,76	28,43	54,91	3	10.417
Lavalleja	69	218	442	7,49	23,66	47,98	7	10.016
Maldonado	101	347	742	11,92	40,94	87,55	8	4793
Montevideo	126	539	1260	20,09	85,93	200,86	10	530
Paysandú	87	342	679	9,12	35,84	71,16	3	13.922
Río Negro	102	342	625	11,16	37,44	68,41	3	9282
Rivera	110	363	757	12,03	39,69	82,78	6	9370
Rocha	121	364	629	13,06	39,29	67,90	3	10551
Salto	88	332	631	9,21	34,73	66,02	1	14.163
San José	86	314	625	10,10	36,87	73,39	2	4992
Soriano	93	355	683	10,21	38,99	75,01	1	9008
Tacuarembó	104	365	747	10,78	37,85	77,45	7	15.438
Treinta y Tres	88	262	430	9,60	28,60	46,93	1	9529

Paraguarí (16,20; 70,66 y 181,66). A su vez, las áreas de menor diversidad se presentan en Ñeembucú (6,38; 13,82 y 21,69), Itapuá (9,37; 31,51 y 58,07) y Misiones (10,04; 28,15 y 54,66) en el sur de Paraguay. Es posible que los bajos valores observados en el sur de Paraguay estén relacionados con un escaso muestreo de las colecciones botánicas en esta área. Finalmente, Uruguay posee mayores índices de biodiversidad a nivel de familia en los departamentos de Montevideo (20,09), Rocha (13,06) y Rivera (12,03). A nivel de géneros y especies Uruguay presenta una mayor concentración de biodiversidad en Montevideo (85,93 y 200,86), Canelones (43,23 y 84,68), Maldonado (40,94 y 87,55) y Rivera (36,69 y 82,78). Por el contrario los valores más bajos se registraron en los departamentos de Flores (5,15; 14,51 y 23,40) y Durazno (6,30; 18,69 y 27,56). Como en el caso de Paraguay, los índices obtenidos pueden deberse a la baja intensidad de colección, y la escasez de trabajos publicados en algunos departamentos del país.

La familia mejor representada en número de especies es Asteraceae, seguida por Poaceae, Fabaceae, Orchidaceae, Solanaceae, Cyperaceae, Euphorbiaceae, Cactaceae, Malvaceae y Apocynaceae. En la Tabla 4 se presenta una lista con todas las familias con su número de géneros, especies, especies endémicas, y el porcentaje de especies endémicas en relación al número total de éstas dentro de la familia. Hay un total de 32 familias en las que

179.77), Cordillera (17.52, 73.82, 195.61), Guairá (16.48, 65.78, 150.58), Amambay (16.27, 70.87, 200.37), and Paraguarí (16.20, 70.66, 181.66), while the lower values are present in the departments Ñeembucú (6.38, 13.82, 21.69), Itapúa (9.37, 31.51, 58.07), and Misiones (10.04, 28.15, 54.66) in southern Paraguay. This could be due to the low intensity of collection in this area of the country. Finally, Uruguay possesses higher values of biodiversity in the departments of Montevideo (20.09), Rocha (13.06), and Rivera (12.03); bidiversity levels are also significant at the generic and specific level in Montevideo (85.93, 200.86), Canelones (43.23, 84.68), Maldonado (40.94, 87.55), and Rivera (36.69, 82.78). The lower values are registered in the departments of Flores (5.15, 14.51, 23.40) and Durazno (6.30, 18.69, 27.56). As in Paraguay, the values obtained for Uruguay might be due to the low intensity of collections as well as the lack of floras or revisions.

The family best represented in species number is Asteraceae, followed by Poaceae, Fabaceae, Orchidaceae, Solanaceae, Cyperaceae, Euphorbiaceae, Cactaceae, Malvaceae, and Apocynaceae. Table 4 presents a list of all of the families with their number of genera, species, endemic species, and the percentage of endemic species with relation to the total number of these within the family: 32 families have endemic species, 52 families are

Tabla 4. Familias en orden descendiente según su número de especies, especies endémicas y porcentaje de especies endémicas en cada familia. Se indican con un asterisco (*) los familias introducidas. *Table 4. Families by decreasing number of species, endemic species, and percentage of endemic species in each family. The asterisk (*) indicates introduced families.*

Familia	Géneros	Especies	Endémicas	%	Familia	Géneros	Especies	Endémicas	%
ASTERACEAE	275	2492	1433	57,5	JUNCACEAE	7	61	27	44,3
POACEAE	203	1528	540	35,3	THELYPTERIDACEAE	2	59	9	15,3
FABACEAE	154	1323	617	46,6	GENTIANACEAE	15	57	22	38,6
ORCHIDACEAE	153	1002	281	28,0	OROBANCHACEAE	11	56	25	44,6
SOLANACEAE	41	500	250	50,0	POLYPODIACEAE	9	55	6	10,9
CYPERACEAE	37	470	148	31,5	BEGONIACEAE	1	54	36	66,7
EUPHORBIACEAE	38	437	202	46,2	CALYCERACEAE	6	54	49	90,7
CACTACEAE	52	399	285	71,4	LOMARIOPSIDACEAE	4	54	11	20,4
MALVACEAE	45	385	164	42,6	ALSTROEMERIACEAE	3	52	39	75,0
APOCYNACEAE	62	324	116	35,8	ARACEAE	19	51	9	17,6
MYRTACEAE	29	305	139	45,6	ANACARDIACEAE	10	50	17	34,0
BRASSICACEAE	71	301	181	60,1	CAMPANULACEAE	9	49	17	34,7
BROMELIACEAE	24	291	139	47,8	NOLANACEAE	1	45	40	88,9
RUBIACEAE	62	287	81	28,2	SALICACEAE	9	44	14	31,8
VERBENACEAE	28	256	139	54,3	GESNERIACEAE	10	42	13	31,0
APIACEAE	48	219	132	60,3	ARECACEAE	16	41	13	31,7
LAMIACEAE	37	217	78	35,9	URTICACEAE	9	41	14	34,1
BORAGINACEAE	30	207	107	51,7	ERIOCAULACEAE	5	40	19	47,5
MELASTOMATACEAE	23	203	45	22,2	PASSIFLORACEAE	1	40	3	7,5
IRIDACEAE	26	195	124	63,6	RHAMNACEAE	16	40	20	50,0
CONVOLVULACEAE	13	180	72	40,0	ARISTOLOCHIACEAE	2	36	17	47,2
CARYOPHYLLACEAE	29	171	80	46,8	LYCOPODIACEAE	3	36	16	44,4
ALLIACEAE	10	163	145	89,0	BLECHNACEAE	2	35	14	40,0
PIPERACEAE	4	145	38	26,2	BERBERIDACEAE	1	34	31	91,2
PLANTAGINACEAE	27	145	59	40,7	NYCTAGINACEAE	10	34	8	23,5
AMARANTHACEAE	15	137	40	29,2	ERICACEAE	5	33	18	54,5
OXALIDACEAE	2	127	74	58,3	VISCACEAE	1	31	1	3,2
VIOLACEAE	4	125	103	82,4	ANNONACEAE	5	30	7	23,3
PTERIDACEAE	18	122	24	19,7	TROPAEOLACEAE	2	30	25	83,3
AMARYLLIDACEAE	16	121	93	76,9	TURNERACEAE	2	30	6	20,0
CHENOPODIACEAE	14	121	59	48,8	ESCALLONIACEAE	2	29	17	58,6
ROSACEAE	22	121	51	42,1	LOGANIACEAE	2	29	12	41,4
ACANTHACEAE	21	119	27	22,7	MORACEAE	8	29	1	3,4
BIGNONIACEAE	28	119	17	14,3	HYPERICACEAE	1	28	14	50,0
MALPIGHIACEAE	31	113	22	19,5	RUTACEAE	12	27	3	11,1
POLYGALACEAE	5	99	46	46,5	COMMELINACEAE	8	26	1	3,8
PORTULACACEAE	12	97	70	72,2	GERANIACEAE	2	26	10	38,5
ONAGRACEAE	7	95	30	31,6	PHYLLANTHACEAE	5	26	3	11,5
SAPINDACEAE	23	95	12	12,6	PHYTOLACCACEAE	11	26	5	19,2
POLYGONACEAE	13	94	36	38,3	SAPOTACEAE	7	26	2	7,7
VALERIANACEAE	3	87	67	77,0	CAPPARACEAE	4	25	4	16,0
CALCEOLARIACEAE	2	86	66	76,7	DENNSTAEDTIACEAE	8	25	1	4,0
DIOSCOREACEAE	2	86	54	62,8	SANTALACEAE	7	25	21	84,0
DRYOPTERIDACEAE	19	83	20	24,1	GRAMMITIDACEAE	8	24	0	0,0
CUCURBITACEAE	24	78	15	19,2	LENTIBULARIACEAE	3	24	2	8,3
STERCULIACEAE	7	69	16	23,2	XYRIDACEAE	1	24	4	16,7
LOASACEAE	7	67	48	71,6	BUDDLEJACEAE	1	22	12	54,5
HYMENOPHYLLACEAE	4	66	23	34,8	MELIACEAE	5	22	2	9,1
LYTHRACEAE	8	64	16	25,0	MONIMIACEAE	5	21	5	23,8
LAURACEAE	11	63	7	11,1	ZYGOPHYLLACEAE	9	20	10	50,0
RANUNCULACEAE	12	63	32	50,8	AIZOACEAE	8	19	9	47,4
ASPLENIACEAE	5	61	12	19,7	CELASTRACEAE	4	19	8	42,1

Tabla 4 (Continuación). *Table 4 (Continued).*

Familia	Géneros	Especies	Endémicas	%
ERYTHROXYLACEAE	1	19	4	21,1
PODOSTEMACEAE	10	19	8	42,1
SCHIZAEACEAE	4	19	1	5,3
MYRSINACEAE	3	18	3	16,7
SELAGINELLACEAE	1	18	2	11,1
CRASSULACEAE	4	17	5	29,4
LINACEAE	2	17	5	29,4
ALISMATACEAE	3	16	1	6,3
ISOËTACEAE	1	16	12	75,0
MALESHERBIACEAE	1	16	15	93,8
OLEACEAE	6	16	2	12,5
COMBRETACEAE	4	15	4	26,7
CYATHEACEAE	3	15	0	0,0
GLEICHENIACEAE	3	15	5	33,3
GUNNERACEAE	1	15	10	66,7
MENISPERMACEAE	5	15	1	6,7
TILIACEAE	4	15	1	6,7
PAPAVERACEAE	6	14	2	14,3
PROTEACEAE	7	14	6	42,9
SCLEROPHYLACACEAE	1	14	14	100,0
SMILACACEAE	1	14	2	14,3
SYMPLOCACEAE	1	14	0	0,0
VITACEAE	2	14	0	0,0
ARALIACEAE	6	13	2	15,4
HIPPOCRATEACEAE	9	13	0	0,0
OPHIOGLOSSACEAE	3	13	2	15,4
POLEMONIACEAE	9	13	4	30,8
SIMAROUBACEAE	6	13	3	23,1
AQUIFOLIACEAE	1	12	1	8,3
BOMBACACEAE	5	12	0	0,0
EPHEDRACEAE	1	12	8	66,7
GROSSULARIACEAE	1	12	10	83,3
POTAMOGETONACEAE	2	12	2	16,7
VOCHYSIACEAE	3	12	2	16,7
DILLENIACEAE	4	11	0	0,0
LEMNACEAE	5	11	0	0,0
LORANTHACEAE	7	11	5	45,5
PRIMULACEAE	6	11	4	36,4
ELAEOCARPACEAE	4	10	4	40,0
FRANKENIACEAE	1	10	6	60,0
MARANTACEAE	6	10	2	20,0
NOTHOFAGACEAE	1	10	10	100,0
PONTEDERIACEAE	3	10	0	0,0
BURMANIACEAE	6	9	0	0,0
CALLITRICHACEAE	1	9	4	44,4
CANNACEAE	1	9	1	11,1
CUNONIACEAE	3	9	2	22,2
LEDOCARPACEAE	1	9	6	66,7
NYMPHAEACEAE	2	9	0	0,0
STYRACACEAE	1	9	0	0,0
TECOPHILAEACEAE	3	9	8	88,9
GILLIESIACEAE	2	8	8	100,0
MISODENDRACEAE	1	8	8	100,0
PHRYMACEAE	2	8	6	75,0
PODOCARPACEAE	4	8	5	62,5
THYMELAEACEAE	3	8	3	37,5
VITTARIACEAE	5	8	0	0,0
ANTHERICACEAE	2	7	2	28,6
CLUSIACEAE	5	7	0	0,0
FUMARIACEAE*	1	7	0	0,0
HYDROCHARITACEAE	5	7	0	0,0
SAXIFRAGACEAE	5	7	4	57,1
SCROPHULARIACEAE	4	7	1	14,3
VIVIANIACEAE	4	7	7	100,0
CARDIOPTERIDACEAE	1	6	1	16,7
CARICACEAE	2	6	1	16,7
CHRYSOBALANACEAE	4	6	0	0,0
DAVALLIACEAE	1	6	0	0,0
DROSERACEAE	1	6	1	16,7
HALORAGACEAE	4	6	2	33,3
HELICONIACEAE	1	6	0	0,0
HERRERIACEAE	2	6	5	83,3
LIMNOCHARITACEAE	2	6	0	0,0
OCHNACEAE	2	6	0	0,0
OLACACEAE	3	6	0	0,0
PLUMBAGINACEAE	4	6	4	66,7
ACHATOCARPACEAE	1	5	2	40,0
ASPARAGACEAE*	1	5	0	0,0
BALANOPHORACEAE	4	5	0	0,0
CELTIDACEAE	2	5	0	0,0
DICKSONIACEAE	3	5	4	80,0
DIPSACACEAE*	3	5	0	0,0
GRISELINIACEAE	1	5	4	80,0
HYACINTHACEAE	1	5	1	20,0
HYPOXIDACEAE	3	5	1	20,0
JUNCAGINACEAE	3	5	1	20,0
MARATTIACEAE	2	5	0	0,0
MARSILEACEAE	3	5	1	20,0
RAFFLESIACEAE	1	5	2	40,0
SAMOLACEAE	1	5	3	60,0
WINTERACEAE	1	5	4	80,0
BASELLACEAE	2	4	0	0,0
CECROPIACEAE	3	4	0	0,0
CUPRESSACEAE	4	4	3	75,0
MARTYNIACEAE	2	4	2	50,0
PINACEAE*	2	4	0	0,0
RESEDACEAE*	1	4	0	0,0
SALVINIACEAE	1	4	0	0,0
TYPHACEAE	1	4	0	0,0
ADOXACEAE	2	3	0	0,0
AGAVACEAE*	2	3	0	0,0
BALSAMINACEAE*	1	3	0	0,0
BETULACEAE	2	3	0	0,0
BURSERACEAE	2	3	1	33,3

Tabla 4 (Continuación). *Table 4 (Continued).*

Familia	Géneros	Especies	Endémicas	%
COSTACEAE	1	3	0	0,0
EBENACEAE	1	3	1	33,3
EREMOLEPIDACEAE	3	3	2	66,7
KRAMERIACEAE	1	3	1	33,3
LACISTEMATACEAE	1	3	0	0,0
LUZURIAGACEAE	1	3	3	100,0
MOLLUGINACEAE	2	3	0	0,0
NAJADACEAE	1	3	0	0,0
OSMUNDACEAE	1	3	0	0,0
RUPPIACEAE	1	3	0	0,0
VELLOZIACEAE	2	3	2	66,7
ACERACEAE*	1	2	0	0,0
ARAUCARIACEAE	1	2	1	50,0
AZOLLACEAE	1	2	0	0,0
CABOMBACEAE	1	2	0	0,0
CANELLACEAE	2	2	1	50,0
CANNABACEAE*	1	2	0	0,0
CAPRIFOLIACEAE*	2	2	0	0,0
CERATOPHYLLACEAE	1	2	0	0,0
CLETHRACEAE	1	2	1	50,0
COCHLOSPERMACEAE	1	2	0	0,0
CONNARACEAE	2	2	0	0,0
CYCLANTHACEAE	1	2	2	100,0
ELATINACEAE	1	2	1	50,0
EQUISETACEAE	1	2	0	0,0
EUCRYPHIACEAE	1	2	2	100,0
FRANCOACEAE	2	2	2	100,0
GOODENIACEAE	2	2	0	0,0
HYDNORACEAE	1	2	1	50,0
HYDROLEACEAE	1	2	0	0,0
LARDIZABALACEAE	2	2	2	100,0
LAXMANNIACEAE	1	2	2	100,0
LINDERNIACEAE	1	2	0	0,0
MARCGRAVIACEAE	2	2	0	0,0
MAYACACEAE	1	2	0	0,0
MENYANTHACEAE	1	2	0	0,0
MYRICACEAE	1	2	0	0,0
OPILIACEAE	1	2	0	0,0
PENTAPHYLACACEAE	1	2	0	0,0
PHILESIACEAE	2	2	2	100,0
QUILLAJACEAE	1	2	1	50,0
SABIACEAE	1	2	0	0,0
TRIGONIACEAE	1	2	0	0,0
TRIURIDACEAE	2	2	0	0,0
ACHARIACEAE*	1	1	0	0,0
AEXTOXICACEAE	1	1	1	100,0
AGAPANTHACEAE*	1	1	0	0,0
APONOGETONACEAE*	1	1	0	0,0
ASPHODELACEAE*	1	1	0	0,0
ASTELIACEAE	1	1	1	100,0
AVICENNIACEAE	1	1	0	0,0
BERBERIDOPSIDACEAE	1	1	1	100,0
BIXACEAE	1	1	0	0,0
CARYOCARACEAE	1	1	0	0,0
CENTROLEPIDACEAE	1	1	1	100,0
CHLORANTHACEAE	1	1	0	0,0
CISTACEAE	1	1	1	100,0
CORIARIACEAE	1	1	1	100,0
CORSIACEAE	1	1	1	100,0
CYMODECEACEAE	1	1	0	0,0
DESFONTAINIACEAE	1	1	1	100,0
DONATIACEAE	1	1	1	100,0
ELAEAGNACEAE*	1	1	0	0,0
EMPETRACEAE	1	1	0	0,0
EPACRIDACEAE	1	1	1	100,0
GOMORTEGACEAE	1	1	1	100,0
HALOPHYTACEAE	1	1	1	100,0
HEMEROCALLIDACEAE	1	1	0	0,0
HIPPURIDACEAE	1	1	0	0,0
HUMIRIACEAE	1	1	0	0,0
HYDRANGEACEAE	1	1	1	100,0
ICACINACEAE	1	1	1	100,0
JUGLANDACEAE	1	1	0	0,0
LACTORIDACEAE	1	1	1	100,0
LECYTHIDACEAE	1	1	0	0,0
MUNTINGIACEAE	1	1	0	0,0
MYOPORACEAE*	1	1	0	0,0
MYRISTICACEAE	1	1	0	0,0
OLEANDRACEAE	1	1	1	100,0
PARKERIACEAE	1	1	0	0,0
PARNASSIACEAE	1	1	0	0,0
PICRODENDRACEAE	1	1	0	0,0
PSILOTACEAE	1	1	0	0,0
QUIINACEAE	1	1	0	0,0
RESTIONACEAE	1	1	1	100,0
RHIZOPHORACEAE	1	1	0	0,0
RUSCACEAE*	1	1	0	0,0
SCHLEGELIACEAE	1	1	1	100,0
SIPARUNACEAE	1	1	0	0,0
SPHENOCLEACEAE*	1	1	0	0,0
STYLIDACEAE	1	1	1	100,0
TAMARICACEAE*	1	1	0	0,0
TETRACHONDRACEAE	1	1	1	100,0
THEACEAE	1	1	0	0,0
THEOPHRASTACEAE	1	1	0	0,0
TRIBELACEAE	1	1	1	100,0
ULMACEAE	1	1	0	0,0
ZANNICHELLIACEAE	1	1	0	0,0
ZINGIBERACEAE*	1	1	0	0,0
ZOSTERACEAE*	1	1	0	0,0
TOTALS	**2586**	**17.693**	**7691**	

todas sus especies son endémicas, 52 familias están representadas por una única especie, y otras 138 familias por 15 o menos especies.

Los géneros con más de 100 especies en orden decreciente son: *Senecio, Solanum, Adesmia, Baccharis, Mimosa, Eupatorium, Oxalis, Croton, Vernonia, Eugenia, Carex, Paspalum* y *Viola*. En la Tabla 5 se detallan todos los géneros con número de especies y especies endémicas y porcentajes en relación al total de especies. La mayoría de los géneros están representados por unas pocas especies: 76 géneros (2,9%) tienen entre 40 y 100 especies, 324 géneros (12,5%) tienen entre 10 y 39 especies, 1101 géneros (42,6%) incluyen dos a nueve especies, y 1071 géneros (41,3%) están representados por una única especie.

En relación a la flora nativa, y su presencia en los diferentes países del área estudiada, las relaciones florísticas más estrechas se observan entre Brasil y Paraguay, que comparten 3929 especies, seguidos por Argentina y Brasil, que comparten unas 3798 especies (Tabla 6). Además, se observa que Argentina y Chile comparten en total 2269 especies, de las cuales más del 52% son endémicas de estos países. Hay un número importante de familias compartidas únicamente entre Argentina y Chile, incluyendo las Malesherbiaceae (que llega hasta Perú), Calyceraceae (prácticamente endémica de la región, con algún representante en Bolivia), Luzuriagaceae, Nothofagaceae, Stylidiaceae, Tetrachondraceae, Asteliaceae, Centrolepidaceae, Coriariaceae, Corsiaceae, Cupressaceae, Desfontainiaceae, Donatiaceae, Epacridaceae, Eucryphiaceae, Grossulariaceae, Lardizabalaceae, Hydrangeaceae, Laxmanniaceae e Hippuridaceae. Familias exclusivas de Chile son las Francoaceae, Gomortegaceae, Lactoridaceae, Nolanaceae (que llegan únicamente a Perú), Restionaceae, Tecophilaeaceae y Berberidopsidaceae. Para finalizar con el análisis de familias presentes en Argentina y Chile, es de destacar la presencia de familias con distribución disyunta entre áreas del sur de estos países y regiones de Brasil y Paraguay. Entre éstas se pueden citar las Araucariaceae, Cunoniaceae, Elaeocarpaceae, Escalloniaceae, Dicksoniaceae, Hymenophyllaceae, Podocarpaceae, Proteaceae, Thymelaeaceae, Vivianiaceae y Winteraceae.

En lo que respecta a la flora del nordeste de Argentina, áreas adyacentes de Paraguay y el sur de Brasil, los tres países comparten una serie de familias sólo presentes en el Cono Sur en esta región: Clusiaceae, Costaceae, Dilleniaceae, Hippocrateaceae, Opiliaceae, Ochnaceae, Olacaceae, Sphenocleaceae, Trigoniaceae, Triuridaceae, Vochysiaceae y Zingiberaceae. Por su parte, Brasil y Paraguay comparten las Caryocaraceae, Chloranthaceae, Lecythidaceae y Theophrastaceae, mientras que Brasil y Argentina lo hacen con las Cistaceae, Clethraceae, Theaceae y Velloziaceae. Finalmente, únicamente en el sur de Brasil se hallan las siguientes familias: Avicenniaceae, Canellaceae, Connaraceae, Cyclanthaceae, Cymodoceaceae, Humiriaceae, Marcgraviaceae, Myristicaceae, Quiinaceae, Rhizophoraceae, Schlegeliaceae y Siparunaceae.

represented by one species, and 138 families by 15 or fewer species.

The genera with more than 100 species in descending order are: *Senecio, Solanum, Adesmia, Baccharis, Mimosa, Eupatorium, Oxalis, Croton, Vernonia, Eugenia, Carex, Paspalum,* and *Viola*. In Table 5, details are given of all the genera with the number of species and endemic species and percentage in relation to the total species. The majority of the genera are represented by fewer species: 76 genera (2.9%) have between 40 and 100 species, 324 genera (12.5%) have between 10 and 39 species, 1101 genera (42.6%) include two to nine species, and 1071 genera (41.3%) are represented by a single species.

With respect to their native flora and its presence in the different countries of the area studied, Brazil and Paraguay and then Argentina and Brazil possess a closer floristic relation, since the first two share 3929 species and the remaining two share 3798 (Table 6). Furthermore, it is observed that Argentina and Chile share a total of 2269 species, of which more than 52% are endemic to these countries. There are a number of important families shared exclusively or almost so between Argentina and Chile, including the Malesherbiaceae (extends up to Peru), Calyceraceae (practically endemic to the region, some represented in Bolivia), Asteliaceae, Centrolepidaceae, Coriariaceae, Corsiaceae, Cupressaceae, Desfontainiaceae, Donatiaceae, Epacridaceae, Eucryphiaceae, Grossulariaceae, Hippuridaceae, Hydrangeaceae, Lardizabalaceae, Laxmanniaceae, Luzuriagaceae, Nothofagaceae, Stylidaceae, and Tetrachondraceae. Families exclusive to Chile are Nolanaceae (extends nearly to Peru), Berberidopsidaceae, Restionaceae, and Tecophilaeaceae. To finalize the analysis of families present in Argentina and Chile, it is necessary to point out the presence of families with disjunct distribution between areas to the south of these countries and regions of Brazil and Paraguay; among these families are the Araucariaceae, Cunoniaceae, Elaeocarpaceae, Escalloniaceae, Hymenophyllaceae, Dicksoniaceae, Podocarpaceae, Proteaceae, Thymelaeaceae, Vivianiaceae, and Winteraceae.

With respect to the flora of northeastern Argentina, adjacent areas of Paraguay, and southern Brazil, the three countries share a series of families present only in this part of the flora area, such as Clusiaceae, Costaceae, Dilleniaceae, Hippocrateaceae, Ochnaceae, Olacaceae, Opiliaceae, Sphenocleaceae, Trigoniaceae, Triuridaceae, Vochysiaceae, and Zingiberaceae. Brazil and Paraguay uniquely share Caryocaraceae, Chloranthaceae, Lecythidaceae, and Theophrastaceae, whereas Brazil and Argentina share Cistaceae, Clethraceae, Theaceae, and Velloziaceae. Finally, in southern Brazil the following families are uniquely found: Avicenniaceae, Canellaceae, Connaraceae, Cyclanthaceae, Cymodoceaceae, Humiriaceae, Marcgraviaceae, Myristicaceae, Quiinaceae, Rhizophoraceae, Schlegeliaceae, and Siparunaceae.

Tabla 5. Géneros en orden descendiente según su número de especies, porcentaje respecto de las especies de la familia, especies endémicas y porcentaje de especies endémicas. Se indican con un asterisco (*) los géneros introducidos. *Table 5. Genera by decreasing number of species, percentage of the species in the family, endemic species, and percentage of endemic species. The asterisk (*) indicates introduced genera.*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género	Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
Senecio	423	16,97	362	85,58	*Aristida*	48	3,14	22	45,83
Solanum	231	46,20	97	41,99	*Nototriche*	48	12,47	31	64,58
Adesmia	198	14,97	185	923,43	*Plantago*	48	33,10	28	58,33
Baccharis	189	7,58	81	42,86	*Cryptantha*	47	22,71	40	85,11
Mimosa	162	12,24	101	62,35	*Eragrostis*	47	3,08	9	19,15
Eupatorium	156	6,26	71	45,51	*Hieracium*	47	1,89	29	61,70
Oxalis	125	98,43	74	59,20	*Lepidium*	47	15,61	25	53,19
Croton	123	28,15	66	53,66	*Sida*	47	12,21	11	23,40
Vernonia	121	4,86	45	37,19	*Deyeuxia*	45	2,95	9	20,00
Eugenia	118	38,69	63	53,39	*Justicia*	45	37,82	12	26,67
Carex	107	22,77	70	65,42	*Leucheria*	45	1,81	43	95,56
Paspalum	107	7,00	26	24,30	*Leucocoryne*	45	27,61	45	100,00
Viola	103	82,40	92	89,32	*Maxillaria*	45	4,49	2	4,44
Peperomia	99	68,28	30	30,30	*Miconia*	45	22,17	5	11,11
Nassella	98	6,41	72	73,47	*Nolana*	45	100,00	40	88,89
Astragalus	94	7,11	74	78,72	*Tibouchina*	45	22,17	16	35,56
Sisyrinchium	91	46,67	61	67,03	*Alstroemeria*	44	84,62	37	84,09
Calceolaria	83	96,51	63	75,90	*Chloraea*	44	4,39	40	90,91
Dioscorea	83	96,51	51	61,44	*Chenopodium*	43	35,54	14	32,56
Euphorbia	83	18,99	35	42,17	*Hyptis*	43	19,82	11	25,58
Mikania	82	3,29	30	36,59	*Lupinus*	43	3,25	29	67,44
Poa	81	5,30	50	61,73	*Acianthera*	42	4,19	15	35,71
Valeriana	81	93,10	66	81,48	*Conyza*	42	1,69	32	76,19
Tillandsia	77	26,46	35	45,45	*Cuphea*	42	65,63	11	26,19
Pavonia	76	19,74	34	44,74	*Gamochaeta*	42	1,68	30	71,43
Nothoscordum	73	44,79	63	86,30	*Lippia*	42	16,41	20	47,62
Oxypetalum	73	22,53	36	49,32	*Piper*	42	28,97	6	14,29
Polygala	71	71,72	33	46,48	*Digitaria*	41	2,68	4	9,76
Ipomoea	70	38,89	30	42,86	*Myrceugenia*	41	13,44	25	60,98
Cyperus	68	14,47	10	14,71	*Chaetanthera*	40	1,61	37	92,50
Eleocharis	65	13,80	17	26,15	*Epidendrum*	40	3,99	10	25,00
Eryngium	65	29,68	45	69,23	*Oenothera*	40	42,11	19	47,50
Habenaria	65	6,49	16	24,62	*Passiflora*	40	100,00	3	7,50
Stevia	65	2,61	42	64,62	*Vriesea*	40	13,75	9	22,50
Rhynchospora	63	13,40	10	15,87	*Hymenophyllum*	39	59,09	18	46,15
Leandra	62	30,54	18	29,03	*Junellia*	39	15,23	32	82,05
Haplopappus	60	2,41	59	98,33	*Serjania*	39	41,05	5	12,82
Thelypteris	58	98,31	9	15,52	*Gomphrena*	38	27,74	14	36,84
Asplenium	56	91,80	11	19,64	*Nassauvia*	38	1,52	36	94,74
Festuca	56	3,66	34	60,71	*Pabstiella*	38	3,79	9	23,68
Dyckia	55	18,90	40	72,73	*Vicia*	38	2,87	21	55,26
Heliotropium	55	26,57	38	69,09	*Cuscuta*	37	20,56	20	54,05
Begonia	54	100,00	36	66,67	*Gnaphalium*	37	1,48	25	67,57
Glandularia	54	21,09	36	66,67	*Parodia*	37	9,27	35	94,59
Panicum	54	3,53	10	18,52	*Acacia*	36	2,72	7	19,44
Gymnocalycium	53	13,28	50	94,34	*Alternanthera*	36	26,28	12	33,33
Senna	53	4,01	24	45,28	*Setaria*	36	2,36	7	19,44
Galium	52	18,12	30	57,69	*Verbena*	36	14,06	18	50,00
Hypochaeris	52	2,09	38	73,08	*Adiantum*	35	28,69	5	14,29
Jarava	52	3,40	39	75,00	*Aristolochia*	35	97,22	17	48,57
Octomeria	51	5,09	11	21,57	*Juncus*	35	57,38	11	31,43
Atriplex	50	41,32	34	68,00	*Mutisia*	35	1,40	25	71,43
Elaphoglossum	50	92,59	11	22,00	*Agrostis*	34	2,23	16	47,06
Oncidium	50	4,99	6	12,00	*Berberis*	34	100,00	31	91,18
Salvia	49	22,58	19	38,78	*Blechnum*	34	97,14	14	41,18

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género	Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
Myrcia	34	11,15	9	26,47	*Scleria*	23	4,89	6	26,09
Bromus	33	2,16	11	33,33	*Sinningia*	23	54,76	8	34,78
Loasa	33	49,25	32	96,97	*Buddleja*	22	100,00	12	54,55
Chusquea	32	2,09	17	53,13	*Byttneria*	22	31,88	6	27,27
Prosopis	32	2,42	18	56,25	*Cayaponia*	22	28,21	4	18,18
Trifolium	32	2,42	6	18,75	*Dalechampia*	22	5,03	7	31,82
Gentianella	31	54,39	19	61,29	*Huperzia*	22	61,11	10	45,45
Lathyrus	31	2,34	16	51,61	*Pelexia*	22	2,20	12	54,55
Melica	31	2,03	26	83,87	*Phyllanthus*	22	84,62	3	13,64
Perezia	31	1,24	20	64,52	*Spigelia*	22	75,86	12	54,55
Phoradendron	31	100,00	1	3,23	*Sporobolus*	22	1,44	7	31,82
Portulaca	31	31,96	15	48,39	*Aeschynomene*	21	1,59	4	19,05
Ranunculus	31	49,21	14	45,16	*Cleistes*	21	2,10	6	28,57
Viguiera	31	1,24	18	58,06	*Crotalaria*	21	1,59	2	9,52
Philibertia	30	9,26	14	46,67	*Geranium*	21	80,77	10	47,62
Borreria	29	10,10	3	10,34	*Hordeum*	21	1,37	12	57,14
Galianthe	29	10,10	14	48,28	*Pteris*	21	17,21	4	19,05
Lycium	29	5,80	16	55,17	*Puya*	21	7,22	17	80,95
Rhodophiala	29	23,97	28	96,55	*Rhynchosia*	21	1,59	5	23,81
Schinus	29	58,00	14	48,28	*Anathallis*	20	2,00	11	55,00
Tropaeolum	29	96,67	24	82,76	*Arachis*	20	1,51	7	35,00
Escallonia	28	96,55	16	57,14	*Axonopus*	20	1,31	2	10,00
Hypericum	28	100,00	14	50,00	*Chamaecrista*	20	1,51	4	20,00
Ludwigia	28	29,47	3	10,71	*Descurainia*	20	6,64	14	70,00
Amaranthus	27	19,71	8	29,63	*Evolvulus*	20	11,11	1	5,00
Cheilanthes	27	22,13	7	25,93	*Hybanthus*	20	16,00	11	55,00
Habranthus	27	22,31	24	88,89	*Stellaria*	20	11,70	8	40,00
Jatropha	27	6,18	16	59,26	*Trichocline*	20	0,80	14	70,00
Nicotiana	27	5,40	16	59,26	*Tristagma*	20	12,27	20	100,00
Psychotria	27	9,41	3	11,11	*Utricularia*	20	83,33	0	0,00
Pyrrhocactus	27	6,77	27	100,00	*Acalypha*	19	4,35	6	31,58
Aechmea	26	8,93	12	46,15	*Aloysia*	19	7,39	11	57,89
Calea	26	1,04	10	38,46	*Bernardia*	19	4,35	14	73,68
Cyclopogon	26	2,59	8	30,77	*Bulbophyllum*	19	1,90	1	5,26
Grindelia	26	1,04	23	88,46	*Campylocentrum*	19	1,90	0	0,00
Polygonum	26	27,66	3	11,54	*Centaurea*	19	0,76	8	42,11
Rumex	26	27,66	14	53,85	*Erythroxylum*	19	100,00	4	21,05
Bulbostylis	25	5,32	2	8,00	*Galactia*	19	1,44	3	15,79
Erigeron	25	1,00	22	88,00	*Hippeastrum*	19	15,70	7	36,84
Ruellia	25	21,01	5	20,00	*Noticastrum*	19	0,76	14	73,68
Silene	25	14,62	16	64,00	*Prunus*	19	15,70	6	31,58
Trichocereus	25	6,27	20	80,00	*Uncinia*	19	4,04	14	73,68
Trichomanes	25	37,88	3	12,00	*Zephyranthes*	19	15,70	13	68,42
Acaena	24	19,83	22	91,67	*Azorella*	18	8,22	14	77,78
Calibrachoa	24	4,80	19	79,17	*Cardamine*	18	5,98	13	72,22
Cistanthe	24	24,74	24	100,00	*Cestrum*	18	3,60	3	16,67
Lobivia	24	6,02	20	83,33	*Chloris*	18	1,18	4	22,22
Piptochaetium	24	1,57	16	66,67	*Cristaria*	18	4,68	17	94,44
Rhipsalis	24	6,02	1	4,17	*Fridericia*	18	15,13	0	0,00
Xyris	24	100,00	4	16,67	*Gochnatia*	18	0,72	6	33,33
Abutilon	23	5,97	2	8,70	*Hydrocotyle*	18	8,22	5	27,78
Copiapoa	23	5,76	22	95,65	*Mandevilla*	18	5,56	1	5,56
Cypella	23	11,79	16	69,57	*Manihot*	18	4,12	5	27,78
Desmodium	23	1,74	7	30,43	*Melochia*	18	26,09	2	11,11
Heteropterys	23	20,35	4	17,39	*Monnina*	18	18,18	11	61,11
Jaborosa	23	4,60	19	82,61	*Montiopsis*	18	18,56	17	94,44
Menonvillea	23	7,64	23	100,00	*Nierembergia*	18	3,60	11	61,11
Ocotea	23	36,51	0	0,00	*Plagiobothrys*	18	8,70	15	83,33

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género	Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
Selaginella	18	100,00	2	11,11	*Dasyphyllum*	14	0,56	3	21,43
Tarasa	18	4,68	9	50,00	*Doryopteris*	14	11,48	3	21,43
Turnera	18	60,00	3	16,67	*Eriosema*	14	1,06	0	0,00
Bidens	17	0,68	2	11,76	*Fabiana*	14	2,80	8	57,14
Caesalpinia	17	1,28	5	29,41	*Macroptilium*	14	1,06	3	21,43
Chuquiraga	17	0,68	12	70,59	*Matelea*	14	4,32	7	50,00
Cyrtopodium	17	1,70	2	11,76	*Merostachys*	14	0,92	5	35,71
Deschampsia	17	1,11	13	76,47	*Mostacillastrum*	14	4,65	10	71,43
Eriocaulon	17	42,50	11	64,71	*Muhlenbergia*	14	0,92	1	7,14
Inga	17	1,28	3	17,65	*Nidularium*	14	4,81	3	21,43
Jacquemontia	17	9,44	10	58,82	*Paronychia*	14	8,19	5	35,71
Lantana	17	6,64	3	17,65	*Philodendron*	14	27,45	1	7,14
Lobelia	17	34,69	7	41,18	*Psidium*	14	4,59	3	21,43
Mollinedia	17	80,95	2	11,76	*Quinchamalium*	14	56,00	13	92,86
Petunia	17	3,40	15	88,24	*Sclerophylax*	14	100,00	14	100,00
Tragia	17	3,89	6	35,29	*Smilax*	14	100,00	2	14,29
Zornia	17	1,28	3	17,65	*Spergularia*	14	8,19	10	71,43
Achyrocline	16	0,64	5	31,25	*Sphaeralcea*	14	3,64	13	92,86
Andropogon	16	1,05	4	25,00	*Symplocos*	14	100,00	0	0,00
Aspilia	16	0,64	3	18,75	*Verbesina*	14	0,56	7	50,00
Bacopa	16	11,03	0	0,00	*Anemia*	13	68,42	1	7,69
Banisteriopsis	16	14,16	1	6,25	*Angelphytum*	13	0,52	5	38,46
Bauhinia	16	1,21	5	31,25	*Annona*	13	43,33	5	38,46
Caiophora	16	23,88	6	37,50	*Arenaria*	13	7,60	8	61,54
Cleome	16	64,00	4	25,00	*Boopis*	13	24,07	13	100,00
Epilobium	16	16,84	3	18,75	*Bothriochloa*	13	0,85	2	15,38
Euphrasia	16	28,57	15	93,75	*Brachystele*	13	1,30	6	46,15
Isoëtes	16	100,00	12	75,00	*Chaptalia*	13	0,52	2	15,38
Linum	16	94,12	5	31,25	*Chorizanthe*	13	13,83	12	92,31
Maihueniopsis	16	4,01	13	81,25	*Cissus*	13	92,86	0	0,00
Malesherbia	16	100,00	15	93,75	*Cordia*	13	6,28	1	7,69
Opuntia	16	4,01	3	18,75	*Ctenitis*	13	15,66	7	53,85
Siphocampylus	16	32,65	2	12,50	*Flourensia*	13	0,52	12	92,31
Trisetum	16	1,05	12	75,00	*Gutierrezia*	13	0,52	12	92,31
Anarthrophyllum	15	1,13	15	100,00	*Luzula*	13	21,31	8	61,54
Cerastium	15	8,77	6	40,00	*Maytenus*	13	68,42	6	46,15
Chiropetalum	15	3,43	10	66,67	*Mulinum*	13	5,94	11	84,62
Diplazium	15	18,07	0	0,00	*Panmorphia*	13	1,30	2	15,38
Gaultheria	15	45,45	11	73,33	*Piptocarpha*	13	0,52	0	0,00
Gavilea	15	1,50	15	100,00	*Pleurostachys*	13	2,77	2	15,38
Gunnera	15	100,00	10	66,67	*Sebastiania*	13	2,97	3	23,08
Machaerium	15	1,13	0	0,00	*Spergula*	13	7,60	7	53,85
Myrsine	15	83,33	2	13,33	*Tagetes*	13	0,52	8	61,54
Nectandra	15	23,81	1	6,67	*Trixis*	13	0,52	3	23,08
Ophryosporus	15	0,60	6	40,00	*Wissadula*	13	3,38	3	23,08
Polystichum	15	18,07	7	46,67	*Acmella*	12	0,48	2	16,67
Pouteria	15	57,69	2	13,33	*Anthurium*	12	23,53	3	25,00
Rubus	15	12,40	4	26,67	*Argylia*	12	10,08	11	91,67
Tabebuia	15	12,61	1	6,67	*Asclepias*	12	3,70	2	16,67
Urochloa	15	0,98	0	0,00	*Benthamiella*	12	2,40	12	100,00
Urtica	15	36,59	7	46,67	*Bowlesia*	12	5,48	6	50,00
Aspidosperma	14	4,29	1	7,14	*Campomanesia*	12	3,93	2	16,67
Ayenia	14	20,29	6	42,86	*Convolvulus*	12	6,67	5	41,67
Calycera	14	25,93	13	92,86	*Crassula*	12	70,59	4	33,33
Calydorea	14	7,18	11	78,57	*Cynodon*	12	0,79	5	41,67
Calyptranthes	14	4,59	6	42,86	*Ephedra*	12	100,00	8	66,67
Cienfuegosia	14	3,64	7	50,00	*Ficus*	12	41,38	0	0,00
Cnidoscolus	14	3,20	9	64,29	*Hysterionica*	12	0,48	7	58,33

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
Ilex	12	100,00	1	8,33
Myosotis	12	5,80	1	8,33
Olsynium	12	6,15	10	83,33
Ourisia	12	8,28	10	83,33
Paepalanthus	12	30,00	5	41,67
Pecluma	12	21,82	2	16,67
Piriqueta	12	40,00	3	25,00
Pycreus	12	2,55	2	16,67
Ribes	12	100,00	10	83,33
Rorippa	12	3,99	4	33,33
Schizanthus	12	2,40	12	100,00
Stachys	12	5,53	9	75,00
Stelis	12	1,20	5	41,67
Stylosanthes	12	0,91	3	25,00
Taraxacum	12	0,48	3	25,00
Trichilia	12	54,55	0	0,00
Bartsia	11	19,64	2	18,18
Calandrinia	11	11,34	6	54,55
Capanemia	11	1,10	3	27,27
Cunila	11	5,07	8	72,73
Danthonia	11	0,72	7	63,64
Dendroseris	11	0,44	11	100,00
Draba	11	3,65	8	72,73
Echinodorus	11	68,75	1	9,09
Frailea	11	2,76	9	81,82
Gomesa	11	1,10	2	18,18
Gomidesia	11	3,61	2	18,18
Hibiscus	11	2,86	0	0,00
Indigofera	11	0,83	3	27,27
Manettia	11	3,83	3	27,27
Megalastrum	11	13,25	3	27,27
Pleopeltis	11	20,00	0	0,00
Polypogon	11	0,72	2	18,18
Pterocaulon	11	0,44	2	18,18
Schizachyrium	11	0,72	0	0,00
Sticherus	11	73,33	5	45,45
Veronica	11	7,59	0	0,00
Vigna	11	0,83	0	0,00
Werneria	11	0,44	3	27,27
Zanthoxylum	11	40,74	1	9,09
Amphilophium	10	8,40	0	0,00
Aspidogyne	10	1,00	2	20,00
Azara	10	22,73	8	80,00
Calliandra	10	0,76	1	10,00
Centrosema	10	0,76	2	20,00
Coccoloba	10	10,64	3	30,00
Deuterocohnia	10	3,44	4	40,00
Dyschoriste	10	8,40	3	30,00
Frankenia	10	100,00	6	60,00
Helenium	10	0,40	8	80,00
Hoffmannseggia	10	0,76	5	50,00
Ichnanthus	10	0,65	0	0,00
Isostigma	10	0,40	6	60,00
Lindsaea	10	40,00	0	0,00
Malaxis	10	1,00	2	20,00
Marsdenia	10	3,09	3	30,00
*Medicago**	10	0,76	0	0,00
Neuontobotrys	10	3,32	8	80,00
Nothofagus	10	100,00	10	100,00
Pennisetum	10	0,65	2	20,00
Pfaffia	10	7,30	1	10,00
Phalaris	10	0,65	2	20,00
Prescottia	10	1,00	1	10,00
Puccinellia	10	0,65	8	80,00
Sarcoglottis	10	1,00	1	10,00
Schizopetalon	10	3,32	10	100,00
Skeptrostachys	10	1,00	2	20,00
Stemodia	10	6,90	3	30,00
Suaeda	10	8,26	6	60,00
Waltheria	10	14,49	2	20,00
Weberbauera	10	3,32	6	60,00
Aegiphila	9	4,15	0	0,00
Alopecurus	9	0,59	2	22,22
Apium	9	4,11	5	55,56
Artemisia	9	0,36	4	44,44
Asteriscium	9	4,11	9	100,00
Balbisia	9	100,00	6	66,67
Bipinnula	9	0,90	9	100,00
Blumenbachia	9	13,43	5	55,56
Butia	9	21,95	6	66,67
Byrsonima	9	7,96	1	11,11
Callitriche	9	100,00	4	44,44
Campyloneurum	9	16,36	1	11,11
Canna	9	100,00	1	11,11
Caperonia	9	2,06	4	44,44
Casearia	9	20,45	2	22,22
Coccocypselum	9	3,14	3	33,33
Cyathea	9	60,00	0	0,00
Cynanchum	9	2,78	8	88,89
Ditaxis	9	2,06	7	77,78
Eriochloa	9	0,59	1	11,11
Eustachys	9	0,59	2	22,22
Faramea	9	3,14	0	0,00
Fimbristylis	9	1,91	0	0,00
Koeleria	9	0,59	7	77,78
Lonchocarpus	9	0,68	2	22,22
Mirabilis	9	26,47	3	33,33
Monteiroa	9	2,34	9	100,00
Morrenia	9	2,78	3	33,33
Myrcianthes	9	2,95	5	55,56
Nastanthus	9	16,67	9	100,00
Ossaea	9	4,43	2	22,22
Panphalea	9	0,36	9	100,00
Paullinia	9	9,47	0	0,00
Phacelia	9	4,35	4	44,44
Physalis	9	1,80	0	0,00
Pilea	9	21,95	6	66,67
Polypsecadium	9	2,99	8	88,89
Potamogeton	9	75,00	2	22,22
Promenaea	9	0,90	5	55,56
Prosthechea	9	0,90	0	0,00
Pterocactus	9	2,26	9	100,00
Pycnophyllum	9	5,26	2	22,22
Rhynchanthera	9	4,43	3	33,33
Styrax	9	100,00	0	0,00
Tetragonia	9	47,37	7	77,78

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género	Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
Vanilla	9	0,90	3	33,33	*Ditassa*	7	2,16	2	28,57
Xylosma	9	20,45	3	33,33	*Dolichandra*	7	5,88	1	14,29
Adenocalymma	8	6,72	2	25,00	*Echinochloa*	7	0,46	0	0,00
Agarista	8	24,24	3	37,50	*Encyclia*	7	0,70	2	28,57
Ambrosia	8	0,32	1	12,50	*Fumaria**	7	100,00	0	0,00
Anthoxanthum	8	0,52	3	37,50	*Gaya*	7	1,82	0	0,00
Billbergia	8	2,75	2	25,00	*Hexachlamys*	7	2,30	3	42,86
Cereus	8	2,01	3	37,50	*Holocheilus*	7	0,28	5	71,43
Cinnamomum	8	12,70	2	25,00	*Lecanophora*	7	1,82	7	100,00
Clinopodium	8	3,69	4	50,00	*Lellingeria*	7	29,17	0	0,00
Cortaderia	8	0,52	3	37,50	*Lepechinia*	7	3,23	4	57,14
Dichaea	8	0,80	0	0,00	*Lotus*	7	0,53	1	14,29
Echinopsis	8	2,01	7	87,50	*Lucilia*	7	0,28	1	14,29
Elymus	8	0,52	5	62,50	*Luehea*	7	46,67	1	14,29
Forsteronia	8	2,45	1	12,50	*Luziola*	7	0,46	0	0,00
Gaylussacia	8	24,24	4	50,00	*Malva**	7	1,82	0	0,00
Geum	8	6,61	7	87,50	*Mastigostyla*	7	3,59	5	71,43
Ipheion	8	4,91	7	87,50	*Merremia*	7	3,89	1	14,29
Jacaranda	8	6,72	0	0,00	*Mimulus*	7	87,50	6	85,71
Lachemilla	8	6,61	2	25,00	*Moschopsis*	7	12,96	6	85,71
Leptochloa	8	0,52	0	0,00	*Pappophorum*	7	0,46	2	28,57
Lycopodium	8	22,22	6	75,00	*Phytolacca*	7	26,92	2	28,57
Marlierea	8	2,62	3	37,50	*Polyachyrus*	7	0,28	4	57,14
Microgramma	8	14,55	0	0,00	*Robinsonia*	7	0,28	7	100,00
Misodendrum	8	100,00	8	100,00	*Rudgea*	7	2,44	0	0,00
Nymphaea	8	88,89	0	0,00	*Ruprechtia*	7	7,45	2	28,57
Ophioglossum	8	61,54	1	12,50	*Sacoila*	7	0,70	3	42,86
Orthosia	8	2,47	3	37,50	*Schinopsis*	7	14,00	1	14,29
Pachygenium	8	0,80	4	50,00	*Schistogyne*	7	2,16	4	57,14
Podocoma	8	0,32	2	25,00	*Scirpus*	7	1,49	6	85,71
Poidium	8	0,52	1	12,50	*Sicyos*	7	8,97	1	14,29
Polystachya	8	0,80	0	0,00	*Sophora*	7	0,53	6	85,71
Porophyllum	8	0,32	2	25,00	*Sorghastrum*	7	0,46	0	0,00
Prestonia	8	2,47	0	0,00	*Stillingia*	7	1,60	3	42,86
Richardia	8	2,79	0	0,00	*Strychnos*	7	24,14	0	0,00
Rollinia	8	26,67	1	12,50	*Symphyotrichum*	7	0,28	4	57,14
Scoparia	8	5,52	3	37,50	*Tephrocactus*	7	1,75	7	100,00
Scutellaria	8	3,69	3	37,50	*Terminalia*	7	46,67	4	57,14
Sisymbrium	8	2,66	0	0,00	*Tetraglochin*	7	5,79	2	28,57
Specklinia	8	0,80	4	50,00	*Triptilion*	7	0,28	7	100,00
Stachytarpheta	8	3,13	1	12,50	*Tweedia*	7	2,16	6	85,71
Syngonanthus	8	20,00	2	25,00	*Urvillea*	7	7,37	0	0,00
Tradescantia	8	30,77	0	0,00	*Varronia*	7	3,38	0	0,00
Urocarpidium	8	2,08	1	12,50	*Xanthium*	7	0,28	1	14,29
Wahlenbergia	8	16,33	5	62,50	*Xerodraba*	7	2,33	7	100,00
Abrotanella	7	0,28	7	100,00	*Zygostates*	7	0,70	4	57,14
Agalinis	7	12,50	3	42,86	*Aa*	6	0,60	2	33,33
*Allium**	7	4,29	0	0,00	*Acantholippia*	6	2,34	5	83,33
Anatherostipa	7	0,46	4	57,14	*Allophylus*	6	6,32	0	0,00
Anemone	7	11,11	4	57,14	*Anemopaegma*	6	5,04	0	0,00
Arthrosia	7	0,70	1	14,29	*Aphelandra*	6	5,04	2	33,33
Barbosella	7	0,70	0	0,00	*Apodanthera*	6	7,69	3	50,00
Bomarea	7	13,46	1	14,29	*Avena*	6	0,39	0	0,00
Canavalia	7	0,53	0	0,00	*Belloa*	6	0,24	1	16,67
Capparis	7	28,00	0	0,00	*Bifrenaria*	6	0,60	0	0,00
Catasetum	7	0,70	1	14,29	*Bougainvillea*	6	17,65	0	0,00
Corynabutilon	7	1,82	7	100,00	*Bouteloua*	6	0,39	0	0,00
Cruckshanksia	7	2,44	6	85,71	*Brunfelsia*	6	1,20	0	0,00

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
Bulnesia	6	30,00	2	33,33
Cattleya	6	0,60	0	0,00
Cenchrus	6	0,39	0	0,00
Chascolytrum	6	0,39	2	33,33
Cissampelos	6	40,00	0	0,00
Citronella	6	100,00	1	16,67
Clidemia	6	2,96	0	0,00
Clitoria	6	0,45	2	33,33
Combretum	6	40,00	0	0,00
Cyclanthera	6	7,69	0	0,00
Dalbergia	6	0,45	1	16,67
Dalea	6	0,45	1	16,67
Daphnopsis	6	75,00	1	16,67
Desmanthus	6	0,45	1	16,67
Dichanthelium	6	0,39	0	0,00
Dicliptera	6	5,04	2	33,33
Diplolepis	6	1,85	5	83,33
Dorstenia	6	20,69	1	16,67
Drosera	6	100,00	1	16,67
Drymaria	6	3,51	1	16,67
Eltroplectris	6	0,60	1	16,67
Erechtites	6	0,24	2	33,33
Eulychnia	6	1,50	6	100,00
Fuchsia	6	6,32	3	50,00
Galeandra	6	0,60	0	0,00
Galinsoga	6	0,24	1	16,67
Gamocarpha	6	11,11	6	100,00
Glechon	6	2,76	3	50,00
Guadua	6	0,39	0	0,00
Guilleminea	6	4,38	2	33,33
Gymnophyton	6	2,74	6	100,00
Gymnopogon	6	0,39	2	33,33
Heliconia	6	100,00	0	0,00
Hesperozygis	6	2,76	5	83,33
Homalocarpus	6	2,74	6	100,00
Imperata	6	0,39	1	16,67
Libertia	6	3,08	6	100,00
Lycopodiella	6	16,67	0	0,00
Malvastrum	6	1,56	0	0,00
Melothria	6	7,69	2	33,33
Menodora	6	37,50	2	33,33
Mitracarpus	6	2,09	1	16,67
Mnesithea	6	0,39	0	0,00
Nardophyllum	6	0,24	5	83,33
Nematanthus	6	14,29	1	16,67
Neoporteria	6	1,50	6	100,00
Nephrolepis	6	100,00	0	0,00
Niedenzuella	6	5,31	0	0,00
Oreocereus	6	1,50	1	16,67
Oxychloë	6	9,84	5	83,33
Phycella	6	4,96	6	100,00
Phymatidium	6	0,60	2	33,33
Pleurobotryum	6	0,60	3	50,00
Potentilla	6	4,96	1	16,67
Prosopidastrum	6	0,45	6	100,00
Pseudabutilon	6	1,56	0	0,00
Rytidosperma	6	0,39	6	100,00
Salix	6	13,64	0	0,00
Schoenoplectus	6	1,29	0	0,00
Schoenus	6	1,28	4	66,67
Serpocaulon	6	10,91	0	0,00
Sesbania	6	0,45	2	33,33
Stenandrium	6	5,04	1	16,67
Stigmaphyllon	6	5,31	1	16,67
Tetrapterys	6	5,31	1	16,67
Thelocephala	6	1,50	6	100,00
Tiquilia	6	2,90	1	16,67
Tournefortia	6	2,90	0	0,00
Vulpia	6	0,39	2	33,33
Wedelia	6	0,24	0	0,00
Weinmannia	6	66,67	1	16,67
Wigginsia	6	1,50	3	50,00
Xenophyllum	6	0,24	2	33,33
Acanthocalycium	5	1,25	5	100,00
Achatocarpus	5	100,00	2	40,00
Acicarpha	5	9,26	2	40,00
Adiantopsis	5	4,10	1	20,00
Albizia	5	0,38	1	20,00
Alsophila	5	33,33	0	0,00
Anthericum	5	71,43	2	40,00
Aphanes	5	4,13	1	20,00
Aphyllocladus	5	0,20	4	80,00
Arjona	5	20,00	5	100,00
*Asparagus**	5	100,00	0	0,00
Aspicarpa	5	4,42	1	20,00
Astronium	5	10,00	1	20,00
Aulonemia	5	0,33	2	40,00
Bactris	5	12,20	0	0,00
Blepharodon	5	1,54	1	20,00
Boehmeria	5	12,20	1	20,00
*Brassica**	5	1,66	0	0,00
Bromelia	5	1,72	1	20,00
Bromidium	5	0,33	1	20,00
Buchnera	5	8,93	0	0,00
Capsicum	5	1,00	0	0,00
Cardionema	5	2,92	3	60,00
*Carduus**	5	0,20	0	0,00
Cedrela	5	22,73	2	40,00
Centaurium	5	8,77	1	20,00
Chaetocalyx	5	0,38	2	40,00
Chersodoma	5	0,20	2	40,00
Chevreulia	5	0,20	3	60,00
Chomelia	5	1,74	1	20,00
Chrysophyllum	5	19,23	0	0,00
Citharexylum	5	1,95	0	0,00
Clematis	5	7,94	1	20,00
Collaea	5	0,38	3	60,00
Colletia	5	12,50	4	80,00
Colliguaja	5	1,14	5	100,00
Commelina	5	19,23	0	0,00
Conanthera	5	55,56	5	100,00
Cranichis	5	0,50	1	20,00
*Crepis**	5	0,20	0	0,00
Cynoglossum	5	2,42	1	20,00
Distichlis	5	0,33	3	60,00
Drimys	5	100,00	4	80,00

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
Eriosyce	5	1,25	5	100,00
Erodium	5	19,23	0	0,00
Erythrina	5	0,38	0	0,00
Eurystyles	5	0,50	0	0,00
Gilliesia	5	62,50	5	100,00
Griselinia	5	100,00	4	80,00
Guapira	5	14,71	2	40,00
Hamadryas	5	7,94	5	100,00
Hapalorchis	5	0,50	1	20,00
Harrisia	5	1,25	2	40,00
Herbertia	5	2,56	4	80,00
Hieronymiella	5	4,13	4	80,00
Isolepis	5	1,06	2	40,00
Jobinia	5	1,54	2	40,00
Jungia	5	0,20	0	0,00
Lemna	5	45,45	0	0,00
Lilaeopsis	5	2,28	1	20,00
Lolium	5	0,33	0	0,00
Luciliocline	5	0,20	2	40,00
Lycianthes	5	1,00	0	0,00
Lythrum	5	7,81	0	0,00
Macrosiphonia	5	1,54	1	20,00
Matayba	5	5,26	1	20,00
Mathewsia	5	1,66	5	100,00
Mecardonia	5	3,45	3	60,00
Mentzelia	5	7,46	2	40,00
Micropsis	5	0,20	5	100,00
Microtea	5	19,23	0	0,00
Modiolastrum	5	1,30	4	80,00
Monvillea	5	1,25	1	20,00
Myrciaria	5	1,64	1	20,00
Neomarica	5	2,56	2	40,00
Notylia	5	0,50	0	0,00
Odontorrhynchus	5	0,50	4	80,00
Olyra	5	0,33	0	0,00
Onuris	5	1,66	5	100,00
Oziroë	5	100,00	1	20,00
Palicourea	5	1,74	1	20,00
*Papaver**	5	35,71	0	0,00
Pectocarya	5	2,42	1	20,00
Peixotoa	5	4,42	2	40,00
Peltaea	5	1,30	0	0,00
Persea	5	7,94	1	20,00
Physaria	5	1,66	4	80,00
Picramnia	5	38,46	1	20,00
Pilostyles	5	100,00	2	40,00
Pitcairnia	5	1,72	4	80,00
Placea	5	4,13	5	100,00
Pleurophora	5	7,81	4	80,00
Pleurothallis	5	0,50	2	40,00
Pluchea	5	0,20	0	0,00
Podocarpus	5	62,50	2	40,00
Podostemum	5	26,32	1	20,00
Polylepis	5	4,13	1	20,00
Pseudobombax	5	41,67	0	0,00
Pteroglossa	5	0,50	4	80,00
Qualea	5	41,67	0	0,00
Rebutia	5	1,25	4	80,00
Rhabdocaulon	5	2,30	2	40,00
*Rosa**	5	4,13	0	0,00
Roupala	5	35,71	0	0,00
Samolus	5	100,00	3	60,00
Smallanthus	5	0,20	2	40,00
Soliva	5	0,20	3	60,00
Spartina	5	0,33	0	0,00
Syagrus	5	12,20	1	20,00
Talinum	5	5,15	2	40,00
Tecoma	5	4,20	0	0,00
Tephrosia	5	0,38	3	60,00
Trichocentrum	5	0,50	0	0,00
Triumfetta	5	33,33	0	0,00
Urera	5	12,20	0	0,00
Wilbrandia	5	6,41	2	40,00
Zygopetalum	5	0,50	0	0,00
Acisanthera	4	1,97	1	25,00
*Aira**	4	0,26	0	0,00
Alchornea	4	0,92	0	0,00
Amelichloa	4	0,26	3	75,00
Ammannia	4	6,25	0	0,00
Anagallis	4	36,36	0	0,00
Angelonia	4	2,76	1	25,00
Anthaenantiopsis	4	0,26	1	25,00
Araujia	4	1,23	1	25,00
Argemone	4	28,57	2	50,00
Austrocactus	4	1,00	4	100,00
Austrocylindropuntia	4	1,00	1	25,00
Banara	4	9,09	1	25,00
Bignonia	4	3,36	0	0,00
Boerhavia	4	11,76	2	50,00
Bonamia	4	2,22	3	75,00
Botrychium	4	30,77	1	25,00
Bredemeyera	4	4,04	2	50,00
Burmannia	4	44,44	0	0,00
Calolisianthus	4	7,02	0	0,00
Camptosema	4	0,30	1	25,00
Cardiospermum	4	4,21	0	0,00
Carica	4	66,67	1	25,00
Castilleja	4	7,14	0	0,00
Celtis	4	80,00	0	0,00
Chilocardamum	4	1,33	4	100,00
Cirrhaea	4	0,40	0	0,00
Cleistocactus	4	1,00	0	0,00
Colanthelia	4	0,26	2	50,00
Condalia	4	10,00	3	75,00
Crinodendron	4	40,00	3	75,00
Ctenium	4	0,26	0	0,00
Dennstaedtia	4	16,00	0	0,00
Dichondra	4	2,22	0	0,00
Dichorisandra	4	15,38	1	25,00
Discolobium	4	0,30	2	50,00
Dryadella	4	0,40	0	0,00
Dryopteris	4	4,82	0	0,00
Elionurus	4	0,26	1	25,00
Eriochrysis	4	0,26	0	0,00
Esenbeckia	4	14,81	0	0,00
Froelichia	4	2,92	1	25,00

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
Gaillardia	4	0,16	2	50,00
Gelasine	4	2,05	2	50,00
Geonoma	4	9,76	1	25,00
Gouania	4	10,00	0	0,00
Gouinia	4	0,26	0	0,00
Grabowskia	4	0,80	3	75,00
Grammitis	4	16,67	0	0,00
Greigia	4	1,37	4	100,00
Grobya	4	0,40	2	50,00
Hedeoma	4	1,84	2	50,00
*Helianthus**	4	0,16	0	0,00
Heteranthera	4	40,00	0	0,00
Heterosperma	4	0,16	0	0,00
Hoehnea	4	1,84	2	50,00
Huanaca	4	1,83	4	100,00
Hyaloseris	4	0,16	3	75,00
Hydrocleys	4	66,67	0	0,00
Hymenachne	4	0,26	0	0,00
Hymenoxys	4	0,16	1	25,00
Hypolepis	4	16,00	1	25,00
Islaya	4	1,00	3	75,00
Kyllinga	4	0,85	0	0,00
*Lactuca**	4	0,16	0	0,00
Lagenocarpus	4	0,85	0	0,00
Larrea	4	20,00	3	75,00
*Leontodon**	4	0,16	0	0,00
*Linaria**	4	2,76	0	0,00
Machaerina	4	0,85	2	50,00
Margaritopsis	4	1,39	1	25,00
*Melilotus**	4	0,30	0	0,00
*Mentha**	4	1,84	0	0,00
Microliabum	4	0,16	3	75,00
Miersia	4	2,45	4	100,00
Miltonia	4	0,40	0	0,00
Muehlenbeckia	4	4,26	1	25,00
Munroa	4	0,26	1	25,00
Ochagavia	4	1,37	4	100,00
Ocimum	4	1,84	0	0,00
Oldenlandia	4	1,39	2	50,00
Ornithopus	4	0,30	1	25,00
Orobanche	4	7,14	2	50,00
Osmorhiza	4	1,83	1	25,00
Palaua	4	1,04	2	50,00
Paramyrciaria	4	1,31	1	25,00
Pectis	4	0,16	1	25,00
Pellaea	4	3,28	1	25,00
Peltodon	4	1,84	1	25,00
Pennellia	4	1,33	3	75,00
Piptadenia	4	0,30	1	25,00
Polycarpon	4	2,34	1	25,00
Pomaria	4	0,30	2	50,00
Randia	4	1,39	0	0,00
Rauvolfia	4	1,23	0	0,00
*Reseda**	4	100,00	0	0,00
Retanilla	4	10,00	4	100,00
Reyesia	4	0,80	4	100,00
Saccharum	4	0,26	0	0,00
Sagina	4	2,34	1	25,00
Salpichroa	4	0,80	0	0,00
Salvinia	4	100,00	0	0,00
Sarcodraba	4	1,33	4	100,00
Schwenckia	4	0,80	0	0,00
Securidaca	4	4,04	0	0,00
Seguieria	4	15,38	0	0,00
Sloanea	4	40,00	0	0,00
*Sonchus**	4	0,16	0	0,00
Staelia	4	1,39	2	50,00
Steinchisma	4	0,26	1	25,00
Stenachaenium	4	0,16	0	0,00
Stigmatopteris	4	4,82	0	0,00
Terpsichore	4	16,67	0	0,00
Tessaria	4	0,16	0	0,00
Tetracera	4	36,36	0	0,00
Teucrium	4	1,84	2	50,00
Thinouia	4	4,21	0	0,00
Tragus	4	0,26	1	25,00
Trichogonia	4	0,16	3	75,00
Tridens	4	0,26	2	50,00
Trimezia	4	2,05	1	25,00
Tripogandra	4	15,38	0	0,00
Tunilla	4	1,00	2	50,00
Typha	4	100,00	0	0,00
*Valerianella**	4	4,60	0	0,00
Veyretia	4	0,40	2	50,00
Viviania	4	57,14	4	100,00
Vochysia	4	33,33	0	0,00
Werdermannia	4	1,33	4	100,00
Xanthosoma	4	7,84	0	0,00
Zygia	4	0,30	0	0,00
Acanthospermum	3	0,12	1	33,33
Agenium	3	0,20	0	0,00
Agrimonia	3	2,48	1	33,33
Aiouea	3	4,76	0	0,00
Amicia	3	0,23	0	0,00
Ananas	3	1,03	0	0,00
Andira	3	0,23	0	0,00
Anogramma	3	2,46	1	33,33
Anredera	3	75,00	0	0,00
Apinagia	3	15,79	2	66,67
Astraea	3	0,69	2	66,67
Attalea	3	7,32	1	33,33
Aureliana	3	0,60	0	0,00
Barneoudia	3	4,76	3	100,00
Bertolonia	3	1,48	0	0,00
Brachyclados	3	0,12	3	100,00
*Briza**	3	0,20	0	0,00
Brosimum	3	10,34	0	0,00
*Calendula**	3	0,12	0	0,00
Callisthene	3	25,00	2	66,67
Caltha	3	4,76	3	100,00
Calystegia	3	1,67	0	0,00
*Camelina**	3	1,00	0	0,00
Carelia	3	0,12	3	100,00
Ceiba	3	25,00	0	0,00
Celosia	3	2,19	0	0,00
Chamissoa	3	2,19	0	0,00

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
Chiliophyllum	3	0,12	3	100,00
Chiliotrichiopsis	3	0,12	2	66,67
Chionanthus	3	18,75	0	0,00
Chloroleucon	3	0,23	0	0,00
Clara	3	50,00	3	100,00
Clerodendrum	3	1,38	0	0,00
Codonanthe	3	7,14	0	0,00
Colobanthus	3	1,75	2	66,67
Cordiera	3	1,05	1	33,33
Coreopsis	3	0,12	1	33,33
Corrigiola	3	1,75	3	100,00
Cosmos	3	0,12	0	0,00
Costus	3	100,00	0	0,00
Cotula	3	0,12	0	0,00
Cryptocarya	3	4,76	1	33,33
Cucurbita	3	3,85	0	0,00
Cumulopuntia	3	0,75	0	0,00
Cyclospermum	3	1,37	1	33,33
Cyphocarpus	3	6,12	3	100,00
Danaea	3	60,00	0	0,00
Datura	3	0,60	0	0,00
Daucus	3	1,37	0	0,00
Davilla	3	27,27	0	0,00
Declieuxia	3	1,05	0	0,00
Dendropanax	3	23,08	0	0,00
Dicksonia	3	60,00	2	66,67
Dicranopteris	3	20,00	0	0,00
Dioclea	3	0,23	0	0,00
Diodella	3	1,05	0	0,00
Diospyros	3	100,00	1	33,33
*Diplotaxis**	3	1,00	0	0,00
Diposis	3	1,37	3	100,00
Discaria	3	7,50	3	100,00
Doliocarpus	3	27,27	0	0,00
Duguetia	3	10,00	0	0,00
Duranta	3	1,17	0	0,00
Eclipta	3	0,12	0	0,00
Eichhornia	3	30,00	0	0,00
Elephantopus	3	0,12	0	0,00
Ennealophus	3	1,54	2	66,67
Epipetrum	3	3,49	3	100,00
Epistephium	3	0,30	0	0,00
Eudema	3	1,00	2	66,67
Exhalimolobos	3	1,00	1	33,33
Exodeconus	3	0,60	1	33,33
Facelis	3	0,12	0	0,00
Fosterella	3	1,03	1	33,33
*Fraxinus**	3	18,75	0	0,00
Fuirena	3	0,64	0	0,00
Funastrum	3	0,93	1	33,33
Galphimia	3	2,65	1	33,33
Gilia	3	23,08	1	33,33
Gloxinia	3	7,14	0	0,00
Glyceria	3	0,20	1	33,33
Gonolobus	3	0,93	0	0,00
Guarea	3	13,64	0	0,00
Guatteria	3	10,00	1	33,33
Guettarda	3	1,05	0	0,00
Guindilia	3	3,16	3	100,00
Hatiora	3	0,75	0	0,00
Hebanthe	3	2,19	0	0,00
Heimia	3	4,69	0	0,00
Helicteres	3	4,35	0	0,00
Herissantia	3	0,78	0	0,00
Herniaria	3	1,75	0	0,00
Herreria	3	50,00	2	66,67
Heterothalamus	3	0,12	3	100,00
Hiraea	3	2,65	0	0,00
Hymenaea	3	0,23	0	0,00
Hyperbaena	3	20,00	0	0,00
Hypoxis	3	60,00	1	33,33
*Impatiens**	3	100,00	0	0,00
Isabelia	3	0,30	1	33,33
Janusia	3	2,65	0	0,00
Jovellana	3	3,49	3	100,00
Kageneckia	3	2,48	2	66,67
Krameria	3	100,00	1	33,33
Krapovickasia	3	0,78	0	0,00
Lacistema	3	100,00	0	0,00
Laennecia	3	0,12	1	33,33
Lagenophora	3	0,12	2	66,67
*Lamium**	3	1,38	0	0,00
Lampaya	3	1,17	2	66,67
Lankesterella	3	0,30	0	0,00
Lasiacis	3	0,20	0	0,00
Leersia	3	0,20	0	0,00
Leptotes	3	0,30	0	0,00
Lithraea	3	6,00	1	33,33
Lomatia	3	21,43	2	66,67
Lophopappus	3	0,12	1	33,33
Luzuriaga	3	100,00	3	100,00
Machaonia	3	1,05	0	0,00
Macroscepis	3	0,93	1	33,33
Marsilea	3	60,00	0	0,00
Marsippospermum	3	4,92	3	100,00
Mascagnia	3	2,65	1	33,33
*Maurandya**	3	2,07	0	0,00
Melasma	3	5,36	1	33,33
Melpomene	3	12,50	0	0,00
Mesosetum	3	0,20	1	33,33
Metastelma	3	0,93	3	100,00
Microphyes	3	1,75	2	66,67
Monttea	3	2,07	3	100,00
Najas	3	100,00	0	0,00
Nama	3	1,45	0	0,00
Neea	3	8,82	1	33,33
Neomitranthes	3	0,98	3	100,00
Neoregelia	3	1,03	0	0,00
Neosparton	3	1,17	3	100,00
Odontocarya	3	20,00	0	0,00
Oreopanax	3	23,08	0	0,00
Oryza	3	0,20	0	0,00
Osmunda	3	100,00	0	0,00
Otholobium	3	0,23	1	33,33
Ottonia	3	2,07	1	33,33
Ouratea	3	50,00	0	0,00

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
Parastrephia	3	0,12	0	0,00
Pera	3	0,69	0	0,00
Pereskia	3	0,75	0	0,00
*Petrorhagia**	3	1,75	0	0,00
Phaseolus	3	0,23	0	0,00
Phlebodium	3	5,45	0	0,00
Phyla	3	1,17	0	0,00
Phylloscirpus	3	0,64	0	0,00
*Pinus**	3	75,00	0	0,00
Pisonia	3	8,82	0	0,00
Platythelys	3	0,30	1	33,33
Plenckia	3	15,79	0	0,00
Poiretia	3	0,23	0	0,00
Polybotrya	3	3,61	1	33,33
Pontederia	3	30,00	0	0,00
Primula	3	27,27	2	66,67
Proustia	3	0,12	2	66,67
Pterolepis	3	1,48	0	0,00
Puna	3	0,75	2	66,67
Rhamnidium	3	7,50	1	33,33
Rhamnus	3	7,50	1	33,33
Rodriguezia	3	0,30	1	33,33
Rumohra	3	3,61	2	66,67
Ruppia	3	100,00	0	0,00
Saccoloma	3	12,00	0	0,00
Sagittaria	3	18,75	0	0,00
Sanderella	3	0,30	1	33,33
Sapium	3	0,69	0	0,00
Sarcocornia	3	2,48	0	0,00
Sauvagesia	3	50,00	0	0,00
Scaphyglottis	3	0,30	0	0,00
Schkuhria	3	0,12	0	0,00
Schultesia	3	5,26	1	33,33
Sedum	3	17,65	1	33,33
Sidastrum	3	0,78	0	0,00
Simaba	3	23,08	1	33,33
Siphoneugena	3	0,98	1	33,33
Solaria	3	37,50	3	100,00
Sophronitis	3	0,30	1	33,33
Spermacoce	3	1,05	1	33,33
Spilanthes	3	0,12	1	33,33
Stanhopea	3	0,30	0	0,00
Stigmatosema	3	0,30	3	100,00
Stuckenia	3	25,00	0	0,00
Synammia	3	5,45	3	100,00
*Tanacetum**	3	0,12	0	0,00
Tanaecium	3	2,52	0	0,00
Tassadia	3	0,93	0	0,00
Tectaria	3	3,61	0	0,00
*Thunbergia**	3	2,52	0	0,00
*Tragopogon**	3	0,12	0	0,00
Triglochin	3	60,00	0	0,00
Trigonidium	3	0,30	1	33,33
Tripogon	3	0,20	1	33,33
Tristerix	3	27,27	2	66,67
Trithrinax	3	7,32	2	66,67
Tynanthus	3	2,52	0	0,00
Ugni	3	0,98	3	100,00
*Verbascum**	3	42,86	0	0,00
Vitex	3	1,38	0	0,00
Vittaria	3	37,50	0	0,00
Xylobium	3	0,30	0	0,00
Xylopia	3	10,00	0	0,00
Zameioscirpus	3	0,64	0	0,00
Zizaniopsis	3	0,20	1	33,33
Abarema	2	0,15	0	0,00
Abatia	2	4,55	0	0,00
Acanthocladus	2	2,02	0	0,00
Acanthosyris	2	8,00	1	50,00
*Acer**	2	100,00	0	0,00
*Achillea**	2	0,08	0	0,00
Acosmium	2	0,15	0	0,00
Acroceras	2	0,13	0	0,00
Acrocomia	2	4,88	0	0,00
Actinostachys	2	10,53	0	0,00
Actinostemon	2	0,46	0	0,00
Adenostemma	2	0,08	0	0,00
Agonandra	2	100,00	0	0,00
Agoseris	2	0,08	2	100,00
*Alisma**	2	12,50	0	0,00
Allagoptera	2	4,88	0	0,00
Allenrolfea	2	1,65	2	100,00
Alnus	2	66,67	0	0,00
Alonsoa	2	28,57	1	50,00
*Ammi**	2	0,91	0	0,00
Amomyrtus	2	0,66	2	100,00
Amphibromus	2	0,13	0	0,00
Amsinckia	2	0,97	0	0,00
Anacampseros	2	2,06	2	100,00
Anadenanthera	2	0,15	0	0,00
Aniseia	2	1,11	1	50,00
Anisomeria	2	7,69	1	50,00
Anoda	2	0,52	0	0,00
Antennaria	2	0,08	2	100,00
*Anthemis**	2	0,08	0	0,00
*Anthriscus**	2	0,91	0	0,00
Antigramma	2	3,28	0	0,00
*Antirrhinum**	2	1,38	0	0,00
Apoda-prorepentia	2	0,20	1	50,00
Aralia	2	15,38	0	0,00
Araucaria	2	100,00	1	50,00
Ardisia	2	11,11	1	50,00
Argyrochosma	2	1,64	1	50,00
Arthropogon	2	0,13	0	0,00
Arundinella	2	0,13	0	0,00
Asplundia	2	100,00	2	100,00
Asterostigma	2	3,92	2	100,00
Azolla	2	100,00	0	0,00
Barbaceniopsis	2	66,67	1	50,00
*Barbarea**	2	0,66	0	0,00
*Bassia**	2	1,65	0	0,00
Bastardia	2	0,52	0	0,00
Becquerelia	2	0,43	0	0,00
Beilschmiedia	2	3,17	2	100,00
Blepharidachne	2	0,13	2	100,00
Blepharocalyx	2	0,66	1	50,00

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género	Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
Bletia	2	0,20	0	0,00	*Cremolobus*	2	0,66	0	0,00
Bolax	2	0,91	2	100,00	*Crenias*	2	10,53	0	0,00
Bolbitis	2	3,70	0	0,00	*Cressa*	2	1,11	1	50,00
Bolboschoenus	2	0,43	0	0,00	*Crumenaria*	2	5,00	1	50,00
*Brachypodium**	2	0,13	0	0,00	*Cryptophoranthus*	2	0,20	1	50,00
Brasiliopuntia	2	0,50	0	0,00	*Ctenanthe*	2	20,00	1	50,00
Brayopsis	2	0,66	0	0,00	*Cucumis**	2	2,56	0	0,00
Brickellia	2	0,08	1	50,00	*Cupania*	2	2,11	0	0,00
Browningia	2	0,50	0	0,00	*Curtia*	2	3,51	1	50,00
Bunchosia	2	1,77	0	0,00	*Cuspidaria*	2	1,68	0	0,00
Cabomba	2	100,00	0	0,00	*Cyanaeorchis*	2	0,20	0	0,00
Calathea	2	20,00	0	0,00	*Cynosurus**	2	0,13	0	0,00
Callisia	2	7,69	0	0,00	*Cystopteris*	2	2,41	0	0,00
Calopogonium	2	0,15	0	0,00	*Cytisus**	2	0,15	0	0,00
Calyptrocarya	2	0,43	0	0,00	*Dianthus**	2	1,17	0	0,00
Carpobrotus	2	10,53	1	50,00	*Dicella*	2	1,77	1	50,00
*Carthamus**	2	0,08	0	0,00	*Dichanthium**	2	0,13	0	0,00
Casselia	2	0,78	2	100,00	*Diodia*	2	0,70	0	0,00
Cassia	2	0,15	0	0,00	*Diplopterys*	2	1,77	0	0,00
Castela	2	15,38	1	50,00	*Diplostephium*	2	0,08	0	0,00
Catabrosa	2	0,13	0	0,00	*Dipsacus**	2	40,00	0	0,00
Catopsis	2	0,69	0	0,00	*Dipteranthus*	2	0,20	1	50,00
Cecropia	2	50,00	0	0,00	*Disciphania*	2	13,33	1	50,00
Centaurodendron	2	0,08	2	100,00	*Diskyphogyne*	2	0,20	1	50,00
Centratherum	2	0,08	1	50,00	*Dissanthelium*	2	0,13	0	0,00
Centrolobium	2	0,15	0	0,00	*Distichia*	2	3,28	0	0,00
Ceradenia	2	8,33	0	0,00	*Dolichopsis*	2	0,15	0	0,00
Ceratophyllum	2	100,00	0	0,00	*Domeykoa*	2	0,91	2	100,00
Ceratosanthes	2	2,56	0	0,00	*Doniophyton*	2	0,08	2	100,00
Cercidium	2	0,15	0	0,00	*Dunalia*	2	0,40	0	0,00
Chelonanthus	2	3,51	0	0,00	*Dysopsis*	2	0,46	2	100,00
Chiliotrichum	2	0,08	2	100,00	*Dyssochroma*	2	0,40	0	0,00
Chlidanthus	2	1,65	2	100,00	*Echinopepon*	2	2,56	1	50,00
Chresta	2	0,08	0	0,00	*Echium**	2	0,97	0	0,00
*Chrysanthemum**	2	0,08	0	0,00	*Egeria*	2	28,57	0	0,00
Chrysosplenium	2	28,57	2	100,00	*Elachyptera*	2	15,38	0	0,00
*Cirsium**	2	0,08	0	0,00	*Elatine*	2	100,00	1	50,00
*Citrullus**	2	2,56	0	0,00	*Eleusine*	2	0,13	0	0,00
Clarkia	2	2,11	1	50,00	*Eleutherine*	2	1,03	0	0,00
Clethra	2	100,00	1	50,00	*Elleanthus*	2	0,20	0	0,00
Clibadium	2	0,08	0	0,00	*Elodea*	2	28,57	0	0,00
Clusia	2	28,57	0	0,00	*Enterolobium*	2	0,15	1	50,00
Cnicothamnus	2	0,08	0	0,00	*Enydra*	2	0,08	0	0,00
Cochlidium	2	8,33	0	0,00	*Equisetum*	2	100,00	0	0,00
Cochlospermum	2	100,00	0	0,00	*Ercilla*	2	7,69	2	100,00
Codonorchis	2	0,20	2	100,00	*Eriolarynx*	2	0,40	2	100,00
Collomia	2	15,38	0	0,00	*Erioneuron*	2	0,13	0	0,00
Colubrina	2	5,00	0	0,00	*Eriope*	2	0,92	0	0,00
Combera	2	0,40	2	100,00	*Erysimum**	2	0,66	0	0,00
Constantia	2	0,20	2	100,00	*Esterhazya*	2	3,57	1	50,00
Copaifera	2	0,15	1	50,00	*Eucalyptus**	2	0,66	0	0,00
Coprosma	2	0,70	2	100,00	*Eucryphia*	2	100,00	2	100,00
Corchorus	2	13,33	0	0,00	*Euplassa*	2	14,29	1	50,00
*Corynephorus**	2	0,13	0	0,00	*Famatina*	2	1,65	2	100,00
Couepia	2	33,33	0	0,00	*Fevillea*	2	2,56	0	0,00
Coursetia	2	0,15	0	0,00	*Flaveria*	2	0,08	1	50,00
Coussarea	2	0,70	0	0,00	*Freesia**	2	1,03	0	0,00
Craniolaria	2	50,00	1	50,00	*Gayophytum*	2	2,11	1	50,00

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
*Genista**	2	0,15	0	0,00
Genlisea	2	8,33	0	0,00
Geoffraea	2	0,15	0	0,00
Geophila	2	0,70	0	0,00
Gethyum	2	1,23	2	100,00
Giliastrum	2	15,38	2	100,00
*Gladiolus**	2	1,03	0	0,00
*Glaucium**	2	14,29	0	0,00
Gleditsia	2	0,15	0	0,00
Glinus	2	66,67	0	0,00
Gongora	2	0,20	0	0,00
Gorgonidium	2	3,92	0	0,00
Gymnanthes	2	0,46	0	0,00
Haageocereus	2	0,50	1	50,00
Hagenbachia	2	28,57	0	0,00
Halerpestes	2	3,17	0	0,00
Haloragis	2	33,33	2	100,00
Hebe	2	1,38	1	50,00
Heisteria	2	33,33	0	0,00
Helietta	2	7,41	0	0,00
Helogyne	2	0,08	1	50,00
Hemipogon	2	0,62	0	0,00
Heteropogon	2	0,13	0	0,00
Heterostachys	2	1,65	1	50,00
Hillia	2	0,70	0	0,00
Hirtella	2	33,33	0	0,00
Hoffmannia	2	0,70	1	50,00
Homolepis	2	0,13	0	0,00
Houssayanthus	2	2,11	0	0,00
Huidobria	2	2,99	2	100,00
*Humulus**	2	100,00	0	0,00
Hyalis	2	0,08	1	50,00
Hydrolea	2	100,00	0	0,00
Hygrophila	2	1,68	0	0,00
Hyparrhenia	2	0,13	0	0,00
Hypseocharis	2	1,57	0	0,00
Ibicella	2	50,00	1	50,00
Inulopsis	2	0,08	1	50,00
*Iris**	2	1,03	0	0,00
Ixora	2	0,70	0	0,00
Jacaratia	2	33,33	0	0,00
Kallstroemia	2	10,00	0	0,00
Kielmeyera	2	28,57	0	0,00
*Knautia**	2	40,00	0	0,00
Lafoensia	2	3,13	1	50,00
Lamanonia	2	22,22	0	0,00
Lastreopsis	2	2,41	0	0,00
Lavoisiera	2	0,99	0	0,00
Leiothrix	2	5,00	1	50,00
*Leonurus**	2	0,92	0	0,00
Lepidagathis	2	1,68	0	0,00
Leptostelma	2	0,08	0	0,00
Leymus	2	0,13	1	50,00
Ligeophila	2	0,20	0	0,00
*Ligustrum**	2	12,50	0	0,00
Limnocharis	2	33,33	0	0,00
Limonium	2	33,33	2	100,00
Lindernia	2	100,00	0	0,00
Liparis	2	0,20	0	0,00
Lipocarpha	2	0,43	0	0,00
Lockhartia	2	0,20	0	0,00
Lophophytum	2	40,00	0	0,00
Luma	2	0,66	2	100,00
Lundia	2	1,68	1	50,00
Lycurus	2	0,13	0	0,00
Lygodium	2	10,53	0	0,00
Lyroglossa	2	0,20	0	0,00
Madia	2	0,08	1	50,00
Maihuenia	2	0,50	2	100,00
Malacothrix	2	0,08	0	0,00
*Malus**	2	1,65	0	0,00
Mancoa	2	0,66	1	50,00
Mangonia	2	3,92	2	100,00
Maranta	2	20,00	1	50,00
Marattia	2	40,00	0	0,00
Margyricarpus	2	1,65	1	50,00
Marsypianthes	2	0,92	1	50,00
*Matricaria**	2	0,08	0	0,00
Mayaca	2	100,00	0	0,00
Megalachne	2	0,13	2	100,00
*Melinis**	2	0,13	0	0,00
Meliosma	2	100,00	0	0,00
Melosperma	2	1,38	2	100,00
Mendoncia	2	1,68	0	0,00
Mesechites	2	0,62	0	0,00
*Mesembryanthemum**	2	10,53	0	0,00
Micranthemum	2	1,38	2	100,00
Microchilus	2	0,20	0	0,00
Microchloa	2	0,13	0	0,00
Microgyne	2	0,08	2	100,00
Microstachys	2	0,46	0	0,00
Mionandra	2	1,77	1	50,00
Morella	2	100,00	0	0,00
Moritzia	2	0,97	2	100,00
Morus	2	6,90	0	0,00
Moscharia	2	0,08	2	100,00
Mourera	2	10,53	0	0,00
Moya	2	10,53	1	50,00
Myosurus	2	3,17	1	50,00
Myriophyllum	2	33,33	0	0,00
Napeanthus	2	4,76	1	50,00
*Nasturtium**	2	0,66	0	0,00
Neobouteloua	2	0,13	1	50,00
Neowerdermannia	2	0,50	1	50,00
Neptunia	2	0,15	0	0,00
Niphidium	2	3,64	0	0,00
Nitrophila	2	1,65	2	100,00
Nymphoides	2	100,00	0	0,00
Ochetophila	2	5,00	2	100,00
*Onopordum**	2	0,08	0	0,00
Onoseris	2	0,08	0	0,00
Oreomyrrhis	2	0,91	1	50,00
Ormosia	2	0,15	0	0,00
Ornithocephalus	2	0,20	1	50,00
Ortachne	2	0,13	1	50,00
Pabstia	2	0,20	0	0,00

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
Pachylaena	2	0,08	1	50,00
Paradisanthus	2	0,20	0	0,00
*Parapholis**	2	0,13	0	0,00
Parapiptadenia	2	0,15	0	0,00
*Parentucellia**	2	3,57	0	0,00
Parietaria	2	4,88	0	0,00
Parodianthus	2	0,78	2	100,00
Parthenium	2	0,08	0	0,00
Pedersenia	2	1,46	0	0,00
Peltastes	2	0,62	1	50,00
Peplonia	2	0,62	0	0,00
Peritassa	2	15,38	0	0,00
Petalostelma	2	0,62	1	50,00
Pharus	2	0,13	0	0,00
Phenax	2	4,88	0	0,00
Phleum	2	0,13	0	0,00
Picrosia	2	0,08	1	50,00
Pilocarpus	2	7,41	0	0,00
Pinguicula	2	8,33	2	100,00
Pityrogramma	2	1,64	0	0,00
Plazia	2	0,08	0	0,00
Plectrocarpa	2	10,00	2	100,00
Pleiochiton	2	0,99	0	0,00
Plinia	2	0,66	0	0,00
Plumbago	2	33,33	0	0,00
Podanthus	2	0,08	2	100,00
Poissonia	2	0,15	0	0,00
Polycarpaea	2	1,17	1	50,00
Polytaenium	2	25,00	0	0,00
Ponthieva	2	0,20	1	50,00
*Populus**	2	4,55	0	0,00
Porlieria	2	10,00	1	50,00
Pozoa	2	0,91	2	100,00
Pradosia	2	7,69	0	0,00
Prosopanche	2	100,00	1	50,00
Protium	2	66,67	1	50,00
Pseudolmedia	2	6,90	0	0,00
Psilocarphus	2	0,08	0	0,00
Psilochilus	2	0,20	0	0,00
Pterichis	2	0,20	0	0,00
Pterocarpus	2	0,15	0	0,00
Pteropepon	2	2,56	1	50,00
Ptilochaeta	2	1,77	0	0,00
Quesnelia	2	0,69	1	50,00
Quillaja	2	100,00	1	50,00
Racinaea	2	0,69	0	0,00
*Raphanus**	2	0,66	0	0,00
Raukaua	2	15,38	2	100,00
Relbunium	2	0,70	2	100,00
Rhabdadenia	2	0,62	0	0,00
Rhaphithamnus	2	0,78	1	50,00
Rhipidocladum	2	0,13	0	0,00
Rhombolytrum	2	0,13	2	100,00
Rodrigueziella	2	0,20	0	0,00
Rostraria	2	0,13	0	0,00
Rotala	2	3,013	0	0,00
Salacia	2	15,38	0	0,00
Salpiglossis	2	0,40	2	100,00
*Salsola**	2	1,65	0	0,00
Sambucus	2	66,67	0	0,00
Sanicula	2	0,91	0	0,00
Sauroglossum	2	0,20	1	50,00
Saxifraga	2	28,57	0	0,00
*Schedonorus**	2	0,13	0	0,00
Schefflera	2	15,38	0	0,00
*Schismus**	2	0,13	0	0,00
Schizaea	2	10,53	0	0,00
Schoepfia	2	33,33	0	0,00
Schubertia	2	0,62	0	0,00
Scutia	2	5,00	0	0,00
Sessea	2	0,40	1	50,00
Sibthorpia	2	1,38	0	0,00
Siegesbeckia	2	0,08	0	0,00
Simira	2	0,70	1	50,00
*Sinapis**	2	0,66	0	0,00
Solenomelus	2	1,03	2	100,00
Solidago	2	0,08	1	50,00
Sommerfeltia	2	0,08	2	100,00
Sorocea	2	6,90	0	0,00
*Sparaxis**	2	1,03	0	0,00
Spathicarpa	2	3,92	1	50,00
Sphagneticola	2	0,08	0	0,00
*Spiraea**	2	1,65	0	0,00
Spirotheca	2	16,67	0	0,00
Stangea	2	2,30	1	50,00
Staurogyne	2	1,68	1	50,00
Struthanthus	2	18,18	0	0,00
Stryphnodendron	2	0,15	0	0,00
Stuckertiella	2	0,08	1	50,00
Sweetia	2	0,15	0	0,00
Taccarum	2	3,92	0	0,00
Tachigali	2	0,15	0	0,00
Talisia	2	2,11	0	0,00
Tecophilaea	2	22,22	2	100,00
Telminostelma	2	0,62	1	50,00
Temnadenia	2	0,62	0	0,00
Ternstroemia	2	100,00	0	0,00
Tetrorchidium	2	0,46	0	0,00
Thalia	2	20,00	0	0,00
Thalictrum	2	3,17	0	0,00
Thevetia	2	0,61	0	0,00
Thrasyopsis	2	0,13	1	50,00
Thryallis	2	1,77	0	0,00
*Tithonia**	2	0,08	0	0,00
Tocoyena	2	0,70	0	0,00
Tontelea	2	15,38	0	0,00
*Torilis**	2	0,91	0	0,00
Trachypogon	2	0,13	0	0,00
Trembleya	2	0,99	0	0,00
Trianthema	2	10,53	1	50,00
Trichloris	2	0,13	0	0,00
Trichopetalum	2	100,00	2	100,00
Trigonia	2	100,00	0	0,00
Triplaris	2	2,13	0	0,00
Tripodanthus	2	18,18	1	50,00
Villanova	2	0,08	1	50,00

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
Voyria	2	3,51	0	0,00
Wettsteiniola	2	10,53	2	100,00
Wittrockia	2	0,69	0	0,00
Wolffia	2	18,18	0	0,00
Wolffiella	2	18,18	0	0,00
Ximenia	2	33,33	0	0,00
Xylophragma	2	1,68	0	0,00
*Yucca**	2	66,67	0	0,00
Zapoteca	2	0,15	0	0,00
Zephyra	2	22,22	1	50,00
Zexmenia	2	0,08	1	50,00
Zeyheria	2	1,68	0	0,00
Ziziphus	2	5,00	0	0,00
Zoellnerallium	2	1,23	2	100,00
Zollernia	2	0,15	0	0,00
Abildgaardia	1	0,21	0	0,00
Abobra	1	1,28	0	0,00
Abuta	1	6,67	0	0,00
Acanthostachys	1	0,34	0	0,00
Acaulimalva	1	0,26	0	0,00
Acca	1	0,33	1	100,00
Achetaria	1	0,69	0	0,00
Aciachne	1	0,07	0	0,00
Aciotis	1	0,49	0	0,00
Acnistus	1	0,20	0	0,00
Acronia	1	0,10	0	0,00
*Acroptilon**	1	0,04	0	0,00
Acrostichum	1	0,82	0	0,00
Actinocephalus	1	2,50	0	0,00
Actinoseris	1	0,04	0	0,00
Adelia	1	0,23	0	0,00
Adenaria	1	1,56	0	0,00
*Adenocarpus**	1	0,08	0	0,00
Adenocaulon	1	0,04	1	100,00
Adenopeltis	1	0,23	1	100,00
Aegopogon	1	0,07	0	0,00
*Aethionema**	1	0,33	0	0,00
Aextoxicon	1	100,00	1	100,00
*Agapanthus**	1	100,00	0	0,00
*Agave**	1	33,33	0	0,00
Ageratum	1	0,04	0	0,00
*Agropyron**	1	0,07	0	0,00
*Agrostemma**	1	0,58	0	0,00
*Ailanthus**	1	7,69	0	0,00
*Alcea**	1	0,26	0	0,00
Alibertia	1	0,35	0	0,00
Alicia	1	0,88	0	0,00
Allamanda	1	0,31	0	0,00
*Alliaria**	1	0,33	0	0,00
Allionia	1	2,94	0	0,00
Alseis	1	0,35	0	0,00
Alvaradoa	1	7,69	0	0,00
*Alyssum**	1	0,33	0	0,00
Amaioua	1	0,35	0	0,00
*Amaryllis**	1	0,83	0	0,00
Amasonia	1	0,39	0	0,00
Amblostoma	1	0,10	0	0,00
Amblyopappus	1	0,04	0	0,00
Amblyopetalum	1	0,31	1	100,00
Amburana	1	0,08	0	0,00
Ameghinoa	1	0,04	1	100,00
*Ammophila**	1	0,07	0	0,00
Ammoselinum	1	0,46	1	100,00
Amomyrtella	1	0,33	0	0,00
Amorimia	1	0,88	1	100,00
*Amorpha**	1	0,08	0	0,00
Amphipetalum	1	1,03	1	100,00
Amphiscirpus	1	0,21	0	0,00
Anacardium	1	2,00	0	0,00
Anaphalis	1	0,04	1	100,00
Anchietea	1	0,80	0	0,00
*Anchusa**	1	0,48	0	0,00
Andeimalva	1	0,26	1	100,00
Androsace	1	9,09	1	100,00
Androtrichum	1	0,21	0	0,00
*Anethum**	1	0,46	0	0,00
Anetium	1	12,50	0	0,00
Aniba	1	1,59	0	0,00
Anisacanthus	1	0,84	0	0,00
Anthaenantia	1	0,07	0	0,00
Anthochloa	1	0,07	0	0,00
Anthodon	1	7,69	0	0,00
Antidaphne	1	33,33	1	100,00
*Antigonon**	1	1,06	0	0,00
Antiphytum	1	0,48	0	0,00
Apalanthe	1	14,29	0	0,00
Aparisthmium	1	0,23	0	0,00
*Apera**	1	0,07	0	0,00
Apoclada	1	0,07	0	0,00
Apodasmia	1	100,00	1	100,00
*Aponogeton**	1	100,00	0	0,00
Apopyros	1	0,04	1	100,00
*Aptenia**	1	5,26	0	0,00
Apteria	1	11,11	0	0,00
Apuleia	1	0,08	0	0,00
Apurimacia	1	0,08	1	100,00
*Aquilegia**	1	1,59	0	0,00
*Arabidopsis**	1	0,33	0	0,00
*Arabis**	1	0,33	0	0,00
Arachniodes	1	1,20	0	0,00
Arachnitis	1	100,00	1	100,00
Araeoandra	1	14,29	1	100,00
*Arctium**	1	0,04	0	0,00
*Arctotheca**	1	0,04	0	0,00
*Arctotis**	1	0,04	0	0,00
*Argyranthemum**	1	0,04	0	0,00
Aristotelia	1	10,00	1	100,00
Armeria	1	16,67	1	100,00
*Arnica**	1	0,04	0	0,00
*Arrhenatherum**	1	0,07	0	0,00
Arthropteris	1	100,00	1	100,00
*Arum**	1	1,96	0	0,00
*Arundo**	1	0,07	0	0,00
Aschersoniodoxa	1	0,33	0	0,00
Ascolepis	1	0,21	0	0,00
Aspasia	1	0,10	0	0,00

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
*Asperugo**	1	0,48	0	0,00
*Asphodelus**	1	100,00	0	0,00
Astelia	1	100,00	1	100,00
Astephanus	1	0,31	1	100,00
Asteranthera	1	2,38	1	100,00
Asteropsis	1	0,04	1	100,00
Astrocaryum	1	2,44	0	0,00
Astrolepis	1	0,82	0	0,00
Ateleia	1	0,08	1	100,00
Athenaea	1	0,20	0	0,00
Athyana	1	1,05	0	0,00
Athyrium	1	1,20	0	0,00
Austrocedrus	1	25,00	1	100,00
Austropeucedanum	1	0,46	1	100,00
*Austrostipa**	1	0,07	0	0,00
Avellanita	1	0,23	1	100,00
Averrhoidium	1	1,05	1	100,00
Avicennia	1	100,00	0	0,00
Aylacophora	1	0,04	1	100,00
Bahia	1	0,04	1	100,00
Baillonia	1	0,39	0	0,00
Bakerolimon	1	16,67	1	100,00
Balfourodendron	1	3,70	0	0,00
*Ballota**	1	0,46	0	0,00
Balsamocarpon	1	0,08	1	100,00
Baltimora	1	0,04	0	0,00
Barbacenia	1	33,33	1	100,00
Barjonia	1	0,31	0	0,00
Barnadesia	1	0,04	0	0,00
Basistemon	1	0,69	0	0,00
Baskervilla	1	0,10	0	0,00
Bastardiopsis	1	0,26	0	0,00
Bathysa	1	0,35	0	0,00
Behuria	1	0,49	0	0,00
*Belamcanda**	1	0,51	0	0,00
*Bellis**	1	0,04	0	0,00
Beloglottis	1	0,10	0	0,00
Berberidopsis	1	100,00	1	100,00
Bergeronia	1	0,08	1	100,00
Berroa	1	0,04	0	0,00
Besleria	1	2,38	0	0,00
*Beta**	1	0,83	0	0,00
*Betula**	1	33,33	0	0,00
Bixa	1	100,00	0	0,00
*Blackstonia**	1	1,75	0	0,00
Blandowia	1	5,26	1	100,00
Blennosperma	1	0,04	1	100,00
Blossfeldia	1	0,25	0	0,00
Blutaparon	1	0,73	0	0,00
Bocconia	1	7,14	0	0,00
Boquila	1	50,00	1	100,00
*Borago**	1	0,48	0	0,00
Bordasia	1	0,26	1	100,00
Borojoa	1	0,35	0	0,00
Bouchea	1	0,39	0	0,00
Bouchetia	1	0,20	1	100,00
Bougueria	1	0,69	0	0,00
Bowdichia	1	0,08	0	0,00
Brachionidium	1	0,10	0	0,00
Brachyotum	1	0,49	0	0,00
Brassavola	1	0,10	0	0,00
*Breynia**	1	0,23	0	0,00
Bridgesia	1	1,05	1	100,00
Briquetia	1	0,26	0	0,00
*Broussonetia**	1	3,45	0	0,00
*Brugmansia**	1	0,20	0	0,00
*Brunsvigia**	1	0,83	0	0,00
Bryantiella	1	7,69	0	0,00
Buchenavia	1	6,67	0	0,00
Buchtienia	1	0,10	0	0,00
*Bupleurum**	1	0,46	0	0,00
Burkartia	1	0,04	1	100,00
Cabralea	1	4,55	0	0,00
Caesarea	1	14,29	1	100,00
*Cajanus**	1	0,08	0	0,00
*Cakile**	1	0,33	0	0,00
Caladium	1	1,96	0	0,00
Caldcluvia	1	11,11	1	100,00
Callaeum	1	0,88	0	0,00
Callianthemoides	1	1,59	1	100,00
Calopappus	1	0,04	1	100,00
Calophyllum	1	14,29	0	0,00
Calotheca	1	0,07	0	0,00
*Calotropis**	1	0,31	0	0,00
Calycophyllum	1	0,35	0	0,00
Calyculogygas	1	0,26	1	100,00
Calyptocarpus	1	0,04	0	0,00
Calyptraemalva	1	0,26	1	100,00
Camarea	1	0,88	0	0,00
Cambessedesia	1	0,49	0	0,00
Camissonia	1	1,05	0	0,00
*Campanula**	1	2,04	0	0,00
Campsidium	1	0,84	1	100,00
*Campsis**	1	0,84	0	0,00
Canastra	1	0,07	0	0,00
Capraria	1	14,29	0	0,00
*Capsella**	1	0,33	0	0,00
Capsicodendron	1	50,00	0	0,00
Cardenanthus	1	0,51	1	100,00
Cariniana	1	100,00	0	0,00
Carlowrightia	1	0,84	1	100,00
Carolus	1	0,88	0	0,00
Carpha	1	0,21	0	0,00
Caryocar	1	100,00	0	0,00
Cascaronia	1	0,08	0	0,00
Casimirella	1	100,00	1	100,00
Cassebeera	1	0,82	0	0,00
Castelnavia	1	5,26	0	0,00
*Catapodium**	1	0,07	0	0,00
*Catharanthus**	1	0,31	0	0,00
*Caucalis**	1	0,46	0	0,00
Centella	1	0,46	0	0,00
Centipeda	1	0,04	1	100,00
*Centunculus**	1	9,09	0	0,00
Cephalanthus	1	0,35	0	0,00
*Ceratocephalus**	1	1,59	0	0,00

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
Ceratopteris	1	100,00	0	0,00
*Ceterach**	1	1,64	0	0,00
Chaboissaea	1	0,07	0	0,00
Chaetostoma	1	0,49	0	0,00
*Chamaemelum**	1	0,04	0	0,00
Chasmanthe	1	0,51	0	0,00
Cheiloclinium	1	7,69	0	0,00
Cheiroglossa	1	7,69	0	0,00
*Chelidonium**	1	7,14	0	0,00
Chiococca	1	0,35	0	0,00
*Chondrilla**	1	0,04	0	0,00
*Chorispora**	1	0,33	0	0,00
Christianella	1	0,88	0	0,00
Chrysanthellum	1	0,04	0	0,00
*Chrysanthemoides**	1	0,04	0	0,00
*Chrysopogon**	1	0,07	0	0,00
Cicendia	1	1,75	0	0,00
*Cichorium**	1	0,04	0	0,00
Cinnamodendron	1	50,00	1	100,00
Cipura	1	0,51	0	0,00
Cissarobryon	1	14,29	1	100,00
*Citrus**	1	3,70	0	0,00
Cladium	1	0,21	0	0,00
Clavija	1	100,00	0	0,00
*Claytonia**	1	1,03	0	0,00
Clinanthus	1	0,83	0	0,00
Cliococca	1	5,88	0	0,00
*Cochlearia**	1	0,33	0	0,00
*Coix**	1	0,07	0	0,00
*Coleostephus**	1	0,04	0	0,00
Colignonia	1	2,94	0	0,00
*Colocasia**	1	1,96	0	0,00
Cologania	1	0,08	0	0,00
*Colutea**	1	0,08	0	0,00
Commiphora	1	33,33	0	0,00
Comparettia	1	0,10	0	0,00
Conchocarpus	1	3,70	0	0,00
Condylocarpon	1	0,31	0	0,00
*Conium**	1	0,46	0	0,00
Connarus	1	50,00	0	0,00
Copernicia	1	2,44	0	0,00
Cordobia	1	0,88	1	100,00
*Cordyline**	1	100,00	0	0,00
*Coriandrum**	1	0,46	0	0,00
Coriaria	1	100,00	1	100,00
*Coronilla**	1	0,08	0	0,00
Corryocactus	1	0,25	0	0,00
Corymborkis	1	0,10	0	0,00
*Cotoneaster**	1	0,83	0	0,00
Cottea	1	0,07	0	0,00
Coussapoa	1	25,00	0	0,00
Coutarea	1	0,35	0	0,00
*Crataegus**	1	0,83	0	0,00
Crateva	1	4,00	0	0,00
Cratylia	1	0,08	0	0,00
Crinum	1	0,83	0	0,00
Criscia	1	0,04	0	0,00
Crocanthemum	1	100,00	1	100,00
*Crocosmia**	1	0,51	0	0,00
Cryptogramma	1	0,82	1	100,00
Cuatrecasasiella	1	0,04	0	0,00
Cucurbitella	1	1,28	0	0,00
Cuminia	1	0,46	1	100,00
Curatella	1	9,09	0	0,00
Cybianthus	1	5,56	0	0,00
Cybistax	1	0,84	0	0,00
Cyclodium	1	1,20	0	0,00
Cyclolepis	1	0,04	1	100,00
Cyclolobium	1	0,08	0	0,00
*Cycloloma**	1	0,83	0	0,00
*Cylindropuntia**	1	0,25	0	0,00
*Cymbalaria**	1	0,69	0	0,00
Cymbocarpa	1	11,11	0	0,00
*Cymbopogon**	1	0,07	0	0,00
*Cynara**	1	0,04	0	0,00
Cynometra	1	0,08	0	0,00
*Cypselea**	1	5,26	0	0,00
*Cyrtomium**	1	1,20	0	0,00
Dactylaena	1	4,00	0	0,00
*Dactylis**	1	0,07	0	0,00
*Dactyloctenium**	1	0,07	0	0,00
*Dahlia**	1	0,04	0	0,00
Dahlstedtia	1	0,08	0	0,00
Delilia	1	0,04	0	0,00
Delpinophytum	1	0,33	1	100,00
Denmoza	1	0,25	1	100,00
Deppea	1	0,35	0	0,00
Desfontainia	1	100,00	1	100,00
Desmaria	1	9,09	1	100,00
Desmoscelis	1	0,49	0	0,00
Diatenopteryx	1	1,05	0	0,00
Dictyophragmus	1	0,33	1	100,00
Dictyophyllaria	1	0,10	1	100,00
Dictyostega	1	11,11	0	0,00
Didymochlaena	1	1,20	0	0,00
Dieffenbachia	1	1,96	0	0,00
Dielsiochloa	1	0,07	0	0,00
*Digitalis**	1	0,69	0	0,00
Dilodendron	1	1,05	0	0,00
Dimerostemma	1	0,04	1	100,00
Dimorphandra	1	0,08	0	0,00
Dinemagonum	1	0,88	1	100,00
Dinemandra	1	0,88	1	100,00
Dinoseris	1	0,04	0	0,00
Diostea	1	0,39	0	0,00
Diplokeleba	1	1,05	0	0,00
Diploön	1	3,85	0	0,00
*Dipogon**	1	0,08	0	0,00
Dipteryx	1	0,08	0	0,00
Diptychandra	1	0,08	0	0,00
Dipyrena	1	0,39	1	100,00
Dirhamphis	1	0,26	0	0,00
Discocactus	1	0,25	0	0,00
Dodonaea	1	1,05	0	0,00
Dolichlasium	1	0,04	1	100,00
Donatia	1	100,00	1	100,00

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género	Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
Downingia	1	2,04	0	0,00	*Gallardoa*	1	0,88	1	100,00
Dracontium	1	1,96	0	0,00	*Gallesia*	1	3,85	0	0,00
Drapetes	1	12,50	1	100,00	*Gamochaetopsis*	1	0,04	1	100,00
*Duchesnea**	1	0,83	0	0,00	*Garaya*	1	0,10	0	0,00
Duseniella	1	0,04	1	100,00	*Garcinia*	1	14,29	0	0,00
*Dyssodia**	1	0,04	0	0,00	*Gastridium**	1	0,07	0	0,00
Ecclinusa	1	3,85	0	0,00	*Gaudinia**	1	0,07	0	0,00
Eccremocarpus	1	0,84	0	0,00	*Gazania**	1	0,04	0	0,00
Echeveria	1	5,88	0	0,00	*Genipa*	1	0,35	0	0,00
Echinolaena	1	0,07	0	0,00	*Gentiana**	1	1,75	0	0,00
Edmundoa	1	0,34	1	100,00	*Geoblasta*	1	0,10	1	100,00
Egletes	1	0,04	0	0,00	*Geochorda*	1	0,69	1	100,00
Ehretia	1	0,48	0	0,00	*Gevuina*	1	7,14	1	100,00
*Ehrharta**	1	0,07	0	0,00	*Gibasis*	1	3,85	0	0,00
Eithea	1	0,83	1	100,00	*Glechoma**	1	0,46	0	0,00
*Elaeagnus**	1	100,00	0	0,00	*Gleichenella*	1	6,67	0	0,00
Elytraria	1	0,84	0	0,00	*Glycyrrhiza*	1	0,08	1	100,00
Elytropus	1	0,31	1	100,00	*Gomortega*	1	100,00	1	100,00
Embothrium	1	7,14	1	100,00	*Gomphocarpus**	1	0,31	0	0,00
*Emex**	1	1,06	0	0,00	*Gordonia*	1	100,00	0	0,00
*Emilia**	1	0,04	0	0,00	*Gossypium**	1	0,26	0	0,00
Emmeorrhiza	1	0,35	0	0,00	*Govenia*	1	0,10	0	0,00
Empetrum	1	100,00	0	0,00	*Grahamia*	1	1,03	1	100,00
Encelia	1	0,04	0	0,00	*Gratiola*	1	0,69	0	0,00
Endlicheria	1	1,59	0	0,00	*Grevillea**	1	7,14	0	0,00
Enneapogon	1	0,07	0	0,00	*Guapurium*	1	0,33	0	0,00
Epiphyllum	1	0,25	0	0,00	*Guazuma*	1	1,45	0	0,00
Eremocharis	1	0,46	1	100,00	*Guibourtia*	1	0,08	0	0,00
Eremodraba	1	0,33	0	0,00	*Guynesomia*	1	0,04	1	100,00
Eriachaenium	1	0,04	1	100,00	*Gymnachne*	1	0,07	1	100,00
Erianthecium	1	0,07	1	100,00	*Gymnocoronis*	1	0,04	0	0,00
*Eriogonum**	1	1,06	0	0,00	*Gymnosiphon*	1	11,11	0	0,00
Eriopsis	1	0,10	1	100,00	*Gynerium*	1	0,07	0	0,00
Eriosorus	1	0,82	0	0,00	*Gynoxys*	1	0,04	1	100,00
Eriotheca	1	8,33	0	0,00	*Gynura**	1	0,04	0	0,00
Errazurizia	1	0,08	1	100,00	*Gypothamnium*	1	0,04	1	100,00
*Eruca**	1	0,33	0	0,00	*Gyrostelma*	1	0,31	1	100,00
Erythrodes	1	0,10	0	0,00	*Hackelia*	1	0,48	0	0,00
*Eschscholzia**	1	7,14	0	0,00	*Hainardia**	1	0,07	0	0,00
Escobedia	1	1,79	0	0,00	*Halenia*	1	1,75	0	0,00
Eubrachion	1	33,33	0	0,00	*Halodule*	1	100,00	0	0,00
Euglypha	1	2,78	0	0,00	*Halophytum*	1	100,00	1	100,00
Eulophia	1	0,10	0	0,00	*Halosicyos*	1	1,28	1	100,00
Euterpe	1	2,44	0	0,00	*Hamelia*	1	0,35	0	0,00
Exostyles	1	0,08	1	100,00	*Hancornia*	1	0,31	0	0,00
Fagonia	1	5,00	0	0,00	*Haplorhus*	1	2,00	0	0,00
Fascicularia	1	0,34	1	100,00	*Hecistopteris*	1	12,50	0	0,00
Ficinia	1	0,21	0	0,00	*Hedera**	1	7,69	0	0,00
Fischeria	1	0,31	0	0,00	*Hedychium**	1	100,00	0	0,00
Fitzroya	1	25,00	1	100,00	*Hedyosmum*	1	100,00	0	0,00
Floscopa	1	3,85	0	0,00	*Hedypnois**	1	0,04	0	0,00
*Foeniculum**	1	0,46	0	0,00	*Heladena*	1	0,88	0	0,00
Fonkia	1	0,69	1	100,00	*Helia*	1	1,75	0	0,00
Francoa	1	50,00	1	100,00	*Heliacme*	1	20,00	0	0,00
Gaimardia	1	100,00	1	100,00	*Heliocarpus*	1	6,67	0	0,00
*Galega**	1	0,08	0	0,00	*Helosis*	1	20,00	0	0,00
*Galenia**	1	5,26	0	0,00	*Hemarthria**	1	0,07	0	0,00
*Galeopsis**	1	0,46	0	0,00	*Hemidictyum*	1	1,20	0	0,00

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
Hemionitis	1	0,82	0	0,00
Hennecartia	1	4,76	0	0,00
*Heracleum**	1	0,46	0	0,00
Herbstia	1	0,73	0	0,00
*Hesperis**	1	0,33	0	0,00
Heterophyllaea	1	0,35	0	0,00
Heteropsis	1	1,96	0	0,00
Heterothalamulopsis	1	0,04	1	100,00
*Heterotheca**	1	0,04	0	0,00
Heterotristicha	1	5,26	1	100,00
*Heterozostera**	1	100,00	0	0,00
Hevea	1	0,23	0	0,00
Hieronyma	1	3,85	0	0,00
Hilleria	1	3,85	0	0,00
Hindsia	1	0,35	1	100,00
*Hippobroma**	1	2,04	0	0,00
Hippocratea	1	7,69	0	0,00
Hippuris	1	100,00	0	0,00
*Hirschfeldia**	1	0,33	0	0,00
Histiopteris	1	4,00	0	0,00
Hochreutinera	1	0,26	1	100,00
Hoehneella	1	0,10	1	100,00
Hohenbergia	1	0,34	0	0,00
*Holcus**	1	0,07	0	0,00
Hollermayera	1	0,33	1	100,00
Holmbergia	1	0,83	0	0,00
Holocalyx	1	0,08	0	0,00
*Holosteum**	1	0,58	0	0,00
*Hornungia**	1	0,33	0	0,00
Houlletia	1	0,10	0	0,00
*Hovenia**	1	2,50	0	0,00
Huarpea	1	0,04	1	100,00
Huberia	1	0,49	0	0,00
Huntleya	1	0,10	0	0,00
*Hydnocarpus**	1	100,00	0	0,00
Hydrangea	1	100,00	1	100,00
Hymenoglossum	1	1,52	1	100,00
Hymenostephium	1	0,04	0	0,00
Hypenia	1	0,46	0	0,00
*Hypoestes**	1	0,84	0	0,00
Hypolytrum	1	0,21	0	0,00
Ianthopappus	1	0,04	1	100,00
*Iberis**	1	0,33	0	0,00
Ichthyothere	1	0,04	0	0,00
Iochroma	1	0,20	0	0,00
Ionopsis	1	0,10	0	0,00
Ipomopsis	1	7,69	0	0,00
Iresine	1	0,73	0	0,00
*Irlbachia**	1	1,75	0	0,00
Isanitella	1	0,10	1	100,00
*Isatis**	1	0,33	0	0,00
Ischaemum	1	0,07	0	0,00
Iseia	1	0,56	0	0,00
Isochilus	1	0,10	0	0,00
Ivania	1	0,33	1	100,00
Ixorhea	1	0,48	1	100,00
Jacquiniella	1	0,10	0	0,00
Jaegeria	1	0,04	0	0,00
Jaumea	1	0,04	0	0,00
Jodina	1	4,00	0	0,00
Juania	1	2,44	1	100,00
Jubaea	1	2,44	1	100,00
Juglans	1	100,00	0	0,00
*Juniperus**	1	25,00	0	0,00
*Kalanchoe**	1	5,88	0	0,00
Kentrothamnus	1	2,50	0	0,00
*Kickxia**	1	0,69	0	0,00
Koellikeria	1	2,38	0	0,00
Koenigia	1	1,06	0	0,00
Kurzamra	1	0,46	1	100,00
*Lablab**	1	0,08	0	0,00
*Laburnum**	1	0,08	0	0,00
*Lachnagrostis**	1	0,07	0	0,00
Lactoris	1	100,00	1	100,00
Laetia	1	2,27	0	0,00
Lagascea	1	0,04	0	0,00
*Lagenaria**	1	1,28	0	0,00
Laguncularia	1	6,67	0	0,00
*Lagurus**	1	0,07	0	0,00
*Lamarckia**	1	0,07	0	0,00
Lamprothyrsus	1	0,07	0	0,00
*Landoltia**	1	9,09	0	0,00
Langsdorffia	1	20,00	0	0,00
Lanium	1	0,10	0	0,00
Lapageria	1	50,00	1	100,00
Laportea	1	2,44	0	0,00
Lappula	1	0,48	0	0,00
*Lapsana**	1	0,04	0	0,00
Lardizabala	1	50,00	1	10
Laretia	1	0,46	1	100,00
Lastarriaea	1	1,06	1	100,00
Lasthenia	1	0,04	1	100,00
Latua	1	0,20	1	100,00
Laurelia	1	4,76	1	100,00
Laureliopsis	1	4,76	1	100,00
Laurembergia	1	16,67	0	0,00
Lebetanthus	1	100,00	1	100,00
Legenere	1	2,04	0	0,00
Legrandia	1	0,33	1	100,00
Lenzia	1	1,03	1	100,00
*Leonotis**	1	0,46	0	0,00
Leontochir	1	1,92	1	100,00
Lepanthopsis	1	0,10	0	0,00
Lepidaploa	1	0,04	0	0,00
Lepidoceras	1	33,33	1	100,00
Lepidophyllum	1	0,04	1	100,00
Lepidothamnus	1	12,50	1	100,00
Leptinella	1	0,04	1	100,00
Leptocarpha	1	0,04	1	100,00
Leptoglossis	1	0,20	1	100,00
Leptophyllochloa	1	0,07	1	100,00
Leptosiphon	1	7,69	1	100,00
Leptostigma	1	0,35	1	100,00
Lepuropetalon	1	100,00	0	0,00
*Leucaena**	1	0,08	0	0,00
*Leucanthemum**	1	0,04	0	0,00

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género	Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
Leucochloron	1	0,08	0	0,00	*Margyracaena*	1	0,83	1	100,00
Leunisia	1	0,04	1	100,00	*Marrubium**	1	0,46	0	0,00
*Levisticum**	1	0,46	0	0,00	*Marticorenia*	1	0,04	1	100,00
Liabum	1	0,04	0	0,00	*Masdevallia*	1	0,10	0	0,00
Licania	1	16,67	0	0,00	*Matthiola**	1	0,33	0	0,00
Licaria	1	1,59	0	0,00	*Mauria*	1	2,00	0	0,00
Ligaria	1	9,09	0	0,00	*Mazus**	1	12,50	0	0,00
Lilaea	1	20,00	0	0,00	*Megathyrsus**	1	0,07	0	0,00
Limnobium	1	14,29	0	0,00	*Melananthus*	1	0,20	1	100,00
Limosella	1	0,69	0	0,00	*Melancium*	1	1,28	0	0,00
Lithachne	1	0,07	0	0,00	*Melanthera*	1	0,04	0	0,00
Lithodraba	1	0,33	1	100,00	*Melia**	1	4,55	0	0,00
*Lithospermum**	1	0,48	0	0,00	*Melicoccus*	1	1,05	0	0,00
Littorella	1	0,69	1	100,00	*Melissa**	1	0,46	0	0,00
Llagunoa	1	1,05	1	100,00	*Mercurialis**	1	0,23	0	0,00
*Lobularia**	1	0,33	0	0,00	*Mesadenella*	1	0,10	0	0,00
Loefgrenianthus	1	0,10	0	0,00	*Metharme*	1	5,00	1	100,00
*Logfia**	1	0,04	0	0,00	*Metrodorea*	1	3,70	0	0,00
Lomagramma	1	1,85	0	0,00	*Microlaelia*	1	0,10	0	0,00
Lomariopsis	1	1,85	0	0,00	*Microlepia*	1	4,00	0	0,00
*Lonicera**	1	50,00	0	0,00	*Microlicia*	1	0,49	0	0,00
Lophocarpinia	1	0,08	1	100,00	*Microlobius*	1	0,08	0	0,00
Lophosoria	1	20,00	1	100,00	*Micropolypodium*	1	4,17	0	0,00
Loudetia	1	0,07	0	0,00	*Microseris**	1	0,04	0	0,00
Loudetiopsis	1	0,07	0	0,00	*Microsteris*	1	7,69	0	0,00
Loxopterygium	1	2,00	0	0,00	*Miersiella*	1	11,11	0	0,00
Luetzelburgia	1	0,08	0	0,00	*Mimozyganthus*	1	0,08	0	0,00
*Luffa**	1	1,28	0	0,00	*Minaria*	1	0,31	0	0,00
Lulia	1	0,04	0	0,00	*Minthostachys*	1	0,46	0	0,00
*Lunaria**	1	0,33	0	0,00	*Minuartia*	1	0,58	1	100,00
Lycapsus	1	0,04	1	100,00	*Miscanthus**	1	0,07	0	0,00
*Lychnis**	1	0,58	0	0,00	*Mitraria*	1	2,38	1	100,00
*Lycopsis**	1	0,48	0	0,00	*Mniodes*	1	0,04	0	0,00
*Lycopus**	1	0,46	0	0,00	*Modiola*	1	0,26	0	0,00
Lysimachia	1	9,09	1	100,00	*Molineria**	1	20,00	0	0,00
Lytocaryum	1	2,44	0	0,00	*Mollugo*	1	33,33	0	0,00
Mabea	1	0,23	0	0,00	*Molucella**	1	0,46	0	0,00
Macairea	1	0,49	0	0,00	*Momordica*	1	1,28	0	0,00
Maclura	1	3,45	0	0,00	*Monanthochloe*	1	0,07	1	100,00
Macrachaenium	1	0,04	1	100,00	*Monolepis**	1	0,83	0	0,00
Macradenia	1	0,10	0	0,00	*Monstera*	1	1,96	0	0,00
Macrocarpaea	1	1,75	0	0,00	*Montanoa**	1	0,04	0	0,00
Macroditassa	1	0,31	0	0,00	*Montia*	1	1,03	0	0,00
Macropharynx	1	0,31	1	100,00	*Moorochloa**	1	0,07	0	0,00
Macrothelypteris	1	1,69	0	0,00	*Mosiera*	1	0,33	1	100,00
Magonia	1	1,05	0	0,00	*Mouriri*	1	0,49	0	0,00
*Maireana**	1	0,83	0	0,00	*Mucuna*	1	0,08	0	0,00
Malachra	1	0,26	0	0,00	*Munnozia*	1	0,04	0	0,00
Malanea	1	0,35	0	0,00	*Muntingia*	1	100,00	0	0,00
*Malcolmia**	1	0,33	0	0,00	*Myoporum**	1	100,00	0	0,00
Malvella	1	0,26	0	0,00	*Myoschilos*	1	4,00	1	100,00
*Mangifera**	1	2,00	0	0,00	*Myoxanthus*	1	0,10	0	0,00
Manilkara	1	3,85	0	0,00	*Myriocarpa*	1	2,44	0	0,00
Mansoa	1	0,84	0	0,00	*Myrocarpus*	1	0,08	0	0,00
Maprounea	1	0,23	0	0,00	*Myroxylon*	1	0,08	0	0,00
Marathrum	1	5,26	1	100,00	*Myrrhinium*	1	0,33	0	0,00
Marcgravia	1	50,00	0	0,00	*Myrteola*	1	0,33	0	0,00
Margaritaria	1	3,85	0	0,00	*Nanodea*	1	4,00	1	100,00

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
Nasa	1	1,49	0	0,00
Nautonia	1	0,31	0	0,00
Navarretia	1	7,69	0	0,00
Neobaclea	1	0,26	1	100,00
*Neonotonia**	1	0,08	0	0,00
*Nepeta**	1	0,46	0	0,00
Nertera	1	0,35	0	0,00
*Neslia**	1	0,33	0	0,00
Nesocaryum	1	0,48	1	100,00
Nicandra	1	0,20	0	0,00
Nissolia	1	0,08	0	0,00
Noccaea	1	0,33	1	100,00
Noisettia	1	0,80	0	0,00
Notanthera	1	9,09	1	100,00
Notholaena	1	0,82	0	0,00
Notiosciadium	1	0,46	1	100,00
Novenia	1	0,04	0	0,00
*Odontonema**	1	0,84	0	0,00
Oeceoclades	1	0,10	0	0,00
*Oenanthe**	1	0,46	0	0,00
Olfersia	1	1,20	0	0,00
Oligocladus	1	0,46	1	100,00
Ombrophytum	1	20,00	0	0,00
*Omphalodes**	1	0,48	0	0,00
*Ononis**	1	0,08	0	0,00
Operculina	1	0,56	0	0,00
Oplismenopsis	1	0,07	1	100,00
Oplismenus	1	0,07	0	0,00
Oplonia	1	0,84	0	0,00
Oreobolus	1	0,21	1	100,00
Oreopolus	1	0,35	1	100,00
Orites	1	7,14	1	100,00
Ornithophora	1	0,10	0	0,00
Orthoclada	1	0,07	0	0,00
Orthopappus	1	0,04	0	0,00
Orthrosanthus	1	0,51	0	0,00
Otachyrium	1	0,07	0	0,00
Ottelia	1	14,29	0	0,00
Ovidia	1	12,50	1	100,00
Oxycaryum	1	0,21	0	0,00
Oxyphyllum	1	0,04	1	100,00
Oxytheca	1	1,06	0	0,00
Pachyrhizus	1	0,08	0	0,00
Pachystroma	1	0,23	0	0,00
Pacourina	1	0,04	0	0,00
Paederia	1	0,35	0	0,00
Paesia	1	4,00	0	0,00
Paleaepappus	1	0,04	1	100,00
Pantacantha	1	0,20	1	100,00
Paranephelius	1	0,04	0	0,00
Parinari	1	16,67	0	0,00
Parkinsonia	1	0,08	0	0,00
Parodiodendron	1	100,00	0	0,00
Parodiodoxa	1	0,33	1	100,00
Parodiolyra	1	0,07	0	0,00
Pasithea	1	100,00	0	0,00
Paspalidium	1	0,07	0	0,00
*Pastinaca**	1	0,46	0	0,00
Patosia	1	1,64	0	0,00
Pausandra	1	0,23	0	0,00
Pelletiera	1	9,09	0	0,00
Peltophorum	1	0,08	1	100,00
Peltophyllum	1	50,00	0	0,00
Peregrina	1	0,88	1	100,00
Periandra	1	0,08	0	0,00
Perianthomega	1	0,84	0	0,00
Perityle	1	0,04	0	0,00
Pernettya	1	3,03	0	0,00
Petiveria	1	3,85	0	0,00
Petrea	1	0,39	0	0,00
Petroravenia	1	0,33	1	100,00
*Petroselinum**	1	0,46	0	0,00
Peumus	1	4,76	1	100,00
Pfeiffera	1	0,25	0	0,00
Philesia	1	50,00	1	100,00
Philippiella	1	0,58	1	100,00
Philyra	1	0,23	0	0,00
Phippsia	1	0,07	1	100,00
Phlebolobium	1	0,33	1	100,00
Phloeophila	1	0,10	1	100,00
*Phoenix**	1	2,44	0	0,00
Phragmites	1	0,07	0	0,00
Phrodus	1	0,20	1	100,00
Phyllachne	1	100,00	1	100,00
*Phyllitis**	1	1,61	0	0,00
Phyllostylon	1	100,00	0	0,00
Picrasma	1	7,69	0	0,00
*Picris**	1	0,04	0	0,00
Pilgerodendron	1	25,00	1	100,00
Pilosocereus	1	0,25	0	0,00
Pilularia	1	20,00	0	0,00
Pimenta	1	0,33	0	0,00
*Pimpinella**	1	0,46	0	0,00
Pintoa	1	5,00	1	100,00
Piptadeniopsis	1	0,08	1	100,00
Piptatherum	1	0,07	0	0,00
Pisoniella	1	2,94	0	0,00
Pistia	1	1,96	0	0,00
Pitavia	1	3,70	1	100,00
Pitraea	1	0,39	0	0,00
Plagiocheilus	1	0,04	0	0,00
Plathymenia	1	0,08	0	0,00
Platymiscium	1	0,08	0	0,00
Platypodium	1	0,08	0	0,00
Platyrhiza	1	0,10	0	0,00
Platystele	1	0,10	1	100,00
Pleocarphus	1	0,04	1	100,00
Pleurosorus	1	1,61	1	100,00
*Plumeria**	1	0,31	0	0,00
Podagrostis	1	0,07	1	100,00
Podophorus	1	0,07	1	100,00
*Podranea**	1	0,84	0	0,00
Poecilanthe	1	0,08	1	100,00
Pogoniopsis	1	0,10	0	0,00
Pogonopus	1	0,35	0	0,00
Poikilacanthus	1	0,84	0	0,00

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género	Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
Polemonium	1	7,69	0	0,00	*Rhytachne**	1	0,07	0	0,00
Polypodium	1	1,82	0	0,00	*Richeria*	1	3,85	0	0,00
*Poncirus**	1	3,70	0	0,00	*Ricinus**	1	0,23	0	0,00
Ponera	1	0,10	0	0,00	*Riedeliella*	1	0,08	0	0,00
Posoqueria	1	0,35	0	0,00	*Rivina*	1	3,85	0	0,00
Pourouma	1	25,00	0	0,00	*Robinia**	1	0,08	0	0,00
Priogymnanthus	1	6,25	0	0,00	*Rodrigueziopsis*	1	0,10	1	100,00
Pristimera	1	7,69	0	0,00	*Rojasia*	1	0,31	0	0,00
Priva	1	0,39	0	0,00	*Romanoa*	1	0,23	0	0,00
Prockia	1	2,27	0	0,00	*Rosenbergiodendron*	1	0,35	0	0,00
Proserpinaca	1	16,67	0	0,00	*Rostkovia*	1	1,64	0	0,00
Prumnopitys	1	12,50	1	100,00	*Rottboellia**	1	0,07	0	0,00
*Prunella**	1	0,46	0	0,00	*Rourea*	1	50,00	0	0,00
Pseudananas	1	0,34	0	0,00	*Rubia**	1	0,35	0	0,00
Pseudechinolaena	1	0,07	0	0,00	*Rudolfiella*	1	0,10	1	100,00
Pseudelephantopus	1	0,04	0	0,00	*Ruta**	1	3,70	0	0,00
Pseuderanthemum	1	0,84	0	0,00	*Sabicea*	1	0,35	0	0,00
Pseudocyclanthera	1	1,28	0	0,00	*Sacciolepis*	1	0,07	0	0,00
Pseudogynoxys	1	0,04	0	0,00	*Sageretia*	1	2,50	0	0,00
Pseudopiptadenia	1	0,08	0	0,00	*Salmea*	1	0,04	0	0,00
Pseudoplantago	1	0,73	1	100,00	*Salpichlaena*	1	2,86	0	0,00
Pseudostelis	1	0,10	0	0,00	*Salpinga*	1	0,49	0	0,00
*Pseudotsuga**	1	25,00	0	0,00	*Samanea*	1	0,08	0	0,00
Psiguria	1	1,28	0	0,00	*Sanguisorba**	1	0,83	0	0,00
Psilotum	1	100,00	0	0,00	*Sanvitalia*	1	0,04	0	0,00
Psittacanthus	1	9,09	0	0,00	*Sapindus*	1	1,05	0	0,00
*Psoralea**	1	0,08	0	0,00	*Saponaria**	1	0,58	0	0,00
Psygmorchis	1	0,10	0	0,00	*Saranthe*	1	10,00	0	0,00
Pteridium	1	4,00	0	0,00	*Sarcorhachis*	1	0,69	1	100,00
Pteroglossaspis	1	0,10	0	0,00	*Sarmienta*	1	2,38	1	100,00
Pterogyne	1	0,08	0	0,00	*Sarracenella*	1	0,10	1	100,00
Pterygiosperma	1	0,33	1	100,00	*Savia*	1	3,85	0	0,00
Pycnophyllopsis	1	0,58	1	100,00	*Saxegothaea*	1	12,50	1	100,00
*Pyracantha**	1	0,83	0	0,00	*Saxifragella*	1	14,29	1	100,00
*Pyrolirion**	1	0,83	0	0,00	*Saxifragodes*	1	14,29	1	100,00
Pyrostegia	1	0,84	0	0,00	*Scabiosa**	1	20,00	0	0,00
Quaternella	1	0,73	1	100,00	*Scaevola*	1	50,00	0	0,00
Quiabentia	1	0,25	0	0,00	*Scandix**	1	0,46	0	0,00
Quiina	1	100,00	0	0,00	*Schaefferia*	1	5,26	1	100,00
Radiovittaria	1	12,50	0	0,00	*Schaueria*	1	0,84	0	0,00
Ramorinoa	1	0,08	1	100,00	*Schedonnardus*	1	0,07	0	0,00
*Rapistrum**	1	0,33	0	0,00	*Schickendantziella*	1	0,61	1	100,00
*Ratibida**	1	0,04	0	0,00	*Schidorrhynchos*	1	0,10	0	0,00
Raulinoa	1	3,70	1	100,00	*Schindleria*	1	3,85	0	0,00
Regnellidium	1	20,00	1	100,00	*Schistocarpha*	1	0,04	0	0,00
Reicheella	1	0,58	1	100,00	*Schizeilema*	1	0,46	1	100,00
Reichenbachia	1	2,94	0	0,00	*Schizolobium*	1	0,08	0	0,00
Reimarochloa	1	0,07	0	0,00	*Schlechtendalia*	1	0,04	0	0,00
Reitzia	1	0,07	0	0,00	*Schlegelia*	1	100,00	1	100,00
Relchela	1	0,07	1	100,00	*Schreiteria*	1	1,03	1	100,00
Remirea	1	0,21	0	0,00	*Schwartzia*	1	50,00	0	0,00
Rheedia	1	14,29	0	0,00	*Schwendenera*	1	0,35	0	0,00
Rhizophora	1	100,00	0	0,00	*Sciaphila*	1	50,00	0	0,00
Rhodocalyx	1	0,31	0	0,00	*Scleranthus**	1	0,58	0	0,00
Rhodostemonodaphne	1	1,59	0	0,00	*Sclerochloa**	1	0,07	0	0,00
Rhynchoryza	1	0,07	0	0,00	*Scleropogon*	1	0,07	0	0,00
Rhynchosida	1	0,26	0	0,00	*Scolymus**	1	0,04	0	0,00
Rhyssostelma	1	0,31	1	100,00	*Scorzonera**	1	0,04	0	0,00

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
*Scrophularia**	1	14,29	0	0,00
Scuticaria	1	0,10	1	100,00
Scyphanthus	1	1,49	1	100,00
Secondatia	1	0,31	0	0,00
Selenicereus	1	0,25	0	0,00
Selkirkia	1	0,48	1	1,00
Selliera	1	50,00	0	0,00
Semialarium	1	7,69	0	0,00
Serpyllopsis	1	1,52	1	100,00
*Seseli**	1	0,46	0	0,00
*Sesuvium**	1	5,26	0	0,00
Setiechinopsis	1	0,25	1	100,00
*Sherardia**	1	0,35	0	0,00
Sicydium	1	1,28	0	0,00
Sideroxylon	1	3,85	0	0,00
*Silybum**	1	0,04	0	0,00
Simsia	1	0,04	0	0,00
Siolmatra	1	1,28	0	0,00
Sipanea	1	0,35	0	0,00
Siparuna	1	100,00	0	0,00
*Sium**	1	0,46	0	0,00
Skytanthus	1	0,31	1	100,00
*Soleirolia**	1	2,44	0	0,00
*Sorbus**	1	0,83	0	0,00
*Sorghum**	1	0,07	0	0,00
Sparattosperma	1	0,84	0	0,00
*Spartium**	1	0,08	0	0,00
Spathantheum	1	1,96	0	0,00
Speea	1	0,61	1	100,00
Spermolepis	1	0,46	1	100,00
*Sphaerophysa**	1	0,08	0	0,00
Sphaeropteris	1	6,67	0	0,00
Sphenoclea	1	100,00	0	0,00
Sphinctanthus	1	0,35	0	0,00
Sphingiphila	1	0,84	0	0,00
Spirodela	1	9,09	0	0,00
Stachycephalum	1	0,04	1	100,00
Stenodrepanum	1	0,08	1	100,00
Stenotaphrum	1	0,07	0	0,00
Sterculia	1	1,45	0	0,00
Stetsonia	1	0,25	0	0,00
Stilpnopappus	1	0,04	0	0,00
Stizophyllum	1	0,84	0	0,00
Streblacanthus	1	0,84	0	0,00
Streptochaeta	1	0,07	0	0,00
Streptostachys	1	0,07	0	0,00
*Strigosella**	1	0,33	0	0,00
Stromanthe	1	20,00	0	0,00
*Struchium**	1	0,04	0	0,00
Suksdorfia	1	14,29	0	0,00
Swartzia	1	0,08	1	100,00
*Symphoricarpos**	1	50,00	0	0,00
*Symphytum**	1	0,48	0	0,00
Synandrospadix	1	1,96	0	0,00
Synanthes	1	0,10	0	0,00
Synedrella	1	0,04	0	0,00
Synedrellopsis	1	0,04	0	0,00
*Syringa**	1	6,25	0	0,00

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
Tabernaemontana	1	0,31	0	0,00
*Taeniatherum**	1	0,07	0	0,00
Taliparíti	1	0,26	0	0,00
*Tamarix**	1	100,00	0	0,00
Tamonea	1	0,39	0	0,00
Tapeinia	1	0,51	1	100,00
Tapirira	1	2,00	0	0,00
Tartagalia	1	8,33	0	0,00
*Teesdalia**	1	0,33	0	0,00
Tepualia	1	0,33	1	100,00
Tetilla	1	50,00	1	100,00
Tetrachondra	1	100,00	1	100,00
Tetroncium	1	20,00	1	100,00
Thamnoseris	1	0,04	1	100,00
Thaumatocaryon	1	0,48	0	0,00
Thelesperma	1	0,04	0	0,00
*Themeda**	1	0,07	0	0,00
Thesium	1	4,00	0	0,00
*Thinopyrum**	1	0,07	0	0,00
*Thlaspi**	1	0,33	0	0,00
Thymophylla	1	0,04	0	0,00
Thyrsopteris	1	20,00	1	100,00
Tigridia	1	0,51	0	0,00
Tilesia	1	0,04	0	0,00
Tinantia	1	3,85	0	0,00
Tipuana	1	0,08	0	0,00
*Tolpis**	1	0,04	0	0,00
*Tordylium**	1	0,46	0	0,00
Toulicia	1	1,05	0	0,00
Tourrettia	1	0,84	0	0,00
*Trachycarpus**	1	2,44	0	0,00
Trachypteris	1	0,82	0	0,00
Traubia	1	0,83	1	100,00
Trema	1	20,00	0	0,00
Trevoa	1	2,50	1	100,00
Tribeles	1	100,00	1	100,00
*Tribulus**	1	5,00	0	0,00
Trichoneura	1	0,07	0	0,00
Trichophorum	1	0,21	0	0,00
Trichosalpinx	1	0,10	0	0,00
Trichostigma	1	3,85	0	0,00
Trichotolinum	1	0,33	1	100,00
Tricomaria	1	0,88	1	100,00
Tridax	1	0,04	0	0,00
*Trigonella**	1	0,08	0	0,00
Triodanis	1	2,04	0	0,00
Triphora	1	0,10	0	0,00
*Tripleurospermum**	1	0,04	0	0,00
Tripsacum	1	0,07	0	0,00
Trismeria	1	0,82	0	0,00
Tristachya	1	0,07	0	0,00
Tristicha	1	5,26	0	0,00
Trizeuxis	1	0,10	0	0,00
Trophaeastrum	1	3,33	1	100,00
Tropidocarpum	1	0,33	1	100,00
Tropidococcus	1	0,26	1	100,00
Uleiorchis	1	0,10	0	0,00
*Ulex**	1	0,08	0	0,00

Tabla 5 (Continuación). *Table 5 (Continued).*

Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género	Género	Especies	% de la familia	Especies endémica	% del género
Ullucus	1	25,00	0	0,00	*Vitis**	1	7,14	0	0,00
Urbania	1	0,39	0	0,00	*Warmingia*	1	0,10	0	0,00
Urena	1	0,26	0	0,00	*Warrea*	1	0,10	0	0,00
Urmenetea	1	0,04	1	100,00	*Watsonia**	1	0,51	0	0,00
*Urospermum**	1	0,04	0	0,00	*Websteria*	1	0,21	0	0,00
*Vaccaria**	1	0,58	0	0,00	*Weingartia*	1	0,25	1	100,00
Vaccinium	1	3,03	0	0,00	*Widgrenia*	1	0,31	0	0,00
Vahlodea	1	0,07	0	0,00	*Willkommia*	1	0,07	0	0,00
Valdivia	1	3,45	1	100,00	*Woodsia*	1	1,20	0	0,00
Vallea	1	10,00	0	0,00	*Wullschlaegelia*	1	0,10	0	0,00
Vallesia	1	0,31	0	0,00	*Xeroaloysia*	1	0,39	1	100,00
Vantanea	1	100,00	0	0,00	*Yavia*	1	0,25	1	100,00
Vassobia	1	0,20	0	0,00	*Yunquea*	1	0,04	1	100,00
Velloziella	1	1,79	1	100,00	*Zannichellia*	1	100,00	0	0,00
Verbenoxylum	1	0,39	1	100,00	*Zantedeschia**	1	1,96	0	0,00
Vestia	1	0,20	1	100,00	*Zinnia*	1	0,04	0	0,00
Viburnum	1	33,33	0	0,00	*Zootrophion*	1	0,10	0	0,00
Victoria	1	11,11	0	0,00	*Zuccagnia*	1	0,08	1	100,00
*Vinca**	1	0,31	0	0,00	*Zygophlebia*	1	4,17	0	0,00
Virola	1	100,00	0	0,00	*Zygostigma*	1	1,75	0	0,00

Endemismo

El término endémico es usado únicamente para referirse a especies o categorías taxonómicas superiores, sólo conocidas para el área del proyecto.

Se registran un total de 10 familias endémicas (3,25% del total): Francoaceae, Gomortegaceae y Lactoridaceae, endémicas de Chile, Halophytaceae endémica de Argentina, Aextoxicaceae, Gilliesiaceae, Misodendraceae, Philesiaceae y Tribelaceae endémicas de Argentina y Chile, y finalmente Sclerophylacaceae endémica de Argentina y Uruguay.

El número de géneros endémicos es 249 (9,63%) y la familia con mayor número de géneros endémicos es Asteraceae, con 42 géneros, seguida por Brassicaceae (17 géneros), Cactaceae (12), Apiaceae (11), Solanaceae (9), Fabaceae (8) y Poaceae (8). En la Tabla 7 se detallan los géneros endémicos, número de especies y su presencia en cada país.

Hay un total de 7691 especies endémicas, que representa el 43,47% del total de especies de plantas presente en el área. En la Tabla 8 se detalla el número de especies endémicas en cada país y su porcentaje relativo en relación al número total de especies tratadas en este estudio. En relación al número de especies endémicas (Tabla 3), los valores más altos, por división política en Brasil, se hallan en los estados de Santa Catarina, Paraná y Rio Grande do Sul de Brasil, con 249, 248 y 208 especies endémicas respectivamente. En Chile los valores aumentan desde la Región I, con 48 especies endémicas, hasta la Región IV, con 127 y la Región Metropolitana con 84;

Endemism

The term endemic refers to species, genera, or families present only in the project area.

A total of 10 families families have been recorded as endemic (3.25% of total): Francoaceae, Gomortegaceae, and Lactoridaceae are endemic to Chile; Halophytaceae is endemic to Argentina; Aextoxicaceae, Gilliesiaceae, Misodendraceae, Philesiaceae, and Tribelaceae are endemic to Argentina and Chile; and finally Sclerophylacaceae is endemic to Argentina and Uruguay.

The number of endemic genera is 249 (9.63%) and the family with the greatest number of endemic genera is the Asteraceae, with 42 genera, followed by Brassicaceae (17), Cactaceae (12), Apiaceae (11), Solanaceae (9), Fabaceae (8), and Poaceae (8). Table 7 summarizes details of the number of endemic genera, endemic species, and their presence within each country.

With relation to the endemic species, a total of 7691 has been recorded, which represents 43.47% of the vascular plant species of the region. In Table 8 the number of endemic species is detailed by country and by percentage relative to the total number of taxa. The highest values by political division for Brazil are in the states of Santa Catarina, Paraná, and Rio Grande do Sul, with 249, 248, and 208 species, respectively. In Chile, values increase from Region I, with 48 endemic species, up to Region IV with 127 endemic species, and Region Metropolitana with 84. These values decline toward the south, with five to 10 endemic species in Regions XI and

Tabla 6. Especies y taxones infraespecíficos compartidos entre países: nativas, endémicas, introducidas, totales y porcentaje del total compartido respecto al total para el Cono Sur. *Table 6. Species and infraspecies shared between countries: natives, endemics, introduced, total, and* % of total shared with respect to the total for Cono Sur.

Países	Nativas	Endémicas	Introducidas	Total	%
Argentina/Brasil	3692	105	285	4082	23,06
Argentina/Chile	877	1397	449	2717	15,35
Argentina/Paraguay	3379	194	121	3634	20,53
Argentina/Uruguay	2125	136	340	2601	14,69
Brasil/Chile	290	0	201	491	2,77
Brasil/Paraguay	3863	66	111	4040	22,82
Brasil/Uruguay	2011	122	193	2326	13,14
Chile/Paraguay	225	0	55	280	1,58
Chile/Uruguay	338	1	263	602	3,40
Paraguay/Uruguay	1557	3	66	1626	9,18

luego, estos valores disminuyen hacia el sur, llegando a sólo cinco a 10 especies en las Regiones XI y XII. El Archipiélago Juan Fernández cuenta con un total de 108 especies endémicas, es decir un 28% de las especies presentes en estas islas. En Argentina el mayor número de especies endémicas se halla en el noroeste y norte del país: en la provincia de Jujuy se cuentan 88 especies endémicas, Salta (70), Mendoza (53), Tucumán (43), Catamarca (43) y La Rioja (39 especies). Estos valores disminuyen, en líneas generales hacia el sur y el este del país. En Paraguay, el departamento Amambay posee el mayor número de especies endémicas, 77 registradas de un total de 1897 (4%), asociadas indudablemente a la región del Cerrado. Estos valores disminuyen en el resto de los departamentos, distinguiéndose Alto Paraguay con 31 especies endémicas. Los niveles de endemismo son bajos en los diferentes departamentos de Uruguay, hallándose el valor más elevado en los departamentos de Montevideo y Maldonado, con 10 y ocho especies endémicas respectivamente.

Endémicos en Relación a las Regiones Biogeográficas

De las tres familias endémicas de Chile, Lactoridaceae es exclusiva de la Isla Más a Tierra (Robinson Crusoe) en el Archipiélago de Juan Fernández; las otras dos familias, Francoaceae con dos géneros y dos especies, y Gomortegaceae con un género y una especie, se hallan en la región mediterránea de Chile Central. Las cinco familias compartidas entre Argentina y Chile son propias de la región subantártica: las Aextoxicaceae y Tribelaceae incluyen un género monotípico cada una,

XII. Juan Fernández Archipelago has a total of 108 endemic species, which represents 28% of the vascular plant species of those islands. In Argentina, the higher number of endemic species is present in the northwest, with 88 in Jujuy, 70 in Salta, 53 in Mendoza, 43 in Tucumán, 43 in Catamarca, and 39 in La Rioja. These values once again decrease toward the south and east of this country. In Paraguay, Amambay has 77 endemic species, for a total of 1897 (4%). Values of endemicity are low in the remaining departments with Alto Paraguay having a total of 31 endemics. Levels of endemicity are also low in Uruguay, with Montevideo and Maldonado having 10 and eight species, respectively.

Endemics with Relation to the Biogeographic Regions

Of the three families endemic to Chile, one, the Lactoridaceae, is exclusive to the Isle of Más a Tierra (Robinson Crusoe) in the Juan Fernández Archipelago; the other two families, Francoaceae with two genera and two species and Gomortegaceae with one genus and one species, are found in the Mediterranean region of Chile in the province of Central Chile. The five families shared between Argentina and Chile belong to the Subantarctic region: Aextoxicaceae and Tribelaceae each include a single monotypic genus, while the Philesiaceae includes two monotypic genera, the Gilliesiaceae two genera and eight species, and the Misodendraceae a single genus with eight species. Finally, the family Sclerophylacaceae is found in the Monte and Pampeana regions in Argentina extending into Uruguay.

Tabla 7. Géneros endémicos, número de especies y presencia en los distintos países. *Table 7. Endemic genera, number of species, and presence in the different countries.*

Género	Familia	Especies	Países				
			Argentina	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay
Acanthocalycium	Cactaceae	5	Argentina				
Adenopeltis	Euphorbiaceae	1			Chile		
Aextoxicon	Aextoxicaceae	1	Argentina		Chile		
Amblyopetalum	Asclepiadaceae	1	Argentina				
Ameghinoa	Asteraceae	1	Argentina				
Amomyrtus	Myrtaceae	2	Argentina		Chile		
Amphipetalum	Portulacaceae	1				Paraguay	
Anarthrophyllum	Fabaceae	15	Argentina		Chile		
Anisomeria	Phytolaccaceae	2			Chile		
Arachnitis	Corsiaceae	1	Argentina		Chile		
Araeoandra	Vivianiaceae	1			Chile		
Asteranthera	Gesneriaceae	1	Argentina		Chile		
Asteriscium	Apiaceae	9	Argentina		Chile		
Asteropsis	Asteraceae	1		Brasil			Uruguay
Austrocactus	Cactaceae	4	Argentina		Chile		
Austrocedrus	Cupressaceae	1	Argentina		Chile		
Austropeucedanum	Apiaceae	1	Argentina				
Avellanita	Euphorbiaceae	1			Chile		
Aylacophora	Asteraceae	1	Argentina				
Balsamocarpon	Fabaceae	1			Chile		
Barneoudia	Ranunculaceae	3	Argentina		Chile		
Benthamiella	Solanaceae	12	Argentina		Chile		
Bergeronia	Fabaceae	1	Argentina			Paraguay	
Bipinnula	Orchidaceae	10	Argentina	Brasil	Chile		Uruguay
Bolax	Apiaceae	2	Argentina		Chile		
Boopis	Calyceraceae	13	Argentina		Chile		
Boquila	Lardizabalaceae	1	Argentina		Chile		
Bordasia	Malvaceae	1				Paraguay	
Brachyclados	Asteraceae	3	Argentina		Chile		
Bridgesia	Sapindaceae	1			Chile		
Burkartia	Asteraceae	1	Argentina				
Callianthemoides	Ranunculaceae	1	Argentina		Chile		
Calopappus	Asteraceae	1			Chile		
Calyculogygas	Malvaceae	1		Brasil			Uruguay
Calyptraemalva	Malvaceae	1		Brasil			
Campsidium	Bignoniaceae	1	Argentina		Chile		
Centaurodendron	Asteraceae	2			Chile		
Chiliophyllum	Asteraceae	3	Argentina		Chile		
Chiliotrichum	Asteraceae	2	Argentina		Chile		
Chilocardamum	Brassicaceae	4	Argentina				
Cissarobryon	Vivianiaceae	1			Chile		
Codonorchis	Orchidaceae	2	Argentina	Brasil	Chile		
Colliguaja	Euphorbiaceae	5	Argentina	Brasil	Chile		
Combera	Solanaceae	2	Argentina		Chile		
Conanthera	Tecophilaeaceae	5			Chile		
Cordobia	Malpighiaceae	1	Argentina			Paraguay	
Corynabutilon	Malvaceae	7	Argentina		Chile		
Cuminia	Lamiaceae	1			Chile		
Cyclolepis	Asteraceae	1	Argentina				
Cyphocarpus	Campanulaceae	3			Chile		
Delpinophytum	Brassicaceae	1	Argentina				
Dendroseris	Asteraceae	11			Chile		
Denmoza	Cactaceae	1	Argentina				
Desmaria	Loranthaceae	1			Chile		

Tabla 7 (Continuación). *Table 7 (Continued).*

Género	Familia	Especies	Países				
			Argentina	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay
Dictiyophyllaria	Orchidaceae	1		Brasil			
Dinemagonum	Malpighiaceae	1			Chile		
Dinemandra	Malpighiaceae	1			Chile		
Diposis	Apiaceae	3	Argentina		Chile		Uruguay
Dipyrena	Verbenaceae	1	Argentina				
Dolichlasium	Asteraceae	1	Argentina				
Doniophyton	Asteraceae	2	Argentina		Chile		
Duseniella	Asteraceae	1	Argentina				
Eithea	Amaryllidaceae	1		Brasil			
Elytropus	Apocynaceae	1			Chile		
Epipetrum	Dioscoreaceae	3			Chile		
Ercilla	Phytolaccaceae	2			Chile		
Eriachaenium	Asteraceae	1	Argentina				
Erianthecium	Poaceae	1	Argentina				Uruguay
Eriosyce	Cactaceae	5			Chile		
Eulychnia	Cactaceae	5			Chile		
Famatina	Amaryllidaceae	2	Argentina		Chile		
Fascicularia	Bromeliaceae	1			Chile		
Fitzroya	Cupressaceae	1	Argentina		Chile		
Fonkia	Plantaginaceae	1	Argentina		Chile		
Francoa	Francoaceae	1			Chile		
Gallardoa	Malpighiaceae	1	Argentina				
Gamocarpha	Calyceraceae	6	Argentina		Chile		
Gamochaetopsis	Asteraceae	1	Argentina		Chile		
Gavilea	Orchidaceae	14	Argentina		Chile		
Geoblasta	Orchidaceae	1	Argentina	Brasil			Uruguay
Gethyum	Alliaceae	2			Chile		
Gevuina	Proteaceae	1	Argentina		Chile		
Gilliesia	Gilliesiaceae	5	Argentina		Chile		
Gomortega	Gomortegaceae	1			Chile		
Grammosperma	Brassicaceae	1	Argentina		Chile		
Grisebachiella	Asclepiadaceae	1	Argentina		Chile		
Guindilia	Sapindaceae	3	Argentina		Chile		
Guynesomia	Asteraceae	1			Chile		
Gymnachne	Poaceae	1			Chile		
Gymnophyton	Apiaceae	6	Argentina		Chile		
Gypothamnium	Asteraceae	1			Chile		
Halophytum	Halophytaceae	1	Argentina				
Halosicyos	Cucurbitaceae	1	Argentina				
Hamadryas	Ranunculaceae	5	Argentina		Chile		
Heterothalamulopsis	Asteraceae	1		Brasil			
Heterotristicha	Podostemaceae	1					Uruguay
Hollermayera	Brassicaceae	1			Chile		
Homalocarpus	Apiaceae	6			Chile		
Huanaca	Apiaceae	4			Chile		
Huarpea	Asteraceae	1	Argentina				
Huidobria	Loasaceae	2			Chile		
Hymenoglossum	Hymenophyllaceae	1	Argentina		Chile		
Ianthopappus	Asteraceae	1	Argentina	Brasil			
Isanitella	Orchidaceae	1		Brasil			Uruguay
Ivania	Brassicaceae	1			Chile		
Ixorhea	Boraginaceae	1	Argentina				
Juania	Arecaceae	1			Chile		
Jubaea	Arecaceae	1			Chile		
Kurzamra	Lamiaceae	1	Argentina		Chile		

Tabla 7 (Continuación). *Table 7 (Continued).*

Género	Familia	Especies	Países				
			Argentina	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay
Lactoris	Lactoridaceae	1			Chile		
Lapageria	Philesiaceae	1			Chile		
Lardizabala	Lardizabalaceae	1	Argentina		Chile		
Laretia	Apiaceae	1	Argentina		Chile		
Latua	Solanaceae	1			Chile		
Laureliopsis	Monimiaceae	1	Argentina		Chile		
Lebetanthus	Epacridaceae	1	Argentina		Chile		
Lecanophora	Malvaceae	7	Argentina		Chile		
Legrandia	Myrtaceae	1			Chile		
Lenzia	Portulacaceae	1	Argentina		Chile		
Leontochir	Alstroemeriaceae	1			Chile		
Lepidophyllum	Asteraceae	1	Argentina		Chile		
Lepidothamnus	Podocarpaceae	1	Argentina		Chile		
Leptinella	Asteraceae	1	Argentina		Chile		
Leptocarpha	Asteraceae	1			Chile		
Leptophyllochloa	Poaceae	1	Argentina		Chile		
Leucocoryne	Alliaceae	45			Chile		
Leunisia	Asteraceae	1			Chile		
Lithodraba	Brassicaceae	1	Argentina				
Lophocarpinia	Fabaceae	1	Argentina			Paraguay	
Lycapsus	Asteraceae	1			Chile		
Macrachaenium	Asteraceae	1	Argentina				
Maihuenia	Cactaceae	2	Argentina		Chile		
Mangonia	Araceae	2		Brasil			Uruguay
Margyracaena	Rosaceae	1			Chile		
Marticorenia	Asteraceae	1			Chile		
Megalachne	Poaceae	1			Chile		
Melosperma	Plantaginaceae	1	Argentina		Chile		
Metharme	Zygophyllaceae	1			Chile		
Microgyne	Asteraceae	1	Argentina	Brasil			Uruguay
Micropsis	Asteraceae	5	Argentina		Chile		Uruguay
Misodendrum	Misodendraceae	8	Argentina		Chile		
Mitraria	Gesneriaceae	1	Argentina		Chile		
Monttea	Plantaginaceae	3	Argentina		Chile		
Moscharia	Asteraceae	2			Chile		
Myoschilos	Santalaceae	1	Argentina		Chile		
Nanodea	Santalaceae	1	Argentina		Chile		
Nastanthus	Calyceraceae	9	Argentina		Chile		
Neobaclea	Malvaceae	1	Argentina				
Neosparton	Verbenaceae	4	Argentina				
Nesocaryum	Boraginaceae	1			Chile		
Notanthera	Loranthaceae	1			Chile		
Notiosciadium	Apiaceae	1	Argentina				Uruguay
Ochagavia	Bromeliaceae	4			Chile		
Ochetophila	Rhamnaceae	2	Argentina		Chile		
Oligocladus	Apiaceae	1	Argentina				
Onuris	Brassicaceae	5	Argentina		Chile		
Oplismenopsis	Poaceae	1	Argentina				Uruguay
Oreopolus	Rubiaceae	1	Argentina		Chile		
Oxyphyllum	Asteraceae	1			Chile		
Paleaepappus	Asteraceae	1	Argentina				
Panphalea	Asteraceae	9	Argentina	Brasil			Uruguay
Pantacantha	Solanaceae	1	Argentina				
Parodianthus	Verbenaceae	2	Argentina				
Parodiodoxa	Brassicaceae	1	Argentina				

Tabla 7 (Continuación). *Table 7 (Continued).*

Género	Familia	Especies	Países				
			Argentina	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay
Peregrina	Malpighiaceae	1	Argentina	Brasil		Paraguay	
Petroravenia	Brassicaceae	1	Argentina				
Peumus	Monimiaceae	1			Chile		
Philesia	Philesiaceae	1	Argentina		Chile		
Philippiella	Caryophyllaceae	1	Argentina		Chile		
Phlebolobium	Brassicaceae	1	Argentina				
Phrodus	Solanaceae	1			Chile		
Phycella	Amaryllidaceae	6	Argentina		Chile		
Pilgerodendron	Cupressaceae	1	Argentina		Chile		
Pintoa	Zygophyllaceae	1			Chile		
Piptadeniopsis	Fabaceae	1				Paraguay	
Pitavia	Rutaceae	1			Chile		
Placea	Amaryllidaceae	5			Chile		
Plectrocarpa	Zygophyllaceae	2	Argentina				
Pleocarphus	Asteraceae	1			Chile		
Podanthus	Asteraceae	2			Chile		
Podophorus	Poaceae	1			Chile		
Pozoa	Apiaceae	2	Argentina		Chile		
Pterocactus	Cactaceae	9	Argentina		Chile		
Pterygiosperma	Brassicaceae	1	Argentina				
Pyrrhocactus	Cactaceae	27	Argentina		Chile		
Quaternella	Amaranthaceae	1		Brasil			
Ramorinoa	Fabaceae	1	Argentina				
Raulinoa	Rutaceae	1		Brasil			
Regnellidium	Marsileaceae	1	Argentina	Brasil			Uruguay
Reicheella	Caryophyllaceae	1			Chile		
Relchela	Poaceae	1	Argentina		Chile		
Retanilla	Rhamnaceae	4	Argentina		Chile		
Reyesia	Solanaceae	4	Argentina		Chile		
Rhombolytrum	Poaceae	2		Brasil	Chile		Uruguay
Rhyssostelma	Apocynaceae	1					Uruguay
Robinsonia	Asteraceae	7			Chile		
Salpiglossis	Solanaceae	2	Argentina		Chile		
Sarcodraba	Brassicaceae	4	Argentina				
Sarmienta	Gesneriaceae	1			Chile		
Saxegothaea	Podocarpaceae	1	Argentina		Chile		
Saxifragella	Saxifragaceae	1	Argentina		Chile		
Saxifragodes	Saxifragaceae	1	Argentina		Chile		
Schickendantzia	Alliaceae	1	Argentina				
Schizanthus	Solanaceae	14	Argentina		Chile		
Schizopetalon	Brassicaceae	10	Argentina		Chile		
Schreiteria	Portulacaceae	1	Argentina				
Sclerophylax	Sclerophylacaceae	14	Argentina				
Scyphanthus	Loasaceae	1				Paraguay	Uruguay
Selkirkia	Boraginaceae	1			Chile		
Serpyllopsis	Hymenophyllaceae	1	Argentina		Chile		
Setiechinopsis	Cactaceae	1	Argentina		Chile		
Skottsbergianthus	Brassicaceae	2	Argentina				
Solaria	Gilliesiaceae	3	Argentina				
Solenomelus	Iridaceae	2	Argentina		Chile		
Sommerfeltia	Asteraceae	2	Argentina		Chile		
Speea	Alliaceae	1		Brasil			Uruguay
Stenodrepanum	Fabaceae	1	Argentina		Chile		
Synammia	Polypodiaceae	3					
Tapeinia	Iridaceae	1	Argentina		Chile		

Tabla 7 (Continuación). *Table 7 (Continued).*

Género	Familia	Especies	Países				
			Argentina	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay
Tecophilaea	Tecophilaeaceae	2			Chile		
Tephrocactus	Cactaceae	7	Argentina				
Tepualia	Myrtaceae	1	Argentina		Chile		
Tetilla	Francoaceae	1			Chile		
Tetroncium	Juncaginaceae	1	Argentina		Chile		
Thamnoseris	Asteraceae	1			Chile		
Thelocephala	Cactaceae	6			Chile		
Thyrsopteris	Dicksoniaceae	1			Chile		
Traubia	Amaryllidaceae	1			Chile		
Trevoa	Rhamnaceae	1			Chile		
Tribeles	Tribelaceae	1	Argentina		Chile		
Trichopetalum	Laxmanniaceae	2	Argentina		Chile		
Trichotolinum	Brassicaceae	1	Argentina				
Tricomaria	Malpighiaceae	1	Argentina				
Triptilion	Asteraceae	7	Argentina		Chile		
Tristagma	Alliaceae	20	Argentina		Chile		
Trophaeastrum	Tropaeolaceae	1	Argentina				
Tropidococcus	Malvaceae	1		Brasil			
Urmenetea	Asteraceae	1	Argentina		Chile		
Valdivia	Escalloniaceae	1			Chile		
Verbenoxylum	Verbenaceae	1		Brasil			
Vestia	Solanaceae	1			Chile		
Viviania	Viviianiaceae	4	Argentina	Brasil	Chile		
Werdermannia	Brassicaceae	4	Argentina		Chile		
Xeroaloysia	Verbenaceae	1	Argentina				
Xerodraba	Brassicaceae	7	Argentina		Chile		
Yavia	Cactaceae	1	Argentina				
Yunquea	Asteraceae	1			Chile		
Zoellnerallium	Alliaceae	2			Chile		
Zuccagnia	Fabaceae	1	Argentina				

mientras que las Philesiaceae comprenden dos géneros monotípicos, las Gilliesiaceae un total de dos géneros y ocho especies, y las Misodendraceae incluyen un único género y ocho especies. Finalmente, la familia Sclerophylacaceae con un género y 14 especies, es propia de las regiones del Monte y Pampeana en Argentina llegando hasta Uruguay.

Analizando la distribución de los géneros endémicos del área estudiada y su distribución en las diferentes regiones biogeográficas se puede observar:

En los Andes Secos Sur-Centrales, incluyendo la Puna, Prepuna y regiones altoandinas del norte de Argentina y Chile se encuentran diversos géneros endémicos de Alliaceae como *Schickendantzia y Zoellnerallium,* Asteraceae como *Dolichlasium* y *Huarpea,* de Brassicaceae como *Grammosperma, Lithodraba, Parodiodoxa, Petroravenia* y *Sarcodraba,* de Cactaceae como *Yavia* y de Portulacaceae como *Schreiteria,* entre otros. Géneros característicos de esta región son *Clinanthus* e *Hieronymiella* (Amaryllidaceae), *Chiliotrichiopsis, Cuatrecasasiella, Urmenetea* y *Werneria*

Analyzing the distribution of the genera endemic to the area studied and their distribution by the principal biogeographical areas, it can be observed that:

In the dry South-Central Andes within the Puna, Prepuna, and high-Andean regions of northern Argentina and Chile, diverse genera are found, including *Schickendantzia* and *Zoellneralium* in the Alliaceae, *Dolichlasium* and *Huarpea* in the Asteraceae, *Grammosperma, Lithodraba, Parodiodoxa, Petroravenia,* and *Sarcodraba* in the Brassicaceae, *Yavia* in the Cactaceae, and *Schreiteria* in the Portulacaceae, among others. Characteristic genera of this region are *Clinanthus* and *Hieronymiella* (Amaryllidaceae), *Chiliotrichiopsis, Cuatrecasasiella, Urmenetea,* and *Werneria* (Asteraceae), *Aschersoniodoxa, Mancoa,* and *Polypsecadium* (Brassicaceae), *Pycnophyllum* (Caryophyllaceae), *Cardenanthus* and *Mastigostyla* (Iridaceae), *Nototriche* and *Tarasa* (Malvaceae), *Hypseocharis* (Oxalidaceae), *Aa* (Orchidaceae), *Lenzia* (Portulacaceae), and *Anthochloa* and *Aciachne*

Tabla 8. Número de especies endémicas de cada país, porcentaje de la flora de cada país, porcentaje de la flora del Cono Sur (considerando en Brasil los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul). *Table 8. Number of species endemic in each country, percentage of the flora of each country, percentage of the flora of the Southern Cone (considering in Brazil only the states of Paraná, Santa Catarina, and Rio Grande do Sul).*

País	Especies	Especies endémicas	% flora del país	% del total de especies
ARGENTINA	9938	1760	17,70	9,95
BRASIL	7712	1146	14,86	6,47
CHILE	4985	1963	39,38	11,09
PARAGUAY	5099	399	7,82	2,25
URUGUAY	2770	113	4,08	0,64

(Asteraceae), *Aschersoniodoxa, Mancoa* y *Polypsecadium* (Brassicaceae), *Pycnophyllum* (Caryophyllaceae), *Cardenanthus* y *Mastigostyla* (Iridaceae), *Nototriche* y *Tarasa* (Malvaceae), *Hypseocharis* (Oxalidaceae), *Aa* (Orchidaceae), *Lenzia* (Portulacaceae) y *Anthochloa* y *Aciachne* (Poaceae), entre otros. Finalmente, existen géneros comunes entre la región del altiplano y altoandina con la región patagónica, como *Adesmia, Azorella, Chuquiraga, Fabiana, Junellia, Mulinum* y *Nardophyllum.*

Pocos géneros son exclusivos o endémicos del área de los Andes Húmedos Nor-Centrales o Yungas en el norte argentino, pudiendo citarse el género *Austropeucedanum* de la familia Apiaceae. Entre los elementos característicos o exclusivos en el área de estudio se pueden citar a las Betulaceae (*Alnus*) y Juglandaceae (*Juglans*), y familias holárticas que llegan al norte de la Argentina como las Myricaceae (*Myrica*), Theaceae (*Ternstroemia*) y Velloziaceae (*Barbaceniopsis*). El bajo nivel de endemismos a nivel de familias y géneros, se explica por la continuación de la región de las Yungas en áreas limítrofes de Bolivia.

Una situación similar se observa en el área que cubre el Bosque Atlántico en el extremo oriental de Argentina y regiones adyacentes de Paraguay y Brasil. Esta región posee elevados índices de biodiversidad a nivel de familias, géneros y especies, pero con escasos endemismos, particularmente a nivel de familia y género. No hay familias endémicas y hay cerca de 10 géneros endémicos, entre los que se pueden citar a *Quaternella* (Amaranthaceae), *Eithea* (Amaryllidaceae), *Heterothalamulopsis* (Asteraceae), *Peregrina* (Malpighiaceae), *Calyptraemalva* y *Tropidococcus* (Malvaceae), *Dictyophyllaria* e *Isanitella* (Orchidaceae), *Amphipetalum* (Portulacaceae) y *Raulinoa* (Rutaceae).

En la región del Desierto Chileno-Peruano, en Chile, se hallan aproximadamente 15 géneros endémicos, principalmente de las familias Cactaceae (*Eriosyce, Eulychnia* y *Thelocephala*), Asteraceae (*Gypothamnium* y *Oxyphyllum*), Alstroemeriaceae (*Leontochir*), Loasaceae (*Huidobria*) y Zygophyllaceae (*Metharme* y *Pintoa*), entre (Poaceae), among others. Finally, genera common between the high-Andean plateau and Patagonia are *Adesmia, Azorella, Chuquiraga, Fabiana, Junellia, Mulinum,* and *Nardophyllum.*

Few genera are exclusively endemic to the area of the Yungas in northern Argentina, among them is the genus *Austropeucedanum* in the family Apiaceae. Within the project area, more widespread genera that are found exclusively in northern Argentina are Betulaceae (*Alnus*) and Juglandaceae (*Juglans*); holartic families present only in northern Argentina are the Myricaceae (*Myrica*), Theaceae (*Ternstroemia*), and Velloziaceae (*Barbaceniopsis*). Low levels of endemism, at the family and generic level, can be explained by the presence of these forests in southern Bolivia.

A similar situation is observed in the Atlantic forests in extreme eastern Argentina and adjacent regions of Paraguay and Brazil. This region has high levels of biodiversity at the family, genus, and species level, but few endemics, particularly at the family and genus level. There are no endemic families and only about 10 endemic genera, among these are *Quaternella* (Amaranthaceae), *Eithea* (Amaryllidaceae), *Heterothalamulopsis* (Asteraceae), *Peregrina* (Malpighiaceae), *Calyptraemalva* and *Tropidococcus* (Malvaceae), *Dictyophyllaria* and *Isanitella* (Orchidaceae), *Amphipetalum* (Portulacaceae), and *Raulinoa* (Rutaceae).

In Chile, in the Chilean-Peruvian Desert region, approximately 15 endemic genera are found, principally in the families Cactaceae (*Eriosyce, Eulychnia,* and *Thelocephala*), Asteraceae (*Gypothamnium* and *Oxyphyllum*), Alstroemeriaceae (*Leontochir*), Loasaceae (*Huidobria*), and Zygophyllaceae (*Metharme* and *Pintoa*), among others. Also present are a significant number of endemic species, including many in the genera *Cryptantha* and *Heliotropium* (Boraginaceae), *Copiapoa* (Cactaceae), and *Nolana* (Nolanaceae).

otros. También hay en esta región un número importante de especies endémicas, incluyendo numerosas especies de *Cryptantha* y *Heliotropium* (Boraginaceae), *Copiapoa* (Cactaceae) y *Nolana* (Nolanaceae).

El área mediterránea de Chile Central posee un número importante de taxones endémicos, incluyendo las familias Francoaceae y Gomortegaceae. A nivel genérico hay más de 50 géneros exclusivos de esta región o que se extienden a otras áreas colindantes. Entre estos géneros se pueden mencionar a *Jubaea* (Arecaceae), géneros de Alliaceae (*Gethyum, Leucocoryne* y *Speea*), numerosos géneros de Asteraceae (*Calopappus, Guynesomia, Leunisia, Marticorenia, Moscharia, Pleocarphus* y *Podanthus*), Bromeliaceae (*Fascicularia* y *Ochagavia*), Francoaceae (*Francoa* y *Tetilla*), Gomortegaceae (*Gomortega*), Monimiaceae (*Peumus*), Tecophilaeaceae (*Conanthera* y *Tecophilaea*), Vivianiaceae (*Araeoandra* y *Cissarobryon*) y Zygophyllaceae (*Pintoa*). Es también elevado el número de especies endémicas.

Son escasos los géneros endémicos en la región Pampeana, tal como se verá en el resto de las regiones biogeográficas hacia el este del área de estudio, en donde se observa un total de apenas 15 géneros, incluyendo representantes de las familias Araceae (*Mangonia*), Asteraceae (*Asteropsis, Ianthopappus, Microgyne, Panphalea* y *Sommerfeltia*), Apiaceae (*Notiosciadium*), Apocynaceae (*Rhyssostelma*) y Poaceae (*Erianthecium* y *Oplismenopsis*). La familia Sclerophylacaceae incluye un único género, *Sclerophylax*, cuyas 14 especies crecen fundamentalmente en la región Pampeana, extendiéndose algunas a la región del Monte.

El Monte incluye un número importante de géneros endémicos como *Halophytum* de la familia endémica Halophytaceae. Entre ellos, más de 20 géneros son endémicos de la Argentina y un número escaso está también presente en la región Mediterránea de Chile. Entre los primeros se pueden citar a *Grisebachiella* (Asclepiadaceae), *Ixorhea* (Boraginaceae), *Acanthocalycium, Denmoza, Setiechinopsis* y *Tephrocactus* (Cactaceae), *Halosicyos* (Cucurbitaceae), *Ramorinoa, Stenodrepanum* y *Zuccagnia* (Fabaceae), *Trichomaria* (Malpighiaceae), *Dipyrena, Parodianthus* y *Xeroaloysia* (Verbenaceae) y *Plectrocarpa* (Zygophyllaceae). Entre los géneros característicos del Monte y que se extienden a Chile Mediterráneo, se pueden citar a *Kurzamra* (Lamiaceae), *Monttea* (Plantaginaceae), *Barneoudia* (Ranunculaceae) y *Guindilia* (Sapindaceae).

Si bien en la región Patagónica el número de taxones disminuye a medida que se avanza hacia el sur, la cantidad de géneros endémicos se eleva, pudiendo citarse a varios representantes de las familias Asteraceae (*Ameghinoa, Aylacophora, Burkartia, Doniophyton, Duseniella, Lepidophyllum* y *Paleaepappus*), Brassicaceae (*Chilocardamum, Delpinophytum, Onuris, Phlebolobium, Pterygiosperma, Skottsbergianthus, Trichotolinum* y *Xerodraba*), Cactaceae (*Austrocactus, Maihuenia* y *Pterocactus*), Calyceraceae (*Boopis, Gamocarpha* y *Nastanthus*), Fabaceae (*Anarthrophyllum*), Malpighiaceae

As has been established in numerous treatments, the Mediterranean area of Chile possesses a significant number of endemic taxa, including the families Francoaceae and Gomortegaceae. This is also seen at the generic level in more than 50 genera exclusive to the region or that extend only into other adjacent areas. Among these genera are *Jubaea* (Arecaceae), genera of the Alliaceae such as *Gethyum, Leucocoryne,* and *Speea,* numerous genera of the Asteraceae (*Calopappus, Guynesomia, Leunisia, Marticorenia, Moscharia, Pleocarphus,* and *Podanthus*), Bromeliaceae (*Fascicularia* and *Ochagavia*), Francoaceae (*Francoa* and *Tetilla*), Gomortegaceae (*Gomortega*), Monimiaceae (*Peumus*), Tecophilaeaceae (*Conanthera* and *Tecophilaea*), Vivianiaceae (*Araeoandra* and *Cissarobryon*), and Zygophyllaceae (*Pintoa*). There are also many endemic species.

Endemic genera are scarce in the Pampas region, in which there are a total of only 15 genera, including representatives of the family Araceae (*Mangonia*), Asteraceae (such as *Asteropsis, Ianthopappus, Microgyne, Panphalea,* and *Sommerfeltia*), Apiaceae (*Notiosciadium*), Apocynaceae (*Rhyssostelma*), and Poaceae (*Erianthecium* and *Oplismenopsis*). The family Sclerophylaceae includes only one genus, *Sclerophylax,* whose 14 species grow fundamentally in the region of the pampas, with some extending to the region of the Monte.

The Monte includes a significant number of endemic genera, including *Halophytum* in the endemic family Halophytaceae. Among them, more than 20 genera are endemic to Argentina, with a few also present in Mediterranean Chile. Endemic genera in Argentina are *Grisebachiella* (Asclepiadaceae), *Ixorhea* (Boraginaceae), *Acanthocalycium, Denmoza, Setiechinopsis,* and *Tephrocactus* (Cactaceae), *Halsicyos* (Cucurbitaceae), *Ramorinoa, Stenodrepanum,* and *Zuccagnia* (Fabaceae), *Trichomaria* (Malpighiaceae), *Dipyrena, Parodianthus,* and *Xeroaloysia* (Verbenaceae), and *Plectrocarpa* (Zygophyllaceae). Genera common between the Monte and Mediterranean Chile are *Kurzamra* (Lamiaceae), *Monttea* (Plantaginaceae), *Guindilia* (Sapindaceae), and *Barneoudia* (Ranunculaceae).

Although in Patagonia the number of taxa decreases toward the south, there is a significant number of endemic genera, such as members of the Asteraceae (*Ameghinoa, Aylacophora, Burkartia, Doniophyton, Duseniella, Lepidophyllum,* and *Paleaepappus*), Brassicaceae (*Chilocardamum, Delpinophytum, Onuris, Phlebolobium, Pterygiosperma, Skottsbergianthus, Trichotolinum,* and *Xerodraba*), Cactaceae (*Austrocactus, Maihuenia,* and *Pterocactus*), Calyceraceae (*Boopis, Gamocarpha,* and *Nastanthus*), Fabaceae (*Anarthrophyllum*), Malpighiaceae (*Gallardoa*), Solanaceae (*Benthamiella* and *Pantacantha*), and Verbenaceae (*Neosparton*). Among the endemic genera present in Patagonia and

(*Gallardoa*), Solanaceae (*Benthamiella* y *Pantacantha*) y Verbenaceae (*Neosparton*). Entre los géneros presentes en esta región y también en Chile se pueden citar a *Triptilion* (Asteraceae), *Austrocactus* y *Maihuenia* (Cactaceae), *Trichopetalum* (Laxmanniaceae), *Melosperma* (Plantaginaceae) y *Retanilla* (Rhamnaceae). Géneros endémicos patagónicos, que también se hallan en el Monte son *Lecanophora* (Malvaceae) y *Neosparton* (Verbenaceae).

El Chaco incluye, tal como ocurre en la región Pampeana, escaso número de géneros endémicos. Aproximadamente existen cinco, incluyendo tres de la familia Fabaceae (*Bergeronia, Lophocarpinia* y *Piptadeniopsis*), uno de Malvaceae (*Bordasia*) y uno de Malpighiaceae (*Cordobia*). El bajo número de familias, géneros y especies endémicas se corresponde con bajos índices de biodiversidad en Argentina y Paraguay.

Finalmente, en la región del Pacífico Templado Húmedo, los bosques subantárticos comprenden un número importante de familias endémicas o exclusivas de la región y de géneros endémicos, no siendo tan elevado el número de especies endémicas. Este hecho estaría explicado por la gran antigüedad y aislamiento de la región, así como a altas tasas de extinción, lo que explicaría asimismo el carácter relictual de la flora (Villagrán & Hinojosa, 1997). Entre las familias endémicas ya citamos a las Aextoxicaceae (género monotípico, *Aextoxicon,* presente en Argentina y Chile), Gilliesiaceae (*Gilliesia* con cinco especies y *Solaria* con tres especies, los dos de Argentina y Chile), Misodendraceae (*Misodendrum* con ocho especies de Argentina y Chile), Philesiaceae (*Lapageria* con una especie exclusiva de Chile y *Philesia* con una especie de Argentina y Chile) y Tribelaceae (*Tribeles* con una especie de Argentina y Chile). Entre las familias exclusivas para América del Sur presentes en esta región podemos citar a las Cupressaceae (con tres géneros endémicos, *Austrocedrus, Fitzroya* y *Pilgerodendron*), Laxmanniaceae (*Trichopetalum*) y Restionaceae (*Apodasmia*). El número de géneros endémicos es de aproximadamente 60; de éstos, las Islas de Juan Fernández tienen un total de 11, incluyendo uno de la familia Arecaceae (*Juania*), géneros de Asteraceae (*Centaurodendron, Dendroseris, Robinsonia, Yunquea*), Boraginaceae (*Selkirkia*), Dicksoniaceae (*Thyrsopteris*), Lactoridaceae (*Lactoris*), Lamiaceae (*Cuminia*) y Poaceae (*Megalachne* y *Podophorus*).

En la región continental se registran, entre los principales, géneros endémicos en Asteraceae (*Gamochaetopsis, Leptinella, Leptocarpha* y *Macrachaenium*), Epacridaceae (*Lebetanthus*), Escalloniaceae (*Valdivia*), Euphorbiaceae (*Avellanita*), Gesneriaceae (*Asteranthera* y *Sarmienta*), Hymenophyllaceae (*Hymenoglossum* y *Serpyllopsis*), Iridaceae (*Solenomelus* y *Tapeinia*), Lardizabalaceae (*Boquila* y *Lardizabala*), Monimiaceae (*Laureliopsis*), Podocarpaceae (*Lepidothamnus* y *Saxegothea*) y otros. Las familias Araucariaceae (*Araucaria*), Blechnaceae (*Blechnum*), Hymenophyllaceae (*Hymenophyllum*), Podocarpaceae (*Podocarpus*), Thymelaeaceae (*Ovidia* y

Chile are *Triptilion* (Asteraceae), *Austrocactus* and *Maihuenia* (Cactaceae), *Trichopetalum* (Laxmanniaceae), *Melosperma* (Plantaginaceae), and *Retanilla* (Rhamnaceae). Common endemic genera between Patagonia and Monte are *Lecanophora* (Malvaceae) and *Neosparton* (Verbenaceae).

As in the Pampas region, the Chaco includes scarce number of endemic genera. There are approximately five, including three in the family Fabaceae (*Bergeronia, Lophocarpinia,* and *Piptadeniopsis*), one in the family Malvaceae (*Bordasia*), and one in the family Malpighiaceae (*Cordobia*). Low levels of endemicity are in concordance with low values of biodiversity in this region both in Argentina and Paraguay.

Finally, the Wet-Temperate Pacific area (or subantarctic forests) contains a number of important families endemic or exclusive to the region and genera endemic to the region, but a smaller number of endemic species. This fact can be explained by the age and isolation of this region, linked with high levels of extinction in the area, a fact that also explains the relictual character of this flora (Villagrán & Hinojosa, 1997). Among the endemic families are the Aextoxicaceae (one monotypic genus, *Aextoxicon,* present in Argentina and Chile), Gilliesiaceae (with two genera, *Gilliesia* with five especies and *Solaria* with three especies, both from Argentina and Chile), Misodendraceae (*Misodendrum* with eight species from Argentina and Chile), Philesiaceae (*Lapageria* with one species, exclusively in Chile, and *Philesia* with one species from Argentina and Chile), and Tribelaceae (*Tribeles* with one species from Argentina and Chile). Among the families that are exclusively from South America and are present in this region are Cupressaceae (with three endemic genera, *Austrocedrus, Fitzroya,* and *Pilgerodendron*), Laxmanniaceae (with the genus *Trichopetalum*), and Restionaceae (*Apodasmia*). The number of endemic genera is approximately 60; of these the Juan Fernández Islands have a total of 11 endemic genera, including four genera of Asteraceae (*Centaurodendron, Dendroseris, Robinsonia,* and *Yunquea*), two of Poaceae (*Megalachne* and *Podophorus*), and one each in the families Arecaceae (*Juania*), Boraginaceae (*Selkirkia*), Dicksoniaceae (*Thyrsopteris*), Lactoridaceae (*Lactoris*), and Lamiaceae (*Cuminia*).

In the continental region the principal families with endemic genera are Asteraceae (*Gamochaetopsis, Leptinella, Leptocarpha,* and *Macrachaenium*), Escalloniaceae (*Valdivia*), Epacridaceae (*Lebetanthus*), Euphorbiaceae (*Avellanita*), Gesneriaceae (*Asteranthera* and *Sarmienta*), Hymenophyllaceae (*Hymenoglossum* and *Serpyllopsis*), Iridaceae (*Solenomelus* and *Tapeinia*), Lardizabalaceae (*Boquila* and *Lardizabala*), Monimiaceae (*Laureliopsis*),

Drapetes) y Winteraceae (*Drimys*) son disyuntas, hallándose también en selvas de los bosques atlánticos.

El análisis de la distribución de endémicos en las diferentes regiones biogeográficas permite concluir que el número de familias endémicas o exclusivas es elevado en la región del Pacifico Templado Húmedo (bosques subantárticos), como así también el número de géneros que allí crecen (disminuyendo en proporción el número de especies endémicas en relación a otras áreas). Por otra parte, la región mediterránea de Chile, y áreas desérticas incluidas en la Patagonia y el Monte en Argentina, poseen un elevado número de familias, géneros y especies endémicas en proporción al total de la flora analizada; estos índices disminuyen a medida que se avanza en latitud en la Patagonia al disminuir la riqueza de la flora vascular en general. A su vez, el desierto chileno y áreas adyacentes altoandinas y puneñas del norte de Argentina, no poseen familias endémicas y también un número menor de géneros endémicos; no obstante, y tomando en consideración la riqueza de la flora, el número de taxones endémicos es uno de los más elevados que se pudieron observar. Finalmente, y tal como se expresó en una contribución anterior (Zuloaga et al., 1999), los valores de endemismo disminuyen marcadamente al movernos del Oeste al Este, siendo bajos en toda la región chaqueña y pampeana, para volver a crecer en términos de especies endémicas, en el Bosque Atlántico donde limitan el este de Paraguay y Argentina y el sur del Brasil.

Formas de Vida

Del total de taxones analizados en relación a su forma de vida (habito), se halló que hay un total de aproximadamente 1100 árboles (a arbolitos y formas arborescentes) en la región, 4410 arbustos a subarbustos (incluyendo arbustos y subarbustos parásitos, suculentos y otras formas), 480 hierbas a subarbustos o arbustos, 350 lianas y 650 enredaderas o lianas, 41 palmeras, 10 saprófitas y otras tantas parásitas y unas 11.720 hierbas (incluyendo diversas categorías que se incluyen en el texto principal), forma que resultó preponderante en el área estudiada.

Introducidos

Se registraron 20 familias introducidas que representan un 6.49% del total de familias para el área estudiada. Estas son Aceraceae, Achariaceae, Agapanthaceae, Agavaceae, Aponogetonaceae, Asparagaceae, Asphodelaceae, Balsaminaceae, Cannabaceae, Caprifoliaceae, Dipsacaceae, Elaeagnaceae, Fumariaceae, Pinaceae, Resedaceae, Ruscaceae, Sphenocleaceae, Tamaricaceae, Zingiberaceae y Zosteraceae. Hay un total de 334 géneros introducidos (12,92%) y 1098 especies introducidas (6,21%). La familia con mayor número de

Podocarpaceae (*Lepidothamnus* and *Saxegothea*), and others. The families Araucariaceae (*Araucaria*), Blechnaceae (*Blechnum*), Hymenophyllaceae (*Hymenophyllum*), Podocarpaceae (*Podocarpus*), Thymelaeaceae (*Ovidia* and *Drapetes*), and Winteraceae (*Drimys*) are disjunct and are also present in the Atlantic Forest.

The analysis of the distribution of endemics by biogeographical regions allows one to conclude that relative to other areas, the number of families and genera that are endemic or exclusive is higher in the Wet-Temperate Pacific region (subantarctic region) and the number of endemic species is lower. Additionally, the Mediterranean region of Chile, the desert areas included in Patagonia, and the Argentinean Monte have a higher number of endemic families, genera, and species in proportion to the total of the flora, but this lessens as latitude increases in Patagonia where a general diminishment in the richness of the vascular flora occurs. The Chilean desert, adjacent high-Andean areas, and areas of the puna in northern Argentina do not possess endemic families and also have a smaller number of endemic genera; nonetheless, taking into consideration the richness of the flora, the number of endemic taxa in those areas is one of the highest anywhere. Finally, as expressed in a previous contribution (Zuloaga et al., 1999), the values of endemism diminish markedly from west to east, being lowest throughout the regions of the Chaco and the Pampas, but increasing in terms of endemic species in the Atlantic Forest where it borders eastern Paraguay and Argentina and southern Brazil.

Life Forms

Of the total taxa analyzed, with relation to their lifeform (habit), it was found there are a total of approximately 1100 trees (to small trees and arborescent forms) in the region, 4410 shrubs to subshrubs (including shrubs and parasitic subshrubs, succulents, and other forms), 480 herbs to subshrubs or shrubs, 350 lianas and 650 vines or lianas, 41 palms, 10 saprophytes and as many parasites, and some 11,720 herbs (including diverse categories that are included in the principal text), the form that was found to be the dominant one in the area studied.

Introduced

There are 20 families that have only introduced species in the flora area, which represents 6.49% of the total families in the study area. These are Aceraceae, Achariaceae, Agapanthaceae, Agavaceae, Aponogetonaceae, Asparagaceae, Asphodelaceae, Balsam-

especies introducidas es Poaceae con 184 especies distribuidas en 79 géneros; le siguen Asteraceae con 134 especies en 67 géneros, Fabaceae con 107 especies en 38 géneros, Brassicaceae con 71 especies en 38 géneros, Caryophyllaceae con 38 especies en 17 géneros, Chenopodiaceae con 35 especies en diez géneros, Rosaceae con 33 especies en 14 géneros, Lamiaceae con 29 especies en 18 géneros, Plantaginaceae y Polygonaceae con 26 especies en ocho y cinco géneros respectivamente. *Trifolium* es el género con mayor número de especies introducidas (20), seguido de *Bromus* (16), *Chenopodium* (14), *Euphorbia* (13), *Polygonum* (13), *Eragrostis* (12), *Centaurea* (11) y *Digitaria, Myosotis, Lepidium, Medicago, Vicia, Veronica* y *Rumex,* con diez especies cada uno; 336 géneros (12,99%) están representados por una única especie introducida y 149 géneros (5.76%) por dos a cuatro especies introducidas (Tabla 5).

El país con mayor número de taxones introducidos es Argentina con 929, es decir, el 8,36% del número total de taxones registrados en ese país. Le sigue en abundancia Chile con 609 (11,04%), Uruguay con 375 (12,35%), Brasil con 353 (4,15%) y Paraguay con 153 (2,72%) (Tabla 9).

V. CONSERVACIÓN Y ÁREAS PROTEGIDAS

En relación a la conservación de las distintas regiones biogeográficas comprendidas en el área de estudio, se puede observar que apenas cerca del 5% de su superficie se encuentra incluida en áreas protegidas como parques nacionales, reservas naturales y monumentos naturales. Estas áreas protegidas comienzan a establecerse hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Sólo a partir de la década del sesenta del siglo XX, se registra un incremento significativo en el total de parques y reservas. No obstante, la mayoría de estas áreas son relativamente pequeñas y en muchos casos han sido seleccionadas por criterios paisajísticos y en relación a intereses turísticos, sin representación en la mayoría de las unidades ecológicas analizadas.

Argentina posee, bajo administración nacional, un total de 43 áreas protegidas, incluyendo 28 parques nacionales, 10 reservas naturales, tres reservas nacionales estrictas y dos monumentos naturales, los que cubren en total 3.000.000 ha, aproximadamente un 1,1% de su territorio. Hay además otros 250 predios protegidos que se encuentran bajo jurisdicción municipal, provincial o privada que incrementan la superficie bajo protección a aproximadamente el 5,5%. Chile es el país con mayor proporción de su territorio (19%) bajo un sistema de protección, incluyendo 95 unidades distribuidas en 32 parques nacionales, 48 reservas naturales y 15 monumentos naturales. Paraguay posee un 5,2% de la superficie del país en

inaceae, Cannabaceae, Caprifoliaceae, Dipsacaceae, Elaeagnaceae, Fumariaceae, Pinaceae, Resedaceae, Ruscaceae, Sphenocleaceae, Tamaricaceae, Zingiberaceae, and Zosteraceae. There are a total of 334 introduced genera (12.92%) and 1098 introduced species (6.21%). The family with the largest number of introduced species is Poaceae with 184 species distributed in 79 genera, followed by Asteraceae with 134 species in 67 genera, Fabaceae with 107 species in 38 genera, Brassicaceae with 71 species in 38 genera, Caryophyllaceae with 38 species in 17 genera, Chenopodiaceae with 35 species in ten genera, Rosaceae with 33 species in 14 genera, Lamiaceae with 29 species in 18 genera, and Plantaginaceae and Polygonaceae with 26 species in eight and five genera respectively. *Trifolium* is the genus with the largest number of introduced species (20), followed by *Bromus* (16), *Chenopodium* (14), *Euphorbia* (13), *Polygonum* (13), *Eragrostis* (12), *Centaurea* (11), and *Digitaria, Myosotis, Lepidium, Medicago, Vicia, Veronica,* and *Rumex,* each with 10; 336 genera (12.99%) are represented by a single introduced species and 149 genera (5.76%) by two to four introduced species (Table 5).

The country with the greatest number of introduced species is Argentina with 929 species or 8.36% of the total number of species recorded for the country, following in abundance is Chile with 609 (11.04%), Uruguay with 375 (12.35%), Brazil with 353 (4.15%), and Paraguay with 153 (2.72%) (Table 9).

V. CONSERVATION AND PROTECTED AREAS

With relation to the conservation of the distinct biogeographic regions included in the study area, it can be observed that only 5% of the surface is included in protected areas such as national parks, natural reserves, and natural monuments. These protected areas began to be establihed toward the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century. Recently, starting with the decade of the 60s during the twentieth century, a significant increase in the total number of parks and reserves has been seen. Nevertheless, the majority of these areas are small and, in many cases, have been selected for their valuable landscapes or touristic interest, and lack representation in most of the ecological units analyzed.

Argentina possesses, under national administration, a total of 43 protected areas, including 28 national parks, 10 natural reserves, three national reserves, and two natural monuments that cover a total of approximately 1.1% of its territory (3,000,000 ha.). There are also 250 other protected properties under municipal, provincial, or private jurisdiction, which increases the protected areas to approximately 5.5% of the territory. Chile is the country with the most proportion of its territory (19%) under a

Tabla 9. Especies y taxones infraespecíficos totales e introducidos en cada país, y porcentaje de la flora de cada país. *Table 9. Total species and infraspecies in each country,total of these introduced, and percentage introduced in each country.*

País	Taxones	Taxones introducidos	% flora de cada país
ARGENTINA	11.108	929	8,36
BRASIL	8488	353	4,16
CHILE	5506	609	11,06
PARAGUAY	5597	153	2,73
URUGUAY	3036	375	12,35

parques o reservas, que incluye 15 parques nacionales, dos reservas de recursos manejados, un refugio de vida silvestre y cuatro reservas privadas. Estos porcentajes descienden aproximadamente a 1,6% en Uruguay y 0,7% en el sur de Brasil.

Andes Húmedos Nor-Centrales (Selva Tucumano-Boliviana o Yungas)

Aunque las Yungas representan menos del 0,1% del territorio argentino, poseen cerca del 50% de la biodiversidad de ese país. El terreno escarpado y las pocas tierras planas disponibles para la agricultura, han colaborado para mantenerlas en estado satisfactorio de conservación. Existen 20 áreas protegidas que cubren una superficie de 317.024 ha y representan cerca del 13% del bioma en la Argentina. Sin embargo, la expansión de la frontera agrícola está transformando los piedemontes en campos de cultivo que están comenzando a presionar sobre los remanentes de la selva de montaña. Las áreas protegidas más importantes son, dentro del sector Oranense, los Parques Nacionales Baritú (72.439 ha) y Calilegua (76.306 ha); dentro del Tucumanense, el Parque Nacional El Rey (44.162 ha) y el Parque Biológico Sierra de San Javier (14.174 ha), junto con otras reservas provinciales menores (Santa Ana, 20.000 ha y La Florida, 9882 ha). Los bosques montanos están escasamente representados en estas reservas mientras que las selvas pedemontanas no están representadas en ninguna de ellas (Brown, 1995). En el año 2002 se estableció una Reserva de Biosfera (MAB) denominada Las Yungas, ubicada entre los 22–24°S y 64–68°O, en las provincias de Salta y Jujuy, con una superficie de 1.328.700 ha.

system of protection, including 95 units distributed in 32 national parks, 48 natural reserves, and 15 natural monuments. Paraguay has 5.2% of the surface of the country in parks or reserves, including 15 national parks, a wildlife refuge, two resource managed reserves, and four private reserves. These percentages decrease to approximately 1.6% in Uruguay and 0.70% in southern Brazil.

North-Central Wet Andes (Tucumán Bolivian Forest or Yungas)

Although the "Yungas" represents less than 0.1% of Argentinean territory, it possesses about 50% of its biodiversity. The rugged terrain and the scant level terrain available for agriculture have worked together to maintain them in a natural condition suitable for conservation. There are a total of 20 protected areas in the Yungas, accounting for ca. 317,024 ha., around 13% of the biome of Argentina. However, the expansion of the agricultural frontier is transforming the piedmont into cultivated fields that are starting to put pressure on the remnants of mountain forest. Within the sector Oranense are found the Baritú (72,439 ha.) and Calilegua (76,306 ha.) national parks; within that of Tucumanense Parque Nacional El Rey (44,162 ha.) and the Parque Biológico Sierra de San Javier (14,174 ha.), together with other minor provincial reserves (Santa Ana, 20,000 ha., and La Florida, 9882 ha.). The Montane Forests are scarcely represented in these reserves whereas the piedmont forests are not represented on any reserve (Brown, 1995). The Reserva de Biosfera (MAB), Las Yungas, located between 22–24°S and 64–68°W, was established in 2002, with a total surface of 1,328,700 ha.

Cerrado

Se trata de una de las sabanas con mayor biodiversidad del mundo, considerada como uno de los 25 sitios de gran interés para conservar. Posee un alto nivel de endemismo de plantas vasculares, en el orden del 44% de su flora. Actualmente se estima que sólo el 20% de la superficie del Cerrado se mantiene sin perturbaciones, debido a la actividad agropecuaria que se ha incrementado drásticamente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Recientemente se establecieron 87 áreas prioritarias de conservación para el Cerrado en Brasil, entre ellas Jaguariaíva y Sengés en el estado de Paraná. El área protegida más grande en este estado es el Parque Estadual do Cerrado con sólo 430 ha (Cavalcanti & Joly, 2002). En Brasil, menos del 1.5% del Cerrado se encuentra bajo algún sistema de protección. En territorio paraguayo se ha establecido el Parque Nacional Paso Bravo (100.300 ha), ubicado en el departamento de Concepción, en la ribera este del Río Paraguay al sur del Río Apa. Este parque constituye una de las áreas protegidas mejor conservadas dentro de esta región a nivel global. También se encuentra vegetación de Cerrado en el extremo noreste de la Reserva del Bosque Mbaracayú.

Bosque Atlántico (Selva Paranense)

Se trata del *hotspot* más devastado y amenazado del planeta (un *hotspot* es un sitio de gran riqueza específica que ha sufrido más del 70% de reducción de su área original). En el pasado ocupaba más de 1.500.000 millones de km^2, conservándose en la actualidad sólo el 7% de la cubierta original. El grado de fragmentación que ha sufrido el Bosque Atlántico es tan considerable que han quedado muy pocos sectores con vegetación intacta y superficie suficiente para asegurar el desarrollo de especies que requieren grandes extensiones para sostener sus poblaciones (Galindo-Leal & Gusmão Câmara, 2003). La historia de la devastación de este ecosistema es de larga data incluso desde épocas precolombinas, pero se ha acelerado exponencialmente durante el siglo XX debido al crecimiento demográfico y la expansión de las urbes y la frontera agropecuaria, la industrialización, la introducción de especies exóticas y la indiscriminada actividad maderera que prácticamente terminó con los pinares de *Araucaria angustifolia* y otras "maderas duras" (Hueck, 1972; Chebez & Hilgert, 2003; Gusmão Câmara, 2003). Ante esta situación se hace evidente la necesidad de contar con áreas protegidas que representen este ecosistema de forma urgente y si bien en los últimos años se han creado numerosas de ellas, la mayoría son muy pequeñas, no cuentan con los recursos suficientes o carecen de pautas de manejo adecuadas. En la provincia de Misiones (Argentina) se cuentan 29 áreas protegidas, que cubren unas 187.000 ha. Sólo dos de estas áreas son de jurisdicción federal; una de ellas, el Parque Nacional Iguazú (67.620 ha),

Cerrado

This treats one of the savannas with the highest level of biodiversity in the world and considered to be one of the 25 sites of greatest interest for conservation. It possesses a high level of endemism for vascular plants, on the order of 44% of its flora. Actually, it is estimated that only 20% of the surface of the Cerrado is maintained without disturbances from agricultural and ranching activity, which has increased drastically beginning in the second half of the twentieth century. Recently, 87 priority areas for conservation were established in the Cerrado in Brazil, among them Jaguariaíva and Sengés in the state of Paraná. The largest protected area in this state is the Parque Estadual do Cerrado with only 430 ha. (Cavalcanti & Joly, 2002); Brazil has less than 1.5% of the Cerrado under any protected system. Paraguay has recently established the Parque Nacional Paso Bravo, with 100,300 ha., south of Rio Apa and bordering the Paraguay River in department Concepción. There is also cerrado vegetation in northwestern areas of the Reserva del Bosque Mbaracayú.

Atlantic Forest (Paranense Forest)

This treats the hotspot that is the most devastated and threatened of the planet (a hotspot is a site of great species richness that has suffered more than 70% reduction of its original area). In the past, it occupied more than 1,500,000 millon km^2, conserving at present only 7% of its original cover. The amount of fragmentation that the Atlantic Forest has suffered is so considerable that very few sectors are left with intact vegetation and sufficient surface to ensure the development of species that require large extensions to sustain their populations (Galindo-Leal & Gusmão Câmara, 2003). The history of the devastation of this ecosystem is of lengthy duration from pre-Colombian epochs, but has accelerated exponentially during the twentieth century due to demographic growth and the expansion of cities, agricultural and ranching frontiers, industrialization, the introduction of exotic species, and the indiscriminant lumber activity that practically terminated the "pinares" of *Araucaria angustifolia* and other hardwood species (Hueck, 1972; Chebez & Hilgert, 2003; Gusmão Câmara, 2003). This situation makes it evident that it is necessary and urgent to establish protected areas in this ecosystem. The ones that have been established are a good start, but the majority of them are very small, do not have sufficient resources, and are lacking guidelines for management. A total of 29 protected areas are present in Misiones, Argentina, covering ca. 187,000 ha.; only two of these areas are under federal jurisdiction, the most important

es el único parque de superficie considerable que cuenta con condiciones óptimas de manejo. El resto de las áreas son de jurisdicción provincial (118.728 ha), siendo la más extensa el Parque Provincial Urugua-í (84.000 ha). En los departamentos de San Pedro y Guaraní (Misiones), se encuentra la Reserva de Biosfera Yabotí (253.773 ha) que se extiende principalmente sobre tierras privadas donde se tiende a promover la explotación maderera en forma ordenada. En Brasil, el extremo oeste del estado de Paraná, en la frontera con Argentina y adyacente al Parque Nacional Iguazú, se encuentra el Parque Nacional do Iguaçu (185.262 ha), que forma un continuo ambiental con éste. En el estado de Rio Grande do Sul prácticamente no existe selva atlántica prístina, a excepción de la correspondiente al Parque Florestal Estadual do Turvo (17.491 ha), sobre el Río Uruguay, en la frontera con Argentina, frente al Parque Provincial Moconá (1000 ha), en el este de la provincia de Misiones. En Paraguay, sobre la serranía de San Rafael al sur del departamento Caazapá y al norte del de Itapuá, se encuentra la Reserva de Recursos Manejados San Rafael (73.000 ha), que constituye la mayor área silvestre protegida de Bosque Atlántico en ese país. También merece mención la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (65.000 ha), en el departamento Canindeyú, que incluye comunidades representativas del Bosque Atlántico Interior o Paranense. Frente al problema de la gran fragmentación del hábitat es necesaria la creación de corredores de biodiversidad que integren a dichas áreas protegidas y sus sectores aledaños, proveyendo conectividad y continuidad de paisajes. En el área del proyecto existen actualmente dos corredores que contienen amplios sectores de selvas bien conservadas. El Corredor de la Serra do Mar que se extiende a lo largo de la franja costera de los estados de Rio de Janeiro y Paraná e incluye los mayores remanentes de Bosque Atlántico en las laderas y cumbres de las sierras costeras, junto con otras comunidades costeras características como las restingas (Pires Aguiar et al., 2003). El Corredor Verde del norte y este de la provincia de Misiones (Argentina), creado por iniciativa de conservacionistas locales y aprobado por una ley provincial de 1999 con el propósito de asegurar el manejo sustentable de 1.100.000 ha de selvas bien conservadas (Chebez & Hilgert, 2003).

Desierto Chileno-Peruano

Los ecosistemas característicos del Desierto Chileno se encuentran en general bien conservados debido a que los caminos y accesos se han construido durante las últimas décadas; estos caminos están asociados principalmente a la actividad minera. Sin embargo, se prevé que esta actividad minera tendrá un impacto negativo sobre la vegetación, conjuntamente con el sobrepastoreo caprino y el comercio indebido de diversas cactáceas y bulbosas exclusivas de estos desiertos. Se estima que el desierto de Atacama alberga unas 550 especies de plantas vasculares (cerca del 10% de la flora

is Parque Nacional Iguazú (67,620 ha.). The remaining 118,728 ha. are under provincial jurisdiction; the biggest is Parque Provincial Urugua-í with 84,000 ha. The Reserva de Biosfera Yabotí, with 253,773 ha., has recently been established in the departments of San Pedro and Guaraní (Misiones) on mostly private lands, where there is a tendency to promote organized timber extraction. In Brazil, in the western extreme of the state of Paraná and adjacent to Parque Nacional Iguazú of Argentina is Parque Nacional do Iguaçu (185,262 ha.). In Rio Grande do Sul is Parque Florestal Estadual do Turvo (17,491 ha.), which is on the Rio Uruguay and near Parque Provincial Moconá (1000 ha.), in the province of Misiones, Argentina. Two areas of Atlantic Forest are protected in Paraguay: Reserva de Recursos Manejados San Rafael (73,000 ha.) in the Serranía de San Rafael in southern Caazapá and northern Itapúa, and Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (65,000 ha.), in department Canindeyú, which includes communities that represent Atlantic Forest or Paranense. Because of the problem of great fragmentation of habitat, it is necessary to create corridors of biodiversity that link the protected areas and their surrounding sectors, thus providing connectibility and continuation of the landscape. In the project area, there are two corridors that contain broad sections of forest that are conserved. The first is the Corredor de la Serra do Mar that extends the length of the coastal fringe in the states of Rio de Janeiro and Paraná in Brazil and includes the major remnants of the Atlantic Forest on the slopes and crests of the coastal sierras, along with other characteristic coastal communities such as the restingas (Pires Aguiar et al., 2003). The second is the Corredor Verde in the northern and eastern part of the province of Misiones in Argentina. The latter was created by initiative of local conservationists and approved by a provincial law in 1999, with the purpose of assuring sustainable management of 1,100,000 ha. of the forests that were conserved (Chebez & Hilgert, 2003).

Chilean-Peruvian Desert

The ecosystems characteristic of the Chilean desert are generally well conserved, due to the roads and accesses that have been constructed during the last decades, associated principally with mining activities. Nevertheless, it is foreseen that this mining activity will negatively impact the vegetation, along with overgrazing by goats and illegal commercialization of the diverse cactus and unique bulbs of these deserts. It is estimated that the Atacama Desert harbors some 550 species of vascular plants (nearly 10% of continental Chilean flora), the majority of which are endemic to it, making the conservation of the Atacama Desert a

continental chilena), la mayoría de las cuales son endémicas de estos desiertos, motivo por el cual su conservación es prioritaria. Se cuenta con el Parque Nacional Pan de Azúcar (43.769 ha), Parque Nacional Llanos de Challe (45.708 ha) en el sector costero de la Región de Atacama y, con el objetivo de proteger la vegetación de "lomas" se ha establecido la Reserva Nacional La Chimba (2583 ha) a 15 km al norte de Antofagasta (Dillon & Hoffmann-J., 1997).

Andes Secos Sur-Centrales

Tal como se ha descrito anteriormente, esta región comprende regiones áridas de la Prepuna, Puna y sectores más elevados de los Andes, incluyendo un número importante de especies endémicas. Sin embargo, existen pocas áreas naturales bajo algún régimen de protección. En Argentina, la Administración de Parques Nacionales cuenta con los Parques Nacionales El Leoncito (74.000 ha) y San Guillermo (170.000 ha) en la provincia de San Juan, y el Parque Nacional Los Cardones (65.000 ha) en Salta. En estos parques es posible encontrar vegetación de Puna y Altoandina junto con la vegetación típica de Monte, a elevaciones menores. También existen reservas de biosfera que incluyen sectores de puna y altoandinos: Laguna Blanca (770.000 ha), Catamarca; Laguna de los Pozuelos (364.000 ha), Jujuy; y San Guillermo (811.460 ha), San Juan. En la República de Chile se destacan los Parques Nacionales Lauca (137.883 ha) que comprende el altiplano de la región de Tarapacá, Volcán Isluga (174.744 ha), y Nevado Tres Cruces (59.081 ha) con vegetación de vegas altoandinas.

Pampas

Se trata de un territorio de gran aprovechamiento agrícola y ganadero, de modo que la vegetación original ha sido destruida en casi su totalidad y sustituida por especies de cultivo, o bien muy alterada por el pastoreo intensivo. No existe prácticamente ningún área relevante protegida en la Argentina, Uruguay y el sur del Brasil. Así, en las Pampas de la Argentina sólo hay 140.000 ha incluidas dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, o sea únicamente un 0,3% de la superficie de esta región (APN 1998 en Burkart, 1999). Además, prácticamente no hay ningún área protegida de carácter federal dedicada a la conservación de pastizales naturales (Bilenca & Miñarro, 2004). En Uruguay, sólo siete de las 35 áreas protegidas del país incluyen en forma parcial comunidades de pradera, y cubren una superficie cercana a las 35.000 ha, o sea un exiguo 0,21% del territorio uruguayo (Bilenca & Miñarro, 2004). Finalmente, en Rio Grande do Sul, Brasil, hay unas 62.000 ha de unidades de conservación, lo que equivale a un 0,36% de la superficie de ese estado (Bilenca & Miñarro, 2004).

priority. Among the protected areas in this region are the Parque Nacional Pan de Azúcar (43,769 ha.) and Parque Nacional Llanos de Challe (45,708 ha.) in coastal areas of Atacama. Also, with the objective of protecting the vegetation of the "lomas," the Reserva Nacional La Chimba, 15 km north of Antofagasta, has recently been created (Dillon & Hoffmann-J., 1997).

South-Central Dry Andes

As previously described, this region includes a significant number of species endemic to arid and semi-arid areas. However, there are only a few natural areas under any kind of protection. In Argentina, the Administración de Parques Nacionales has the following parks: El Leoncito (74,000 ha.) and San Guillermo (170,000 ha.) national parks in San Juan, and the Parque Nacional Los Cardones (65,000 ha.) in Salta. High-Andean and Puna vegetation can be found in these parks at higher elevations, while Monte vegetation is present at lower altitudes. Biosphere Reserves were also established in Argentina: Laguna Blanca (770,000 ha.) in Catamarca, Laguna de los Pozuelos (364,000 ha.) in Jujuy, and San Guillermo (811,460 ha.) in San Juan. Similar areas in Chile are Parque Nacional Lauca (137,883 ha.), covering high-Andean vegetation of Tarapacá, Volcán Isluga (174,744 ha.), and Nevado Tres Cruces (59,081 ha.), with a good representation of high-Andean meadows.

Pampas

This treats a territory greatly used for agriculture and livestock, in which the original vegetation has been almost totally destroyed and replaced with cultivated species, or much altered by intensive grazing. Protected areas in Argentina, Uruguay, and southern Brazil are practically nonexistent. In the Pampas of Argentina there are only 140,000 ha. included within the System of Natural Protected Areas, or only 0.3% of the surface area of this region (APN, 1998 in Burkart, 1999); furthermore, there are practically no protected areas of federal category dedicated to the conservation of natural grasslands (Bilenca & Miñarro, 2004). In Uruguay, only seven of the 35 protected areas of the country include, in partial form, communities of prairies and cover approximately 35,000 ha., or about 0.21% of Uruguayan territory (Bilenca & Miñarro, 2004). Finally, in Rio Grande do Sul, Brazil, there are some 62,000 ha. of conservation units, which equal some 0.36% of the surface area of this state (Bilenca & Miñarro, 2004).

Chile Mediterráneo (Chile Central)

En esta zona se encuentran los mejores suelos para cultivo de Chile, resultando su vegetación muy afectada por la práctica agropecuaria desde tiempos pasados. Grandes áreas de bosques y matorrales han sido desmontadas para el establecimiento de las urbanizaciones (cerca de 10.000.000 de personas, aproximadamente el 80% de la población chilena, vive en esta zona central del país). Igualmente, la intensa actividad minera, la construcción de caminos, la deposición de residuos y la contaminación han afectado directamente a la vegetación (Hoffmann-J. & Herrera-McBryde, 1997). La palma chilena (*Jubaea chilensis*) fue llevada al borde de la extinción debido a la explotación de la savia azucarada que se extrae de sus troncos (Grau, 1995). La región mediterránea de Chile es una de las menos representadas dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del país. Las principales áreas protegidas son: Reserva Nacional Las Chinchillas (4229 ha), Parque Nacional La Campana (8000 ha), Reserva Natural Lago Pañuelas (9260 ha), Reserva Natural Río Blanco (10.175 ha), Santuario de la Naturaleza Yerba Loca (11.600 ha), Reserva Natural Río Clarillo (10.185 ha), Parque Nacional Las Palmas de Cocalán (3709 ha), y Reserva Natural Río de los Cipreses (36.882 ha). A través de estas áreas protegidas no es posible conservar adecuadamente la vegetación de la región mediterránea chilena.

Monte

El Monte en Argentina ha sido significativamente alterado por el sobrepastoreo que ha generado desertificación en varios sectores. La densidad de población en el Monte es relativamente baja. Sin embargo, otros sectores han sido modificados mediante sistemas de riego en áreas de cultivo, fundamentalmente en lo que a viñedos se refiere en las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y Salta en Argentina. Existen 26 áreas protegidas que cubren unas 1.758.862 ha. Sin embargo, éstas no parecen ser suficientes para asegurar la representividad biogeográfica de esta unidad y sólo la quinta parte de ellas posee un manejo entre aceptable y óptimo. Entre estas áreas se destacan los Parques Nacionales Talampaya (215.000 ha) en la provincia de La Rioja, San Guillermo (170.000 ha) y el Leoncito (74.000 ha) en San Juan, Sierra de las Quijadas (150.000 ha) en San Luis y la Reserva Provincial de Usos Múltiples Valle Fértil (800.000 ha) en San Juan. Además existe la Reserva de Biosfera Ñacuñán (12.271 ha) en los departamentos de Santa Rosa y La Paz, en la provincia de Mendoza.

Mediterranean Chile (Central Chile)

In this zone, the best soils for cultivation in Chile are found. This has resulted in its vegetation having been affected by agricultural and livestock practices for some time. Large areas of forests and matorrals have been used for the establishment of the urban areas (nearly 10,000,000 persons, approximately 80% of the Chilean population, live in this central zone of the country). Also, the intense mining activity, the construction of roads, the deposition of residues, and the resulting contamination have directly affected the vegetation (Hoffmann-J. & Herrera-McBryde, 1997). The Chilean palm (*Jubaea chilensis*) nearly became extinct because of the exploitation of the sugary sap that was extracted from its trunks (Grau, 1995). The Chilean Mediterranean region is one of the least represented within the National System of Protected Wildlife Areas in the country. The principal protected areas are the Reserva Nacional Las Chinchillas (4229 ha.), the Parque Nacional La Campana (8000 ha.), the Reserva Natural Lago Pañuelas (9260 ha.), the Reserva Natural Río Blanco (10,175 ha.), the Santuario Natural Yerba Loca (11,600 ha.), the Reserva Natural Río Clarillo (10,185 ha.), the Parque Natural Las Palmas de Cocalán (3709 ha.), and the Reserva Natural Río de Los Cipreses (36,882 ha.). However, these protected areas do not adequately conserve the diverse types of vegetation of the Chilean Mediterranean region.

Monte

The principal threat to the vegetation of the Monte in Argentina is overgrazing due to sheep-raising, which has provoked desertification in many sections. Population density is relatively low in the Monte region. Nevertheless, parts of this region have been modified to transform it into cultivated areas, fundamentally in what is referred to as "viñedos" in the provinces of Mendoza, San Juan, La Rioja, and Salta in Argentina. There are a total of 26 protected areas in the region covering ca. 1,758,862 ha., which are insufficient to preserve the biogeographic diversity represented in this region, and which are generally poorly managed. Among these areas in Argentina are Parque Nacional Talampaya (215,000 ha.) in the province of La Rioja, San Guillermo (170,000 ha.) and Leoncito (74,000 ha.) in San Juan, Sierra de las Quijadas (150,000 ha.) in San Luis, and the Reserva Provincial de Usos Multiples Valle Fértil (800,000 ha.) in San Juan. Finally, there is the Reserva de Biosfera Ñacuñán, with 12,271 ha., in the departments of Santa Rosa and La Paz in Mendoza.

Patagonia

La principal amenaza para la vegetación en esta región es el sobrepastoreo debido a la cría de ovejas, la que ha provocado desertificación en amplios sectores. En la Patagonia, la densidad poblacional es relativamente baja. Considerando su gran extensión existen muy pocas áreas protegidas que se correspondan estrictamente con la Patagonia como unidad. Bajo la jurisdicción federal argentina sólo se encuentran el Parque Nacional Laguna Blanca (8200 ha) y la adyacente Reserva Natural Laguna Blanca (3000 ha) en la provincia de Neuquén, el Parque Nacional Monte León (60.800 ha) y el Monumento Natural Bosques Petrificados (10.000 ha) en la provincia de Santa Cruz, que conservan bosques petrificados del periodo Jurásico. Hacia la Cordillera de los Andes, diversos parques y reservas cubren amplios sectores de bosques andino-patagónicos y de estepa patagónica como el Parque Nacional Lanín que incluye unas 195.000 ha de estepa y el Parque Nacional Perito Moreno unas 33.000 ha. En la meseta de Somuncurá, provincia de Rio Negro, se ha establecido un área natural protegida por la provincia (1.600.000 ha) en un sector de gran endemismo que comprende sectores de Monte y de Patagonia. Sin embargo, el control y manejo de esta reserva es muy bajo. Se ha propuesto crear una reserva de usos múltiples en el este de la península Valdés, provincia de Chubut (360.000 ha) (Villamil, 1997).

Chaco

Esta unidad se encuentra muy alterada por la intensa actividad forestal y la ganadería, y en muchas zonas no sólo ha desaparecido el bosque primitivo sino incluso el estrato herbáceo, quedando sólo arbustos espinosos, bromélias y cactus (Cabrera & Willink, 1980). La destrucción de los bosques chaqueños de "quebracho" (diversas especies de *Schinopsis,* principalmente *S. lorentzii*) se inició a fines del siglo XIX debido que estos bosques poseen maderas duras y resistentes que son combustible de alto valor calorífico. La destrucción se ha intensificado desde mediados del siglo XX por la extracción de sus taninos. A pesar de la aridez, la actividad pastoril que se remonta a tiempos de la colonia ha causado grandes daños sobre la vegetación. La Argentina cuenta con más de 60 áreas protegidas en el Chaco (incluyendo el espinal), que cubren más de 3.000.000 ha, aunque representan sólo el 3,5% del bioma en ese país. Entre los distintos tipos, el Chaco Húmedo es el que se encuentra más escasamente representado con menos del 4% de la superficie bajo protección. Se pueden mencionar en zonas subhúmedas, el Parque Nacional Chaco (14.981 ha), el Parque Nacional Río Pilcomayo (47.000 ha) en la provincia de Formosa, y la Reserva Nacional Natural Formosa (9005 ha) en el sudoeste de esa provincia. En la zona del Chaco Seco se encuentran la Reserva de Biosfera Teuquito (72.000 ha) en Formosa, y el Parque Nacional Copo (114.250 ha) en Santiago del Estero. Paraguay cuenta con cuatro parques

Patagonia

The main threat to Patagonia vegetation is overgrazing due to sheep-raising, which has provoked desertification in many sections. Population density is also relatively low in Patagonia. There are few protected areas that correspond strictly with Patagonia as a unit. A few of these units are under federal jurisdiction in Argentina. These are the Parque Nacional Laguna Blanca (8200 ha.) and the adjacent Reserva Natural Laguna Blanca (3000 ha.) in the province of Neuquén, and Parque Nacional Monte León (60,800 ha.) and Monumento Natural Bosques Petrificados (10,000 ha.) in the province of Santa Cruz, which conserve petrified forests from the Jurassic Period. Toward the Andes, several parks and reserves include huge sectors of subantarctic forests and portions of the Patagonian steppe, such as the Parque Nacional Lanín with ca. 195,000 ha. of steppe and Parque Nacional Perito Moreno with ca. 33,000 ha. A natural protected area with 1,600,000 ha. has been established in Meseta de Somuncurá. It includes several endemics and vegetation of both Monte and Patagonia; however, it should be mentioned that this natural protected area has no management at all. Finally, it has been proposed that a multiple use reserve be created in eastern Valdés Peninsula, province of Chubut (360,000 ha.) (Villamil, 1997).

Chaco

The Chaco is very altered by intense forestry and ranching activity, and in many zones the primary forest and the herbaceous strata have disappeared, leaving only spinose shrubs, bromeliads, and cactuses (Cabrera & Willink, 1980). The destruction of the Chaco forests of "quebracho" (diverse species of *Schinopsis,* principally *S. lorentzii*) was initiated at the end of the nineteenth century because of the hardness and resistance of its wood and its properties as a fuel of high caloric value. This destruction has intensified since the middle of the twentieth century for extraction of its tannins. In spite of its aridity, pastoral activity dating back to colonial times has caused great damage to the vegetation. In this region nearly 60 protected areas are present in Argentina, including the "espinal," covering ca. 3,000,000 ha.; this represents only about 3.5% of the biome in that country. A few parks are present in the semi-humid zone, among them Parque Nacional Chaco (14,981 ha.), Parque Nacional Río Pilcomayo (47,000 ha.) in Formosa, and Reservas Nacional Natural Formosa (9005 ha.) in southwestern Formosa. In total these parks account for less than 4% of protected areas. In the dry Chaco the reserves include the Reserva de Biosfera Teuquito (72,000 ha.) in Formosa, and the Parque Nacional Copo (114,250

nacionales en ecosistemas chaqueños que ocupan 1.600.000 ha, lo que representa aproximadamente el 5% del Chaco Paraguayo. El Parque Nacional Tinfunqué (280.000 ha) ocupa sectores húmedos, mientras que en zonas subhúmedas a semi-áridas se encuentra el Parque Nacional Defensores del Chaco (780.000 ha) el de mayor extensión, que incluye el Cerro León (70.000 ha); otro parque, en la zona semi-árida es el Parque Nacional Teniente Agripino Enciso con 40.000 ha.

Pacífico Templado Húmedo (Bosques Subantárticos)

Se trata de la única región biogeográfica con un nivel muy satisfactorio de protección estricta. En Argentina existen más de 40 áreas bajo algún régimen de protección. Los parques y reservas de jurisdicción federal cubren unas 2.300.000 ha, de las cuales aproximadamente 500.000 corresponden a los hielos continentales. Además, deben computarse otras 120.000 ha que corresponden a reservas y parques provinciales, monumentos naturales, reservas privadas, etc. Los parques nacionales más significativos son: Lanín (412.003 ha) en la provincia de Neuquén, Nahuel Huapi (712.160 ha) en Neuquén y Río Negro, Lago Puelo (23.700 ha) y Los Alerces (26.300 ha) en Chubut, Los Glaciares (717.800 ha) y Perito Moreno (115.000 ha) en Santa Cruz y Tierra del Fuego (63.000 ha) en la provincia del mismo nombre. En Chile la situación es aún más favorable, el Sistema Nacional de Áreas Protegidos del país cuenta con unas 50 áreas protegidas y más de 10.000.000 ha en esta región, aunque es preciso aclarar que gran parte de esa superficie está ocupada por los denominados campos de hielo y glaciares, tal como acontece en los Parques Nacionales Bernardo O'Higgins, Laguna San Rafael o Alberto de Angostini. Otras áreas están destinadas a proteger la fauna marina de las islas fueguinas o la vegetación de turberas. Además están los Parques Nacionales Conguillio (60.833 ha) y Puyehue (106.772 ha) donde pueden observarse bosques de "pehuén" (*Araucaria araucana*), Vicente Pérez Rosales (231.000 ha) y Chiloé (43.057 ha) en los que se desarrollan bosques siempreverdes, y el Parque Nacional Hornopirén (48.232 ha) con bosques de "alerce" (*Fitzroya cupressoides*) y "lenga" (*Nothofagus pumilio*), entre otros.

El Archipiélago Juan Fernández fue declarado parque nacional y reserva de la biósfera. Su flora nativa se encuentra seriamente amenazada, principalmente por la introducción de especies exóticas muchas de las cuales se han convertido en especies invasoras. Actualmente cerca del 50% de la flora del archipiélago es introducida (Stuessy et al., 1997; Marticorena et al., 1998). Además, la erosión es intensa sobre los suelos volcánicos que son fácilmente fragmentados por el viento, el agua y la actividad biótica. Por estas cuestiones puede considerarse que su flora endémica se encuentra amenazada (cfr. Stuessy et al., 1997).

ha.) in Santiago del Estero. Paraguay has four national parks in Chacoan ecosystems with a total of 1,600,000 ha. and approximately 5% of the Paraguayan Chaco. These parks are Parque Nacional Tinfunqué (280,000 ha.) in semi-humid habitats, while in semi-humid to semi-arid zones there are Parque Nacional Defensores del Chaco (780,000 ha.), which includes the Cerro León (70,000 ha.), and Parque Nacional Teniente Agripino Enciso (40,000 ha.)

Wet-Temperate Pacific (Sub-antartic Forests)

This is the only biogeographic region treated here that has satisfactory coverage of protected areas. In Argentina there are more than 40 areas with some kind of protection. The parks and reserves under federal jurisdiction cover more than 2,300,000 ha., 500,000 of which are part of the continental ice sheet. Additionally, there are another 120,000 ha. of reserves, parks, and natural monuments under provincial or private protection. The most significant parks and reserves are Parque Nacional Lanín (412,003 ha.) in Neuquén, Parque Nacional Nahuel Huapi (712,160 ha.) in Neuquén and Rio Negro, Lago Puelo (23,700 ha.) and Los Alerces (26,300 ha.) in Chubut, Los Glaciares (717,800 ha.) and Perito Moreno (115,000 ha.) in Santa Cruz, and Tierra del Fuego (63,000 ha.) in Tierra del Fuego. There are even more protected areas in Chile with approximately 50 parks and reserves with a total of 10,000,000 ha., although a good portion of this territory is covered by continental ice, i.e., in Bernardo O´Higgins, Laguna San Rafael, and Alberto de Angostini national parks. Other areas were established to preserve the marine fauna of the islands or the "turbera" vegetation. Among the parks present in the country are Conguilio (60,833 ha.) and Puyehue (106,722 ha.) national parks, where there are "pehuén" forests (*Araucaria araucana*), Vicente Pérez Rosales (231.000 ha.) and Chiloé (43.057 ha.), where there are evergreen forests, and Parque Nacional Hornopirén (48.232 ha.) where there are "alerce" (*Fitzroya cupressoides*) and "lenga" (*Nothofagus pumilio*) forests, among others.

The Juan Fernández Archipelago was declared a national park and biosphere reserve. Its native flora is severely threatened, principally by the introduction of exotic species, many of which have become very invasive. Close to 50% of the archipelago flora is introduced (Stuessy et al., 1997; Marticorena et al., 1998). Furthermore, erosion is intense on volcanic soils that are easily fragmented by the wind, water, and biotic activity. Because of this the endemic flora is considered threatened (cf. Stuessy et al., 1997).

VI. FORMATO DEL CATÁLOGO

El lenguaje utilizado en el *Catálogo* es el español. Se incluye una versión en inglés de las paginas introductorias. Como se mencionó anteriormente, la información utilizada para la realización del presente trabajo se ingresó a la base de datos relacional IRIS®. Esta base de datos incluye información sobre familias, géneros, especies y categorías infraespecíficas, indicando si los taxones son nombres aceptados o sinónimos. Los nombres aceptados incluyen referencias bibliográficas, datos de hábito, ciclo de vida, estatus, elevación, distribución geográfica por país y por cada división política mayor (dentro de cada país), y se cita un espécimen de herbario para cada país. Los sinónimos se hallan cruzados con su correspondiente nombre aceptado.

En el Apéndice I (Volumen 3, pp. 3315–3340) se presenta la lista de los géneros y familias citados en este *Catálogo*.

La información florística existente en la base de datos esta disponible en línea (www.darwin.edu.ar) y se mantendrá actualizada a medida que nuevos cambios taxonómicos o nuevos registros para el área de estudio sean publicados. En la versión impresa de este *Catálogo* se incluyen novedades hasta aproximadamente el mes de octubre de 2006.

VI. FORMAT OF THE CATALOGUE

The language used in the *Catalogue* is Spanish with an English version of the introductory pages. As was mentioned earlier, the information in the present work is incorporated into the relational database IRIS. This database includes information about families, genera, species, and infraspecific taxa, indicating if the taxa are accepted names or synonyms. Entries for accepted names include bibliographic references, habit information, life cycle, status, elevation, geographical distribution by country and for each major political division within each country, and an example of an herbarium specimen for each political division. Entries for synonyms are cross-referenced to the corresponding accepted name.

Appendix I (Volume 3, pp. 3315–3340) lists the genera and families cited in this *Catalogue*.

The floristic information in the database is available online (www.darwin.edu.ar) and will be updated as new taxonomic changes or new information for the study area are published. In the printed version of this *Catalogue* novelties are included until approximately October 2006.

Ejemplos del Formato. ***Examples of Format.***	**Explicación del Formato.** ***Explanation of Format.***
FABACEAE	FAMILIA. *FAMILY NAME.*
Coordinador: Fortunato, R. H.	Coordinador(es). *Coordinator(s).*
Autores: Beyhaut, R. (Uruguay), Costa Bortoluzzi, R. L. (Caesalpinioideae del Sur de Brasil), Fortunato, R. H. (*Andira* del Sur de Brasil), Gómez-Sosa, E. V. (*Astragalus*), Izaguirre, P. (Uruguay), Lima, H. C. (*Acosmium, Amburana, Andira, Centrolobium, Dalbergia, Holocalyx, Machaerium, Myrocarpus, Myroxylon, Ormosia, Platypodium, Pterocarpus, Riedeliella, Sweetia* y *Zollernia* del Sur de Brasil), Miotto, S. T. S. (Papilionoideae del Sur de Brasil), Moura Baptista, L. R. (Mimosoideae del Sur de Brasil) y Ulibarri, E. A. (*Adesmia, Caesalpinia, Hoffmannseggia, Pomaria* y *Cercidium*).	Autor(es). *Author(s).*
Revisores: Lewis, G. P. (*Anadenanthera* y *Diptychandra*), Pennington, T. D. (*Inga*), Rico, L. (*Acacia*, Ingeae excepto *Inga*), Schrire, B. D. (*Indigofera*) y Tozzi, A. M. G. A. (*Lonchocarpus* y *Machaerium*).	Revisor(es). *Reviewer(s).*
154 géneros, 1324 especies, 617 especies endémicas, 107 especies introducidas.	Número de géneros, especies, especies endémicas, especies introducidas. *Number of genera, species, endemic species, introduced species.*

Ejemplos del Formato (Continuación). ***Examples of Format (Continued).***	**Explicación del Formato (Continuación).** ***Explanation of Format (Continued).***
Acacia Mill.	Género con abreviatura(s) de autor(es). *Genus name with abbreviation(s) of author(s).*
Número de especies: 36, 7 endémicas, 6 introducidas	Número de especies, especies endémicas y especies introducidas. *Number of species, endemic species, and introduced species.*
Acacia martii Benth.	Taxón aceptado con sigla(s) de autor(es). *Accepted taxon name with abbreviation(s) of author(s).*
Sin.: *Acacia paniculata* Willd. var. *martii* (Benth.) Hassl., *Manganaroa martii* (Benth.) Speg., *Manganaroa paniculata* (Willd.) Speg. var. *paraguayensis* Speg.	Sinónimos. *Synonyms.*
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1904; Cialdella, A. M., 1984; Spegazzini, C. L., 1923a.	Referencias bibliográficas. *Bibliographic references.*
Arbusto. Nativa. 0–500 m.	Habito (y ciclo de vida), estatus, elevación. *Habit (and life cycle when appropriate), status, elevation.*
Países: ARG(FOR); PRY(CON, PHA).	Distribución: lista de las abreviaturas usadas para los países y entre paréntesis "( )" las abreviaturas para los estados, departamentos, provincias o regiones. *Distribution: list of country abbreviations and after each a parenthesis "( )" with the abbreviations of the states, departments, provinces, or regions.*
Ejemplares de Referencia: ARG[*Muello s.n.* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 7443* (G)].	Especímenes de herbario, al menos uno por país. *Herbarium specimen, at least one per country.*
Acacia paniculata Willd. var. *martii* (Benth.) Hassl. = **Acacia martii** Benth.	Sinónimo, se indica como referencia cruzada del taxón aceptado. *Synonym followed by cross-reference to accepted taxon name.*
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.	Referencias bibliográficas donde se indica la sinonimia. *Bibliographic references supporting the synonymy.*
[Acacia riparia Kunth f. intermedia Hassl.]	Nombres dudosos o mal interpretados y taxones excluidos entre corchetes "[ ]." *Doubtful, misinterpreted, or excluded taxon name listed within brackets "[ ]."*
Notas: Nombre dudoso.	Nota explicando por qué el nombre va en corchetes. *Note explaining why name is in brackets.*

Información Adicional del Formato

1. El nombre de la familia se presenta en mayúsculas y **negritas** y a continuación el nombre(s) del autor(es) y revisor(es) del tratamiento. Se presenta el número de géneros, especies, especies endémicas y especies introducidas incluidas en el *Catálogo*. Todos los conteos se realizaron automáticamente, no siendo responsabilidad del autor.
2. El nombre del género incluyendo el autor se indica en **negritas**. Las siglas de los autores se indican según

Additional Information about Format

1. The name of the family is given in **bold** and all capital letters. This is followed by the name of the author(s) and reviewer(s) of the family in the *Catalogue*. The next line lists the number of genera, species, endemic species, and introduced species included in the *Catalogue*. All of the calculations of numbers were generated automatically, not by the author.
2. The name of the genus is given including its author in **bold.** The abbreviations of the authors follow

Brummitt & Powell (1992), *Authors of Plant Names*. A continuación se presenta el número de especies, especies endémicas y especies introducidas incluidas en el *Catálogo*.

3. Los nombres aceptados de las especies y taxones de rango infraespecífico se indican en **negritas**, debiendo haber sido confirmados por la bibliografía (punto 5) y/o por ejemplares de referencia (punto 11). Se incluyeron todos los nombres que fueron publicados sobre la base de material perteneciente al área (Argentina, sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) y los nombres utilizados en la literatura para la región.
4. Los sinónimos se indican en *bastardillas* debajo del nombre aceptado y se incluyen como referencias cruzadas. Se indica, en líneas generales, el basónimo y los sinónimos utilizados para el área (tanto en bibliografía como en la identificación de material de herbario).
5. Las referencias bibliográficas incluyen las contribuciones relevantes al taxón tratado, indicando autor(es) y fecha de publicación (en caso de que un autor haya publicado más de un trabajo en el mismo año, los mismos se distinguen con letras a continuación del año). La bibliografía citada en este punto se presenta en forma completa al final del *Catálogo* (Volumen 3, pp. 3315–3340). Los títulos de las revistas y series se abrevian de acuerdo a Lawrence et al. (1968), *B-P-H. Botanico-Periodico-Huntianum,* y a Bridson & Smith (1991), *B-P-H/S. Botanico-Periodico-Huntianum/Supplementum*. La mayoría de los títulos de los libros se citan completos, siguiendo las recomendaciones de Stafleu & Cowan (1976–1988) y Stafleu & Mennega (1992–1997) *Taxonomic Literature*.
6. Se indica el hábito de la planta: árbol, arbolito, arbusto, enredadera, epífita, hemiepífita, hierba (acuática, palustre, subleñosa, suculenta, etc.), liana, parásita, saprófita, subarbusto y combinaciones de los mismos (por ejemplo: subarbusto epífito, árbol o arbolito).
7. En el caso de las hierbas se indica el ciclo de vida de la planta, pudiendo tratarse de un ciclo anual, bianual, anual o bianual, anual o perenne, perenne.
8. Se indica el estatus nativo o introducido del taxón en relación a la distribución geográfica. El taxón puede ser endémico del área de estudio además de ser nativo.
9. La elevación se presenta en intervalos de 100 metros (por ejemplo, 200–800 m).
10. Se indica la distribución geográfica con acrónimos para los distintos países seguidos de acrónimos para las divisiones políticas por país (estados, provincias, departamentos o regiones). Ver la lista de acrónimos en página xc.
11. Se citan especímenes de herbario (al menos uno por cada país en que se encuentra el taxón). Para cada cita de material se indica apellido e iniciales del colector, número de colección (se aceptan letras si forman parte del número y se indica *s.n.* si el ejemplar carece de numeración) y herbarios donde están depositados. Los

Brummitt & Powell (1992), *Authors of Plant Names*. Following that is the number of species, endemic species, and introduced species included in the genus in this *Catalogue*.

3. Accepted names of the species and taxa of infraspecific rank are indicated in **bold**, and were confirmed by the bibliography (point 5) and/or by reference examples (point 11). It was attempted to include all of the names that have been published based on material from the area (Argentina, southern Brazil, Chile, Paraguay, and Uruguay) and the names used found in the regional literature.
4. Synonyms are indicated in *italics* below the accepted name and are included as cross references. The basionym is indicated, as well as the synonyms used in the bibliography and/or on herbarium material identifications for the area.
5. The bibliographic references include contributions relevant to the taxon treated, indicating author(s) and date of publication (in cases where an author has published more than one work in the same year, these are distinguished with letters following the year). The bibliographic citation is presented in complete form at the end of the *Catalogue* (Volume 3, pp. 3315–3340). The titles of the journals and series are abbreviated according to Lawrence et al. (1968), *B-P-H. Botanico-Periodicum-Huntianum*, and Bridson & Smith (1991), *B-P-H/S. Botanico-Periodicum-Huntianum/ Supplementum*. The majority of the book titles are cited following the recommendations of Stafleu & Cowan (1976–1988) and Stafleu & Mennega (1992–1997) *Taxonomic Literature*.
6. Indication of the habit of the plant: tree, small tree, shrub, vine, epiphyte, hemiepiphyte, herb (aquatic, marshy, semiwoody, succulent, etc.), liana, parasite, saprophyte, subshrub, and combinations of these (for example: epiphytic subshrub, tree, or small tree).
7. Indication of the life cycle, in the case of herbs: annual, biennial, annual or biennial, annual or perennial, perennial.
8. Indication of the native or introduced status of the taxon within the flora area; when endemic to the flora area, that word is used instead of native.
9. Elevation is presented in intervals of 100 meters (for example, 200–800 m).
10. Geographic distribution is indicated by a list of acronyms for countries, each followed by acronyms for the political subdivision (states, provinces, departments, or regions). Acronyms are given on page xc.
11. Reference herbarium specimens are cited (at least one per country in which the taxon is encountered). Each citation of material indicates the surname and initials of the collector, collection number (letters are included if part of the number and *s.n.* is used when the example lacks numeration), and herbaria where deposited. The acronyms of the herbaria follow Holmgren et al. (1990), *Index Herbariorum, Part I:*

acrónimos de los herbarios se indican según Holmgren et al. (1990), *Index Herbariorum, Part I: The Herbaria of the World.* Se incluyó un asterisco "*" en aquellos casos en que del ejemplar de referencia citado no pudo ser localizado.

12. En Notas se incluye brevemente toda la información relevante que el autor considere necesaria para aclarar aspectos taxónómicos y nomenclaturales, aclaraciones acerca de la distribución del taxón, etc.
13. Nombres mal interpretados o dudosos, citas dudosas, presencia probable de taxones en el área o taxones incluidos erróneamente sobre la base de material mal identificado aparecen entre corchetes "[ ]". Esta información es seguida por una nota donde se explica brevemente la situación incluyendo referencias bibliográficas si es necesario.

Otras Abreviaturas

auct. non = nombre erróneamente aplicado.
com. pers. = comunicación personal.
comb. illeg. = publicado como combinación ilegítima.
comb. superfl. = publicado como combinación superflua.
emend. = indica una modificación en los caracteres diagnósticos de un taxón; abreviatura seguida por el nombre del autor responsable de dicha modificación.
et al. = y otros.
ex = hace referencia al autor que ha publicado inválidamente un nombre y el autor que publicó el mismo válidamente.
f. = forma.
nom. cons. = nombre conservado en el *Código Internacional de Nomenclatura Botánica.*
nom. illeg. = nombre ilegítimo.
nom. inval. = publicado como nombre inválido.
nom. nud. = nombre no acompañado por una descripción válida.
nom. superfl. = publicado como nombre superfluo.
p.p. = en parte.
pro syn. = publicado como sinónimo.
subsp. = subespecie.
var.= variedad.

The Herbaria of the World. An asterisk "*" was used when a cited specimen could not be located.

12. Notes include briefly all the relevant information that the author considers necessary to clarify taxonomic and nomenclatural aspects, distribution of the taxon, etc.
13. Entries for doubtful or misinterpreted names or those cited erroneously elsewhere based on misidentified specimens appear inside brackets "[ ]". A note follows that briefly explains the situation, accompanied by bibliographic references, if necessary.

Other Abbreviations

auct. non = name erroneously applied.
com. pers. = personal communication.
comb. illeg. = published as an illegitimate combination.
comb. superfl. = published as a superfluous combination.
emend. = indicates a modification of the diagnostic characters of the taxon; abbreviation followed by the name of the author responsible for the modification.
et al. = and others.
ex = indicates that the author listed after the "ex" is the author of the validly published name but who attributed that name to the author listed before the "ex."
f. = form.
nom. cons. = name conserved in the *International Code of Botanical Nomenclature.*
nom. illeg. = illegitimate name.
nom. inval. = published as invalid name.
nom. nud. = name not accompanied by a valid description.
nom. superfl. = published as a superfluous name.
p.p. = in part.
pro syn. = published as a synonym.
subsp. = subspecies.
var. = variety.

ACRÓNIMOS PARA PAÍSES. *ACRONYMS FOR COUNTRIES.*

Acrónimos utilizados en el *Catálogo* para designar a los países y provincias/estados/departamentos/regiones. *Acronyms used in the* Catalogue *to designate the countries and provinces/states/departments/regions.*

Argentina (ARG)
Buenos Aires (BAI)
Catamarca (CAT)
Chaco (CHA)
Chubut (CHU)
Córdoba (COR)
Corrientes (COS)
Distrito Federal (DFE)
Entre Ríos (ERI)
Formosa (FOR)
Jujuy (JUJ)
La Pampa (LPA)
La Rioja (LRI)
Mendoza (MEN)
Misiones (MIS)
Neuquén (NEU)
Río Negro (RNE)
Salta (SAL)
San Juan (SJU)
San Luis (SLU)
Santa Cruz (SCR)
Santa Fe (SFE)
Santiago del Estero (SDE)
Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur (TDF)
Tucumán (TUC)

Brasil (BRA)
Paraná (PAR)
Rio Grande do Sul (RGS)
Santa Catarina (SCA)

Chile (CHL)
Región I – Tarapacá (I)
Región II – Antofagasta (II)
Región III – Atacama (III)
Región IV – Coquimbo (IV)
Región V – Valparaíso (V)
Región VI – O'Higgins (VI)
Región VII – Maule (VII)
Región VIII – Bío Bío (VIII)
Región IX – Araucanía (IX)
Región X – Los Lagos (X)
Región XI – Aisén (XI)
Región XII – Magallanes (XII)
Islas Desventuradas (IDE)
Islas de Juan Fernández (IJF)
Región Metropolitana de Santiago (RME)

Paraguay (PRY)
Alto Paraguay (APY)
Alto Paraná (APA)
Amambay (AMA)
Boquerón (APY)
Caaguazú (CAU)
Caazapá (CAA)
Canindeyú (CAN)
Central (CEN)
Concepción (CON)
Cordillera (COA)
Guairá (GUA)
Itapúa (ITA)
Misiones (MIE)
Ñeembucú (ÑEE)
Paraguarí (PAI)
Presidente Hayes (PHA)
San Pedro (SPE)

Uruguay (URY)
Artigas (ART)
Canelones (CAS)
Cerro Largo (CLA)
Colonia (COL)
Durazno (DUR)
Flores (FLO)
Florida (FLA)
Lavalleja (LAV)
Maldonado (MAL)
Montevideo (MON)
Paysandú (PAY)
Río Negro (RNO)
Rivera (RIV)
Rocha (ROC)
Salto (SAO)
San José (SJO)
Soriano (SOR)
Tacuarembó (TAC)
Treinta y Tres (TYT)

Nota: Los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay fueron considerados como un único departamento (APY). Los mapas incluidos en la introducción (Mapas 1–5) indican el orden político de cada país y estos mismos acrónimos aquí presentados.
Note: Departments Boquerón and Alto Paraguay were considered as one (APY). The maps included in the introduction (Maps 1–5) show the political division in each country and the acronyms used here.

BIBLIOGRAFÍA. *BIBLIOGRAPHY.*

Bilenca, D. & Miñarro, F. 2004. Identificación de Áreas Valiosas de Pastizal en las Pampas y Campos de Argentina, Uruguay y Sur de Brasil. 1–333. Fundación Vida Silvestre Argentina, Buenos Aires.

Bridson, G. D. R. & Smith, E. R. 1991. B-P-H/S. Botanico-Periodicum-Huntianum/Supplementum. Hunt Institute for Documentation, Pittsburgh.

Brown, A. D. 1995. Fitogeografía y conservación de las selvas de montaña del noroeste de Argentina. En S. P. Churchill, H. Balslev, E. Forero & J. L. Luteyn (eds.), Biodiversity and Conservation of Neotropical Montane Forests: 663–672. The New York Botanical Garden. Bronx, New York.

Brummitt, R.K. & Powell, C.E. 1992. Authors of Plant Names. Royal Botanic Gardens, Kew.

Burkart, R. 1999. Conservación de la biodiversidad en bosques naturales productivos del subtrópico argentino. En S. D. Mateucci, O. T. Solbrig, J. Morello. & G. Halffter (eds.), Biodiversidad y Uso de la Tierra. Conceptos y Ejemplos de Latinoamérica: 131–174. Eudeba, Buenos Aires.

Cabrera, A. L. 1957. La vegetación de la Puna Argentina. Revista Invest. Agric. 11: 317–412.

——. 1976. Regiones fitogeográficas argentinas. En L. R. Parodi (ed.), Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería 2(1): 2–85. Acme, Buenos Aires.

——. 1994. Regiones fitogeográficas argentinas. En W.F. Kugler (ed.), Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería 2(1): 1–85, 2ª edición, 1ª reimpresión. Acme, Buenos Aires.

—— & Willink, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Serie de Biología, Monografía 13: 1–120. Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Washington, D.C.

—— & ——. 1980. Biogeografía de América Latina. Serie de Biología, Monografía 13: 1–117. Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Washington, D. C.

Cardoso da Silva, J. M. & Casteleti, C. H. M. 2003. Status of the biodiversity of the Atlantic Forest of Brasil. En C. Galindo-Leal & I. Gusmão Câmara (eds.), The Atlantic Forest of South America: 43–59. The Center for Applied Biodiversity Science at Conservation International. Island Press, Washington, Covelo, London.

Cavalcanti, R. B. & Joly, C. A. 2002. Biodiversity and conservation priorities in the Cerrado biome. En P. S. Oliveira & R. J. Marquis (eds.), The Cerrados of Brazil: 351–367. Columbia University Press, New York.

Chebez, J. C. & Hilgert, N. 2003. The Atlantic Forest of South America: 141–159. En C. Galindo-Leal & I. Gusmão Câmara (eds.), The Center for Applied Biodiversity Science at Conservation International. Island Press, Washington, Covelo, London.

Conti, H. A. 1999. Características climáticas de la Patagonia. En M. N. Correa (ed.), Flora Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 8(6): 31–47.

Cunha de Mendonça, R., Felfili, J. M., Teles Walter, B. M., da Silva Júnior, M. C., Rezende, A. V., Filgueiras, T. S. & Nogueira, P. E. 1998. Flora vascular do Cerrado. En S. Matiko Sano & S. Pedrosa de Almeida (eds.), Cerrado: Ambiente e Flora: 289–556. EMBRAPA, Planaltina, DF.

Dillon, M. O. & Hoffmann-J., A. 1997. Lomas formations of the Atacama Desert. En S. D. Davis, V. H. Heywood, O. Herrera-McBryde, J. Villa-Lobos & A. C. Hamilton (eds.), Centres of Plant Diversity 3, The Americas: 528–535.

Filgueiras, T. S. 2002. Herbaceous plant communities. En P. S. Oliveira & R. J. Marquis (eds.), The Cerrados of Brazil: 121–139. Columbia University Press, New York.

Galera, F. M. & Ramella, L. 1997. Gran Chaco. Argentina, Paraguay, Brazil. Bolivia. En S. D. Davis, V. H. Heywood, O. Herrera-McBryde, J. Villa-Lobos & A. C. Hamilton (eds.), Centres of Plant Diversity 3, The Americas: 411–415.

Galindo-Leal, C. & Gusmão Câmara, I. 2003. Atlantic Forest hotspot status: an overview. En C. Galindo-Leal & I. Gusmão Câmara (eds.), The Atlantic Forest of South America: 3–11. The Center for Applied Biodiversity Science at Conservation International. Island Press, Washington, Covelo, London.

Grau, J. 1995. Aspectos geográficos de la flora de Chile. En C. Marticorena & R. Rodríguez (eds.), Flora de Chile 1: 63–83.

Gusmão Câmara, I. 2003. Brief history of conservation in the Atlantic Forest. En C. Galindo-Leal & I. Gusmão Câmara (eds.), The Atlantic Forest of South America: 31–42. The Center for Applied Biodiversity Science at Conservation International. Island Press, Washington, Covelo, London.

Hoffmann-J, A. & Herrera-McBryde, O. 1997. Mediterranean Region and La Campana National Park. En S. D. Davis, V. H. Heywood, O. Herrera-McBryde, J. Villa-Lobos & A. C. Hamilton (eds.), Centres of Plant Diversity 3, The Americas: 536–541.

Holmgren, P. K., Holmbgre, N. H. & Barnett, C. L. 1990. Index Herbariorum, Part I: The Herbaria of the World. 8th edition. New York Botanical Garden, New York.

Hueck, K. 1972. As Florestas da América do Sul. 1–466. Ed. Polígono S.A. São Paulo.

Josse, C., Navarro, G., Comer, P., Evans, R., Faber-Langendoen, D., Fellows, M., Kittel, G., Menard, S., Pyne, M., Reid, M., Schulz, K., Snow, K. & Teague, J. 2003. Ecological Systems of Latin America and the Caribbean: A Working Classification of Terrestrial Systems. NatureServe, Arlington.

Lawrence, G. H. M., Buchheim, A. F. G., Daniels, G. S. & Dolezal, H. 1968. B-P-H. Botanico-Periodicum-Huntianum. Hunt Botanical Library, Pittsburgh.

Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M. 1998. Catálogo de la flora vascular de las Islas Robinson Crusoe y Juan Fernández, Chile. Gayana Bot. 55: 187–211.

Miranda, H. S., Bustamante, M. M. C. & Miranda, A. C. 2002. The fire factor. En P. S. Oliveira & R. J. Marquis (eds.), The Cerrados of Brazil: 51–68. Columbia University Press, New York.

Morrone, J. J. 1999. Presentación preliminar de un nuevo esquema biogeográfico de América del Sur. Biogeographica 75: 1–16.

——. 2002. Biogeographical regions under track and cladistic scrutiny. J. Biogeography 29: 149–152.

Muñoz Pizarro, C. 1965. El Desierto Florido. Museo Nacional de Historia Natural, Santiago, Ser. Educativa: 31.

Oliveira-Filho, A. T. & Ratter, J. A. 2002. Vegetation physiognomies and woody flora of the Cerrado biome. En P. S. Oliveira & R. J. Marquis (eds.), The Cerrados of Brazil: 91–120. Columbia University Press, New York.

Pires Aguiar, A., Garcia Chiarello, A., Lucena Mendes, S. & Neri de Matos, E. 2003. The Central and Serra do Mar Corridors in the Brazilian Atlantic Forest. En C. Galindo-Leal & I. Gusmão Câmara (eds.), The Atlantic Forest of South America: 31-42. The Center for Applied Biodiversity Science at Conservation International. Island Press, Washington, Covelo, London.

Prado, D. E. 1991. A critical evaluation of the floristic links between Chaco and Caatingas vegetation in South America. 1–173. Ph. D. Thesis. University of Saint Andrews, St. Andrews.

Rauh, W. 1985. The Peruvian-Chilean deserts. En M. Evenari, I. Noy-Meir & D. W. Goodall (eds.), Ecosystems of the World 12A. Hot Deserts and Arid Shrublands: 239–267.

Ribeiro, J. F. & Teles Walter, B. M. 1998. Fitofisionomias do bioma Cerrado. En S. Matiko Sano & S. Pedrosa de Almeida (eds.), Cerrado: Ambiente e Flora: 89–166. EMBRAPA, Planaltina, DF.

Ribichich, A. M. 2002. El modelo clásico de la fitogeografía de Argentina: Un análisis crítico. Interciencia 27: 669–675.

Roig, F. A. 1999. La vegetación de la Patagonia. En M. N. Correa (ed.), Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 8(6): 48–166.

Rundel, P. W., Dillon, M., Paula, O. B., Mooney, H. A., Gulmon, S. L. & Ehleringer, J. R.. 1991. The phytogeography and ecology of the coastal Atacama and Peruvian Deserts. Aliso 13: 1–49.

Spichiger, R., Ramella, L. & Bocquet, G. (eds.) 1983–2006. Flora del Paraguay: 1–37. Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Chambesy, & Missouri Botanical Garden, St-Louis. (http://www.ville-ge.ch/cjb/bd.php)

Stafleu, F. A. & Cowan, R. S. 1976–1988. Taxonomic literature. A selective guide to botanical publications and collections with dates, commentaries and types. 2nd edition. 7 vols. Bohn, Scheltema, & Holkema Ultrecht.

—— & Mennega, E. A. 1992–1997. Taxonomic literature. A selective guide to botanical publications and collections with dates, commentaries and types. 6 vols. Koeltz Scientific Books, Königsberg.Stauffer, F. & Ramella, L. (eds.). 2007. Flora del Paraguay 38–. Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Suiza. (http://www.ville-ge.ch/cjb/bd.php)

Stuessy, T. F., Swenson, U., Crawford, D. J., Anderson, G. & Silva, O. M. 1997. Plant conservation in the Juan Fernández Archipiélago, Chile. Aliso 16: 89–101.

Teillier A. S., Zepeda F. H. & García, V. P. 1998. Flores del desierto de Chile: 1–111. Marisa Cuneo Ediciones, Valdivia.

Tryon, R. M. & Tryon, A. F. 1982. Ferns and allied plants, with special reference to Tropical America: i–v, 1–857. Springer-Verlag, N.Y., Heidelberg, Berlin.

Villagrán, C. & Hinojosa, L. F.. 1997. Historia de los bosques del sur de Sudamérica. II. Análisis fitogeográfico. Revista Chilena Hist. Nat. 70: 241–267.

Villamil, C. 1997. Patagonia. En S. D. Davis, V. H. Heywood, O. Herrera-McBryde, J. Villa-Lobos & A. C. Hamilton (eds.), Centres of Plant Diversity 3, The Americas: 549–552.

Zuloaga, F. O. & Morrone, O. 1996. Catálogo de las Plantas Vasculares de la República Argentina. I. Pteridophyta, Gymnospermae y Angiospermae (Monocotyledoneae). Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 60: 1–323.

—— & —— . 1999. Catálogo de las Plantas Vasculares de la República Argentina, II. Dicotyledoneae. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 74: 1–1269.

——, —— & Rodríguez, D. 1999. Análisis de la biodiversidad vegetal en plantas vasculares de la Argentina. Kurtziana 27: 17–167.

——, Nicora, E. G., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Morrone, O, Pensiero, J. & Cialdella, A. M. 1994. Catálogo de la Familia Poaceae en la República Argentina. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 47: 1–178.

AUTORES Y REVISORES. *AUTHORS AND REVIEWERS.*

Ackermann, M. (BSB, Alemania): Loasaceae.
Aedo, C. (MA, España): Geraniaceae (*Geranium*).
Albesiano, S. (Colombia): Cactaceae (*Wigginsia*).
Al-Shehbaz, I. A. (MO, Estados Unidos de América): Brassicaceae.
Almeda, F. (CAS, Estados Unidos de América): Symplocaceae.
Alves, M. V. (UFP, Brasil): Cyperaceae (*Hypolytrum, Lagenocarpus* y *Pleurostachys*).
Anderson, C. (MICH, Estados Unidos de América): Malpighiaceae (revisor).
Andreata, R. H. (RUSU, Brasil): Smilacaceae.
Aranha Filho, J. L. M. (UEC, Brasil): Symplocaceae.
Araújo, A. C. (ICN, Brasil): Cyperaceae del Sur de Brasil.
Arbo, M. M. (CTES, Argentina): Bignoniaceae, Lentibulariaceae, Turneraceae.
Argus, G. (CAN, Canadá): Salicaceae (*Salix*).
Arroyo-Leuenberger, S. (B, Alemania): Amaryllidaceae, Epacridaceae, Hyacinthaceae, Luzuriagaceae, Philesiaceae.
Atkins, S. (K, Inglaterra): Verbenaceae (*Stachytarpheta*).
Austin, D. F. (ARIZ, Estados Unidos de América): Convolvulaceae.
Aymard C., G. (PORT, Venezuela): Dilleniaceae.
Barboza, G. E. (CORD, Argentina): Gentianaceae, Solanaceae.
Bartoli, A. (BAA, Argentina): Asteraceae (Astereae).
Baeza, C. M. (CONC, Chile): Asteraceae (Lactuceae).
Bayón, N. D. (LP, Argentina): Asteraceae (Vernonieae).
Belgrano, M. J. (SI, Argentina): Cucurbitaceae (*Apodanthera*), Laxmanniaceae.
Berg, C. C. (BG, Noruega): Cecropiaceae, Celtidaceae, Moraceae.
Berry, P. E. (MICH, Estados Unidos de América): Euphorbiaceae, Phyllanthaceae (revisor), Picrodendraceae (revisor).
Beyhaut, R. (MVFA, Uruguay): Fabaceae y Poaceae de Uruguay.
Boldrini, I. (ICN, Brasil): Poaceae del Sur de Brasil.
Bonifacino, M. (MVFA, Uruguay): Asteraceae (Astereae).
Borsch, T. (Nees-Institute for Biodiversity of Plants, Alemania): Amaranthaceae.
Cabral, E. L. (CTES, Argentina): Rubiaceae.
Caruzo, M. B. R. (SP, Brasil): Euphorbiaceae.
Castillo, A. (Jardín Botánico de Ezeiza, Argentina): Iridaceae.
Castro Souza, J. P. (ESA, Brasil): Violaceae (revisor).
Castro Souza, V. (ESA, Brasil): Orobanchaceae (revisor), Plantaginaceae (revisor), Scrophulariaceae.
Cervi, A. (UPCB, Brasil): Passifloraceae del Sur de Brasil.
Chautems, A. (G, Suiza): Gesneriaceae.
Cialdella, A. M. (SI, Argentina): Poaceae, Polygonaceae.
Clausen, A. M. (BAL, Argentina): Solanaceae (*Solanum* sect. *Petota*).
Conn, B. (NSW, Australia): Urticaceae (revisor).
Cordeiro, I. (SP, Brasil): Euphorbiaceae.
Costa Bortoluzzi, R. L. (Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil): Fabaceae (Caesalpinioideae del Sur de Brasil).
Costa e Silva, M. B. (Universidade Federal Rural do Pernambuco, Brasil): Capparaceae.
Costea, M. (WLU, Canadá): Convolvulaceae (*Cuscuta*).
Cristóbal, C. L. (CTES, Argentina): Sterculiaceae.
Croat, T. B. (MO, Estados Unidos de América): Araceae.
Davenport, L. (Samford University, Estados Unidos de América): Hydroleaceae (revisor).
De Gennaro, D. (SI, Argentina): Poaceae.
Deginani, N. B. (SI, Argentina): Hydroleaceae, Passifloraceae.
Delucchi, G. (LP, Argentina): Asteraceae (Anthemideae, Arctoteae, Calenduleae, Cardueae).
Dematteis, M. (CTES, Argentina): Asteraceae (Vernonieae).
Denham, S. S. (SI, Argentina): Poaceae.
Dhooge, S. (GENT, Bélgica): Cyperaceae (*Amphiscirpus, Phylloscirpus* y *Zameioscirpus*).
Dillon, M. (F, Estados Unidos de América): Griseliniaceae, Nolanaceae.
Dressler, S. (FR, Alemania): Marcgraviaceae.
Dutilh, J. (UEC, Brasil): Amaryllidaceae.
Eriksson, R. (GB, Suecia): Basellaceae.
Esser, H. J. (M, Alemania): Euphorbiaceae.
Ezcurra, C. (BCRU, Argentina): Acanthaceae, Apocynaceae.
Faúndez, L. (Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, Chile): Cactaceae.
Fernández Casas, F. J. (MA, España): Euphorbiaceae.
Ferrucci, M. S. (CTES, Argentina): Sapindaceae, Tiliaceae.
Filippa, E. M. (CORD, Argentina): Gentianaceae.
Fontella Pereira, J. (R, Brasil): Apocynaceae.
Ford-Wentz, D. I. (WVA, Estados Unidos de América): Portulacaceae.
Fortunato, R. H. (BAB, Argentina): Fabaceae.

Fortune Hopkins, H. (K, Inglaterra): Cunoniaceae.
França, F. (HUEFS, Brasil): Verbenaceae (*Aegiphila*).
Frasier, C. (Rutgers University, Estados Unidos de América): Loganiaceae (revisor).
Freire, A. (PH, Estados Unidos de América): Crassulaceae, Polygalaceae.
Freire, S. E. (LP, Argentina): Asteraceae.
Freitas, M. F. (RB, Brasil): Myrsinaceae (revisor).
Fritsch, P. (CAS, Estados Unidos de América): Styracaceae, Symplocaceae.
Gattuso, S. (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): Smilacaceae.
Giberti, G. (BAF, Argentina): Aquifoliaceae.
Giúdice, G. E. (LP, Argentina): Pteridaceae.
Giuliano, D. (LP, Argentina): Asteraceae (Astereae).
Giulietti, A. M. (HUEFS, Brasil): Eriocaulaceae.
Giussani, L. (SI, Argentina): Poaceae.
Goetghebeur, P. (GENT, Bélgica): Cyperaceae (revisor).
Goldblatt, P. (MO, Estados Unidos de América): Iridaceae (revisor).
Gómez-Sosa, E. V. (SI, Argentina): Fabaceae (*Astragalus*).
Gonçalves, E. (Laboratorio de Botânica, Universidade Católica de Brasília, Brasil): Araceae.
Gonzales, J. (Amazon Conservation Association, LPB, Bolivia): Gleicheniaceae.
González-Elizondo, M. S. (CIIDIR, México): Cyperaceae (*Eleocharis*).
Graham, S. A. (MO, Estados Unidos de América): Lythraceae.
Grau, J. (M, Alemania): Loasaceae.
Grela, I. (MVJB, Uruguay): Ericaceae, Lauraceae y Salicaceae de Uruguay (revisor).
Guaglianone, E. R. (SI, Argentina): Cyperaceae, Hyacinthaceae, Laxmanniaceae, Phytolaccaceae, Smilacaceae.
Guglieri, A. (ICN, Brasil): Poaceae del Sur de Brasil.
Gutiérrez, D. (LP, Argentina): Asteraceae (Helenieae, Liabeae, Mutisieae).
Harley, R. (K, Inglaterra): Lamiaceae.
Hausner, G. (Werner-Hiperst Str. 67, Wiesbaden, Alemania): Siparunaceae.
Haynes, R. R. (UNA, Estados Unidos de América): Alismataceae, Hydrocharitaceae (revisor), Limnocharitaceae (revisor), Najadaceae (revisor), Pontederiaceae, Potamogetonaceae, Ruppiaceae, Zannichelliaceae (revisor).
Hefler, S. (ICN, Brasil): Cyperaceae (*Cyperus* del Sur de Brasil).
Hoch, P. (MO, Estados Unidos de América): Onagraceae.
Holm-Nielsen, L. B. (AAU, Dinamarca): Hydrocharitaceae (revisor).
Horn, C. N. (NBYC, Estados Unidos de América): Pontederiaceae.
Iharlegui, L. (LP, Argentina): Asteraceae (Inuleae).
Izaguirre, P. (MVFA, Uruguay): Fabaceae, Orchidaceae y Poaceae de Uruguay.
Johnson, L. (BRY, Estados Unidos de América): Polemoniaceae (revisor).
Jørgensen, P. M. (MO, Estados Unidos de América): Calyceraceae (revisor), Gunneraceae (revisor), Haloragaceae (revisor), Hydnoraceae (revisor), Passifloraceae (revisor), Santalaceae (revisor), Verbenaceae (revisor).
Kameyama, C. (SP, Brasil): Acanthaceae.
Katinas, L. (LP, Argentina): Asteraceae (Mutisieae).
Kiesling, R. (MERL, Argentina): Cactaceae.
Kinoshita, L. S. (UEC, Brasil): Apocynaceae.
Krapovickas, A. (CTES, Argentina): Malvaceae.
Kuijt, J. (UVIC, Canadá): Eremolepidaceae (revisor), Loranthaceae (revisor), Viscaceae (revisor).
Kutschker, A. M. (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Argentina): Valerianaceae
Labiak, P. H. (UPCB, Brasil): Grammitidaceae, Polypodiaceae, Vittariaceae.
Lammers, T. G. (OSH, Estados Unidos de América): Campanulaceae.
Landolt, E. (ZT, Suiza): Lemnaceae.
Larocca, J. (Laboratório de Taxonomia Vegetal, UNISINOS, Brasil): Cactaceae.
Lehnebach, C. (Chile): Orchidaceae de Chile, Ranunculaceae (*Ranunculus* de Chile).
Lehnert, M. (A-V-H Institut, Abteilung Systematische Botanik, Göttingen, Alemania): Cyatheaceae, Dicksoniaceae.
Les, D. H. (CONN, Estados Unidos de América): Ceratophyllaceae.
Levin, G. A. (ILLS, Estados Unidos de América): Euphorbiaceae.
Lewis, G. P. (K, Inglaterra): Fabaceae (revisor *Anadenanthera* y *Diptychandra*).
Lidén, M. (Suecia): Fumariaceae (revisor).
Lima, H. C. (RB, Brasil): Fabaceae (*Acosmium, Amburana, Andira, Centrolobium, Dalbergia, Holocalyx, Machaerium, Myrocarpus, Myroxylon, Ormosia, Platypodium, Pterocarpus, Riedeliella, Sweetia* y *Zollernia* del Sur de Brasil).
Lima, L. R. (SP, Brasil): Euphorbiaceae.
Linder, H. P. (Z, Suiza): Restionaceae.
Lohmann, L. (SPF, Brasil): Bignoniaceae.
Lombardi, J. A. (HRCB, Brasil): Hippocrateaceae, Vitaceae.

Longhi-Wagner, H. M. (ICN, Brasil): Poaceae del Sur de Brasil.
Lopes, R. C. (RFA, Brasil): Herreriaceae.
López, M. G. (CTES, Argentina): Cyperaceae (*Bulbostylis* y *Fimbristylis*).
López Sepúlveda, P. (CONC, Chile): Cyperaceae (*Cyperus* de Chile).
Luer, C. A. (MO, Estados Unidos de América): Orchidaceae (revisor).
Luteyn, J. L. (NY, Estados Unidos de América): Ericaceae.
Maas, P. J. M. (U, Holanda): Burmanniaceae, Cannaceae, Triuridaceae (revisor), Zingiberaceae (revisor).
Macluf, C. (LP, Argentina): Isoëtaceae.
Marchesi, E. (MVFA, Uruguay): Cyperaceae de Uruguay.
Marticorena, A. (CONC, Chile): Chenopodiaceae, Malvaceae (revisor), Rosaceae.
Marticorena, C. (CONC, Chile): Cyperaceae de Chile.
Martínez, S. (BAFC, Argentina): Apiaceae.
Martins, Z. (Brasil): Bromeliaceae del Sur de Brasil.
Matesevach, M. (CORD, Argentina): Solanaceae.
Maza, I. (Facultad Agronomía Universidad de Buenos Aires, Argentina): Iridaceae.
Mentz, L. A. (ICN, Brasil): Solanaceae.
Metzing, D. (Institüt fur Biologie und Umweltwissenschaften, Alemania): Cactaceae.
Mereles, F. (FCQ, Paraguay): Cyperaceae de Paraguay (*Cyperus, Eleocharis* y *Fimbristylis*).
Miller, J. S. (NY, Estados Unidos de América): Boraginaceae (*Cordia* y *Varronia*).
Miotto, S. T. S. (ICN, Brasil): Fabaceae (Papilionoideae del Sur de Brasil).
Moraes R., M. (LPB, Bolivia): Arecaceae.
Moreira, B. (SP, Brasil): Bromeliaceae.
Morrone, O. (SI, Argentina): Poaceae.
Motley, T. (ODU, Estados Unidos de América): Loganiaceae (revisor).
Moura Baptista, L. R. (ICN, Brasil): Fabaceae (Mimosoideae del Sur de Brasil).
Múlgura, M. E. (SI, Argentina): Chenopodiaceae, Malpighiaceae, Oxalidaceae, Verbenaceae.
Muñoz, M. (SGO, Chile): Alstroemeriaceae (revisor).
Nadruz, M. (RJ, Brasil): Araceae.
Noblick, L. (FTG, Estados Unidos de América): Arecaceae (revisor).
Norman, E. M. (DLF, Estados Unidos de América): Buddlejaceae (revisor).
O'Leary, N. (SI, Argentina): Verbenaceae (*Verbena*).
Øllgaard, B. (AAU, Dinamarca): Lycopodiaceae (revisor), Marattiaceae (revisor).
Pastore, J. F. (UEFS, Brasil): Polygalaceae.
Pennington, T. D. (K, Inglaterra): Fabaceae (revisor *Inga*).
Peralta, I. E. (MERL, Argentina): Portulacaceae, Solanaceae (*Solanum* sect. *Petota*).
Peralta, P. (SI, Argentina): Verbenaceae (*Glandularia, Junellia* y *Tamonea*).
Picca, P. (BACF, Argentina): Nothofagaceae.
Ponce, M. M. (SI, Argentina): Aspleniaceae, Azollaceae, Blechnaceae, Cyatheaceae, Davalliaceae, Dennstaedtiaceae, Dicksoniaceae, Dryopteridaceae, Equisetaceae, Gleicheniaceae, Grammitidaceae, Hymenophyllaceae, Isoëtaceae, Lomariopsidaceae, Marsileaceae, Ophioglossaceae, Osmundaceae, Parkeriaceae, Polypodiaceae, Psilotaceae, Pteridaceae, Salviniaceae, Schizaeaceae, Selaginellaceae, Thelypteridaceae, Vittariaceae.
Porter, D. M. (VPI, Estados Unidos de América): Zygophyllaceae.
Pozner, R. (SI, Argentina): Calyceraceae, Cucurbitaceae, Halophytaceae.
Prado, J. (SP, Brasil): Azollaceae (revisor), Blechnaceae (revisor), Cyatheaceae (revisor), Davalliaceae (revisor), Dennstaedtiaceae, Dicksoniaceae (revisor), Dryopteridaceae (revisor), Equisetaceae (revisor), Gleicheniaceae (revisor), Hymenophyllaceae (revisor), Lomariopsidaceae (revisor), Marsileaceae (revisor), Ophioglossaceae (revisor), Osmundaceae (revisor), Parkeriaceae, Psilotaceae (revisor), Pteridaceae (revisor), Salviniaceae (revisor), Schizaeaceae (revisor), Selaginellaceae (revisor), Thelypteridaceae (revisor), Vittariaceae (revisor).
Prance, G. T. (K, Inglaterra): Caryocaraceae, Chrysobalanaceae, Proteaceae.
Raven, P. H. (MO, Estados Unidos de América): Onagraceae.
Renner, S. S. (M, Alemania): Monimiaceae, Siparunaceae.
Reznicek, A. A. (MICH, Estado Unidos de América): Cyperaceae (revisor).
Rico, L. (K, Inglaterra): Fabaceae (revisor *Acacia*, revisor Ingeae excepto *Inga*).
Riina, R. (MICH, Estados Unidos de América): Euphorbiaceae.
Rodríguez Ríos, R. (CONC, Chile): Gleicheniaceae.
Rohwer, J. G. (HBG, Alemania): Lauraceae (revisor), Oleaceae (revisor).
Roitman, G. (BAA, Argentina): Amaryllidaceae (revisor), Iridaceae.
Rolleri, C. (LP, Argentina): Lycopodiaceae, Marattiaceae.
Rotman, A. D. (JUA, Argentina): Myrtaceae, Verbenaceae (*Diostea, Lampaya, Lantana* y *Neosparton*).

Sáenz, A. A. (LP, Argentina): Asteraceae (Heliantheae).
Salariato, D. (SI, Argentina): Poaceae.
Salimena, F. R. G. (CESJ, Brasil): Verbenaceae (*Aegiphila*).
Salino, A. (BHCB, Brasil): Dryopteridaceae, Thelypteridaceae.
Sancho, G. (LP, Argentina): Asteraceae (Astereae, Mutisieae).
Sanso, A. M. (SI, Argentina): Alstroemeriaceae, Violaceae.
Saunders, J. (SI, Argentina): Sterculiaceae (*Waltheria*).
Schinini, A. (CTES, Argentina): Bromeliaceae, Orchidaceae.
Schrire, B. D. (K, Inglaterra): Fabaceae (revisor *Indigofera*).
Sede, S. (SI, Argentina): Escalloniaceae, Saxifragaceae, Tribelaceae.
Semir, J. (UEC, Brasil): Solanaceae (*Calibrachoa* y *Petunia*).
Seo, M. N. (BACP, Argentina): Violaceae (*Hybanthus*).
Simmons, M. P. (CS, Estados Unidos de América): Celastraceae.
Simpson, B. B. (TEX, Estados Unidos de América): Krameriaceae.
Smith, A. R. (UC, Estados Unidos de América): Grammitidaceae (revisor), Polypodiaceae (revisor).
Soria, N. (FCQ, Paraguay): Asteraceae de Paraguay.
Sota, E. R. de la (LP, Argentina): Azollaceae, Blechnaceae, Cyatheaceae, Davalliaceae, Dennstaedtiaceae, Dicksoniaceae, Equisetaceae, Grammitidaceae, Hymenophyllaceae, Lomariopsidaceae, Marsileaceae, Ophioglossaceae, Osmundaceae, Polypodiaceae, Psilotaceae, Salviniaceae, Schizaeaceae, Selaginellaceae, Vittariaceae.
Spooner, D. M. (WIS, Estados Unidos de América): Solanaceae (*Solanum* sect. *Petota*).
Stace, C. A. (LTR, Estados Unidos de América): Combretaceae.
Ståhl, B. (GU, Suecia): Myrsinaceae, Primulaceae (revisor), Samolaceae, Symplocaceae (revisor), Theophrastaceae.
Stehmann, J. R. (BHCB, Brasil): Solanaceae (*Calibrachoa* y *Petunia*).
Stone, D. E. (DUKE, Estados Unidos de América): Juglandaceae.
Strehl, T. (HAS, Brasil): Bromeliaceae del Sur de Brasil.
Stuessy, T. F. (WU, Austria): Asteraceae (Lactuceae, Mutisieae).
Sylvestre, L. S. (RBR, Brasil): Aspleniaceae.
Taylor, C. M. (MO, Estados Unidos de América): Rubiaceae.
Tortosa, R. D. (BAA, Argentina): Asteraceae (Astereae), Rhamnaceae.
Tozzi, A. M. G. A. (UEC, Brasil): Fabaceae (revisor *Lonchocarpus* y *Machaerium*).
Tremetsberger, K. (WU, Austria): Asteraceae (Lactuceae).
Trevisán, R. (ICN, Brasil): Cyperaceae (*Eleocharis* del Sur de Brasil).
Ulibarri, E. A. (SI, Argentina): Fabaceae (*Adesmia, Caesalpinia, Hoffmannseggia, Pomaria* y *Cercidium*).
Ulloa Ulloa, C. (MO, Estados Unidos de América): Berberidaceae, Melastomataceae.
Urtubey, E. (LP, Argentina): Asteraceae (Lactuceae, Mutisieae).
Waechter, J. (ICN, Brasil): Orchidaceae del Sur de Brasil.
Wallnöfer, B. (W, Austria): Ebenaceae.
Wanderley, M. G. L. (SP, Brasil): Bromeliaceae, Xyridaceae.
Weigend, M. (BSB, Alemania): Grossulariaceae, Loasaceae.
Wheeler, G. A. (MIN, Estados Unidos de América): Cyperaceae (*Carex* y *Uncinia*).
Wiersema, J. H. (BARC, Estados Unidos de América): Nymphaeaceae (revisor).
Wurdack, K. J. (US, Estados Unidos de América): Euphorbiaceae, Phyllanthaceae (revisor).
Xifreda, C. C. (La Plata, Argentina): Violaceae.
Yatskievych, G. (MO, Estados Unidos de América): Aspleniaceae (revisor), Parkeriaceae (revisor), Pteridaceae.
Zanin, A. (ICN, Brasil): Poaceae del Sur de Brasil.
Zanotti, C. (SI, Argentina): Calyceraceae.
Zmarzty, S. (K, Inglaterra): Achariaceae, Berberidopsidaceae, Salicaceae.
Zuloaga, F. O. (SI, Argentina): Poaceae.

Nota: Las familias en las que no se indica autor fueron realizadas por los editores generales del *Catálogo*. *Note: The families without indication of authors were prepared by the main editors of the* Catalogue.

Pteridophyta

ASPLENIACEAE

Autores: Sylvestre, L. S. & Ponce, M. M.
Revisor: Yatskievych, G.

5 géneros, 61 especies, 12 especies endémicas, 2 especies introducidas.

Antigramma C. Presl

Número de especies: 2

Antigramma balansae (Baker) L. Sylvestre & P.G. Windisch
Sin.: *Phyllitis balansae* (Baker) C. Chr., *Scolopendrium balansae* Baker
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Hassler, E., 1928; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sylvestre, L. S. & Windisch, P. G., 2002.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, CAN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 294* (SI)]; BRA[*Carneiro, J. 481* (MBM)]; PRY[*Peña-Chocarro, M. C. 311* (BM, PY)].

Antigramma brasiliensis (Sw.) T. Moore
Sin.: *Asplenium brasiliense* Sw., *Phyllitis brasiliensis* (Sw.) Kuntze, *Phyllitis brasiliensis* (Sw.) Kuntze var. *decurrens* Sehnem, *Scolopendrium brasiliense* (Sw.) Kunze
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Sylvestre, L. S. & Windisch, P. G., 2002.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAA, CEN, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 7976* (BAA, BAB, CTES)]; BRA[*Krapovickas, A. 43474* (CTES)]; PRY[*Balansa, B. 4466* (B, NY, US)].

[Antigramma plantaginea (Schrad.) C. Presl]
Sin.: *Phyllitis plantaginea* (Schrad.) Kuntze, *Scolopendrium plantagineum* Schrad.
Referencias: Sylvestre, L. S. & Windisch, P. G., 2002.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Asplenium L.

Número de especies: 56, 11 endémicas

Asplenium abscissum Willd.
Sin.: *Asplenium firmum* Kunze
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Sehnem, A., 1968a; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, SPE); URY(CLA, RIV, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 1378* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 32302* (MBM, PACA)]; PRY [*Rojas, T. 3656* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 3745* (SI)].

Asplenium achalense Hieron.
Sin.: *Asplenium furcatum* auct. non Thunb.
Referencias: de la Sota, E. R., 1973a, 1977.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(COR, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 879* (SI)].

Asplenium alatum Willd.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 153* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 1846* (HBR)].

Asplenium angustatum Kunze var. *langsdorffii* Mart. = **Asplenium martianum** C. Chr.

[Asplenium anisophyllum Kunze]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Asplenium anthriscifolium Jacq. = **Asplenium pumilum** Sw.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Asplenium araucarietii Sehnem = **Asplenium harpeodes** Kunze

Asplenium argentinum Hieron.
Referencias: de la Sota, E. R., 1973a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32671* (SI), *Zuloaga, F. O. 7504* (SI)].

Asplenium argentinum auct. non Hieron. = **Asplenium sellowianum** (Hieron.) C. Presl ex Hieron.
Referencias: Capurro, R. H., 1961.

Asplenium auriculatum Sw.
Sin.: *Asplenium semicordatum* Raddi
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sylvestre, L. S., 2001.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 1760* (SI)]; BRA[*Cordeiro, J. 298* (CTES)]; PRY[*Arenas, P. 769* (CTES)].

Asplenium auritum Sw.
Sin.: *Asplenium auritum* Sw. var. *regognitum* (Kunze) Griseb., *Asplenium auritum* Sw. var. *rigidum* (Sw.) Hook., *Asplenium lanceolatum* auct. non Huds., *Asplenium rigidum* Sw., *Asplenium sulcatum* auct. non Lam., *Asplenium sulcatum* Lam. var. *recognitum* (Kunze) Hicken
Referencias: de la Sota, E. R., 1973a, 1977; Hassler, E., 1928; Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Sylvestre, L. S., 2001; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 0–1800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 9579* (SI), *Zuloaga, F. O. 7742* (SI)]; BRA[*Labiak, P. H. 260* (MBM, SP, UPCB)]; PRY[*Jörgensen, P. 4391* (SI), *Rojas, T. 3810* (SI)].

Asplenium auritum Sw. var. *regognitum* (Kunze) Griseb. = **Asplenium auritum** Sw.

Asplenium auritum Sw. var. *rigidum* (Sw.) Hook. = **Asplenium auritum** Sw.

Asplenium bangii Hieron. = **Asplenium claussenii** Hieron.

Asplenium brachyotus Kunze = **Asplenium inaequilaterale** Willd.

Asplenium bradei Rosenst.
Referencias: Sehnem, A., 1968a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 306* (ICN)].

Asplenium brasiliense Raddi, hom. illeg. = **Asplenium raddianum** Gaudich.

Asplenium brasiliense Sw. = **Antigramma brasiliensis** (Sw.) T. Moore
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Asplenium campos-portoi Brade
Referencias: Sehnem, A., 1968a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 32219* (MBM, PACA)].

Asplenium castaneum Schltdl. & Cham.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Philippi, R. A. s.n.* (B)]; CHL[*de la Reu, A. s.n.* (P)].

Asplenium chondrophyllum Bertero ex Colla = **Asplenium obtusatum** G. Forst. var. **sphenoides** (Kunze) C. Chr. ex Skottsb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Asplenium ciliatum C. Presl ex Bertero = **Pleurosorus papaverifolius** (Kunze) Mett.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Asplenium cirrhatum Rich. ex Willd. = **Asplenium radicans** L. var. **cirrhatum** (Rich. ex Willd.) Rosenst.

Asplenium claussenii Hieron.
Sin.: *Asplenium bangii* Hieron., *Asplenium lunulatum* Sw. var. *commune* Lindm., *Asplenium lunulatum* Sw. var. *kunzeanum* (Kaulf.) C. Chr., *Asplenium lunulatum* Sw. var. *lunulatum*, *Asplenium lunulatum* Sw. var. *majus* Mett.
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1968a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY (AMA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1051* (SI), *Zuloaga, F. O. 5002* (SI)]; BRA[*Annies, J. s.n.* (SI), *Dusén, P. K. H. 4256* (SI), *Dutra, J. 20* (SI), *Dutra, J. 310* (SI), *Hatschbach, A. 24504* (UC)]; PRY[*Aguayo, A. 530* (UC), *Rojas, T. 3202* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 3532* (B, P)].

Asplenium concisum Desv. = **Asplenium dareoides** Desv.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Asplenium consimile J. Remy = **Asplenium obtusatum** G. Forst. var. **sphenoides** (Kunze) C. Chr. ex Skottsb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Asplenium cristatum Lam.
Referencias: Sylvestre, L. S., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reineck, E. M. s.n.* (P)].

[Asplenium cuspidatum Lam.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Asplenium cyrtopteron Kunze = **Asplenium radicans** L. var. **radicans**

Asplenium dareoides Desv.
Sin.: *Asplenium concisum* Desv., *Asplenium dareoides* Desv. var. *dentatum* G. Kunkel, *Asplenium magellanicum* Kaulf., *Asplenium philippi* Gand.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Capurro, R. H., 1961; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Moore, D. M., 1983; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6384* (SI), *James, P. 1496* (SI)]; CHL[*Marticorena, C. 170* (CONC)].

Asplenium dareoides Desv. var. *dentatum* G. Kunkel = **Asplenium dareoides** Desv.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Asplenium debile Fée = **Asplenium gilliesii** Hook.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Asplenium depauperatum Fée
Sin.: *Asplenium gibertianum* Hook., *Asplenium inciso-alatum* T. Moore, nom. nud., *Asplenium micropteron* Baker, *Asplenium schiffneri* H. Christ
Referencias: de la Sota, E. R., 1973a, 1977; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, MIS, SAL, TUC); PRY(CEN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 921* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 4328* (FCQ, MO)].

Asplenium divergens Mett. = **Asplenium gastonis** Fée

Asplenium drepanophyllum Kunze
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Foster, M. S. 80-6* (UC), *Woolston, A. L. 706* (UC), *Zardini, E. M. 7317* (UC)].

[Asplenium erectum Bory ex Willd.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Asplenium feei Kunze ex Fée
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Barbosa, E. 284* (MBM)].

Asplenium fernandezianum Kunze = **Asplenium stellatum** Colla
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Asplenium firmum Kunze = **Asplenium abscissum** Willd.

Asplenium flabellulatum Kunze var. *partitum* Klotzsch = **Asplenium radicans** L. var. **partitum** (Klotzsch) Hieron.

Asplenium formosum Willd.
Referencias: de la Sota, E. R., 1973a, 1977; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(COR, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 6067* (LP), *Diem, J. 1401* (SI)]; PRY[*Jiménez, B. 1202* (BM, CTES, PY)].

Asplenium fragile C. Presl = **Asplenium peruvianum** Desv.

Asplenium fragile C. Presl var. *lomense* Weath. = **Asplenium peruvianum** Desv.

Asplenium furcatum auct. non Thunb. = **Asplenium achalense** Hieron.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Asplenium gastonis Fée
Sin.: *Asplenium divergens* Mett.
Referencias: Sylvestre, L. S., 2001.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, CEN, GUA, PAI, SPE); URY(RIV, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guillén, R. 209* (G, LP, MNES, SI)]; BRA[*Dutra, J. 21* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 3001* (US)]; URY[*Osten, C. 6614* (US)].

Asplenium gibertianum Hook. = **Asplenium depauperatum** Fée
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Asplenium gilliesianum Hook. & Grev. = **Asplenium gilliesii** Hook.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Asplenium gilliesii Hook.
Sin.: *Asplenium debile* Fée, *Asplenium gilliesianum* Hook. & Grev.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba saxícola. Perenne. Endémica.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 5884* (SI), *Ruiz Leal, R. A. 1266* (LP)].

Asplenium harpeodes Kunze
Sin.: *Asplenium araucarietii* Sehnem
Referencias: Sehnem, A., 1968a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Spannagel, C. s.n.* (SI)].

Asplenium holmbergii Hicken = **Asplenium pulchellum** Raddi
Referencias: Márquez, G., Giúdice, G. E. & Ponce, M. M., 2006.

Asplenium imbricatum Hook. & Grev. = **Asplenium triphyllum** C. Presl
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Asplenium inaequilaterale Willd.
Sin.: *Asplenium brachyotus* Kunze
Referencias: Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Márquez, G., Giúdice, G. E. & Ponce, M. M., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, GUA, PAI); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Riemel, R. 31* (SI), *Zuloaga, F. O. 7469* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 35714* (MBM)]; PRY[*Zardini, E. M. 48943* (AS, MO)]; URY[*Herter, W. G. F. 10272* (B)].

Asplenium inciso-alatum T. Moore, nom. nud. = **Asplenium depauperatum** Fée
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Asplenium incurvatum Fée
Referencias: Sehnem, A., 1968a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dombrowski, L. T. 14413* (MBM)].

Asplenium kunzeanum Klotzsch ex Rosenst.
Referencias: Sehnem, A., 1968a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kozera, C. 950* (MBM)].

Asplenium lacinulatum Schrad.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Tessmann, G. 1953* (MBM)].

Asplenium laetum Sw.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Murakami, N. & Moran, R. C., 1993; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL, TUC); BRA(RGS); PRY(CAN, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Osten, C. 10481* (SI), *Venturi, S. 6178* (SI)]; BRA[*Jürgens, C. 27* (MICH)]; PRY[*Peña-Chocarro, M. C. 302* (BM)].

Asplenium lanceolatum auct. non Huds. = **Asplenium auritum** Sw.

Asplenium langsdorffii (Mart.) Sehnem = **Asplenium martianum** C. Chr.

Asplenium lealii Alston = **Asplenium resiliens** Kunze
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Asplenium lilloanum de la Sota
Referencias: Arana, M. D., Ponce, M. M. & Vischi, N., 2004; de la Sota, E. R., 1977.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Endémica. 700–2500 m.
Países: ARG(COR, JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Brown, A. 8651* (LP), *Kiesling, R. 5456* (SI)].

Asplenium longifolium Phil. = **Asplenium monanthes** L.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Asplenium lorentzii Hieron.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 600–2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bartlett, H. H. 20173* (SI)].

Asplenium lunulatum Sw. var. *commune* Lindm. = **Asplenium claussenii** Hieron.

Asplenium lunulatum Sw. var. *kunzeanum* (Kaulf.) C. Chr. = **Asplenium claussenii** Hieron.

Asplenium lunulatum Sw. var. *lunulatum* = **Asplenium claussenii** Hieron.

Asplenium lunulatum Sw. var. *majus* Mett. = **Asplenium claussenii** Hieron.

Asplenium lunulatum Sw. var. *sellowianum* Hieron. = **Asplenium sellowianum** (Hieron.) C. Presl ex Hieron.
Referencias: Capurro, R. H., 1961.

Asplenium lunulatum Sw. var. *stellatum* (Colla) C. Chr. = **Asplenium stellatum** Colla
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Asplenium lunulatum Sw. var. *tenerrima* Hieron. = **Asplenium sellowianum** (Hieron.) C. Presl ex Hieron.

Asplenium macrocarpum Desv. = **Asplenium monanthes** L.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Asplenium macrosorum Bertero ex Colla
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Parodi, D. s.n.* (SI)].

Asplenium magellanicum Kaulf. = **Asplenium dareoides** Desv.
Referencias: Moore, D. M., 1983; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Asplenium martianum C. Chr.
Sin.: *Asplenium angustatum* Kunze var. *langsdorffii* Mart., *Asplenium langsdorffii* (Mart.) Sehnem
Referencias: Sehnem, A., 1968a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 40266* (PACA)].

Asplenium menziesii Hook. & Grev. = **Asplenium monanthes** L.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Asplenium micropteron Baker = **Asplenium depauperatum** Fée
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

[Asplenium micropteron Baker var. minor Hicken]
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].
Notas: Nombre dudoso.

Asplenium monanthemum L. = **Asplenium monanthes** L.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Asplenium monanthemum Murray, hom. illeg. = **Asplenium monanthes** L.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Asplenium monanthes L.
Sin.: *Asplenium longifolium* Phil., *Asplenium macrocarpum* Desv., *Asplenium menziesii* Hook. & Grev., *Asplenium monanthemum* L., *Asplenium monanthemum* Murray, hom. illeg.
Referencias: de la Sota, E. R., 1973a, 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995; Sehnem, A., 1968a.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 0–2700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(IX, X, XI, XII); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 5068* (SI), *Zuloaga, F. O. 7830* (SI)]; BRA[*Spannagel, C. s.n.* (SI)]; CHL[*Rudolph 474* (CONC)]; URY[*Berro, M. B. 5173b* (MVFA)].

Asplenium mucronatum C. Presl
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1968a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 1761* (SI)]; BRA[*Jönsson, G. 728a* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5423* (SI)].

Asplenium muellerianum Rosenst.
Referencias: Sylvestre, L. S., 2001.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16376* (MBM, PACA)].

Asplenium nigricans Kunze = **Asplenium praemorsum** Sw.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Asplenium obliquum G. Forst. var. *chondrophyllum* (Bertero ex Colla) Mett. = **Asplenium obtusatum** G. Forst. var. **sphenoides** (Kunze) C. Chr. ex Skottsb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Asplenium obliquum G. Forst. var. *sphenoides* (Kunze) Mett. = **Asplenium obtusatum** G. Forst. var. **sphenoides** (Kunze) C. Chr. ex Skottsb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Asplenium obtusatum G. Forst. var. **sphenoides** (Kunze) C. Chr. ex Skottsb.
Sin.: *Asplenium chondrophyllum* Bertero ex Colla, *Asplenium consimile* J. Remy, *Asplenium obliquum* G. Forst. var. *chondrophyllum* (Bertero ex Colla) Mett., *Asplenium obliquum* G. Forst. var. *sphenoides* (Kunze) Mett., *Asplenium sphenoides* Kunze
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 177* (SI)].

Asplenium obtusifolium L. = **Asplenium triquetrum** N. Murak. & R.C. Moran

Asplenium oligophyllum Kaulf.
Referencias: Sehnem, A., 1968a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*d'Orbigny, A. D. 329* (P)]; BRA[*Dutra, J. 109* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 12250* (B, K, NY, P, US)].

Asplenium otites Link
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kuniyoshi, Y. S. 3912* (MBM)]; PRY[*Zardini, E. M. 15713* (US)].

Asplenium ovalescens Fée = **Asplenium pseudonitidum** Raddi

Asplenium palmeri Maxon
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 400–1500 m.
Países: ARG(COR, LRI, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giardelli, M. L. 439* (SI), *Nicora, E. G. 972* (SI)].

Asplenium paraguariense Hieron. = **Asplenium radicans** L. var. **partitum** (Klotzsch) Hieron.

Asplenium parvulum Hook. = **Asplenium trilobum** Cav.
Referencias: Looser, G., 1944; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Asplenium parvulum M. Martens & Galeotti, hom. illeg. = **Asplenium resiliens** Kunze
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Asplenium peruvianum Desv.
Sin.: *Asplenium fragile* C. Presl, *Asplenium fragile* C. Presl var. *lomense* Weath.
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b; Rodríguez Ríos, R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.
Hierba saxícola. Perenne. Nativa. 200–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9309* (*)]; CHL[*Johnson, I. M. 5421* (GH)].

Asplenium philippi Gand. = **Asplenium dareoides** Desv.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

[Asplenium poloense Rosenst.]
Sin.: *Asplenium spannagelii* Sehnem
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Asplenium praemorsum Sw.
Sin.: *Asplenium nigricans* Kunze
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 9588* (SI)]; BRA[*Reineck, E. M. s.n.* (P)].

Asplenium pseudonitidum Raddi
Sin.: *Asplenium ovalescens* Fée
Referencias: Sehnem, A., 1968a; Sylvestre, L. S., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Barbosa, E. 500* (MBM)].

Asplenium pteropus Kaulf.
Referencias: Sehnem, A., 1968a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. M. 3763* (MBM)].

Asplenium pulchellum Raddi
Sin.: *Asplenium holmbergii* Hicken
Referencias: Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Márquez, G., Giúdice, G. E. & Ponce, M. M., 2006; Sylvestre, L. S., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 27366* (NY)]; BRA[*Leite, J. E. 414* (NY)].

Asplenium pumilum Sw.
Sin.: *Asplenium anthriscifolium* Jacq.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Palací, C. A. 917* (LP), *Venturi, S. 7704* (SI)].

Asplenium raddianum Gaudich.
Sin.: *Asplenium brasiliense* Raddi, hom. illeg.
Referencias: Sehnem, A., 1968a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24705* (MBM, PACA)].

Asplenium radicans L. var. **cirrhatum** (Rich. ex Willd.) Rosenst.
Sin.: *Asplenium cirrhatum* Rich. ex Willd.
Referencias: Sehnem, A., 1968a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 10191* (MBM)].

Asplenium radicans L. var. **partitum** (Klotzsch) Hieron.
Sin.: *Asplenium flabellulatum* Kunze var. *partitum* Klotzsch, *Asplenium paraguariense* Hieron.
Referencias: Sehnem, A., 1968a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Cislinski, J. 139* (UPCB)]; PRY[*Balansa, B. 2891* (SI)].

Asplenium radicans L. var. **radicans**
Sin.: *Asplenium cyrtopteron* Kunze
Referencias: Sehnem, A., 1968a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Riemel, R. 120* (SI)]; BRA[*Annies, I. s.n.* (SI), *Müller, O. s.n.* (SI)].

Asplenium radicans L. var. **uniseriale** (Raddi) L.D. Gómez
Sin.: *Asplenium uniseriale* Raddi
Referencias: Sehnem, A., 1968a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*sin colector 20560b* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 5021* (AS, MO)].

[Asplenium repandulum Kuntze]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Asplenium resiliens Kunze
Sin.: *Asplenium lealii* Alston, *Asplenium parvulum* M. Martens & Galeotti, hom. illeg., *Asplenium trichomanes* L. var. *anceps* (Sol.) Milde
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938], 1961; de la Sota, E. R., 1977; Sylvestre, L. S., 2001.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); URY(COL, RNO, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 10109* (SI), *Nicora, E. G. 2538* (SI), *Roig, F. A. 12623* (LP)]; BRA[*Spannagel, C. 240* (HBR, NY, US)]; URY [*de la Sota, E. R. 7131* (SI)].

Asplenium rigidum Sw. = **Asplenium auritum** Sw.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Asplenium scandicinum Kaulf.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Sehnem, A., 1968a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 6116* (LP)]; BRA[*Müller, I. O. s.n.* (SI)].

Asplenium schiffneri H. Christ = **Asplenium depauperatum** Fée
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Asplenium scolopendrium L. = **Phyllitis scolopendrium** (L.) Newman
Referencias: Moore, D. M., 1968.

Asplenium sellowianum C. Presl, nom. nud. = **Asplenium sellowianum** (Hieron.) C. Presl ex Hieron.

Asplenium sellowianum (Hieron.) C. Presl ex Hieron.
Sin.: *Asplenium argentinum* auct. non Hieron., *Asplenium lunulatum* Sw. var. *sellowianum* Hieron., *Asplenium lunulatum* Sw. var. *tenerrima* Hieron., *Asplenium sellowianum* C. Presl, nom. nud., *Asplenium ulbrichtii* Rosenst. var. *sellowianum* (Hieron.) Osten & Herter
Referencias: Capurro, R. H., 1961, 1969[1968]; Sehnem, A., 1968a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(ITA); URY(ART, CLA, LAV, MAL, ROC, RNO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 1143* (SI)]; BRA[*Jürgens, C. 306* (UC)]; PRY[*Foster, M. S. 78-(2)-41* (UC)]; URY[*de la Sota, E. R. 6048* (LP), *Osten, C. 6470* (SI)].

Asplenium semicordatum Raddi = **Asplenium auriculatum** Sw.

Asplenium serra Langsd. & Fisch.
Referencias: de la Sota, E. R., 1973a, 1977; Labiak, P. H. & Prado, J., 1998.
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CLA, LAV, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Keller, H. A. 52* (CTES, SI)]; BRA[*Labiak, P. H. 109* (MBM, SP, UPCB)]; URY[*Arechavaleta, J. s.n.* (SI)].

Asplenium serratum L.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14731* (SI), *Spegazzini, C. L. 472* (LP)]; BRA[*Labiak, P. H. 68* (SP, UPCB)]; PRY[*Jiménez, B. 134* (BM, CTES, PY), *Múlgura de Romero, M. E. 3533* (CTES, FCQ, SI)].

Asplenium spannagelii Sehnem = **Asplenium poloense** Rosenst.

Asplenium sphenoides Kunze = **Asplenium obtusatum** G. Forst. var. **sphenoides** (Kunze) C. Chr. ex Skottsb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Asplenium squamosum L.
Sin.: *Asplenium tucumanense* Hieron.
Referencias: Sehnem, A., 1968a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 1000–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 18789* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 3420a* (HBR)].

Asplenium stellatum Colla
Sin.: *Asplenium fernandezianum* Kunze, *Asplenium lunulatum* Sw. var. *stellatum* (Colla) C. Chr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–1800 m.
Países: CHL(V, IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz 7166* (SGO)].

Asplenium stuebelianum Hieron.
Referencias: Basualdo, I. Z., Soria Rey, N., Degen, R., Ortíz, M. & Zardini, E. M., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(FOR); BRA(PAR); PRY(APY, CAA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 9094* (US)]; BRA[*Hatschbach, G. 34533* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 800* (NY)].

Asplenium subglandulosum (Hook. & Grev.) Salvo, Prada & Díaz subsp. *papaverifolium* (Kunze) Salvo, Prada & Díaz = **Pleurosorus papaverifolius** (Kunze) Mett.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Asplenium sulcatum auct. non Lam. = **Asplenium auritum** Sw.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Asplenium sulcatum Lam. var. *recognitum* (Kunze) Hicken = **Asplenium auritum** Sw.
Referencias: Hassler, E., 1928.

Asplenium trapezoides Sw. = **Asplenium trilobum** Cav.
Referencias: Looser, G., 1944.

[Asplenium trichomanes L.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Asplenium trichomanes L. var. *anceps* (Sol.) Milde = **Asplenium resiliens** Kunze
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Asplenium trilobum Cav.
Sin.: *Asplenium parvulum* Hook., *Asplenium trapezoides* Sw., *Asplenium trilobum* Cav. var. *trapezoides* (Sw.) G. Kunkel
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Looser, G., 1944; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 68-p* (BAB)]; CHL[*Werdermann, E. 77* (SI)].

Asplenium trilobum Cav. var. *trapezoides* (Sw.) G. Kunkel = **Asplenium trilobum** Cav.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Asplenium triphyllum C. Presl
Sin.: *Asplenium imbricatum* Hook. & Grev.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba saxícola. Perenne. Nativa. 4300–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SCR, TUC); CHL(I, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 5020* (SI)]; CHL[*Zoellner, O. 4130* (CONC)].

Asplenium triquetrum N. Murak. & R.C. Moran
Sin.: *Asplenium obtusifolium* L.
Referencias: Murakami, N. & Moran, R. C., 1993.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. s.n.* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 24738* (MO, S, UC)]; PRY[*Zardini, E. M. 9501* (MO)].

Asplenium tucumanense Hieron. = **Asplenium squamosum** L.

Asplenium ulbrichtii Rosenst.
Sin.: *Asplenium ulbrichtii* Rosenst. var. *major* Rosenst., *Asplenium ulbrichtii* Rosenst. var. *serrato-dentatum* Rosenst.
Referencias: Capurro, R. H., 1961, 1969[1968]; Sehnem, A., 1968a; Sylvestre, L. S., 2001.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(CEN); URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pennington, T. D. 1114* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 2978* (PACA)]; PRY[*Hassler, E. 12247* (B, K, NY, P, US)]; URY[*Marchesi, E. 201* (MVFA)].

Asplenium ulbrichtii Rosenst. var. *major* Rosenst. = **Asplenium ulbrichtii** Rosenst.

Asplenium ulbrichtii Rosenst. var. *sellowianum* (Hieron.) Osten & Herter = **Asplenium sellowianum** (Hieron.) C. Presl ex Hieron.

Asplenium ulbrichtii Rosenst. var. *serrato-dentatum* Rosenst. = **Asplenium ulbrichtii** Rosenst.

Asplenium uniseriale Raddi = **Asplenium radicans** L. var. **uniseriale** (Raddi) L.D. Gómez

Asplenium wacketii Rosenst.
Referencias: Sehnem, A., 1968a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dittrich, V. A. s.n.* (MBM)].

Ceterach Willd.

Número de especies: 1 introducida

Ceterach officinarum Willd.
Hierba terrestre. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gamerro, J. C. 1167* (LP), *Gamerro, J. C. 1339* (LP)].

Gymnogramma chilensis Brack. = **Pleurosorus papaverifolius** (Kunze) Mett. var. **papaverifolius**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Gymnogramma papaverifolia Kunze = **Pleurosorus papaverifolius** (Kunze) Mett. var. **papaverifolius**
Referencias: Looser, G., 1931; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Phyllitis Hill

Número de especies: 1 introducida

Phyllitis balansae (Baker) C. Chr. = **Antigramma balansae** (Baker) L. Sylvestre & P.G. Windisch

Phyllitis brasiliensis (Sw.) Kuntze = **Antigramma brasiliensis** (Sw.) T. Moore

Phyllitis brasiliensis (Sw.) Kuntze var. *decurrens* Sehnem = **Antigramma brasiliensis** (Sw.) T. Moore

Phyllitis plantaginea (Schrad.) Kuntze = **Antigramma plantaginea** (Schrad.) C. Presl

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
Sin.: *Asplenium scolopendrium* L., *Scolopendrium vulgare* Sm.
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Moore, D. M., 1968.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Introducida. 0–200 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vallentin, E. F. s.n.* (K)].
Notas: Introducida en las Islas Malvinas, Argentina.

Pleurosorus Fée

Número de especies: 1 endémica

Pleurosorus inmersus Fée = **Pleurosorus papaverifolius** (Kunze) Mett.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pleurosorus papaverifolius (Kunze) Fée var. *hirsuta* Villagran = **Pleurosorus papaverifolius** (Kunze) Mett.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pleurosorus papaverifolius (Kunze) Fée var. *nana* Villagran = **Pleurosorus papaverifolius** (Kunze) Mett.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pleurosorus papaverifolius (Kunze) Mett.
Sin.: *Asplenium ciliatum* C. Presl ex Bertero, *Asplenium subglandulosum* (Hook. & Grev.) Salvo, Prada & Díaz subsp. *papaverifolium* (Kunze) Salvo, Prada & Díaz, *Gymnogramma chilensis* Brack., *Gymnogramma papaverifolia* Kunze, *Pleurosorus inmersus* Fée, *Pleurosorus papaverifolius* (Kunze) Fée var. *hirsuta* Villagran, *Pleurosorus papaverifolius* (Kunze) Fée var. *nana* Villagran, *Pleurosorus papaverifolius* (Kunze) Fée var. *spegazzinii* Hicken
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Looser, G., 1931; Rodríguez Ríos, R., 1995; Salvo Tierra, A. E., Prada, M. C. I. & Díaz, T., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 1225* (SI), *Sanzin, R. 3112* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996058* (CONC)].

Pleurosorus papaverifolius (Kunze) Fée var. *spegazzinii* Hicken = **Pleurosorus papaverifolius** (Kunze) Mett.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Scolopendrium balansae Baker = **Antigramma balansae** (Baker) L. Sylvestre & P.G. Windisch
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Scolopendrium brasiliense (Sw.) Kunze = **Antigramma brasiliensis** (Sw.) T. Moore

Scolopendrium plantagineum Schrad. = **Antigramma plantaginea** (Schrad.) C. Presl

Scolopendrium vulgare Sm. = **Phyllitis scolopendrium** (L.) Newman
Referencias: Moore, D. M., 1968.

AZOLLACEAE

Autores: de la Sota, E. R. & Ponce, M. M.
Revisor: Prado, J.

1 género, 2 especies.

Azolla Lam.

Número de especies: 2

Azolla arbuscula Desv. = **Azolla filiculoides** Lam.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Azolla bonariensis Bertol. = **Azolla filiculoides** Lam.
Referencias: Evrard, C. & Van Hove, C., 2004.

Azolla caroliniana auct. non Willd. = **Azolla cristata** Kaulf.
Referencias: Evrard, C. & Van Hove, C., 2004.

Azolla caroliniana Willd. = **Azolla filiculoides** Lam.
Referencias: Evrard, C. & Van Hove, C., 2004.

Azolla cristata Kaulf.
Sin.: *Azolla caroliniana* auct. non Willd., *Azolla mexicana* C. Presl, *Azolla microphylla* auct. non Kaulf., *Salvinia azolla* Raddi
Referencias: Evrard, C. & Van Hove, C., 2004.
Hierba acuática. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS); PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 1357* (BR, LP)]; PRY[*Balansa, B. 1121* (BM, BR, K)].

Azolla filiculoides Lam.
Sin.: *Azolla arbuscula* Desv., *Azolla bonariensis* Bertol., *Azolla caroliniana* Willd., *Azolla magellanica* Willd., *Azolla microphylla* Kaulf., *Azolla squamosa* Molina
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Evrard, C. & Van Hove, C., 2004; Rodríguez Ríos, R., 1995; Sehnem, A., 1979c; Svenson, H. K., 1944; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1994.
Hierba acuática. Nativa. 0–3800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU); BRA(RGS, SCA); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, RME); PRY(APY, APA, COA, PHA); URY(ART, COL, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 1544* (LP)]; BRA[*Ule, E. H. G. s.n.* (BR)]; CHL[*Ricardi, M. 272* (CONC)]; PRY[*Mereles, F. 6001* (FCQ, MO)]; URY[*Felippone, F. 1247* (K)].

Azolla magellanica Willd. = **Azolla filiculoides** Lam.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Azolla mexicana C. Presl = **Azolla cristata** Kaulf.
Referencias: Evrard, C. & Van Hove, C., 2004.

Azolla microphylla auct. non Kaulf. = **Azolla cristata** Kaulf.
Referencias: Evrard, C. & Van Hove, C., 2004.

Azolla microphylla Kaulf. = **Azolla filiculoides** Lam.
Referencias: Mickel, J. T. & Smith, A. R., 2004.

Azolla squamosa Molina = **Azolla filiculoides** Lam.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

BLECHNACEAE

Autores: de la Sota, E. R. & Ponce, M. M.
Revisor: Prado, J.

2 géneros, 35 especies, 14 especies endémicas.

Asplenium blechnoides Lag. ex Sw. = **Blechnum polypodioides** Raddi
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.

Blechnopsis brasiliensis (Desv.) C. Presl = **Blechnum brasiliense** Desv. var. **brasiliense**

Blechnopteris hastata (Kaulf.) Trevis. = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: de la Sota, E. R., 1972b; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum L.

Número de especies: 34, 14 endémicas

Blechnum acuminatum J.W. Sturm, hom. illeg. = **Blechnum arcuatum** J. Remy
Referencias: Looser, G., 1947; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum aduncum Liebm. = **Blechnum confluens** Schltdl. & Cham.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Blechnum alpinum Mett. = **Blechnum penna-marina** (Poir.) Kuhn
Referencias: de la Sota, E. R., 1970; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum alpinum Mett. var. *elongatum* Mett. = **Blechnum penna-marina** (Poir.) Kuhn
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum andicola (Phil.) C. Chr. = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum angustifolium Willd. = **Blechnum serrulatum** Rich.
Referencias: Sehnem, A., 1968b.

Blechnum angustum Schrad. = **Blechnum serrulatum** Rich.
Referencias: Sehnem, A., 1968b.

Blechnum araucanum (Phil.) C. Chr. = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum arcuatum J. Remy
Sin.: *Blechnum acuminatum* J.W. Sturm, hom. illeg., *Blechnum bibreae* Mett.
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Looser, G., 1947; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–900 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roth, S. s.n.* (SI)]; CHL[*Stuessy, T. F. 7604* (CONC)].

Blechnum asperum (Klotzsch) J.W. Sturm
Sin.: *Lomaria aspera* Klotzsch
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 196* (CONC)].

Blechnum asplenioides Sw.
Sin.: *Blechnum ceteraccinum* Raddi, *Blechnum glandulosum* Kaulf. ex Link var. *pallidum* Rosenst., *Blechnum unilaterale* Sw., nom. superfl.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Dittrich, V. A., 2005; Murillo, M. T., 1968; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1968b.
Hierba terrestre o rupícola. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA, CAA, CAN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1383* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 5318* (MBM)]; PRY[*Pietrobom-Silva, M. R. 2129* (SJRP)].

Blechnum attenuatum auct. non (Sw.) Mett. = **Blechnum binervatum** (Poir.) C.V. Morton & Lellinger subsp. **fragile** (Liebm.) R.M. Tryon & Stolze
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

[Blechnum attenuatum (Sw.) Mett.]
Sin.: *Onoclea attenuata* Sw.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Blechnum auriculatum auct. non Cav. = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum auriculatum Cav. = **Blechnum australe** L. subsp. **auriculatum** (Cav.) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Blechnum auriculatum Cav. f. *parvula* (Phil.) C. Chr. & Skottsb. = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum auriculatum Cav. f. *remotum* (C. Presl) C. Chr. & Skottsb. = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum auriculatum Cav. var. *hastatum* (Kaulf.) Looser = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum auriculatum Cav. var. *parvulum* (Phil.) Looser = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum auriculatum Cav. var. *trilobum* (C. Presl) Osten & Herter = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum australe auct. non L. = **Blechnum australe** L. subsp. **auriculatum** (Cav.) de la Sota

Blechnum australe L. f. *genuina* Hieron., nom. inval. = **Blechnum australe** L. subsp. **auriculatum** (Cav.) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Blechnum australe L. f. *mucronato-dentata* Rosenst. = **Blechnum australe** L. subsp. **auriculatum** (Cav.) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Blechnum australe L. f. *trilobum* (C. Presl) Rosenst. = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum australe L. var. *hastata* (Kaulf.) Hieron. = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum australe L. var. *triloba* (C. Presl) Hieron. = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum australe L. subsp. **auriculatum** (Cav.) de la Sota
Sin.: *Blechnum auriculatum* Cav., *Blechnum australe* auct. non L., *Blechnum australe* L. f. *genuina* Hieron., nom. inval. , *Blechnum australe* L. f. *mucronato-dentata* Rosenst., *Blechnum hastatum* auct. non Kaulf., *Mesothema auriculata* (Cav.) C. Presl
Referencias: de la Sota, E. R., 1972a, 1977; de la Sota, E. R., Giúdice, G. E. & Luna, M. L., 2006; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Osten, C. & Herter, W. G. F., 1925.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Endémica. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, MIS, RNE, SAL, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); URY(ART, CAS, COL, DUR, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, RIV, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 6449* (SI), *Troiani, H. O. 8278* (LP)]; BRA[*Eskuche, U. G. 1640-36* (CTES)]; URY[*Gómez Sosa, E. V. 292* (SI)].

Blechnum austrobrasilianum de la Sota
Sin.: *Blechnum rosenstockii* de la Sota, hom. illeg.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(LAV, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30641a* (SI), *de la Sota, E. R. 7115* (LP), *Zuloaga, F. O. 5513* (SI)]; BRA[*Burkart, A. 25047* (SI)]; URY[*Marchesi, E. 1253* (MVFA)].

Blechnum bibreae Mett. = **Blechnum arcuatum** J. Remy
Referencias: Looser, G., 1947.

Blechnum binervatum (Poir.) C.V. Morton & Lellinger subsp. **acutum** (Desv.) R.M. Tryon & Stolze
Sin.: *Blechnum kunthianum* C. Chr., *Blechnum meridense* (Klotzsch) Mett., nom. illeg., *Lomaria acuta* Desv., *Lomaria angustifolia* Kunth, *Lomaria meridensis* Klotzsch
Referencias: de la Sota, E. R. & Ponce, M. M., 1992; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.
Hierba hemiepífita. Perenne. Nativa. 100–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2904* (SI)]; BRA[*Imaguirre, N. 5326* (CTES)]; PRY[*Jiménez, B. 1337* (BM, CTES, MO, PY)].

[Blechnum binervatum (Poir.) C.V. Morton & Lellinger subsp. fragile (Liebm.) R.M. Tryon & Stolze]
Sin.: *Blechnum attenuatum* auct. non (Sw.) Mett., *Blechnum fragile* (Liebm.) C.V. Morton & Lellinger, *Blechnum onocleoides* Sw., *Blechnum polypodioides* (Sw.) Kuhn, hom. illeg., *Lomaria fragile* Liebm., *Lomaria onocleoides* (Sw.) Spreng.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Blechnum blechnoides (Lag. ex Sw.) C. Chr., nom. illeg. = **Blechnum polypodioides** Raddi
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.

Blechnum blechnoides auct. non Keyserl. = **Blechnum mochaenum** G. Kunkel var. **mochaenum**

Blechnum blechnoides Keyserl.
Sin.: *Blechnum leyboldtianum* (Phil.) C. Chr., *Blechnum lomarioides* Mett., hom. illeg., *Blechnum valdiviense* C. Chr., *Lomaria blechnoides* auct. non Bory, *Lomaria leyboldtiana* Phil., *Spicanta leyboldtiana* (Phil.) Kuntze
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1100 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 507* (CONC)].

Blechnum blechnoides (Bory) Keyserl. var. *achalense* (Hieron.) Looser = **Blechnum mochaenum** G. Kunkel var. **achalense** (Hieron.) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1972c.

Blechnum blechnoides (Bory) Keyserl. var. *fernandezianum* Looser = **Blechnum mochaenum** G. Kunkel var. **fernandezianum** (Looser) de la Sota
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum bradei Markgr. = **Blechnum schomburgkii** (Klotzsch) C. Chr.
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.

Blechnum brasiliense Desv. var. **angustifolium** Sehnem
Referencias: Sehnem, A., 1968b.
Hierba arborescente. Perenne. Endémica. 700–800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 14834* (HBR)].

Blechnum brasiliense Desv. var. **brasiliense**
Sin.: *Blechnopsis brasiliensis* (Desv.) C. Presl, *Blechnum corcovadense* Raddi, *Blechnum fluminensis* Vell., *Blechnum nigrosquamatum* Gilb., *Blechnum nitidum* C. Presl
Referencias: de la Sota, E. R., 1972a, 1977; Dutra, J., 1940[1938]; Osten, C. & Herter, W. G. F., 1925; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1968b.
Hierba arborescente. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, CAN, COA, SPE); URY(CLA, DUR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2179* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 7428* (FLOR, HBR)]; PRY[*Ferrucci, M. S. 1433* (CTES, SI)]; URY[*Berro, M. B. 1275* (MVFA)].

Blechnum brevifolium G. Kunkel = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum brevifolium G. Kunkel f. *acuminatum* G. Kunkel = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum brevifolium G. Kunkel f. *imbricatum* G. Kunkel = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum brevifolium G. Kunkel f. *nervosum* G. Kunkel = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum brevifolium G. Kunkel f. *semidecurrens* G. Kunkel = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum brevifolium G. Kunkel var. *valdiviense* G. Kunkel = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum brevifolium G. Kunkel subsp. *parvulum* (Phil.) G. Kunkel = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum calophyllum Langsd. & Fisch. = **Blechnum serrulatum** Rich.
Referencias: Sehnem, A., 1968b.

Blechnum capense auct. non (L.) Schltdl. = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Blechnum cartilagineum Schkuhr = **Blechnum occidentale** L.
Referencias: Sehnem, A., 1968b.

Blechnum caudatum Cav. = **Blechnum occidentale** L.
Referencias: Sehnem, A., 1968b.

Blechnum ceteraccinum Raddi = **Blechnum asplenioides** Sw.
Referencias: Sehnem, A., 1968b.

Blechnum chilense (Kaulf.) Mett. = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Blechnum chilense (Kaulf.) Mett. f. *imbricatum* G. Kunkel = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Blechnum chilense (Kaulf.) Mett. var. *reedii* (Phil.) Looser = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Blechnum ciliatum C. Presl = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum cognatum C. Presl = **Blechnum occidentale** L.
Referencias: Sehnem, A., 1968b.

[Blechnum confluens Schltdl. & Cham.]
Sin.: *Blechnum aduncum* Liebm., *Blechnum triangulare* Link
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Blechnum corcovadense Raddi = **Blechnum brasiliense** Desv. var. **brasiliense**
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Blechnum cordatum (Desv.) Hieron.
Sin.: *Blechnum capense* auct. non (L.) Schltdl., *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett., *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett. f. *imbricatum* G. Kunkel, *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett. var. *reedii* (Phil.) Looser, *Blechnum euraddianum* Brade, nom. inval., *Blechnum gilliesii* (Hook. & Grev.) Mett., *Blechnum macahense* Brade, *Blechnum ornifolium* (C. Presl) Ettingsh., *Blechnum raddianum* Hieron., hom. illeg., *Blechnum raddianum* Rosenst., *Blechnum reedii* (Phil.) Espinosa, *Blechnum regnellianum* (Kunze) C. Chr., *Blechnum regnellianum* (Kunze) C. Chr. var. *elatius* Sehnem, *Blechnum simile* Sehnem, *Lomaria brasiliensis* Raddi, *Lomaria chilensis* Kaulf., *Lomaria cordata* Desv., *Lomaria gillesii* Hook. & Grev., *Lomaria ornifolia* C. Presl, *Lomaria procera* auct. non Spreng., *Lomaria reedii* Phil., *Lomaria regnelliana* Kunze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Broughton, D. A., Adam, J. H. M. & Brännström, R., 2000; Osten, C. & Herter, W. G. F., 1925; Sehnem, A., 1968b.
Subarbusto. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SLU, TDF); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF, RME); PRY(CAU, COA, SPE); URY(CAS, MAL, MON, RIV, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 6500* (LP)]; BRA[*Jürgens, C. s.n.* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20003* (CONC, SGO)]; PRY[*Zardini, E. M. 38191* (MO)]; URY[*Osten, C. 6548* (SI)].
Notas: R. M. Tryon & Stolze (1993: 63) opinan que se necesita una revisión de este taxón y especies afines.

Blechnum corralense Espinosa
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 7139* (CONC)].

Blechnum cycadifolium (Colla) J.W. Sturm
Sin.: *Blechnum lanuginosum* (Kunze) J.W. Sturm, *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *cycadifolium* (Colla) C. Chr., *Lomaria cycadifolia* Colla, *Lomaria lanuginosa* Kunze
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Arborescente. Perenne. Endémica. 200–1200 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 6h* (SI)].

Blechnum distans C. Presl = **Blechnum laevigatum** Cav.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Blechnum distans C. Presl var. *meridionale* (C. Presl) Rosenst. = **Blechnum laevigatum** Cav.

Blechnum divergens (Kunze) Mett.
Sin.: *Lomaria divergens* Kunze
Referencias: Sehnem, A., 1968b.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16351* (MBM)].

Blechnum euraddianum Brade, nom. inval. = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.

Blechnum exiguum Dutra = **Blechnum schomburgkii** (Klotzsch) C. Chr.
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.

Blechnum fluminensis Vell. = **Blechnum brasiliense** Desv. var. **brasiliense**

Blechnum fragile (Liebm.) C.V. Morton & Lellinger = **Blechnum binervatum** (Poir.) C.V. Morton & Lellinger subsp. **fragile** (Liebm.) R.M. Tryon & Stolze
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Blechnum fraxineum auct. non Willd. = **Blechnum gracile** Kaulf.
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Blechnum gayanum (J. Remy) J.W. Sturm = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum gayanum (J. Remy) J.W. Sturm f. *germainii* (Hook.) Looser = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton
Referencias: Looser, G., 1947; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum germanii (Hook.) H. Christ = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton
Referencias: Looser, G., 1947; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum gilliesii (Hook. & Grev.) Mett. = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Blechnum glandulosum auct. non Kaulf. ex Link = **Blechnum laevigatum** Cav.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Blechnum glandulosum Kaulf. ex Link = **Blechnum occidentale** L.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Blechnum glandulosum Kaulf. ex Link var. *distans* (C. Presl) C. Chr. = **Blechnum laevigatum** Cav.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Blechnum glandulosum Kaulf. ex Link var. *elongatum* Kunze = **Blechnum occidentale** L.

Blechnum glandulosum Kaulf. ex Link var. *meridionale* (C. Presl) Sehnem = **Blechnum laevigatum** Cav.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Blechnum glandulosum Kaulf. ex Link var. *pallidum* Rosenst. = **Blechnum asplenioides** Sw.

Blechnum gracile Kaulf.
Sin.: *Blechnum fraxineum* auct. non Willd.
Referencias: Dutra, J., 1940[1938]; Moran, R. C., 1995; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1968b.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1543* (SI), *Tressens, S. G. 5719* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 24045* (MBM, PACA)]; PRY[*Jiménez, B. 1198* (PY)].

Blechnum hastatum auct. non Kaulf. = **Blechnum australe** L. subsp. **auriculatum** (Cav.) de la Sota

Blechnum hastatum Kaulf.
Sin.: *Blechnopteris hastata* (Kaulf.) Trevis., *Blechnum auriculatum* auct. non Cav., *Blechnum auriculatum* Cav. f. *parvula* (Phil.) C. Chr. & Skottsb., *Blechnum auriculatum* Cav. f. *remotum* (C. Presl) C. Chr. & Skottsb., *Blechnum auriculatum* Cav. var. *hastatum* (Kaulf.) Looser, *Blechnum auriculatum* Cav. var. *parvulum* (Phil.) Looser, *Blechnum auriculatum* Cav. var. *trilobum* (C. Presl) Osten & Herter, *Blechnum australe* L. f. *trilobum* (C. Presl) Rosenst., *Blechnum australe* L. var. *hastata* (Kaulf.) Hieron., *Blechnum australe* L. var. *triloba* (C. Presl) Hieron., *Blechnum brevifolium* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel f. *acuminatum* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel f. *imbricatum* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel f. *nervosum* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel f. *semidecurrens* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel subsp. *parvulum* (Phil.) G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel var. *valdiviense* G. Kunkel, *Blechnum ciliatum* C. Presl, *Blechnum hastatum* Kaulf. f. *alternatum* G. Kunkel, *Blechnum hastatum* Kaulf. f. *punctatum* (Looser) G. Kunkel, *Blechnum hastatum* Kaulf. var. *minor* Hook., *Blechnum hastatum* Kaulf. var. *trilobum* (C. Presl) G. Kunkel, *Blechnum parvulum* Phil., *Blechnum remotum* C. Presl, *Blechnum trilobum* C. Presl, *Lomaria hastata* (Kaulf.) Kunze, *Lomaria pubescens* (Hook.) Kunze, *Lomaria triloba* (C. Presl) Fée, *Mesothema remotum* (C. Presl) C. Presl, *Mesothema trilobum* (C. Presl) C. Presl, *Parablechnum ciliatum* (C. Presl) C. Presl, *Spicanta hastata* (Kaulf.) Kuntze, *Struthiopteris hastata* (Kaulf.) Trevis., *Struthiopteris remota* (C. Presl) Trevis., *Struthiopteris triloba* (C. Presl) Trevis., *Taenitis sagittaefera* Bory
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; de la Sota, E. R., 1972b; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Corte, A. 54* (LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 994842* (CONC, SGO)].

Blechnum hastatum Kaulf. f. *alternatum* G. Kunkel = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum hastatum Kaulf. f. *punctatum* (Looser) G. Kunkel = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum hastatum Kaulf. var. *minor* Hook. = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum hastatum Kaulf. var. *trilobum* (C. Presl) G. Kunkel = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum imperiale (Fée & Glaz.) H. Christ = **Blechnum tabulare** (Thunb.) Kuhn
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Blechnum integerrimum Spreng. = **Blechnum lanceola** Sw.

Blechnum jürgensii Rosenst. = **Blechnum laevigatum** Cav.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Blechnum kunthianum C. Chr. = **Blechnum binervatum** (Poir.) C.V. Morton & Lellinger subsp. **acutum** (Desv.) R.M. Tryon & Stolze
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Blechnum laevigatum Cav.
Sin.: *Blechnum distans* C. Presl, *Blechnum distans* C. Presl var. *meridionale* (C. Presl) Rosenst., *Blechnum glandulosum* auct. non Kaulf. ex Link, *Blechnum glandulosum* Kaulf. ex Link var. *distans* (C. Presl) C. Chr., *Blechnum glandulosum* Kaulf. ex Link var. *meridionale* (C. Presl) Sehnem, *Blechnum jürgensii* Rosenst., *Blechnum occidentale* L. var. *distans* (C. Presl) Baker
Referencias: de la Sota, E. R., 1972a, 1977; Osten, C. & Herter, W. G. F., 1925.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, MIS, SLU); BRA(PAR, RGS); URY(ART, CLA, COL, DUR, FLO, MAL, RIV, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7548* (SI)]; BRA[*Kummrow, R. 1077* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 3761* (SI)].

Blechnum lanceola Sw.
Sin.: *Blechnum integerrimum* Spreng., *Blechnum lanceola* Sw. f. *minus* Hassl., *Blechnum lanceola* Sw. var. *trifoliatum* (Kaulf.) Kuntze, *Blechnum lanceolatum* Raddi, hom. illeg., *Blechnum minutulum* H. Christ, *Blechnum plantagineum* (C. Presl) Hook., *Blechnum trifoliatum* Kaulf., *Mesothema plantaginea* C. Presl, *Spicantha lanceola* (Sw.) Kuntze, *Struthiopteris lanceola* (Sw.) Trevis.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Dutra, J., 1940[1938]; Murillo, M. T., 1968; Pellegrini, G., 1999; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1968b.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS); PRY(APA, CAN, COA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 1547* (SI)]; BRA[*Leite, J. E. 16* (NY)]; PRY[*Hassler, E. 5237* (BM)].

Blechnum lanceola Sw. f. *minus* Hassl. = **Blechnum lanceola** Sw.

Blechnum lanceola Sw. var. *trifoliatum* (Kaulf.) Kuntze = **Blechnum lanceola** Sw.

Blechnum lanceolatum auct. non (R. Br.) J.W. Sturm = **Blechnum mochaenum** G. Kunkel var. **mochaenum**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum lanceolatum Raddi, hom. illeg. = **Blechnum lanceola** Sw.
Referencias: Sehnem, A., 1968b.

Blechnum lanceolatum (R. Br.) J.W. Sturm var. *achalense* auct. non Hieron. = **Blechnum mochaenum** G. Kunkel var. **mochaenum**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum lanceolatum (R. Br.) J.W. Sturm var. *achalense* Hieron. = **Blechnum mochaenum** G. Kunkel var. **achalense** (Hieron.) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1972c.

Blechnum lanceolatum (R. Br.) J.W. Sturm var. *squamipes* Hieron. = **Blechnum mochaenum** G. Kunkel var. **squamipes** (Hieron.) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Blechnum lanuginosum (Kunze) J.W. Sturm = **Blechnum cycadifolium** (Colla) J.W. Sturm
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum lehmanii Hieron.
Sin.: *Blechnum mexiae* Copel., *Struthiopteris mexiae* (Copel.) Ching
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 100–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4463* (HBR)].

Blechnum leyboldtianum (Phil.) C. Chr. = **Blechnum blechnoides** Keyserl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum lomarioides Mett., hom. illeg. = **Blechnum blechnoides** Keyserl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum longicauda C. Chr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, C. J. F. 465* (*)].
Notas: Endémica de la Isla Más Afuera, Archipiélago de Juan Fernández, Chile.

Blechnum ludificans Herter
Referencias: de la Sota, E. R., Giúdice, G. E. & Luna, M. L., 2006.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 100–200 m.
Países: URY(DUR).
Ejemplares de referencia: URY[*Herter, G. 99722* (US)].

Blechnum macahense Brade = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.

Blechnum magellanicum (Desv.) Mett.
Sin.: *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. f. *kochii* G. Kunkel, *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *bipinnatifidum* G. Kunkel, *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *setigerum* (Gaudich.) C. Chr., *Blechnum tabulare* (Thunb.) Kuhn var. *setigerum* (Gaudich.) Capurro, *Blechnum tabulare* auct. non (Thunb.) Kuhn, *Lomaria boryana* auct. non (Sw.) Willd., *Lomaria magellanica* Desv., *Lomaria setigera* Gaudich.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Looser, G., 1947; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–2200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1023* (SI)]; CHL[*Marticorena, C. 1824* (CONC)].

Blechnum magellanicum (Desv.) Mett. f. *kochii* G. Kunkel = **Blechnum magellanicum** (Desv.) Mett.

Blechnum magellanicum (Desv.) Mett. var. *bipinnatifidum* G. Kunkel = **Blechnum magellanicum** (Desv.) Mett.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum magellanicum (Desv.) Mett. var. *cycadifolium* (Colla) C. Chr. = **Blechnum cycadifolium** (Colla) J.W. Sturm
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum magellanicum (Desv.) Mett. var. *setigerum* (Gaudich.) C. Chr. = **Blechnum magellanicum** (Desv.) Mett.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum meridense (Klotzsch) Mett., nom. illeg. = **Blechnum binervatum** (Poir.) C.V. Morton & Lellinger subsp. **acutum** (Desv.) R.M. Tryon & Stolze
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Blechnum mexiae Copel. = **Blechnum lehmanii** Hieron.
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.

Blechnum microphyllum (Goldm.) C.V. Morton
Sin.: *Blechnum andicola* (Phil.) C. Chr., *Blechnum araucanum* (Phil.) C. Chr., *Blechnum gayanum* (J. Remy) J.W. Sturm, *Blechnum gayanum* (J. Remy) J.W. Sturm f. *germainii* (Hook.) Looser, *Blechnum germanii* (Hook.) H. Christ, *Blechnum poeppigianum* J.W. Sturm, *Lomaria andicola* Phil., *Lomaria araucana* Phil., *Lomaria australis* Kunze, *Lomaria gayana* J. Remy, *Lomaria germainii* Hook., *Lomaria microphylla* Goldm.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Looser, G., 1947; Prina, A. O., Alfonso, G. L. & Muiño, W., 2004[2003]; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2600 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6185* (LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20114* (CONC, SGO)].

Blechnum minutulum H. Christ = **Blechnum lanceola** Sw.

Blechnum mochaenum G. Kunkel var. **achalense** (Hieron.) de la Sota
Sin.: *Blechnum blechnoides* (Bory) Keyserl. var. *achalense* (Hieron.) Looser, *Blechnum lanceolatum* (R. Br.) J.W. Sturm var. *achalense* Hieron.
Referencias: de la Sota, E. R., 1972c.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Endémica. 500–800 m.
Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cassá de Pazos, L. 235* (LP)].

Blechnum mochaenum G. Kunkel var. **fernandezianum** (Looser) de la Sota
Sin.: *Blechnum blechnoides* (Bory) Keyserl. var. *fernandezianum* Looser
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. s.n.* (*)].

Blechnum mochaenum G. Kunkel var. **mochaenum**
Sin.: *Blechnum blechnoides* auct. non Keyserl., *Blechnum lanceolatum* (R. Br.) J.W. Sturm var. *achalense* auct. non Hieron., *Blechnum lanceolatum* auct. non (R. Br.) J.W. Sturm, *Lomaria lechleri* T. Moore
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; de la Sota, E. R., 1972c; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Sehnem, A., 1968b.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1800 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, NEU, RNE, TUC); BRA(RGS); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6531* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 6798* (PACA)]; CHL[*Garaventa, A. 4919* (CONC)].

Blechnum mochaenum G. Kunkel var. **squamipes** (Hieron.) de la Sota
Sin.: *Blechnum lanceolatum* (R. Br.) J.W. Sturm var. *squamipes* Hieron.
Referencias: de la Sota, E. R., 1972c, 1977.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1571* (SI)].

Blechnum mollucanum Desv. = **Blechnum serrulatum** Rich.
Referencias: Sehnem, A., 1968b.

Blechnum nigrosquamatum Gilb. = **Blechnum brasiliense** Desv. var. **brasiliense**
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Blechnum nitidum C. Presl = **Blechnum brasiliense** Desv. var. **brasiliense**
Referencias: de la Sota, E. R., 1972a.

Blechnum obtusifolium Ettingsh.
Sin.: *Lomaria obtusifolia* C. Presl, nom. nud.
Referencias: Herter, W. G. F., 1940b; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAN, PAI); URY(CAS, CLA, MAL, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 1726* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 1641* (MVM)].
Notas: Citada por Peña-Chocarro (1999) para Argentina y por R. M. Tryon & Stolze (1993) para Brasil sin indicar localidad o material de referencia.

Blechnum occidentale L. var. *caudatum* (Cav.) Rosenst. = **Blechnum occidentale** L.

Blechnum occidentale L. var. *distans* (C. Presl) Baker = **Blechnum laevigatum** Cav.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Blechnum occidentale L. var. *lacerata* Rosenst. = **Blechnum occidentale** L.

Blechnum occidentale L.
Sin.: *Blechnum cartilagineum* Schkuhr, *Blechnum caudatum* Cav., *Blechnum cognatum* C. Presl, *Blechnum glandulosum* Kaulf. ex Link, *Blechnum glandulosum* Kaulf. ex Link var. *elongatum* Kunze, *Blechnum occidentale* L. var. *caudatum* (Cav.) Rosenst., *Blechnum occidentale* L. var. *lacerata* Rosenst., *Blechnum occidentale* L. var. *pubirhachis* Rosenst., *Blechnum suburbicum* Vell.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Dutra, J., 1940[1938]; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1968b.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 4443* (LP), *Zuloaga, F. O. 5481* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 46443* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 4437* (BM)].

Blechnum occidentale L. var. *pubirhachis* Rosenst. = **Blechnum occidentale** L.

Blechnum onocleoides Sw. = **Blechnum binervatum** (Poir.) C.V. Morton & Lellinger subsp. **fragile** (Liebm.) R.M. Tryon & Stolze
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.

Blechnum ornifolium (C. Presl) Ettingsh. = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.
Referencias: Sehnem, A., 1968b.

Blechnum parvulum Phil. = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum penna-marina (Poir.) Kuhn
Sin.: *Blechnum alpinum* Mett., *Blechnum alpinum* Mett. var. *elongatum* Mett., *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn f. *polypodioides* (Desv. ex Gaudich.) C. Chr., *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn var. *polypodioides* (Desv. ex Gaudich.) Looser, *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn var. *uliginosa* (F. Phil.) C. Chr., *Blechnum uliginosum* (F. Phil.) C. Chr., *Lomaria alpina* Spreng., *Lomaria antarctica* Carmich., *Lomaria penna-marina* (Poir.) Mett., *Lomaria polypodioides* Desv. ex Gaudich., *Lomaria uliginosa* F. Phil., *Lomaria uliginosa* F. Phil. var. *magellanica* F. Phil., *Polypodium penna-marina* Poir.
Referencias: de la Sota, E. R., 1970, 1977; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Dutra, J., 1940[1938]; Sehnem, A., 1968b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ, NEU, RNE, SAL, SCR, SLU, TDF, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 16421* (LP), *de la Sota, E. R. 6402* (LP)]; BRA[*Sehnem, A. 948* (PACA)]; CHL[*Gunckel, L. H. 16019* (CONC)].

Blechnum penna-marina (Poir.) Kuhn f. *polypodioides* (Desv. ex Gaudich.) C. Chr. = **Blechnum penna-marina** (Poir.) Kuhn
Referencias: de la Sota, E. R., 1970; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum penna-marina (Poir.) Kuhn var. *polypodioides* (Desv. ex Gaudich.) Looser = **Blechnum penna-marina** (Poir.) Kuhn
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum penna-marina (Poir.) Kuhn var. *uliginosa* (F. Phil.) C. Chr. = **Blechnum penna-marina** (Poir.) Kuhn
Referencias: de la Sota, E. R., 1970; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum plantagineum (C. Presl) Hook. = **Blechnum lanceola** Sw.

[Blechnum plumierii (Desv.) Mett.]
Sin.: *Lomaria plumierii* Desv.
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Blechnum poeppigianum J.W. Sturm = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum pohlianum C. Presl = **Blechnum polypodioides** Raddi
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.

Blechnum polypodioides (Sw.) Kuhn, hom. illeg. = **Blechnum binervatum** (Poir.) C.V. Morton & Lellinger subsp. **fragile** (Liebm.) R.M. Tryon & Stolze
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Blechnum polypodioides Raddi
Sin.: *Asplenium blechnoides* Lag. ex Sw., *Blechnum blechnoides* (Lag. ex Sw.) C. Chr., nom. illeg., *Blechnum pohlianum* C. Presl, *Blechnum unilaterale* Sw. f. *maius* Sehnem
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwarz, G. J. 5905* (RB)]; BRA[*Hatschbach, G. 24426* (MBM, PACA)]; PRY[*Krapovickas, A. 41875* (MBM)].

Blechnum raddianum Hieron., hom. illeg. = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.

Blechnum raddianum Rosenst. = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.

Blechnum reedii (Phil.) Espinosa = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Blechnum regnellianum (Kunze) C. Chr. = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.

Blechnum regnellianum (Kunze) C. Chr. var. *elatius* Sehnem = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.

Blechnum remotum C. Presl = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum rosenstockii de la Sota, hom. illeg. = **Blechnum austrobrasilianum** de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Blechnum sampaioanum Brade
Sin.: *Lomaria mucronata* Fée
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.
Hierba terrestre. Nativa. 200–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA); URY(CLA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ribas, O. S. 5180* (MBM)].

Blechnum schomburgkii (Klotzsch) C. Chr.
Sin.: *Blechnum bradei* Markgr., *Blechnum exiguum* Dutra, *Lomaria schomburgkii* Klotzsch
Referencias: Dittrich, V. A., 2005; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, GUA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 6275* (PACA)]; PRY[*Jörgensen, P. 4606* (SI)].

Blechnum schottii (Colla) C. Chr.
Sin.: *Lomaria bella* F. Phil., *Lomaria fernandeziana* F. Phil., *Lomaria schottii* Colla
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba hemiepífita. Perenne. Endémica. 300 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 5047* (CONC)].
Notas: Endémica del Archipiélago de Juan Fernández, Chile.

Blechnum serrulatum Rich.
Sin.: *Blechnum angustifolium* Willd., *Blechnum angustum* Schrad., *Blechnum calophyllum* Langsd. & Fisch., *Blechnum mollucanum* Desv., *Blechnum serrulatum* Rich. var. *stierii* Rosenst., *Blechnum stagninum* Raddi, *Blechnum stierii* Rosenst.
Referencias: Dutra, J., 1940[1938]; Murillo, M. T., 1968; Sehnem, A., 1968b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CEN, COA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 9* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 4960* (HBR)]; PRY[*Hahn, W. J. 2064* (MO, PY)].

Blechnum serrulatum Rich. var. *stierii* Rosenst. = **Blechnum serrulatum** Rich.

Blechnum simile Sehnem = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.

Blechnum spannagelii Rosenst.
Sin.: *Blechnum spannagelii* Rosenst. f. *pectinata* Rosenst.
Referencias: Dutra, J., 1940[1938]; Sehnem, A., 1968b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 277* (SI)].

Blechnum spannagelii Rosenst. f. *pectinata* Rosenst. = **Blechnum spannagelii** Rosenst.

Blechnum sprucei C. Chr.
Sin.: *Lomaria caudata* Baker
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cassá de Pazos, L. 285* (LP)].
Notas: Citada para el Sur de Brasil sin indicar localidad o material de referencia (R. M. Tryon & Stolze, 1993).

Blechnum stagninum Raddi = **Blechnum serrulatum** Rich.
Referencias: Sehnem, A., 1968b.

Blechnum stierii Rosenst. = **Blechnum serrulatum** Rich.
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.

Blechnum suburbicum Vell. = **Blechnum occidentale** L.

Blechnum tabulare auct. non (Thunb.) Kuhn = **Blechnum magellanicum** (Desv.) Mett.
Referencias: Looser, G., 1947; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum tabulare (Thunb.) Kuhn
Sin.: *Blechnum imperiale* (Fée & Glaz.) H. Christ, *Lomaria boryana* (Sw.) Willd., *Lomaria imperialis* Fée & Glaz., *Lomaria robusta* Carmich., *Lomaria tabularis* Mett. ex Baker, *Onoclea boryana* Sw., *Pteris osmundoides* Bory, *Pteris palmaeformis* Thouars, *Pteris tabularis* Thunb., *Struthiopteris imperialis* (Fée & Glaz.) Ching
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Legrand, C. M. D. H. & Lombardo, A., 1958; Legrand, D. & Lombardo, A., 1958; Osten, C. & Herter, W. G. F., 1925; Sehnem, A., 1968b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, MIE); URY(CAS, CLA, MAL, RIV, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cassá de Pazos, L. 286* (LP), *Zuloaga, F. O. 7508* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 14427* (SI), *Dutra, J. 278* (SI), *Jürgens, C. s.n.* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 4404* (SI)]; URY[*Brussa, C. s.n.* (MVJB)].

Blechnum tabulare (Thunb.) Kuhn var. *setigerum* (Gaudich.) Capurro = **Blechnum magellanicum** (Desv.) Mett.

Blechnum triangulare Link = **Blechnum confluens** Schltdl. & Cham.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Blechnum trifoliatum Kaulf. = **Blechnum lanceola** Sw.
Referencias: Sehnem, A., 1968b.

Blechnum trilobum C. Presl = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum uliginosum (F. Phil.) C. Chr. = **Blechnum penna-marina** (Poir.) Kuhn
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum unilaterale Sw., nom. superfl. = **Blechnum asplenioides** Sw.
Referencias: Murillo, M. T., 1968; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Blechnum unilaterale Sw. f. *maius* Sehnem = **Blechnum polypodioides** Raddi
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.

Blechnum usterianum (Christ) C. Chr.
Sin.: *Lomaria usteriana* Christ
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 48933* (MBM)].

Blechnum valdiviense C. Chr. = **Blechnum blechnoides** Keyserl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Blechnum volubilis Kaulf. = **Salpichlaena volubilis** (Kaulf.) J. Sm.
Referencias: Moran, R. C., 1995; Sehnem, A., 1968b.

Lomaria acuta Desv. = **Blechnum binervatum** (Poir.) C.V. Morton & Lellinger subsp. **acutum** (Desv.) R.M. Tryon & Stolze
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Lomaria alpina Spreng. = **Blechnum penna-marina** (Poir.) Kuhn
Referencias: Moore, D. M., 1983; Sehnem, A., 1968b.

Lomaria andicola Phil. = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria angustifolia Kunth = **Blechnum binervatum** (Poir.) C.V. Morton & Lellinger subsp. **acutum** (Desv.) R.M. Tryon & Stolze
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Lomaria antarctica Carmich. = **Blechnum penna-marina** (Poir.) Kuhn
Referencias: de la Sota, E. R., 1970.

Lomaria araucana Phil. = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria aspera Klotzsch = **Blechnum asperum** (Klotzsch) J.W. Sturm
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria australis Kunze = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria bella F. Phil. = **Blechnum schottii** (Colla) C. Chr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria blechnoides auct. non Bory = **Blechnum blechnoides** Keyserl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria boryana (Sw.) Willd. = **Blechnum tabulare** (Thunb.) Kuhn
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Lomaria boryana auct. non (Sw.) Willd. = **Blechnum magellanicum** (Desv.) Mett.
Referencias: Looser, G., 1947; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria brasiliensis Raddi = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.

Lomaria caudata Baker = **Blechnum sprucei** C. Chr.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Lomaria chilensis Kaulf. = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Lomaria cordata Desv. = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.
Referencias: Sehnem, A., 1968b.

Lomaria cycadifolia Colla = **Blechnum cycadifolium** (Colla) J.W. Sturm
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria divergens Kunze = **Blechnum divergens** (Kunze) Mett.
Referencias: Sehnem, A., 1968b.

Lomaria fernandeziana F. Phil. = **Blechnum schottii** (Colla) C. Chr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria fragile Liebm. = **Blechnum binervatum** (Poir.) C.V. Morton & Lellinger subsp. **fragile** (Liebm.) R.M. Tryon & Stolze
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Lomaria fraxinifolia Raddi = **Lomariopsis marginata** (Schrad.) Kuhn
Referencias: Moran, R. C., 2000.

Lomaria gayana J. Remy = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria germainii Hook. = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria gillesii Hook. & Grev. = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Lomaria hastata (Kaulf.) Kunze = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: de la Sota, E. R., 1972b; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria imperialis Fée & Glaz. = **Blechnum tabulare** (Thunb.) Kuhn
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Lomaria lanuginosa Kunze = **Blechnum cycadifolium** (Colla) J.W. Sturm
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria lechleri T. Moore = **Blechnum mochaenum** G. Kunkel var. **mochaenum**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria leyboldtiana Phil. = **Blechnum blechnoides** Keyserl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria magellanica Desv. = **Blechnum magellanicum** (Desv.) Mett.
Referencias: Looser, G., 1947; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria meridensis Klotzsch = **Blechnum binervatum** (Poir.) C.V. Morton & Lellinger subsp. **acutum** (Desv.) R.M. Tryon & Stolze
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Lomaria microphylla Goldm. = **Blechnum microphyllum** (Goldm.) C.V. Morton
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria mucronata Fée = **Blechnum sampaioanum** Brade
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.

Lomaria obtusifolia C. Presl, nom. nud. = **Blechnum obtusifolium** Ettingsh.
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Lomaria onocleoides (Sw.) Spreng. = **Blechnum binervatum** (Poir.) C.V. Morton & Lellinger subsp. **fragile** (Liebm.) R.M. Tryon & Stolze

Lomaria ornifolia C. Presl = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.
Referencias: Sehnem, A., 1968b.

Lomaria penna-marina (Poir.) Mett. = **Blechnum penna-marina** (Poir.) Kuhn

Lomaria plumierii Desv. = **Blechnum plumierii** (Desv.) Mett.

Lomaria polypodioides Desv. ex Gaudich. = **Blechnum penna-marina** (Poir.) Kuhn
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria procera auct. non Spreng. = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Lomaria pubescens (Hook.) Kunze = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria reedii Phil. = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Lomaria regnelliana Kunze = **Blechnum cordatum** (Desv.) Hieron.
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.

Lomaria robusta Carmich. = **Blechnum tabulare** (Thunb.) Kuhn
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Lomaria schomburgkii Klotzsch = **Blechnum schomburgkii** (Klotzsch) C. Chr.

Lomaria schottii Colla = **Blechnum schottii** (Colla) C. Chr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria setigera Gaudich. = **Blechnum magellanicum** (Desv.) Mett.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria tabularis Mett. ex Baker = **Blechnum tabulare** (Thunb.) Kuhn
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Lomaria triloba (C. Presl) Fée = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria uliginosa F. Phil. = **Blechnum penna-marina** (Poir.) Kuhn
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria uliginosa F. Phil. var. *magellanica* F. Phil. = **Blechnum penna-marina** (Poir.) Kuhn
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lomaria usteriana Christ = **Blechnum usterianum** (Christ) C. Chr.

Mesothema auriculata (Cav.) C. Presl = **Blechnum australe** L. subsp. **auriculatum** (Cav.) de la Sota

Mesothema plantaginea C. Presl = **Blechnum lanceola** Sw.
Referencias: Sehnem, A., 1968b.

Mesothema remotum (C. Presl) C. Presl = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Mesothema trilobum (C. Presl) C. Presl = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Onoclea attenuata Sw. = **Blechnum attenuatum** (Sw.) Mett.

Onoclea boryana Sw. = **Blechnum tabulare** (Thunb.) Kuhn
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Parablechnum ciliatum (C. Presl) C. Presl = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium penna-marina Poir. = **Blechnum penna-marina** (Poir.) Kuhn
Referencias: de la Sota, E. R., 1970; Rodríguez Ríos, R., 1995; Sehnem, A., 1968b.

Pteris osmundoides Bory = **Blechnum tabulare** (Thunb.) Kuhn
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Pteris palmaeformis Thouars = **Blechnum tabulare** (Thunb.) Kuhn
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Pteris tabularis Thunb. = **Blechnum tabulare** (Thunb.) Kuhn
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Salpichlaena J. Sm.

Número de especies: 1

Salpichlaena volubilis (Kaulf.) J. Sm.
Sin.: *Blechnum volubilis* Kaulf.
Referencias: Moran, R. C., 1995; Sehnem, A., 1968b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 14397* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 10093a* (BM)].

Spicanta hastata (Kaulf.) Kuntze = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Spicanta leyboldtiana (Phil.) Kuntze = **Blechnum blechnoides** Keyserl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Spicantha lanceola (Sw.) Kuntze = **Blechnum lanceola** Sw.

Struthiopteris hastata (Kaulf.) Trevis. = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Struthiopteris imperialis (Fée & Glaz.) Ching = **Blechnum tabulare** (Thunb.) Kuhn
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Struthiopteris lanceola (Sw.) Trevis. = **Blechnum lanceola** Sw.

Struthiopteris mexiae (Copel.) Ching = **Blechnum lehmanii** Hieron.
Referencias: Dittrich, V. A., 2005.

Struthiopteris remota (C. Presl) Trevis. = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Struthiopteris triloba (C. Presl) Trevis. = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Taenitis sagittaefera Bory = **Blechnum hastatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

CYATHEACEAE

Autores: Lehnert, M., Ponce, M. M. & de la Sota, E. R.
Revisor: Prado, J.

3 géneros, 15 especies.

Alsophila R. Br.

Número de especies: 5

[Alsophila acantha Sehnem]
Notas: Nombre dudoso.

Alsophila atrovirens (Langsd. & Fisch.) C. Presl = **Cyathea atrovirens** (Langsd. & Fisch.) Domin
Referencias: Lellinger, D. B., 1987a.

Alsophila campestrium Sehnem = **Cyathea corcovadensis** (Raddi) Domin

Alsophila capensis (L. f.) J. Sm. subsp. **polypodioides** (Sw.) D.S. Conant
Sin.: *Cyathea polypodioides* Sw., *Hemitelia gardneriana* C. Presl
Referencias: Conant, D. S., 1983; Sehnem, A., 1978.
Arborescente. Perenne. Endémica. 900–2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 10222* (MBM)].

Alsophila christiana Sehnem, nom. nud. = **Cyathea dichromatolepis** (Fée) Domin

Alsophila cipoënsis Sehnem = **Cyathea villosa** Humb. & Bonpl. ex Willd.

[Alsophila compta (Mart.) Mart. f. transiens Hassl.]
Referencias: Hassler, E., 1928.
Notas: Nombre dudoso.

Alsophila corcovadensis (Raddi) C. Chr. = **Cyathea corcovadensis** (Raddi) Domin

Alsophila cuspidata (Kunze) D.S. Conant
Sin.: *Cyathea cuspidata* Kunze, *Cyathea hassleriana* H. Christ var. *hassleriana*, *Cyathea hassleriana* H. Christ var. *rojasii* H. Christ, *Nephelea cuspidata* (Kunze) R.M. Tryon
Referencias: Conant, D. S., 1983; Gastony, G. J., 1973; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Arborescente. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: PRY(CAA, CAN, COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Marín, G. 217* (BM, CTES, MO, PY)].

Alsophila decipiens Fée = **Cyathea corcovadensis** (Raddi) Domin

Alsophila dichromatolepis Fée = **Cyathea dichromatolepis** (Fée) Domin

Alsophila dorsalis (Fée) H. Christ = **Alsophila setosa** Kaulf.
Referencias: Conant, D. S., 1983.

Alsophila elegans Mart. var. *crenato-serrata* Sehnem = **Cyathea corcovadensis** (Raddi) Domin

Alsophila feeana C. Chr. = **Cyathea corcovadensis** (Raddi) Domin

Alsophila gardneri Hook. = **Sphaeropteris gardneri** (Hook.) R.M. Tryon

Alsophila glaziovii Baker, hom. illeg. = **Cyathea corcovadensis** (Raddi) Domin

Alsophila glaziovii H. Christ, hom. illeg. = **Cyathea dichromatolepis** (Fée) Domin

Alsophila hirta Kaulf. = **Cyathea hirsuta** C. Presl

Alsophila impressa Fée = **Cyathea poeppigii** (Hook.) Domin

Alsophila incana auct. non (H. Karst.) D.S. Conant = **Alsophila odonelliana** (Alston) Lehnert
Referencias: Lehnert, M., 2005.

Alsophila kleinii Sehnem = **Cyathea atrovirens** (Langsd. & Fisch.) Domin

Alsophila leptocladia Fée = **Cyathea atrovirens** (Langsd. & Fisch.) Domin

Alsophila leucolepis Mart. = **Cyathea axillaris** (Fée) Lellinger

Alsophila miquelii Kunze ex Rosenst. = **Cyathea atrovirens** (Langsd. & Fisch.) Domin

Alsophila nigrescens (Hook.) Sehnem = **Cyathea axillaris** (Fée) Lellinger

[Alsophila nitida Kuntze]
Notas: Especie excluida del área del proyecto; citada para el área sobre la base de material identificado erróneamente (Sehnem, 1978).

Alsophila odonelliana (Alston) Lehnert
Sin.: *Alsophila incana* auct. non (H. Karst.) D.S. Conant, *Cyathea odonelliana* Alston
Referencias: Lehnert, M., 2005.
Arborescente. Perenne. Nativa. 200–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Capurro, R. H. 245* (BA, LIL)].

Alsophila paleolata auct. non Mart. = **Cyathea phalerata** Mart.

Alsophila paleolata Mart. var. *nigrescens* Hook. = **Cyathea axillaris** (Fée) Lellinger

Alsophila phalerata (Mart.) Mart. = **Cyathea phalerata** Mart.

Alsophila plagiopteris Mart. = **Cyathea poeppigii** (Hook.) Domin

Alsophila poeppigii Hook. = **Cyathea poeppigii** (Hook.) Domin

Alsophila procera (Willd.) Desv. = **Cyathea pungens** (Willd.) Domin

Alsophila proceroides Rosenst. = **Cyathea atrovirens** (Langsd. & Fisch.) Domin

Alsophila pruinata (Sw.) Kaulf. ex Kunze = **Lophosoria quadripinnata** (J.F. Gmel.) C. Chr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.

Alsophila pungens (Willd.) C. Presl = **Cyathea pungens** (Willd.) Domin

Alsophila radens Mett. = **Cyathea atrovirens** (Langsd. & Fisch.) Domin

Alsophila reitzii Sehnem = **Cyathea phalerata** Mart.

Alsophila rigidula Mart. = **Cyathea villosa** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Sehnem, A., 1978.

Alsophila serrae Sehnem = **Cyathea dichromatolepis** (Fée) Domin

Alsophila setosa Kaulf.
Sin.: *Alsophila dorsalis* (Fée) H. Christ, *Alsophila setosa* Kaulf. var. *crenata* Rosenst., *Cyathea leucosticta* Fée, *Cyathea setosa* (Kaulf.) Domin, *Hemitelia beyrichiana* C. Presl, *Hemitelia setosa* (Kaulf.) Mett., *Nephelea setosa* (Kaulf.) R.M. Tryon
Referencias: Conant, D. S., 1983; Gastony, G. J., 1973; Sehnem, A., 1978.
Arborescente. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1243* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 12712* (HBR)]; PRY[*Zardini, E. M. 40755* (MO)].

Alsophila setosa Kaulf. var. *crenata* Rosenst. = **Alsophila setosa** Kaulf.
Referencias: Conant, D. S., 1983.

Alsophila sternbergii (Pohl ex Sternb.) D.S. Conant
Sin.: *Cyathea acanthomelas* Fée, *Cyathea rojasii* C. Chr., *Cyathea sternbergii* Pohl ex Sternb., *Nephelea sternbergii* (Pohl ex Sternb.) R.M. Tryon, *Nephelea sternbergii* (Pohl ex Sternb.) R.M. Tryon f. *acanthomelas* (Fée) Brade, *Nephelea sternbergii* (Pohl ex Sternb.) R.M. Tryon var. *acanthomelas* (Fée) Gastony
Referencias: Conant, D. S., 1983; Gastony, G. J., 1973.
Arborescente. Perenne. Nativa. 100–700 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pietrobom-Silva, M. R. 4252* (MBM)]; PRY[*Balansa, B. 2861p.p.* (F, P)].

Alsophila tijucensis Fée = **Cyathea poeppigii** (Hook.) Domin

Alsophila trichophlebia Baker = **Cyathea atrovirens** (Langsd. & Fisch.) Domin

Alsophila verruculosa Rosenst. = **Cyathea atrovirens** (Langsd. & Fisch.) Domin

Alsophila villosa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Desv. = **Cyathea villosa** Humb. & Bonpl. ex Willd.

Alsophila virens Sehnem, nom. nud. = **Cyathea phalerata** Mart.

Cyathea Sm.

Número de especies: 9

Cyathea acanthomelas Fée = **Alsophila sternbergii** (Pohl ex Sternb.) D.S. Conant
Referencias: Conant, D. S., 1983.

Cyathea atrovirens (Langsd. & Fisch.) Domin
Sin.: *Alsophila atrovirens* (Langsd. & Fisch.) C. Presl, *Alsophila kleinii* Sehnem, *Alsophila leptocladia* Fée, *Alsophila miquelii* Kunze ex Rosenst., *Alsophila proceroides* Rosenst., *Alsophila radens* Mett., *Alsophila trichophlebia* Baker, *Alsophila verruculosa* Rosenst., *Polypodium atrovirens* Langsd. & Fisch., *Trichipteris atrovirens* (Langsd. & Fisch.) R.M. Tryon
Referencias: Barrington, D. S., 1978; Lellinger, D. B., 1987a; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Arborescente. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 430* (SI)]; BRA[*Carauta, J. P. P. 2625* (COL)]; PRY[*Zardini, E. M. 33215* (MO)].

Cyathea axillaris (Fée) Lellinger
Sin.: *Alsophila leucolepis* Mart., *Alsophila nigrescens* (Hook.) Sehnem, *Alsophila paleolata* Mart. var. *nigrescens* Hook., *Cyathea leucofolis* Domin, *Phegopteris axillaris* Fée, *Polypodium axillare* Raddi, *Trichipteris leucolepis* (Mart.) R.M. Tryon

Referencias: Barrington, D. S., 1978; Lellinger, D. B., 1987a.
Arborescente. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 17115* (F, GH, MO, NY)].

Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin
Sin.: *Alsophila campestrium* Sehnem, *Alsophila corcovadensis* (Raddi) C. Chr., *Alsophila decipiens* Fée, *Alsophila elegans* Mart. var. *crenato-serrata* Sehnem, *Alsophila feeana* C. Chr., *Alsophila glaziovii* Baker, hom. illeg., *Polypodium corcovadense* Raddi, *Trichipteris corcovadensis* (Raddi) Copel., *Trichipteris elegans* Fée
Referencias: Barrington, D. S., 1978; Lellinger, D. B., 1987a; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002.
Arborescente. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 37858* (SI)].

Cyathea cuspidata Kunze = **Alsophila cuspidata** (Kunze) D.S. Conant
Referencias: Conant, D. S., 1983.

Cyathea delgadii Sternb.
Sin.: *Cyathea feei* Glaz., *Cyathea hirtula* Mart., *Cyathea schanschin* Mart., *Cyathea vestita* Mart.
Referencias: Hassler, E., 1928; Sehnem, A., 1978; Smith, A. R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a; Tryon, R. M., 1976.
Arborescente. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 6278* (A, US)]; BRA[*Dittrich, V. A. 80* (UPCB)]; PRY[*Zardini, E. M. 6696* (MO)].

Cyathea dichromatolepis (Fée) Domin
Sin.: *Alsophila christiana* Sehnem, nom. nud., *Alsophila dichromatolepis* Fée, *Alsophila glaziovii* H. Christ, hom. illeg., *Alsophila serrae* Sehnem, *Trichipteris dichromatolepis* (Fée) R.M. Tryon
Referencias: Barrington, D. S., 1978; Lellinger, D. B., 1987a.
Arborescente. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 5505* (PACA)].

Cyathea feei Glaz. = **Cyathea delgadii** Sternb.

Cyathea gardneri (Hook.) Lellinger = **Sphaeropteris gardneri** (Hook.) R.M. Tryon

Cyathea hassleriana H. Christ var. *hassleriana* = **Alsophila cuspidata** (Kunze) D.S. Conant
Referencias: Conant, D. S., 1983; Gastony, G. J., 1973.

Cyathea hassleriana H. Christ var. *rojasii* H. Christ = **Alsophila cuspidata** (Kunze) D.S. Conant
Referencias: Conant, D. S., 1983; Gastony, G. J., 1973.

Cyathea hirsuta C. Presl
Sin.: *Alsophila hirta* Kaulf., *Trichipteris armata* (Sw.) R.M. Tryon, p.p.
Referencias: Barrington, D. S., 1978; Lellinger, D. B., 1987a.
Arborescente. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 29335* (MBM)].

Cyathea hirtula Mart. = **Cyathea delgadii** Sternb.

Cyathea leucofolis Domin = **Cyathea axillaris** (Fée) Lellinger

Cyathea leucosticta Fée = **Alsophila setosa** Kaulf.

Cyathea odonelliana Alston = **Alsophila odonelliana** (Alston) Lehnert
Referencias: Lehnert, M., 2005.

Cyathea phalerata Mart.
Sin.: *Alsophila paleolata* auct. non Mart., *Alsophila phalerata* (Mart.) Mart., *Alsophila reitzii* Sehnem, *Alsophila virens* Sehnem, nom. nud., *Trichipteris phalerata* (Mart.) Barrington
Referencias: Barrington, D. S., 1978; Lellinger, D. B., 1987a.
Arborescente. Perenne. Nativa. 200–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3325* (HBR)].

Cyathea plagiopteris (Mart.) Domin = **Cyathea poeppigii** (Hook.) Domin

Cyathea poeppigii (Hook.) Domin
Sin.: *Alsophila impressa* Fée, *Alsophila plagiopteris* Mart., *Alsophila poeppigii* Hook., *Alsophila tijucensis* Fée, *Cyathea plagiopteris* (Mart.) Domin, *Sphaeropteris elongata* (Hook.) R.M. Tryon
Referencias: Hassler, E., 1928; Lellinger, D. B., 1987a; Windisch, P. G., 1977.
Arborescente. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(RGS, SCA); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3592* (HBR)]; PRY[*Balansa, B. 305* (BM)].

Cyathea polypodioides Sw. = **Alsophila capensis** (L. f.) J. Sm. subsp. **polypodioides** (Sw.) D.S. Conant
Referencias: Conant, D. S., 1983.

[Cyathea pungens (Willd.) Domin]
Sin.: *Alsophila procera* (Willd.) Desv., *Alsophila pungens* (Willd.) C. Presl, *Polypodium procerum* Willd., *Polypodium pungens* Willd., *Trichipteris procera* (Willd.) R.M. Tryon, *Trichipteris pungens* (Willd.) R.M. Tryon
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cyathea rojasii C. Chr. = **Alsophila sternbergii** (Pohl ex Sternb.) D.S. Conant
Referencias: Conant, D. S., 1983; Gastony, G. J., 1973.

Cyathea schanschin Mart. = **Cyathea delgadii** Sternb.

Cyathea setosa (Kaulf.) Domin = **Alsophila setosa** Kaulf.
Referencias: Conant, D. S., 1983.

Cyathea sternbergii Pohl ex Sternb. = **Alsophila sternbergii** (Pohl ex Sternb.) D.S. Conant
Referencias: Conant, D. S., 1983.

Cyathea vestita Mart. = **Cyathea delgadii** Sternb.

Cyathea villosa Humb. & Bonpl. ex Willd.
Sin.: *Alsophila cipoënsis* Sehnem, *Alsophila rigidula* Mart., *Alsophila villosa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Desv., *Trichipteris villosa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) R.M. Tryon
Referencias: Barrington, D. S., 1978; Sehnem, A., 1978; Smith, A. R., 1995.
Arborescente. Perenne. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 14070* (HBR)].

Hemitelia beyrichiana C. Presl = **Alsophila setosa** Kaulf.
Referencias: Conant, D. S., 1983; Gastony, G. J., 1973.

Hemitelia gardneriana C. Presl = **Alsophila capensis** (L. f.) J. Sm. subsp. **polypodioides** (Sw.) D.S. Conant
Referencias: Conant, D. S., 1983.

Hemitelia setosa (Kaulf.) Mett. = **Alsophila setosa** Kaulf.
Referencias: Conant, D. S., 1983.

Nephelea cuspidata (Kunze) R.M. Tryon = **Alsophila cuspidata** (Kunze) D.S. Conant
Referencias: Conant, D. S., 1983.

Nephelea setosa (Kaulf.) R.M. Tryon = **Alsophila setosa** Kaulf.
Referencias: Conant, D. S., 1983.

Nephelea sternbergii (Pohl ex Sternb.) R.M. Tryon = **Alsophila sternbergii** (Pohl ex Sternb.) D.S. Conant
Referencias: Conant, D. S., 1983.

Nephelea sternbergii (Pohl ex Sternb.) R.M. Tryon f. *acanthomelas* (Fée) Brade = **Alsophila sternbergii** (Pohl ex Sternb.) D.S. Conant
Referencias: Conant, D. S., 1983.

Nephelea sternbergii (Pohl ex Sternb.) R.M. Tryon var. *acanthomelas* (Fée) Gastony = **Alsophila sternbergii** (Pohl ex Sternb.) D.S. Conant
Referencias: Conant, D. S., 1983.

Phegopteris axillaris Fée = **Cyathea axillaris** (Fée) Lellinger
Referencias: Lellinger, D. B., 1987a.

Polypodium atrovirens Langsd. & Fisch. = **Cyathea atrovirens** (Langsd. & Fisch.) Domin

Polypodium axillare Raddi = **Cyathea axillaris** (Fée) Lellinger
Referencias: Lellinger, D. B., 1987a.

Polypodium corcovadense Raddi = **Cyathea corcovadensis** (Raddi) Domin
Referencias: Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002.

Polypodium procerum Willd. = **Cyathea pungens** (Willd.) Domin
Referencias: Smith, A. R., 1995.

Polypodium pungens Willd. = **Cyathea pungens** (Willd.) Domin

Sphaeropteris Bernh.

Número de especies: 1

Sphaeropteris elongata (Hook.) R.M. Tryon = **Cyathea poeppigii** (Hook.) Domin

Sphaeropteris gardneri (Hook.) R.M. Tryon
Sin.: *Alsophila gardneri* Hook., *Cyathea gardneri* (Hook.) Lellinger
Referencias: Sehnem, A., 1978; Tryon, R. M., 1971.
Arborescente. Perenne. Nativa.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 232* (HBR)].

Trichipteris armata (Sw.) R.M. Tryon, p.p. = **Cyathea hirsuta** C. Presl

Trichipteris atrovirens (Langsd. & Fisch.) R.M. Tryon = **Cyathea atrovirens** (Langsd. & Fisch.) Domin
Referencias: Lellinger, D. B., 1987a.

Trichipteris corcovadensis (Raddi) Copel. = **Cyathea corcovadensis** (Raddi) Domin
Referencias: Lellinger, D. B., 1987a.

Trichipteris dichromatolepis (Fée) R.M. Tryon = **Cyathea dichromatolepis** (Fée) Domin
Referencias: Lellinger, D. B., 1987a.

Trichipteris elegans Fée = **Cyathea corcovadensis** (Raddi) Domin
Referencias: Barrington, D. S., 1978; Lellinger, D. B., 1987a.

Trichipteris leucolepis (Mart.) R.M. Tryon = **Cyathea axillaris** (Fée) Lellinger
Referencias: Barrington, D. S., 1978; Lellinger, D. B., 1987a.

Trichipteris phalerata (Mart.) Barrington = **Cyathea phalerata** Mart.
Referencias: Lellinger, D. B., 1987a.

Trichipteris procera (Willd.) R.M. Tryon = **Cyathea pungens** (Willd.) Domin
Referencias: Barrington, D. S., 1978; Lellinger, D. B., 1987a.

Trichipteris pungens (Willd.) R.M. Tryon = **Cyathea pungens** (Willd.) Domin

Trichipteris villosa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) R.M. Tryon = **Cyathea villosa** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Lellinger, D. B., 1987a.

DAVALLIACEAE

Autores: Ponce, M. M. & de la Sota, E. R.
Revisor: Prado, J.

1 género, 6 especies.

Aspidium acutum Schkuhr = **Nephrolepis biserrata** (Sw.) Schott
Referencias: Sehnem, A., 1979e.

Aspidium biserratum Sw. = **Nephrolepis biserrata** (Sw.) Schott
Referencias: Sehnem, A., 1979e.

Aspidium cordifolium (L.) Sw. = **Nephrolepis cordifolia** (L.) C. Presl
Referencias: Sehnem, A., 1979e.

Aspidium pectinatum Willd. = **Nephrolepis pectinata** (Willd.) Schott
Referencias: Sehnem, A., 1979e.

Aspidium pendulum Raddi = **Nephrolepis pendula** (Raddi) J. Sm.
Referencias: Sehnem, A., 1979e.

Aspidium tuberosum Bory ex Willd. = **Nephrolepis cordifolia** (L.) C. Presl

Nephrodium cordifolium (L.) Desv. = **Nephrolepis cordifolia** (L.) C. Presl
Referencias: Sehnem, A., 1979e.

Nephrodium pectinatum (Willd.) Link = **Nephrolepis pectinata** (Willd.) Schott
Referencias: Sehnem, A., 1979e.

Nephrolepis Schott

Número de especies: 6

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott
Sin.: *Aspidium acutum* Schkuhr, *Aspidium biserratum* Sw.
Referencias: Sehnem, A., 1979e.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 100–1800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, S. M. s.n.* (NY)].

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl
Sin.: *Aspidium cordifolium* (L.) Sw., *Aspidium tuberosum* Bory ex Willd., *Nephrodium cordifolium* (L.) Desv., *Nephrolepis tuberosa* (Bory) C. Presl, *Polypodium cordifolium* L.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Sehnem, A., 1979e.
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, JUJ, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 3933* (SI), *Delucchi, G. 1254* (LP)]; BRA[*Sehnem, A. 635* (PACA)]; PRY[*Locke, R. D. 53* (*)].

Nephrolepis exaltata (L.) Schott
Sin.: *Polypodium exaltatum* L.
Referencias: Sehnem, A., 1979e.
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19612* (MBM)].

Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott
Sin.: *Aspidium pectinatum* Willd., *Nephrodium pectinatum* (Willd.) Link
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Sehnem, A., 1979e.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 265* (UPCB)].

Nephrolepis pendula (Raddi) J. Sm.
Sin.: *Aspidium pendulum* Raddi
Referencias: Nauman, C. E., 1995; Sehnem, A., 1979e.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4983* (HBR)].

Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug
Sin.: *Polypodium rivulare* Vahl
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Nauman, C. E., 1995.
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 400–1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 72* (MBM, UPCB)].

Nephrolepis tuberosa (Bory) C. Presl = **Nephrolepis cordifolia** (L.) C. Presl
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Polypodium cordifolium L. = **Nephrolepis cordifolia** (L.) C. Presl
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Sehnem, A., 1979e.

Polypodium exaltatum L. = **Nephrolepis exaltata** (L.) Schott
Referencias: Sehnem, A., 1979e.

Polypodium rivulare Vahl = **Nephrolepis rivularis** (Vahl) Mett. ex Krug

DENNSTAEDTIACEAE

Autores: Ponce, M. M., Prado, J. & de la Sota, E. R.

8 géneros, 25 especies, 1 especie endémica.

Adiantum lanceum L. = **Lindsaea lancea** (L.) Bedd. var. **lancea**
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Adiantum strictum Sw. = **Lindsaea stricta** (Sw.) Dryand.
Referencias: Kramer, K. U., 1957.

Cheilanthes glandulifera Fée = **Paesia glandulosa** (Sw.) Kunth

Cheilanthes glandulosa Sw. = **Paesia glandulosa** (Sw.) Kunth

Cheilanthes hostilis Kunze = **Hypolepis hostilis** (Kunze) C. Presl

Davallia arborescens Willd. = **Dennstaedtia arborescens** (Willd.) Maxon

Davallia bifida Kaulf. = **Lindsaea bifida** (Kaulf.) Mett. ex Kuhn

Davallia domingensis Spreng. = **Saccoloma domingense** (Spreng.) C. Chr.

Davallia glauca Cav. = **Dennstaedtia glauca** (Cav.) C. Chr. ex Looser
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Davallia inaequalis Kunze = **Saccoloma inaequale** (Kunze) Mett.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Dennstaedtia Bernh.

Número de especies: 4

Dennstaedtia adiantoides (Humb. & Bonpl. ex Willd.) T. Moore = **Dennstaedtia bipinnata** (Cav.) Maxon

[Dennstaedtia arborescens (Willd.) Maxon]
Sin.: *Davallia arborescens* Willd., *Dennstaedtia mathewsii* (Hook.) C. Chr., *Deparia conncina* Baker
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Dennstaedtia bipinnata (Cav.) Maxon]
Sin.: *Dennstaedtia adiantoides* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) T. Moore, *Dicksonia adiantoides* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Dicksonia bipinnata* Cav.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Dennstaedtia bradeorum Rosenst. = **Dennstaedtia globulifera** (Poir.) Hieron.
Referencias: Sehnem, A., 1972.

Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore
Sin.: *Dennstaedtia decomposita* (H. Christ) H. Christ, *Dennstaedtia rubiginosa* (Kaulf.) T. Moore, *Dicksonia angustidens* C. Presl, *Dicksonia apiifolia* Sw. var. *dissecta* Desv., *Dicksonia cicutaria* Sw., *Dicksonia decomposita* H. Christ, *Dicksonia rubiginosa* Kaulf.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Sehnem, A., 1972; Stutz, L. C., 1983.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS, SAL); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CAA, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 6153* (LP)]; BRA[*Plaumann, F. 539* (HBR)]; PRY[*Stutz, L. C. 153* (G)].

[Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore var. incisa (Fée) Capurro]
Sin.: *Dicksonia cicutaria* Sw. var. *incisa* Fée
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].
Notas: Nombre dudoso.

Dennstaedtia cornuta (Kaulf.) Mett. = **Dennstaedtia dissecta** (Sw.) T. Moore
Referencias: Navarrete, H. & Øllgaard, B., 2000.

Dennstaedtia decomposita (H. Christ) H. Christ = **Dennstaedtia cicutaria** (Sw.) T. Moore
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

[Dennstaedtia dissecta (Sw.) T. Moore]
Sin.: *Dennstaedtia cornuta* (Kaulf.) Mett., *Dicksonia cornuta* Kaulf., *Dicksonia dissecta* Sw., *Polypodium dissectum* Sw., hom. illeg.
Referencias: Navarrete, H. & Øllgaard, B., 2000.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Dennstaedtia erosa (Kunze) T. Moore = **Dennstaedtia obtusifolia** (Willd.) T. Moore
Referencias: Navarrete, H. & Øllgaard, B., 2000.

Dennstaedtia exaltata (Kunze) Hieron. = **Dennstaedtia globulifera** (Poir.) Hieron.
Referencias: Sehnem, A., 1972.

Dennstaedtia glauca (Cav.) C. Chr. ex Looser
Sin.: *Davallia glauca* Cav., *Dicksonia lambertieana* J. Remy
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; de la Sota, E. R., 1977; Martínez, O. G. & de la Sota, E. R., 2000; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–3200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC); CHL(IV, V, VI, VII, RME).

Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 123* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20006* (CONC, SGO)].

Dennstaedtia globulifera (Poir.) Hieron.
Sin.: *Dennstaedtia bradeorum* Rosenst., *Dennstaedtia exaltata* (Kunze) Hieron., *Dennstaedtia lagerheimii* (Sodiro) C. Chr., *Dennstaedtia tamandarei* Rosenst., *Dennstaedtia tenera* (C. Presl) Mett., *Dennstaedtia tenera* (C. Presl) Mett. var. *dentata* Hieron., *Dicksonia exaltata* Kunze, *Dicksonia globulifera* (Poir.) Lindm., *Dicksonia lagerheimii* Sodiro, *Polypodium globuliferum* Poir.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Lorscheitter Baptista, M. L., Ashraf, A. R., Windisch, P. G. & Mossbrugger, V., 2002; Martínez, O. G. & de la Sota, E. R., 2000; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CAN, COA); URY(CLA, PAY, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1450* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 14771* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 5702* (BM)]; URY[*Bonifacino, J. M. s.n.* (MVFA)].

Dennstaedtia lagerheimii (Sodiro) C. Chr. = **Dennstaedtia globulifera** (Poir.) Hieron.
Referencias: Sehnem, A., 1972.

Dennstaedtia mathewsii (Hook.) C. Chr. = **Dennstaedtia arborescens** (Willd.) Maxon

Dennstaedtia obtusifolia (Willd.) T. Moore
Sin.: *Dennstaedtia erosa* (Kunze) T. Moore, *Dicksonia erosa* Kunze, *Dicksonia obtusifolia* Willd.
Referencias: Cremers, G. & Kramer, K. U., 1991; Hassler, E., 1928; Lorscheitter Baptista, M. L., Ashraf, A. R., Windisch, P. G. & Mossbrugger, V., 2002; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN, COA, MIE, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 1163* (PACA)]; PRY[*Rojas, T. 3186* (MO)].

Dennstaedtia rubiginosa (Kaulf.) T. Moore = **Dennstaedtia cicutaria** (Sw.) T. Moore var. **cicutaria**
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Sehnem, A., 1972.

Dennstaedtia tamandarei Rosenst. = **Dennstaedtia globulifera** (Poir.) Hieron.
Referencias: Sehnem, A., 1972.

Dennstaedtia tenera (C. Presl) Mett. = **Dennstaedtia globulifera** (Poir.) Hieron.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Sehnem, A., 1972.

Dennstaedtia tenera (C. Presl) Mett. var. *dentata* Hieron. = **Dennstaedtia globulifera** (Poir.) Hieron.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Deparia conncina Baker = **Dennstaedtia arborescens** (Willd.) Maxon

Dicksonia adiantoides Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Dennstaedtia bipinnata** (Cav.) Maxon

Dicksonia angustidens C. Presl = **Dennstaedtia cicutaria** (Sw.) T. Moore
Referencias: Sehnem, A., 1972.

Dicksonia apiifolia Sw. var. *dissecta* Desv. = **Dennstaedtia cicutaria** (Sw.) T. Moore
Referencias: Sehnem, A., 1972.

Dicksonia bipinnata Cav. = **Dennstaedtia bipinnata** (Cav.) Maxon

Dicksonia cicutaria Sw. = **Dennstaedtia cicutaria** (Sw.) T. Moore

Dicksonia cicutaria Sw. var. *incisa* Fée = **Dennstaedtia cicutaria** (Sw.) T. Moore var. **incisa** (Fée) Capurro

Dicksonia cornuta Kaulf. = **Dennstaedtia dissecta** (Sw.) T. Moore
Referencias: Navarrete, H. & Øllgaard, B., 2000.

Dicksonia decomposita H. Christ = **Dennstaedtia cicutaria** (Sw.) T. Moore
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Sehnem, A., 1972.

Dicksonia dissecta Sw. = **Dennstaedtia dissecta** (Sw.) T. Moore
Referencias: Navarrete, H. & Øllgaard, B., 2000.

Dicksonia erosa Kunze = **Dennstaedtia obtusifolia** (Willd.) T. Moore
Referencias: Navarrete, H. & Øllgaard, B., 2000.

Dicksonia exaltata Kunze = **Dennstaedtia globulifera** (Poir.) Hieron.

Dicksonia globulifera (Poir.) Lindm. = **Dennstaedtia globulifera** (Poir.) Hieron.

Dicksonia lagerheimii Sodiro = **Dennstaedtia globulifera** (Poir.) Hieron.

Dicksonia lambertieana J. Remy = **Dennstaedtia glauca** (Cav.) C. Chr. ex Looser
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Dicksonia obtusifolia Willd. = **Dennstaedtia obtusifolia** (Willd.) T. Moore
Referencias: Stolze, R. G., 1981.

Dicksonia rubiginosa Kaulf. = **Dennstaedtia cicutaria** (Sw.) T. Moore
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Sehnem, A., 1972.

Histiopteris (J. Agardh) J. Sm.

Número de especies: 1

Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm.
Sin.: *Histiopteris incisa* (Thunb.) J. Sm. var. *flavescens* (Colla) C. Chr., *Litobrochia appendiculata* (Kaulf.) J. Remy, *Litobrochia incisa* (Thunb.) C. Presl, *Litobrochia patens* (Kunze) J. Remy, *Pteridium patens* Kunze, *Pteris flavescens* Colla, *Pteris incisa* Thunb., *Pteris vespertilionis* auct. non Labill., *Pteris vespertilionis* Labill. var. *flavescens* (Colla) J. Agardh
Referencias: Lorscheitter Baptista, M. L., Ashraf, A. R., Windisch, P. G. & Mossbrugger, V., 2002; Rodríguez Ríos, R., 1995; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA); CHL(X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 983* (PACA)]; CHL[*Schlegel, F. 2193* (CONC)].

Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm. var. *flavescens* (Colla) C. Chr. = **Histiopteris incisa** (Thunb.) J. Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hypolepis Bernh.

Número de especies: 4, 1 endémica

Hypolepis chilensis Fée = **Hypolepis poeppigii** (Kunze) Maxon
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hypolepis hauman-merckii Hicken = **Hypolepis poeppigii** (Kunze) Maxon

Hypolepis hostilis (Kunze) C. Presl
Sin.: *Cheilanthes hostilis* Kunze
Referencias: Lorscheitter Baptista, M. L., Ashraf, A. R., Windisch, P. G. & Mossbrugger, V., 2002; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 9617* (HBR)].

Hypolepis mitis Kuhn
Referencias: Lorscheitter Baptista, M. L., Ashraf, A. R., Windisch, P. G. & Mossbrugger, V., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–1100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*sin colector s.n.* (PACA)].

Hypolepis poeppigiana Mett. = **Hypolepis poeppigii** (Kunze) Maxon
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hypolepis poeppigii (Kunze) R. Rodr., comb. superfl. = **Hypolepis poeppigii** (Kunze) Maxon
Referencias: Maxon, W. R., 1941; Rodríguez Ríos, R., 1989, 1995.

Hypolepis poeppigii (Kunze) Maxon
Sin.: *Hypolepis chilensis* Fée, *Hypolepis hauman-merckii* Hicken, *Hypolepis poeppigiana* Mett., *Hypolepis poeppigii* (Kunze) R. Rodr., comb. superfl., *Hypolepis rugosula* (Labill.) J. Sm. var. *poeppigii* (Kunze) C. Chr. & Skottsb., *Phegopteris poeppigii* (Kunze) Fée ex J. Remy, *Phegopteris poeppigii* (Kunze) Fée ex J. Remy var. *hirsuta* F. Phil., *Phegopteris sturmii* F. Phil., *Polypodium poeppigii* Kunze
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Capurro, R. H., 1961; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Maxon, W. R., 1941; Rodríguez Ríos, R., 1989.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–700 m.
Países: ARG(BAI, MEN, NEU, RNE); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 2052* (BAB)]; CHL[*Zoellner, O. 12194* (CONC)].

Hypolepis repens (L.) C. Presl
Sin.: *Lonchitis repens* L.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Lorscheitter Baptista, M. L., Ashraf, A. R., Windisch, P. G. & Mossbrugger, V., 2002; Martínez, O. G. & de la Sota, E. R., 2000; Prado, J., 2004a; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4034* (SI), *Zuloaga, F. O. 7616* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 6954* (PACA)].

[Hypolepis rugosula (Labill.) J. Sm.]
Sin.: *Polypodium rugosulum* Labill.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Hypolepis rugosula (Labill.) J. Sm. var. *poeppigii* (Kunze) C. Chr. & Skottsb. = **Hypolepis poeppigii** (Kunze) Maxon
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lindsaea Dryand. ex Sm.

Número de especies: 10

Lindsaea arcuata Kunze
Sin.: *Lindsaea horizontalis* Hook., *Lindsaea lancea* (L.) Bedd. var. *arcuata* (Kunze) Rosenst., *Lindsaea trapeziformis* Dryand. var. *arcuata* (Kunze) Baker
Referencias: Kramer, K. U., 1957, 1963; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Prado, J., 2004a; Sehnem, A., 1972; Smith, A. R., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Schmalz, P. s.n.* (US)].

Lindsaea bifida (Kaulf.) Mett. ex Kuhn
Sin.: *Davallia bifida* Kaulf., *Odontosoria bifida* (Kaulf.) J. Sm., *Stenolobium bifidum* (Kaulf.) Fée
Referencias: Prado, J. & Windisch, P. G., 1996; Prado, J., 2004a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 2041* (UPCB)].

Lindsaea botrychioides A. St.-Hil.
Sin.: *Lindsaea botrychioides* A. St.-Hil. var. *subpinnata* Rosenst.
Referencias: Kieling-Rubio, M. A. & Windisch, P. G., 2004; Kramer, K. U., 1957, 1963; Prado, J., 2004a; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 8334* (B, BM, K, NY, S, US)].

Lindsaea botrychioides A. St.-Hil. var. *subpinnata* Rosenst. = **Lindsaea botrychioides** A. St.-Hil.
Referencias: Kramer, K. U., 1957.

Lindsaea brasiliensis Desv. = **Lindsaea stricta** (Sw.) Dryand.
Referencias: Kramer, K. U., 1957.

Lindsaea catharinae Hook. = **Lindsaea virescens** Sw. var. **catharinae** (Hook.) Baker

Lindsaea christii Rosenst. = **Lindsaea ovoidea** Fée
Referencias: Kramer, K. U., 1957.

Lindsaea falcata Dryand. = **Lindsaea lancea** (L.) Bedd. var. **falcata** (Dryand.) Rosenst.

Lindsaea guianensis (Aubl.) Dryand. f. *stricta* (Sw.) Lindm. = **Lindsaea stricta** (Sw.) Dryand.
Referencias: Kramer, K. U., 1957.

Lindsaea guianensis (Aubl.) Dryand. subsp. **lancecastrum** K.U. Kramer
Referencias: Kramer, K. U., 1957; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1972; Smith, A. R., 1995.
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 14117p.p.* (BM, G, GH, K, LE, MO, NY, S, US)]; PRY[*Hassler, E. 10044* (B, K)].

Lindsaea horizontalis Hook. = **Lindsaea arcuata** Kunze

Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. *arcuata* (Kunze) Rosenst. = **Lindsaea arcuata** Kunze
Referencias: Kramer, K. U., 1957.

[Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. falcata (Dryand.) Rosenst.]
Sin.: *Lindsaea falcata* Dryand.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. **lancea**
Sin.: *Adiantum lanceum* L.
Referencias: Hassler, E., 1928; Kieling-Rubio, M. A. & Windisch, P. G., 2004; Kramer, K. U., 1957, 1963; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Prado, J., 2004a; Sehnem, A., 1972; Smith, A. R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, COA. SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2186* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 4614* (B, BM, G, GH, NY)].

Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. *quadrangularis* (Raddi) Rosenst. = **Lindsaea quadrangularis** Raddi subsp. **quadrangularis**
Referencias: Kramer, K. U., 1957.

Lindsaea ovoidea Fée
Sin.: *Lindsaea christii* Rosenst.
Referencias: Kramer, K. U., 1957, 1963; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 3730* (US)].

Lindsaea portoricensis Desv.
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Smith, A. R., 1995.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 100–300 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Peña-Chocarro, M. C. 218* (BM, PY)].
Notas: Citada para Brasil sin indicar localidad o material de referencia (A. R. Smith, 1995).

Lindsaea quadrangularis Raddi var. *pallescens* Sehnem = **Lindsaea quadrangularis** Raddi subsp. **terminalis** K.U. Kramer

Lindsaea quadrangularis Raddi subsp. **quadrangularis**
Sin.: *Lindsaea lancea* (L.) Bedd. var. *quadrangularis* (Raddi) Rosenst.
Referencias: Kramer, K. U., 1957.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15298* (B, S, US)].

Lindsaea quadrangularis Raddi subsp. **terminalis** K.U. Kramer
Sin.: *Lindsaea quadrangularis* Raddi var. *pallescens* Sehnem
Referencias: Kramer, K. U., 1957, 1963; Prado, J., 2004a; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3974* (US)]; PRY[*Lindman, C. A. M. 1757* (BM, G, GH, K, S, UPS, US)].

Lindsaea stricta (Sw.) Dryand.
Sin.: *Adiantum strictum* Sw., *Lindsaea brasiliensis* Desv., *Lindsaea guianensis* (Aubl.) Dryand. f. *stricta* (Sw.) Lindm., *Lindsaea stricta* (Sw.) Dryand. var. *microphylla* (C. Presl) Hassl.
Referencias: Kramer, K. U., 1957, 1963; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1451* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 11296* (MBM)]; PRY[*Rojas, T. 3762* (BM, G)].

Lindsaea stricta (Sw.) Dryand. var. *microphylla* (C. Presl) Hassl. = **Lindsaea stricta** (Sw.) Dryand.
Referencias: Kramer, K. U., 1957.

Lindsaea trapeziformis Dryand. var. *arcuata* (Kunze) Baker = **Lindsaea arcuata** Kunze
Referencias: Kramer, K. U., 1957.

Lindsaea virescens Sw. var. **catharinae** (Hook.) Baker
Sin.: *Lindsaea catharinae* Hook., *Odontosoria virescens* (Sw.) Rosenst. var. *catharinae* (Hook.) Rosenst., *Stenoloma catharinae* (Hook.) Sehnem
Referencias: Kramer, K. U., 1957; Prado, J., 2004a; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 2304* (HBG)].

Lindsaea virescens Sw. var. **virescens**
Sin.: *Stenoloma virescens* (Sw.) C. Chr.
Referencias: Kramer, K. U., 1957; Prado, J., 2004a; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 7643* (HBR)].

Litobrochia appendiculata (Kaulf.) J. Remy = **Histiopteris incisa** (Thunb.) J. Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Litobrochia incisa (Thunb.) C. Presl = **Histiopteris incisa** (Thunb.) J. Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Litobrochia patens (Kunze) J. Remy = **Histiopteris incisa** (Thunb.) J. Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lonchitis repens L. = **Hypolepis repens** (L.) C. Presl
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Microlepia C. Presl
Número de especies: 1

Microlepia brasiliensis C. Presl = **Saccoloma brasiliensis** (C. Presl) Mett.
Referencias: Sehnem, A., 1972.

Microlepia speluncae (L.) T. Moore
Sin.: *Polypodium speluncae* L.
Referencias: Hassler, E., 1928; Sehnem, A., 1972; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA); PRY(APA, CEN, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hassler, E. 560* (G)]; BRA[*Ule, E. H. G. 2281* (HBG)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5779* (G)].

Odontosoria bifida (Kaulf.) J. Sm. = **Lindsaea bifida** (Kaulf.) Mett. ex Kuhn

Odontosoria virescens (Sw.) Rosenst. var. *catharinae* (Hook.) Rosenst. = **Lindsaea virescens** Sw. var. **catharinae** (Hook.) Baker

Orthiopteris brasiliensis (C. Presl) Sehnem = **Saccoloma brasiliensis** (C. Presl) Mett.

Orthiopteris domingensis (Spreng.) Copel. = **Saccoloma domingense** (Spreng.) C. Chr.

Orthiopteris inaequalis (Kunze) Copel. = **Saccoloma inaequale** (Kunze) Mett.

Paesia J. St.-Hil.
Número de especies: 1

Paesia glandulosa (Sw.) Kunth
Sin.: *Cheilanthes glandulifera* Fée, *Cheilanthes glandulosa* Sw., *Pteridium amazonica* H. Christ
Referencias: Sehnem, A., 1972; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 11268* (MBM)].

Polypodium dissectum Sw., hom. illeg. = **Dennstaedtia dissecta** (Sw.) T. Moore
Referencias: Navarrete, H. & Øllgaard, B., 2000.

Polypodium globuliferum Poir. = **Dennstaedtia globulifera** (Poir.) Hieron.

Polypodium poeppigii Kunze = **Hypolepis poeppigii** (Kunze) Maxon
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium rugosulum Labill. = **Hypolepis rugosula** (Labill.) J. Sm.

Polypodium speluncae L. = **Microlepia speluncae** (L.) T. Moore
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Pteridium Gled. ex Scop., nom. cons.
Número de especies: 1

Pteridium amazonica H. Christ = **Paesia glandulosa** (Sw.) Kunth
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

[Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. aquilinum]
Sin.: *Pteris aquilina* L.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. *arachnoideum* (Kaulf.) Brade = **Pteridium arachnoideum** (Kaulf.) Maxon

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. *umbrosum* Christ = **Pteridium arachnoideum** (Kaulf.) Maxon

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon
Sin.: *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn var. *arachnoideum* (Kaulf.) Brade, *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn var. *umbrosum* Christ, *Pteris arachnoidea* Kaulf., *Pteris esculenta* G. Forst.
Referencias: Martínez, O. G. & de la Sota, E. R., 2000; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Prado, J., 2004a; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CAN, COA); URY(LAV, MAL, ROC, SAO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 14126* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 13234* (HBR)]; PRY[*Marín, G. 269* (PY)]; URY[*Marchesi, E. 18332* (MVFA)].

Pteridium patens Kunze = **Histiopteris incisa** (Thunb.) J. Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

[Pteridium psittacinum (C. Presl) Maxon]
Sin.: *Pteris psittacina* C. Presl
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Pteris arachnoidea Kaulf. = **Pteridium arachnoideum** (Kaulf.) Maxon

Pteris esculenta G. Forst. = **Pteridium arachnoideum** (Kaulf.) Maxon

Pteris flavescens Colla = **Histiopteris incisa** (Thunb.) J. Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pteris incisa Thunb. = **Histiopteris incisa** (Thunb.) J. Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pteris psittacina C. Presl = **Pteridium psittacinum** (C. Presl) Maxon

Pteris vespertilionis auct. non Labill. = **Histiopteris incisa** (Thunb.) J. Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pteris vespertilionis Labill. var. *flavescens* (Colla) J. Agardh = **Histiopteris incisa** (Thunb.) J. Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Saccoloma Kaulf.

Número de especies: 3

Saccoloma brasiliensis (C. Presl) Mett.
Sin.: *Microlepia brasiliensis* C. Presl, *Orthiopteris brasiliensis* (C. Presl) Sehnem
Referencias: Sehnem, A., 1972.
Subarborescente. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 23304* (MBM)].

[Saccoloma domingense (Spreng.) C. Chr.]
Sin.: *Davallia domingensis* Spreng., *Orthiopteris domingensis* (Spreng.) Copel.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Saccoloma elegans Kaulf.
Referencias: Prado, J., 2004a; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 2170* (HBG)].

Saccoloma inaequale (Kunze) Mett.
Sin.: *Davallia inaequalis* Kunze, *Orthiopteris inaequalis* (Kunze) Copel.
Referencias: Hassler, E., 1928; Prado, J., 2004a; Sehnem, A., 1972; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Niederlein, G. s.n.* (*)]; BRA[*Sehnem, A. 9452* (PACA)].

Stenoloma catharinae (Hook.) Sehnem = **Lindsaea virescens** Sw. var. **catharinae** (Hook.) Baker
Referencias: Prado, J., 2004a.

Stenoloma virescens (Sw.) C. Chr. = **Lindsaea virescens** Sw. var. **virescens**
Referencias: Prado, J., 2004a.

DICKSONIACEAE

Autores: Lehnert, M., Ponce, M. M. & de la Sota, E. R.
Revisor: Prado, J.

3 géneros, 5 especies, 4 especies endémicas.

Alsophila quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr. = **Lophosoria quadripinnata** (J.F. Gmel.) C. Chr.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.

Balantium berteroanum Kunze = **Dicksonia berteroana** (Colla) Hook.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Balantium coniifolium (Hook.) J. Sm. = **Culcita coniifolia** (Hook.) Maxon

Balantium sellowianum (Hook.) C. Presl = **Dicksonia sellowiana** Hook.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

[Culcita coniifolia (Hook.) Maxon]
Sin.: *Balantium coniifolium* (Hook.) J. Sm., *Dicksonia coniifolia* Hook.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cyathea discolor Bory = **Lophosoria quadripinnata** (J.F. Gmel.) C. Chr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Davallia berteroana Colla = **Dicksonia berteroana** (Colla) Hook.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Dicksonia L'Hér.

Número de especies: 3, 2 endémicas

Dicksonia berteriana (Colla) Hook. var. *virgata* C. Chr. & Skottsb. = **Dicksonia externa** C. Chr. & Skottsb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Dicksonia berteroana (Colla) Hook.
Sin.: *Balantium berteroanum* Kunze, *Davallia berteroana* Colla
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Arborescente. Perenne. Endémica. 200–700 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 5516* (CONC)].

Dicksonia coniifolia Hook. = **Culcita coniifolia** (Hook.) Maxon

Dicksonia elegans (Kunze) Mett. = **Thyrsopteris elegans** Kunze
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Dicksonia externa C. Chr. & Skottsb.
Sin.: *Dicksonia berteriana* (Colla) Hook. var. *virgata* C. Chr. & Skottsb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Arborescente. Perenne. Endémica. 200–700 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 9488* (CONC)].
Notas: Endémica de la Isla Más Afuera, Archipiélago de Juan Fernández, Chile.

Dicksonia sellowiana Hook.
Sin.: *Balantium sellowianum* (Hook.) C. Presl
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Fernandes, I., 2000; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.
Arborescente. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CLA, MAL, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1330* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 42082* (CTES, MBM, SPF)]; URY[*Berro, M. B. 2366* (MVFA)].

Lophosoria C. Presl

Número de especies: 1 endémica

Lophosoria exisa Fée = **Lophosoria quadripinnata** (J.F. Gmel.) C. Chr.
Referencias: Sehnem, A., 1978.

Lophosoria pruinata (Sw.) C. Presl = **Lophosoria quadripinnata** (J.F. Gmel.) C. Chr.
Referencias: Prado, J., 2006a; Rodríguez Ríos, R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.

Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr.
Sin.: *Alsophila pruinata* (Sw.) Kaulf. ex Kunze, *Alsophila quadripinnata* (J.F. Gmel.) C. Chr., *Cyathea discolor* Bory, *Lophosoria exisa* Fée, *Lophosoria pruinata* (Sw.) C. Presl, *Lophosoria quadripinnata* (J.F. Gmel.) C. Chr. f. *viridifolia* G. Kunkel, *Polypodium cinereum* Cav., *Polypodium glaucum* Sw., hom. illeg., *Polypodium pruinatum* Sw., *Polypodium quadripinnatum* J.F. Gmel.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Looser, G., 1933; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Rodríguez Ríos, R., 1995; Sehnem, A., 1978; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.
Subarbusto. Endémica. 800–3000 m.
Países: ARG(NEU, RNE); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6358* (SI)]; BRA[*Jürgens, C. 711* (NY)]; CHL[*Stuessy, T. F. 6377* (CONC)].

Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr. f. *viridifolia* G. Kunkel = **Lophosoria quadripinnata** (J.F. Gmel.) C. Chr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Panicularia berteri Colla = **Thyrsopteris elegans** Kunze
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium cinereum Cav. = **Lophosoria quadripinnata** (J.F. Gmel.) C. Chr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium glaucum Sw., hom. illeg. = **Lophosoria quadripinnata** (J.F. Gmel.) C. Chr.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.

Polypodium pruinatum Sw. = **Lophosoria quadripinnata** (J.F. Gmel.) C. Chr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.

Polypodium quadripinnatum J.F. Gmel. = **Lophosoria quadripinnata** (J.F. Gmel.) C. Chr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.

Thyrsopteris Kunze

Número de especies: 1 endémica

Thyrsopteris elegans Kunze
Sin.: *Dicksonia elegans* (Kunze) Mett., *Panicularia berteri* Colla
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Arbusto. Endémica. 700–1000 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. 1537* (*)].

DRYOPTERIDACEAE

Autores: Salino, A. & Ponce, M. M.
Revisor: Prado, J.

19 géneros, 83 especies, 20 especies endémicas, 3 especies introducidas.

Acrostichum osmundaceum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Hook. = **Polybotrya osmundacea** Willd.

Adiantum lunulatum Houtt., hom. illeg. = **Didymochlaena truncatula** (Sw.) Sm.
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Arachniodes Blume

Número de especies: 1

Arachniodes denticulata (Sw.) Ching
Sin.: *Polypodium denticulatum* Sw., *Polystichum denticulatum* (Sw.) J. Sm.
Referencias: Mickel, J. T. & Smith, A. R., 2004; Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Nativa. 1600 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22217* (MBM)].

Aspidium aculeatum (L.) Sw. = **Polystichum aculeatum** (L.) Schott

Aspidium aculeatum auct. non (L.) Sw. = **Polystichum tetragonum** Fée
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Aspidium aculeatum (L.) Sw. var. *chilensis* C. Chr. = **Polystichum chilense** (H. Christ) Diels var. **chilense**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995.

Aspidium aequatoriense Hieron. = **Tectaria aequatoriensis** (Hieron.) C. Chr.

Aspidium berteroanum Colla = **Rumohra berteroana** (Colla) R. Rodr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Aspidium bridgesii (Schott) J.W. Sturm = **Polystichum chilense** (H. Christ) Diels var. **chilense**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Aspidium brongniartianum (J. Remy) J.W. Sturm = **Polystichum subintegerrimum** (Hook. & Arn.) R. Rodr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Aspidium capense (L.) Willd. = **Rumohra adiantiformis** (G. Forst.) Ching
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Aspidium capense auct. non Willd. = **Rumohra berteroana** (Colla) R. Rodr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Aspidium coriaceum Sw. = **Rumohra adiantiformis** (G. Forst.) Ching
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Aspidium crenulans Fée = **Megalastrum crenulans** (Fée) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Ponce, M. M., 2001.

Aspidium ctenitis Link = **Ctenitis distans** (Brack.) Ching

Aspidium elegans (J. Remy) J.W. Sturm = **Polystichum plicatum** (Poepp. ex Kunze) Hicken
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Aspidium eriocaulon Fée = **Ctenitis eriocaulis** (Fée) Alston
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Aspidium falciculatum Raddi = **Ctenitis falciculata** (Raddi) Ching
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Aspidium filix-mas (L.) Sw. = **Dryopteris filix-mas** (L.) Schott

Aspidium filix-mas (L.) Sw. var. *remotum* auct. non A. Br. = **Athyrium dombeyi** Desv.

Aspidium flexum Kunze = **Rumohra berteroana** (Colla) R. Rodr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Aspidium guianense Klotzsch = **Cyclodium guianense** (Klotzsch) A.R. Sm.
Referencias: Smith, A. R., 1986.

Aspidium macrophyllum auct. non Sw. = **Tectaria incisa** Cav.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Aspidium martinicense Spreng. = **Tectaria incisa** Cav.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Aspidium meniscoides Willd. = **Cyclodium meniscioides** (Willd.) C. Presl

Aspidium mohrioides Bory = **Polystichum mohrioides** (Bory) C. Presl
Referencias: Moore, D. M., 1968.

Aspidium montevidense (Spreng.) Hieron. = **Polystichum montevidense** (Spreng.) Rosenst. var. **montevidense**
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Aspidium montevidense (Spreng.) Hieron. f. *imbricata* Hieron. = **Polystichum montevidense** (Spreng.) Rosenst. var. **montevidense**
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Aspidium montevidense (Spreng.) Hieron. f. *squamulosa* Hieron. = **Polystichum montevidense** (Spreng.) Rosenst. var. **squamulosa** (Hieron.) Hieron.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Aspidium multifidum Mett. = **Polystichum multifidum** (Mett.) H. Christ var. **multifidum**
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Aspidium nemophilum Kunze = **Ctenitis ampla** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Aspidium orbiculatum Desv. = **Polystichum chilense** (H. Christ) Diels var. **chilense**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Aspidium paleaceum Sw. = **Dryopteris wallichiana** (Spreng.) Hyl.

Aspidium parallelogrammum Kunze = **Dryopteris wallichiana** (Spreng.) Hyl.

Aspidium patulum Sw. = **Dryopteris patula** (Sw.) Underw.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Aspidium paucicuspis J.W. Sturm = **Polystichum chilense** (H. Christ) Diels var. **chilense**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Aspidium pearcei (Phil.) F. Phil. = **Polystichum multifidum** (Mett.) T. Moore var. **pearcei** (Phil.) R. Rodr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Aspidium pedicellatum H. Christ = **Ctenitis pedicellata** (H. Christ) Copel.

Aspidium platyphyllum Willd. = **Polystichum platyphyllum** (Willd.) C. Presl var. **platyphyllum**
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Aspidium plicatum Poepp. ex Kunze = **Polystichum plicatum** (Poepp. ex Kunze) Hicken
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995.

Aspidium plicatum Poepp. ex Kunze var. *laxum* Kunze = **Polystichum plicatum** (Poepp. ex Kunze) Hicken
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Aspidium plicatum Poepp. ex Kunze var. *rigidum* Kunze = **Polystichum plicatum** (Poepp. ex Kunze) Hicken
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Aspidium subintegerrimum Hook. & Arn. = **Polystichum subintegerrimum** (Hook. & Arn.) R. Rodr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Aspidium truncatulum Sw. = **Didymochlaena truncatula** (Sw.) Sm.
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Aspidium vestitum auct. non Sw. = **Polystichum chilense** (H. Christ) Diels var. **chilense**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995.

Aspidium wallichianum Spreng. = **Dryopteris wallichiana** (Spreng.) Hyl.

Asplenium arboreum Willd. = **Diplazium cristatum** (Desr.) Alston
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Asplenium lindbergii Mett. = **Diplazium lindbergii** (Mett.) H. Christ
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Asplenium marginatum L. = **Hemidictyum marginatum** (L.) C. Presl
Referencias: Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002.

Asplenium plantaginifolium L. = **Diplazium plantaginifolium** (L.) Urb.
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Asplenium riedelianum Bong. ex Kuhn = **Diplazium riedelianum** (Bong. ex Kuhn) Kuhn ex C. Chr.
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Asplenium shepherdii Spreng. = **Diplazium cristatum** (Desr.) Alston
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Asplenium striatum L. = **Diplazium striatum** (L.) C. Presl
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Athyrium Roth

Número de especies: 1

Athyrium dombeyi Desv.
Sin.: *Aspidium filix-mas* (L.) Sw. var. *remotum* auct. non A. Br., *Athyrium filix-femina* (L.) Roth var. *dombeyi* (Desv.) Hieron.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 700–3200 m.
Países: ARG(BAI, COR, SAL, TUC); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 358* (LP)]; BRA[*Sehnem, A. 6299* (PACA)].

[Athyrium filix-femina (L.) Roth]
Sin.: *Athyrium filix-femina* (L.) Roth var. *incisa* (Fée) Hieron., *Polypodium filix-femina* L .
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[*Athyrium filix-femina* (L.) Roth var. *dombeyi* (Desv.) Hieron. = **Athyrium dombeyi** Desv.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Athyrium filix-femina (L.) Roth var. *incisa* (Fée) Hieron. = **Athyrium filix-femina** (L.) Roth
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Athyrium lilloi (Hicken) Alston = **Diplazium lilloi** (Hicken) R.M. Tryon & A.F. Tryon
Referencias: Castro, M. T., 1998.

Athyrium lilloi (Hicken) C.V. Morton, comb. superfl. = **Diplazium lilloi** (Hicken) R.M. Tryon & A.F. Tryon

Cardiochlaena pilosa Fée = **Tectaria pilosa** (Fée) R.C. Moran

Cheilanthes crenata Kunze = **Woodsia montevidensis** (Spreng.) Hieron.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Ctenitis (C. Chr.) C. Chr.

Número de especies: 13, 7 endémicas

Ctenitis abyssi (Sehnem) Salino & Morais
Sin.: *Dryopteris abyssi* Sehnem
Referencias: Salino, A. & Morais, P. O., 2003.
Hierba rupícola. Perenne. Endémica. 600–700 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 6315* (PACA)].

Ctenitis adenopteris (C. Chr.) Ching = **Megalastrum adenopteris** (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran

Ctenitis ampla (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching
Sin.: *Aspidium nemophilum* Kunze, *Ctenitis nemophila* (Kunze) Ching, *Dryopteris nemophila* (Kunze) C. Chr., *Polypodium amplum* Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 400–1800 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fries, R. E. 222* (US)].

Ctenitis anniesii (Rosenst.) Copel.
Sin.: *Dryopteris anniesii* Rosenst., *Dryopteris anniesii* Rosenst. var. *ottonis* Rosenst.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24065* (MBM, NY, US)].

Ctenitis aspidioides (C. Presl) Ching
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 100–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 32198* (MBM, UC)].

Ctenitis connexa (Kaulf.) Copel. = **Megalastrum connexum** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Smith, A. R. & Moran, R. C., 1987.

Ctenitis deflexa (Kaulf.) Copel.
Sin.: *Dryopteris deflexa* (Kaulf.) C. Chr., *Nephrodium vestitum* Baker, *Polypodium deflexum* Kaulf.
Referencias: Hassler, E., 1928; Sehnem, A., 1979a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 900–1200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 8900* (US)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Hassler, 1928).

Ctenitis distans (Brack.) Ching
Sin.: *Aspidium ctenitis* Link, *Dryopteris ctenitis* (Link) Kuntze, *Lastrea distans* Brack.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 200–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 12863* (HBR)].

Ctenitis eriocaulis (Fée) Alston
Sin.: *Aspidium eriocaulon* Fée
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 200–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Braga 97* (UPCB, US)]; PRY[*Peña-Chocarro, M. C. 243* (BM)].

Ctenitis falciculata (Raddi) Ching
Sin.: *Aspidium falciculatum* Raddi
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Salino, A. 1462* (NY)]; PRY[*Marín, G. 306* (BM, CTES, PY)].

Ctenitis fenestralis (C. Chr.) Copel.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Spannagel, C. 144* (NY, UC)].

Ctenitis inaequalifolia (Colla) Ching = **Megalastrum inaequalifolium** (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **inaequalifolium**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Ctenitis inaequalifolia (Colla) Ching var. *glabrior* (C. Chr. & Skottsb.) G. Kunkel = **Megalastrum inaequalifolium** (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **glabrior** (C. Chr. & Skottsb.) R. Rodr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Ctenitis laetevirens (Rosenst.) Salino & Morais
Sin.: *Dryopteris laetevirens* Rosenst.
Referencias: Salino, A. & Morais, P. O., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Luederwaldt 1380* (SP)].

Ctenitis macrosora (Fée) Ching = **Megalastrum inaequale** (Kaulf. ex Link) A.R. Sm. & R.C. Moran

Ctenitis nemophila (Kunze) Ching = **Ctenitis ampla** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Ctenitis oreocharis (Sehnem) R.M. Bueno & R.M. Senna = **Megalastrum oreocharis** (Sehnem) Salino & Ponce

Ctenitis paranaensis (C. Chr.) Lellinger
Sin.: *Dryopteris falciculata* (Raddi) Kuntze var. *paranaensis* C. Chr., *Dryopteris paranensis* (C. Chr.) Sehnem
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Annies, J. s.n.* (C)].

Ctenitis pedicellata (H. Christ) Copel.
Sin.: *Aspidium pedicellatum* H. Christ, *Dryopteris indecora* Rosenst., *Dryopteris pedicellata* (H. Christ) C. Chr.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 900–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 42541* (MBM)].

Ctenitis pulverulenta (Poir.) Copel. = **Megalastrum pulverulentum** (Poir.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Ctenitis spectabilis (Kaulf.) G. Kunkel = **Megalastrum spectabile** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **spectabile**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Smith, A. R. & Moran, R. C., 1987.

Ctenitis spectabilis (Kaulf.) G. Kunkel var. *philippiana* (C. Chr.) R. Rodr. = **Megalastrum spectabile** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **philippianum** (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Ctenitis subincisa (Willd.) Ching = **Megalastrum subincisum** (Willd.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Ctenitis submarginalis (Langsd. & Fisch.) Copel., comb. superfl. = **Ctenitis submarginalis** (Langsd. & Fisch.) Ching

Ctenitis submarginalis (Langsd. & Fisch.) Ching
Sin.: *Ctenitis submarginalis* (Langsd. & Fisch.) Copel., comb. superfl., *Dryopteris sellowii* Hieron., *Dryopteris submarginalis* (Langsd. & Fisch.) C. Chr., *Nephrodium caripense* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Hook., *Nephrodium submarginale* (Langsd. & Fisch.) A. Braun, *Polypodium submarginale* Langsd. & Fisch.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, CAA, CAN); URY(ART, CLA, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1059* (SI)]; BRA[*Ribas, O. S. 3939* (SI)]; PRY[*Múlgura de Romero, M. E. 3496* (CTES, FCQ, SI), *Peña-Chocarro, M. C. 246* (BM), *Schinini, A. 27673* (CTES)]; URY[*Marchesi, E. 19096* (MVFA)].

Ctenitis wacketii (Rosenst. ex C. Chr.) Ching = **Megalastrum wacketii** (Rosenst. ex C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R. & Moran, R. C., 1987.

Cyclodium C. Presl
Número de especies: 1

[Cyclodium guianense (Klotzsch) A.R. Sm.]
Sin.: *Aspidium guianense* Klotzsch
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cyclodium meniscioides (Willd.) C. Presl
Sin.: *Aspidium meniscoides* Willd.
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Smith, A. R., 1986.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(AMA, CAN, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer 6280* (UC)]; PRY[*Hassler, E. 4783* (BM)].

Cyrtomium C. Presl
Número de especies: 1 introducida

Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl
Sin.: *Phanerophlebia falcata* (L. f.) Copel., *Polypodium falcatum* L. f.
Referencias: Burkart, A., 1933; Capurro, R. H., 1969[1968].
Hierba terrestre. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hurrell, J. A. 3208* (LP)].

Cystopteris Bernh.

Número de especies: 2

Cystopteris apiiformis Gand. = **Cystopteris fragilis** (L.) Bernh.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Cystopteris canariensis C. Presl = **Cystopteris diaphana** (Bory) Blasdell
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell
Sin.: *Cystopteris canariensis* C. Presl, *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. subsp. *canariensis* (C. Presl) H. Christ, *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. subsp. *diaphana* (Bory) Litard., *Polypodium diaphanum* Bory
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Ramos Giacosa, J. P., de la Sota, E. R. & Giúdice, G. E., 2004.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 200–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, SAL, TUC); URY(CLA, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Del Vitto, L. A. 1469* (LP), *Zuloaga, F. O. 7836* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 11118* (MVFA)].

Cystopteris emarginatula C. Presl = **Cystopteris fragilis** (L.) Bernh.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Sin.: *Cystopteris apiiformis* Gand., *Cystopteris emarginatula* C. Presl, *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. var. *apiiformis* (Gand.) C. Chr., *Polypodium fragile* L.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Blasdell, R. F., 1963; Broughton, D. A., Adam, J. H. M. & Brännström, R., 2000; Marchesi, E., 1965; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Rodríguez Ríos, R., 1995; Sehnem, A., 1979a; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, NEU, RNE, SAL, SCR, SLU, TDF, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(VII, XII, IJF); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 2792* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 10497* (HBR)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92341* (CONC, SGO)]; URY[*Del Puerto, O. 1556* (MVFA)].

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. var. *apiiformis* (Gand.) C. Chr. = **Cystopteris fragilis** (L.) Bernh.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. *canariensis* (C. Presl) H. Christ = **Cystopteris diaphana** (Bory) Blasdell
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. *diaphana* (Bory) Litard. = **Cystopteris diaphana** (Bory) Blasdell
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Dicksonia andina Phil. = **Polystichum multifidum** (Mett.) H. Christ var. **multifidum**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995.

Dicksonia montevidensis Spreng. = **Woodsia montevidensis** (Spreng.) Hieron.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Didymochlaena Desv.

Número de especies: 1

Didymochlaena lunulata Desv., nom. superfl. = **Didymochlaena truncatula** (Sw.) Sm.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Didymochlaena sinuosa Desv. = **Didymochlaena truncatula** (Sw.) Sm.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Didymochlaena truncatula (Sw.) Sm.
Sin.: *Adiantum lunulatum* Houtt., hom. illeg., *Aspidium truncatulum* Sw., *Didymochlaena lunulata* Desv., nom. superfl., *Didymochlaena sinuosa* Desv.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Stutz, L. C., 1983; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CAN, GUA); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1073* (SI), *Morrone, O. 1545* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 43452* (CTES)]; PRY[*Múlgura de Romero, M. E. 3532* (CTES, FCQ, SI), *Schinini, A. 28044* (CTES, SI)].
Notas: Citada para Tacuarembó, Uruguay, sin mencionar ejemplar de referencia (Legrand & Lombardo, 1958).

Diplazium Sw.

Número de especies: 15

Diplazium acuminatum Raddi = **Diplazium plantaginifolium** (L.) Urb.
Referencias: Cislinski, J., 1996.

Diplazium ambiguum Raddi
Sin.: *Diplazium brasiliense* Rosenst.
Referencias: Castro, M. T., 1998; Cislinski, J., 1996; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Capurro, R. H. 854* (BA)]; BRA[*Cislinski, J. 271* (CTES)]; PRY[*Rojas, T. 5689* (AS, MO)].

Diplazium arboreum (Willd.) C. Presl = **Diplazium cristatum** (Desr.) Alston
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Diplazium blanchetii (Willd.) C. Presl = **Diplazium lindbergii** (Mett.) H. Christ
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Diplazium brasiliense Rosenst. = **Diplazium ambiguum** Raddi
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Diplazium celtidifolium Kuntze
Sin.: *Diplazium celtidifolium* Kuntze var. *puberulum* Stolze
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4066* (*)]; PRY[*Marín, G. 257* (BM, PY)].

Diplazium celtidifolium Kuntze var. *puberulum* Stolze = **Diplazium celtidifolium** Kuntze

Diplazium cristatum (Desr.) Alston
Sin.: *Asplenium arboreum* Willd., *Asplenium shepherdii* Spreng., *Diplazium arboreum* (Willd.) C. Presl, *Diplazium shepherdii* (Spreng.) Link, *Meniscium cristatum* Desr.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1013* (SI), *Morrone, O. 2140* (SI)]; BRA[*Silva, J. M. 2973* (CTES)]; PRY[*Peña-Chocarro, M. C. 330* (BM)].

Diplazium herbaceum Fée
Referencias: Castro, M. T., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 11710* (LIL)]; BRA[*Cislinski, J. 220* (CTES)].

Diplazium hians Kunze ex Klotzsch
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–400 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jiménez, B. 115* (BM, CTES, PY)].
Notas: Citada para el Sur de Brasil sin indicar localidad o material de referencia (Mickel & Smith, 2004).

Diplazium intercalatum H. Christ = **Diplazium petersenii** (Kuntze) H. Christ

Diplazium japonicum (Thunb.) Bedd. = **Diplazium petersenii** (Kuntze) H. Christ

Diplazium leptocarpon Fée
Referencias: Cislinski, J., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Cislinski, J. 156* (UPCB)].

Diplazium lilloi (Hicken) R.M. Tryon & A.F. Tryon
Sin.: *Athyrium lilloi* (Hicken) Alston, *Athyrium lilloi* (Hicken) C.V. Morton, comb. superfl., *Nephrodium lilloi* Hicken
Referencias: Castro, M. T., 1998.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 400–1800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 4436* (LP), *Venturi, S. 3214* (LP), *Zuloaga, F. O. 7851* (SI)].

Diplazium lindbergii (Mett.) H. Christ
Sin.: *Asplenium lindbergii* Mett., *Diplazium blanchetii* (Willd.) C. Presl
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 300–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1362* (SI)]; BRA[*Kuniyoshi, Y. S. 3129* (CTES)].

Diplazium marginatum (L.) Diels, nom. illeg. = **Hemidictyum marginatum** (L.) C. Presl

Diplazium petersenii (Kuntze) H. Christ
Sin.: *Diplazium intercalatum* H. Christ, *Diplazium japonicum* (Thunb.) Bedd.
Referencias: Cislinski, J., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Cislinski, J. 242* (UPCB)].

Diplazium plantaginifolium (L.) Urb.
Sin.: *Asplenium plantaginifolium* L., *Diplazium acuminatum* Raddi
Referencias: Cislinski, J., 1996; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Salino, A. 1548* (BHCB, UPCB)]; PRY[*Jiménez, B. 116* (BM, CTES, PY)].

Diplazium riedelianum Kunze, hom. illeg. = **Diplazium riedelianum** (Bong. ex Kuhn) Kuhn ex C. Chr.

Diplazium riedelianum (Bong. ex Kuhn) Kuhn ex C. Chr.
Sin.: *Asplenium riedelianum* Bong. ex Kuhn, *Diplazium riedelianum* Kunze, hom. illeg.
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Schmalz, P. s.n.* (SI)]; PRY[*Marín, G. 226* (BM, CTES, PY)].

Diplazium rostratum Fée
Referencias: Cislinski, J., 1996.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kummrow, R. 308* (MBM, PACA)].

Diplazium shepherdii (Spreng.) Link = **Diplazium cristatum** (Desr.) Alston
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Diplazium striatum (L.) C. Presl
Sin.: *Asplenium striatum* L.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Hassler, E., 1928; Legrand, C. M. D. E. & Lombardo, A., 1958; Sehnem, A., 1979a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); URY(CLA, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 6851* (CTES)]; BRA[*Reitz, P. R. 3355* (HBR)]; URY[*Bonifacino, J. M. 26047* (MVFA)].

Diplazium turgidum Rosenst.
Referencias: Cislinski, J., 1996; Sehnem, A., 1979a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 100–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Cislinski, J. 254* (UPCB)].

Diplazium urticifolium H. Christ
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 100–400 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Peña-Chocarro, M. C. 355* (BM)].

Dryopteris Adans., nom. cons.

Número de especies: 4, 2 introducidas

Dryopteris abundans Rosenst. = **Megalastrum abundans** (Rosenst.) A.R. Sm. & R.C. Moran

Dryopteris abyssi Sehnem = **Ctenitis abyssi** (Sehnem) Salino & Morais
Referencias: Salino, A. & Morais, P. O., 2003.

Dryopteris adenopteris C. Chr. = **Megalastrum adenopteris** (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R. & Moran, R. C., 1987.

[Dryopteris adnata Rosenst. ex Hassl., hom. illeg.]
Notas: Nombre dudoso.

Dryopteris amplissima (C. Presl) Kuntze = **Lastreopsis amplissima** (C. Presl) Tindale
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Dryopteris anniesii Rosenst. = **Ctenitis anniesii** (Rosenst.) Copel.

Dryopteris anniesii Rosenst. var. *ottonis* Rosenst. = **Ctenitis anniesii** (Rosenst.) Copel.

Dryopteris connexa (Kaulf.) C. Chr. = **Megalastrum connexum** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R. & Moran, R. C., 1987.

Dryopteris connexa (Kaulf.) C. Chr. var. *minor* D. Legrand = **Megalastrum connexum** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran

Dryopteris crenulans (Fée) C. Chr. = **Megalastrum crenulans** (Fée) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Ponce, M. M., 2001.

Dryopteris ctenitis (Link) Kuntze = **Ctenitis distans** (Brack.) Ching

Dryopteris deflexa (Kaulf.) C. Chr. = **Ctenitis deflexa** (Kaulf.) Copel.

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray
Sin.: *Dryopteris spinulosa* (Mett.) Kuntze subsp. *dilatata* (Hoffm.) C. Chr., *Polypodium dilatatum* Hoffm.
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Moore, D. M., 1968.
Hierba terrestre. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Notas: Introducida en las Islas Malvinas, Argentina.

Dryopteris effusa (Sw.) Urb. = **Lastreopsis effusa** (Sw.) Tindale subsp. **effusa**
Referencias: Tindale, M. D., 1965.

Dryopteris effusa (Sw.) Urb. var. *tenuis* (Hicken) Hassl. = **Lastreopsis effusa** (Sw.) Tindale subsp. **effusa**

Dryopteris falciculata (Raddi) Kuntze var. *paranaensis* C. Chr. = **Ctenitis paranaensis** (C. Chr.) Lellinger

Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Sin.: *Aspidium filix-mas* (L.) Sw., *Dryopteris patagonica* Diem, *Nephrodium filix-mas* (L.) Rich., *Polypodium filix-mas* L.
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Diem, J., 1960; Fraser-Jenkins, C. R., 1986; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba terrestre. Perenne. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 2449* (BAB)].
Notas: Asilvestrada en Valdivia, Chile.

Dryopteris filix-mas (L.) Schott subsp. *paleacea* (Sw.) C. Chr. = **Dryopteris wallichiana** (Spreng.) Hyl.

Dryopteris inaequalifolia (Colla) C. Chr. = **Megalastrum inaequalifolium** (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **inaequalifolium**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Dryopteris inaequalifolia (Colla) C. Chr. var. *glabrior* C. Chr. & Skottsb. = **Megalastrum inaequalifolium** (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **glabrior** (C. Chr. & Skottsb.) R. Rodr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Dryopteris indecora Rosenst. = **Ctenitis pedicellata** (H. Christ) Copel.

Dryopteris laetevirens Rosenst. = **Ctenitis laetevirens** (Rosenst.) Salino & Morais
Referencias: Salino, A. & Morais, P. O., 2003.

Dryopteris late-adnata (H. Christ) C. Chr. = **Megalastrum connexum** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran

Dryopteris macrosora (Fée) C. Chr. = **Megalastrum inaequale** (Kaulf. ex Link) A.R. Sm. & R.C. Moran

Dryopteris metteniana Kuntze = **Polystichum multifidum** (Mett.) H. Christ var. **multifidum**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Dryopteris nemophila (Kunze) C. Chr. = **Ctenitis ampla** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Dryopteris oreocharis Sehnem = **Megalastrum oreocharis** (Sehnem) Salino & Ponce

Dryopteris paleacea (Sw.) C. Chr., nom. illeg. = **Dryopteris wallichiana** (Spreng.) Hyl.

Dryopteris parallelogramma (Kunze) Alston = **Dryopteris wallichiana** (Spreng.) Hyl.

Dryopteris paranensis (C. Chr.) Sehnem = **Ctenitis paranaensis** (C. Chr.) Lellinger

Dryopteris patagonica Diem = **Dryopteris filix-mas** (L.) Schott
Referencias: Fraser-Jenkins, C. R., 1986; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Dryopteris patula (Sw.) Underw.
Sin.: *Aspidium patulum* Sw., *Nephrodium patulum* (Sw.) Baker
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 400–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4039* (SI)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar material de referencia.

Dryopteris pedicellata (H. Christ) C. Chr. = **Ctenitis pedicellata** (H. Christ) Copel.

Dryopteris pulverulenta (Poir.) C. Chr. = **Megalastrum pulverulentum** (Poir.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Dryopteris sellowii Hieron. = **Ctenitis submarginalis** (Langsd. & Fisch.) Ching
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Dryopteris skottsbergii C. Chr. = **Megalastrum inaequalifolium** (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **inaequalifolium**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Dryopteris spectabilis (Kaulf.) C. Chr. = **Megalastrum spectabile** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **spectabile**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Dryopteris spectabilis (Kaulf.) C. Chr., comb. superfl. = **Megalastrum spectabile** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **spectabile**
Referencias: Smith, A. R. & Moran, R. C., 1987.

Dryopteris spectabilis (Kaulf.) Macloskie & Dusén = **Megalastrum spectabile** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **spectabile**

Dryopteris spectabilis (Kaulf.) C. Chr. var. *philippiana* C. Chr. = **Megalastrum spectabile** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **philippianum** (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Dryopteris spinulosa (Mett.) Kuntze subsp. *dilatata* (Hoffm.) C. Chr. = **Dryopteris dilatata** (Hoffm.) A. Gray
Referencias: Moore, D. M., 1968.

Dryopteris subincisa (Willd.) Urb. = **Megalastrum subincisum** (Willd.) A.R. Sm. & R.C. Moran

Dryopteris submarginalis (Langsd. & Fisch.) C. Chr. = **Ctenitis submarginalis** (Langsd. & Fisch.) Ching
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Dryopteris umbrina C. Chr. = **Megalastrum umbrinum** (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran

Dryopteris villosa (L.) Kuntze var. *berteroana* (Hook.) C. Chr. = **Megalastrum inaequalifolium** (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **inaequalifolium**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Dryopteris wacketii Rosenst. ex C. Chr. = **Megalastrum wacketii** (Rosenst. ex C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R. & Moran, R. C., 1987.

Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl.
Sin.: *Aspidium paleaceum* Sw., *Aspidium parallelogrammum* Kunze, *Aspidium wallichianum* Spreng., *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott subsp. *paleacea* (Sw.) C. Chr., *Dryopteris paleacea* (Sw.) C. Chr., nom. illeg., *Dryopteris parallelogramma* (Kunze) Alston, *Nephrodium filix-mas* (L.) Rich. var. *paleaceum* (Sw.) Mett.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Hierba terrestre. Perenne. Nativa.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7834* (SI)].

Hemidictyum C. Presl

Número de especies: 1

Hemidictyum marginatum (L.) C. Presl
Sin.: *Asplenium marginatum* L., *Diplazium marginatum* (L.) Diels, nom. illeg.
Referencias: Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 245* (HBR)].

Lastrea distans Brack. = **Ctenitis distans** (Brack.) Ching

Lastreopsis Ching

Número de especies: 2

Lastreopsis amplissima (C. Presl) Tindale
Sin.: *Dryopteris amplissima* (C. Presl) Kuntze, *Nephrodium amplissimum* (C. Presl) Hook., *Polystichopsis amplissima* (C. Presl) Abbiatti, *Polystichum amplissimum* C. Presl
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Tindale, M. D., 1965; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hassler, E. 567* (G)]; BRA[*Rambo, B. 46249* (NY)]; PRY[*Peña-Chocarro, M. C. 274* (BM)].

Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale subsp. **divergens** (Willd. ex Schkuhr) Tindale
Sin.: *Parapolystichum effusum* (Sw.) Abbiatti var. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Abbiatti, *Polypodium divergens* Willd. ex Schkuhr
Referencias: Abbiatti, D., 1958; Tindale, M. D., 1965.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 300–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS); PRY(CAU, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1065* (SI)]; BRA[*Leite, J. E. 2309* (GH, NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 43340* (MO, PY)].

Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale subsp. **effusa**
Sin.: *Dryopteris effusa* (Sw.) Urb., *Dryopteris effusa* (Sw.) Urb. var. *tenuis* (Hicken) Hassl., *Nephrodium effusum* (Sw.) Baker, *Nephrodium effusum* (Sw.) Baker var. *tenue* Hicken, *Polypodium effusum* Sw.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Stutz, L. C., 1983; Tindale, M. D., 1965; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5646* (SI)]; BRA[*Rohr, J. A. 1064* (NY)]; PRY[*Múlgura de Romero, M. E. 3530* (CTES, FCQ, SI), *Peña-Chocarro, M. C. 201* (BM, PY)].

Megalastrum Holttum

Número de especies: 11, 3 endémicas

Megalastrum abundans (Rosenst.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Dryopteris abundans* Rosenst.
Referencias: Smith, A. R. & Moran, R. C., 1987.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 700–800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 9916* (PACA)].

Megalastrum adenopteris (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenitis adenopteris* (C. Chr.) Ching, *Dryopteris adenopteris* C. Chr.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 400–2000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 886* (SI)]; BRA[*Jürgens, C. 206* (UC)].

Megalastrum connexum (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenitis connexa* (Kaulf.) Copel., *Dryopteris connexa* (Kaulf.) C. Chr., *Dryopteris connexa* (Kaulf.) C. Chr. var. *minor* D. Legrand, *Dryopteris late-adnata* (H. Christ) C. Chr., *Nephrodium connexum* (Kaulf.) Hicken, *Phegopteris late-adnata* H. Christ, *Polypodium connexum* Kaulf.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 100–1100 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CAN, COA); URY(CLA, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Heinonen, S. 9* (SI)]; BRA[*Leite, J. E. 39* (NY)]; PRY[*Schinini, A. 27051* (CTES)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 3994* (MVM)].

Megalastrum crenulans (Fée) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Aspidium crenulans* Fée, *Dryopteris crenulans* (Fée) C. Chr.
Referencias: Ponce, M. M., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5551* (SI)]; BRA[*Jürgens, C. s.n.* (NY)]; PRY[*Rojas, T. 4039* (SI)].

Megalastrum inaequale (Kaulf. ex Link) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenitis macrosora* (Fée) Ching, *Dryopteris macrosora* (Fée) C. Chr., *Polypodium inaequale* Kaulf. ex Link
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 29729* (MBM)].

Megalastrum inaequalifolium (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **glabrior** (C. Chr. & Skottsb.) R. Rodr.
Sin.: *Ctenitis inaequalifolia* (Colla) Ching var. *glabrior* (C. Chr. & Skottsb.) G. Kunkel, *Dryopteris inaequalifolia* (Colla) C. Chr. var. *glabrior* C. Chr. & Skottsb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 200–600 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, C. J. F. 731* (*)].

Megalastrum inaequalifolium (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **inaequalifolium**
Sin.: *Ctenitis inaequalifolia* (Colla) Ching, *Dryopteris inaequalifolia* (Colla) C. Chr., *Dryopteris skottsbergii* C. Chr., *Dryopteris villosa* (L.) Kuntze var. *berteroana* (Hook.) C. Chr., *Nephrodium villosum* auct. non (L.) C. Presl, *Polypodium inaequalifolium* Colla, *Polypodium punctatum* auct. non (L.) Sw., *Polypodium vestitum* auct. non (F. Phil.) Hook.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 200–600 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. s.n.* (*)].

Megalastrum oreocharis (Sehnem) Salino & Ponce
Sin.: *Ctenitis oreocharis* (Sehnem) R.M. Bueno & R.M. Senna, *Dryopteris oreocharis* Sehnem
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 900–1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 5508* (PACA)].

Megalastrum pulverulentum (Poir.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenitis pulverulenta* (Poir.) Copel., *Dryopteris pulverulenta* (Poir.) C. Chr., *Polypodium pulverulentum* Poir.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 400–1800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 1662* (LP), *Zuloaga, F. O. 7844* (SI)].

Megalastrum spectabile (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **philippianum** (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenitis spectabilis* (Kaulf.) G. Kunkel var. *philippiana* (C. Chr.) R. Rodr., *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) C. Chr. var. *philippiana* C. Chr.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 21278* (CONC)].

Megalastrum spectabile (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **spectabile**
Sin.: *Ctenitis spectabilis* (Kaulf.) G. Kunkel, *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) C. Chr., *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) C. Chr., comb. superfl., *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) Macloskie & Dusén, *Phegopteris spectabilis* (Kaulf.) Fée, *Phegopteris vestita* F. Phil., *Polypodium spectabile* Kaulf., *Polypodium vestitum* (F. Phil.) Hook.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Capurro, R. H., 1940[1938]; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 700–900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(IV, V, VI, VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5037* (LP)]; CHL[*Pisano, E. 6193* (CONC)].

[Megalastrum subincisum (Willd.) A.R. Sm. & R.C. Moran]
Sin.: *Ctenitis subincisa* (Willd.) Ching, *Dryopteris subincisa* (Willd.) Urb., *Nephrodium subincisum* (Willd.) H. Christ, *Polypodium subincisum* Willd.
Referencias: Smith, A. R. & Moran, R. C., 1987.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Megalastrum umbrinum (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Dryopteris umbrina* C. Chr.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Luederwaldt, H. 1806* (US)].

[Megalastrum villosum (L.) Holttum]
Sin.: *Nephrodium villosum* (L.) C. Presl, *Polypodium villosum* L.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Megalastrum wacketii (Rosenst. ex C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenitis wacketii* (Rosenst. ex C. Chr.) Ching, *Dryopteris wacketii* Rosenst. ex C. Chr.
Referencias: Sehnem, A., 1979a; Smith, A. R. & Moran, R. C., 1987.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24737* (MBM)].

Meniscium cristatum Desr. = **Diplazium cristatum** (Desr.) Alston
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Nephrodium amplissimum (C. Presl) Hook. = **Lastreopsis amplissima** (C. Presl) Tindale
Referencias: Tindale, M. D., 1965.

Nephrodium caripense (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Hook. = **Ctenitis submarginalis** (Langsd. & Fisch.) Ching

Nephrodium connexum (Kaulf.) Hicken = **Megalastrum connexum** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran

Nephrodium duriusculum C. Presl = **Rumohra adiantiformis** (G. Forst.) Ching
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Nephrodium effusum (Sw.) Baker = **Lastreopsis effusa** (Sw.) Tindale subsp. **effusa**
Referencias: Tindale, M. D., 1965.

Nephrodium effusum (Sw.) Baker var. *tenue* Hicken = **Lastreopsis effusa** (Sw.) Tindale subsp. **effusa**
Referencias: Tindale, M. D., 1965.

Nephrodium filix-mas (L.) Rich. = **Dryopteris filix-mas** (L.) Schott
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Nephrodium filix-mas (L.) Rich. var. *paleaceum* (Sw.) Mett. = **Dryopteris wallichiana** (Spreng.) Hyl.

Nephrodium lilloi Hicken = **Diplazium lilloi** (Hicken) R.M. Tryon & A.F. Tryon
Referencias: Castro, M. T., 1998.

Nephrodium patulum (Sw.) Baker = **Dryopteris patula** (Sw.) Underw.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Nephrodium subincisum (Willd.) H. Christ = **Megalastrum subincisum** (Willd.) A.R. Sm. & R.C. Moran

Nephrodium submarginale (Langsd. & Fisch.) A. Braun = **Ctenitis submarginalis** (Langsd. & Fisch.) Ching

Nephrodium vestitum Baker = **Ctenitis deflexa** (Kaulf.) Copel.

Nephrodium villosum (L.) C. Presl = **Megalastrum villosum** (L.) Holttum

Nephrodium villosum auct. non (L.) C. Presl = **Megalastrum inaequalifolium** (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **inaequalifolium**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Olfersia Raddi

Número de especies: 1

Olfersia cervina (L.) Kunze
Sin.: *Osmunda cervina* L., *Osmunda corcovadensis* Raddi, *Polybotrya cervina* (L.) Kaulf., *Polybotrya cervina* (L.) Kaulf. f. *transitoria* Rosenst.
Referencias: Moran, R. C., 1986; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 13642* (NY)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o material de referencia (Hassler, 1928).

Osmunda cervina L. = **Olfersia cervina** (L.) Kunze
Referencias: Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002.

Osmunda corcovadensis Raddi = **Olfersia cervina** (L.) Kunze

Parapolystichum effusum (Sw.) Abbiatti var. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Abbiatti = **Lastreopsis effusa** (Sw.) Tindale subsp. **divergens** (Willd. ex Schkuhr) Tindale
Referencias: Tindale, M. D., 1965.

Phanerophlebia falcata (L. f.) Copel. = **Cyrtomium falcatum** (L. f.) C. Presl
Referencias: Capurro, R. H., 1969[1968].

Phegopteris brevinervis Fée = **Stigmatopteris brevinervis** (Fée) R.C. Moran
Referencias: Moran, R. C., 1991.

Phegopteris heterocarpa Fée = **Stigmatopteris heterocarpa** (Fée) Rosenst.
Referencias: Moran, R. C., 1991.

Phegopteris late-adnata H. Christ = **Megalastrum connexum** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran

Phegopteris poeppigii (Kunze) Fée ex J. Remy = **Hypolepis poeppigii** (Kunze) Maxon
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Phegopteris poeppigii (Kunze) Fée ex J. Remy var. *hirsuta* F. Phil. = **Hypolepis poeppigii** (Kunze) Maxon
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Phegopteris spectabilis (Kaulf.) Fée = **Megalastrum spectabile** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **spectabile**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Phegopteris sturmii F. Phil. = **Hypolepis poeppigii** (Kunze) Maxon
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Phegopteris vestita F. Phil. = **Megalastrum spectabile** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **spectabile**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Physematium cumingianum Kunze = **Woodsia montevidensis** (Spreng.) Hieron.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polybotrya Humb. & Bonpl. ex Willd.

Número de especies: 3, 1 endémica

Polybotrya cervina (L.) Kaulf. = **Olfersia cervina** (L.) Kunze
Referencias: Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002.

Polybotrya cervina (L.) Kaulf. f. *transitoria* Rosenst. = **Olfersia cervina** (L.) Kunze

Polybotrya cylindrica Kaulf.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998.
Hierba hemiepífita. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 155* (SP, UPCB)].

Polybotrya goyazensis Brade
Sin.: *Polybotrya macedoi* Brade
Referencias: Moran, R. C., 1987.
Hierba hemiepífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 10182* (B, BM)].

Polybotrya macedoi Brade = **Polybotrya goyazensis** Brade

[Polybotrya osmundacea Humb. & Bonpl. ex Willd.]
Sin.: *Acrostichum osmundaceum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Hook.
Referencias: Moran, R. C., 1987.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Polybotrya scandens Fée]
Notas: Nombre dudoso.

Polybotrya semipinnata Fée
Referencias: Moran, R. C., 1987.
Hierba hemiepífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Schwacke, C. A. W. s.n.* (P)].

Polypodium aculeatum L. = **Polystichum aculeatum** (L.) Schott
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Polypodium adiantiforme G. Forst. = **Rumohra adiantiformis** (G. Forst.) Ching
Referencias: Capurro, R. H., 1969[1968]; Rodríguez Ríos, R., 1995.

[Polypodium adnatum Kunze ex Klotzsch]
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Polypodium amplum Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Ctenitis ampla** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Polypodium carrii Baker = **Stigmatopteris heterocarpa** (Fée) Rosenst.
Referencias: Moran, R. C., 1991.

Polypodium caudatum Raddi = **Stigmatopteris caudata** (Raddi) C. Chr.
Referencias: Moran, R. C., 1991.

Polypodium connexum Kaulf. = **Megalastrum connexum** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R. & Moran, R. C., 1987.

Polypodium deflexum Kaulf. = **Ctenitis deflexa** (Kaulf.) Copel.

Polypodium denticulatum Sw. = **Arachniodes denticulata** (Sw.) Ching

Polypodium diaphanum Bory = **Cystopteris diaphana** (Bory) Blasdell
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Polypodium dilatatum Hoffm. = **Dryopteris dilatata** (Hoffm.) A. Gray
Referencias: Moore, D. M., 1968.

Polypodium divergens Willd. ex Schkuhr = **Lastreopsis effusa** (Sw.) Tindale subsp. **divergens** (Willd. ex Schkuhr) Tindale
Referencias: Tindale, M. D., 1965.

Polypodium effusum Sw. = **Lastreopsis effusa** (Sw.) Tindale subsp. **effusa**
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Polypodium falcatum L. f. = **Cyrtomium falcatum** (L. f.) C. Presl
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Polypodium filix-femina L. = **Athyrium filix-femina** (L.) Roth

Polypodium filix-mas L. = **Dryopteris filix-mas** (L.) Schott
Referencias: Fraser-Jenkins, C. R., 1986; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium fragile L. = **Cystopteris fragilis** (L.) Bernh.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Polypodium inaequale Kaulf. ex Link = **Megalastrum inaequale** (Kaulf. ex Link) A.R. Sm. & R.C. Moran

Polypodium inaequalifolium Colla = **Megalastrum inaequalifolium** (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **inaequalifolium**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium montevidense Spreng. = **Polystichum montevidense** (Spreng.) Rosenst. var. **montevidense**
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Polypodium obtusum Spreng. = **Woodsia obtusa** (Spreng.) Torr.

Polypodium pulverulentum Poir. = **Megalastrum pulverulentum** (Poir.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Polypodium punctatum auct. non (L.) Sw. = **Megalastrum inaequalifolium** (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **inaequalifolium**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium spectabile Kaulf. = **Megalastrum spectabile** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **spectabile**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Smith, A. R. & Moran, R. C., 1987.

Polypodium subincisum Willd. = **Megalastrum subincisum** (Willd.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R. & Moran, R. C., 1987.

Polypodium submarginale Langsd. & Fisch. = **Ctenitis submarginalis** (Langsd. & Fisch.) Ching
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Polypodium trifoliatum L. = **Tectaria trifoliata** (L.) Cav.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Polypodium vestitum (F. Phil.) Hook. = **Megalastrum spectabile** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **spectabile**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium vestitum auct. non (F. Phil.) Hook. = **Megalastrum inaequalifolium** (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **inaequalifolium**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium villosum L. = **Megalastrum villosum** (L.) Holttum

Polystichopsis amplissima (C. Presl) Abbiatti = **Lastreopsis amplissima** (C. Presl) Tindale
Referencias: Abbiatti, D., 1958.

Polystichum Roth, nom. cons.

Número de especies: 15, 7 endémicas

Polystichum aculeatum auct. non (L.) Schott = **Polystichum chilense** (H. Christ) Diels var. **chilense**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

[Polystichum aculeatum (L.) Schott]
Sin.: *Aspidium aculeatum* (L.) Sw., *Polypodium aculeatum* L.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Polystichum aculeatum (L.) Schott var. *brongniartianum* (J. Remy & Fée) C. Chr. = **Polystichum subintegerrimum** (Hook. & Arn.) R. Rodr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987.

Polystichum aculeatum (L.) Schott var. *chilense* (H. Christ) C. Chr. = **Polystichum chilense** (H. Christ) Diels var. **chilense**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995.

Polystichum aculeatum (L.) Schott var. *montevidense* (Spreng.) C. Chr. = **Polystichum montevidense** (Spreng.) Rosenst. var. **montevidense**
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Polystichum aculeatum (L.) Schott var. *orbiculatum* auct. non (Desv.) C. Chr. = **Polystichum chilense** (H. Christ) Diels var. **chilense**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polystichum aculeatum (L.) Schott var. *phegopteroidea* Baker = **Polystichum platyphyllum** (Willd.) C. Presl var. **platyphyllum**

Polystichum aculeatum (L.) Schott var. *platyphyllum* (Willd.) C. Chr. = **Polystichum platyphyllum** (Willd.) C. Presl var. **platyphyllum**
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Polystichum aculeatum (L.) Schott var. *subintegerrimum* (Hook. & Arn.) C. Chr. = **Polystichum subintegerrimum** (Hook. & Arn.) R. Rodr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polystichum aculeolatum Fée
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 700–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 9792* (HBR)].

Polystichum adiantiforme (G. Forst.) J. Sm. = **Rumohra adiantiformis** (G. Forst.) Ching
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938], 1961; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polystichum amplissimum C. Presl = **Lastreopsis amplissima** (C. Presl) Tindale
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Polystichum andinum Phil.
Sin.: *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl var. *plicatum* (Poepp.) C. Chr., *Polystichum mohrioides* auct. non (Bory) C. Presl, *Polystichum plicatum* auct. non (Poepp. ex Kunze) Hicken
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Capurro, R. H., 1940[1938]; Pichi Sermolli, R. E. G. & Bizarri, M. P., 1978; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–4000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 846* (LP), *Skottsberg, C. J. F. s.n.* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92406* (CONC)].

Polystichum berteroanum (Colla) C. Chr. = **Rumohra berteroana** (Colla) R. Rodr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polystichum bridgesii Schott = **Polystichum chilense** (H. Christ) Diels var. **chilense**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polystichum brongniartianum J. Remy = **Polystichum subintegerrimum** (Hook. & Arn.) R. Rodr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polystichum caudescens Dutra
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Nativa. 900–1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 874* (PACA)].

Polystichum chilense (H. Christ) Diels var. **chilense**
Sin.: *Aspidium aculeatum* (L.) Sw. var. *chilensis* C. Chr., *Aspidium bridgesii* (Schott) J.W. Sturm, *Aspidium orbiculatum* Desv., *Aspidium paucicuspis* J.W. Sturm, *Aspidium vestitum* auct. non Sw., *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *chilense* (H. Christ) C. Chr., *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *orbiculatum* auct. non (Desv.) C. Chr., *Polystichum aculeatum* auct. non (L.) Schott, *Polystichum bridgesii* Schott, *Polystichum orbiculatum* auct. non (Desv.) J. Remy, *Polystichum vestitum* (G. Forst.) C. Presl
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Looser, G., 1939; Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6284* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 994849* (CONC, SGO)].

Polystichum chilense (H. Christ) Diels var. **dusenii** (C. Chr.) Looser ex R. Rodr.
Sin.: *Polystichum multifidum* (Mett.) T. Moore var. *dusenii* C. Chr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dudley, T. R. 1202* (LP), *James, P. 1504* (SI)]; CHL[*Dusén, P. K. H. 489* (S)].

Polystichum coriaceum Schott = **Rumohra adiantiformis** (G. Forst.) Ching
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polystichum denticulatum (Sw.) J. Sm. = **Arachniodes denticulata** (Sw.) Ching

Polystichum elegans J. Remy = **Polystichum plicatum** (Poepp. ex Kunze) Hicken
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995.

Polystichum giganteum Fée
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 12890* (HBR)].

Polystichum laniceps Rosenst.
Referencias: Rosenstock, E., 1907.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Jürgens, C. 6* (*)].

Polystichum lanosum Fée = **Polystichum platyphyllum** (Willd.) C. Presl var. **platyphyllum**

Polystichum longecuspis Fée
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 12585* (HBR)].

Polystichum microsorium Fée = **Polystichum montevidense** (Spreng.) Rosenst. var. **montevidense**

Polystichum mohrioides auct. non (Bory) C. Presl = **Polystichum andinum** Phil.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987.

Polystichum mohrioides (Bory) C. Presl
Sin.: *Aspidium mohrioides* Bory
Referencias: Moore, D. M., 1968.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hooker, W. J. s.n.* (SI)].

Polystichum mohrioides (Bory) C. Presl f. *genuina* Hicken = **Polystichum plicatum** (Poepp. ex Kunze) Hicken
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995.

Polystichum mohrioides (Bory) C. Presl f. *latifolia* Hicken = **Polystichum plicatum** (Poepp. ex Kunze) Hicken
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995.

Polystichum mohrioides (Bory) C. Presl var. *elegans* (J. Remy) C. Chr. = **Polystichum plicatum** (Poepp. ex Kunze) Hicken
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995.

Polystichum mohrioides (Bory) C. Presl var. *plicatum* (Poepp.) C. Chr. = **Polystichum andinum** Phil.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995.

Polystichum montevidense (Spreng.) Rosenst. var. **montevidense**
Sin.: *Aspidium montevidense* (Spreng.) Hieron., *Aspidium montevidense* (Spreng.) Hieron. f. *imbricata* Hieron., *Polypodium montevidense* Spreng., *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *montevidense* (Spreng.) C. Chr., *Polystichum microsorium* Fée
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Legrand, C. M. D. E. & Lombardo, A., 1958; Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(PAI); URY(MAL).

Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 9037* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 12585* (HBR)]; PRY[*Balansa, B. 2914* (BM)]; URY[*Marchesi, E. 1379* (MVFA)].

Polystichum montevidense (Spreng.) Rosenst. var. **squamulosa** (Hieron.) Hieron.
Sin.: *Aspidium montevidense* (Spreng.) Hieron. f. *squamulosa* Hieron.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–2000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4733* (LP), *Zuloaga, F. O. 7721* (SI)].

Polystichum multifidum (Mett.) T. Moore var. *autranii* Hicken = **Polystichum multifidum** (Mett.) H. Christ var. **multifidum**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995.

Polystichum multifidum (Mett.) T. Moore var. *dusenii* C. Chr. = **Polystichum chilense** (H. Christ) Diels var. **dusenii** (C. Chr.) Looser ex R. Rodr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995.

Polystichum multifidum (Mett.) H. Christ var. **multifidum**
Sin.: *Aspidium multifidum* Mett., *Dicksonia andina* Phil., *Dryopteris metteniana* Kuntze, *Polystichum multifidum* (Mett.) T. Moore var. *autranii* Hicken
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 5369* (SI)]; CHL[*Lechler, W. 773* (*)].

Polystichum multifidum (Mett.) T. Moore var. **pearcei** (Phil.) R. Rodr.
Sin.: *Aspidium pearcei* (Phil.) F. Phil., *Polystichum nahuelhuapiense* Diem, *Polystichum pearcei* Phil.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 3260* (BAB)]; CHL[*Pearce, R. s.n.* (*)].

Polystichum nahuelhuapiense Diem = **Polystichum multifidum** (Mett.) T. Moore var. **pearcei** (Phil.) R. Rodr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995.

Polystichum opacum Rosenst. = **Polystichum platyphyllum** (Willd.) C. Presl var. **platyphyllum**

Polystichum orbiculatum auct. non (Desv.) J. Remy = **Polystichum chilense** (H. Christ) Diels var. **chilense**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995.

Polystichum orbiculatum auct. non (Desv.) J. Remy = **Polystichum tetragonum** Fée
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polystichum pearcei Phil. = **Polystichum multifidum** (Mett.) T. Moore var. **pearcei** (Phil.) R. Rodr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995.

Polystichum platylepis Fée = **Polystichum platyphyllum** (Willd.) C. Presl var. **platyphyllum**

Polystichum platyphyllum (Willd.) C. Presl var. **klotzschii** Rosenst. ex Brade
Referencias: Brade, A. C., 1920; Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 120* (SI)]; BRA[*Jürgens, C. s.n.* (SI)]; URY[*Hicken, C. M. s.n.* (SI)].

Polystichum platyphyllum (Willd.) C. Presl var. **kurtziana** Hicken
Referencias: Hicken, C. M., 1907.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 1700 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. 8352* (SI)].

Polystichum platyphyllum (Willd.) C. Presl var. **platyphyllum**
Sin.: *Aspidium platyphyllum* Willd., *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *phegopteroidea* Baker, *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *platyphyllum* (Willd.) C. Chr., *Polystichum lanosum* Fée, *Polystichum opacum* Rosenst., *Polystichum platylepis* Fée
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Hassler, E., 1928; Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(GUA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 50* (SI)]; BRA[*Eskuche, U. G. 1641-59* (CTES)]; PRY[*Zardini, E. M. 8473* (MO)].

Polystichum plicatum auct. non (Poepp. ex Kunze) Hicken = **Polystichum andinum** Phil.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987.

Polystichum plicatum (Poepp. ex Kunze) Hicken
Sin.: *Aspidium elegans* (J. Remy) J.W. Sturm, *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze, *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze var. *laxum* Kunze, *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze var. *rigidum* Kunze, *Polystichum elegans* J. Remy, *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl f. *genuina* Hicken, *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl f. *latifolia* Hicken, *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl var. *elegans* (J. Remy) C. Chr.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6448* (SI), *Cabrera, A. L. 23042* (LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20001* (CONC, SGO)].

Polystichum subintegerrimum (Hook. & Arn.) R. Rodr.
Sin.: *Aspidium brongniartianum* (J. Remy) J.W. Sturm, *Aspidium subintegerrimum* Hook. & Arn., *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *brongniartianum* (J. Remy & Fée) C. Chr., *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *subintegerrimum* (Hook. & Arn.) C. Chr., *Polystichum brongniartianum* J. Remy
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1987, 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1100 m.
Países: CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 971* (CONC)].

Polystichum tetragonum Fée
Sin.: *Aspidium aculeatum* auct. non (L.) Sw., *Polystichum orbiculatum* auct. non (Desv.) J. Remy, *Polystichum vestitum* auct. non (G. Forst.) C. Presl
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 200 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 9524* (CONC)].

Polystichum tijucense Fée
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 1303* (PACA)].

Polystichum vestitum (G. Forst.) C. Presl = **Polystichum chilense** (H. Christ) Diels var. **chilense**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polystichum vestitum auct. non (G. Forst.) C. Presl = **Polystichum tetragonum** Fée
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Rumohra Raddi

Número de especies: 3, 2 endémicas

Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching
Sin.: *Aspidium capense* (L.) Willd., *Aspidium coriaceum* Sw., *Nephrodium duriusculum* C. Presl, *Polypodium adiantiforme* G. Forst., *Polystichum adiantiforme* (G. Forst.) J. Sm., *Polystichum coriaceum* Schott, *Rumohra aspidioides* Raddi
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Capurro, R. H., 1940[1938], 1961; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Moore, D. M., 1968; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COS, MIS, NEU, RNE, SCR, TDF); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IV, VIII, IX, X, XI, XII); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6560* (SI)]; BRA[*Labiak, P. H. 271* (UPCB)]; CHL[*Garaventa, A. 5738* (CONC)]; URY[*Alonso Paz, E. 3620* (MVFQ)].

Rumohra aspidioides Raddi = **Rumohra adiantiformis** (G. Forst.) Ching
Referencias: Capurro, R. H., 1961.

Rumohra berteroana (Colla) R. Rodr.
Sin.: *Aspidium berteroanum* Colla, *Aspidium capense* auct. non Willd., *Aspidium flexum* Kunze, *Polystichum berteroanum* (Colla) C. Chr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1972, 1995.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 200–1200 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. s.n.* (*)].

Rumohra turficola R.M. Senna
Referencias: Senna, R. M., 2005.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Senna, R. M. 918* (HAS, HBR, MBM, PACA)].

Stigmatopteris C. Chr.

Número de especies: 4

Stigmatopteris bradei Rosenst. = **Stigmatopteris brevinervis** (Fée) R.C. Moran
Referencias: Moran, R. C., 1991.

Stigmatopteris brevinervis (Fée) R.C. Moran
Sin.: *Phegopteris brevinervis* Fée, *Stigmatopteris bradei* Rosenst.
Referencias: Moran, R. C., 1991.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 725a* (BM, GH, MO)].

Stigmatopteris caudata (Raddi) C. Chr.
Sin.: *Polypodium caudatum* Raddi
Referencias: Moran, R. C., 1991.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 100–600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24739* (NY, UC)].

Stigmatopteris heterocarpa (Fée) Rosenst.
Sin.: *Phegopteris heterocarpa* Fée, *Polypodium carrii* Baker, *Stigmatopteris heterocarpa* (Fée) Rosenst. var. *basilaris* Rosenst.
Referencias: Moran, R. C., 1991; Sehnem, A., 1979a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 25939* (NY, UC, US)].

Stigmatopteris heterocarpa (Fée) Rosenst. var. *basilaris* Rosenst. = **Stigmatopteris heterocarpa** (Fée) Rosenst.
Referencias: Moran, R. C., 1991.

Stigmatopteris ulei (C. Chr.) Sehnem
Referencias: Moran, R. C., 1991; Sehnem, A., 1979a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 70p.p.* (P)].

Tectaria Cav.

Número de especies: 3

[Tectaria aequatoriensis (Hieron.) C. Chr.]
Sin.: *Aspidium aequatoriense* Hieron.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Tectaria buchtienii (Rosenst.) Maxon
Referencias: Mickel, J. T. & Smith, A. R., 2004; Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2818* (PACA)].

Tectaria incisa Cav.
Sin.: *Aspidium macrophyllum* auct. non Sw., *Aspidium martinicense* Spreng., *Tectaria martinicense* (Spreng.) Copel.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN. GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 436* (SI), *Deginani, N. B. 1144* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 9960* (CTES)]; PRY[*Jiménez, B. 1210* (BM, PY), *Schinini, A. 27995* (CTES)].

Tectaria martinicense (Spreng.) Copel. = **Tectaria incisa** Cav.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Tectaria pilosa (Fée) R.C. Moran
Sin.: *Cardiochlaena pilosa* Fée
Referencias: Moran, R. C., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 22* (UPCB)].

[Tectaria plumierii (C. Presl) Copel. var. brasiliensis Rosenst.]
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

[Tectaria trifoliata (L.) Cav.]
Sin.: *Polypodium trifoliatum* L.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Woodsia R. Br.

Número de especies: 1

Woodsia crenata (Kunze) Hieron. = **Woodsia montevidensis** (Spreng.) Hieron.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Woodsia cumingiana (Kunze) Hook. = **Woodsia montevidensis** (Spreng.) Hieron.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Woodsia incisa Gillies = **Woodsia montevidensis** (Spreng.) Hieron.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Woodsia jujuiensis Copel. = **Woodsia montevidensis** (Spreng.) Hieron.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Woodsia montevidensis (Spreng.) Hieron.
Sin.: *Cheilanthes crenata* Kunze, *Dicksonia montevidensis* Spreng., *Physematium cumingianum* Kunze, *Woodsia crenata* (Kunze) Hieron., *Woodsia cumingiana* (Kunze) Hook., *Woodsia incisa* Gillies, *Woodsia jujuiensis* Copel., *Woodsia peruviana* Hook.
Referencias: Alfonso, G. L., 1996; de la Sota, E. R., 1977; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(I); URY(CAS, CLA, LAV, MON, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 2831* (SI)]; BRA[*Jürgens, C. 355* (NY)]; CHL[*Zoellner, O. 3882* (CONC)]; URY[*Sello s.n.* (*)].

[Woodsia obtusa (Spreng.) Torr.]
Sin.: *Polypodium obtusum* Spreng.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Woodsia peruviana Hook. = **Woodsia montevidensis** (Spreng.) Hieron.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

EQUISETACEAE

Autores: de la Sota, E. R. & Ponce, M. M.
Revisor: Prado, J.

1 género, 2 especies.

Equisetum Michx. ex DC.

Número de especies: 2

Equisetum araucanum Phil. = **Equisetum giganteum** L.
Referencias: Looser, G., 1961; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Equisetum bogotense Kunth
Sin.: *Equisetum chilense* C. Presl ex Milde, *Equisetum flagelliferum* Kunze ex Milde, *Equisetum flagelliforme* Kunze, *Equisetum rinihuense* G. Kunkel, *Equisetum stipulaceum* Vaucher
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Capurro, R. H., 1940[1938]; de la Sota, E. R., 1972d, 1977; de la Sota, E. R., Ponce,

M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Hauke, R. L., 1979[1978]; Rodríguez Ríos, R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3200 m.
Países: ARG(CHU, COR, COS, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 51* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20155* (CONC, SGO)].

Equisetum chilense C. Presl ex Milde = **Equisetum bogotense** Kunth
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Equisetum flagelliferum Kunze ex Milde = **Equisetum bogotense** Kunth
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Equisetum flagelliforme Kunze = **Equisetum bogotense** Kunth
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Equisetum giganteum L.
Sin.: *Equisetum araucanum* Phil., *Equisetum giganteum* L. var. *caracasanum* (DC.) Milde, *Equisetum giganteum* L. var. *chilense* Milde, *Equisetum giganteum* L. var. *digitaliferum* Pastore, *Equisetum lechleri* Milde, *Equisetum philippi* Gand., *Equisetum poeppigianum* Mett., *Equisetum pyramidale* Goldm., *Equisetum ramosissimum* Desf. var. *affine* Milde, *Equisetum ramosissimum* Desf. var. *dolosa* Milde, *Equisetum ramosissimum* Desf. var. *scaberium* Milde, *Equisetum ramosissimum* Humb. & Bonpl. ex Willd., hom. illeg., *Equisetum scandens* J. Remy, *Equisetum schaffneri* Milde, *Equisetum tarapacanum* Phil., *Equisetum xylochaetum* Mett., *Hippochaete gigantea* (L.) Holub
Referencias: Capurro, R. H., 1969[1968]; de la Sota, E. R., 1972d, 1977; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Looser, G., 1961; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Rodríguez Ríos, R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, SCA); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME); PRY(CAA, CAN); URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 8118* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 4464* (NY)]; CHL[*Montero, G. 11714* (CONC)]; PRY[*Hassler, E. 5509* (BM)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Equisetum giganteum L. var. *caracasanum* (DC.) Milde = **Equisetum giganteum** L.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Equisetum giganteum L. var. *chilense* Milde = **Equisetum giganteum** L.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Equisetum giganteum L. var. *digitaliferum* Pastore = **Equisetum giganteum** L.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Equisetum lechleri Milde = **Equisetum giganteum** L.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Equisetum philippi Gand. = **Equisetum giganteum** L.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Equisetum poeppigianum Mett. = **Equisetum giganteum** L.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Equisetum pyramidale Goldm. = **Equisetum giganteum** L.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Equisetum ramosissimum Humb. & Bonpl. ex Willd., hom. illeg. = **Equisetum giganteum** L.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Equisetum ramosissimum Desf. var. *affine* Milde = **Equisetum giganteum** L.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Equisetum ramosissimum Desf. var. *dolosa* Milde = **Equisetum giganteum** L.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Equisetum ramosissimum Desf. var. *scaberium* Milde = **Equisetum giganteum** L.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Equisetum rinihuense G. Kunkel = **Equisetum bogotense** Kunth
Referencias: Hauke, R. L., 1979[1978]; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Equisetum scandens J. Remy = **Equisetum giganteum** L.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Equisetum schaffneri Milde = **Equisetum giganteum** L.
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1994.

Equisetum stipulaceum Vaucher = **Equisetum bogotense** Kunth
Referencias: Hauke, R. L., 1979[1978]; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Equisetum tarapacanum Phil. = **Equisetum giganteum** L.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Equisetum xylochaetum Mett. = **Equisetum giganteum** L.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hippochaete gigantea (L.) Holub = **Equisetum giganteum** L.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

GLEICHENIACEAE

Autores: Ponce, M. M., Rodríguez Ríos, R. & Gonzales, J.
Revisor: Prado, J.

3 géneros, 15 especies, 5 especies endémicas.

Dicranopteris Bernh.

Número de especies: 3

Dicranopteris bifida (Willd.) Maxon = **Sticherus bifidus** (Willd.) Ching
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Dicranopteris cryptocarpa (Hook.) Looser = **Sticherus cryptocarpus** (Hook.) Ching

[Dicranopteris dichotoma (Thunb. ex Murray) Bernh.]
Sin.: *Dicranopteris linearis* (Burm. f.) Underw., *Mertensia dichotoma* (Thunb. ex Murray) Willd., *Polypodium dichotomum* Thunb. ex Murray
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Dicranopteris discolor (Schrad.) Nakai
Sin.: *Gleichenia discolor* (Schrad.) Sehnem, *Mertensia discolor* Schrad.
Referencias: Sehnem, A., 1970b.
Hierba. Perenne. Nativa. 900–1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ferrucci, M. S. 295* (CTES)].

Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw.
Sin.: *Dicranopteris rigida* (Kunze) Nakai, *Gleichenia flexuosa* (Schrad.) Mett., *Gleichenia rigida* (Kunze) J. Bommer & H. Christ, *Mertensia flexuosa* Schrad., *Mertensia rigida* Kunze
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 2001; Sehnem, A., 1970b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 397* (SI)]; BRA[*Ule, E. H. G. 2166* (HBG)]; PRY[*Hassler, E. 4864* (BM)].

Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. = **Dicranopteris dichotoma** (Thunb. ex Murray) Bernh.

Dicranopteris nervosa (Kaulf.) Maxon
Sin.: *Gleichenia gaenslyi* Rosenst., *Gleichenia nervosa* (Kaulf.) Spreng., *Mertensia latissima* Fée, *Mertensia neglecta* Sturm, *Mertensia nervosa* Kaulf., *Sticherus gaenslyi* (Rosenst.) Nakai
Referencias: Sehnem, A., 1970b; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 17992* (HBR)].
Notas: Citado para Paraguay sin indicar material de referencia (Hassler, 1928).

Dicranopteris oligocarpa (F. Phil.) Looser = **Sticherus squamulosus** (Desv.) Nakai var. **squamulosus**

Dicranopteris pectinata (Willd.) Underw. = **Gleichenella pectinata** (Willd.) Ching
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Dicranopteris pedalis (Kaulf.) Looser = **Sticherus squamulosus** (Desv.) Nakai var. **squamulosus**

Dicranopteris pedalis (Kaulf.) Looser var. *litoralis* (F. Phil.) Looser = **Sticherus litoralis** (F. Phil.) Nakai

Dicranopteris pennigera (Mart.) Maxon = **Sticherus pruinosus** (Mart.) Ching
Referencias: Gonzales, M. J., 2003.

Dicranopteris pruinosa (Mart.) Maxon = **Sticherus pruinosus** (Mart.) Ching
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Dicranopteris pubescens (Willd.) Conz. = **Sticherus bifidus** (Willd.) Ching
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Dicranopteris quadripartita (Poir.) Looser = **Sticherus quadripartitus** (Poir.) Ching

Dicranopteris remota (Kaulf.) Maxon = **Sticherus remotus** (Kaulf.) Chrysler
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Dicranopteris rigida (Kunze) Nakai = **Dicranopteris flexuosa** (Schrad.) Underw.
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Dicranopteris squamulosa (Desv.) Looser var. *gunckeliana* Looser = **Sticherus squamulosus** (Desv.) Nakai var. **gunckelianus** (Looser) Ponce

Gleichenella Ching

Número de especies: 1

Gleichenella pectinata (Willd.) Ching
Sin.: *Dicranopteris pectinata* (Willd.) Underw., *Gleichenia pectinata* (Willd.) C. Presl, *Mertensia brasiliana* Desv., *Mertensia emarginata* Raddi, *Mertensia glaucescens* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Mertensia pectinata* Willd.
Referencias: Legrand, C. M. D. E. & Lombardo, A., 1958; Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001; Sehnem, A., 1970b.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA); URY(CLA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 794* (PACA)]; URY[*Arechavaleta, J. s.n.* (*)].

Gleichenia acutifolia Hook. = **Sticherus quadripartitus** (Poir.) Ching

Gleichenia angusta (Klotzsch) Sehnem = **Sticherus pruinosus** (Mart.) Ching
Referencias: Gonzales, M. J., 2003.

Gleichenia bibreae Mett. ex Kuhn = **Sticherus quadripartitus** (Poir.) Ching

Gleichenia bifida (Willd.) Spreng. = **Sticherus bifidus** (Willd.) Ching

Gleichenia bifida (Willd.) Spreng. var. *nigropaleacea* (Sturm) Rosenst. = **Sticherus nigropaleaceus** (Sturm) J. Prado

Gleichenia cryptocarpa Hook. = **Sticherus cryptocarpus** (Hook.) Ching

Gleichenia discolor (Schrad.) Sehnem = **Dicranopteris discolor** (Schrad.) Nakai

Gleichenia flexuosa (Schrad.) Mett. = **Dicranopteris flexuosa** (Schrad.) Underw.
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Gleichenia furcata auct. non (L.) Spring = **Sticherus bifidus** (Willd.) Ching

Gleichenia gaenslyi Rosenst. = **Dicranopteris nervosa** (Kaulf.) Maxon
Referencias: Sehnem, A., 1970b.

Gleichenia inmersa (Kaulf.) Spreng. = **Sticherus bifidus** (Willd.) Ching
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Gleichenia lanuginosa Fée = **Sticherus lanuginosus** (Fée) Nakai

Gleichenia lepidota R. Rodr. = **Sticherus lepidotus** (R. Rodr.) Ponce & R. Rodr.

Gleichenia litoralis (F. Phil.) C. Chr. = **Sticherus litoralis** (F. Phil.) Nakai

Gleichenia longipes (Fée) H. Christ = **Sticherus pruinosus** (Mart.) Ching
Referencias: Gonzales, M. J., 2003.

Gleichenia nervosa (Kaulf.) Spreng. = **Dicranopteris nervosa** (Kaulf.) Maxon

Gleichenia oligocarpa (F. Phil.) C. Chr. = **Sticherus squamulosus** (Desv.) Nakai var. **squamulosus**

Gleichenia pectinata (Willd.) C. Presl = **Gleichenella pectinata** (Willd.) Ching
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Gleichenia pedalis (Kaulf.) Spreng. = **Sticherus squamulosus** (Desv.) Nakai var. **squamulosus**

Gleichenia pennigera (Mart.) Moore = **Sticherus pruinosus** (Mart.) Ching
Referencias: Gonzales, M. J., 2003.

Gleichenia pennigera (Mart.) Moore var. *lanuginosa* (Fée) T. Moore = **Sticherus lanuginosus** (Fée) Nakai

Gleichenia pruinosa (Mart.) Mett. = **Sticherus pruinosus** (Mart.) Ching
Referencias: Gonzales, M. J., 2003.

Gleichenia pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth = **Sticherus bifidus** (Willd.) Ching
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Gleichenia quadripartita (Poir.) T. Moore = **Sticherus quadripartitus** (Poir.) Ching

Gleichenia remota (Kaulf.) Spreng. = **Sticherus remotus** (Kaulf.) Chrysler
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Gleichenia revoluta Kunth = **Sticherus revolutus** (Kunth) Ching

Gleichenia revoluta Kunth var. *angusta* (Klotzsch ex Sturm) C. Chr. = **Sticherus pruinosus** (Mart.) Ching
Referencias: Gonzales, M. J., 2003.

Gleichenia rigida (Kunze) J. Bommer & H. Christ = **Dicranopteris flexuosa** (Schrad.) Underw.
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Gleichenia squamulosa (Desv.) T. Moore = **Sticherus squamulosus** (Desv.) Nakai var. **squamulosus**

Gleichenia squamulosa (Desv.) T. Moore var. *gunckeliana* (Looser) Duek = **Sticherus squamulosus** (Desv.) Nakai var. **gunckelianus** (Looser) Ponce

Gleichenia trifurcans (Fée) C. Chr. = **Sticherus decurrens** (Raddi) J. Gonzales
Referencias: Gonzales, M. J., 2003.

Mertensia acutifolia (Hook.) J. Remy & Fée = **Sticherus quadripartitus** (Poir.) Ching

Mertensia angusta Klotzsch ex Sturm = **Sticherus pruinosus** (Mart.) Ching
Referencias: Gonzales, M. J., 2003.

Mertensia bifida Willd. = **Sticherus bifidus** (Willd.) Ching
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Mertensia brasiliana Desv. = **Gleichenella pectinata** (Willd.) Ching
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Mertensia cryptocarpa (Hook.) J. Remy = **Sticherus cryptocarpus** (Hook.) Ching

Mertensia decurrens Raddi = **Sticherus decurrens** (Raddi) J. Gonzales

Mertensia dichotoma (Thunb. ex Murray) Willd. = **Dicranopteris dichotoma** (Thunb. ex Murray) Bernh.

Mertensia discolor Schrad. = **Dicranopteris discolor** (Schrad.) Nakai

Mertensia emarginata Raddi = **Gleichenella pectinata** (Willd.) Ching
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Mertensia flexuosa Schrad. = **Dicranopteris flexuosa** (Schrad.) Underw.
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Mertensia glaucescens Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Gleichenella pectinata** (Willd.) Ching
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Mertensia inmersa Kaulf. = **Sticherus bifidus** (Willd.) Ching
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Mertensia latissima Fée = **Dicranopteris nervosa** (Kaulf.) Maxon
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Mertensia litoralis F. Phil. = **Sticherus litoralis** (F. Phil.) Nakai

Mertensia longipes Fée = **Sticherus pruinosus** (Mart.) Ching
Referencias: Gonzales, M. J., 2003.

Mertensia magellanica Desv. = **Sticherus quadripartitus** (Poir.) Ching

Mertensia neglecta Sturm = **Dicranopteris nervosa** (Kaulf.) Maxon
Referencias: Sehnem, A., 1970b.

Mertensia nervosa Kaulf. = **Dicranopteris nervosa** (Kaulf.) Maxon
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.

Mertensia nigropalacea Sturm = **Sticherus nigropaleaceus** (Sturm) J. Prado
Referencias: Prado, J. & Lellinger, D. B., 1996.

Mertensia oligocarpa F. Phil. = **Sticherus squamulosus** (Desv.) Nakai var. **squamulosus**

Mertensia pectinata Willd. = **Gleichenella pectinata** (Willd.) Ching
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Mertensia pedalis Kaulf. = **Sticherus squamulosus** (Desv.) Nakai var. **squamulosus**

Mertensia penniger Mart. = **Sticherus pruinosus** (Mart.) Ching
Referencias: Gonzales, M. J., 2003.

Mertensia pruinosa Mart. = **Sticherus pruinosus** (Mart.) Ching

Mertensia pubescens Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Sticherus bifidus** (Willd.) Ching
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Mertensia quadripartita (Poir.) Poir. = **Sticherus quadripartitus** (Poir.) Ching

Mertensia remota Kaulf. = **Sticherus remotus** (Kaulf.) Chrysler
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Mertensia revoluta (Kunth) Desv. = **Sticherus pruinosus** (Mart.) Ching
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Mertensia rigida Kunze = **Dicranopteris flexuosa** (Schrad.) Underw.
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Mertensia squamulosa Desv. = **Sticherus squamulosus** (Desv.) Nakai var. **squamulosus**

Mertensia trifurcans Fée = **Sticherus decurrens** (Raddi) J. Gonzales
Referencias: Gonzales, M. J., 2003.

Polypodium dichotomum Thunb. ex Murray = **Dicranopteris dichotoma** (Thunb. ex Murray) Bernh.

Polypodium quadripartitum Poir. = **Sticherus quadripartitus** (Poir.) Ching

Sticherus C. Presl

Número de especies: 11, 5 endémicas

Sticherus bifidus (Willd.) Ching
Sin.: *Dicranopteris bifida* (Willd.) Maxon, *Dicranopteris pubescens* (Willd.) Conz., *Gleichenia bifida* (Willd.) Spreng., *Gleichenia furcata* auct. non (L.) Spring, *Gleichenia inmersa* (Kaulf.) Spreng., *Gleichenia pubescens* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth, *Mertensia bifida* Willd., *Mertensia inmersa* Kaulf., *Mertensia pubescens* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Sticherus pubescens* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Nakai
Referencias: Herter, W. G. F., 1937; Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001; Sehnem, A., 1970b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, PAI); URY(RIV).

Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 2168* (HBG)]; PRY[*Hassler, E. 10116* (BM)]; URY[*Herter, W. G. F. 1631* (*)].

Sticherus cryptocarpus (Hook.) Ching
Sin.: *Dicranopteris cryptocarpa* (Hook.) Looser, *Gleichenia cryptocarpa* Hook., *Mertensia cryptocarpa* (Hook.) J. Remy, *Sticherus cryptocarpus* (Hook.) Ching var. *looserianus* G. Kunkel
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Looser, G., 1939, 1962; Moore, D. M., 1968; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 6083* (SI)]; CHL[*Marticorena, C. 279* (CONC)].

Sticherus cryptocarpus (Hook.) Ching var. *looserianus* G. Kunkel = **Sticherus cryptocarpus** (Hook.) Ching

Sticherus decurrens (Raddi) J. Gonzales
Sin.: *Gleichenia trifurcans* (Fée) C. Chr., *Mertensia decurrens* Raddi, *Mertensia trifurcans* Fée, *Sticherus trifurcans* (Fée) Ching
Referencias: Gonzales, M. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Haerchen, F. 61* (BM, GH, NY, S, U, US, W)].

Sticherus gaenslyi (Rosenst.) Nakai = **Dicranopteris nervosa** (Kaulf.) Maxon
Referencias: Sehnem, A., 1970b.

Sticherus lanuginosus (Fée) Nakai
Sin.: *Gleichenia lanuginosa* Fée, *Gleichenia pennigera* (Mart.) Moore var. *lanuginosa* (Fée) T. Moore
Referencias: Gonzales, M. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1700 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Conrad, J. 2074* (MO)]; PRY[*Hassler, E. 5147* (B)].

Sticherus lepidotus (R. Rodr.) R. Rodr. & Ponce
Sin.: *Gleichenia lepidota* R. Rodr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1990, 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1100 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 9508* (CONC)].

Sticherus litoralis (F. Phil.) Nakai
Sin.: *Dicranopteris pedalis* (Kaulf.) Looser var. *litoralis* (F. Phil.) Looser, *Gleichenia litoralis* (F. Phil.) C. Chr., *Mertensia litoralis* F. Phil.
Referencias: Looser, G., 1962; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1100 m.
Países: CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 74* (CONC)].

Sticherus longipes (Fée) Copel. = **Sticherus pruinosus** (Mart.) Ching
Referencias: Gonzales, M. J., 2003.

Sticherus longipinnatus (Hook.) Ching var. *nigropaleaceus* (Sturm) Nakai = **Sticherus nigropaleaceus** (Sturm) J. Prado
Referencias: Prado, J. & Lellinger, D. B., 1996.

Sticherus nigropaleaceus (Sturm) J. Prado
Sin.: *Gleichenia bifida* (Willd.) Spreng. var. *nigropaleacea* (Sturm) Rosenst., *Mertensia nigropalacea* Sturm, *Sticherus longipinnatus* (Hook.) Ching var. *nigropaleaceus* (Sturm) Nakai
Referencias: Prado, J. & Lellinger, D. B., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 203* (SP, UPCB)].

Sticherus oligocarpus (F. Phil.) Nakai = **Sticherus squamulosus** (Desv.) Nakai var. **squamulosus**

Sticherus pedalis (Kaulf.) Ching = **Sticherus squamulosus** (Desv.) Nakai var. **squamulosus**

Sticherus penniger (Mart.) Copel. = **Sticherus pruinosus** (Mart.) Ching
Referencias: Gonzales, M. J., 2003.

Sticherus pruinosus (Mart.) Ching
Sin.: *Dicranopteris pennigera* (Mart.) Maxon, *Dicranopteris pruinosa* (Mart.) Maxon, *Gleichenia angusta* (Klotzsch) Sehnem, *Gleichenia longipes* (Fée) H. Christ, *Gleichenia pennigera* (Mart.) Moore, *Gleichenia pruinosa* (Mart.) Mett., *Gleichenia revoluta* Kunth var. *angusta* (Klotzsch ex Sturm) C. Chr., *Mertensia angusta* Klotzsch ex Sturm, *Mertensia longipes* Fée, *Mertensia penniger* Mart., *Mertensia pruinosa* Mart., *Mertensia revoluta* (Kunth) Desv., *Sticherus longipes* (Fée) Copel., *Sticherus penniger* (Mart.) Copel.
Referencias: Gonzales, M. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–2500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 14374* (B, BM, S, US)].

Sticherus pubescens (Willd.) Nakai = **Sticherus bifidus** (Willd.) Ching
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001.

Sticherus quadripartitus (Poir.) Ching
Sin.: *Dicranopteris quadripartita* (Poir.) Looser, *Gleichenia acutifolia* Hook., *Gleichenia bibreae* Mett. ex Kuhn, *Gleichenia quadripartita* (Poir.) T. Moore, *Mertensia acutifolia* (Hook.) J. Remy & Fée, *Mertensia magellanica* Desv., *Mertensia quadripartita* (Poir.) Poir., *Polypodium quadripartitum* Poir., *Sticherus quadripartitus* (Poir.) Ching f. *bipartitus* G. Kunkel, *Sticherus quadripartitus* (Poir.) Ching f. *simplex* G. Kunkel
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE, TDF); CHL(VIII, IX, X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 5542* (SI)]; CHL[*Marticorena, C. 310* (CONC)].

Sticherus quadripartitus (Poir.) Ching f. *bipartitus* G. Kunkel = **Sticherus quadripartitus** (Poir.) Ching

Sticherus quadripartitus (Poir.) Ching f. *simplex* G. Kunkel = **Sticherus quadripartitus** (Poir.) Ching

Sticherus remotus (Kaulf.) Chrysler
Sin.: *Dicranopteris remota* (Kaulf.) Maxon, *Gleichenia remota* (Kaulf.) Spreng., *Mertensia remota* Kaulf.
Referencias: Østergaard Andersen, E. & Øllgaard, B., 2001; Sehnem, A., 1970b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 3120* (PACA)].

[Sticherus revolutus (Kunth) Ching]
Sin.: *Gleichenia revoluta* Kunth
Referencias: Gonzales, M. J., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Sticherus squamulosus (Desv.) Nakai var. *glaber* (T. Moore) Nakai = **Sticherus squamulosus** (Desv.) Nakai var. **squamulosus**

Sticherus squamulosus (Desv.) Nakai var. **gunckelianus** (Looser) R. Rodr. & Ponce
Sin.: *Dicranopteris squamulosa* (Desv.) Looser var. *gunckeliana* Looser, *Gleichenia squamulosa* (Desv.) T. Moore var. *gunckeliana* (Looser) Duek
Referencias: Looser, G., 1962; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Enredadera o liana. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 7928* (CONC)].

Sticherus squamulosus (Desv.) Nakai var. **squamulosus**
Sin.: *Dicranopteris oligocarpa* (F. Phil.) Looser, *Dicranopteris pedalis* (Kaulf.) Looser, *Gleichenia oligocarpa* (F. Phil.) C. Chr., *Gleichenia pedalis* (Kaulf.) Spreng., *Gleichenia squamulosa* (Desv.) T. Moore, *Mertensia oligocarpa* F. Phil., *Mertensia pedalis* Kaulf., *Mertensia squamulosa* Desv., *Sticherus oligocarpus* (F. Phil.) Nakai, *Sticherus pedalis* (Kaulf.) Ching, *Sticherus squamulosus* (Desv.) Nakai var. *glaber* (T. Moore) Nakai
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Looser, G., 1962; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: CHL(VIII, IX, X, XI, IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1038* (CONC)].

Sticherus trifurcans (Fée) Ching = **Sticherus decurrens** (Raddi) J. Gonzales
Referencias: Gonzales, M. J., 2003.

GRAMMITIDACEAE

Autores: Labiak, P. H., de la Sota, E. R. & Ponce, M. M.
Revisor: Smith, A. R.

8 géneros, 24 especies.

Acrostichum serrulatum Sw. = **Cochlidium serrulatum** (Sw.) L.E. Bishop
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998.

Asplenium serrulatum (Sw.) Sw. = **Cochlidium serrulatum** (Sw.) L.E. Bishop
Referencias: Bishop, L. E., 1978.

Ceradenia L.E. Bishop

Número de especies: 2

Ceradenia albidula (Baker) L.E. Bishop
Sin.: *Ctenopteris albidula* (Baker) Copel., *Polypodium albidulum* Baker, *Polypodium subinaequale* H. Christ
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2003.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16238* (MBM, PACA)].

Ceradenia spixiana (Mart. ex Mett.) L.E. Bishop
Sin.: *Grammitis transiens* (Lindm.) F. Seym., *Polypodium longipes* Fée, nom. illeg., *Polypodium radicale* Moritzi ex Baker, *Polypodium spixianum* Mart. ex Mett., *Polypodium transiens* Lindm.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998, 2003.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 266* (MBM, SP, UPCB)].

Cochlidium Kaulf.

Número de especies: 2

Cochlidium paucinervatum (Fée) C. Chr. = **Cochlidium punctatum** (Raddi) L.E. Bishop
Referencias: Bishop, L. E., 1978.

Cochlidium punctatum (Raddi) L.E. Bishop
Sin.: *Cochlidium paucinervatum* (Fée) C. Chr., *Grammitis paucinervata* Fée, *Grammitis punctata* Raddi, *Monogramma rudolfii* Rosenst., *Polypodium paucinervatum* (Fée) C. Chr., *Polypodium punctatum* (Raddi) Hook.
Referencias: Bishop, L. E., 1978; Labiak, P. H. & Prado, J., 1998, 2003; Sehnem, A., 1970a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 275* (UPCB)].

Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E. Bishop
Sin.: *Acrostichum serrulatum* Sw., *Asplenium serrulatum* (Sw.) Sw., *Grammitis serrulata* (Sw.) Sw., *Gymnopteris serrulata* (Sw.) Bernh., *Polypodium duale* Maxon, nom.

superfl., *Polypodium serrulatum* (Sw.) Mett., nom. illeg., *Xiphopteris auyantepuiensis* Vareschi, *Xiphopteris extensa* Fée, *Xiphopteris serrulata* (Sw.) Kaulf.
Referencias: Bishop, L. E., 1978; Labiak, P. H. & Prado, J., 1998, 2003.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 121* (SP, UPCB)].

Ctenopteris achilleifolium (Kaulf.) J. Sm. = **Terpsichore achilleifolia** (Kaulf.) A.R. Sm.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005c; Smith, A. R., 1993.

Ctenopteris albidula (Baker) Copel. = **Ceradenia albidula** (Baker) L.E. Bishop
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2003.

Ctenopteris apiculata (Kunze ex Klotzsch) Copel. = **Lellingeria apiculata** (Kunze ex Klotzsch) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005a; Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Ctenopteris brevistipes (Mett. ex Kuhn) Copel. = **Lellingeria brevistipes** (Mett. ex Kuhn) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005a; Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Ctenopteris chrysleri Copel. = **Terpsichore chrysleri** (Copel.) A.R. Sm.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005c.

Ctenopteris ciliaris (Fée) Copel. = **Terpsichore reclinata** (Brack.) Labiak
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005c.

Ctenopteris gradata (Baker) Copel. = **Terpsichore gradata** (Baker) A.R. Sm.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005c; Smith, A. R., 1993.

Ctenopteris itatimense (C. Chr.) Copel. = **Lellingeria itatimensis** (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005a; Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Ctenopteris moniliformis (Lag. ex Sw.) J. Sm. = **Melpomene moniliformis** (Lag. ex Sw.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005b; Smith, A. R. & Moran, R. C., 1992.

Ctenopteris peruviana (Desv.) J. Sm. = **Melpomene peruviana** (Desv.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: de la Sota, E. R., Cassá de Pazos, L. & Ponce, M. M., 2000; Labiak, P. H. & Prado, J., 2005b; Smith, A. R. & Moran, R. C., 1992.

Ctenopteris pilosissima (M. Martens & Galeotti) Copel. = **Melpomene pilosissima** (M. Martens & Galeotti) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005b; Smith, A. R. & Moran, R. C., 1992.

Ctenopteris reclinata (Brack.) Copel. = **Terpsichore reclinata** (Brack.) Labiak
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005c.

Ctenopteris schwackei (H. Christ) Copel. = **Terpsichore gradata** (Baker) A.R. Sm.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005c; Smith, A. R., 1993.

Ctenopteris subcrassa Copel. = **Zygophlebia longipilosa** (C. Chr.) L.E. Bishop
Referencias: Bishop, L. E., 1989; Labiak, P. H. & Prado, J., 2005c.

Ctenopteris taxifolia (L.) Copel. = **Terpsichore taxifolia** (L.) A.R. Sm.

Ctenopteris tenuicola (Fée) Copel. = **Lellingeria tenuicula** (Fée) A.R. Sm. & R.C. Moran

Ctenopteris tungurahuae (Rosenst.) Copel. = **Lellingeria tungurahuae** (Rosenst.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: de la Sota, E. R., Cassá de Pazos, L. & Ponce, M. M., 2000.

Grammitis Sw.

Número de especies: 4

Grammitis achilleifolia (Kaulf.) R.M. Tryon = **Terpsichore achilleifolia** (Kaulf.) A.R. Sm.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005c; Smith, A. R., 1993.

Grammitis apiculata (Kunze ex Klotzsch) F. Seym. = **Lellingeria apiculata** (Kunze ex Klotzsch) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005a; Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Grammitis araucana Phil., p.p. = **Grammitis magellanica** Desv.
Referencias: Parris, B. S. & Given, D. R., 1976.

Grammitis armstrongii Tindale = **Grammitis poeppigiana** (Mett.) Pic. Serm.
Referencias: Pichi Sermolli, R. E. G. & Bizarri, M. P., 1978.

Grammitis australis R. Br. var. *nana* (Brack.) Franch. = **Grammitis poeppigiana** (Mett.) Pic. Serm.
Referencias: Dudley, T. R., 1981; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Grammitis billardieri Willd. f. *nana* (Brack.) de la Sota = **Grammitis poeppigiana** (Mett.) Pic. Serm.
Referencias: Dudley, T. R., 1981; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Grammitis billardieri Willd. var. *magellanica* (Desv.) de la Sota = **Grammitis magellanica** Desv.
Referencias: Parris, B. S. & Given, D. R., 1976; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Grammitis chrysleri (Copel.) Proctor = **Terpsichore chrysleri** (Copel.) A.R. Sm.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005c.

Grammitis ciliata auct. non Colenso = **Grammitis patagonica** (C. Chr.) Parris
Referencias: Parris, B. S. & Given, D. R., 1976; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Grammitis fluminensis Fée
Sin.: *Grammitis marginella* (Sw.) Sw. var. *castellensis* Brade, *Polypodium marginellum* Bory ex Willd. var. *brasiliense* Rosenst.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2003.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Schmalz, A. 163* (B, NY)].

Grammitis gradata (Baker) R.M. Tryon & A.F. Tryon = **Terpsichore gradata** (Baker) A.R. Sm.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005c; Smith, A. R., 1993.

Grammitis kerguelensis Tardieu = **Grammitis poeppigiana** (Mett.) Pic. Serm.
Referencias: Parris, B. S., 1981.

Grammitis magellanica Desv.
Sin.: *Grammitis araucana* Phil., p.p. , *Grammitis billardieri* Willd. var. *magellanica* (Desv.) de la Sota, *Polypodium gramineum* Poir., hom. illeg., *Polypodium magellanicum* (Desv.) Copel., comb. superfl., *Polypodium magellanicum* (Desv.) J.W. Sturm
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; de la Sota, E. R., 1960; de la Sota, E. R., Cassá de Pazos, L. & Ponce, M. M., 2000; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998Dudley, T. R., 1981; Parris, B. S. & Given, D. R., 1976; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII, IX, X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 473* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 7218* (CONC)].

Grammitis magellanica Desv. f. *nana* (Brack.) de la Sota ex T.R. Dudley = **Grammitis poeppigiana** (Mett.) Pic. Serm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Grammitis marginella (Sw.) Sw. var. *castellensis* Brade = **Grammitis fluminensis** Fée
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2003.

Grammitis melanosticta (Kunze) F. Seym. = **Melpomene melanosticta** (Kunze) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005b.

Grammitis moniliformis (Lag. ex Sw.) Proctor = **Melpomene moniliformis** (Lag. ex Sw.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005b; Smith, A. R. & Moran, R. C., 1992.

Grammitis nana Brack., hom. illeg. = **Grammitis poeppigiana** (Mett.) Pic. Serm.

Grammitis organensis auct. non Gardner = **Lellingeria organensis** (Gardner) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005a.

Grammitis organensis Gardner = **Lellingeria organensis** (Gardner) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005a; Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Grammitis patagonica (C. Chr.) Parris
Sin.: *Grammitis ciliata* auct. non Colenso, *Grammitis repanda* Kunze ex Mett., *Polypodium patagonicum* C. Chr.
Referencias: de la Sota, E. R., Cassá de Pazos, L. & Ponce, M. M., 2000; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(CHU, SCR); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 1316a* (LIL)]; CHL[*Dusén, P. K. H. s.n.* (S)].

Grammitis paucinervata Fée = **Cochlidium punctatum** (Raddi) L.E. Bishop
Referencias: Bishop, L. E., 1978; Labiak, P. H. & Prado, J., 2003.

Grammitis peruviana (Desv.) C.V. Morton = **Melpomene peruviana** (Desv.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: de la Sota, E. R., Cassá de Pazos, L. & Ponce, M. M., 2000; Labiak, P. H. & Prado, J., 2005b; Smith, A. R. & Moran, R. C., 1992.

Grammitis pilosissima (M. Martens & Galeotti) C.V. Morton = **Melpomene pilosissima** (M. Martens & Galeotti) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005b; Smith, A. R. & Moran, R. C., 1992.

Grammitis poeppigiana (Mett.) Pic. Serm.
Sin.: *Grammitis armstrongii* Tindale, *Grammitis australis* R. Br. var. *nana* (Brack.) Franch., *Grammitis billardieri* Willd. f. *nana* (Brack.) de la Sota, *Grammitis kerguelensis* Tardieu, *Grammitis magellanica* Desv. f. *nana* (Brack.) de la Sota ex T.R. Dudley, *Grammitis nana* Brack., hom. illeg., *Polypodium australe* (R. Br.) Mett. f. *nanum* (Franch.) Macloskie, *Polypodium australe* Mett. var. *nanum* Brack. ex Macloskie, *Polypodium billardieri* (Willd.) C. Chr. f. *nanum* (Brack.) Franch. ex Skottsb., *Polypodium billardieri* (Willd.) C. Chr. var. *magellanicum* (Desv.) C. Chr., *Polypodium poeppigianum* Mett.
Referencias: de la Sota, E. R., 1966; de la Sota, E. R., Cassá de Pazos, L. & Ponce, M. M., 2000; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos,

L., 1998; Dudley, T. R., 1981; Pichi Sermolli, R. E. G. & Bizarri, M. P., 1978; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*James, P. 1499* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 12354* (CONC)].
Notas: Distribución circumantártica.

Grammitis punctata Raddi = **Cochlidium punctatum** (Raddi) L.E. Bishop
Referencias: Bishop, L. E., 1978.

Grammitis reitzii (Alston) Brade = **Lellingeria organensis** (Gardner) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005a.

Grammitis repanda Kunze ex Mett. = **Grammitis patagonica** (C. Chr.) Parris
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Grammitis schenckii (Hieron.) Brade = **Lellingeria schenckii** (Hieron.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005a; Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Grammitis serrulata (Sw.) Sw. = **Cochlidium serrulatum** (Sw.) L.E. Bishop
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2003.

Grammitis setosa (Kaulf.) Blume = **Micropolypodium setosum** (Kaulf.) A.R. Sm.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005b; Smith, A. R., 1992.

Grammitis subcrassa (Copel.) C.V. Morton = **Zygophlebia longipilosa** (C. Chr.) L.E. Bishop
Referencias: Bishop, L. E., 1989; Labiak, P. H. & Prado, J., 2005c.

Grammitis taxifolia (L.) Proctor = **Terpsichore taxifolia** (L.) A.R. Sm.

Grammitis tenuicula (Fée) Proctor = **Lellingeria tenuicula** (Fée) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Grammitis transiens (Lindm.) F. Seym. = **Ceradenia spixiana** (Mart. ex Mett.) L.E. Bishop
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2003.

[Grammitis trifurcata (L.) Copel.]
Sin.: *Polypodium trifurcatum* L.
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Grammitis tungurahuae (Rosenst.) C.V. Morton = **Lellingeria tungurahuae** (Rosenst.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: de la Sota, E. R., Cassá de Pazos, L. & Ponce, M. M., 2000.

Grammitis wittigiana Fée = **Lellingeria wittigiana** (Fée) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Gymnopteris serrulata (Sw.) Bernh. = **Cochlidium serrulatum** (Sw.) L.E. Bishop

Lellingeria A.R. Sm. & R.C. Moran

Número de especies: 7

Lellingeria apiculata (Kunze ex Klotzsch) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenopteris apiculata* (Kunze ex Klotzsch) Copel., *Grammitis apiculata* (Kunze ex Klotzsch) F. Seym., *Polypodium apiculatum* Kunze ex Klotzsch, *Polypodium pecten* Fée, *Xiphopteris apiculata* (Kunze ex Klotzsch) Copel.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005a; Sehnem, A., 1970a; Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 800–1100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15277* (PACA)].

Lellingeria brevistipes (Mett. ex Kuhn) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenopteris brevistipes* (Mett. ex Kuhn) Copel., *Polypodium brevistipes* Mett. ex Kuhn, *Polypodium brevistipes* Mett. ex Kuhn var. *sebastianopolitanum* Baker, *Polypodium brevistipes* Mett. ex Kuhn var. *subintegrum* Rosenst.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005a; Sehnem, A., 1970a; Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 400–1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. 1140* (PACA)].

Lellingeria depressa (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Polypodium depressum* C. Chr., *Polypodium immersum* Fée
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005a; Sehnem, A., 1970a; Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19763* (PACA)].

Lellingeria itatimensis (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenopteris itatimense* (C. Chr.) Copel., *Polypodium itatimense* C. Chr., *Polypodium saxicola* Rosenst.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005a; Sehnem, A., 1970a; Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 800–1200 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 7300* (PACA)].

Lellingeria organensis (Gardner) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Grammitis organensis* auct. non Gardner, *Grammitis organensis* Gardner, *Grammitis reitzii* (Alston) Brade, *Polypodium organense* (Gardner) Mett., *Xiphopteris organensis* (Gardner) Copel., *Xiphopteris reitzii* Alston
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005a; Sehnem, A., 1970a; Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 400–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2411* (HBR)].

Lellingeria schenckii (Hieron.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Grammitis schenckii* (Hieron.) Brade, *Polypodium schenckii* Hieron., *Xiphopteris schenckii* (Hieron.) Copel.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998, 2005a; Sehnem, A., 1970a; Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 400–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 272* (MBM, UPCB)].

[Lellingeria tenuicula (Fée) A.R. Sm. & R.C. Moran]
Sin.: *Ctenopteris tenuicola* (Fée) Copel, *Grammitis tenuicola* (Fée) Proctor
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005a; Sehnem, A., 1970a.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Lellingeria tungurahuae (Rosenst.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenopteris tungurahuae* (Rosenst.) Copel., *Grammitis tungurahuae* (Rosenst.) C.V. Morton, *Polypodium tungurahuae* Rosenst.
Referencias: de la Sota, E. R., Cassá de Pazos, L. & Ponce, M. M., 2000.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 600–700 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cassá de Pazos, L. 281* (LP, MCNS), *Zuloaga, F. O. 7811* (SI)].

[Lellingeria wittigiana (Fée) A.R. Sm. & R.C. Moran]
Sin.: *Grammitis wittigiana* Fée, *Polypodium wittigianum* (Fée) H. Christ, *Xiphopteris wittigiana* (Fée) Brade
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005a; Sehnem, A., 1970a.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Melpomene A.R. Sm. & R.C. Moran

Número de especies: 3

Melpomene melanosticta (Kunze) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Grammitis melanosticta* (Kunze) F. Seym., *Polypodium calvum* Maxon, *Polypodium melanostictum* Kunze
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005b; Sehnem, A., 1970a; Smith, A. R. & Moran, R. C., 1992.
Hierba rupícola. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15126* (MBM)].

[Melpomene moniliformis (Lag. ex Sw.) A.R. Sm. & R.C. Moran]
Sin.: *Ctenopteris moniliformis* (Lag. ex Sw.) J. Sm., *Grammitis moniliformis* (Lag. ex Sw.) Proctor, *Polypodium moniliforme* Lag. ex Sw., *Xiphopteris moniliformis* (Lag. ex Sw.) Crabbe
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005b; Sehnem, A., 1970a.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Melpomene peruviana (Desv.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenopteris peruviana* (Desv.) J. Sm., *Grammitis peruviana* (Desv.) C.V. Morton, *Polypodium moniliforme* Lag. ex Sw. var. *anfractuosum* auct. non Mett., *Polypodium peruvianum* Desv., *Polypodium stipitatum* Hook. & Grev.
Referencias: de la Sota, E. R., 1960, 1977; de la Sota, E. R., Cassá de Pazos, L. & Ponce, M. M., 2000; Smith, A. R. & Moran, R. C., 1992.
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 500–3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4675* (SI)].

Melpomene pilosissima (M. Martens & Galeotti) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenopteris pilosissima* (M. Martens & Galeotti) Copel., *Grammitis pilosissima* (M. Martens & Galeotti) C.V. Morton, *Polypodium acrodontium* Fée, *Polypodium pilosissimum* M. Martens & Galeotti
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005b; Sehnem, A., 1970a; Smith, A. R. & Moran, R. C., 1992.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 873* (PACA)].

Micropolypodium Hayata

Número de especies: 1

[Micropolypodium perpusillum (Maxon) A.R. Sm.]
Sin.: *Polypodium perpusillum* Maxon
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005b; Sehnem, A., 1970a.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Micropolypodium setosum (Kaulf.) A.R. Sm.
Sin.: *Grammitis setosa* (Kaulf.) Blume, *Polypodium micropteris* C. Chr., *Xiphopteris setosa* Kaulf.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005b; Sehnem, A., 1970a; Smith, A. R., 1992.
Hierba rupícola. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13441* (MBM, PACA)].

Monogramma rudolfii Rosenst. = **Cochlidium punctatum** (Raddi) L.E. Bishop
Referencias: Bishop, L. E., 1978; Labiak, P. H. & Prado, J., 2003.

Polypodium achilleifolium Kaulf. = **Terpsichore achilleifolia** (Kaulf.) A.R. Sm.
Referencias: Smith, A. R., 1993.

Polypodium acrodontium Fée = **Melpomene pilosissima** (M. Martens & Galeotti) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R. & Moran, R. C., 1992.

Polypodium albidulum Baker = **Ceradenia albidula** (Baker) L.E. Bishop
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2003.

Polypodium apiculatum Kunze ex Klotzsch = **Lellingeria apiculata** (Kunze ex Klotzsch) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Polypodium australe (R. Br.) Mett. f. *nanum* (Franch.) Macloskie = **Grammitis poeppigiana** (Mett.) Pic. Serm.

Polypodium australe (R. Br.) Mett. var. *nanum* Brack. ex Macloskie = **Grammitis poeppigiana** (Mett.) Pic. Serm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium billardieri (Willd.) C. Chr. f. *nanum* (Brack.) Franch. ex Skottsb. = **Grammitis poeppigiana** (Mett.) Pic. Serm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium billardieri (Willd.) C. Chr. var. *magellanicum* (Desv.) C. Chr. = **Grammitis poeppigiana** (Mett.) Pic. Serm.
Referencias: Parris, B. S. & Given, D. R., 1976; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium brevistipes Mett. ex Kuhn = **Lellingeria brevistipes** (Mett. ex Kuhn) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Polypodium brevistipes Mett. ex Kuhn var. *sebastianopolitanum* Baker = **Lellingeria brevistipes** (Mett. ex Kuhn) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Polypodium brevistipes Mett. ex Kuhn var. *subintegrum* Rosenst. = **Lellingeria brevistipes** (Mett. ex Kuhn) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Polypodium calvum Maxon = **Melpomene melanosticta** (Kunze) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005b.

Polypodium confluens Fée = **Terpsichore chrysleri** (Copel.) A.R. Sm.

Polypodium depressum C. Chr. = **Lellingeria depressa** (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Polypodium duale Maxon, nom. superfl. = **Cochlidium serrulatum** (Sw.) L.E. Bishop

Polypodium gradatum Baker = **Terpsichore gradata** (Baker) A.R. Sm.
Referencias: Smith, A. R., 1993.

Polypodium gramineum Poir., hom. illeg. = **Grammitis magellanica** Desv.
Referencias: Parris, B. S. & Given, D. R., 1976; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium immersum Fée = **Lellingeria depressa** (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Polypodium itatimense C. Chr. = **Lellingeria itatimensis** (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

[Polypodium l'herminieri Fée]
Referencias: de la Sota, E. R., 1960; Hicken, C. M., 1909.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Polypodium longepilosum C. Chr. = **Zygophlebia longipilosa** (C. Chr.) L.E. Bishop
Referencias: Bishop, L. E., 1989.

Polypodium longipes Fée, nom. illeg. = **Ceradenia spixiana** (Mart. ex Mett.) L.E. Bishop
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2003.

Polypodium magellanicum (Desv.) Copel., comb. superfl. = **Grammitis magellanica** Desv.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium magellanicum (Desv.) J.W. Sturm = **Grammitis magellanica** Desv.
Referencias: Parris, B. S. & Given, D. R., 1976; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium marginellum Bory ex Willd. var. *brasiliense* Rosenst. = **Grammitis fluminensis** Fée
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2003.

Polypodium melanostictum Kunze = **Melpomene melanosticta** (Kunze) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005b; Smith, A. R. & Moran, R. C., 1992.

Polypodium micropteris C. Chr. = **Micropolypodium setosum** (Kaulf.) A.R. Sm.
Referencias: Smith, A. R., 1992.

Polypodium moniliforme Lag. ex Sw. = **Melpomene moniliformis** (Lag. ex Sw.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005b; Smith, A. R. & Moran, R. C., 1992.

Polypodium moniliforme Lag. ex Sw. var. *anfractuosum* auct. non Mett. = **Melpomene peruviana** (Desv.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.

Polypodium organense (Gardner) Mett. = **Lellingeria organensis** (Gardner) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Polypodium patagonicum C. Chr. = **Grammitis patagonica** (C. Chr.) Parris
Referencias: de la Sota, E. R., Cassá de Pazos, L. & Ponce, M. M., 2000; Parris, B. S. & Given, D. R., 1976; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium paucinervatum (Fée) C. Chr. = **Cochlidium punctatum** (Raddi) L.E. Bishop
Referencias: Bishop, L. E., 1978.

Polypodium pecten Fée = **Lellingeria apiculata** (Kunze ex Klotzsch) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Polypodium perpusillum Maxon = **Micropolypodium perpusillum** (Maxon) A.R. Sm.

Polypodium peruvianum Desv. = **Melpomene peruviana** (Desv.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: de la Sota, E. R., Cassá de Pazos, L. & Ponce, M. M., 2000; Smith, A. R. & Moran, R. C., 1992.

Polypodium pilosissimum M. Martens & Galeotti = **Melpomene pilosissima** (M. Martens & Galeotti) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R. & Moran, R. C., 1992.

Polypodium poeppigianum Mett. = **Grammitis poeppigiana** (Mett.) Pic. Serm.
Referencias: de la Sota, E. R., Cassá de Pazos, L. & Ponce, M. M., 2000; Pichi Sermolli, R. E. G. & Bizarri, M. P., 1978; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium punctatum (Raddi) Hook. = **Cochlidium punctatum** (Raddi) L.E. Bishop
Referencias: Bishop, L. E., 1978.

Polypodium radicale Moritzi ex Baker = **Ceradenia spixiana** (Mart. ex Mett.) L.E. Bishop
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2003.

Polypodium reclinatum Brack. = **Terpsichore reclinata** (Brack.) Labiak

Polypodium repandum Fée = **Terpsichore chrysleri** (Copel.) A.R. Sm.

Polypodium saxicola Rosenst. = **Lellingeria itatimensis** (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Polypodium schenckii Hieron. = **Lellingeria schenckii** (Hieron.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Polypodium schwackei H. Christ = **Terpsichore gradata** (Baker) A.R. Sm.
Referencias: Smith, A. R., 1993.

Polypodium serrulatum (Sw.) Mett., nom. illeg. = **Cochlidium serrulatum** (Sw.) L.E. Bishop

Polypodium spixianum Mart. ex Mett. = **Ceradenia spixiana** (Mart. ex Mett.) L.E. Bishop

Polypodium stipitatum Hook. & Grev. = **Melpomene peruviana** (Desv.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: de la Sota, E. R., Cassá de Pazos, L. & Ponce, M. M., 2000.

Polypodium subinaequale H. Christ = **Ceradenia albidula** (Baker) L.E. Bishop
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2003.

Polypodium taxifolium L. = **Terpsichore taxifolia** (L.) A.R. Sm.

Polypodium transiens Lindm. = **Ceradenia spixiana** (Mart. ex Mett.) L.E. Bishop

Polypodium trifurcatum L. = **Grammitis trifurcata** (L.) Copel.

Polypodium tungurahuae Rosenst. = **Lellingeria tungurahuae** (Rosenst.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: de la Sota, E. R., Cassá de Pazos, L. & Ponce, M. M., 2000.

Polypodium wittigianum (Fée) H. Christ = **Lellingeria wittigiana** (Fée) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Terpsichore A.R. Sm.

Número de especies: 4

Terpsichore achilleifolia (Kaulf.) A.R. Sm.
Sin.: *Ctenopteris achilleifolium* (Kaulf.) J. Sm., *Grammitis achilleifolia* (Kaulf.) R.M. Tryon, *Polypodium achilleifolium* Kaulf.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005c; Sehnem, A., 1970a; Smith, A. R., 1993.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Klein, R. M. 9133* (HBR)]; BRA[*Reitz, P. R. 1917a* (HBR)].

Terpsichore chrysleri (Copel.) A.R. Sm.
Sin.: *Ctenopteris chrysleri* Copel., *Grammitis chrysleri* (Copel.) Proctor, *Polypodium confluens* Fée, *Polypodium repandum* Fée

Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005c; Sehnem, A., 1970a; Smith, A. R., 1993.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 700–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dittrich, V. A. 713* (MBM)].

[Terpsichore cultrata (Bory ex Willd.) A.R. Sm.]
Referencias: Sehnem, A., 1970a.
Notas: Especie excluida del área del proyecto, ocurre en el norte de América del Sur. El material citado bajo este nombre corresponde a *Terpsichore reclinata* (Brack.) Labiak.

Terpsichore gradata (Baker) A.R. Sm.
Sin.: *Ctenopteris gradata* (Baker) Copel., *Ctenopteris schwackei* (H. Christ) Copel., *Grammitis gradata* (Baker) R.M. Tryon & A.F. Tryon, *Polypodium gradatum* Baker, *Polypodium schwackei* H. Christ
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005c; Sehnem, A., 1970a; Smith, A. R., 1993.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 700–1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 25384* (NY)].

Terpsichore reclinata (Brack.) Labiak
Sin.: *Ctenopteris ciliaris* (Fée) Copel., *Ctenopteris reclinata* (Brack.) Copel., *Polypodium reclinatum* Brack.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005c; Sehnem, A., 1970a; Smith, A. R., 1993.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 318* (MBM)].

[Terpsichore taxifolia (L.) A.R. Sm.]
Sin.: *Ctenopteris taxifolia* (L.) Copel., *Grammitis taxifolia* (L.) Proctor, *Polypodium taxifolium* L.
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Xiphopteris apiculata (Kunze ex Klotzsch) Copel. = **Lellingeria apiculata** (Kunze ex Klotzsch) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Xiphopteris auyantepuiensis Vareschi = **Cochlidium serrulatum** (Sw.) L.E. Bishop
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2003.

Xiphopteris extensa Fée = **Cochlidium serrulatum** (Sw.) L.E. Bishop
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2003.

Xiphopteris moniliformis (Lag. ex Sw.) Crabbe = **Melpomene moniliformis** (Lag. ex Sw.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005b; Smith, A. R. & Moran, R. C., 1992.

Xiphopteris organensis (Gardner) Copel. = **Lellingeria organensis** (Gardner) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005a; Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Xiphopteris reitzii Alston = **Lellingeria organensis** (Gardner) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005a.

Xiphopteris schenckii (Hieron.) Copel. = **Lellingeria schenckii** (Hieron.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005a; Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Xiphopteris serrulata (Sw.) Kaulf. = **Cochlidium serrulatum** (Sw.) L.E. Bishop
Referencias: Bishop, L. E., 1978; Labiak, P. H. & Prado, J., 2003.

Xiphopteris setosa Kaulf. = **Micropolypodium setosum** (Kaulf.) A.R. Sm.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 2005b; Smith, A. R., 1992.

Xiphopteris wittigiana (Fée) Brade = **Lellingeria wittigiana** (Fée) A.R. Sm. & R.C. Moran
Referencias: Smith, A. R., Moran, R. C. & Bishop, L. E., 1991.

Zygophlebia L.E. Bishop
Número de especies: 1

Zygophlebia longipilosa (C. Chr.) L.E. Bishop
Sin.: *Ctenopteris subcrassa* Copel., *Grammitis subcrassa* (Copel.) C.V. Morton, *Polypodium longepilosum* C. Chr.
Referencias: Bishop, L. E., 1989; Labiak, P. H. & Prado, J., 2005c; Sehnem, A., 1970a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 700–1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 662* (SP)].

HYMENOPHYLLACEAE

Autores: Ponce, M. M. & de la Sota, E. R.
Revisor: Prado, J.

4 géneros, 66 especies, 23 especies endémicas.

Davallíopsis elegans (Rich.) Copel. = **Trichomanes elegans** Rich.

Didymoglossum angustifrons Fée = **Trichomanes angustifrons** (Fée) Wess. Boer

Didymoglossum hymenoides (Hedw.) Desv. = **Trichomanes hymenoides** Hedw.
Referencias: Capurro, R. H., 1970.

Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) C. Presl = **Trichomanes krausii** Hook. & Grev.
Referencias: Capurro, R. H., 1970.

Didymoglossum magellanicum Desv. = **Hymenophyllum seselifolium** C. Presl
Referencias: Duek, J. J. & Rodríguez Ríos, R., 1972; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Didymoglossum mosenii (Lindm.) Copel. = **Trichomanes mosenii** Lindm.

Didymoglossum reptans (Sw.) C. Presl = **Trichomanes reptans** Sw.
Referencias: Capurro, R. H., 1970.

Didymoglossum sociale Fée = **Trichomanes hymenoides** Hedw.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Hymenoglossum C. Presl

Número de especies: 1 endémica

Hymenoglossum cruentum (Cav.) C. Presl
Sin.: *Hymenophyllum cruentum* Cav.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Rodríguez Ríos, R., 1995; Vidoz, F. F., Cassá de Pazos, L. & de la Sota, E. R., 1999[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(CHU); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vidoz, F. F. 136* (BACP)]; CHL[*Ricardi, M. 4116* (CONC)].

Hymenophyllum Sm.

Número de especies: 39, 18 endémicas

Hymenophyllum abruptum auct. non Hook. = **Hymenophyllum darwinii** Hook. f. ex Bosch
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959.

Hymenophyllum abruptum Hook. var. *brevifrons* (Kunze) Franch. = **Hymenophyllum darwinii** Hook. f. ex Bosch
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum antarcticum C. Presl = **Hymenophyllum tunbrigense** (L.) Sm. var. **tunbrigense**
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum asplenioides (Sw.) Sw.
Sin.: *Mecodium asplenioides* (Sw.) Copel., *Trichomanes asplenioides* Sw.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Sehnem, A., 1971.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 255* (MBM, UPCB)].

Hymenophyllum attenuatum Hook. = **Hymenophyllum seselifolium** C. Presl
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum berteroi Hook. = **Hymenophyllum ferrugineum** Colla
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum bibraianum J.W. Sturm = **Hymenophyllum seselifolium** C. Presl
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum brasilianum (Fée) Rosenst.
Sin.: *Hymenophyllum crispum* Kunth var. *brasilianum* Fée
Referencias: Sehnem, A., 1971.
Hierba. Perenne. Nativa. 600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 670* (ICN)].

Hymenophyllum bridgesii Hook. = **Hymenophyllum dentatum** Cav.
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum caespitosum auct. non Gaudich. = **Hymenophyllum falklandicum** Baker
Referencias: Moore, D. M., 1983; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum caespitosum Gaudich. = **Serpyllopsis caespitosa** (Gaudich.) C. Chr. var. **caespitosa**

Hymenophyllum capurroi de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Capurro, R. H. 105* (LIL, LP)].

Hymenophyllum caudatum Bosch = **Hymenophyllum caudiculatum** Mart. var. **productum** (C. Presl) C. Chr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum caudiculatum Mart. var. **caudiculatum**
Sin.: *Hymenophyllum martii* Sturm
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Sehnem, A., 1971.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 7899* (HBR)]; PRY[*Sparre, B. B. 336* (BM)].

Hymenophyllum caudiculatum Mart. var. **productum** (C. Presl) C. Chr.
Sin.: *Hymenophyllum caudatum* Bosch, *Hymenophyllum patagonicum* Gand., *Mecodium caudiculatum* (Mart.) Copel. f. *nanum* G. Kunkel, *Mecodium caudiculatum* (Mart.) Copel. f. *productum* (C. Presl) G. Kunkel, *Sphaerocionium productum* C. Presl
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Vidoz, F. F., Cassá de Pazos, L. & de la Sota, E. R., 1999[2000].
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU); CHL(V, VIII, IX, X, XI, XII, IJF, RME).

Ejemplares de referencia: ARG[*Vidoz, F. F. 148* (BACP)]; CHL[*Stuessy, T. F. 5052* (CONC)].

Hymenophyllum chiloense Hook. = **Hymenophyllum dicranotrichum** (C. Presl) Hook. ex Sadeb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum ciliatum (Sw.) Sw. = **Hymenophyllum hirsutum** (L.) Sw.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.

Hymenophyllum constrictum H. Christ = **Hymenophyllum crispum** Kunth
Referencias: Sehnem, A., 1971.

Hymenophyllum crispum Kunth
Sin.: *Hymenophyllum constrictum* H. Christ, *Sphaerocionium crispum* (Kunth) Klotzsch
Referencias: Sehnem, A., 1971; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.
Hierba saxícola. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Jürgens, C. s.n.* (SI)].

Hymenophyllum crispum Kunth var. *brasilianum* Fée = **Hymenophyllum brasilianum** (Fée) Rosenst.

[Hymenophyllum crispum Kunth var. fastigiata (Sieber) Hieron.]
Sin.: *Trichomanes fastigiata* Sieber
Referencias: Rosenstock, E., 1907.
Notas: Nombre dudoso.

Hymenophyllum cruentum Cav. = **Hymenoglossum cruentum** (Cav.) C. Presl

Hymenophyllum cumingii C. Presl = **Hymenophyllum cuneatum** Kunze var. **cuneatum**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum cuneatum Kunze f. *imbricata* C. Chr. & Skottsb. = **Hymenophyllum cuneatum** Kunze var. **rariforme** C. Chr. & Skottsb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum cuneatum Kunze var. **cuneatum**
Sin.: *Hymenophyllum cumingii* C. Presl, *Hymenophyllum polyanthos* auct. non (Sw.) Sw., *Mecodium cuneatum* (Kunze) Copel.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 400–1000 m.
Países: CHL(VIII, IX, X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 9287* (CONC)].

Hymenophyllum cuneatum Kunze var. **rariforme** C. Chr. & Skottsb.
Sin.: *Hymenophyllum cuneatum* Kunze f. *imbricata* C. Chr. & Skottsb., *Hymenophyllum terminale* Phil., *Mecodium cuneatum* (Kunze) Copel. var. *rariforme* (C. Chr. & Skottsb.) G. Kunkel
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 300–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, C. J. F. 146* (SGO)].

Hymenophyllum darwinii Hook. f. ex Bosch
Sin.: *Hymenophyllum abruptum* auct. non Hook., *Hymenophyllum abruptum* Hook. var. *brevifrons* (Kunze) Franch., *Hymenophyllum rarum* auct. non R. Br., *Hymenophyllum skottsbergii* C. Chr.
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 740* (SI)]; CHL[*Teillier A., S. 4405* (CONC)].

Hymenophyllum delicatulum Sehnem
Referencias: Sehnem, A., 1971.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 800–900 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 6513* (PACA)].

Hymenophyllum dentatum Cav.
Sin.: *Hymenophyllum bridgesii* Hook., *Hymenophyllum trichocaulum* Phil., *Leptocionium dentatum* (Cav.) Bosch, *Meringium dentatum* (Cav.) Copel., *Sphaerocionium bridgesii* (Hook.) Klotzsch
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1600 m.
Países: ARG(NEU, RNE, TDF); CHL(VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6314* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 30907* (CONC)].

Hymenophyllum dichotomum auct. non Cav. = **Hymenophyllum plicatum** Kaulf.
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum dichotomum Cav. var. *krauseanum* (Phil.) C. Chr. = **Hymenophyllum krauseanum** Phil.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum dicranotrichum (C. Presl) Hook. ex Sadeb.
Sin.: *Hymenophyllum chiloense* Hook., *Leptocionium dicranotrichum* C. Presl, *Trichomanes spinulosum* Phil.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 528* (CONC)].
Notas: Es dudosa su presencia en el Archipiélago de Juan Fernández, Chile.

Hymenophyllum dusenii H. Christ = **Serpyllopsis caespitosa** (Gaudich.) C. Chr. var. **caespitosa**
Referencias: Moore, D. M., 1983.

[Hymenophyllum elatius H. Christ]
Referencias: Sehnem, A., 1971.
Notas: Nombre dudoso.

Hymenophyllum elegans Spreng.
Sin.: *Sphaerocionium elegans* (Spreng.) Copel.
Referencias: Sehnem, A., 1971.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19245* (MBM)].

Hymenophyllum falklandicum Baker
Sin.: *Hymenophyllum caespitosum* auct. non Gaudich., *Hymenophyllum falklandicum* Baker f. *andinum* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum falklandicum* Baker var. *andinum* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum falklandicum* Baker var. *elongatum* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum glebarium* H. Christ ex C. Chr., *Hymenophyllum wilsonii* auct. non Hook., *Trichomanes flabellatum* auct. non Bosch, *Trichomanes sibthorpioides* auct. non Bory
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Moore, D. M., 1983; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Endémica. 0–1700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII, IX, X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 25p* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 6157* (CONC)].

Hymenophyllum falklandicum Baker f. *andinum* Diem & J.S. Licht. = **Hymenophyllum falklandicum** Baker
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum falklandicum Baker var. *andinum* Diem & J.S. Licht. = **Hymenophyllum falklandicum** Baker
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959.

Hymenophyllum falklandicum Baker var. *elongatum* Diem & J.S. Licht. = **Hymenophyllum falklandicum** Baker

Hymenophyllum ferrugineum Colla
Sin.: *Hymenophyllum berteroi* Hook., *Hymenophyllum ferrugineum* Colla var. *donatii* Looser, *Hymenophyllum frankliniae* Colenso, *Hymenophyllum subtilissimum* Kunze, *Sphaerocionium ferrugineum* (Colla) Copel.
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Moore, D. M., 1983; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 614* (SI)]; CHL[*Stuessy, T. F. 5077* (CONC)].

Hymenophyllum ferrugineum Colla var. *donatii* Looser = **Hymenophyllum ferrugineum** Colla

Hymenophyllum fragile (Hedw.) C.V. Morton
Sin.: *Hymenophyllum raddianum* Müll.Berol., *Sphaerocionium fragile* (Hedw.) Pic. Serm., *Trichomanes fragile* Hedw.
Referencias: Sehnem, A., 1971; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Jürgens, C. s.n.* (SI)].

Hymenophyllum fragile (Hedw.) C.V. Morton var. *venustum* (Desv.) C.V. Morton = **Hymenophyllum hirsutum** (L.) Sw.

Hymenophyllum frankliniae Colenso = **Hymenophyllum ferrugineum** Colla
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum fuciforme Sw.
Sin.: *Hymenophyllum semiteres* Colla, *Leptocionium fuciforme* (Sw.) C. Presl, *Mecodium fuciforme* (Sw.) Copel.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Vidoz, F. F., Cassá de Pazos, L. & de la Sota, E. R., 1999[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(CHU); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vidoz, F. F. 131* (BACP)]; CHL[*Stuessy, T. F. 9445* (CONC)].

Hymenophyllum fucoides (Sw.) Sw.
Sin.: *Trichomanes fucoides* Sw.
Referencias: Sehnem, A., 1971.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 7771* (HBR)].

Hymenophyllum glaziovii Baker
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ribas, O. S. 859* (MBM)].

Hymenophyllum glebarium H. Christ ex C. Chr. = **Hymenophyllum falklandicum** Baker
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw.
Sin.: *Hymenophyllum ciliatum* (Sw.) Sw., *Hymenophyllum fragile* (Hedw.) C.V. Morton var. *venustum* (Desv.) C.V. Morton, *Hymenophyllum venustum* Desv., *Sphaerocionium ciliatum* (Sw.) C. Presl, *Sphaerocionium hirsutum* (L.) C. Presl, *Trichomanes ciliatum* Sw., *Trichomanes hirsutum* L.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Sehnem, A., 1971; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 67* (SP, UPCB)].

Hymenophyllum krauseanum Phil.
Sin.: *Hymenophyllum dichotomum* Cav. var. *krauseanum* (Phil.) C. Chr., *Hymenophyllum magellanicum* Willd. ex Kunze var. *krauseanum* (Phil.) C. Chr., *Hymenophyllum plicatum* Kaulf. var. *krauseanum* (Phil.) Looser, *Meringium krauseanum* (Phil.) G. Kunkel
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; de la Sota, E. R., Ponce, M. M.,

Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 586* (SI)]; CHL[*Rodríguez Ríos, R. 521* (CONC)].

Hymenophyllum lineare (Sw.) Sw.
Sin.: *Trichomanes lineare* Sw.
Referencias: Sehnem, A., 1971.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 11725* (MBM)].

Hymenophyllum lineare (Sw.) Sw. var. *brasiliense* Rosenst. = **Hymenophyllum rufum** Fée
Referencias: Sehnem, A., 1971.

Hymenophyllum magellanicum (Desv.) Willd. ex Kunze = **Hymenophyllum seselifolium** C. Presl
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959.

Hymenophyllum magellanicum Willd. ex Kunze var. *krauseanum* (Phil.) C. Chr. = **Hymenophyllum krauseanum** Phil.
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum martii Sturm = **Hymenophyllum caudiculatum** Mart. var. **caudiculatum**

Hymenophyllum megachilum C. Presl = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum menziesii C. Presl = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.
Referencias: Moore, D. M., 1983; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum mettenii Bosch = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum meyeri C. Presl = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum microcarpum Desv.
Sin.: *Mecodium microcarpum* (Desv.) Copel., *Sphaerocionium microcarpum* (Desv.) Copel.
Referencias: Sehnem, A., 1971; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 800–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3021* (HBR)].

Hymenophyllum myriocarpum Hook.
Referencias: Mickel, J. T. & Smith, A. R., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Oliveira, P. I. 798* (MBM)].

Hymenophyllum nahuelhuapiense Diem & J.S. Licht.
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba terrestre o rupícola. Perenne. Endémica. 200–800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF); CHL(X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 992* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 5506* (CONC)].

Hymenophyllum nahuelhuapiense Diem & J.S. Licht. f. *densipinnata* Diem & J.S. Licht. = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.

Hymenophyllum nigricans auct. non Colla = **Hymenophyllum tortuosum** Hook. & Grev.
Referencias: Moore, D. M., 1983.

Hymenophyllum nigricans Colla = **Hymenophyllum plicatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum patagonicum Gand. = **Hymenophyllum caudiculatum** Mart. var. **productum** (C. Presl) C. Chr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum pectinatum Cav.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica. 0–3600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19098* (SI)]; CHL[*Stuessy, T. F. 9571* (CONC)].

Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv.
Sin.: *Hymenophyllum megachilum* C. Presl, *Hymenophyllum menziesii* C. Presl, *Hymenophyllum mettenii* Bosch, *Hymenophyllum meyeri* C. Presl, *Hymenophyllum nahuelhuapiense* Diem & J.S. Licht. f. *densipinnata* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv. var. *elegans* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv. var. *elongatum* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv. var. *imbricatum* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv. var. *minor* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv. var. *patagonicum* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm. var. *wilsonii* (Hook.) Sadeb., *Hymenophyllum unilaterale* Bory, *Hymenophyllum wilsonii* Hook., *Trichomanes peltatum* Poir.
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Moore, D. M., 1983; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(NEU, RNE, TDF); BRA(RGS); CHL(IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 106p* (SI)]; BRA[*Windisch, P. G. 8735* (SI)]; CHL[*Garaventa, A. 5737* (CONC)].

Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv. var. *achalensis* (Hieron.) Capurro = **Hymenophyllum tunbrigense** (L.) Sm. var. **cordobense** Hieron.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv. var. *elegans* Diem & J.S. Licht. = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.

Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv. var. *elongatum* Diem & J.S. Licht. = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.

Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv. var. *imbricatum* Diem & J.S. Licht. = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.

Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv. var. *minor* Diem & J.S. Licht. = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.

Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv. var. *patagonicum* Diem & J.S. Licht. = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.

Hymenophyllum plicatum Kaulf.
Sin.: *Hymenophyllum dichotomum* auct. non Cav., *Hymenophyllum nigricans* Colla, *Hymenophyllum plicatum* Kaulf. var. *quadrifidum* (Phil.) Looser, *Hymenophyllum quadrifidum* Phil., *Hymenophyllum quadrivalve* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Meringium plicatum* (Kaulf.) Copel., *Ptychophyllum plicatum* (Kaulf.) C. Presl
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(NEU, RNE, TDF); CHL(VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 640* (BAB)]; CHL[*Stuessy, T. F. 5057* (CONC)].

Hymenophyllum plicatum Kaulf. var. *krauseanum* (Phil.) Looser = **Hymenophyllum krauseanum** Phil.
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959.

Hymenophyllum plicatum Kaulf. var. *quadrifidum* (Phil.) Looser = **Hymenophyllum plicatum** Kaulf.
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum plumosum Kaulf.
Referencias: Windisch, P. G., 1992.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 1100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Berry, P. E. 4479* (MBM)].

Hymenophyllum polyanthos auct. non (Sw.) Sw. = **Hymenophyllum cuneatum** Kunze var. **cuneatum**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw.
Sin.: *Hymenophyllum viridissimum* Fée, *Mecodium polyanthos* (Sw.) Copel., *Trichomanes polyanthos* Sw.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Sehnem, A., 1971.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Windisch, P. G. 8734* (SI)].

Hymenophyllum pulchellum Schltdl. & Cham.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 12118* (SI)].

Hymenophyllum quadrifidum Phil. = **Hymenophyllum plicatum** Kaulf.
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum quadrivalve Phil. ex Reiche, nom. nud. = **Hymenophyllum plicatum** Kaulf.
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum quetrihuense Diem & J.S. Licht.
Sin.: *Hymenophyllum quetrihuense* Diem & J.S. Licht. f. *nana* Diem & J.S. Licht.
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cusato, L. 4318* (BAF)].

Hymenophyllum quetrihuense Diem & J.S. Licht. f. *nana* Diem & J.S. Licht. = **Hymenophyllum quetrihuense** Diem & J.S. Licht.
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998.

Hymenophyllum raddianum Müll.Berol. = **Hymenophyllum fragile** (Hedw.) C.V. Morton

Hymenophyllum rarum auct. non R. Br. = **Hymenophyllum darwinii** Hook. f. ex Bosch
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959.

Hymenophyllum rufum Fée
Sin.: *Hymenophyllum lineare* (Sw.) Sw. var. *brasiliense* Rosenst., *Sphaerocionium rufum* (Fée) Copel.
Referencias: Sehnem, A., 1971.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Windisch, P. G. 8737* (SI)].

Hymenophyllum rugosum C. Chr. & Skottsb.
Sin.: *Hymenophyllum rugosum* C. Chr. & Skottsb. f. *lanceolatum* C. Chr. & Skottsb., *Hymenophyllum tunbrigense* auct. non (L.) Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 400–700 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 9490* (CONC)].

Hymenophyllum rugosum C. Chr. & Skottsb.
f. *lanceolatum* C. Chr. & Skottsb.
= **Hymenophyllum rugosum** C. Chr. & Skottsb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum rupestre Raddi = **Trichomanes rupestre** (Raddi) Bosch

Hymenophyllum secundum Hook. & Grev.
Sin.: *Hymenophyllum serra* C. Presl, *Meringium secundum* (Hook. & Grev.) Copel.
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 470b* (SI)]; CHL[*Skottsberg, C. J. F. 1135* (CONC)].

Hymenophyllum semiteres Colla = **Hymenophyllum fuciforme** Sw.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum serra C. Presl = **Hymenophyllum secundum** Hook. & Grev.
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum seselifolium C. Presl
Sin.: *Didymoglossum magellanicum* Desv., *Hymenophyllum attenuatum* Hook., *Hymenophyllum bibraianum* J.W. Sturm, *Hymenophyllum magellanicum* (Desv.) Willd. ex Kunze, *Leptocionium attenuatum* (Hook.) Bosch, *Leptocionium magellanicum* (Desv.) Bosch, *Leptocionium seselifolium* (C. Presl) Bosch, *Meringium magellanicum* (Desv.) Copel., *Ptychophyllum magellanicum* Klotzsch
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Duek, J. J. & Rodríguez Ríos, R., 1972; Rodríguez Ríos, R., 1995; Sehnem, A., 1971.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 585* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 15873* (HBR)]; CHL[*Ricardi, M. 2387* (CONC)].

Hymenophyllum skottsbergii C. Chr. = **Hymenophyllum darwinii** Hook. f. ex Bosch
Referencias: Moore, D. M., 1983; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum skottsbergii Gand., hom. illeg.
= **Hymenophyllum tortuosum** Hook. & Grev.
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum subtilissimum Kunze
= **Hymenophyllum ferrugineum** Colla
Referencias: Moore, D. M., 1983; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum terminale Phil. = **Hymenophyllum cuneatum** Kunze var. **rariforme** C. Chr. & Skottsb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum tortuosum Hook. & Grev.
Sin.: *Hymenophyllum nigricans* auct. non Colla, *Hymenophyllum skottsbergii* Gand., hom. illeg., *Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev. var. *beckeri* (H. Krause ex Phil.) Espinosa, *Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev. var. *bustillosii* Espinosa, *Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev. var. *glomeratum* Diem & J.S. Licht., *Leptocionium tortuosum* (Hook. & Grev.) Bosch, *Meringium tortuosum* (Hook. & Grev.) Copel., *Myrmecostylum tortuosum* (Hook. & Grev.) C. Presl, *Trichomanes beckeri* H. Krause ex Phil.
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Duek, J. J. & Rodríguez Ríos, R., 1972; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IX, X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 470a* (SI)]; CHL[*Marticorena, C. 675* (CONC)].

Hymenophyllum tortuosum Hook. & Grev. var. *beckeri* (E.H.L. Krause ex F. Phil.) Espinosa
= **Hymenophyllum tortuosum** Hook. & Grev.
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum tortuosum Hook. & Grev. var. *bustillosii* Espinosa = **Hymenophyllum tortuosum** Hook. & Grev.
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum tortuosum Hook. & Grev. var. *glomeratum* Diem & J.S. Licht. = **Hymenophyllum tortuosum** Hook. & Grev.
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959.

Hymenophyllum trichocaulum Phil. = **Hymenophyllum dentatum** Cav.
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum tunbrigense auct. non (L.) Sm.
= **Hymenophyllum rugosum** C. Chr. & Skottsb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. var. *asperula* (Kunze) Diem & J.S. Licht. = **Hymenophyllum tunbrigense** (L.) Sm. var. **tunbrigense**

Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. var. **cordobense** Hieron.
Sin.: *Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv. var. *achalensis* (Hieron.) Capurro, *Hymenophyllum wilsonii* Hook. var. *achalensis* Hieron.

Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica. 1200 m.
Países: ARG(CAT, COR, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 9* (SI)].

Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. var. **tunbrigense**
Sin.: *Hymenophyllum antarcticum* C. Presl, *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm. var. *asperula* (Kunze) Diem & J.S. Licht., *Trichomanes tunbrigense* L.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR); CHL(VI, VII, VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 802* (SI)]; CHL[*Kubitzki, K. 2* (CONC)].

Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. var. *wilsonii* (Hook.) Sadeb. = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.
Referencias: Macloskie, G., 1903; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum ulei H. Christ & Giesenh.
Referencias: Sehnem, A., 1971.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 240* (HBR)].

Hymenophyllum umbratile Diem & J.S. Licht.
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 370* (SI)]; CHL[*Villagrán, C. 5599* (CONC)].

Hymenophyllum unilaterale Bory = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hymenophyllum venustum Desv. = **Hymenophyllum hirsutum** (L.) Sw.
Referencias: Sehnem, A., 1971.

Hymenophyllum vestitum (C. Presl) Bosch
Sin.: *Sphaerocionium vestitum* C. Presl
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dombrowski, L. T. 4494* (MBM)].

Hymenophyllum viridissimum Fée = **Hymenophyllum polyanthos** (Sw.) Sw.
Referencias: Sehnem, A., 1971.

Hymenophyllum wilsonii auct. non Hook. = **Hymenophyllum falklandicum** Baker
Referencias: Moore, D. M., 1983.

Hymenophyllum wilsonii Hook. var. *achalensis* Hieron. = **Hymenophyllum tunbrigense** (L.) Sm. var. **cordobense** Hieron.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Hymenophyllum wilsonii Hook. = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Leptocionium attenuatum (Hook.) Bosch = **Hymenophyllum seselifolium** C. Presl
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Leptocionium dentatum (Cav.) Bosch = **Hymenophyllum dentatum** Cav.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Leptocionium dicranotrichum C. Presl = **Hymenophyllum dicranotrichum** (C. Presl) Hook. ex Sadeb.

Leptocionium fuciforme (Sw.) C. Presl = **Hymenophyllum fuciforme** Sw.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Leptocionium magellanicum (Desv.) Bosch = **Hymenophyllum seselifolium** C. Presl
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Leptocionium seselifolium (C. Presl) Bosch = **Hymenophyllum seselifolium** C. Presl
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Leptocionium tortuosum (Hook. & Grev.) Bosch = **Hymenophyllum tortuosum** Hook. & Grev.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Mecodium asplenioides (Sw.) Copel. = **Hymenophyllum asplenioides** (Sw.) Sw.

Mecodium caudiculatum (Mart.) Copel. f. *nanum* G. Kunkel = **Hymenophyllum caudiculatum** Mart. var. **productum** (C. Presl) C. Chr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Mecodium caudiculatum (Mart.) Copel. f. *productum* (C. Presl) G. Kunkel = **Hymenophyllum caudiculatum** Mart. var. **productum** (C. Presl) C. Chr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Mecodium cuneatum (Kunze) Copel. = **Hymenophyllum cuneatum** Kunze var. **cuneatum**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Mecodium cuneatum (Kunze) Copel. var. *rariforme* (C. Chr. & Skottsb.) G. Kunkel = **Hymenophyllum cuneatum** Kunze var. **rariforme** C. Chr. & Skottsb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Mecodium fuciforme (Sw.) Copel. = **Hymenophyllum fuciforme** Sw.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Mecodium microcarpum (Desv.) Copel. = **Hymenophyllum microcarpum** Desv.

Mecodium polyanthos (Sw.) Copel. = **Hymenophyllum polyanthos** (Sw.) Sw.

Meringium dentatum (Cav.) Copel. = **Hymenophyllum dentatum** Cav.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Meringium krauseanum (Phil.) G. Kunkel = **Hymenophyllum krauseanum** Phil.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Meringium magellanicum (Desv.) Copel. = **Hymenophyllum seselifolium** C. Presl
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Meringium plicatum (Kaulf.) Copel. = **Hymenophyllum plicatum** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Meringium secundum (Hook. & Grev.) Copel. = **Hymenophyllum secundum** Hook. & Grev.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Meringium tortuosum (Hook. & Grev.) Copel. = **Hymenophyllum tortuosum** Hook. & Grev.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Myrmecostylum tortuosum (Hook. & Grev.) C. Presl = **Hymenophyllum tortuosum** Hook. & Grev.
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959.

Polyphlebium angustatum (Carmich.) Ebihara & Dubuisson = **Trichomanes angustatum** Carmich.

Polyphlebium exsectum (Kunze) Ebihara & Dubuisson = **Trichomanes exsectum** Kunze

Polyphlebium ingae (C. Chr. & Skottsb.) Ebihara & Dubuisson = **Trichomanes ingae** C. Chr. & Skottsb.

Polyphlebium philippianum (J.W. Sturm) Ebihara & Dubuisson = **Trichomanes philippianum** J.W. Sturm

Polyphlebium pyxidiferum (L.) Ebihara & Dubuisson = **Trichomanes pyxidiferum** L.

Ptychophyllum magellanicum Klotzsch = **Hymenophyllum seselifolium** C. Presl
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Ptychophyllum plicatum (Kaulf.) C. Presl = **Hymenophyllum plicatum** Kaulf.
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959.

Serpyllopsis Bosch

Número de especies: 1 endémica

Serpyllopsis caespitosa (Gaudich.) C. Chr. var. **caespitosa**
Sin.: *Hymenophyllum caespitosum* Gaudich., *Hymenophyllum dusenii* H. Christ, *Serpyllopsis caespitosa* (Gaudich.) C. Chr. var. *densifolia* (Phil.) C. Chr., *Serpyllopsis caespitosa* (Gaudich.) C. Chr. var. *dusenii* (H. Christ) C. Chr., *Serpyllopsis caespitosa* (Gaudich.) C. Chr. var. *elongata* (Hook.) C. Chr., *Trichomanes caespitosum* (Gaudich.) Hook. f.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Moore, D. M., 1983; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–1700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 2101* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 6223* (CONC)].

Serpyllopsis caespitosa (Gaudich.) C. Chr. var. *densifolia* (Phil.) C. Chr. = **Serpyllopsis caespitosa** (Gaudich.) C. Chr. var. **caespitosa**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Serpyllopsis caespitosa (Gaudich.) C. Chr. var. *dusenii* (H. Christ) C. Chr. = **Serpyllopsis caespitosa** (Gaudich.) C. Chr. var. **caespitosa**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Serpyllopsis caespitosa (Gaudich.) C. Chr. var. *elongata* (Hook.) C. Chr. = **Serpyllopsis caespitosa** (Gaudich.) C. Chr. var. **caespitosa**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Serpyllopsis caespitosa (Gaudich.) C. Chr. var. **fernandeziana** C. Chr. & Skottsb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba terrestre o rupícola. Perenne. Endémica. 400–1400 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 5079* (CONC)].

Sphaerocionium bridgesii (Hook.) Klotzsch = **Hymenophyllum dentatum** Cav.
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Sphaerocionium ciliatum (Sw.) C. Presl = **Hymenophyllum hirsutum** (L.) Sw.

Sphaerocionium crispum (Kunth) Klotzsch
= **Hymenophyllum crispum** Kunth

Sphaerocionium elegans (Spreng.) Copel.
= **Hymenophyllum elegans** Spreng.

Sphaerocionium ferrugineum (Colla) Copel.
= **Hymenophyllum ferrugineum** Colla
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Sphaerocionium fragile (Hedw.) Pic. Serm.
= **Hymenophyllum fragile** (Hedw.) C.V. Morton

Sphaerocionium hirsutum (L.) C. Presl
= **Hymenophyllum hirsutum** (L.) Sw.

Sphaerocionium microcarpum (Desv.) Copel.
= **Hymenophyllum microcarpum** Desv.

Sphaerocionium productum C. Presl = **Hymenophyllum caudiculatum** Mart. var. **productum** (C. Presl) C. Chr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Sphaerocionium rufum (Fée) Copel. = **Hymenophyllum rufum** Fée

Sphaerocionium vestitum C. Presl = **Hymenophyllum vestitutm** (C. Presl) Bosch

Trichomanes L.

Número de especies: 25, 3 endémicas

[Trichomanes accedens C. Presl]
Referencias: Windisch, P. G., 1992.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Trichomanes acrocarpon Fée = **Trichomanes krausii** Hook. & Grev.
Referencias: Capurro, R. H., 1970.

Trichomanes anadromum Rosenst.
Sin.: *Trichomanes polypodioides* auct. non L., *Trichomanes sinuosum* Rich. ex Willd.
Referencias: Capurro, R. H., 1970; Sehnem, A., 1971.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CLA, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Capurro, R. H. 971* (BA)]; BRA[*Eskuche, U. G. 1642-76* (SI)].

Trichomanes angustatum Carmich.
Sin.: *Polyphlebium angustatum* (Carmich.) Ebihara & Dubuisson, *Trichomanes fulvum* Klotzsch, *Trichomanes tenerum* Spreng., *Vandenboschia angustata* (Carmich.) Copel., *Vandenboschia tenera* (Spreng.) Copel.
Referencias: Capurro, R. H., 1970; Sehnem, A., 1971; de la Sota, E. R., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, COA, PAI); URY(CLA, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Klein, R. M. 4-159* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 2291* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 2826* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 3741* (SI)].

Trichomanes angustifrons (Fée) Wess. Boer
Sin.: *Didymoglossum angustifrons* Fée
Referencias: Mickel, J. T. & Smith, A. R., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 4460* (BM)].

Trichomanes apodum Hook. & Grev. = **Trichomanes hymenoides** Hedw.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Trichomanes asplenioides Sw. = **Hymenophyllum asplenioides** (Sw.) Sw.

Trichomanes beckeri E.H.L. Krause ex F. Phil.
= **Hymenophyllum tortuosum** Hook. & Grev.
Referencias: Duek, J. J. & Rodríguez Ríos, R., 1972; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Trichomanes bifidum Vent. = **Trichomanes rigidum** Sw.
Referencias: Sehnem, A., 1971.

Trichomanes caespitosum (Gaudich.) Hook. f.
= **Serpyllopsis caespitosa** (Gaudich.) C. Chr. var. **caespitosa**
Referencias: Moore, D. M., 1983.

Trichomanes cavifolium Müll.Berol. = **Trichomanes pyxidiferum** L.
Referencias: Sehnem, A., 1971.

Trichomanes ciliatum Sw. = **Hymenophyllum hirsutum** (L.) Sw.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.

Trichomanes collariatum Bosch
Referencias: Mickel, J. T. & Smith, A. R., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. M. 2431* (MBM)]; PRY[*Balansa, B. 2834* (BM)].

[Trichomanes crispum L.]
Referencias: Windisch, P. G., 1992.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Trichomanes cristatum Kaulf.
Sin.: *Trichomanes sellowianum* C. Presl
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1971; Windisch, P. G., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA).

Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 392* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 18137* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6343* (SI)].

Trichomanes daucoides C. Presl = **Trichomanes rigidum** Sw.
Referencias: Sehnem, A., 1971.

Trichomanes diaphanum Kunth
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. M. 1486* (MBM)]; PRY[*Peña-Chocarro, M. C. 325* (BM)].

Trichomanes dregel Bosch = **Trichomanes rigidum** Sw.
Referencias: Sehnem, A., 1971.

Trichomanes elegans Rich.
Sin.: *Davalliopsis elegans* (Rich.) Copel., *Trichomanes priurii* Kuntze
Referencias: Sehnem, A., 1971.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22086* (MBM)].

Trichomanes emarginatum C. Presl
Sin.: *Trichomanes eximium* Kunze ex J.W. Sturm, nom. illeg., *Trichomanes pyxidiferum* auct. non L., *Trichomanes pyxidiferum* L. var. *elongatum* Hook.
Referencias: Capurro, R. H., 1970; Sehnem, A., 1971.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Capurro, R. H. 958* (BA)]; BRA[*Hatschbach, G. 15872* (MBM)].

Trichomanes eximium Kunze ex J.W. Sturm, nom. illeg. = **Trichomanes emarginatum** C. Presl
Referencias: Capurro, R. H., 1970.

Trichomanes exsectum Kunze
Sin.: *Polyphlebium exsectum* (Kunze) Ebihara & Dubuisson, *Vandenboschia exsecta* (Kunze) Copel.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(VII, X, IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 2043* (CONC)].

Trichomanes fastigiata Sieber = **Hymenophyllum crispum** Kunth var. **fastigiata** (Sieber) Hieron.

Trichomanes flabellatum auct. non Bosch = **Hymenophyllum falklandicum** Baker
Referencias: Moore, D. M., 1983.

Trichomanes fontanum Lindm.
Referencias: Sehnem, A., 1971.
Hierba saxícola. Perenne. Nativa. 200 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 1171* (PACA)].

Trichomanes fragile Hedw. = **Hymenophyllum fragile** (Hedw.) C.V. Morton

Trichomanes fucoides Sw. = **Hymenophyllum fucoides** (Sw.) Sw.

Trichomanes fulvum Klotzsch = **Trichomanes angustatum** Carmich.
Referencias: Capurro, R. H., 1970.

Trichomanes hirsutum L. = **Hymenophyllum hirsutum** (L.) Sw.

[Trichomanes hookeri C. Presl]
Referencias: Sehnem, A., 1971.
Notas: Nombre dudoso.

Trichomanes hymenoides Hedw.
Sin.: *Didymoglossum hymenoides* (Hedw.) Desv., *Didymoglossum sociale* Fée, *Trichomanes apodum* Hook. & Grev., *Trichomanes hymenoides* Hedw. f. *pseudoreptans* Rosenst., *Trichomanes muscoides* Sw., *Trichomanes pabstianum* C.Müller, *Trichomanes pseudoreptans* (Rosenst.) Sehnem, *Trichomanes sociale* (Fée) Lindm.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938], 1970; de la Sota, E. R., 1977; Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Legrand, D. & Lombardo, A., 1958; Sehnem, A., 1971.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Keller, H. A. 848* (CTES, SI)]; BRA[*Windisch, P. G. 8723* (SI)]; PRY[*Pérez de Molas 846* (PY)].
Notas: Citado para Tacuarembó, Uruguay, sin indicar ejemplar de referencia (Legrand & Lombardo, 1958).

Trichomanes hymenoides Hedw. f. *pseudoreptans* Rosenst. = **Trichomanes hymenoides** Hedw.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Trichomanes ingae C. Chr. & Skottsb.
Sin.: *Polyphlebium ingae* (C. Chr. & Skottsb.) Ebihara & Dubuisson, *Vandenboschia ingae* (C. Chr. & Skottsb.) Copel.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Endémica. 100–400 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, C. J. F. 162* (SGO)].

Trichomanes krausii Hook. & Grev.
Sin.: *Didymoglossum krausii* (Hook. & Grev.) C. Presl, *Trichomanes acrocarpon* Fée
Referencias: Capurro, R. H., 1970; de la Sota, E. R., 1977; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Sehnem, A., 1971.
Hierba saxícola. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL); BRA(PAR, SCA); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Capurro, R. H. 305* (BA)]; BRA[*Salino, A. s.n.* (NY)]; PRY[*Hassler, E. 12251a* (BM)].

Trichomanes kunzeanum Hook. = **Trichomanes radicans** Sw.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.

Trichomanes langsdorffii Bosch = **Trichomanes pilosum** Raddi
Referencias: Windisch, P. G., 1992.

Trichomanes lineare Sw. = **Hymenophyllum lineare** (Sw.) Sw.

[Trichomanes lucens Sw.]
Referencias: Windisch, P. G., 1992.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Trichomanes mandiocanum Raddi = **Trichomanes rigidum** Sw.
Referencias: Sehnem, A., 1971.

Trichomanes montanum Hook. = **Trichomanes reptans** Sw.
Referencias: Jørgensen, P. M., 1999a.

Trichomanes mosenii Lindm.
Sin.: *Didymoglossum mosenii* (Lindm.) Copel.
Referencias: Hassler, E., 1928; Sehnem, A., 1971.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 7043* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 101* (G)].

Trichomanes muscoides Sw. = **Trichomanes hymenoides** Hedw.
Referencias: Capurro, R. H., 1970.

[Trichomanes orbiculare H. Christ]
Referencias: Sehnem, A., 1971.
Notas: Nombre dudoso.

Trichomanes pabstianum C.Müller = **Trichomanes hymenoides** Hedw.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Trichomanes pellucens Kunze
Referencias: Smith, A. R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a; Windisch, P. G., 1992.
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 400–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 3456* (P)].
Notas: El material citado por Hassler (1928) para Paraguay corresponde a *Trichomanes cristatum* Kaulf.

Trichomanes peltatum Poir. = **Hymenophyllum peltatum** (Poir.) Desv.
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959.

Trichomanes philippianum J.W. Sturm
Sin.: *Polyphlebium philippianum* (J.W. Sturm) Ebihara & Dubuisson, *Vandenboschia philippiana* (J.W. Sturm) Copel.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–700 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, C. J. F. 351* (SGO)].

Trichomanes pilosum Raddi
Sin.: *Trichomanes langsdorffii* Bosch
Referencias: Capurro, R. H., 1970; Legrand, D. & Lombardo, A., 1958; Sehnem, A., 1971; Windisch, P. G., 1992.
Hierba saxícola. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, COA, GUA, PAI); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 3008* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 217* (SI)]; PRY[*Sparre, B. B. 333* (BM)]; URY[*Osten, C. 6546* (US)].

Trichomanes polyanthos Sw. = **Hymenophyllum polyanthos** (Sw.) Sw.

Trichomanes polypodioides L.
Referencias: Hassler, E., 1928; Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Legrand, C. M. D. E. & Lombardo, A., 1958; Sehnem, A., 1971; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(COA); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 238* (MBM)]; PRY[*Balansa, B. 4458* (BM)].

Trichomanes polypodioides auct. non L. = **Trichomanes anadromum** Rosenst.
Referencias: Capurro, R. H., 1970.

Trichomanes priurii Kuntze = **Trichomanes elegans** Rich.
Referencias: Sehnem, A., 1971.

Trichomanes pseudoreptans (Rosenst.) Sehnem = **Trichomanes hymenoides** Hedw.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Trichomanes punctatum Poir.
Sin.: *Trichomanes sphenoides* Kunze var. *minor* Rosenst.
Referencias: Rosenstock, E., 1907; Sehnem, A., 1971.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Jürgens, C. s.n.* (SI)].

Trichomanes pyxidiferum auct. non L. = **Trichomanes emarginatum** C. Presl
Referencias: Capurro, R. H., 1970.

Trichomanes pyxidiferum L.
Sin.: *Polyphlebium pyxidiferum* (L.) Ebihara & Dubuisson, *Trichomanes cavifolium* Müll.Berol., *Trichomanes tranninense* Fée
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Sehnem, A., 1971.
Hierba saxícola. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Jürgens, C. s.n.* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 12248a* (BM)].

Trichomanes pyxidiferum L. var. *elongatum* Hook.
= **Trichomanes emarginatum** C. Presl
Referencias: Capurro, R. H., 1970.

Trichomanes quercifolium Hook. & Grev.
= **Trichomanes reptans** Sw.
Referencias: Capurro, R. H., 1970.

Trichomanes radicans auct. non Sw. = **Trichomanes repens** Schott ex J.W. Sturm

Trichomanes radicans Sw.
Sin.: *Trichomanes kunzeanum* Hook., *Trichomanes radicans* Sw. var. *gigantea* Mett., *Trichomanes scandens* auct. non L., *Trichomanes venustum* H. Christ, nom. illeg.
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1971; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.
Hierba saxícola. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Windisch, P. G. 8722* (SI)].

Trichomanes radicans Sw. var. *gigantea* Mett.
= **Trichomanes radicans** Sw.
Referencias: Rosenstock, E., 1907.

Trichomanes repens Schott ex J.W. Sturm
Sin.: *Trichomanes radicans* auct. non Sw., *Trichomanes repens* Schott ex J.W. Sturm var. *stipitatum* J.W. Sturm
Referencias: Capurro, R. H., 1970.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Keller, H. A. 53* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 10747* (MBM, PACA)]; PRY[*Jiménez, B. 155* (BM, CTES, PY)].

Trichomanes repens Schott ex J.W. Sturm var. *stipitatum* J.W. Sturm = **Trichomanes repens** Schott ex J.W. Sturm
Referencias: Capurro, R. H., 1970.

Trichomanes reptans Sw.
Sin.: *Didymoglossum reptans* (Sw.) C. Presl, *Trichomanes montanum* Hook., *Trichomanes quercifolium* Hook. & Grev.
Referencias: Capurro, R. H., 1970; de la Sota, E. R., 1977; Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Rosenstock, E., 1907.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26540* (SI)]; BRA[*Labiak, P. H. 84* (SP, UPCB)].
Notas: Citado para Paraguay sin indicar material de referencia (Mickel & Smith, 2004). El material citado bajo *Trichomanes montanum* Hook. para ese país no fue localizado (Hassler, 1928).

Trichomanes rigidum Sw.
Sin.: *Trichomanes bifidum* Vent., *Trichomanes daucoides* C. Presl, *Trichomanes dregel* Bosch, *Trichomanes mandiocanum* Raddi
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1971; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 268* (HBR)]; PRY[*Marín, G. 238* (BM, PY)].

Trichomanes rupestre (Raddi) Bosch
Sin.: *Hymenophyllum rupestre* Raddi, *Vandenboschia rupestris* (Raddi) Ebihara & K. Iwats.
Referencias: Hassler, E., 1928; Sehnem, A., 1971.
Hierba saxícola. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. 360* (PACA)]; PRY[*Hassler, E. 488* (SI)].

Trichomanes scandens auct. non L. = **Trichomanes radicans** Sw.

Trichomanes sellowianum C. Presl = **Trichomanes cristatum** Kaulf.
Referencias: Windisch, P. G., 1992.

Trichomanes sibthorpioides auct. non Bory
= **Hymenophyllum falklandicum** Baker
Referencias: Moore, D. M., 1983.

Trichomanes sinuosum Rich. ex Willd. = **Trichomanes anadromum** Rosenst.
Referencias: Capurro, R. H., 1970.

Trichomanes sociale (Fée) Lindm. = **Trichomanes hymenoides** Hedw.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Trichomanes sphenoides Kunze var. *minor* Rosenst.
= **Trichomanes punctatum** Poir.

Trichomanes spinulosum Phil. = **Hymenophyllum dicranotrichum** (C. Presl) Hook. ex Sadeb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Trichomanes tenerum Spreng. = **Trichomanes angustatum** Carmich.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.

Trichomanes tranninense Fée = **Trichomanes pyxidiferum** L.
Referencias: Sehnem, A., 1971.

Trichomanes tunbrigense L. = **Hymenophyllum tunbrigense** (L.) Sm. var. **tunbrigense**
Referencias: Diem, J. & Lichtenstein, J. S., 1959; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Trichomanes venustum H. Christ, nom. illeg.
= **Trichomanes radicans** Sw.
Referencias: Hassler, E., 1928.

Vandenboschia angustata (Carmich.) Copel.
= **Trichomanes angustatum** Carmich.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.

Vandenboschia exsecta (Kunze) Copel. = **Trichomanes exsectum** Kunze
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Vandenboschia ingae (C. Chr. & Skottsb.) Copel.
= **Trichomanes ingae** C. Chr. & Skottsb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Vandenboschia philippiana (J.W. Sturm) Copel.
= **Trichomanes philippianum** J.W. Sturm
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Vandenboschia rupestris (Raddi) Ebihara & K. Iwats.
= **Trichomanes rupestre** (Raddi) Bosch

Vandenboschia tenera (Spreng.) Copel. = **Trichomanes angustatum** Carmich.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.

ISOËTACEAE

Autores: Macluf, C. & Ponce, M. M.

1 género, 16 especies, 12 especies endémicas.

Isoëtes L.

Número de especies: 16, 12 endémicas

Isoëtes alcalophila Halloy
Referencias: Halloy, S., 1979; Tryon, A. F. & Tryon, R. M., 1982.
Hierba. Anual. Endémica. 4300 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Halloy, S. 170* (LIL)].

Isoëtes argentina A.A. Eaton ex Palmer, nom. nud.
= **Isoëtes hieronymi** U. Weber
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Isoëtes brasiliensis H.P. Fuchs
Referencias: Fuchs-Eckert, H. P., 1986.
Hierba acuática. Anual. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 128* (LIL)].

Isoëtes chubutiana Hickey, Macluf & W.C. Taylor
Sin.: *Isoëtes meyeri* H.P. Fuchs, nom. nud., *Isoëtes valdiviensis* H.P. Fuchs, nom. nud.
Referencias: Hickey, R. J., Macluf, C. & Taylor, W. C., 2003.
Hierba acuática. Anual. Endémica. 700–1300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Taylor, W. C. 6172* (MIL)]; CHL[*Pisano, E. 4304* (HIP)].

Isoëtes ekmanii U. Weber
Referencias: Capurro, R. H., 1969[1968]; de la Sota, E. R. & Jankowski, L., 1996; Pastore, A. L., 1936; Weber, U., 1922.
Hierba. Anual. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(BAI, COS, MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28493* (SI)].

Isoëtes escondidensis Halloy
Referencias: Halloy, S., 1979.
Hierba. Perenne. Endémica. 4300–4400 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Halloy, S. 732* (LIL)].

Isoëtes fusco-marginata H.P. Fuchs
Referencias: Fuchs-Eckert, H. P., 1986.
Hierba palustre. Anual. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 44875* (LIL)].

[Isoëtes gardneriana Mett.]
Referencias: Hassler, E., 1928; Pastore, A. L., 1936.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Isoëtes hieronymi U. Weber
Sin.: *Isoëtes argentina* A.A. Eaton ex Palmer, nom. nud., *Isoëtes karsteni* auct. non A. Braun, *Isoëtes lechleri* auct. non Mett., *Isoëtes socia* auct. non A. Braun
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Hickey, R. J., 1986b; Pastore, A. L., 1936; Rodríguez Ríos, R., 1995; Weber, U., 1922.
Hierba acuática. Anual. Endémica. 1000 m.
Países: ARG(COR, RNE); CHL(IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 774* (CORD)].

Isoëtes itaboensis H.P. Fuchs
Referencias: Macluf, C., Morbelli, M. & Giúdice, G. E., 2006.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Shade, s.n.* (CTES)].

Isoëtes karsteni auct. non A. Braun = **Isoëtes hieronymi** U. Weber
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Isoëtes lechleri auct. non Mett. = **Isoëtes hieronymi** U. Weber
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Isoëtes meyeri H.P. Fuchs, nom. nud. = **Isoëtes chubutiana** Hickey, Macluf & W.C. Taylor
Referencias: Hickey, R. J., Macluf, C. & Taylor, W. C., 2003.

Isoëtes panamensis Maxon & C.V. Morton
Referencias: Hickey, R. J., 1985, 1986a, b, 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1994.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APA, CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 3294* (G)].

Isoëtes pedersenii H.P. Fuchs
Referencias: Hickey, R. J., 1985.
Hierba. Anual. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 8105* (LP)].

Isoëtes ramboi Herter
Referencias: Fuchs-Eckert, H. P., 1986.
Hierba acuática. Anual. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Spannagel, C. 475* (SP)].

Isoëtes savatieri Franch.
Sin.: *Isoëtes savatieri* Franch. subsp. *valdiviensis* H.P. Fuchs, nom. nud.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Hickey, R. J., Macluf, C. & Taylor, W. C., 2003; Looser, G., 1939; Moore, D. M., 1983; Musselman, L. J., 2003[2002]; Rodríguez Ríos, R., 1995; Weber, U., 1922.
Hierba acuática. Anual. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Savatier, s.n.* (P)]; CHL[*Donat, A. 380* (BM, F, GH, LIL, NY, SGO)].

Isoëtes savatieri Franch. subsp. *valdiviensis* H.P. Fuchs, nom. nud. = **Isoëtes savatieri** Franch.

Isoëtes sehnemii H.P. Fuchs
Referencias: Fuchs-Eckert, H. P., 1986.
Hierba acuática. Anual. Endémica. 400–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 17094* (PACA)].

Isoëtes smithii H.P. Fuchs
Referencias: Fuchs-Eckert, H. P., 1986.
Hierba acuática. Anual. Endémica. 1000–1600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3305* (LIL)].

Isoëtes socia auct. non A. Braun = **Isoëtes hieronymi** U. Weber
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Isoëtes spannagellii H.P. Fuchs
Referencias: Fuchs-Eckert, H. P., 1986.
Hierba acuática. Anual. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bueno, O. L. 4471* (ICN)].

Isoëtes valdiviensis H.P. Fuchs, nom. nud. = **Isoëtes chubutiana** Hickey, Macluf & W.C. Taylor
Referencias: Hickey, R. J., Macluf, C. & Taylor, W. C., 2003.

Isoëtes weberi Herter
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; Pastore, A. L., 1936; Weber, U., 1922.
Hierba palustre. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. s.n.* (LIL)]; URY[*Alonso Paz, E. 2731* (MVFQ)].
Notas: Probablemente crezca en la Argentina.

LOMARIOPSIDACEAE

Autores: Ponce, M. M. & de la Sota, E. R.
Revisor: Prado, J.

4 géneros, 54 especies, 11 especies endémicas.

Acrostichum beaurepairei Fée = **Elaphoglossum beaurepairei** (Fée) Brade
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum blanchetii Mett. ex Kuhn = **Elaphoglossum blanchetii** (Mett. ex Kuhn) C. Chr.

Acrostichum brasiliense Spreng. ex Kuhn = **Elaphoglossum sellowianum** (Klotzsch ex Kuhn) T. Moore
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum brevipes Kunze = **Elaphoglossum brevipes** (Kunze) T. Moore

Acrostichum burchellii Baker = **Elaphoglossum burchellii** (Baker) C. Chr.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum chrysolepis Fée = **Elaphoglossum chrysolepis** (Fée) Alston
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998.

Acrostichum conforme auct. non Sw. = **Elaphoglossum gayanum** (Fée) T. Moore

Acrostichum conforme auct. non Sw. = **Elaphoglossum lingua** (C. Presl) Brack.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum conforme auct. non Sw. = **Elaphoglossum vagans** (Mett.) Hieron.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum craspedariaforme Fée = **Elaphoglossum craspedariaforme** (Fée) Brade ex Alston

Acrostichum crassinerve Kunze = **Elaphoglossum crassinerve** (Kunze) T. Moore
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum crassipes Hieron. = **Elaphoglossum crassipes** (Hieron.) Diels
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Acrostichum curupiae Lindm. = **Bolbitis curupirae** (Lindm.) Ching ex C. Chr.

Acrostichum erythrodes Kunze = **Lomariopsis marginata** (Schrad.) Kuhn
Referencias: Moran, R. C., 2000.

Acrostichum flaccidum Fée var. *pallidum* Baker = **Elaphoglossum nigrescens** (Hook.) T. Moore ex Diels
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum fonkii Phil. = **Elaphoglossum fonkii** (Phil.) T. Moore
Referencias: Looser, G., 1940[1938]; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Acrostichum gayanum Fée = **Elaphoglossum gayanum** (Fée) T. Moore
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Acrostichum glaziovii Fée = **Elaphoglossum scolopendrifolium** (Raddi) J. Sm.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum guianense (Aubl.) Baker = **Lomagramma guianensis** (Aubl.) Ching

Acrostichum hartwegii Fée = **Elaphoglossum hartwegii** (Fée) T. Moore

Acrostichum hymenodiastrum Fée = **Elaphoglossum macrophyllum** (Mett. ex Kuhn) Fée var. **macrophyllum**
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum insignis Fée = **Elaphoglossum scolopendrifolium** (Raddi) J. Sm.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum jamesoni Hook. & Grev. = **Elaphoglossum piloselloides** (C. Presl) T. Moore

Acrostichum latifolium auct. non Sw. = **Elaphoglossum crassinerve** (Kunze) T. Moore
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum latifolium auct. non Sw. = **Elaphoglossum macrophyllum** (Mett. ex Kuhn) Fée var. **macrophyllum**
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum latifolium Sw. = **Elaphoglossum latifolium** (Sw.) J. Sm.

Acrostichum latifolium Sw. var. *rubicundum* (Pohl ex Ettingsh.) Baker = **Elaphoglossum rubicundum** (Pohl ex Ettingsh.) Alston
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum lindbergii Mett. ex Kuhn = **Elaphoglossum lindbergii** (Mett. ex Kuhn) Rosenst.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Acrostichum lindenii Bory ex Fée = **Elaphoglossum lindenii** (Bory ex Fée) T. Moore
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Acrostichum lineare Fée, hom. illeg. = **Elaphoglossum brachyneuron** (Fée) J. Sm.
Referencias: Alston, A. H. G., 1958.

Acrostichum lingua (C. Presl) Raddi, nom. illeg. = **Elaphoglossum lingua** (C. Presl) Brack.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998.

Acrostichum lorentzii Hieron. = **Elaphoglossum lorentzii** (Hieron.) H. Christ
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Acrostichum luridum Fée = **Elaphoglossum luridum** (Fée) H. Christ

Acrostichum macahense Fée = **Elaphoglossum macahense** (Fée) Rosenst.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum macrophyllum Mett. ex Kuhn = **Elaphoglossum macrophyllum** (Mett. ex Kuhn) Fée var. **macrophyllum**
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum muscosum Sw. = **Elaphoglossum muscosum** (Sw.) T. Moore

Acrostichum nigrescens Hook. = **Elaphoglossum nigrescens** (Hook.) T. Moore ex Diels
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum ornatum Mett. ex Kuhn = **Elaphoglossum ornatum** (Mett. ex Kuhn) H. Christ
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum ovatum Fée = **Elaphoglossum vagans** (Mett.) Hieron.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum pachydermum Fée = **Elaphoglossum pachydermum** (Fée) T. Moore
Referencias: Ponce, M. M., 2001; Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum pervium Lindm. = **Bolbitis serratifolia** (Mert. ex Kaulf.) Schott
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum petiolatum Sw. = **Elaphoglossum petiolatum** (Sw.) Urb.

Acrostichum piloselloides C. Presl = **Elaphoglossum piloselloides** (C. Presl) T. Moore
Referencias: Mickel, J. T., 1991; Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum praelongum Fée = **Elaphoglossum burchellii** (Baker) C. Chr.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum producens Fée = **Elaphoglossum lingua** (C. Presl) Brack.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum raddianum Hook. & Grev. = **Elaphoglossum horridulum** (Kaulf.) J. Sm.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum raddianum Kuntze = **Lomagramma guianensis** (Aubl.) Ching

Acrostichum rubicundum Pohl ex Ettingsh. = **Elaphoglossum rubicundum** (Pohl ex Ettingsh.) Alston
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum scandens Raddi = **Lomagramma guianensis** (Aubl.) Ching

Acrostichum schomburgkii Fée = **Elaphoglossum luridum** (Fée) H. Christ

Acrostichum scolopendrifolium Raddi = **Elaphoglossum scolopendrifolium** (Raddi) J. Sm.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum sculpturatum Lindm. = **Bolbitis curupirae** (Lindm.) Ching ex C. Chr.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum sellowianum Klotzsch ex Kuhn = **Elaphoglossum sellowianum** (Klotzsch ex Kuhn) T. Moore
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum serratifolium Mert. ex Kaulf. = **Bolbitis serratifoiia** (Mert. ex Kaulf.) Schott
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum simplex Sw. = **Elaphoglossum simplex** (Sw.) Schott

Acrostichum spathulatum auct. non Bory = **Elaphoglossum horridulum** (Kaulf.) J. Sm.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum spathulatum Bory = **Elaphoglossum spathulatum** (Bory) T. Moore

Acrostichum spathulinum Raddi = **Elaphoglossum horridulum** (Kaulf.) J. Sm.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum squamatum Sw., hom. illeg. = **Elaphoglossum lindenii** (Bory ex Fée) T. Moore
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Acrostichum squamipes Hook. = **Elaphoglossum squamipes** (Hook.) T. Moore

Acrostichum squamosum Cav. = **Elaphoglossum lindenii** (Bory ex Fée) T. Moore
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Acrostichum stramineum Fée = **Elaphoglossum organense** Brade

Acrostichum strictum Raddi = **Elaphoglossum strictum** (Raddi) T. Moore
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum tectum Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Elaphoglossum tectum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) T. Moore
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Acrostichum tenerum Baker, hom. illeg. = **Elaphoglossum balansae** C. Chr.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Acrostichum vagans Mett. = **Elaphoglossum vagans** (Mett.) Hieron.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Acrostichum viscosum Sw., nom. illeg. = **Elaphoglossum petiolatum** (Sw.) Urb.
Referencias: Mickel, J. T., 1991.

Bolbitis Schott

Número de especies: 2

Bolbitis crenata (C. Presl) C. Chr. = **Bolbitis serratifolia** (Mert. ex Kaulf.) Schott
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Bolbitis curupirae (Lindm.) Ching ex C. Chr.
Sin.: *Acrostichum curupiae* Lindm., *Acrostichum sculpturatum* Lindm., *Leptochilus curupiare* (Lindm.) C. Chr.
Referencias: Rosenstock, E., 1907; Sehnem, A., 1979a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 28121* (MBM)].

Bolbitis guianensis (Aubl.) K.U. Kramer ex Vareschi = **Lomagramma guianensis** (Aubl.) Ching
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Bolbitis serratifolia (Mert. ex Kaulf.) Schott
Sin.: *Acrostichum pervium* Lindm., *Acrostichum serratifolium* Mert. ex Kaulf., *Bolbitis crenata* (C. Presl) C. Chr., *Leptochilus crenatus* (C. Presl) C. Chr., *Leptochilus serratifolius* (Mert. ex Kaulf.) C. Chr.

Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1979a; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR); PRY(AMA, CAN, COA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hilgert, N. 754* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 10755* (MBM)]; PRY[*Peña-Chocarro, M. C. 304* (BM)].

Elaphoglossum Schott ex J. Sm., nom. cons.

Número de especies: 50, 11 endémicas

Elaphoglossum acutifolium Brade & Rosenst., nom. illeg. = **Elaphoglossum iguapense** Brade
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Elaphoglossum alpestre (Gardner) T. Moore
Referencias: Alston, A. H. G., 1958.
Hierba. Perenne. Nativa. 1400–1700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16447* (HBR)].
Notas: El material citado por Sehnem (1979) bajo *Elaphoglossum organense* Brade corresponde a esta especie.

Elaphoglossum altosianum H. Christ = **Elaphoglossum balansae** C. Chr.

Elaphoglossum balansae C. Chr.
Sin.: *Acrostichum tenerum* Baker, hom. illeg., *Elaphoglossum altosianum* H. Christ
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Hassler, E., 1928; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Endémica. 300–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Balansa, B. 390* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 9801* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 4612* (BM)].

Elaphoglossum beaurepairei (Fée) Brade
Sin.: *Acrostichum beaurepairei* Fée
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 6316* (*)].

Elaphoglossum bicolor Rosenst. = **Elaphoglossum vagans** (Mett.) Hieron.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

[Elaphoglossum blanchetii (Mett. ex Kuhn) C. Chr.]
Sin.: *Acrostichum blanchetii* Mett. ex Kuhn
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Elaphoglossum brachyneuron (Fée) J. Sm.
Sin.: *Acrostichum lineare* Fée, hom. illeg., *Elaphoglossum lineare* (Fée) T. Moore, comb. superfl.
Referencias: Alston, A. H. G., 1958; Sehnem, A., 1979a.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 800–1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19511* (MBM)].

Elaphoglossum brevipes (Kunze) T. Moore
Sin.: *Acrostichum brevipes* Kunze
Referencias: Alston, A. H. G., 1958.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. M. 2607* (MBM)].

Elaphoglossum burchellii (Baker) C. Chr.
Sin.: *Acrostichum burchellii* Baker, *Acrostichum praelongum* Fée, *Elaphoglossum burchellii* (Baker) C. Chr. var. *major* Rosenst., *Elaphoglossum dusenii* H. Christ, *Elaphoglossum praesiougum* (Fée) Brade
Referencias: Alston, A. H. G., 1958; Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5714* (HBR)]; PRY[*Soria, N. 1738* (FCQ)].

Elaphoglossum burchellii (Baker) C. Chr. var. *major* Rosenst. = **Elaphoglossum burchellii** (Baker) C. Chr.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Elaphoglossum chrysolepis (Fée) Alston
Sin.: *Acrostichum chrysolepis* Fée
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 75* (MBM, SP, UPCB)].

Elaphoglossum craspedariaforme (Fée) Brade ex Alston
Sin.: *Acrostichum craspedariaforme* Fée
Referencias: Alston, A. H. G., 1958.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 3550* (BM)].

Elaphoglossum crassinerve (Kunze) T. Moore
Sin.: *Acrostichum crassinerve* Kunze, *Acrostichum latifolium* auct. non Sw.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Sehnem, A., 1979a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 91* (MBM, SP, UPCB)].

Elaphoglossum crassipes (Hieron.) Diels
Sin.: *Acrostichum crassipes* Hieron.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 1000–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 2935* (SI)].

Elaphoglossum dusenii H. Christ = **Elaphoglossum burchellii** (Baker) C. Chr.

Elaphoglossum dutrae Brade
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 222* (ICN)].

Elaphoglossum edwallii Rosenst.
Sin.: *Elaphoglossum reitzii* Brade
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Nativa. 900–1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10553* (HBR)].

Elaphoglossum fonkii (Phil.) T. Moore
Sin.: *Acrostichum fonkii* Phil., *Elaphoglossum mathewsii* auct. non (Fée) T. Moore
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Looser, G., 1939, 1940[1938]; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Fonk, F. s.n.* (SGO)].
Notas: Citada como probable en Neuquén y Río Negro en la Argentina (de la Sota et al., 1998).

Elaphoglossum gayanum auct. non (Fée) T. Moore
= **Elaphoglossum skottsbergii** Krajina
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Elaphoglossum gayanum (Fée) T. Moore
Sin.: *Acrostichum conforme* auct. non Sw., *Acrostichum gayanum* Fée
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC); BRA(PAR); CHL(IX, X); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7505* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 25745* (MBM)]; CHL[*Gunckel, L. H. 44631* (CONC)]; URY[*Marchesi, E. 1005* (MVFA)].

Elaphoglossum gertii Sehnem
Sin.: *Elaphoglossum hatschbachii* Sehnem, nom. nud.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 10794* (*)].

Elaphoglossum hartwegii (Fée) T. Moore
Sin.: *Acrostichum hartwegii* Fée
Referencias: Mickel, J. T. & Smith, A. R., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: CHL(sin localidad).
Notas: Citada para Chile sin indicar localidad o material de referencia (Mickel & Smith, 2004).

Elaphoglossum hassleri H. Christ
Sin.: *Elaphoglossum latifolium* auct. non (Sw.) J. Sm.
Referencias: Hassler, E., 1928; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAN, COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5660* (G)].

Elaphoglossum hatschbachii Sehnem, nom. nud.
= **Elaphoglossum gertii** Sehnem
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Elaphoglossum horridulum (Kaulf.) J. Sm.
Sin.: *Acrostichum raddianum* Hook. & Grev., *Acrostichum spathulatum* auct. non Bory, *Acrostichum spathulinum* Raddi
Referencias: Alston, A. H. G., 1958; Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Nativa. 900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dombrowski, L. T. 2884* (MBM)].

Elaphoglossum hymenodiastrum (Fée) Brade
= **Elaphoglossum macrophyllum** (Mett. ex Kuhn) Fée var. **macrophyllum**
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Elaphoglossum iguapense Brade
Sin.: *Elaphoglossum acutifolium* Brade & Rosenst., nom. illeg.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. 1077* (HBR)].

Elaphoglossum itatiayensis Rosenst.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10550* (HBR)].

Elaphoglossum jamesonii (Hook. & Grev.) T. Moore
= **Elaphoglossum piloselloides** (C. Presl) T. Moore

Elaphoglossum lagesianum Rosenst.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3277* (HBR)].

Elaphoglossum latifolium auct. non (Sw.) J. Sm.
= **Elaphoglossum hassleri** H. Christ

[Elaphoglossum latifolium (Sw.) J. Sm.]
Sin.: *Acrostichum latifolium* Sw.
Referencias: Ponce, M. M., 2001.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Elaphoglossum lindbergii (Mett. ex Kuhn) Rosenst.
Sin.: *Acrostichum lindbergii* Mett. ex Kuhn
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 400–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 2937* (SI)].

Elaphoglossum lindenii (Bory ex Fée) T. Moore
Sin.: *Acrostichum lindenii* Bory ex Fée, *Acrostichum squamatum* Sw., hom. illeg., *Acrostichum squamosum* Cav., *Elaphoglossum squamatum* (Sw.) T. Moore

Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 400 m.
Países: CHL(IJF).

Elaphoglossum lineare (Fée) T. Moore, comb. superfl.
= **Elaphoglossum brachyneuron** (Fée) J. Sm.
Referencias: Alston, A. H. G., 1958.

Elaphoglossum lingua (C. Presl) Brack.
Sin.: *Acrostichum conforme* auct. non Sw., *Acrostichum lingua* (C. Presl) Raddi, nom. illeg., *Acrostichum producens* Fée, *Olfersia lingua* C. Presl
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Sehnem, A., 1979a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 253* (MBM, SP, UPCB)].

Elaphoglossum lorentzii (Hieron.) H. Christ
Sin.: *Acrostichum lorentzii* Hieron.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–3200 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 401* (SI)].

Elaphoglossum luridum (Fée) H. Christ
Sin.: *Acrostichum luridum* Fée, *Acrostichum schomburgkii* Fée, *Elaphoglossum schomburgkii* (Fée) T. Moore
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bresolin, A. 411* (FLOR, HBR)].

Elaphoglossum macahense (Fée) Rosenst.
Sin.: *Acrostichum macahense* Fée
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2064* (HBR)].

Elaphoglossum macrophyllum (Mett. ex Kuhn) Fée var. **macrophyllum**
Sin.: *Acrostichum hymenodiastrum* Fée, *Acrostichum latifolium* auct. non Sw., *Acrostichum macrophyllum* Mett. ex Kuhn, *Elaphoglossum hymenodiastrum* (Fée) Brade
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Sehnem, A., 1979a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 140* (MBM, SP, UPCB)].

Elaphoglossum macrophyllum (Mett. ex Kuhn) Fée var. **schmalzii** (Rosenst.) Alston
Sin.: *Elaphoglossum schmalzii* Rosenst.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4226* (HBR)].

Elaphoglossum mathewsii auct. non (Fée) T. Moore
= **Elaphoglossum fonkii** (Phil.) T. Moore

Elaphoglossum minutum (Pohl ex Fée) T. Moore
Referencias: Alston, A. H. G., 1958.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ribas, O. S. 3078* (MBM)].

[Elaphoglossum muscosum (Sw.) T. Moore]
Sin.: *Acrostichum muscosum* Sw.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Elaphoglossum nigrescens (Hook.) T. Moore ex Diels
Sin.: *Acrostichum flaccidum* Fée var. *pallidum* Baker, *Acrostichum nigrescens* Hook., *Elaphoglossum wacketii* Rosenst., *Elaphoglossum williamsii* Vareschi
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Sehnem, A., 1979a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 297* (MBM, SP, UPCB)].

[Elaphoglossum organense Brade]
Sin.: *Acrostichum stramineum* Fée
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Elaphoglossum ornatum (Mett. ex Kuhn) H. Christ
Sin.: *Acrostichum ornatum* Mett. ex Kuhn
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Sehnem, A., 1979a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 231* (MBM, SP, UPCB)].

Elaphoglossum pachydermum (Fée) T. Moore
Sin.: *Acrostichum pachydermum* Fée
Referencias: Ponce, M. M., 2001; Sehnem, A., 1979a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 394* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 5091* (HBR)].

Elaphoglossum paulistanum Rosenst.
Referencias: Alston, A. H. G., 1958; Sehnem, A., 1979a.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 10033* (MBM)].

[Elaphoglossum petiolatum (Sw.) Urb.]
Sin.: *Acrostichum petiolatum* Sw., *Acrostichum viscosum* Sw., nom. illeg., *Elaphoglossum viscosum* J. Sm.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Elaphoglossum piloselloides (C. Presl) T. Moore
Sin.: *Acrostichum jamesoni* Hook. & Grev., *Acrostichum piloselloides* C. Presl, *Elaphoglossum jamesonii* (Hook. & Grev.) T. Moore, *Elaphoglossum spathulatum* (Bory) T. Moore var. *piloselloides* (C. Presl) C. Chr.

Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Mickel, J. T., 1991; Sehnem, A., 1979a; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–3600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29920* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 27551* (MBM)].
Notas: Citada para Chile sin indicar localidad o material de referencia (R. M. Tryon & Stolze, 1991).

Elaphoglossum porteri Hicken
Sin.: *Elaphoglossum rudolphii* Espinosa
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–900 m.
Países: ARG(sin localidad); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hauman, L. L. 85* (SI)]; CHL[*Espinoza, N. s.n.* (CONC)].
Notas: Probablemente se halle en Río Negro y Neuquén, Argentina.

Elaphoglossum praesiougum (Fée) Brade = **Elaphoglossum burchellii** (Baker) C. Chr.

Elaphoglossum reitzii Brade = **Elaphoglossum edwallii** Rosenst.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Elaphoglossum rubicundum (Pohl ex Ettingsh.) Alston
Sin.: *Acrostichum latifolium* Sw. var. *rubicundum* (Pohl ex Ettingsh.) Baker, *Acrostichum rubicundum* Pohl ex Ettingsh.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Sehnem, A., 1979a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 263* (MBM, SP, UPCB)].

Elaphoglossum rudolphii Espinosa = **Elaphoglossum porteri** Hicken
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Elaphoglossum schiffneri C. Chr. = **Elaphoglossum vagans** (Mett.) Hieron.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Elaphoglossum schmalzii Rosenst. = **Elaphoglossum macrophyllum** (Mett. ex Kuhn) Fée var. **schmalzii** (Rosenst.) Alston
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Elaphoglossum schomburgkii (Fée) T. Moore = **Elaphoglossum luridum** (Fée) H. Christ

Elaphoglossum schwackeanum Brade
Referencias: Brade, A. C., 1965.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dittrich, V. A. 323* (MBM)].

Elaphoglossum scolopendrifolium (Raddi) J. Sm.
Sin.: *Acrostichum glaziovii* Fée, *Acrostichum insignis* Fée, *Acrostichum scolopendrifolium* Raddi
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 107* (HBR)].

Elaphoglossum sellowianum (Klotzsch ex Kuhn) T. Moore
Sin.: *Acrostichum brasiliense* Spreng. ex Kuhn, *Acrostichum sellowianum* Klotzsch ex Kuhn
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 2347* (HBG)].

[Elaphoglossum simplex (Sw.) Schott]
Sin.: *Acrostichum simplex* Sw.
Referencias: Marchesi, E., 1964.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Elaphoglossum skottsbergii Krajina
Sin.: *Elaphoglossum gayanum* auct. non (Fée) T. Moore, *Elaphoglossum tahitense* auct. non Brack.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 400–500 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, C. J. F. 691* (*)].
Notas: Endémica de la Isla de Pascua, Chile.

Elaphoglossum spannagelii Rosenst. = **Elaphoglossum ulei** C. Chr.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

[Elaphoglossum spathulatum (Bory) T. Moore]
Sin.: *Acrostichum spathulatum* Bory
Referencias: Mickel, J. T., 1991.

Elaphoglossum spathulatum (Bory) T. Moore var. *piloselloides* (C. Presl) C. Chr. = **Elaphoglossum piloselloides** (C. Presl) T. Moore
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Elaphoglossum squamatum (Sw.) T. Moore = **Elaphoglossum lindenii** (Bory ex Fée) T. Moore
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Elaphoglossum squamipes (Hook.) T. Moore
Sin.: *Acrostichum squamipes* Hook.
Referencias: Mickel, J. T. & Smith, A. R., 2004; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 1000–1400 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Barbosa, E. 430* (MBM)].

Elaphoglossum strictum (Raddi) T. Moore
Sin.: *Acrostichum strictum* Raddi, *Elaphoglossum strictum* (Raddi) T. Moore var. *discolor* Rosenst.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Sehnem, A., 1979a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 106* (MBM, SP, UPCB)].

Elaphoglossum strictum (Raddi) T. Moore var. *discolor* Rosenst. = **Elaphoglossum strictum** (Raddi) T. Moore
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Elaphoglossum subarborescens Rosenst.
Referencias: Alston, A. H. G., 1958; Labiak, P. H. & Prado, J., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 244* (MBM, SP, UPCB)].

Elaphoglossum subcochleare H. Christ
Referencias: Hassler, E., 1928; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAN, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5661* (BM)].

Elaphoglossum tahitense auct. non Brack. = **Elaphoglossum skottsbergii** Krajina
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Elaphoglossum tectum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) T. Moore
Sin.: *Acrostichum tectum* Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–600 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Wagner, E. R. s.n.* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 68285* (MBM)].

Elaphoglossum tenax Rosenst.
Referencias: Alston, A. H. G., 1958.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Spannagel, C. s.n.* (SP)].

Elaphoglossum ulei C. Chr.
Sin.: *Elaphoglossum spannagelii* Rosenst.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Spannagel, C. 2* (HBR)].

Elaphoglossum vagans (Mett.) Hieron.
Sin.: *Acrostichum conforme* auct. non Sw., *Acrostichum ovatum* Fée, *Acrostichum vagans* Mett., *Elaphoglossum bicolor* Rosenst., *Elaphoglossum schiffneri* C. Chr.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5100* (HBR)].

Elaphoglossum viscosum J. Sm. = **Elaphoglossum petiolatum** (Sw.) Urb.
Referencias: Mickel, J. T., 1991.

Elaphoglossum wacketii Rosenst. = **Elaphoglossum nigrescens** (Hook.) T. Moore ex Diels
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Elaphoglossum wettsteinii H. Christ
Referencias: Sehnem, A., 1979a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 21187* (PACA)].

Elaphoglossum williamsii Vareschi = **Elaphoglossum nigrescens** (Hook.) T. Moore ex Diels

Elaphoglossum yungense de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 100–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Holmbert 9684* (SI)].

Leptochilus crenatus (C. Presl) C. Chr. = **Bolbitis serratifolia** (Mert. ex Kaulf.) Schott
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Leptochilus curupiare (Lindm.) C. Chr. = **Bolbitis curupirae** (Lindm.) Ching ex C. Chr.
Referencias: Sehnem, A., 1979a.

Leptochilus guianensis (Aubl.) C. Chr. = **Lomagramma guianensis** (Aubl.) Ching
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Leptochilus serratifolius (Mert. ex Kaulf.) C. Chr. = **Bolbitis serratifolia** (Mert. ex Kaulf.) Schott
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Sehnem, A., 1979a.

Lomagramma J. Sm.

Número de especies: 1

Lomagramma guianensis (Aubl.) Ching
Sin.: *Acrostichum guianense* (Aubl.) Baker, *Acrostichum raddianum* Kuntze, *Acrostichum scandens* Raddi, *Bolbitis guianensis* (Aubl.) K.U. Kramer ex Vareschi, *Leptochilus guianensis* (Aubl.) C. Chr., *Polypodium guianense* Aubl.
Referencias: Hassler, E., 1928; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1979a; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.
Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18121* (MBM)]; PRY[*Peña-Chocarro, M. C. 357* (BM)].

Lomaria marginata Schrad. = **Lomariopsis marginata** (Schrad.) Kuhn
Referencias: Moran, R. C., 2000; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002.

Lomaria scandens auct. non Willd. = **Lomariopsis marginata** (Schrad.) Kuhn
Referencias: Moran, R. C., 2000.

Lomariopsis Fée

Número de especies: 1

Lomariopsis elongata Fée = **Lomariopsis marginata** (Schrad.) Kuhn
Referencias: Moran, R. C., 2000.

Lomariopsis erythrodes (Kunze) Fée = **Lomariopsis marginata** (Schrad.) Kuhn
Referencias: Moran, R. C., 2000.

Lomariopsis lanceolata Klotzsch ex Holttum = **Lomariopsis marginata** (Schrad.) Kuhn
Referencias: Moran, R. C., 2000.

Lomariopsis marginata (Schrad.) Kuhn
Sin.: *Acrostichum erythrodes* Kunze, *Lomaria fraxinifolia* Raddi, *Lomaria marginata* Schrad., *Lomaria scandens* auct. non Willd., *Lomariopsis elongata* Fée, *Lomariopsis erythrodes* (Kunze) Fée, *Lomariopsis lanceolata* Klotzsch ex Holttum, *Lomariopsis speciosa* Klotzsch ex Holttum, *Stenochlaena erythrodes* (Kunze) Underw., *Stenochlaena marginata* (Schrad.) C. Chr.
Referencias: Moran, R. C., 2000; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002.
Hierba hemiepífita. Perenne. Nativa. 200–1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 3088* (B, GH, M)].

Lomariopsis speciosa Klotzsch ex Holttum = **Lomariopsis marginata** (Schrad.) Kuhn
Referencias: Moran, R. C., 2000.

Olfersia lingua C. Presl = **Elaphoglossum lingua** (C. Presl) Brack.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998.

Polypodium guianense Aubl. = **Lomagramma guianensis** (Aubl.) Ching
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1991.

Stenochlaena erythrodes (Kunze) Underw. = **Lomariopsis marginata** (Schrad.) Kuhn
Referencias: Moran, R. C., 2000.

Stenochlaena marginata (Schrad.) C. Chr. = **Lomariopsis marginata** (Schrad.) Kuhn
Referencias: Moran, R. C., 2000.

LYCOPODIACEAE

Autor: Rolleri, C.
Revisor: Øllgaard, B.

3 géneros, 36 especies, 16 especies endémicas.

Austrolycopodium alboffii (Rolleri) Holub = **Lycopodium alboffii** Rolleri
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Austrolycopodium confertum (Willd.) Holub = **Lycopodium confertum** Willd.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Austrolycopodium erectum (Phil.) Holub = **Lycopodium erectum** Phil.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Austrolycopodium magellanicum (P. Beauv.) Holub = **Lycopodium magellanicum** (P. Beauv.) Sw.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1994.

Austrolycopodium paniculatum (Desv.) Holub = **Lycopodium paniculatum** Desv.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Diphasiastrum thyoides (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Holub = **Lycopodium thyoides** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Huperzia Bernh.

Número de especies: 22, 10 endémicas

Huperzia acerosa (Sw.) Holub
Sin.: *Huperzia verticillata* auct. non (L. f.) Trevis., *Lycopodium acerosum* Sw., *Lycopodium verticillatum* auct. non L. f., *Urostachys acerosus* (Sw.) Herter ex Nessel, *Urostachys verticillatus* auct. non (L. f.) Herter
Referencias: Holub, J. L., 1985; Nessel, H., 1927; Øllgaard, B., 1992; Toursarkissian, M., 1971.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–2600 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. s.n.* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 43026* (NY)].

Huperzia andina (Rosenst.) Holub = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.
Referencias: Holub, J. L., 1985; Rolleri, C. H., 1977a, b.

Huperzia aschersonii (Herter) Holub = **Huperzia quadrifariata** (Bory) Rothm.

Huperzia axillaris (Roxb.) Rothm. = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B., 1992; Rolleri, C. H., 1977a, b.

Huperzia badiniana B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Øllgaard, B., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 2300–2400 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 2333* (HBG)].

Huperzia bifida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Holub = **Huperzia reflexa** (Lam.) Trevis.
Referencias: Holub, J. L., 1985; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Huperzia biformis (Hook.) Holub
Sin.: *Lycopodium biforme* Hook., *Urostachys biformis* (Hook.) Herter
Referencias: Holub, J. L., 1985; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Øllgaard, B., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–2400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dala Rosa, C. 31* (NY)].

Huperzia catharinae (Christ) Holub
Sin.: *Lycopodium catharinae* Christ
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 313* (US)].

[Huperzia christii (Silveira) Holub]
Sin.: *Lycopodium christii* Silveira
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Huperzia flexibilis (Fée) B. Øllg.
Sin.: *Lycopodium flexibile* Fée, *Lycopodium linifolium* L. var. *sanguineum* Spring, *Lycopodium linifolium* L. var. *subaristatum* Christ, *Urostachys linifolius* (L.) Herter var. *flexibilis* (Fée) Nessel, *Urostachys linifolius* (L.) Herter var. *sanguineus* (Spring) Nessel
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Øllgaard, B., 1987.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 96* (MBM, SP, UPCB)].

Huperzia fontinaloides (Spring) Trevis.
Sin.: *Lycopodium fontinaloides* Spring, *Lycopodium fontinaloides* Spring var. *brasiliense* Spring, *Lycopodium serpyllifolium* Fée, *Urostachys fontinaloides* (Spring) Nessel, *Urostachys fontinaloides* (Spring) Nessel var. *serpyllifolius* (Fée) Nessel & Hoehne, *Urostachys gehrtii* Nessel, *Urostachys serpyllifolium* (Fée) Herter
Referencias: Nessel, H., 1927; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–2400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ribas, O. S. 3256* (CTES, SI)].

Huperzia friburgensis (Nessel) B. Øllg. & P.G. Windisch
Sin.: *Lycopodium friburgense* (Nessel) Rolleri, *Urostachys friburgensis* Nessel, *Urostachys reflexus* (Lam.) Herter var. *friburgensis* (Nessel) Nessel
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Rolleri, C. H., 1984.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 500–2000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 17178* (US)]; PRY[*Balansa, B. 4474* (US)].

Huperzia fuegiana (Roiv.) Holub
Sin.: *Huperzia selago* auct. non (L.) Schrank & Mart., *Lycopodium fuegianum* Roiv., *Lycopodium selago* auct. non L., *Urostachys fuegianus* (Roiv.) Herter, *Urostachys selago* (L.) Herter var. *aschersonianus* Herter ex Nessel, *Urostachys selago* (L.) Herter var. *hessei* Herter ex Nessel
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Holub, J. L., 1985; Øllgaard, B., 1992; Rodríguez Ríos, R., 1995; Rolleri, C. H., 1974, 1979[1978].
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 4628* (LIL)]; CHL[*Pisano, E. 8797* (CONC)].

Huperzia heterocarpon (Fée) Holub
Sin.: *Huperzia longearistata* (Christ) Holub, *Lycopodium heterocarpon* Fée, *Lycopodium longearistatum* Christ, *Urostachys dichotomus* (Jacq.) Herter var. *spegazzini* (Nessel) Nessel, *Urostachys heterocarpon* (Fée) Herter, *Urostachys heterocarpon* (Fée) Herter var. *longearistatus* (Christ) Nessel, *Urostachys longearistatus* (Christ) Nessel, *Urostachys portoanus* Nessel, *Urostachys spegazzini* Nessel
Referencias: Holub, J. L., 1985; Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Øllgaard, B., 1992; Toursarkissian, M., 1971.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1600 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (BA, BAB, BAF)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 6673* (NY)].

Huperzia hexasticha B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 1000–2400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 45489* (S)].

Huperzia mandiocana (Raddi) Trevis.
Sin.: *Lycopodium dichotomum* Grev. & Hook., hom. illeg., *Lycopodium dichotomun* Jacq. var. *mandiocanum* (Raddi) Rosenst., *Lycopodium mandiocanum* Raddi, *Lycopodium mandiocanum* Raddi var. *brasiliense* Spring, *Lycopodium pithyoides* Schltdl. & Cham., *Lycopodium pseudomandiocanum* Herter, *Urostachys mandiocanus* (Raddi) Herter, *Urostachys mandiocanus* (Raddi) Nessel var. *brasiliensis* (Spring) Nessel, *Urostachys pseudomandicanus* (Herter) Nessel
Referencias: de la Sota, E. R., 1972d; Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Øllgaard, B., 1987, 1992; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Rolleri, C. H., 1981.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Crisci, J. V. 302* (LP)]; BRA[*Labiak, P. H. 235* (SP, UPCB)]; PRY[*Jiménez, B. 0192* (BM, PY)].

Huperzia passerinoides (Kunth) Trevis. = **Huperzia taxifolia** (Sw.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Huperzia passerinoides (Kunth) Trevis. var. *nitens* (Schltdl. & Cham.) Trevis. = **Huperzia taxifolia** (Sw.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Huperzia phylicifolia (Desv. ex Poir.) Holub
Sin.: *Lycopodium congestifolium* Spring, *Lycopodium nubigenum* Herzog, *Lycopodium phylicifolium* Desv. ex Poir., *Urostachys nubigenus* (Herzog) Herter ex Nessel, *Urostachys phylicifolius* (Poir.) Herter ex Nessel
Referencias: Jørgensen, P. M., 1999b; Kessler, M., Krömer, T. & Jiménez, I., 2000; Øllgaard, B., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: CHL(sin localidad).
Ejemplares de referencia: CHL[*Desvaux, N. A. 1896* (P)].

Huperzia pungentifolia (Silveira) B. Øllg.
Sin.: *Lycopodium ouropretanum* Christ, *Lycopodium pungentifolium* Silveira, *Urostachys hennebergorum* Nessel, *Urostachys pungentifolius* (Silveira) Nessel, *Urostachys reflexus* (Lam.) Herter var. *pungentifolius* (Silveira) Nessel
Referencias: Nessel, H., 1927; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Øllgaard, B., 1992; Rolleri, C. H., 1984.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Endémica. 1200–1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 42279* (US)].

Huperzia quadrifariata (Bory) Rothm.
Sin.: *Huperzia aschersonii* (Herter) Holub, *Lycopodium aschersonii* Herter, *Lycopodium fontinaloides* Spring var. *coronata* Fée, *Lycopodium quadrangulare* Spring, *Lycopodium quadrifariatum* Bory, *Urostachys aschersonii* (Herter) Nessel, *Urostachys fontinaloides* (Spring) Nessel var. *coronatus* (Fée) Nessel, *Urostachys quadrangularis* (Spring) Nessel, *Urostachys quadrifariatus* (Bory) Nessel
Referencias: Nessel, H., 1927; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Øllgaard, B., 1992.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 100–1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, 3306* (SI)].

Huperzia reflexa (Lam.) Trevis.
Sin.: *Huperzia bifida* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Holub, *Huperzia reflexa* (Lam.) Trevis. var. *bifida* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Trevis., *Lycopodium bifidum* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Lycopodium brutum* Herter, *Lycopodium mexiae* Copel., *Lycopodium reflexum* Lam., *Lycopodium reflexum* Lam. var. *caesium* Vareschi, *Lycopodium reflexum* Lam. var. *majus* Spring, *Lycopodium reversum* C. Presl, *Plananthus reflexus* (Lam.) P. Beauv., *Urostachys bifidus* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Herter ex Nessel, *Urostachys intermedius* (Spring) Herter var. *cipoanus* Nessel, *Urostachys jergii* Nessel, *Urostachys parvifolius* Nessel, *Urostachys reflexus* (Lam.) Herter, *Urostachys reflexus* Lam. var. *brutus* (Herter) Nessel, *Urostachys reflexus* Lam. var. *parvifolius* (Nessel) Nessel, *Urostachys reversus* (C. Presl) Herter, *Urostachys stellae-polaris* Herter
Referencias: Øllgaard, B., 1992; Rolleri, C. H., 1981; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 8094a* (US)].

Huperzia reflexa (Lam.) Trevis. var. *bifida* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Trevis. = **Huperzia reflexa** (Lam.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Huperzia rubiginosus Nessel = **Huperzia taxifolia** (Sw.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Huperzia sanctae-barbarae (Rolleri) Rolleri & Deferrari
Sin.: *Lycopodium sanctae-barbarae* Rolleri
Referencias: Øllgaard, B., 1992; Rolleri, C. H., 1972, 1981.
Hierba. Perenne. Endémica. 2300 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 2883* (LP)].

Huperzia saururoides (Bory & d'Urv.) Rothm.
Sin.: *Lycopodium selago* L. var. *sauroides* Bory & d'Urv. ex Baker, *Urostachys saururoides* (Bory & d'Urv. ex Baker) Herter ex Nessel
Hierba. Perenne. Endémica. 100–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hooker, J. D. s.n.* (K)].
Notas: Podría tratarse de *Huperzia fuegiana* (Roiv.) Holub., que sí crece en localidades de las Islas Malvinas, Argentina (Zuloaga & Morrone, 1996).

Huperzia saururus (Lam.) Trevis.
Sin.: *Huperzia andina* (Rosenst.) Holub, *Huperzia axillaris* (Roxb.) Rothm., *Lycopodium andinum* Rosenst., *Lycopodium axillare* Roxb., *Lycopodium breve* Herter, *Lycopodium elongatum* Lag. ex Sw., *Lycopodium saururus* Lam., *Plananthus saururus* (Lam.) P. Beauv., *Selago indica* Dill., nom. inval., *Urostachys andinus* (Rosenst.) Herter ex Nessel, *Urostachys axillaris* (Roxb.) Herter ex Nessel, *Urostachys brevis* (Herter) Herter ex Nessel, *Urostachys elongatus* (Sw.) Herter, *Urostachys saururus* (Lam.) Herter
Referencias: de la Sota, E. R., 1972d, 1977; Holub, J. L., 1985; Øllgaard, B., 1992; Rolleri, C. H., 1972, 1977a, b, 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 2848* (SI)].

Huperzia selago auct. non (L.) Schrank & Mart. = **Huperzia fuegiana** (Roiv.) Holub
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Huperzia sellowiana (Herter) B. Øllg.
Sin.: *Lycopodium sellowianum* Herter
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 200–1800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Schmalz, R. 204* (NY)].

[Huperzia silveirae (Nessel) B. Øllg. & P.G. Windisch]
Sin.: *Urostachis silveirae* Nessel
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Huperzia sotae (Rolleri) Holub
Sin.: *Lycopodium sotae* Rolleri
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Holub, J. L., 1985; Øllgaard, B., 1992.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 1000–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 4420* (LP)].

Huperzia subulata (Desv. ex Poir.) Holub
Sin.: *Lycopodium ewanii* (Herter) C.V. Morton, *Lycopodium subulatum* Desv. ex Poir., *Urostachys ewanii* Herter, *Urostachys subulatus* (Desv. ex Poir.) Herter ex Nessel
Referencias: Holub, J. L., 1985; Rolleri, C. H., 1972; de la Sota, E. R., 1977; Øllgaard, B., 1988.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 1000–1200 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Santos Biloni, J. 6482* (SI)].

Huperzia taxifolia (Sw.) Trevis.
Sin.: *Huperzia passerinoides* (Kunth) Trevis., *Huperzia passerinoides* (Kunth) Trevis. var. *nitens* (Schltdl. & Cham.) Trevis., *Huperzia rubiginosus* Nessel, *Lycopodium herminieri* Spring, *Lycopodium nitens* Schltdl. & Cham., *Lycopodium passerinoides* Kunth, *Lycopodium schwendeneri* Herter, *Lycopodium taxifolium* Sw., *Lycopodium taxifolium* Sw. var. *passerinoides* (Kunth) Baker, *Phlegmariurus taxifolius* (Sw.) A. Löve & D. Löve, *Urostachys nitens* (Schltdl. & Cham.) Herter, *Urostachys passerinoides* Kunth var. *nitens* (Schltdl. & Cham.) Herter ex Nessel, *Urostachys rubiginosus* Herter ex Nessel, *Urostachys schwendeneri* (Herter) Herter, *Urostachys schwendeneri* (Herter) Herter var. *nitens* (Schltdl. & Cham.) Herter ex Nessel, *Urostachys taxifolius* (Sw.) Herter
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1994.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 800–2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 242* (MBM, SP, UPCB)].

Huperzia verticillata auct. non (L. f.) Trevis. = **Huperzia acerosa** (Sw.) Holub
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Øllgaard, B., 1992.

Lepidotis alopecuroides (L.) Rothm. = **Lycopodiella alopecuroides** (L.) Cranfill var. **alopecuroides**
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lepidotis cernua (L.) P. Beauv. = **Lycopodiella cernua** (L.) Pic. Serm.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lepidotis clavata (L.) P. Beauv. = **Lycopodium clavatum** L.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lepidotis magellanica P. Beauv. = **Lycopodium magellanicum** (P. Beauv.) Sw.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Rolleri, C. H., 1979[1978].

Lycopodiella Holub

Número de especies: 6

Lycopodiella alopecuroides (L.) Cranfill var. **alopecuroides**
Sin.: *Lepidotis alopecuroides* (L.) Rothm., *Lycopodium alopecuroides* L., *Lycopodium alopecuroides* L. f. *bistachya* Rosenst. ex Nessel, *Plananthus alopecuroides* (L.) P. Beauv.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Legrand, C. M. D. E. & Lombardo, A., 1958; Øllgaard, B., 1987, 1992; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Toursarkissian, M., 1971.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, COS, MIS); BRA(RGS); PRY(AMA, CAN); URY(CAL, MAL, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (SI)]; BRA[*Windisch, P. G. 8727* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 5264* (BM)].
Notas: Citado para Uruguay sin indicar ejemplar de referencia (Legrand & Lombardo, 1958).

Lycopodiella alopecuroides (L.) Cranfill var. **integerrima** (Spring) B. Øllg. & P.G. Windisch
Sin.: *Lycopodium alopecuroides* L. var. *divaricatum* Nessel, *Lycopodium alopecuroides* L. var. *integerrimum* Spring, *Lycopodium alopecuroides* L. var. *longipes* (Grev. & Hook.) Rosenst., *Lycopodium longipes* Grev. & Hook.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6146* (PY)].

Lycopodiella alopecuroides (L.) Cranfill var. **tupiana** B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2300 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU); URY(CAS, COL, MAL, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 16756* (S)]; PRY[*Krapovickas, A. 12539* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 3326* (LP)].

Lycopodiella camporum B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–1800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Prado, J. 69* (AAU, HB, RB, SP, SPF)]; PRY[*Basualdo, I. 2873* (FCQ)].

Lycopodiella caroliniana (L.) Pic. Serm. var. **meridionalis** (Underw. & F.E. Lloyd) B. Øllg. & P.G. Windisch
Sin.: *Lycopodium carolinianum* L. var. *meridionalis* Nessel, *Lycopodium meridionale* Underw., *Pseudolycopodiella meridionalis* (Underw. & F.E. Lloyd) Holub
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Toursarkissian, M., 1971.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jiménez, B. 1465-bj* (BM, CTES, PY)].

Lycopodiella caroliniana (L.) Pic. Serm. var. **paradoxa** (Mart.) B. Øllg. & P.G. Windisch
Sin.: *Lycopodium carolinianum* L. subsp. *paradoxus* (Mart.) Hassl., *Lycopodium carolinianum* L. var. *paradoxum* (Mart.) Christ, *Lycopodium paradoxum* Mart., *Pseudolycopodiella paradoxa* (Mart.) Holub
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Sparre, B. B. 2039* (PY)].

Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm.
Sin.: *Lepidotis cernua* (L.) P. Beauv., *Lycopodiella sikkimense* Müll.Berol., *Lycopodium boryanum* A. Rich., *Lycopodium capillaceum* (Spring) Willd. ex Hieron., *Lycopodium cernuum* L., *Lycopodium cernuum* L. var. *capillaceum* Spring, *Lycopodium cernuum* L. var. *panamense* Wercklé ex Nessel, *Lycopodium cernuum* L. var. *watsonianum* Nessel, *Lycopodium cymosum* L' Herm. ex Hieron., *Lycopodium heeschii* Müll.Berol., *Lycopodium hupeanum* Müll.Berol., *Lycopodium marianum* Willd., *Lycopodium moritzii* Müll.Berol., *Palhinhaea capillacea* (Spring) Holub, *Palhinhaea cernua* Franco & Vascon
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Mereles, F., 2001; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Øllgaard, B., 1987; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Toursarkissian, M., 1971.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2200 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR); PRY(CAA, CAN, COA, GUA); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6601* (SI)]; BRA[*Prado, J. 423* (NY)]; PRY[*Schinini, A. 28041* (CTES, SI)]; URY[*Del Puerto, O. 1813a* (MVFA)].

Lycopodiella eichleri (Fée) B. Øllg. = **Lycopodiella pendulina** (Hook.) B. Øllg.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodiella geometra B. Øllg. & P.G. Windisch
Sin.: *Lycopodium alopecuroides* L. var. *furcatum* Fée, *Lycopodium alopecuroides* L. var. *hoehneanum* Nessel, *Lycopodium alopecuroides* L. var. *nettoanum* Baker
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–1300 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Brade, A. C. 19723* (AAU, RB)]; PRY[*Hassler, E. 9095* (PY)].

Lycopodiella pendulina (Hook.) B. Øllg.
Sin.: *Lycopodiella eichleri* (Fée) B. Øllg., *Lycopodium cernuum* L. var. *eichleri* (Fée) Nessel, *Lycopodium cernuum* L. var. *pendulinum* (Hook.) Baker, *Lycopodium eichleri* Fée, *Lycopodium pendulinum* Hook., *Palhinhaea eichleri* (Fée) Holub, *Palhinhaea pendulina* (Hook.) Holub
Referencias: Holub, J. L., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–600 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Brunner, D. R. 1519* (MO, PY)].

Lycopodiella sikkimense Müll.Berol. = **Lycopodiella cernua** (L.) Pic. Serm.

Lycopodium L.

Número de especies: 8, 6 endémicas

Lycopodium acerosum Sw. = **Huperzia acerosa** (Sw.) Holub
Referencias: Holub, J. L., 1985; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Øllgaard, B., 1992.

Lycopodium alboffii Rolleri
Sin.: *Austrolycopodium alboffii* (Rolleri) Holub, *Lycopodium clavatum* L. f. *nana* Albov, *Lycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Sw. var. *maius* Herter ex Nessel, *Lycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Sw. var. *nanum* (Albov) Looser, *Lycopodium nanum* Herter
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; de la Sota, E. R. & Rolleri, C. H., 1972; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Holub, J. L., 1991; Rodríguez Ríos, R., 1995; Rolleri, C. H., 1979[1978].
Hierba. Perenne. Endémica. 100–300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 477* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 3360* (CONC)].

Lycopodium alopecuroides L. = **Lycopodiella alopecuroides** (L.) Cranfill var. **alopecuroides**
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Øllgaard, B., 1988; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Lycopodium alopecuroides L. f. *bistachya* Rosenst. ex Nessel = **Lycopodiella alopecuroides** (L.) Cranfill var. **alopecuroides**
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium alopecuroides L. var. *divaricatum* Nessel = **Lycopodiella alopecuroides** (L.) Cranfill var. **integerrima** (Spring) B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium alopecuroides L. var. *furcatum* Fée = **Lycopodiella geometra** B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium alopecuroides L. var. *hoehneanum* Nessel = **Lycopodiella geometra** B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium alopecuroides L. var. *integerrimum* Spring = **Lycopodiella alopecuroides** (L.) Cranfill var. **integerrima** (Spring) B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium alopecuroides L. var. *longipes* (Grev. & Hook.) Rosenst. = **Lycopodiella alopecuroides** (L.) Cranfill var. **integerrima** (Spring) B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium alopecuroides L. var. *nettoanum* Baker = **Lycopodiella geometra** B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium anceps Wallr., hom. illeg. = **Lycopodium complanatum** L. var. **anceps** Asch.

Lycopodium andinum Rosenst. = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.
Referencias: Holub, J. L., 1985; Rolleri, C. H., 1981; de la Sota, E. R., 1977; Øllgaard, B., 1987.

Lycopodium aristatum Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Lycopodium clavatum** L.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Øllgaard, B., 1992.

Lycopodium aristatum Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *desvauxianum* Spring = **Lycopodium clavatum** L.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium aristatum Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *incurvum* Grev. & Hook. = **Lycopodium clavatum** L.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium aristatum Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *robustius* Grev. & Hook. = **Lycopodium clavatum** L.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium aschersonii Herter = **Huperzia quadrifariata** (Bory) Rothm.

Lycopodium axillare Roxb. = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.
Referencias: Holub, J. L., 1985; Øllgaard, B., 1987; Rolleri, C. H., 1981.

Lycopodium barrosii (Looser) Herter = **Lycopodium confertum** Willd.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Rolleri, C. H., 1979[1978].

Lycopodium bifidum Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Huperzia reflexa** (Lam.) Trevis.
Referencias: Holub, J. L., 1985; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium biforme Hook. = **Huperzia biformis** (Hook.) Holub

Lycopodium boryanum A. Rich. = **Lycopodiella cernua** (L.) Pic. Serm.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium breve Herter = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.

Lycopodium brutum Herter = **Huperzia reflexa** (Lam.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium capillaceum (Spring) Willd. ex Hieron. = **Lycopodiella cernua** (L.) Pic. Serm.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium carolinianum L. var. *meridionalis* Nessel = **Lycopodiella caroliniana** (L.) Pic. Serm. var. **meridionalis** (Underw. & F.E. Lloyd) B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium carolinianum L. var. *paradoxum* (Mart.) Christ = **Lycopodiella caroliniana** (L.) Pic. Serm. var. **paradoxa** (Mart.) B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium carolinianum L. subsp. *paradoxus* (Mart.) Hassl. = **Lycopodiella caroliniana** (L.) Pic. Serm. var. **paradoxa** (Mart.) B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium catharinae Christ = **Huperzia catharinae** (Christ) Holub
Referencias: Holub, J. L., 1985; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium cernuum L. = **Lycopodiella cernua** (L.) Pic. Serm.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Øllgaard, B., 1988; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Lycopodium cernuum L. var. *capillaceum* Spring = **Lycopodiella cernua** (L.) Pic. Serm.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium cernuum L. var. *eichleri* (Fée) Nessel = **Lycopodiella pendulina** (Hook.) B. Øllg.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium cernuum L. var. *panamense* Wercklé ex Nessel = **Lycopodiella cernua** (L.) Pic. Serm.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium cernuum L. var. *pendulinum* (Hook.) Baker = **Lycopodiella pendulina** (Hook.) B. Øllg.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium cernuum L. var. *watsonianum* Nessel = **Lycopodiella cernua** (L.) Pic. Serm.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium chonoticum Phil. = **Lycopodium confertum** Willd.
Referencias: Looser, G., 1939; Øllgaard, B., 1987; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lycopodium christii Silveira = **Huperzia christii** (Silveira) Holub

Lycopodium clavatum L.
Sin.: *Lepidotis clavata* (L.) P. Beauv., *Lycopodium aristatum* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Lycopodium aristatum* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *desvauxianum* Spring, *Lycopodium aristatum* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *incurvum* Grev. & Hook., *Lycopodium aristatum* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *robustius* Grev. & Hook., *Lycopodium clavatum* L. var. *equisetoides* Schwacke, *Lycopodium clavatum* L. var. *eriostachys* (Fée) Nessel & Hoehne, *Lycopodium clavatum* L. var. *minarum* H. Christ, *Lycopodium clavatum* L. var. *piliferum* (Raddi) Nessel & Hoehne, *Lycopodium clavatum* L. var. *preslianum* Spring, *Lycopodium clavatum* L. var. *raddianum* Spring, *Lycopodium clavatum* L. var. *robustius* (Grev. & Hook.) Nakai, *Lycopodium clavatum* L. var. *trichophyllum* (Desv.) Nessel & Hoehne, *Lycopodium eriostachys* Fée, *Lycopodium piliferum* Raddi, *Lycopodium preslii* Grev. & Hook., *Lycopodium serpens* C. Presl, *Lycopodium trichiatum* Bory var. *desvauxianum* Spring, *Lycopodium trichophyllum* Desv.
Referencias: de la Sota, E. R., 1972d, 1977; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Rolleri, C. H., 1972, 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–2500 m.
Países: ARG(COR, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Keller, H. A. 49* (CTES, SI)]; BRA[*Windisch, P. G. 8731* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 36170* (PY)].

Lycopodium clavatum L. f. *nana* Albov = **Lycopodium alboffii** Rolleri
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Rodríguez Ríos, R., 1995; Rolleri, C. H., 1979[1978].

Lycopodium clavatum L. var. *equisetoides* Schwacke = **Lycopodium clavatum** L.

Lycopodium clavatum L. var. *eriostachys* (Fée) Nessel & Hoehne = **Lycopodium clavatum** L.

Lycopodium clavatum L. var. *minarum* H. Christ = **Lycopodium clavatum** L.

Lycopodium clavatum L. var. *piliferum* (Raddi) Nessel & Hoehne = **Lycopodium clavatum** L.

Lycopodium clavatum L. var. *preslianum* Spring = **Lycopodium clavatum** L.

Lycopodium clavatum L. var. *raddianum* Spring = **Lycopodium clavatum** L.

Lycopodium clavatum L. var. *robustius* (Grev. & Hook.) Nakai = **Lycopodium clavatum** L.

Lycopodium clavatum L. var. *trichophyllum* (Desv.) Nessel & Hoehne = **Lycopodium clavatum** L.

Lycopodium complanatum L. var. *adpressifolium* Spring = **Lycopodium thyoides** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

[Lycopodium complanatum L. var. anceps Asch.]
Sin.: *Lycopodium anceps* Wallr., hom. illeg.
Referencias: Toursarkissian, M., 1971.
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Lycopodium complanatum L. var. *tropicum* Spring = **Lycopodium thyoides** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Lycopodium comptoniodes Desv. = **Lycopodium thyoides** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Øllgaard, B., 1992.

Lycopodium confertum Willd.
Sin.: *Austrolycopodium confertum* (Willd.) Holub, *Lycopodium barrosii* (Looser) Herter, *Lycopodium chonoticum* Phil., *Lycopodium confertum* Willd. var. *barrosii* Looser
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Holub, J. L., 1991; Looser, G., 1945; Moore, D. M., 1968; Øllgaard, B., 1987; Rodríguez Ríos, R., 1995; Rolleri, C. H., 1979[1978].
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (SI)]; CHL[*Rodríguez Ríos, R. 1052* (CONC)].

Lycopodium confertum Willd. var. *barrosii* Looser = **Lycopodium confertum** Willd.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Rodríguez Ríos, R., 1995; Rolleri, C. H., 1979[1978].

Lycopodium congestifolium Spring = **Huperzia phylicifolia** (Desv. ex Poir.) Holub
Referencias: Jørgensen, P. M., 1999b; Kessler, M., Krömer, T. & Jiménez, I., 2000; Øllgaard, B., 1988.

Lycopodium cymosum L' Herm. ex Hieron. = **Lycopodiella cernua** (L.) Pic. Serm.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium dendromorphum Kunze = **Lycopodium paniculatum** Desv.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Rodríguez Ríos, R., 1995; Rolleri, C. H., 1979[1978].

Lycopodium dichotomum Grev. & Hook., hom. illeg. = **Huperzia mandiocana** (Raddi) Trevis.
Referencias: Toursarkissian, M., 1971.

Lycopodium dichotomun Jacq. var. *mandiocanum* (Raddi) Rosenst. = **Huperzia mandiocana** (Raddi) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium eichleri Fée = **Lycopodiella pendulina** (Hook.) B. Øllg.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium elongatum Lag. ex Sw. = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium erectum Phil.
Sin.: *Austrolycopodium erectum* (Phil.) Holub, *Lycopodium looseri* Herter, *Lycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Sw. var. *erectum* (Phil.) Looser
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Øllgaard, B., 1987; Rodríguez Ríos, R., 1995; Rolleri, C. H., 1979[1978].
Hierba. Perenne. Endémica. 1200–2800 m.
Países: ARG(JUJ, NEU, RNE); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 8163* (LIL)]; CHL[*Cekalovic s.n.* (CONC)].

Lycopodium eriostachys Fée = **Lycopodium clavatum** L.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium ewanii (Herter) C.V. Morton = **Huperzia subulata** (Desv. ex Poir.) Holub
Referencias: Øllgaard, B., 1988, 1995.

Lycopodium flexibile Fée = **Huperzia flexibilis** (Fée) B. Øllg.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium fontinaloides Spring = **Huperzia fontinaloides** (Spring) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium fontinaloides Spring var. *brasiliense* Spring = **Huperzia fontinaloides** (Spring) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium fontinaloides Spring var. *coronata* Fée = **Huperzia quadrifariata** (Bory) Rothm.

Lycopodium friburgense (Nessel) Rolleri = **Huperzia friburgensis** (Nessel) B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Rolleri, C. H., 1984.

Lycopodium fuegianum Roiv. = **Huperzia fuegiana** (Roiv.) Holub
Referencias: Holub, J. L., 1985; Rodríguez Ríos, R., 1995; Rolleri, C. H., 1974.

Lycopodium gayanum J. Remy
Sin.: *Lycopodium jussiaei (jussieui)* auct. non Desv., *Lycopodium scariosum* auct. non G. Forst., *Lycopodium scariosum* G. Forst. f. *skottsbergii* Herter ex Nessel, *Lycopodium scariosum* G. Forst. var. *gayanum* (J. Remy) Nessel, *Lycopodium skottsbergii* (Herter ex Nessel) Herter
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Looser, G., 1961; Øllgaard, B., 1987; Rodríguez Ríos, R., 1995; Rolleri, C. H., 1979[1978].
Hierba. Perenne. Endémica. 300–1300 m.
Países: ARG(SCR); CHL(VIII, IX, X, XI, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vidal s.n.* (SI)]; CHL[*Stuessy, T. F. 6360* (CONC)].

Lycopodium heeschii Müll.Berol. = **Lycopodiella cernua** (L.) Pic. Serm.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium herminieri Spring = **Huperzia taxifolia** (Sw.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium heterocarpon Fée = **Huperzia heterocarpon** (Fée) Holub
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium hupeanum Müll.Berol. = **Lycopodiella cernua** (L.) Pic. Serm.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium jussiaei (jussieui) auct. non Desv. = **Lycopodium gayanum** J. Remy
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Rolleri, C. H., 1979[1978].

Lycopodium linifolium L. var. *sanguineum* Spring = **Huperzia flexibilis** (Fée) B. Øllg.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium linifolium L. var. *subaristatum* Christ = **Huperzia flexibilis** (Fée) B. Øllg.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium longearistatum Christ = **Huperzia heterocarpon** (Fée) Holub
Referencias: Holub, J. L., 1985; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium longipes Grev. & Hook. = **Lycopodiella alopecuroides** (L.) Cranfill var. **integerrima** (Spring) B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium looseri Herter = **Lycopodium erectum** Phil.
Referencias: Øllgaard, B., 1987, 1992.

Lycopodium magellanicum (P. Beauv.) Sw.
Sin.: *Austrolycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Holub, *Lepidotis magellanica* P. Beauv., *Lycopodium pichinchense* Hook., *Lycopodium spurium* Willd.

Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; de la Sota, E. R. & Rolleri, C. H., 1972; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Frangi, J. L., 1984; Holub, J. L., 1991; Moore, D. M., 1968; Øllgaard, B., 1992; Rodríguez Ríos, R., 1995; Rolleri, C. H., 1979[1978].
Hierba. Perenne. Endémica. 300–1600 m.
Países: ARG(CHU, JUJ, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Belgrano, M. J. 39* (SI)]; CHL[*Weldt, E. 343* (CONC)].

Lycopodium magellanicum (P. Beauv.) Sw. var. *erectum* (Phil.) Looser = **Lycopodium erectum** Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Frangi, J. L., 1984; Holub, J. L., 1991; Moore, D. M., 1968; Rodríguez Ríos, R., 1995; Rolleri, C. H., 1979[1978].

Lycopodium magellanicum (P. Beauv.) Sw. var. *maius* Herter ex Nessel = **Lycopodium alboffii** Rolleri
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lycopodium magellanicum (P. Beauv.) Sw. var. *nanum* (Albov) Looser = **Lycopodium alboffii** Rolleri
Referencias: Holub, J. L., 1991; Moore, D. M., 1968; Øllgaard, B., 1992; Rodríguez Ríos, R., 1995; Rolleri, C. H., 1979[1978].

Lycopodium mandiocanum Raddi = **Huperzia mandiocana** (Raddi) Trevis.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Øllgaard, B., 1987, 1988.

Lycopodium mandiocanum Raddi var. *brasiliense* Spring = **Huperzia mandiocana** (Raddi) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium marianum Willd. = **Lycopodiella cernua** (L.) Pic. Serm.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium meridionale Underw. = **Lycopodiella caroliniana** (L.) Pic. Serm. var. **meridionalis** (Underw. & F.E. Lloyd) B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium mexiae Copel. = **Huperzia reflexa** (Lam.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium moritzii Müll.Berol. = **Lycopodiella cernua** (L.) Pic. Serm.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium nanum Herter = **Lycopodium alboffii** Rolleri
Referencias: Holub, J. L., 1991; Rodríguez Ríos, R., 1995; Rolleri, C. H., 1979[1978].

Lycopodium nitens Schltdl. & Cham. = **Huperzia taxifolia** (Sw.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium nubigenum Herzog = **Huperzia phylicifolia** (Desv. ex Poir.) Holub
Referencias: Foster, R. C., 1958; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium ouropretanum Christ = **Huperzia pungentifolia** (Silveira) B. Øllg.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium paniculatum Desv.
Sin.: *Austrolycopodium paniculatum* (Desv.) Holub, *Lycopodium dendromorphum* Kunze
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Dimitri, M. J., 1974a; Looser, G., 1961; Rodríguez Ríos, R., 1995; Rolleri, C. H., 1979[1978].
Hierba. Perenne. Endémica. 700–900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 1061* (BAB)]; CHL[*Marticorena, C. 1545* (CONC)].

Lycopodium paradoxum Mart. = **Lycopodiella caroliniana** (L.) Pic. Serm. var. **paradoxa** (Mart.) B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium passerinoides Kunth = **Huperzia taxifolia** (Sw.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium pendulinum Hook. = **Lycopodiella pendulina** (Hook.) B. Øllg.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium phylicifolium Desv. ex Poir. = **Huperzia phylicifolia** (Desv. ex Poir.) Holub
Referencias: Jørgensen, P. M., 1999b; Kessler, M., Krömer, T. & Jiménez, I., 2000; Øllgaard, B., 1988.

Lycopodium pichinchense Hook. = **Lycopodium magellanicum** (P. Beauv.) Sw.
Referencias: Øllgaard, B., 1992, 1995.

Lycopodium piliferum Raddi = **Lycopodium clavatum** L.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Øllgaard, B., 1992.

Lycopodium pithyoides Schltdl. & Cham. = **Huperzia mandiocana** (Raddi) Trevis.
Referencias: Toursarkissian, M., 1971.

Lycopodium preslii Grev. & Hook. = **Lycopodium clavatum** L.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium pseudomandiocanum Herter = **Huperzia mandiocana** (Raddi) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Øllgaard, B., 1992.

Lycopodium pungentifolium Silveira = **Huperzia pungentifolia** (Silveira) B. Øllg.

Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium quadrangulare Spring = **Huperzia quadrifariata** (Bory) Rothm.

Lycopodium quadrifariatum Bory = **Huperzia quadrifariata** (Bory) Rothm.

Lycopodium reflexum Lam. = **Huperzia reflexa** (Lam.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1994.

Lycopodium reflexum Lam. var. *caesium* Vareschi = **Huperzia reflexa** (Lam.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium reflexum Lam. var. *majus* Spring = **Huperzia reflexa** (Lam.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium reversum C. Presl = **Huperzia reflexa** (Lam.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium sanctae-barbarae Rolleri = **Huperzia sanctae-barbarae** (Rolleri) Rolleri & Deferrari
Referencias: Øllgaard, B., 1988; Rolleri, C. H., 1972.

Lycopodium saururus Lam. = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B., 1992.

Lycopodium scariosum auct. non G. Forst. = **Lycopodium gayanum** J. Remy
Referencias: Looser, G., 1961; Rodríguez Ríos, R., 1995; Rolleri, C. H., 1979[1978].

Lycopodium scariosum G. Forst. f. *skottsbergii* Herter ex Nessel = **Lycopodium gayanum** J. Remy
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lycopodium scariosum G. Forst. var. *gayanum* (J. Remy) Nessel = **Lycopodium gayanum** J. Remy
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Rolleri, C. H., 1979

Lycopodium selago auct. non L. = **Huperzia fuegiana** (Roiv.) Holub
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Rodríguez Ríos, R., 1995; Rolleri, C. H., 1979[1978].

Lycopodium selago L. var. *sauroides* Bory & d'Urv. ex Baker = **Huperzia saururoides** (Bory & d'Urv.) Rothm.

Lycopodium sellowianum Herter = **Huperzia sellowiana** (Herter) B. Øllg.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium serpens C. Presl = **Lycopodium clavatum** L.

Lycopodium serpyllifolium Fée = **Huperzia fontinaloides** (Spring) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium skottsbergii (Herter ex Nessel) Herter = **Lycopodium gayanum** J. Remy
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lycopodium sotae Rolleri = **Huperzia sotae** (Rolleri) Holub
Referencias: Holub, J. L., 1985; Øllgaard, B., 1987.

Lycopodium spurium Willd. = **Lycopodium magellanicum** (P. Beauv.) Sw.

Lycopodium subulatum Desv. ex Poir. = **Huperzia subulata** (Desv. ex Poir.) Holub
Referencias: Holub, J. L., 1985.

Lycopodium taxifolium Sw. = **Huperzia taxifolia** (Sw.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1994.

Lycopodium taxifolium Sw. var. *passerinoides* (Kunth) Baker = **Huperzia taxifolia** (Sw.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Lycopodium thyoides Humb. & Bonpl. ex Willd.
Sin.: *Diphasiastrum thyoides* (Willd.) Holub, *Lycopodium complanatum* L. var. *adpressifolium* Spring, *Lycopodium complanatum* L. var. *tropicum* Spring, *Lycopodium comptoniodes* Desv.
Referencias: de la Sota, E. R., 1972d, 1977; Øllgaard, B., 1987, 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 1300 m.
Países: ARG(COR, JUJ); BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 4634* (LP)]; BRA[*Windisch, P. G. 8733b* (SI)].

Lycopodium trichiatum Bory var. *desvauxianum* Spring = **Lycopodium clavatum** L.

Lycopodium trichophyllum Desv. = **Lycopodium clavatum** L.

Lycopodium verticillatum auct. non L. f. = **Huperzia acerosa** (Sw.) Holub
Referencias: Øllgaard, B., 1992.

Palhinhaea capillacea (Spring) Holub = **Lycopodiella cernua** (L.) Pic. Serm.
Referencias: Holub, J. L., 1985; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Palhinhaea cernua Franco & Vascon = **Lycopodiella cernua** (L.) Pic. Serm.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Palhinhaea eichleri (Fée) Holub = **Lycopodiella pendulina** (Hook.) B. Øllg.
Referencias: Holub, J. L., 1985; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Palhinhaea pendulina (Hook.) Holub = **Lycopodiella pendulina** (Hook.) B. Øllg.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Phlegmariurus taxifolius (Sw.) A. Löve & D. Löve = **Huperzia taxifolia** (Sw.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Plananthus alopecuroides (L.) P. Beauv. = **Lycopodiella alopecuroides** (L.) Cranfill var. **alopecuroides**
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Plananthus reflexus (Lam.) P. Beauv. = **Huperzia reflexa** (Lam.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1994.

Plananthus saururus (Lam.) P. Beauv. = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Pseudolycopodiella meridionalis (Underw. & F.E. Lloyd) Holub = **Lycopodiella caroliniana** (L.) Pic. Serm. var. **meridionalis** (Underw. & F.E. Lloyd) B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Holub, J. L., 1985; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Pseudolycopodiella paradoxa (Mart.) Holub = **Lycopodiella caroliniana** (L.) Pic. Serm. var. **paradoxa** (Mart.) B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Holub, J. L., 1985; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Selago indica Dill., nom. inval. = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.

Urostachis silveirae Nessel = **Huperzia silveirae** (Nessel) B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys acerosus (Sw.) Herter ex Nessel = **Huperzia acerosa** (Sw.) Holub
Referencias: Holub, J. L., 1985; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys andinus (Rosenst.) Herter ex Nessel = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.
Referencias: Rolleri, C. H., 1977a, b.

Urostachys aschersonii (Herter) Nessel = **Huperzia quadrifariata** (Bory) Rothm.

Urostachys axillaris (Roxb.) Herter ex Nessel = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.
Referencias: Rolleri, C. H., 1977a, b.

Urostachys bifidus (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Herter ex Nessel = **Huperzia reflexa** (Lam.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys biformis (Hook.) Herter = **Huperzia biformis** (Hook.) Holub

Urostachys brevis (Herter) Herter ex Nessel = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B., 1987.

Urostachys dichotomus (Jacq.) Herter var. *spegazzini* (Nessel) Nessel = **Huperzia heterocarpon** (Fée) Holub
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys elongatus (Sw.) Herter = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.

Urostachys ewanii Herter = **Huperzia subulata** (Desv. ex Poir.) Holub
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rolleri, C. H., 1972.

Urostachys fontinaloides (Spring) Nessel = **Huperzia fontinaloides** (Spring) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys fontinaloides (Spring) Nessel var. *coronatus* (Fée) Nessel = **Huperzia quadrifariata** (Bory) Rothm.

Urostachys fontinaloides (Spring) Nessel var. *serpyllifolius* (Fée) Nessel & Hoehne = **Huperzia fontinaloides** (Spring) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys friburgensis Nessel = **Huperzia friburgensis** (Nessel) B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys fuegianus (Roiv.) Herter = **Huperzia fuegiana** (Roiv.) Holub
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Rodríguez Ríos, R., 1995; Rolleri, C. H., 1974.

Urostachys gehrtii Nessel = **Huperzia fontinaloides** (Spring) Trevis.

Urostachys hennebergorum Nessel = **Huperzia pungentifolia** (Silveira) B. Øllg.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys heterocarpon (Fée) Herter = **Huperzia heterocarpon** (Fée) Holub
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys heterocarpon (Fée) Herter var. *longearistatus* (Christ) Nessel = **Huperzia heterocarpon** (Fée) Holub
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys intermedius (Spring) Herter var. *cipoanus* Nessel = **Huperzia reflexa** (Lam.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys jergii Nessel = **Huperzia reflexa** (Lam.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys linifolius (L.) Herter var. *flexibilis* (Fée) Nessel = **Huperzia flexibilis** (Fée) B. Øllg.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys linifolius (L.) Herter var. *sanguineus* (Spring) Nessel = **Huperzia flexibilis** (Fée) B. Øllg.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys longearistatus (Christ) Nessel = **Huperzia heterocarpon** (Fée) Holub
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys mandiocanus (Raddi) Herter = **Huperzia mandiocana** (Raddi) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Rolleri, C. H., 1981, 1984.

Urostachys mandiocanus (Raddi) Nessel var. *brasiliensis* (Spring) Nessel = **Huperzia mandiocana** (Raddi) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys nitens (Schltdl. & Cham.) Herter = **Huperzia taxifolia** (Sw.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys nubigenus (Herzog) Herter ex Nessel = **Huperzia phylicifolia** (Desv. ex Poir.) Holub
Referencias: Foster, R. C., 1958; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys parvifolius Nessel = **Huperzia reflexa** (Lam.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys passerinoides Kunth var. *nitens* (Schltdl. & Cham.) Herter ex Nessel = **Huperzia taxifolia** (Sw.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys phylicifolius (Poir.) Herter ex Nessel = **Huperzia phylicifolia** (Desv. ex Poir.) Holub
Referencias: Kessler, M., Krömer, T. & Jiménez, I., 2000; Øllgaard, B., 1988.

Urostachys portoanus Nessel = **Huperzia heterocarpon** (Fée) Holub
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys pseudomandicanus (Herter) Nessel = **Huperzia mandiocana** (Raddi) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys pungentifolius (Silveira) Nessel = **Huperzia pungentifolia** (Silveira) B. Øllg.
Referencias: Nessel, H., 1927; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Øllgaard, B., 1992; Rolleri, C. H., 1984.

Urostachys quadrangularis (Spring) Nessel = **Huperzia quadrifariata** (Bory) Rothm.

Urostachys quadrifariatus (Bory) Nessel = **Huperzia quadrifariata** (Bory) Rothm.

Urostachys reflexus (Lam.) Herter = **Huperzia reflexa** (Lam.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1994.

Urostachys reflexus Lam. var. *brutus* (Herter) Nessel = **Huperzia reflexa** (Lam.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys reflexus (Lam.) Herter var. *friburgensis* (Nessel) Nessel = **Huperzia friburgensis** (Nessel) B. Øllg. & P.G. Windisch
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys reflexus Lam. var. *parvifolius* (Nessel) Nessel = **Huperzia reflexa** (Lam.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys reflexus (Lam.) Herter var. *pungentifolius* (Silveira) Nessel = **Huperzia pungentifolia** (Silveira) B. Øllg.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys reversus (C. Presl) Herter = **Huperzia reflexa** (Lam.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys rubiginosus Herter ex Nessel = **Huperzia taxifolia** (Sw.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys saururoides (Bory & d'Urv. ex Baker) Herter ex Nessel = **Huperzia saururoides** (Bory & d'Urv.) Rothm.

Urostachys saururus (Lam.) Herter = **Huperzia saururus** (Lam.) Trevis.
Referencias: Moran, R. & Smith, A. R., 2001; Øllgaard, B., 1988.

Urostachys schwendeneri (Herter) Herter = **Huperzia taxifolia** (Sw.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys schwendeneri (Herter) Herter var. *nitens* (Schltdl. & Cham.) Herter ex Nessel = **Huperzia taxifolia** (Sw.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys selago (L.) Herter var. *aschersonianus* Herter ex Nessel = **Huperzia fuegiana** (Roiv.) Holub
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Urostachys selago (L.) Herter var. *hessei* Herter ex Nessel = **Huperzia fuegiana** (Roiv.) Holub
Referencias: Looser, G., 1961; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Urostachys serpyllifolium (Fée) Herter = **Huperzia fontinaloides** (Spring) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys spegazzini Nessel = **Huperzia heterocarpon** (Fée) Holub
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys stellae-polaris Herter = **Huperzia reflexa** (Lam.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B., 1988.

Urostachys subulatus (Desv. ex Poir.) Herter ex Nessel = **Huperzia subulata** (Desv. ex Poir.) Holub
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Øllgaard, B., 1988.

Urostachys taxifolius (Sw.) Herter = **Huperzia taxifolia** (Sw.) Trevis.
Referencias: Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987.

Urostachys verticillatus auct. non (L. f.) Herter = **Huperzia acerosa** (Sw.) Holub
Referencias: Holub, J. L., 1985; Nessel, H., 1927; Øllgaard, B. & Windisch, P. G., 1987; Øllgaard, B., 1992.

MARATTIACEAE

Autor: Rolleri, C.
Revisor: Øllgaard, B.

2 géneros, 5 especies.

Acrostichum nodosum L. = **Danaea nodosa** (L.) Sm.
Referencias: Rolleri, C. H., 2004; Tuomisto, H. & Moran, R. C., 2001.

Danaea Sm., nom. cons.

Número de especies: 3

Danaea cordata Fée = **Danaea nodosa** (L.) Sm.
Referencias: Rolleri, C. H., 2004.

Danaea elliptica Sm. in Rees
Sin.: *Danaea geniculata* Raddi, *Danaea polymorpha* Lepr. ex Baker
Referencias: Benko-Iseppon, A. M. & Rodrigues da Fonseca, E., 2000; Rolleri, C. H., 2004; Tuomisto, H. & Moran, R. C., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 255* (US)].

Danaea excurrens Rosenst. = **Danaea moritziana** C. Presl
Referencias: Rolleri, C. H., 2004.

Danaea geniculata Raddi = **Danaea elliptica** Sm. in Rees
Referencias: Rolleri, C. H., 2004.

Danaea moritziana C. Presl
Sin.: *Danaea excurrens* Rosenst., *Danaea moritziana* C. Presl var. *brasiliensis* Rosenst., *Danaea muelleriana* Rosenst., *Danaea polymorpha* Lepr. ex Baker
Referencias: Rolleri, C. H., 2004; Tuomisto, H. & Moran, R. C., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2600 m.
Países: BRA(SCA); PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: BRA[*Schmalz, E. 122* (UC)]; PRY[*Balansa, B. s.n.* (CTES)].

Danaea moritziana C. Presl var. *brasiliensis* Rosenst. = **Danaea moritziana** C. Presl
Referencias: Rolleri, C. H., 2004; Tuomisto, H. & Moran, R. C., 2001.

Danaea muelleriana Rosenst. = **Danaea moritziana** C. Presl
Referencias: Rolleri, C. H., 2004; Tuomisto, H. & Moran, R. C., 2001.

Danaea nodosa (L.) Sm.
Sin.: *Acrostichum nodosum* L., *Danaea cordata* Fée, *Danaea sellowiana* C. Presl
Referencias: Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Rolleri, C. H., 2004; Tuomisto, H. & Moran, R. C., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: BRA(SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2859* (US)]; PRY[*Zardini, E. M. 48901* (MO)].

Danaea polymorpha Lepr. ex Baker = **Danaea moritziana** C. Presl
Referencias: Rolleri, C. H., 2004.

Danaea sellowiana C. Presl = **Danaea nodosa** (L.) Sm.
Referencias: Rolleri, C. H., 2004.

Discostegia laevis (Sm.) C. Presl = **Marattia laevis** Sm.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003; Sehnem, A., 1967c.

Eupodium kaulfussii (Sm.) Hook. = **Marattia laevis** Sm.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003; Sehnem, A., 1967c.

Gymnotheca cicutifolia (Kaulf.) C. Presl = **Marattia cicutifolia** Kaulf.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003; Sehnem, A., 1967c.

Gymnotheca obtusidens C. Presl = **Marattia cicutifolia** Kaulf.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003; Sehnem, A., 1967c.

Gymnotheca podolepis de Vriese = **Marattia cicutifolia** Kaulf.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003; Sehnem, A., 1967c.

Gymnotheca polyodon C. Presl = **Marattia cicutifolia** Kaulf.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003; Sehnem, A., 1967c.

Gymnotheca raddiana (Schott) C. Presl = **Marattia cicutifolia** Kaulf.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003; Sehnem, A., 1967c.

Gymnotheca verschaffeltiana de Vriese & Harting = **Marattia cicutifolia** Kaulf.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003; Sehnem, A., 1967c.

Marattia Sw.

Número de especies: 2

Marattia alata Raddi, hom. illeg. = **Marattia laevis** Sm.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003; Sehnem, A., 1967c.

Marattia alata Sw. var. *laevis* (Sm.) Farw. = **Marattia laevis** Sm.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003; Sehnem, A., 1967c.

Marattia cicutifolia Kaulf.
Sin.: *Gymnotheca cicutifolia* (Kaulf.) C. Presl, *Gymnotheca obtusidens* C. Presl, *Gymnotheca podolepis* de Vriese, *Gymnotheca polyodon* C. Presl, *Gymnotheca raddiana* (Schott) C. Presl, *Gymnotheca verschaffeltiana* de Vriese & Harting, *Marattia fraxinea* Raddi non Sm., nom. illeg., *Marattia juerguensii* Rosenst., *Marattia obtusidens* (C. Presl) Sturm, *Marattia podolepis* (de Vriese) Sturm, *Marattia polyodon* (C. Presl) Sturm, *Marattia raddiana* Schott, *Marattia raddii* Desv., *Marattia raddii* Desv. var. *juergemsii* (Rosenst.) Rosenst., *Marattia verschaffeltiana* (de Vriese & Harting) Sturm in Mart.
Referencias: Lavalle, M. C., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 41956* (NY)].

Marattia fraxinea Raddi non Sm., nom. illeg. = **Marattia cicutifolia** Kaulf.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003; Sehnem, A., 1967c.

Marattia juerguensii Rosenst. = **Marattia cicutifolia** Kaulf.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003; Sehnem, A., 1967c.

Marattia kaulfussii J. Sm. in Hook. = **Marattia laevis** Sm.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003; Sehnem, A., 1967c.

Marattia laevis Sm.
Sin.: *Discostegia laevis* (Sm.) C. Presl, *Eupodium kaulfussii* (Sm.) Hook., *Marattia alata* Raddi, hom. illeg., *Marattia alata* Sw. var. *laevis* (Sm.) Farw., *Marattia kaulfussii* J. Sm. in Hook., *Marattia pittieri* Maxon, *Myriotheca laevis* (Sm.) Poir.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Ponce, M. M. & Smith, A. R., 1998; Sehnem, A., 1967c.
Arborescente. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2975* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 955* (GH)].

Marattia obtusidens (C. Presl) Sturm = **Marattia cicutifolia** Kaulf.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003.

Marattia pittieri Maxon = **Marattia laevis** Sm.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003; Sehnem, A., 1967c.

Marattia podolepis (de Vriese) Sturm = **Marattia cicutifolia** Kaulf.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003; Sehnem, A., 1967c.

Marattia polyodon (C. Presl) Sturm = **Marattia cicutifolia** Kaulf.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003; Sehnem, A., 1967c.

Marattia raddiana Schott = **Marattia cicutifolia** Kaulf.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003.

Marattia raddii Desv. = **Marattia cicutifolia** Kaulf.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003.

Marattia raddii Desv. var. *juergemsii* (Rosenst.) Rosenst. = **Marattia cicutifolia** Kaulf.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003.

Marattia verschaffeltiana (de Vriese & Harting) Sturm = **Marattia cicutifolia** Kaulf.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003.

Myriotheca laevis (Sm.) Poir. = **Marattia laevis** Sm.
Referencias: Lavalle, M. C., 2002, 2003.

MARSILEACEAE

Autores: de la Sota, E. R. & Ponce, M. M.
Revisor: Prado, J.

3 géneros, 5 especies,1 especie endémica.

Calamistrum americanum (A. Braun) Kuntze = **Pilularia americana** A. Braun
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2002.

Calamistrum mandonii (A. Braun) Kuntze = **Pilularia americana** A. Braun
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2002.

Marsilea L.

Número de especies: 3

Marsilea ancylopoda A. Braun
Sin.: *Marsilea berteroi* A. Braun, *Marsilea concinna* Baker, *Marsilea ernestii* A. Braun, *Marsilea hickenii* Herter
Referencias: Alfonso, G. L., 1996; Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2002; Johnson, D. M., 1986a; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1994.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–2400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SFE, SLU); BRA(RGS); PRY(APY, CEN); URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, PAY, ROC, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 8020* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 14834* (CTES)]; URY[*Alonso Paz, E. 3245* (MVFQ)].

Marsilea berteroi A. Braun = **Marsilea ancylopoda** A. Braun
Referencias: Johnson, D. M., 1986a.

Marsilea brasiliensis Mart. = **Marsilea polycarpa** Hook. & Grev.

Marsilea concinna Baker = **Marsilea ancylopoda** A. Braun
Referencias: Johnson, D. M., 1986a.

Marsilea deflexa A. Braun
Sin.: *Zaluzianskia deflexa* (A. Braun) Kuntze
Referencias: Eskuche, U. G., 1996; Johnson, D. M., 1986a; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1994.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(COS); PRY(APY, CON, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fontana, J. L. 770* (CTESN)]; PRY[*Pedersen, T. M. 4068* (C, G, GH, NY, S, US)].

Marsilea ernestii A. Braun = **Marsilea ancylopoda** A. Braun
Referencias: Sehnem, A., 1979b.

Marsilea hickenii Herter = **Marsilea ancylopoda** A. Braun
Referencias: Johnson, D. M., 1986a.

Marsilea mollis B.L. Rob. & Fernald
Sin.: *Marsilea punae* de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Johnson, D. M., 1986a; Rodríguez Ríos, R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1994.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC); CHL(IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Werner, T. B. 842* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 1236* (CONC)].

[Marsilea polycarpa Hook. & Grev.]
Sin.: *Marsilea brasiliensis* Mart.
Referencias: Johnson, D. M., 1986a.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Marsilea punae de la Sota = **Marsilea mollis** B.L. Rob. & Fernald
Referencias: Johnson, D. M., 1986a; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pilularia L.

Número de especies: 1

Pilularia americana A. Braun
Sin.: *Calamistrum americanum* (A. Braun) Kuntze, *Calamistrum mandonii* (A. Braun) Kuntze, *Pilularia mandonii* A. Braun, *Pilularia valdiviana* Phil., nom. nud.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2002; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rodríguez Ríos, R., 1995; Sehnem, A., 1979b.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, NEU, SFE); BRA(RGS); CHL(IV, V, VII, VIII, IX, X, RME); URY(CAS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26016* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 57097* (PACA)]; CHL[*Rodríguez Ríos, R. 2421* (CONC)]; URY[*Alonso Paz, E. 3061* (MVFQ)].

Pilularia mandonii A. Braun = **Pilularia americana** A. Braun
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2002.

Pilularia valdiviana Phil., nom. nud. = **Pilularia americana** A. Braun
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Regnellidium Lindm.

Número de especies: 1 endémica

Regnellidium diphyllum Lindm.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2002; de la Sota, E. R. & Mitchell, D. S., 1970; Sehnem, A., 1979b.
Hierba acuática. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(RGS, SCA); URY(CLA, PAY, ROC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Mitchell, D. S. 1224* (LP)]; BRA[*Pabst, G. F. J. 6524* (NY)]; URY[*Rosengurtt, B. 11710* (MVFA)].

Zaluzianskia deflexa (A. Braun) Kuntze = **Marsilea deflexa** A. Braun
Referencias: Johnson, D. M., 1986a.

OLEANDRACEAE

1 género, 1 especie endémica.

Arthropteris J. Sm. ex Hook. f.

Número de especies: 1 endémica

Arthropteris altescandens (Colla) J. Sm.
Sin.: *Polypodium altescandens* Colla, *Polypodium procurrens* Kunze
Referencias: Rodríguez Ríos, R. 1995.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. 12009* (CONC)].

Polypodium altescandens Colla = **Arthropteris altescandens** (Colla) J. Sm.

Polypodium procurrens Kunze = **Arthropteris altescandens** (Colla) J. Sm.

OPHIOGLOSSACEAE

Autores: de la Sota, E. R. & Ponce, M. M.
Revisor: Prado, J.

3 géneros, 13 especies, 2 especies endémicas.

Botrychium Sw.

Número de especies: 4, 1 endémica

Botrychium australe R. Br. subsp. **australe**
Sin.: *Botrychium ternatum* auct. non (Thunb.) Sw.
Referencias: Capurro, R. H., 1969[1968]; de la Sota, E. R., 1977; Lichtenstein, J. S., 1944.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Del Vitto, L. A. 7701* (UNSL)].

Botrychium australe R. Br. subsp. **negeri** (H. Christ) R.T. Clausen
Sin.: *Botrychium negeri* H. Christ, *Botrychium ternatum* auct. non (Thunb.) Sw., *Sceptridium negeri* (H. Christ) Holub
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Lichtenstein, J. S., 1944; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. s.n.* (SI)]; CHL[*Neger, F. W. 1897* (*)].

Botrychium cicutarium (Savigny) Sw. = **Botrychium virginianum** (L.) Sw.

Botrychium dusenii (H. Christ) Alston
Sin.: *Botrychium lunaria* (L.) Sw. var. *antarctica* Speg., *Botrychium lunaria* (L.) Sw. var. *dusenii* H. Christ, *Botrychium lunaria* auct. non (L.) Sw., *Botrychium matricariifolium* A. Braun subsp. *patagonicum* (C. Chr.) R.T. Clausen, *Botrychium ramosum* Asch. var. *patagonicum* H. Christ
Referencias: Alston, A. H. G., 1960; Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Lichtenstein, J. S., 1944; Moore, D. M., 1983; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 9847* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92059* (CONC, SGO)].

Botrychium lunaria auct. non (L.) Sw. = **Botrychium dusenii** (H. Christ) Alston
Referencias: Lichtenstein, J. S., 1944.

Botrychium lunaria (L.) Sw. var. *antarctica* Speg. = **Botrychium dusenii** (H. Christ) Alston
Referencias: Lichtenstein, J. S., 1944; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Botrychium lunaria (L.) Sw. var. *dusenii* H. Christ = **Botrychium dusenii** (H. Christ) Alston
Referencias: Moore, D. M., 1983; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Botrychium matricariifolium A. Braun subsp. *patagonicum* (C. Chr.) R.T. Clausen = **Botrychium dusenii** (H. Christ) Alston
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Botrychium negeri H. Christ = **Botrychium australe** R. Br. subsp. **negeri** (H. Christ) R.T. Clausen
Referencias: Lichtenstein, J. S., 1944; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Botrychium ramosum Asch. var. *patagonicum* H. Christ = **Botrychium dusenii** (H. Christ) Alston
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Botrychium schaffneri Underw.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Lichtenstein, J. S., 1944.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 3145* (LIL)].

Botrychium ternatum auct. non (Thunb.) Sw. = **Botrychium australe** R. Br. subsp. **australe**
Referencias: Lichtenstein, J. S., 1944.

Botrychium ternatum auct. non (Thunb.) Sw. = **Botrychium australe** R. Br. subsp. **negeri** (H. Christ) R.T. Clausen
Referencias: Lichtenstein, J. S., 1944; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Botrychium virginianum (L.) Sw.
Sin.: *Botrychium cicutarium* (Savigny) Sw., *Osmunda virginiana* L.
Referencias: Legrand, C. M. D. H. & Lombardo, A., 1958; Sehnem, A., 1979d.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. s.n.* (PACA)]; URY[*Bonifacino, J. M. s.n.* (MVFA)].

Cheiroglossa C. Presl

Número de especies: 1

Cheiroglossa austrobrasiliensis Brade = **Cheiroglossa palmata** (L.) C. Presl

Cheiroglossa palmata (L.) C. Presl
Sin.: *Cheiroglossa austrobrasiliensis* Brade, *Ophioderma palmata* (L.) Nakai, *Ophioglossum palmatum* L.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Ponce, M. M., 2001; Sehnem, A., 1979d.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.

Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Chaves, H. s.n.* (SI)]; BRA[*Labiak, P. H. 239* (MBM, SP, UPCB)].

Ophioderma palmata (L.) Nakai = **Cheiroglossa palmata** (L.) C. Presl

Ophioglossum L.

Número de especies: 8, 1 endémica

Ophioglossum bulbosum Michx. = **Ophioglossum crotalophoroides** Walter subsp. **crotalophoroides**
Referencias: Lichtenstein, J. S., 1944; Rodríguez Ríos, R., 1995; Sehnem, A., 1979d.

Ophioglossum coriaceum A. Cunn. = **Ophioglossum lusitanicum** L. subsp. **coriaceum** (A. Cunn.) R.T. Clausen

Ophioglossum crotalophoroides Walter var. **nanum** J.S. Licht. ex Osten
Referencias: Lichtenstein, J. S., 1944.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rojas, T. s.n.* (SI)]; PRY[*Osten, C. s.n.* (BM, SI)].

Ophioglossum crotalophoroides Walter var. *opacum* (Carmich.) J.S. Licht. = **Ophioglossum opacum** Carmich.
Referencias: Lichtenstein, J. S., 1944.

Ophioglossum crotalophoroides Walter subsp. **crotalophoroides**
Sin.: *Ophioglossum bulbosum* Michx., *Ophioglossum pusillum* Nutt., hom. illeg., *Ophioglossum stipatum* Colla, *Ophioglossum tuberosum* Hook. & Arn., *Ophioglossum vulgatum* L. var. *crotalophoroides* (Walter) D.C. Eaton
Referencias: Alfonso, G. L., 1996; de la Sota, E. R., 1977; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Herter, W. G. F., 1930; Lichtenstein, J. S., 1944; Rodríguez Ríos, R., 1995; Sehnem, A., 1979d.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI, JUJ, LPA, NEU, RNE, SAL, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(V, VII, VIII, X, RME); URY(ART, CAS, DUR, LAV, MON, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 5530* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 775* (PACA)]; CHL[*Garaventa, A. 2203* (CONC)]; URY[*Berro, M. B. 1650* (MVFA)].

Ophioglossum crotalophoroides Walter subsp. **robustum** R.T. Clausen
Referencias: Clausen, R. T., 1948; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 9329* (SI)]; CHL[*Hicken, C. M. 23* (SI)].

Ophioglossum ellipticum Hook. & Grev.
Sin.: *Ophioglossum vulgatum* L. var. *surinamense* Luerss.
Referencias: Hassler, E., 1928; Lichtenstein, J. S., 1944; Sehnem, A., 1979d.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, CEN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 8076* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 209* (HBR)]; PRY[*Rojas, T. 1831* (SI)].

Ophioglossum fernandezianum C. Chr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bäckström 1126* (*)].

Ophioglossum gomezianum Welw. ex A. Braun = **Ophioglossum nudicaule** L. f. var. **nudicaule**
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Ophioglossum gramineum auct. non Willd. = **Ophioglossum lusitanicum** L. subsp. **coriaceum** (A. Cunn.) R.T. Clausen

Ophioglossum lusitanicum L. subsp. **coriaceum** (A. Cunn.) R.T. Clausen
Sin.: *Ophioglossum coriaceum* A. Cunn., *Ophioglossum gramineum* auct. non Willd., *Ophioglossum melipillense* J. Remy, *Ophioglossum minimum* (Hook. f.) J.B. Armstr.
Referencias: Clausen, R. T., 1938; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1600 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).

[Ophioglossum lusitanicum L. subsp. lusitanicum]
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Notas: Subespecie excluida del área del proyecto.

Ophioglossum macrorrhizum Kunze = **Ophioglossum nudicaule** L. f. var. **nudicaule**
Referencias: Lichtenstein, J. S., 1944.

Ophioglossum melipillense J. Remy = **Ophioglossum lusitanicum** L. subsp. **coriaceum** (A. Cunn.) R.T. Clausen

Ophioglossum minimum (Hook. f.) J.B. Armstr. = **Ophioglossum lusitanicum** L. subsp. **coriaceum** (A. Cunn.) R.T. Clausen

Ophioglossum nudicaule L. f. var. *macrorrhizum* (Kunze) R.T. Clausen = **Ophioglossum nudicaule** L. f. var. **nudicaule**
Referencias: Lichtenstein, J. S., 1944.

Ophioglossum nudicaule L. f. var. **nudicaule**
Sin.: *Ophioglossum gomezianum* Welw. ex A. Braun, *Ophioglossum macrorrhizum* Kunze, *Ophioglossum nudicaule* L. f. var. *macrorrhizum* (Kunze) R.T. Clausen

Referencias: Clausen, R. T., 1938; de la Sota, E. R., 1977; Herter, W. G. F., 1930; Lichtenstein, J. S., 1944.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, MIS, SAL, TUC); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11655a* (SI)].
Notas: Su presencia es probable en el sur de Brasil.

Ophioglossum nudicaule L. f. var. **robustum** J.S. Licht.
Referencias: Lichtenstein, J. S., 1944; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: CHL(XI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Rentzell, I. s.n.* (SI)].

Ophioglossum opacum Carmich.
Sin.: *Ophioglossum crotalophoroides* Walter var. *opacum* (Carmich.) J.S. Licht.
Referencias: Lichtenstein, J. S., 1944.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Greene 3150* (SI)].
Notas: Se encuentra en las Islas Georgias del Sur, Argentina.

Ophioglossum palmatum L. = **Cheiroglossa palmata** (L.) C. Presl

[Ophioglossum pedunculosum Desv.]
Referencias: Sehnem, A., 1979d.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Ophioglossum peruvianum C. Presl = **Ophioglossum reticulatum** L.
Referencias: Lichtenstein, J. S., 1944; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Ophioglossum pusillum Nutt., hom. illeg. = **Ophioglossum crotalophoroides** Walter subsp. **crotalophoroides**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Ophioglossum reticulatum L.
Sin.: *Ophioglossum peruvianum* C. Presl, *Ophioglossum vulgatum* L. var. *reticulatum* (L.) Luerss.
Referencias: Arbo, M. M. & Tressens, S. G., 2002; Capurro, R. H., 1969[1968]; Lichtenstein, J. S., 1944; Sehnem, A., 1979d.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3787* (SI), *Weber-Bachmann s.n.* (BA)]; BRA[*Sehnem, A. 605* (PACA)]; PRY[*Hassler, E. 12614* (BM)].

Ophioglossum stipatum Colla = **Ophioglossum crotalophoroides** Walter subsp. **crotalophoroides**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Ophioglossum tuberosum Hook. & Arn. = **Ophioglossum crotalophoroides** Walter subsp. **crotalophoroides**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Sehnem, A., 1979d.

Ophioglossum valdivianum Phil. = **Ophioglossum vulgatum** L.
Referencias: de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998.

Ophioglossum vulgatum L.
Sin.: *Ophioglossum valdivianum* Phil., *Ophioglossum vulgatum* L. var. *valdivianum* (Phil.) J.S. Licht.
Referencias: Lichtenstein, J. S., 1944; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. s.n.* (SI)]; CHL[*Hollermayer, A. 24* (CONC)].

Ophioglossum vulgatum L. var. *crotalophoroides* (Walter) D.C. Eaton = **Ophioglossum crotalophoroides** Walter subsp. **crotalophoroides**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Ophioglossum vulgatum L. var. *reticulatum* (L.) Luerss. = **Ophioglossum reticulatum** L.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Ophioglossum vulgatum L. var. *surinamense* Luerss. = **Ophioglossum ellipticum** Hook. & Grev.
Referencias: Lichtenstein, J. S., 1944.

Ophioglossum vulgatum L. var. *valdivianum* (Phil.) J.S. Licht. = **Ophioglossum vulgatum** L.

Osmunda virginiana L. = **Botrychium virginianum** (L.) Sw.

Sceptridium negeri (H. Christ) Holub = **Botrychium australe** R. Br. subsp. **negeri** (H. Christ) R.T. Clausen

OSMUNDACEAE

Autores: de la Sota, E. R. & Ponce, M. M.
Revisor: Prado, J.

1 género, 3 especies.

Aphyllocalpa regalis (L.) Lag., D. García & Clemente = **Osmunda regalis** L. var. **spectabilis** (Willd.) A. Gray
Referencias: Salvo Tierra, A. E. & España, L., 1987a.

Osmunda L.

Número de especies: 3

Osmunda cinnamomea L.
Sin.: *Osmunda imbricata* Kunze, *Osmundastrum cinnamomeum* (L.) C. Presl
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Salvo Tierra, A. E. & España, L., 1987a; Sehnem, A., 1967a; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, COA); URY(RIV).

Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 4310* (CTES, SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 7255* (HBR)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6475* (SI), *Hassler, E. 6845* (G), *Jiménez, B. 1516* (BM, PY)]; URY[*Brussa, C. s.n.* (MVFA)].

Osmunda gracilis Link
Referencias: Sehnem, A., 1967a.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 240* (*)].

Osmunda imbricata Kunze = **Osmunda cinnamomea** L.
Referencias: Salvo Tierra, A. E. & España, L., 1987a; Sehnem, A., 1967a.

Osmunda palustris Schrad. = **Osmunda regalis** L. var. **spectabilis** (Willd.) A. Gray
Referencias: Salvo Tierra, A. E. & España, L., 1987a; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.

Osmunda regalis L. var. *palustris* (Schrad.) C. Chr. = **Osmunda regalis** L. var. **spectabilis** (Willd.) A. Gray

[Osmunda regalis L. var. regalis]
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Osmunda regalis L. var. **spectabilis** (Willd.) A. Gray
Sin.: *Aphyllocalpa regalis* (L.) Lag., D. García & Clemente, *Osmunda palustris* Schrad., *Osmunda regalis* L. subsp. *palustris* (Schrad.) A. Löve & D. Löve, *Osmunda regalis* L. var. *palustris* (Schrad.) C. Chr., *Osmunda spectabilis* Willd.
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; Capurro, R. H., 1961, 1969[1968]; Charpin, A. & Novara, L., 1993; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Salvo Tierra, A. E. & España, L., 1987a; Sehnem, A., 1967a; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, SPE); URY(CAS, DUR, LAV, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2944* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 7946* (HBR)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5113* (G)]; URY[*Rosengurtt, B. 7779b* ()].

Osmunda regalis L. subsp. *palustris* (Schrad.) A. Löve & D. Löve = **Osmunda regalis** L. var. **spectabilis** (Willd.) A. Gray
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.

Osmunda spectabilis Willd. = **Osmunda regalis** L. var. **spectabilis** (Willd.) A. Gray
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.

Osmundastrum cinnamomeum (L.) C. Presl = **Osmunda cinnamomea** L.
Referencias: Bobrov, A. E., 1967; Salvo Tierra, A. E. & España, L., 1987a.

PARKERIACEAE

Autores: Ponce, M. M. & Prado, J.
Revisor: Yatskievych, G.

1 género, 1 especie.

Acrostichum thalictroides L. = **Ceratopteris thalictroides** (L.) Brongn.
Referencias: Lloyd, R. M., 1974.

Ceratopteris Brongn.

Número de especies: 1

Ceratopteris froesii Brade = **Ceratopteris thalictroides** (L.) Brongn.
Referencias: Lloyd, R. M., 1974.

Ceratopteris parkeri J. Sm., nom. superfl. = **Ceratopteris pteridoides** (Hook.) Hieron.
Referencias: Lloyd, R. M., 1974.

Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron.
Sin.: *Ceratopteris parkeri* J. Sm., nom. superfl., *Parkeria pteridoides* Hook.
Referencias: Arbo, M. M. & Tressens, S. G., 2002; Burkart, A., 1957c; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Lloyd, R. M., 1974; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Hierba acuática. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, MIS); PRY(APY, CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kermes, E. s.n.* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 4815* (FCQ)].

[Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.]
Sin.: *Acrostichum thalictroides* L., *Ceratopteris froesii* Brade, *Furcaria thalictroides* (L.) Desv.
Referencias: Lloyd, R. M., 1974.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Furcaria thalictroides (L.) Desv. = **Ceratopteris thalictroides** (L.) Brongn.
Referencias: Lloyd, R. M., 1974.

Parkeria pteridoides Hook. = **Ceratopteris pteridoides** (Hook.) Hieron.
Referencias: Lloyd, R. M., 1974.

POLYPODIACEAE

Autores: Labiak, P. H., de la Sota, E. R. & Ponce, M. M.
Revisor: Smith, A. R.

9 géneros, 55 especies, 6 especies endémicas.

Acrostichum lepidopteris Langsd. & Fisch. = **Pleopeltis lepidopteris** (Langsd. & Fisch.) de la Sota

Acrostichum polypodioides L. = **Pleopeltis polypodioides** (L.) E.G. Andrews & Windham

Anaxetum crassifolium (L.) Schott, nom. illeg. = **Niphidium crassifolium** (L.) Lellinger

Aspidium pentaphyllum Willd. = **Campyloneurum decurrens** (Raddi) C. Presl

Campyloneurum C. Presl

Número de especies: 9, 1 endémica

Campyloneurum acrocarpon Fée
Referencias: León, B., 1992.
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ribas, O. S. 3408* (MBM)].

Campyloneurum aglaolepis (Alston) de la Sota
Sin.: *Campyloneurum angustifolium* (Sw.) Fée var. *ensifolium* auct. non (Willd.) C. Chr., *Campyloneurum angustifolium* auct. non (Sw.) Fée, *Polypodium aglaolepis* Alston
Referencias: de la Sota, E. R., 1960; Lellinger, D. B., 1988.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 600–2100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 2946* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 5731* (PACA)].

Campyloneurum angustifolium auct. non (Sw.) Fée = **Campyloneurum aglaolepis** (Alston) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.

Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée var. *ensifolium* auct. non (Willd.) C. Chr. = **Campyloneurum aglaolepis** (Alston) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.

Campyloneurum austrobrasilianum (Alston) de la Sota
Sin.: *Polypodium austrobrasilianum* Alston
Referencias: Lellinger, D. B., 1988; León, B., 1992; de la Sota, E. R., 1960.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2111* (SI)]; BRA[*Eskuche, U. G. 1642-68* (CTES)].

Campyloneurum decurrens (Raddi) C. Presl
Sin.: *Aspidium pentaphyllum* Willd., *Cyrtophlebium decurrens* (Raddi) J. Sm., *Polypodium decurrens* Raddi
Referencias: León, B., 1992; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. 355* (PACA)].

[Campyloneurum fallax Fée]
Notas: Especie excluida del área del proyecto. Citada erróneamente sobre la base de material perteneciente a *Campyloneurum nitidum* (León, 1992).

Campyloneurum herbaceum (H. Christ ex Schwacke) Ching = **Campyloneurum minus** Fée

Campyloneurum lapathifolium (Poir.) Ching = **Campyloneurum repens** (Aubl.) C. Presl

Campyloneurum leuconeurum Fée = **Campyloneurum nitidum** (Kaulf.) C. Presl

Campyloneurum lorentzii (Hieron.) Ching
Sin.: *Polypodium lorentzii* Hieron.
Referencias: Basualdo, I. Z., Soria Rey, N., Degen, R., Ortíz, M. & Zardini, E. M., 2005; de la Sota, E. R., 1960, 1977; León, B., 1992.
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, SAL, TUC); PRY(CAA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33838* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 53236* (MO)].

Campyloneurum major (Hieron. ex Hicken) Lellinger = **Campyloneurum nitidum** (Kaulf.) C. Presl

Campyloneurum minus Fée
Sin.: *Campyloneurum herbaceum* (H. Christ ex Schwacke) Ching, *Polypodium herbaceum* H. Christ ex Schwacke
Referencias: Lellinger, D. B., 1988; León, B., 1992; Márquez, G., Giúdice, G. E. & Ponce, M. M., 2006.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(COA, GUA, ITA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1191* (SI)]; BRA[*Kummrow, R. 1953* (MBM)]; PRY[*Aguayo, A. 288* (MO)].

Campyloneurum nitidum (Kaulf.) C. Presl
Sin.: *Campyloneurum leuconeurum* Fée, *Campyloneurum major* (Hieron. ex Hicken) Lellinger, *Polypodium phyllitidis* L. f. *major* Hieron. ex Hicken, *Polypodium phyllitidis* L. f. *minor* Hieron.
Referencias: León, B., 1992; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Márquez, G., Giúdice, G. E. & Ponce, M. M., 2006; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, GUA, ITA, PAI); URY(CLA, RIV, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1071* (SI)]; BRA[*Labiak, P. H. 213* (SP, UPCB)]; PRY[*Pedersen, T. M. 9548* (US)]; URY[*Felippone, F. 6149* (SI)].

[Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl]
Sin.: *Polypodium phyllitidis* L.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Campyloneurum repens (Aubl.) C. Presl]
Sin.: *Campyloneurum lapathifolium* (Poir.) Ching, *Polypodium lapathifolium* Poir., *Polypodium repens* Aubl.
Referencias: León, B., 1992.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Campyloneurum rigidum J. Sm.
Sin.: *Polypodium lucidum* auct. non T. Moore, *Polypodium rigidum* (J. Sm.) Lowe
Referencias: León, B., 1992.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Carneiro, J. 1512* (MBM)].

Campyloneurum tucumanense (Hieron.) Ching
Sin.: *Polypodium tucumanense* Hieron.
Referencias: Lellinger, D. B., 1988; León, B., 1992; de la Sota, E. R., 1960.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 200–1800 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1637* (SI)].

Craspedaria cordifolia Fée = **Microgramma vacciniifolia** (Langsd. & Fisch.) Copel.
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.

Craspedaria grandis Fée = **Microgramma squamulosa** (Kaulf.) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Craspedaria vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Link = **Microgramma vacciniifolia** (Langsd. & Fisch.) Copel.
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.

Cyrtophlebium decurrens (Raddi) J. Sm. = **Campyloneurum decurrens** (Raddi) C. Presl

Drynaria crassifolia (L.) J. Sm. = **Niphidium crassifolium** (L.) Lellinger
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Drynaria lanceolata (L.) Fée = **Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Drynaria lindbergii (Mett. ex Kuhn) Fée = **Microgramma lindbergii** (Mett. ex Kuhn) de la Sota

Drynaria macrocarpa (Bory ex Willd.) Fée = **Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Drynaria raddiana Fée = **Pleopeltis pleopeltifolia** (Raddi) Alston
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.

Goniophlebium californicum auct. non (Kaulf.) Fée = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Goniophlebium hirsutissimum (Raddi) Brack. = **Pleopeltis hirsutissima** (Raddi) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.

Goniophlebium incanum J. Sm. var. *minor* Fée = **Pleopeltis squalida** (Vell.) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Goniophlebium synammia Fée ex J. Remy = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: de la Sota, E. R., 1969[1968]a; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Goniophlebium translucens (Kunze) Fée = **Synammia intermedia** (Colla) G. Kunkel subsp. **intermedia**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Goniophlebium trilobum (Cav.) T. Moore = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: de la Sota, E. R., 1969[1968]a; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Grammitis araucana Phil., p.p. = **Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Grammitis robusta Phil. = **Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Grammitis triloba (Cav.) Desv. = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: de la Sota, E. R., 1969[1968]a; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lepicystis chrysolepis (Hook.) Diels = **Polypodium chrysolepis** Hook.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Lepicystis lanceolata (L.) Diels = **Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Lepicystis vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Diels = **Microgramma vacciniifolia** (Langsd. & Fisch.) Copel.
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.

Marginaria hirsutissima (Raddi) Pic. Serm. = **Pleopeltis hirsutissima** (Raddi) de la Sota

Marginaria minima Bory = **Pleopeltis squalida** (Vell.) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Mecosorus trilobus (Cav.) Klotzsch = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: de la Sota, E. R., 1969[1968]a; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Microgramma C. Presl

Número de especies: 8

Microgramma chrysolepis (Hook.) Crabbe = **Polypodium chrysolepis** Hook.

Microgramma geminata (Schrad.) A.F. Tryon & R.M. Tryon
Sin.: *Polypodium geminatum* Schrad.
Referencias: Salino, A., Silva, S. M., Dittrich, V. A. & Brítez, R., 2005.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Salino, A. s.n.* (UPCB)].

Microgramma lindbergii (Mett. ex Kuhn) de la Sota
Sin.: *Drynaria lindbergii* (Mett. ex Kuhn) Fée, *Polypodium lindbergii* Mett. ex Kuhn
Referencias: de la Sota, E. R., 1960; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 440* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 12265* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 4892* (BM), *Múlgura de Romero, M. E. 3493* (CTES, FCQ, SI)].

[Microgramma lycopodioides (L.) Copel.]
Sin.: *Polypodium lycopodioides* L.
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Microgramma mortoniana de la Sota
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; de la Sota, E. R., 1973b.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, MIS, SAL); BRA(RGS); PRY(PAI); URY(COL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5271* (SI)]; BRA[*Stribel 1186* (B)]; PRY[*Zardini, E. M. 5615* (FCQ, MO)]; URY[*de la Sota, E. R. 7129* (CTES)].

Microgramma percussa (Cav.) de la Sota
Sin.: *Polypodium percussum* Cav.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 245* (MBM, SP, UPCB)].

Microgramma persicariifolia (Schrad.) C. Presl
Sin.: *Polypodium persicariifolium* Schrad.
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APA, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4145* (BM)].

[Microgramma piloselloides (L.) Copel.]
Sin.: *Polypodium piloselloides* L.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota
Sin.: *Craspedaria grandis* Fée, *Pleopeltis squamulosa* (Kaulf.) C. Presl, *Polypodium lycopodioides* auct. non L., *Polypodium squamulosum* Kaulf.
Referencias: de la Sota, E. R., 1960, 1977; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Stutz, L. C., 1983.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1600 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CAN); URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1865* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 43472* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 4887* (BM)]; URY[*Rosengurtt, B. 4571pe* (MVFA)].

Microgramma tecta (Kaulf.) Alston
Sin.: *Polypodium tectum* Kaulf.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 127* (MBM, UPCB)].

Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel.
Sin.: *Craspedaria cordifolia* Fée, *Craspedaria vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) Link, *Lepicystis vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) Diels, *Polypodium lycopodioides* auct. non L., *Polypodium vaccinifolium* Langsd. & Fisch.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; de la Sota, E. R., 1960; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CAA, CAN, CON, PAI, PHA); URY(ART, CLA, MAL, RIV, ROC, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 401* (SI)]; BRA[*Labiak, P. H. 160* (MBM, SP, UPCB)]; PRY[*Fortunato, R. H. 3751* (BAB)]; URY[*Marchesi, E. 1221* (MVFA)].

Niphidium J. Sm.

Número de especies: 2

Niphidium crassifolium (L.) Lellinger
Sin.: *Anaxetum crassifolium* (L.) Schott, nom. illeg., *Drynaria crassifolia* (L.) J. Sm., *Pessopteris crassifolia* (L.) Underw. & Maxon, *Phymatodes crassifolia* (L.) C. Presl, *Pleopeltis crassifolia* (L.) T. Moore, *Pleuridium crassifolium* (L.) Fée, *Polypodium crassifolium* L.
Referencias: Basualdo, I. Z., Soria Rey, N., Degen, R., Ortíz, M. & Zardini, E. M., 2005; Lellinger, D. B., 1972; de la Sota, E. R., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(RGS); PRY(CAA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Capurro, R. H. 1054* (BA, LIL)]; BRA[*Wasum, R. s.n.* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 7706* (FCQ, MO)].

Niphidium rufosquamatum Lellinger
Referencias: Lellinger, D. B., 1972.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 6151* (LP, US)]; BRA[*Reitz, P. R. 4692* (HBR)].

Pecluma M.G. Price

Número de especies: 12, 2 endémicas

Pecluma camptophyllaria (Fée) M.G. Price var. **lachnifera** (Hieron.) Lellinger
Sin.: *Polypodium camptophyllarium* Fée var. *lachniferum* (Hieron.) A.M. Evans, *Polypodium lachniferum* Hieron.
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–400 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Peña-Chocarro, M. C. 222* (BM, PY)].
Notas: Citada para Brasil por sin mencionar localidad o material de referencia (Peña-Chocarro et al., 1999) .

Pecluma chnoophora (Kunze) Salino & F. Costa Assis
Sin.: *Polypodium chnoophorum* Kunze, *Polypodium dissimile* auct. non L.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998.
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 80* (SP, UPCB)]; PRY[*Zardini, E. M. 5950* (FCQ, MO)].

Pecluma filicula (Kaulf.) M.G. Price
Sin.: *Polypodium elasticum* Rich. var. *filicula* (Kaulf.) Baker, *Polypodium filiculum* Kaulf.
Referencias: Evans, A. M., 1968[1969]; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR); PRY(APA, CAA, CAN, PAI); URY(MAL, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1802* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 23090* (CTES)]; PRY[*Peña-Chocarro, M. C. 266* (BM)]; URY[*Brussa, C. s.n.* (MVJB)].

Pecluma oranense (de la Sota) de la Sota
Sin.: *Polypodium oranense* de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1960, 1977, 1995b.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 1500–1800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Capurro, R. H. 289* (LP)].

Pecluma paradiseae (Langsd. & Fisch.) M.G. Price
Sin.: *Polypodium paradiseae* Langsd. & Fisch.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998.
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 219* (MBM, UPCB)].

[Pecluma pectinata (L.) M.G. Price]
Sin.: *Polypodium pectinatum* L.
Referencias: de la Sota, E. R., 1960; Price, M. G., 1983.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Pecluma pectinatiformis (Lindm.) M.G. Price
Sin.: *Polypodium pectinatiforme* Lindm.
Referencias: de la Sota, E. R., 1960; Evans, A. M., 1968[1969]; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Price, M. G., 1983; Stutz, L. C., 1983.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7719* (SI)]; BRA[*Petean, M. P. 82* (MBM)]; PRY[*Stutz, L. C. 881* (G)].

[Pecluma ptilodon (Kunze) M.G. Price]
Sin.: *Polypodium ptilodon* Kunze
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Pecluma recurvata (Kaulf.) M.G. Price
Sin.: *Polypodium extensum* Fée, *Polypodium paraguayense* Baker, *Polypodium recurvatum* Kaulf., *Polypodium recurvatum* Kaulf. var. *paraguayense* (Baker) Hassl.
Referencias: Evans, A. M., 1968[1969]; Labiak, P. H. & Prado, J., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 234* (UPCB)]; PRY[*Zardini, E. M. 6756* (FCQ, MO)].

Pecluma robusta (Fée) M. Kessler & A.R. Sm.
Sin.: *Polypodium ptilodon* Kunze var. *robustum* (Fée) A.M. Evans, *Polypodium robustum* Fée
Referencias: Arbo, M. M. & Tressens, S. G., 2002; Kessler, M. & Smith, A. R., 2005; Price, M. G., 1983.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2135* (SI)]; BRA[*Bresolin, A. 583* (MBM)]; PRY[*Jiménez, B. 15239* (PY)].

Pecluma sicca (Lindm.) M.G. Price
Sin.: *Polypodium elasticum* auct. non Rich., nom. nud., *Polypodium heteroclitum* Fée, *Polypodium plumula* auct. non Humb. & Bonpl. ex Willd., *Polypodium siccum* Lindm.
Referencias: de la Sota, E. R., 1960; Evans, A. M., 1968[1969]; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Price, M. G., 1983.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAN, GUA); URY(CLA, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1558* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 43490* (CTES)]; PRY[*Morrone, O. 2154* (SI)]; URY[*Felippone, F. s.n.* (SI)].

Pecluma singeri (de la Sota) M.G. Price
Sin.: *Polypodium gregale* Sehnem, *Polypodium singeri* de la Sota
Referencias: Evans, A. M., 1968[1969]; Price, M. G., 1983; de la Sota, E. R., 1960.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1053* (SI)]; BRA[*Wasum, R. s.n.* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5450* (LIL)].

Pecluma truncorum (Lindm.) M.G. Price
Sin.: *Polypodium elasticum* Rich. var. *glaziovii* Baker, *Polypodium truncorum* Lindm.
Referencias: Evans, A. M., 1968[1969]; Price, M. G., 1983; de la Sota, E. R., 1960.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5268* (SI)]; BRA[*Kuniyoshi, Y. S. 4555* (MBM)].

Pecluma venturii (de la Sota) M.G. Price
Sin.: *Polypodium venturii* de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1960, 1977; Evans, A. M., 1968[1969]; Price, M. G., 1983; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 200–2000 m.
Países: ARG(SAL, TUC); PRY(CAA, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 2974* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 5946* (FCQ, MO)].

Pessopteris crassifolia (L.) Underw. & Maxon = **Niphidium crassifolium** (L.) Lellinger
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Phlebodium (R. Br.) J. Sm.

Número de especies: 3

Phlebodium areolatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. Sm.
Sin.: *Phlebodium aureum* (L.) J. Sm. var. *areolatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Farw., *Phlebodium aureum* (L.) J. Sm. var. *areolatum* (Humb. & Bonpl.) de la Sota, comb. superfl., *Polypodium areolatum* Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: de la Sota, E. R., 1960, 1977; Meza Torres, E. I., de la Sota, E. R. & Ferrucci, M. S., 2005.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 200–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, SCA); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pozner, R. 481* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 32567* (MBM)]; PRY[*Zardini, E. M. 5947* (FCQ, MO)].

Phlebodium aureum (L.) J. Sm.
Sin.: *Polypodium aureum* L.
Referencias: Meza Torres, E. I., de la Sota, E. R. & Ferrucci, M. S., 2005, 2006.
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meza Torres, E. I. 165* (CTES, LP)].

Phlebodium aureum (L.) J. Sm. var. *areolatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Farw. = **Phlebodium areolatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. Sm.

Phlebodium aureum (L.) J. Sm. var. *areolatum* (Humb. & Bonpl.) de la Sota, comb. superfl. = **Phlebodium areolatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. Sm.

Phlebodium decumanum (Willd.) J. Sm.
Sin.: *Polypodium decumanum* Willd.
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Esquivel, M. A. 24* (BM)].

Phlebodium lanceolatum (L.) J. Sm. = **Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

[Phlebodium pseudoareum (Cav.) Lellinger]
Referencias: Christensen, C. F. A., 1937; Mickel, J. T. & Smith, A. R., 2004.
Notas: Nombre dudoso.

Phymatodes crassifolia (L.) C. Presl = **Niphidium crassifolium** (L.) Lellinger
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Pleopeltis Humb. & Bonpl. ex Willd.

Número de especies: 11

[Pleopeltis angusta Humb. & Bonpl. ex Willd.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto. Citada erróneamente sobre la base de material perteneciente a *Pleopeltis pleopeltifolia* (Basualdo et al., 1999; Labiak & Prado, 1998).

Pleopeltis argentina (Maxon) de la Sota = **Pleopeltis pinnatifida** Gillies ex Hook. & Grev.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E. Fourn.
Sin.: *Polypodium astrolepis* Liebm.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 251* (MBM, SP, UPCB)].

Pleopeltis bryopoda (Maxon) de la Sota
Sin.: *Polypodium bryopodum* Maxon
Referencias: de la Sota, E. R., 1960, 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 2600–3900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 167* (CTES, SI)].

Pleopeltis chrysolepis (Hook.) de la Sota = **Polypodium chrysolepis** Hook.

Pleopeltis crassifolia (L.) T. Moore = **Niphidium crassifolium** (L.) Lellinger
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la Sota
Sin.: *Goniophlebium hirsutissimum* (Raddi) Brack., *Marginaria hirsutissima* (Raddi) Pic. Serm., *Polypodium hirsutissimum* Raddi, *Polypodium lepidopteris* (Langsd. & Fisch.) Kunze var. *rufulum* (C. Presl) Baker, *Polypodium raddi* Desv., *Polypodium rufulum* C. Presl, *Polypodium vexillare* H. Christ

Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; de la Sota, E. R., 1960.
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAN, COA); URY(CLA, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6488* (SI)]; BRA[*Labiak, P. H. 223* (MBM, SP, UPCB)]; PRY[*Peña-Chocarro, M. C. 288* (BM)]; URY[*Grela, I. s.n.* (MVFA)].

Pleopeltis lanceolatum (L.) C. Presl, hom. illeg.
= **Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Pleopeltis lepidopteris (Langsd. & Fisch.) de la Sota
Sin.: *Acrostichum lepidopteris* Langsd. & Fisch., *Polypodium lepidopteris* (Langsd. & Fisch.) Kunze
Referencias: Sehnem, A., 1970a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PAI, SPE); URY(CLA, LAV, MAL, RIV, ROC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 3883* (PACA)]; PRY[*Rojas, T. 3000a* (AS, MO)]; URY[*Forzza, R. C. 3387* (NY, RB, SP)].

Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf.
Sin.: *Drynaria lanceolata* (L.) Fée, *Drynaria macrocarpa* (Bory ex Willd.) Fée, *Grammitis araucana* Phil., p.p. , *Grammitis robusta* Phil., *Lepicystis lanceolata* (L.) Diels, *Phlebodium lanceolatum* (L.) J. Sm., *Pleopeltis lanceolatum* (L.) C. Presl, hom. illeg., *Polypodium lanceolatum* L., *Polypodium lanceolatum* L. var. *araucanum* (F. Phil.) Looser, *Polypodium macrocarpum* Bory ex Willd.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, SCA); CHL(II, VIII, IX, X, IJF); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 2948* (SI)]; BRA[*Grazziotini, G. s.n.* (MBM)]; CHL[*Dillon, M. O. 5988* (CONC)]; URY[*Izaguirre, P. s.n.* (MVFA)].

Pleopeltis masafuerae (Phil.) de la Sota
Sin.: *Polypodium atacamense* Baker ex Ball, *Polypodium masafuerae* Phil., *Polypodium mollendense* Maxon, *Polypodium squamatum* Phil.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: CHL(II, IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5309* (CONC)].

Pleopeltis pinnatifida Gillies ex Hook. & Grev.
Sin.: *Pleopeltis argentina* (Maxon) de la Sota, *Polypodium argentinum* Maxon, *Polypodium ratibori* Copel., *Polypodium ruiz-leallii* de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1960, 1977.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 200–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4764* (SI)].
Notas: Es probable su presencia en Chile.

Pleopeltis pleopeltidis (Fée) de la Sota
Sin.: *Polypodium pleopeltidis* Fée, *Polypodium typicum* Fée, nom. inval.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 400–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA);
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 4428* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 972* (PACA)].

Pleopeltis pleopeltifolia (Raddi) Alston
Sin.: *Drynaria raddiana* Fée, *Polypodium angustum* auct. non (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Liebm., *Polypodium pleopeltifolium* Raddi
Referencias: Basualdo, I. Z., Soria Rey, N., Degen, R., Ortíz, M. & Zardini, E. M., 2005; de la Sota, E. R., 1960; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE); URY(ART, CLA, FLA, LAV, PAY, RIV, RNO, ROC, SAO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1195* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 43467* (CTES)]; PRY[*Peña-Chocarro, M. C. 264* (BM)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 1808* (MVFA)].

[Pleopeltis polypodioides (L.) E.G. Andrews & Windham]
Sin.: *Acrostichum polypodioides* L., *Polypodium polypodioides* (L.) Watt
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Pleopeltis squalida (Vell.) de la Sota
Sin.: *Goniophlebium incanum* J. Sm. var. *minor* Fée, *Marginaria minima* Bory, *Polypodium incanum* auct. non Sw., *Polypodium incanum* Sw. var. *squalidum* (Vell.) Baker, *Polypodium microlepis* Fée, *Polypodium minimum* (Bory) Herter, nom. illeg., *Polypodium polypodioides* (L.) Watt var. *minus* (Fée) Weath., *Polypodium squalidum* Vell.
Referencias: Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; de la Sota, E. R., 1960, 1977, 2003.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI); URY(ART, CLA, COL, RIV, RNO, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1674* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 26388* (MBM)]; PRY[*Sparre, B. B. 1762* (LIL)]; URY[*Del Puerto, O. s.n.* (MVFA)].

Pleopeltis squamulosa (Kaulf.) C. Presl = **Microgramma squamulosa** (Kaulf.) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Pleopeltis tweediana (Hook.) A.R. Sm.
Sin.: *Polypodium macrocarpon* Bory ex Willd. var. *unguiculare* Griseb., *Polypodium platybasis* Baker, *Polypodium pynocarpum* auct. non C. Chr., *Polypodium tweedianum* Hook.

Referencias: de la Sota, E. R., 1960, 1977; Kessler, M. & Smith, A. R., 2005.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 300–2400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7716* (SI)].

Pleuridium crassifolium (L.) Fée = **Niphidium crassifolium** (L.) Lellinger
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Polypodium L.

Número de especies: 1

Polypodium aglaolepis Alston = **Campyloneurum aglaolepis** (Alston) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

[Polypodium angustifolium Sw. var. ensifolium (Willd.) Sodiro]
Sin.: *Polypodium ensifolium* Willd.
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Polypodium angustum auct. non (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Liebm. = **Pleopeltis pleopeltifolia** (Raddi) Alston
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.

Polypodium appressum Copel. = **Serpocaulon appressum** (Copel.) A.R. Sm.

Polypodium areolatum Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Phlebodium areolatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. Sm.
Referencias: Lellinger, D. B., 1987b.

Polypodium argentinum Maxon = **Pleopeltis pinnatifida** Gillies ex Hook. & Grev.

Polypodium astrolepis Liebm. = **Pleopeltis astrolepis** (Liebm.) E. Fourn.

Polypodium atacamense Baker ex Ball = **Pleopeltis masafuerae** (Phil.) de la Sota
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium aureum L. = **Phlebodium aureum** (L.) J. Sm.

Polypodium austrobrasilianum Alston = **Campyloneurum austrobrasilianum** (Alston) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.

Polypodium brasiliense Poir. = **Serpocaulon triseriale** (Sw.) A.R. Sm.

Polypodium bryopodum Maxon = **Pleopeltis bryopoda** (Maxon) de la Sota

Polypodium camptophyllarium Fée var. *lachniferum* (Hieron.) A.M. Evans = **Pecluma camptophyllaria** (Fée) M.G. Price var. **lachnifera** (Hieron.) Lellinger

Polypodium catharinae Langsd. & Fisch. = **Serpocaulon catharinae** (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.
Referencias: Smith, A. R., Kreier, H. P., Haufler, C. H., Ranker, T. A. & Schneider, H., 2006.

Polypodium chnoophorum Kunze = **Pecluma chnoophora** (Kunze) de la Sota

Polypodium chrysolepis Hook.
Sin.: *Lepicystis chrysolepis* (Hook.) Diels, *Microgramma chrysolepis* (Hook.) Crabbe, *Pleopeltis chrysolepis* (Hook.) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1960, 1977; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 1700–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 2982* (SI)].

Polypodium crassifolium L. = **Niphidium crassifolium** (L.) Lellinger
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Polypodium decumanum Willd. = **Phlebodium decumanum** (Willd.) J. Sm.

Polypodium decurrens Raddi = **Campyloneurum decurrens** (Raddi) C. Presl
Referencias: Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002.

Polypodium dissimile auct. non L. = **Pecluma chnoophora** (Kunze) de la Sota

Polypodium elasticum auct. non Rich., nom. nud. = **Pecluma sicca** (Lindm.) M.G. Price

Polypodium elasticum Rich. var. *filicula* (Kaulf.) Baker = **Pecluma filicula** (Kaulf.) M.G. Price

Polypodium elasticum Rich. var. *glaziovii* Baker = **Pecluma truncorum** (Lindm.) M.G. Price

Polypodium ensifolium Willd. = **Polypodium angustifolium** Sw. var. **ensifolium** (Willd.) Sodiro

Polypodium espinosae Weath. = **Synammia espinosae** (Weath.) G. Kunkel

Polypodium extensum Fée = **Pecluma recurvata** (Kaulf.) M.G. Price

Polypodium feuillei Bertero = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: de la Sota, E. R., 1969[1968]a; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium feuillei Bertero f. *basiscopicum* Looser = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium feuillei Bertero f. *hastifolium* G. Kunkel = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium feuillei Bertero f. *simplex* Looser = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium feuillei Bertero f. *trilobum* (Cav.) Looser = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium feuillei Bertero f. *unilaterale* G. Kunkel = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium feuillei Bertero var. *ibañezii* Looser = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **ibañezii** (Looser) G. Kunkel
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium feuillei Bertero var. *minor* G. Kunkel = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium filiculum Kaulf. = **Pecluma filicula** (Kaulf.) M.G. Price
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Polypodium fraxinifolium Jacq. = **Serpocaulon appressum** (Copel.) A.R. Sm.

Polypodium geminatum Schrad. = **Microgramma geminata** (Schrad.) A.F. Tryon & R.M. Tryon

Polypodium gilliesii C. Chr. = **Serpocaulon gilliesii** (C. Chr.) A.R. Sm.
Referencias: Smith, A. R., Kreier, H. P., Haufler, C. H., Ranker, T. A. & Schneider, H., 2006.

Polypodium glaucescens Bory = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: de la Sota, E. R., 1969[1968]a; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium gregale Sehnem = **Pecluma singeri** (de la Sota) M.G. Price

Polypodium hasslerii H. Christ = **Serpocaulon vacillans** (Link) A.R. Sm.

Polypodium herbaceum H. Christ ex Schwacke = **Campyloneurum minus** Fée
Referencias: León, B., 1992.

Polypodium heteroclitum Fée = **Pecluma sicca** (Lindm.) M.G. Price

Polypodium hirsutissimum Raddi = **Pleopeltis hirsutissima** (Raddi) de la Sota

Polypodium incanum auct. non Sw. = **Pleopeltis squalida** (Vell.) de la Sota
Referencias: Sehnem, A., 1970a.

Polypodium incanum Sw. var. *squalidum* (Vell.) Baker = **Pleopeltis squalida** (Vell.) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Polypodium intermedium Colla = **Synammia intermedia** (Colla) G. Kunkel subsp. **intermedia**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium intermedium Colla var. *basicompositum* C. Chr. & Skottsb. = **Synammia intermedia** (Colla) G. Kunkel subsp. **intermedia**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium intermedium Colla var. *fernandezianum* = **Synammia intermedia** (Colla) G. Kunkel subsp. **intermedia**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium intermedium Colla subsp. *masafueranum* C. Chr. & Skottsb. = **Synammia intermedia** (Colla) G. Kunkel subsp. **masafuerana** (C. Chr. & Skottsb.) G. Kunkel
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium lachniferum Hieron. = **Pecluma camptophyllaria** (Fée) M.G. Price var. **lachnifera** (Hieron.) Lellinger

Polypodium laetum Raddi = **Serpocaulon latipes** (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.

Polypodium lanceolatum L. = **Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium lanceolatum L. var. *araucanum* (F. Phil.) Looser = **Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium lapathifolium Poir. = **Campyloneurum repens** (Aubl.) C. Presl

Polypodium latipes Langsd. & Fisch. = **Serpocaulon latipes** (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.
Referencias: Smith, A. R., Kreier, H. P., Haufler, C. H., Ranker, T. A. & Schneider, H., 2006.

Polypodium latissimum R.C. Moran & B. Øllg. = **Serpocaulon latissimum** (R.C. Moran & B. Øllg.) A.R. Sm.

Referencias: Smith, A. R., Kreier, H. P., Haufler, C. H., Ranker, T. A. & Schneider, H., 2006.

Polypodium lepidopteris (Langsd. & Fisch.) Kunze = **Pleopeltis lepidopteris** (Langsd. & Fisch.) de la Sota

Polypodium lepidopteris (Langsd. & Fisch.) Kunze var. *rufulum* (C. Presl) Baker = **Pleopeltis hirsutissima** (Raddi) de la Sota

Polypodium lindbergii Mett. ex Kuhn = **Microgramma lindbergii** (Mett. ex Kuhn) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.

Polypodium lorentzii Hieron. = **Campyloneurum lorentzii** (Hieron.) Ching
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Polypodium lucidum auct. non T. Moore = **Campyloneurum rigidum** J. Sm.

Polypodium lycopodioides auct. non L. = **Microgramma squamulosa** (Kaulf.) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.

Polypodium lycopodioides auct. non L. = **Microgramma vacciniifolia** (Langsd. & Fisch.) Copel.
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.

Polypodium lycopodioides L. = **Microgramma polypodioides** (L.) Copel.

Polypodium macrocarpon Bory ex Willd. var. *unguiculare* Griseb. = **Pleopeltis tweediana** (Hook.) A.R. Sm.

Polypodium macrocarpum Bory ex Willd. = **Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium masafuerae Phil. = **Pleopeltis masafuerae** (Phil.) de la Sota

[Polypodium medicinale Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d.
Notas: Nombre dudoso.

Polypodium meniscifolium Langsd. & Fisch. = **Serpocaulon triseriale** (Sw.) A.R. Sm.

Polypodium microlepis Fée = **Pleopeltis squalida** (Vell.) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Polypodium minimum (Bory) Herter, nom. illeg. = **Pleopeltis squalida** (Vell.) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Polypodium mollendense Maxon = **Pleopeltis masafuerae** (Phil.) de la Sota
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium neriifolium Schkuhr = **Serpocaulon triseriale** (Sw.) A.R. Sm.

Polypodium oranense de la Sota = **Pecluma oranense** (de la Sota) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1995b.

Polypodium paradiseae Langsd. & Fisch. = **Pecluma paradiseae** (Langsd. & Fisch.) M.G. Price

Polypodium paraguayense Baker = **Pecluma recurvata** (Kaulf.) M.G. Price

Polypodium pectinatiforme Lindm. = **Pecluma pectinatiformis** (Lindm.) M.G. Price
Referencias: Price, M. G., 1983.

Polypodium pectinatum L. = **Pecluma pectinata** (L.) M.G. Price

Polypodium percussum Cav. = **Microgramma percussa** (Cav.) de la Sota

Polypodium persicariifolium Schrad. = **Microgramma persicariifolia** (Schrad.) C. Presl

Polypodium phyllitidis L. = **Campyloneurum phyllitidis** (L.) C. Presl

Polypodium phyllitidis L. f. *major* Hieron. ex Hicken = **Campyloneurum nitidum** (Kaulf.) C. Presl
Referencias: León, B., 1992.

Polypodium phyllitidis L. f. *minor* Hieron. = **Campyloneurum nitidum** (Kaulf.) C. Presl

Polypodium piloselloides L. = **Microgramma piloselloides** (L.) Copel.
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.

Polypodium platybasis Baker = **Pleopeltis tweediana** (Hook.) A.R. Sm.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Polypodium pleopeltidis Fée = **Pleopeltis pleopeltidis** (Fée) de la Sota

Polypodium pleopeltifolium Raddi = **Pleopeltis pleopeltifolia** (Raddi) Alston
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.

Polypodium plumula auct. non Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Pecluma sicca** (Lindm.) M.G. Price

Polypodium polypodioides (L.) Watt = **Pleopeltis polypodioides** (L.) E.G. Andrews & Windham

Polypodium polypodioides (L.) Watt var. *minus* (Fée) Weath. = **Pleopeltis squalida** (Vell.) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Polypodium ptilodon Kunze = **Pecluma ptilodon** (Kunze) M.G. Price

Polypodium ptilodon Kunze var. *robustum* (Fée) A.M. Evans = **Pecluma robusta** (Fée) M. Kessler & A.R. Sm.
Referencias: Price, M. G., 1983.

Polypodium pubescens Gillies ex Hook. & Grev., hom. illeg. = **Serpocaulon gilliesii** (C. Chr.) A.R. Sm.
Referencias: Smith, A. R., Kreier, H. P., Haufler, C. H., Ranker, T. A. & Schneider, H., 2006; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Polypodium pynocarpum auct. non C. Chr. = **Pleopeltis tweediana** (Hook.) A.R. Sm.
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.

Polypodium raddi Desv. = **Pleopeltis hirsutissima** (Raddi) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.

Polypodium ratibori Copel. = **Pleopeltis pinnatifida** Gillies ex Hook. & Grev.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Polypodium recurvatum Kaulf. = **Pecluma recurvata** (Kaulf.) M.G. Price

Polypodium recurvatum Kaulf. var. *paraguayense* (Baker) Hassl. = **Pecluma recurvata** (Kaulf.) M.G. Price

Polypodium repens Aubl. = **Campyloneurum repens** (Aubl.) C. Presl

Polypodium rigidum (J. Sm.) Lowe = **Campyloneurum rigidum** J. Sm.

Polypodium robustum Fée = **Pecluma robusta** (Fée) M. Kessler & A.R. Sm.
Referencias: Price, M. G., 1983.

Polypodium rufulum C. Presl = **Pleopeltis hirsutissima** (Raddi) de la Sota

Polypodium ruiz-leallii de la Sota = **Pleopeltis pinnatifida** Gillies ex Hook. & Grev.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Polypodium siccum Lindm. = **Pecluma sicca** (Lindm.) M.G. Price
Referencias: Price, M. G., 1983.

Polypodium singeri de la Sota = **Pecluma singeri** (de la Sota) M.G. Price
Referencias: Price, M. G., 1983.

Polypodium squalidum Vell. = **Pleopeltis squalida** (Vell.) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 2003.

Polypodium squamatum Phil. = **Pleopeltis masafuerae** (Phil.) de la Sota
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium squamulosum Kaulf. = **Microgramma squamulosa** (Kaulf.) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Polypodium synammia (Fée ex J. Remy) C. Chr. = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: de la Sota, E. R., 1969[1968]a; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium tectum Kaulf. = **Microgramma tecta** (Kaulf.) Alston

Polypodium transluscens Kunze = **Synammia intermedia** (Colla) G. Kunkel subsp. **intermedia**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium trilobum Cav., hom. illeg. = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: de la Sota, E. R., 1969[1968]a; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium triseriale Sw. = **Serpocaulon triseriale** (Sw.) A.R. Sm.
Referencias: Smith, A. R., Kreier, H. P., Haufler, C. H., Ranker, T. A. & Schneider, H., 2006.

Polypodium truncorum Lindm. = **Pecluma truncorum** (Lindm.) M.G. Price
Referencias: Price, M. G., 1983.

Polypodium tucumanense Hieron. = **Campyloneurum tucumanense** (Hieron.) Ching
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Polypodium tweedianum Hook. = **Pleopeltis tweediana** (Hook.) A.R. Sm.

Polypodium typicum Fée, nom. inval. = **Pleopeltis pleopeltidis** (Fée) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Polypodium vaccinifolium Langsd. & Fisch. = **Microgramma vacciniifolia** (Langsd. & Fisch.) Copel.
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.

Polypodium vacillans Link = **Serpocaulon vacillans** (Link) A.R. Sm.
Referencias: Smith, A. R., Kreier, H. P., Haufler, C. H., Ranker, T. A. & Schneider, H., 2006.

Polypodium venturii de la Sota = **Pecluma venturii** (de la Sota) M.G. Price
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1993.

Polypodium vexillare H. Christ = **Pleopeltis hirsutissima** (Raddi) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1960.

Serpocaulon A.R. Sm.

Número de especies: 6

[Serpocaulon appressum (Copel.) A.R. Sm.]
Sin.: *Polypodium appressum* Copel., *Polypodium fraxinifolium* Jacq.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Serpocaulon catharinae (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.
Sin.: *Polypodium catharinae* Langsd. & Fisch.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Smith, A. R., Kreier, H. P., Haufler, C. H., Ranker, T. A. & Schneider, H., 2006.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 101* (MBM, SP, UPCB)]; PRY[*Zardini, E. M. 27096* (FCQ, MO)].

Serpocaulon gilliesii (C. Chr.) A.R. Sm.
Sin.: *Polypodium gilliesii* C. Chr., *Polypodium pubescens* Gillies ex Hook. & Grev., hom. illeg.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Smith, A. R., Kreier, H. P., Haufler, C. H., Ranker, T. A. & Schneider, H., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 38* (SI)].
Notas: Esta especie fué erróneamente considerada un sinónimo de *Polypodium lasiopus* (R. M. Tryon & Stolze, 1993).

Serpocaulon latipes (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.
Sin.: *Polypodium laetum* Raddi, *Polypodium latipes* Langsd. & Fisch.
Referencias: de la Sota, E. R., 1960; Hensen, R. V., 1990; Sehnem, A., 1970a; Smith, A. R., Kreier, H. P., Haufler, C. H., Ranker, T. A. & Schneider, H., 2006.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 200–1800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAN, COA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwindt, E. 4691* (LIL)]; BRA[*Reitz, P. R. 731h* (LIL)]; PRY[*Peña-Chocarro, M. C. 333* (BM)].

Serpocaulon latissimum (R.C. Moran & B. Øllg.) A.R. Sm.
Sin.: *Polypodium latissimum* R.C. Moran & B. Øllg.
Referencias: Moran, R. C. & Øllgaard, B., 1995; Smith, A. R., Kreier, H. P., Haufler, C. H., Ranker, T. A. & Schneider, H., 2006.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 800–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Barbosa, E. 644* (MBM)].

[Serpocaulon loriceum (L.) A.R. Sm.]
Referencias: Smith, A. R., Kreier, H. P., Haufler, C. H., Ranker, T. A. & Schneider, H., 2006.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm.
Sin.: *Polypodium brasiliense* Poir., *Polypodium meniscifolium* Langsd. & Fisch., *Polypodium neriifolium* Schkuhr, *Polypodium triseriale* Sw.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Smith, A. R., 1995; Smith, A. R., Kreier, H. P., Haufler, C. H., Ranker, T. A. & Schneider, H., 2006.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 119* (MBM, SP, UPCB)]; PRY[*Jiménez, B. 1481a* (BM)].

Serpocaulon vacillans (Link) A.R. Sm.
Sin.: *Polypodium hasslerii* H. Christ, *Polypodium vacillans* Link
Referencias: Hensen, R. V., 1990; Smith, A. R., Kreier, H. P., Haufler, C. H., Ranker, T. A. & Schneider, H., 2006.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 200–1900 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAU, CAA, CAN, COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Cruz, J. M. 89* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 5824* (BM)].

Synammia C. Presl

Número de especies: 3 endémicas

Synammia espinosae (Weath.) G. Kunkel
Sin.: *Polypodium espinosae* Weath.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Schneider, H., Kreier, H. P., Wilson, R. & Smith, A. R., 2006.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 200–1000 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5492* (GH)].

Synammia feuillei (Bertero) Copel. f. *basiscopica* (Looser) G. Kunkel = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Synammia feuillei (Bertero) Copel. f. *hastifolia* (G. Kunkel) G. Kunkel = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Synammia feuillei (Bertero) Copel. f. *simplex* (Looser) G. Kunkel = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Synammia feuillei (Bertero) Copel. f. *triloba* (Cav.) G. Kunkel = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Synammia feuillei (Bertero) Copel. f. *unilaterale* (G. Kunkel) G. Kunkel = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**

Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Synammia feuillei (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Sin.: *Goniophlebium californicum* auct. non (Kaulf.) Fée, *Goniophlebium synammia* Fée ex J. Remy, *Goniophlebium trilobum* (Cav.) T. Moore, *Grammitis triloba* (Cav.) Desv., *Mecosorus trilobus* (Cav.) Klotzsch, *Polypodium feuillei* Bertero, *Polypodium feuillei* Bertero f. *basiscopicum* Looser, *Polypodium feuillei* Bertero f. *hastifolium* G. Kunkel, *Polypodium feuillei* Bertero f. *simplex* Looser, *Polypodium feuillei* Bertero f. *trilobum* (Cav.) Looser, *Polypodium feuillei* Bertero f. *unilaterale* G. Kunkel, *Polypodium feuillei* Bertero var. *minor* G. Kunkel, *Polypodium glaucescens* Bory, *Polypodium synammia* (Fée ex J. Remy) C. Chr., *Polypodium trilobum* Cav., hom. illeg., *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. f. *basiscopica* (Looser) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. f. *hastifolia* (G. Kunkel) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. f. *simplex* (Looser) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. f. *triloba* (Cav.) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. f. *unilaterale* (G. Kunkel) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *minor* (G. Kunkel) G. Kunkel, *Synammia skottsbergii* G. Kunkel, *Synammia triloba* (Cav.) C. Presl
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; de la Sota, E. R., 1960; de la Sota, E. R., 1969[1968]a; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Rodríguez Ríos, R., 1995; Schneider, H., Kreier, H. P., Wilson, R. & Smith, A. R., 2006.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rossow, R. A. 2193* (BAB)]; CHL[*Marticorena, C. 483* (CONC)].

Synammia feuillei (Bertero) Copel. var. **ibañezii** (Looser) G. Kunkel
Sin.: *Polypodium feuillei* Bertero var. *ibañezii* Looser
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ibáñez 647* (*)].

Synammia feuillei (Bertero) Copel. var. *minor* (G. Kunkel) G. Kunkel = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Synammia intermedia (Colla) G. Kunkel subsp. **intermedia**
Sin.: *Goniophlebium translucens* (Kunze) Fée, *Polypodium intermedium* Colla, *Polypodium intermedium* Colla var. *basicompositum* C. Chr. & Skottsb., *Polypodium intermedium* Colla var. *fernandezianum*, *Polypodium transluscens* Kunze, *Synammia intermedia* (Colla) G. Kunkel subsp. *masatierrae* (C. Chr. & Skottsb.) G. Kunkel
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Schneider, H., Kreier, H. P., Wilson, R. & Smith, A. R., 2006.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 9147* (CONC)].

Synammia intermedia (Colla) G. Kunkel subsp. **masafuerana** (C. Chr. & Skottsb.) G. Kunkel
Sin.: *Polypodium intermedium* Colla subsp. *masafueranum* C. Chr. & Skottsb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 200 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, C. J. F. 432* (SGO)].

Synammia intermedia (Colla) G. Kunkel subsp. *masatierrae* (C. Chr. & Skottsb.) G. Kunkel = **Synammia intermedia** (Colla) G. Kunkel subsp. **intermedia**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Synammia skottsbergii G. Kunkel = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Synammia triloba (Cav.) C. Presl = **Synammia feuillei** (Bertero) Copel. var. **feuillei**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

PSILOTACEAE

Autores: de la Sota, E. R. & Ponce, M. M.
Revisor: Prado, J.

1 género, 1 especie.

Lycopodium nudum L. = **Psilotum nudum** (L.) P. Beauv.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Molina, R. A., 1975; Salvo Tierra, A. E. & España, L., 1987b.

Psilotum Sw.

Número de especies: 1

Psilotum nudum (L.) Griseb., comb. superfl. = **Psilotum nudum** (L.) P. Beauv.
Referencias: Molina, R. A., 1975.

Psilotum nudum (L.) P. Beauv.
Sin.: *Lycopodium nudum* L., *Psilotum nudum* (L.) Griseb., comb. superfl., *Psilotum triquetrum* Sw., *Psilotum triquetrum* Sw. var. *gracile* Hook. & Grev.
Referencias: de la Sota, E. R., 1972d, 1977; Fernández Casas, F. J., 1988; Marchesi, E., 1979; Rodríguez Ríos, R., 1995; Salvo Tierra, A. E. & España, L., 1987b.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL); BRA(RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE); URY(ROC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29002* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 7977* (PACA)]; PRY[*Hassler, E. 5805* (BM), *Woolston, A. L. 810* (NY)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Psilotum triquetrum Sw. = **Psilotum nudum** (L.) P. Beauv.
Referencias: Salvo Tierra, A. E. & España, L., 1987b; de la Sota, E. R., 1977.

Psilotum triquetrum Sw. var. *gracile* Hook. & Grev. = **Psilotum nudum** (L.) P. Beauv.
Referencias: Salvo Tierra, A. E. & España, L., 1987b; de la Sota, E. R., 1977.

PTERIDACEAE

Autores: Ponce, M. M., Prado., J. & Giúdice, G. E.
Revisor: Yatskievych, G.

18 géneros, 122 especies, 24 especies endémicas, 6 especies introducidas.

Acrostichum L.

Número de especies: 1

Acrostichum albidulum Sw. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **nivea**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Acrostichum aureonitens Hook. = **Trachypteris pinnata** (Hook. f.) C. Chr.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

[Acrostichum aureum L.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Acrostichum bonariense Willd. = **Cheilanthes bonariensis** (Willd.) Proctor
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Acrostichum calomelanos L. = **Pityrogramma calomelanos** (L.) Link var. **calomelanos**
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch.
Sin.: *Acrostichum excelsum* Maxon
Referencias: Sehnem, A., 1972.
Hierba palustre. Nativa. 0–100 m.
Países: ARG(CHA, FOR); BRA(PAR, SCA); PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 1632* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 12273* (HBR, US)]; PRY[*da Silva, A. F. 2153* (FCQ)].

Acrostichum excelsum Maxon = **Acrostichum danaeifolium** Langsd. & Fisch.
Referencias: Hassler, E., 1928.

Acrostichum flavens Sw. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **flava** (Hook.) Ponce
Referencias: Ponce, M. M., 1996.

Acrostichum gillianum Baker = **Trachypteris pinnata** (Hook. f.) C. Chr.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Acrostichum glaucum Cav. = **Cheilanthes glauca** (Cav.) Mett.
Referencias: Looser, G., 1939; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Acrostichum scariosum Sw. = **Cheilanthes scariosa** (Sw.) C. Presl
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Acrostichum sinuatum Lag. & Sw. = **Astrolepis sinuata** (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham
Referencias: Benham, D. M. & Windham, M., 1992; Morbelli, M. & Ponce, M. M., 1997.

Acrostichum trifoliatum L. = **Trismeria trifoliata** (L.) Diels
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Sehnem, A., 1972; de la Sota, E. R., 1977.

Adiantopsis Fée

Número de especies: 5, 1 endémica

Adiantopsis cheilanthoides R.M. Senna
Referencias: Senna, R. M., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Senna, R. M. 208* (HAS, HBR, PACA)].

Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée
Sin.: *Cheilanthes brasiliensis* Raddi, *Cheilanthes chlorophylla* Sw., *Cheilanthes spectabilis* Kaulf.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; de la Sota, E. R., 1972d, 1977; Capurro, R. H., 1961; Prado, J., 2004b; Sehnem, A., 1972; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE); URY(ART, CLA, COL, FLA, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 1753* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 14635* (HBR)]; PRY[*Marín, G. 232* (PY)]; URY[*Berro, M. B. 5236* (MVFA)].

Adiantopsis dichotoma (Cav.) Moore = **Cheilanthes dichotoma** Sw.
Referencias: Ponce, M. M. & Morbelli, M., 1989.

Adiantopsis occulta Sehnem
Referencias: Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 14772* (HBR)].

Adiantopsis perfasciculata Sehnem
Referencias: Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 16843a* (HBR)].

Adiantopsis radiata (L.) Fée
Sin.: *Adiantum radiatum* L., *Cheilanthes radiata* (L.) J. Sm.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Prado, J., 2004b; Sehnem, A., 1972; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1448* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 7149* (HBR)]; PRY[*Charpin, A. 21251* (G, SI)].

Adiantopsis regularis (Mett.) T. Moore = **Cheilanthes regularis** Mett.

Adiantum L.

Número de especies: 35, 5 endémicas, 1 introducida

Adiantum abscissum Schrad.
Sin.: *Adiantum brasiliense* Raddi
Referencias: Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2323* (HBR, PACA, US)].

Adiantum aemulum T. Moore = **Adiantum raddianum** C. Presl
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Adiantum aethiopicum auct. non L. = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **thalictroides**
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Adiantum aethiopicum L. = **Adiantum chilense** Kaulf. var. **chilense**
Referencias: Giúdice, G. & Nieto, M., 1994.

Adiantum aethiopicum L. var. *glabrum* Kuntze = **Adiantum chilense** Kaulf. var. **chilense**
Referencias: Giúdice, G., 1994; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Adiantum aethiopicum L. var. *hirsutum* (Hook. & Grev.) Kuntze = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **hirsutum** (Hook. & Grev.) de la Sota
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Adiantum aethiopicum L. var. *scabrum* (Kaulf.) Kuntze = **Adiantum chilense** Kaulf. var. **scabrum** (Kaulf.) Hicken
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Adiantum aethiopicum L. var. *sulphureum* (Kaulf.) Kuntze = **Adiantum chilense** Kaulf. var. **sulphureum** (Hook.) Giúdice
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Adiantum amabile T. Moore, hom. illeg. = **Adiantum raddianum** C. Presl
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Adiantum brasiliense Raddi = **Adiantum abscissum** Schrad.

Adiantum capillus-veneris L.
Sin.: *Adiantum formosum* auct. non R. Br., *Adiantum remyanum* Espinosa
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–2100 m.
Países: BRA(RGS); CHL(I, III, IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reineck, E. M. 210* (US)]; CHL[*Ricardi, M. 3881* (CONC)].

Adiantum chilense Kaulf. var. **chilense**
Sin.: *Adiantum aethiopicum* L., *Adiantum aethiopicum* L. var. *glabrum* Kuntze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Broughton, D. A., Adam, J. H. M. & Brännström, R., 2000; Capurro, R. H., 1940[1938]; Giúdice, G. & Nieto, M., 1994; Giúdice, G., 1998, 1999; Looser, G., 1939; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU, TDF); CHL(I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 1097* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20019* (CONC, SGO)].

Adiantum chilense Kaulf. var. *hirsutum* Hook. & Grev. = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **hirsutum** (Hook. & Grev.) de la Sota
Referencias: Giúdice, G., 1999; Rodríguez Ríos, R., 1995; de la Sota, E. R., 1977.

Adiantum chilense Kaulf. var. **scabrum** (Kaulf.) Hicken
Sin.: *Adiantum aethiopicum* L. var. *scabrum* (Kaulf.) Kuntze, *Adiantum glanduliferum* auct. non Link, *Adiantum philippianum* Espinosa, *Adiantum scabrum* Kaulf. var. *philippianum* (Espinosa) Looser, *Adiantum scabrum* Kaulf. var. *scabrum*
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Capurro, R. H., 1940[1938]; Giúdice, G., 1995, 1998, 1999; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.

Países: ARG(NEU); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26445* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996162* (CONC)].

Adiantum chilense Kaulf. var. *subsulphurea* auct. non (Kaulf.) Kuntze = **Adiantum chilense** Kaulf. var. **sulphureum** (Hook.) Giúdice
Referencias: Giúdice, G., 1999.

Adiantum chilense Kaulf. var. *subsulphureum* (J. Remy) Giúdice = **Adiantum chilense** Kaulf. var. **sulphureum** (Hook.) Giúdice
Referencias: Giúdice, G., 1999.

Adiantum chilense Kaulf. var. **sulphureum** (Hook.) Giúdice
Sin.: *Adiantum aethiopicum* L. var. *sulphureum* (Kaulf.) Kuntze, *Adiantum chilense* Kaulf. var. *subsulphurea* auct. non (Kaulf.) Kuntze, *Adiantum chilense* Kaulf. var. *subsulphureum* (J. Remy) Giúdice, *Adiantum poiretii* Wikstr. var. *sulphureum* (Kaulf.) R.M. Tryon, *Adiantum subsulphureum* J. Remy, *Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *cuneifolium* Meigen, *Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *majus* Hook., *Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *minus* Hook., *Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *subsulphureum* (J. Remy) Looser, *Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *sulphureum*
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Giúdice, G., 1998, 1999; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1700 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 300* (LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 994846* (CONC, SGO)].

Adiantum colpodes T. Moore = **Adiantum raddianum** C. Presl
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Adiantum crenatum auct. non Poir. = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **thalictroides**
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Adiantum crenatum Poir. f. *glabra* Hieron. = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **thalictroides**
Referencias: Giúdice, G., 1994.

Adiantum cuneatum Langsd. & Fisch., hom. illeg. = **Adiantum raddianum** C. Presl
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Adiantum cuneatum Langsd. & Fisch. var. *veneris* Griseb. = **Adiantum lorentzii** Hieron.
Referencias: Giúdice, G., 1994.

Adiantum curvatum Kaulf.
Referencias: Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 33838* (HB, LP, MBM, MO, U)].

Adiantum deflectens Mart.
Sin.: *Adiantum deflectens* Mart. var. *tremulum* Kunze ex Hieron., *Adiantum dolabriforme* Hook., *Adiantum subaristatum* Fée
Referencias: Giúdice, G., 1999, 2001; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(SAL); BRA(PAR); PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3368* (SI)]; BRA[*Martius, C. F. P. s.n.* (M)]; PRY[*Zardini, E. M. 13139* (MO)].

Adiantum deflectens Mart. var. *tremulum* Kunze ex Hieron. = **Adiantum deflectens** Mart.
Referencias: Giúdice, G., 2001.

Adiantum delicatulum Mart.
Referencias: Giúdice, G., 2001; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: PRY(APY, AMA, CEN, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 5545* (MO)].

Adiantum digitatum C. Presl, nom. nud. = **Adiantum digitatum** Hook.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Adiantum digitatum Hook.
Sin.: *Adiantum digitatum* C. Presl, nom. nud., *Adiantum palmatum* T. Moore, *Adiantum speciosum* Hook.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Giúdice, G., 1999; Legrand, C. M. D. H. & Lombardo, A., 1958; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(ART, LAV, MAL, RNO, RIV, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 4275* (LP)]; BRA[*Spannagel, C. 189* (HB, NY, SPF)]; URY[*Bonifacino, J. M. s.n.* (MVFA)].

Adiantum diogoanum Glaz. ex Baker
Referencias: Prado, J. & Smith, A. R., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14304* (MBM, PACA)].

Adiantum dolabriforme Hook. = **Adiantum deflectens** Mart.
Referencias: Giúdice, G., 2001.

Adiantum excisum Kunze
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1700 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles, C. 297* (CONC)].

Adiantum filiforme Gardner
Sin.: *Adiantum flagellum* Fée, *Adiantum glareosum* Lindm.
Referencias: Giúdice, G. & Nieto, M., 1994; Giúdice, G., 1999, 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA, GUA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 135* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 4153* (LP)].

Adiantum flagellum Fée = **Adiantum filiforme** Gardner
Referencias: Giúdice, G., 2001.

Adiantum formosum auct. non R. Br. = **Adiantum capillus-veneris** L.

[Adiantum fossarum Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d.
Notas: Nombre dudoso.

Adiantum fovearum Raddi = **Adiantum latifolium** Lam.
Referencias: Giúdice, G., 1995, 1999.

Adiantum gertrudis Espinosa
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 3250* (CONC)].

Adiantum glanduliferum auct. non Link = **Adiantum chilense** Kaulf. var. **scabrum** (Kaulf.) Hicken
Referencias: Giúdice, G., 1995, 1999; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Adiantum glanduliferum Link = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **hirsutum** (Hook. & Grev.) de la Sota
Referencias: Giúdice, G., 1999; Rodríguez Ríos, R., 1995; de la Sota, E. R., 1977.

Adiantum glareosum Lindm. = **Adiantum filiforme** Gardner
Referencias: Giúdice, G., 2001.

[Adiantum gracile Fée]
Referencias: Sehnem, A., 1972.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Adiantum hirtum Klotzsch = **Adiantum terminatum** Miq.
Referencias: Sehnem, A., 1972.

Adiantum humile Kunze
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 43647* (MBM, UC)].

Adiantum incertum Lindm.
Referencias: Prado, J. & Lellinger, D. B., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 23171* (HB, MBM, MO, UC)]; PRY[*Lindman, C. A. M. s.n.* (B, BM, K)].

Adiantum intermedium Sw.
Referencias: Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Haerchen, F. 182* (US)].

Adiantum kaulfussii Kunze = **Adiantum petiolatum** Desv.
Referencias: Sehnem, A., 1972.

Adiantum latifolium Lam.
Sin.: *Adiantum fovearum* Raddi
Referencias: Giúdice, G., 1995, 1999; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(FOR, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APY, APA, CAN, CEN, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 438* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15831* (MBM, NY, UPCB, US)]; PRY[*Krapovickas, A. 2491* (LP)].

Adiantum lorentzii Hieron.
Sin.: *Adiantum cuneatum* Langsd. & Fisch. var. *veneris* Griseb.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Giúdice, G. & Nieto, M., 1994; Giúdice, G., 1999; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 124* (SI)]; BRA[*Jürgens, C. s.n.* (NY, P, R, UC, W)]; PRY[*Schinini, A. 27926* (CTES)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o material de referencia.

[Adiantum lucidum Rojas Acosta, hom. illeg.]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d.
Notas: Nombre dudoso.

Adiantum lucidum (Cav.) Sw. var. *pinnatum* E. Fourn. = **Adiantum petiolatum** Desv.

[Adiantum lunulatum Burm. f.]
Referencias: Giúdice, G., 1994, 1999.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Adiantum macrophyllum Sw.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Giúdice, G., 1999; Sehnem, A., 1972; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 417* (LP)].

Adiantum mathewsianum Hook.
Referencias: Prado, J. & Palacios-Rios, M., 1998; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APY, CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. M. 3190* (MBM, W)]; PRY[*Zardini, E. M. 53826* (G)].

Adiantum microphyllum Sw. = **Cheilanthes microphylla** (Sw.) Sw.
Referencias: Tryon, A. F. & Tryon, R. M., 1982.

Adiantum moorei Baker = **Adiantum raddianum** C. Presl
Referencias: Giúdice, G., 1999; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Adiantum obliquum Willd.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Prado, J. 470* (MBM, UPCB)].

Adiantum obliquum auct. non Willd. = **Adiantum petiolatum** Desv.

Adiantum oblongatum Schrad. = **Adiantum petiolatum** Desv.

Adiantum obtusum Desv. = **Adiantum serrato-dentatum** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Giúdice, G., 1999.

Adiantum orbignyanum Mett. ex Kuhn
Sin.: *Adiantum tenerum* Sw. var. *rhomboideum* Griseb.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Giúdice, G. & Nieto, M., 1994; Giúdice, G., 1999; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Hierba. Perenne. Nativa. 1700–4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 6362* (LP)].

Adiantum palmatum T. Moore = **Adiantum digitatum** Hook.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Giúdice, G., 1999.

Adiantum papillosum Handro
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 33844* (MBM)].

Adiantum pearcei F. Phil.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pearce s.n.* (CONC)].

Adiantum pectinatum Kunze ex Baker
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Giúdice, G., 1999; Sehnem, A., 1972; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); BRA(PAR, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7678* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 1751* (MBM)]; PRY[*Rojas, T. 10579* (G)].

[Adiantum pedatum L.]
Referencias: Giúdice, G., 1994.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Adiantum pellucidum M. Martens & Galeotti = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **thalictroides**
Referencias: de la Sota, E. R., 1972b; Giúdice, G., 1999.

Adiantum pentadactylon Langsd. & Fisch.
Sin.: *Adiantum trapeziforme* L. var. *pentadactyla* (Langsd. & Fisch.) C. Chr.
Referencias: Giúdice, G., 1999; Prado, J. & Palacios-Rios, M., 1998; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Prado, J. 471* (MBM, NY, SJRP, UPCB)].

Adiantum petiolatum Desv.
Sin.: *Adiantum kaulfussii* Kunze, *Adiantum lucidum* (Cav.) Sw. var. *pinnatum* E. Fourn., *Adiantum obliquum* auct. non Willd., *Adiantum oblongatum* Schrad.
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 280* (B, P, US)]; PRY[*Marín, G. 239* (PY)].

Adiantum philippianum Espinosa = **Adiantum chilense** Kaulf. var. **scabrum** (Kaulf.) Hicken
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Adiantum pilosum Fée = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **hirsutum** (Hook. & Grev.) de la Sota
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Adiantum platyphyllum Sw.
Referencias: Giúdice, G., 1994, 1999; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–1000 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11664* (G)].

Adiantum poiretii Wikstr.
Referencias: Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pirani, J. R. 598* (SP, SPF)].

Adiantum poiretii auct. non Wikstr. = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **thalictroides**
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Adiantum poiretii Wikstr. f. *glabra* (Hieron.) Hicken & Capurro = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **thalictroides**
Referencias: Giúdice, G. & Nieto, M., 1994.

Adiantum poiretii Wikstr. f. *hirsutum* (Hook. & Grev.) Hicken = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **hirsutum** (Hook. & Grev.) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Adiantum poiretii Wikstr. var. *hirsutum* (Hook. & Grev.) R.M. Tryon = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **hirsutum** (Hook. & Grev.) de la Sota
Referencias: Giúdice, G., 1999; Rodríguez Ríos, R., 1995; de la Sota, E. R., 1977.

Adiantum poiretii Wikstr. var. *sulphureum* (Kaulf.) R.M. Tryon = **Adiantum chilense** Kaulf. var. **sulphureum** (Hook.) Giúdice
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

[Adiantum polyphyllum Willd.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Adiantum pseudotinctum Hieron.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Giúdice, G., 1999; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN, COA, GUA, MIE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 6469* (CTES, SI)]; BRA[*Spannagel, C. 25* (BM, NY, SP, SPF, UC)]; PRY[*Balansa, B. 2848* (B, BM, L)].

Adiantum pubescens C. Presl = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **hirsutum** (Hook. & Grev.) de la Sota
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Adiantum pulverulentum L.
Referencias: Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 56231* (MO)].
Notas: Citado para Brasil sin indicar material de referencia (Mynssen et al., 2002).

Adiantum raddianum C. Presl
Sin.: *Adiantum aemulum* T. Moore, *Adiantum amabile* T. Moore, hom. illeg., *Adiantum colpodes* T. Moore, *Adiantum cuneatum* Langsd. & Fisch., hom. illeg., *Adiantum moorei* Baker
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Capurro, R. H., 1961; Giúdice, G., 1999; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1972; Stutz, L. C., 1983; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, GUA, PAI); URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, MAL, PAY, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 5792* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 10208* (HBR, MBM, NY)]; PRY[*Marín, G. 339* (PY)]; URY[*Ziliani, G. s.n.* (MVFA)].

Adiantum radiatum L. = **Adiantopsis radiata** (L.) Fée
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Adiantum remyanum Espinosa = **Adiantum capillus-veneris** L.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Adiantum rhomboideum auct. non Schkuhr = **Adiantum serrato-dentatum** Humb. & Bonpl. ex Willd.

Adiantum scabrum Kaulf. var. *philippianum* (Espinosa) Looser = **Adiantum chilense** Kaulf. var. **scabrum** (Kaulf.) Hicken
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Adiantum scabrum Kaulf. var. *scabrum* = **Adiantum chilense** Kaulf. var. **scabrum** (Kaulf.) Hicken
Referencias: Giúdice, G., 1999; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Adiantum serrato-dentatum Humb. & Bonpl. ex Willd.
Sin.: *Adiantum obtusum* Desv., *Adiantum rhomboideum* auct. non Schkuhr
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Giúdice, G., 1995, 1999; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1972; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR); PRY(AMA, CAN, CON, COA, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 2809* (CTES)]; BRA[*Labourian, L. 66* (SP)]; PRY[*Hassler, E. 5399* (BM)].

Adiantum speciosum Hook. = **Adiantum digitatum** Hook.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Giúdice, G., 1999.

Adiantum subaristatum Fée = **Adiantum deflectens** Mart.
Referencias: Giúdice, G., 2001.

Adiantum subsulphureum J. Remy = **Adiantum chilense** Kaulf. var. **sulphureum** (Hook.) Giúdice
Referencias: Giúdice, G., 1999; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Adiantum sulphureum Kaulf. var. *cuneifolium* Meigen = **Adiantum chilense** Kaulf. var. **sulphureum** (Hook.) Giúdice
Referencias: Giúdice, G., 1999; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Adiantum sulphureum Kaulf. var. *majus* Hook.
= **Adiantum chilense** Kaulf. var. **sulphureum** (Hook.) Giúdice
Referencias: Giúdice, G., 1999; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Adiantum sulphureum Kaulf. var. *minus* Hook.
= **Adiantum chilense** Kaulf. var. **sulphureum** (Hook.) Giúdice
Referencias: Giúdice, G., 1999; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Adiantum sulphureum Kaulf. var. *subsulphureum* (J. Remy) Looser = **Adiantum chilense** Kaulf. var. **sulphureum** (Hook.) Giúdice
Referencias: Giúdice, G., 1999; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Adiantum sulphureum Kaulf. var. *sulphureum*
= **Adiantum chilense** Kaulf. var. **sulphureum** (Hook.) Giúdice
Referencias: Giúdice, G., 1999.

[Adiantum tenerum Sw.]
Referencias: Giúdice, G., 1999; Sehnem, A., 1972.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Adiantum tenerum Sw. var. *rhomboideum* Griseb.
= **Adiantum orbignyanum** Mett. ex Kuhn
Referencias: Giúdice, G., 1999.

Adiantum terminatum Miq.
Sin.: *Adiantum hirtum* Klotzsch
Referencias: Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 32200* (MBM, UC)].

Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Giúdice, G., 1995, 1999; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fernández 21* (LP)]; BRA[*Prado, J. 481* (MBM, UPCB)]; PRY[*Hassler, E. 5149* (BM)].

Adiantum thalictroides Willd. ex Schltdl. f. **bottini** Giúdice & Nieto
Referencias: Alfonso, G. L., 1996; Giúdice, G. & Nieto, M., 1994; Giúdice, G., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bonavía, A. 171* (LP)].

Adiantum thalictroides Willd. ex Schltdl. var. **hirsutum** (Hook. & Grev.) de la Sota
Sin.: *Adiantum aethiopicum* L. var. *hirsutum* (Hook. & Grev.) Kuntze, *Adiantum chilense* Kaulf. var. *hirsutum* Hook. & Grev., *Adiantum glanduliferum* Link, *Adiantum pilosum* Fée, *Adiantum poiretii* Wikstr. f. *hirsutum* (Hook. & Grev.) Hicken, *Adiantum poiretii* Wikstr. var. *hirsutum* (Hook. & Grev.) R.M. Tryon, *Adiantum pubescens* C. Presl, *Adiantum weatherbyanum* Espinosa
Referencias: Giúdice, G., 1999; Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005; Rodríguez Ríos, R., 1995; de la Sota, E. R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 1700–3400 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC); CHL(II, IV, V, VI, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Galián, D. 41* (SI)]; CHL[*Elórtegui, S. s.n.* (SGO)].

Adiantum thalictroides Willd. ex Schltdl. var. **thalictroides**
Sin.: *Adiantum aethiopicum* auct. non L., *Adiantum crenatum* auct. non Poir., *Adiantum crenatum* Poir. f. *glabra* Hieron., *Adiantum pellucidum* M. Martens & Galeotti, *Adiantum poiretii* auct. non Wikstr., *Adiantum poiretii* Wikstr. f. *glabra* (Hieron.) Hicken & Capurro
Referencias: Alfonso, G. L., 1996; Capurro, R. H., 1940[1938]; de la Sota, E. R., 1972d, 1977; Giúdice, G. & Nieto, M., 1994; Giúdice, G., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, TUC); PRY(PAI); URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, PAY, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guillén, R. 214* (CTES, G, MNES)]; PRY[*Zardini, E. M. 4550* (FCQ, MO)]; URY[*Berro, M. B. 5202* (MVFA)].

Adiantum trapeziforme L. var. *pentadactyla* (Langsd. & Fisch.) C. Chr. = **Adiantum pentadactylon** Langsd. & Fisch.
Referencias: Giúdice, G., 1999; Sehnem, A., 1972.

Adiantum triphyllum Lam. = **Cassebeera triphylla** (Lam.) Kaulf.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Sehnem, A., 1972.

Adiantum weatherbyanum Espinosa = **Adiantum thalictroides** Willd. ex Schltdl. var. **hirsutum** (Hook. & Grev.) de la Sota
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Adiantum windischii J. Prado
Referencias: Prado, J., 2005a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Peña-Chocarro, M. C. 327* (BM)].

Allosorus andromedifolius auct. non (Kaulf.) Kunze
= **Pellaea myrtillifolia** Mett. ex Kuhn
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Allosorus crispus Bernh. var. *chilensis* C. Chr.
= **Cryptogramma fumariifolia** (Phil. ex Baker) H. Christ
Referencias: Looser, G., 1955; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Allosorus fumariifolius (Phil.) Kuntze = **Cryptogramma fumariifolia** (Phil. ex Baker) H. Christ
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Allosorus hirsutus C. Presl = **Cheilanthes glauca** (Cav.) Mett.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Allosorus marginatus (Kunth) J.G. Sm. = **Cheilanthes marginata** Kunth
Referencias: Tryon, A. F. & Tryon, R. M., 1982.

Allosorus myrtifolius (Mett. ex Kuhn) Kuntze = **Pellaea myrtillifolia** Mett. ex Kuhn
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Allosorus ternifolius Kunze ex Klotzsch = **Pellaea ternifolia** (Cav.) Link
Referencias: Looser, G., 1955; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Anogramma Link

Número de especies: 3, 1 endémica

Anogramma chaerophylla (Desv.) Link
Sin.: *Gymnogramma chaerophylla* Desv.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN, PAI); URY(CAS, CLA, LAV, MAL, PAY, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 1769* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 16791* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 644* (G)]; URY[*Izaguirre, P. 2616* (MVFA)].

[Anogramma leptophylla (L.) Link]
Sin.: *Gymnogramma leptophylla* (L.) Desv., *Polypodium leptophyllum* L.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Anogramma lorentzii (Hieron.) Diels
Sin.: *Gymnogramma lorentzii* Hieron., *Gymnogramma regnelliana* Lindm., *Gymnogramma regnelliana* Lindm. var. *megaspora* Lindm.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(COR, ERI, JUJ); BRA(RGS); PRY(CEN); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bartlett, H. H. 20370* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 609* (PACA)]; PRY[*Balansa, B. 351* (G)]; URY[*Arechavaleta, J. 401* (MVM)].

Anogramma osteniana Dutra
Referencias: Sehnem, A., 1972.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(CAS, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 8487* (PACA)]; URY[*Rosengurtt, B. 3180b* (MVFA)].

Argyrochosma (J. Sm.) Windham

Número de especies: 2, 1 endémica

Argyrochosma chilensis (Fée & J. Remy) Windham
Sin.: *Cincinalis chilensis* Fée & J. Remy, *Notholaena chilensis* (Fée & J. Remy) J.W. Sturm, *Pellaea chilensis* (J. Remy) C. Chr., *Pellaea chilensis* Fée, nom. nud.
Referencias: Morbelli, M. A., Ponce, M. M., Macluf, C. & Piñeiro, M. R., 2001; Rodríguez Ríos, R., 1995; Windham, M., 1987.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, C. J. F. 100* (SGO)].

Argyrochosma nivea (Poir.) Windham var. **flava** (Hook.) Ponce
Sin.: *Acrostichum flavens* Sw., *Gymnogramma flavens* (Sw.) Kaulf., *Notholaena flavens* (Sw.) T. Moore, *Notholaena nivea* (Poir.) Desv. var. *flava* Hook., *Pellaea flavens* (Sw.) C. Chr., *Pellaea nivea* (Poir.) Prantl f. *flavens* (Sw.) Hieron.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Ponce, M. M., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. 148* (SI)].

Argyrochosma nivea (Poir.) Windham var. **nivea**
Sin.: *Acrostichum albidulum* Sw., *Cincinalis nivea* (Poir.) Desv., *Cincinalis tarapacana* Phil., *Gymnogramma nivea* (Poir.) Mett., *Notholaena nivea* (Poir.) Desv., *Notholaena nivea* (Poir.) Desv. var. *oblongata* Griseb., *Pellaea nivea* (Poir.) Prantl, *Pteris nivea* Poir.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b; Windham, M., 1987.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Riedel, J. 97* (SI)].

Argyrochosma nivea (Poir.) Windham var. **tenera** (Gillies ex Hook.) Ponce
Sin.: *Notholaena nivea* (Poir.) Desv. var. *tenera* (Gillies ex Hook.) Griseb., *Notholaena tenera* Gillies ex Hook., *Pellaea nivea* (Poir.) Prantl f. *tenera* (Gillies ex Hook.) Hieron., *Pellaea tenera* (Hook.) Prantl
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Ponce, M. M., 1996; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pozner, R. 441* (CTES, SI)].

Asplenium tomentosum Lam. = **Hemionitis tomentosa** (Lam.) Raddi
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Astrolepis D.M. Benham & Windham

Número de especies: 1

Astrolepis sinuata (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham
Sin.: *Acrostichum sinuatum* Lag. & Sw., *Cheilanthes sinuata* (Sw.) Domin, *Gymnogramma sinuata* (Lag. ex Sw.) C. Presl, *Notholaena sinuata* (Sw.) Kaulf.
Referencias: Benham, D. M. & Windham, M., 1992; de la Sota, E. R., 1977; Morbelli, M. & Ponce, M. M., 1997; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 838* (SI)]; CHL[*Sudzuki, H. F. s.n.* (CONC)].

Bakeropteris triphylla (Lam.) Kuntze, nom. superfl. = **Cassebeera triphylla** (Lam.) Kaulf.
Referencias: Tryon, A. F. & Tryon, R. M., 1982.

Cassebeera Kaulf.

Número de especies: 1

Cassebeera pedatifida H. Christ = **Cassebeera triphylla** (Lam.) Kaulf.
Referencias: de la Sota, E. R. & Giudice, G. E., 2004.

Cassebeera ternifolia (Cav.) Farw. = **Pellaea ternifolia** (Cav.) Link
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Cassebeera triphylla (Lam.) Kaulf.
Sin.: *Adiantum triphyllum* Lam., *Bakeropteris triphylla* (Lam.) Kuntze, nom. superfl., *Cassebeera pedatifida* H. Christ, *Doryopteris pedatifida* (H. Christ) H. Christ, *Doryopteris triphylla* (Lam.) H. Christ, *Doryopteris triphylla* (Lam.) H. Christ var. *pedatifida* (H. Christ) Hassl., *Pellaea triphylla* (Lam.) Prantl
Referencias: Cartaginese, M. S., 1977; de la Sota, E. R., 1977; de la Sota, E. R. & Giudice, G. E., 2004; Pellegrini, G., 1996; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CEN, COA, PAI); URY(MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 156* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15890* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 6570* (BM, G)]; URY[*Felippone, F. 4321* (SI)].

Ceropteris calomelanos (L.) Link, nom. superfl. = **Pityrogramma calomelanos** (L.) Link var. **calomelanos**
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Cheilanthes Sw., nom. cons.

Número de especies: 27, 7 endémicas

Cheilanthes andina Hook.
Sin.: *Cheilanthes valdiviana* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*sin colector s.n.* (SI)].

Cheilanthes arequipensis (Maxon) R.M. Tryon & A.F. Tryon
Sin.: *Notholaena arequipensis* Maxon
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Hierba. Perenne. Nativa. 2300–4000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cristóbal, C. L. 13* (LIL)]; CHL[*Marticorena, C. 281* (CONC)].

Cheilanthes bonariensis (Willd.) Proctor
Sin.: *Acrostichum bonariense* Willd., *Cheilanthes ferruginea* Willd. ex Link, *Notholaena aurea* (Poir.) Desv., *Notholaena bonariensis* (Willd.) C. Chr., *Notholaena ferruginea* (Willd. ex Link) Hook., nom. illeg., *Notholaena rufa* C. Presl, *Pteris aurea* Poir.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 9136* (SI)]; CHL[*Johnston, I. M. 5451* (CONC)].

Cheilanthes brasiliensis Raddi = **Adiantopsis chlorophylla** (Sw.) Fée
Referencias: Sehnem, A., 1972.

Cheilanthes buchtienii (Rosenst.) R.M. Tryon
Sin.: *Cheilanthes buchtienii* (Rosenst.) R.M. Tryon var. *ventanensis* (Weath.) Capurro, *Notholaena buchtienii* Rosenst., *Notholaena buchtienii* Rosenst. var. *ventanaensis* Weath., *Notholaena fraseri* (Mett. ex Kuhn) Baker var. *robusta* Hieron.
Referencias: Capurro, R. H., 1961; de la Sota, E. R., 1977; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Galián, D. 43* (SI)].

Cheilanthes buchtienii (Rosenst.) R.M. Tryon var. *ventanensis* (Weath.) Capurro = **Cheilanthes buchtienii** (Rosenst.) R.M. Tryon
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Cheilanthes cartilaginea Griseb. = **Cheilanthes poeppigiana** Mett. ex Kuhn
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Cheilanthes cartilaginea Griseb. var. *platyloba* Griseb. = **Cheilanthes poeppigiana** Mett. ex Kuhn

Cheilanthes chilensis Fée = **Cheilanthes glauca** (Cav.) Mett.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Cheilanthes chlorophylla Sw. = **Adiantopsis chlorophylla** (Sw.) Fée
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Cheilanthes concolor (Langsd. & Fisch.) R.M. Tryon & A.F. Tryon = **Doryopteris concolor** (Langsd. & Fisch.) Kuhn

[Cheilanthes cucullans Fée]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cheilanthes dichotoma Sw.
Sin.: *Adiantopsis dichotoma* (Cav.) Moore, *Cheilanthes flexuosissima* Baker
Referencias: Ponce, M. M. & Morbelli, M., 1989; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, CEN, ITA); URY(MAL, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1359* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5903* (G)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 2083* (MVFA)].

Cheilanthes doradilla (Colla) Domin = **Cheilanthes mollis** (Kunze) C. Presl
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Cheilanthes elegans Desv. = **Cheilanthes myriophylla** Desv.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Cheilanthes fasciculata Goldm. = **Cheilanthes pruinata** Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Cheilanthes ferruginea Willd. ex Link = **Cheilanthes bonariensis** (Willd.) Proctor
Referencias: Tryon, R. M., 1956.

Cheilanthes flexuosissima Baker = **Cheilanthes dichotoma** Sw.

[Cheilanthes fraseri Mett. ex Kuhn]
Sin.: *Notholaena fraseri* (Mett. ex Kuhn) Baker
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cheilanthes glauca (Cav.) Mett.
Sin.: *Acrostichum glaucum* Cav., *Allosorus hirsutus* C. Presl, *Cheilanthes chilensis* Fée, *Pellaea glauca* (Cav.) J. Sm., *Pellaea hirsuta* (C. Presl) Hook., *Pteris glauca* (Cav.) Cav., *Pteris microphylla* Colla
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Barrera, E. M., 1983–1984; Capurro, R. H., 1940[1938]; Rodríguez Ríos, R., 1995; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6525* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20130* (CONC, SGO)].

Cheilanthes hassleri (Weath.) Ponce
Sin.: *Notholaena hassleri* Weath.
Referencias: Weatherby, C. A., 1941.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10996* (K, P)].

Cheilanthes hieronymi Herter
Sin.: *Cheilanthes marginata* auct. non Kunth, *Cheilanthes marginata* Kunth var. *gracilis* Hieron.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938], 1961; de la Sota, E. R., 1969b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, LPA, MEN); BRA(RGS); URY(LAV, RIV, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5180* (SI)]; BRA[*Herter, W. G. F. 3153* (NY)]; URY[*Marchesi, E. 391* (MVFA)].

Cheilanthes hypoleuca (Kunze) Mett.
Sin.: *Cincinalis tomentosa* Desv., *Notholaena hypoleuca* Kunze, *Notholaena tomentosa* (Desv.) Desv., *Polypodium confluens* Colla, hom. illeg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Barrera, E. M., 1983–1984; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Ponce, M. M., 1992; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, RNE); CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 9622* (BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 994927* (CONC)].

[Cheilanthes incarum Maxon]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cheilanthes juergensii Rosenst.
Sin.: *Cheilanthes juergensii* Rosenst. var. *thellungii* (Herter) D. Legrand & Lombardo, *Cheilanthes thellungii* Herter
Referencias: Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 12278* (PACA)].

Cheilanthes juergensii Rosenst. var. *thellungii* (Herter) D. Legrand & Lombardo = **Cheilanthes juergensii** Rosenst.

Cheilanthes lepida Phil. = **Notholaena sulphurea** (Cav.) J. Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Tryon, R. M., 1956.

Cheilanthes macleanii Hook. = **Cheilanthes pilosa** Goldm.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Cheilanthes marginata auct. non Kunth = **Cheilanthes hieronymi** Herter
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Cheilanthes marginata Kunth
Sin.: *Allosorus marginatus* (Kunth) J.G. Sm., *Pellaea marginata* (Kunth) Baker
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; de la Sota, E. R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 1200–3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 42* (SI)].

[Cheilanthes marginata Kunth var. breviloba Kuntze]
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].
Notas: Nombre dudoso.

Cheilanthes marginata Kunth var. *gracilis* Hieron. = **Cheilanthes hieronymi** Herter
Referencias: de la Sota, E. R., 1969b.

Cheilanthes mathewsii Kunze = **Cheilanthes pruinata** Kaulf.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Cheilanthes microphylla (Sw.) Sw.
Sin.: *Adiantum microphyllum* Sw.
Referencias: de la Sota, E. R. & Ponce, M. M., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–1100 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Palací, C. A. 341* (LP)].

Cheilanthes micropteris Sw.
Sin.: *Notholaena micropteris* (Sw.) Keyserl.
Referencias: Alfonso, G. L., 1996; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; de la Sota, E. R., 1977; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(COA, PAI); URY(LAV, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5777* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 11863* (PACA)]; PRY[*Basualdo, I. 759* (FCQ, MO)]; URY[*Del Puerto, O. 3472* (MVFA)].

Cheilanthes mollis (Kunze) C. Presl
Sin.: *Cheilanthes doradilla* (Colla) Domin, *Notholaena doradilla* Colla, *Notholaena mollis* Kunze
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: CHL(I, II, III, IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Poeppig, E. F. s.n.* (LZ)].

Cheilanthes myriophylla Desv.
Sin.: *Cheilanthes elegans* Desv., *Cheilanthes myriophylla* Desv. var. *elegans* (Desv.) Hicken, *Notholaena myriophylla* J. Sm.
Referencias: Alfonso, G. L., 1996; de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 283* (SI)]; CHL[*Garaventa, A. 5485* (CONC)].

Cheilanthes myriophylla Desv. var. *elegans* (Desv.) Hicken = **Cheilanthes myriophylla** Desv.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Cheilanthes notholaenoides (Desv.) Maxon ex Weath
Sin.: *Pteris notholaenoides* Desv.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Brown, A. 956* (LP)].

Cheilanthes obducta Mett. ex Kuhn
Sin.: *Notholaena balansae* Baker, *Notholaena herzogii* Rosenst., *Notholaena obducta* (Mett. ex Kuhn) Baker
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b; Tryon, R. M., 1956.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SJU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1305* (SI)]; PRY[*Hahn, W. J. 1531* (G)].

Cheilanthes orbignyana Mett. ex Kuhn
Referencias: Ponce, M. M. & Morbelli, M., 1989.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–2000 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL); PRY(APY, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Albov, N. M. s.n.* (SI)]; PRY[*Alboff, N. s.n.* (SI)].

[Cheilanthes peruviana (Desv.) T. Moore]
Sin.: *Notholaena brackenridgei* Baker, *Notholaena peruviana* Desv.
Referencias: Weatherby, C. A., 1941.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cheilanthes pilosa Goldm.
Sin.: *Cheilanthes macleanii* Hook.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, MEN, SAL, SLU, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. 727* (SI)].

Cheilanthes poeppigiana Mett. ex Kuhn
Sin.: *Cheilanthes cartilaginea* Griseb., *Cheilanthes cartilaginea* Griseb. var. *platyloba* Griseb.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 43* (SI)].

Cheilanthes pruinata Kaulf.
Sin.: *Cheilanthes fasciculata* Goldm., *Cheilanthes mathewsii* Kunze, *Notholaena mathewsii* (Kunze) Griseb.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–4800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 8916* (SI)]; CHL[*Marticorena, C. 282* (CONC)].

Cheilanthes radiata (L.) J. Sm. = **Adiantopsis radiata** (L.) Fée
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Cheilanthes recurvata Baker
Referencias: Ponce, M. M. & Morbelli, M., 1989.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 12768* (G)].

Cheilanthes regularis Mett.
Sin.: *Adiantopsis regularis* (Mett.) T. Moore
Referencias: Prado, J., 2004b; Sehnem, A., 1972; Stutz, L. C., 1983.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3507* (HBR)]; PRY[*Stutz, L. C. 1783* (G)].

Cheilanthes sarmientoi Ponce
Referencias: Alfonso, G. L., 1996; Ponce, M. M. & Morbelli, M., 1989.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3500 m.
Países: ARG(CAT, LPA, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1528* (SI)].

[Cheilanthes scariosa (Sw.) C. Presl]
Sin.: *Acrostichum scariosum* Sw.
Referencias: Weatherby, C. A., 1941.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cheilanthes sinuata (Sw.) Domin = **Astrolepis sinuata** (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham
Referencias: Benham, D. M. & Windham, M., 1992; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Cheilanthes spectabilis Kaulf. = **Adiantopsis chlorophylla** (Sw.) Fée
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Cheilanthes squamosa Gillies ex Hook. & Grev.
Sin.: *Notholaena gilliesii* Fée, *Notholaena lilloi* (Hicken) Hicken, *Notholaena squamosa* (Gillies ex Hook. & Grev.) Lowe, *Pellaea lilloi* Hicken
Referencias: Capurro, R. H., 1961; de la Sota, E. R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–4500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4403* (SI)].

Cheilanthes ternifolia (Cav.) T. Moore = **Pellaea ternifolia** (Cav.) Link
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Cheilanthes thellungii Herter = **Cheilanthes juergensii** Rosenst.

Cheilanthes tweediana Hook.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Ponce, M. M. & Morbelli, M., 1989.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, LRI, MIS, SDE, SFE, SLU); PRY(APY, CAU, CEN, COA, PAI); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 6165* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 784* (G)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Cheilanthes valdiviana Phil. = **Cheilanthes andina** Hook.

Cheilanthes volcanensis de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 2300–2500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Halloy, S. 134* (LIL)].

Chrysochosma sulphurea (Cav.) Kümmerle = **Notholaena sulphurea** (Cav.) J. Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Cincinalis chilensis Fée & J. Remy = **Argyrochosma chilensis** (Fée & J. Remy) Windham
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Cincinalis nivea (Poir.) Desv. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **nivea**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Windham, M., 1987.

Cincinalis tarapacana Phil. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **nivea**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Windham, M., 1987.

Cincinalis tomentosa Desv. = **Cheilanthes hypoleuca** (Kunze) Mett.
Referencias: Ponce, M. M., 1992; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Cryptogramma R. Br.

Número de especies: 1 endémica

Cryptogramma crispa auct. non (L.) R. Br. ex Hook. = **Cryptogramma fumariifolia** (Phil. ex Baker) H. Christ

Cryptogramma crispa (L.) R. Br. var. *chilensis* (C. Chr.) Looser = **Cryptogramma fumariifolia** (Phil. ex Baker) H. Christ
Referencias: Looser, G., 1955; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Cryptogramma fumariifolia (Phil. ex Baker) H. Christ
Sin.: *Allosorus crispus* Bernh. var. *chilensis* C. Chr., *Allosorus fumariifolius* (Phil.) Kuntze, *Cryptogramma crispa* (L.) R. Br. var. *chilensis* (C. Chr.) Looser, *Cryptogramma crispa* auct. non (L.) R. Br. ex Hook., *Pellaea fumariifolia* Phil. ex Baker, *Pellaea fumariifolia* Phil., hom. illeg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Looser, G., 1955; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Hierba. Perenne. Endémica. 900–1400 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 2074* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20062* (CONC, SGO)].

Doryopteris J. Sm., nom. cons.

Número de especies: 14, 3 endémicas

Doryopteris acutiloba (Prantl) Diels
Sin.: *Pellaea acutiloba* Prantl
Referencias: Prado, J., 2005b; Sehnem, A., 1972; Tryon, R. M., 1942.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4841* (HBR)].

Doryopteris alcicornis Diels var. *major* H. Christ = **Doryopteris collina** (Raddi) J. Sm.

Doryopteris angularis Fée = **Doryopteris rediviva** Fée
Referencias: Sehnem, A., 1972.

Doryopteris angustata Sehnem
Referencias: Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 8241* (PACA)].

Doryopteris collina (Raddi) J. Sm.
Sin.: *Doryopteris alcicornis* Diels var. *major* H. Christ, *Pteris collina* Raddi, *Pteris palmata* auct. non Willd., *Pteris pedata* L. var. *collina* (Raddi) Baker
Referencias: Hassler, E., 1928; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Sehnem, A., 1972; Tryon, R. M., 1942.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 80* (HBR)]; PRY[*Degen, R. 626* (G)].

Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn
Sin.: *Cheilanthes concolor* (Langsd. & Fisch.) R.M. Tryon & A.F. Tryon, *Pellaea concolor* (Langsd. & Fisch.) Baker, *Pteris concolor* Langsd. & Fisch.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Gastony, G. J. & Rollo, D. R., 1995; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Prado, J., 1992; Sehnem, A., 1972; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, PAI); URY(ART, DUR, FLA, RNO, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1155* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 43461* (CTES)]; PRY[*Jiménez, B. 1341* (BM, CTES, MO, PY)]; URY[*Del Puerto, O. 8554* (MVFA)].

Doryopteris crenulans (Fée) H. Christ
Sin.: *Pellaea crenulans* Fée
Referencias: Cartaginese, M. S., 1977; de la Sota, E. R., 1977; Sehnem, A., 1972; Tryon, R. M., 1942.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 24950* (LP)]; BRA[*Sehnem, A. 4228* (PACA)].

Doryopteris elegans (Vell.) H. Christ = **Doryopteris nobilis** (T. Moore) C. Chr.

Doryopteris juergensii Rosenst. = **Doryopteris lorentzii** (Hieron.) Diels
Referencias: Sehnem, A., 1972.

Doryopteris lomariacea Kunze ex Klotzsch
Sin.: *Pellaea lomariacea* (Kunze ex Klotzsch) Hook.
Referencias: Hassler, E., 1928; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1972; Tryon, R. M., 1942.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–2500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 26195* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 5191* (BM)].

Doryopteris lorentzii (Hieron.) Diels
Sin.: *Doryopteris juergensii* Rosenst., *Doryopteris pedata* (L.) Fée var. *lorentzii* (Hieron.) Hassl., *Pellaea lorentzii* Hieron.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Hassler, E., 1928; Pellegrini, G., 1996; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Sehnem, A., 1972; Tryon, R. M., 1942; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA, ITA); URY(ART, CLA, PAY, RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Herrera, J. 339* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 21279* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 1408* (G)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Doryopteris multipartita (Fée) Sehnem = **Doryopteris raddiana** (C. Presl) Fée

Doryopteris nobilis (T. Moore) C. Chr.
Sin.: *Doryopteris elegans* (Vell.) H. Christ, *Doryopteris palmata* (Willd.) J. Sm. var. *patula* (Fée) Hassl., *Doryopteris patula* (Fée) Fée, *Doryopteris raddiana* (C. Presl) Fée var. *patula* Fée, *Litobrochia nobilis* T. Moore, *Pteris elegans* Vell., hom. illeg.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; de la Sota, E. R., 1977; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1972; Stutz, L. C., 1983; Tryon, R. M., 1942.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, ITA, PAI, SPE); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1061* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 8847* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 4372* (BM)]; URY[*Gago, J. s.n.* (MVJB)].

Doryopteris ornithopus (Mett.) J. Sm.
Sin.: *Pteris ornithopus* Mett.

Referencias: Prado, J., 1992; Sehnem, A., 1972; Tryon, R. M., 1942.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–1800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 12116* (MBM)].

Doryopteris palmata (Willd.) J. Sm. = **Doryopteris pedata** (L.) Fée var. **palmata** (Willd.) Hicken

Doryopteris palmata (Willd.) J. Sm. var. *patula* (Fée) Hassl. = **Doryopteris nobilis** (T. Moore) C. Chr.

Doryopteris patula (Fée) Fée = **Doryopteris nobilis** (T. Moore) C. Chr.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

[Doryopteris pedata (L.) Fée]
Sin.: *Pteris pedata* L.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Doryopteris pedata (L.) Fée var. *lorentzii* (Hieron.) Hassl. = **Doryopteris lorentzii** (Hieron.) Diels

Doryopteris pedata (L.) Fée var. *multipartita* (Fée) R.M. Tryon = **Doryopteris raddiana** (C. Presl) Fée

[Doryopteris pedata (L.) Fée var. palmata (Willd.) Hicken]
Sin.: *Doryopteris palmata* (Willd.) J. Sm., *Pteris palmata* Willd.
Notas: Variedad excluida del área del proyecto (Perú).

Doryopteris pedatifida (H. Christ) H. Christ = **Cassebeera triphylla** (Lam.) Kaulf.
Referencias: de la Sota, E. R. & Giúdice, G. E., 2004.

Doryopteris pentagona Pic. Serm.
Referencias: Márquez, G., Giúdice, G. E. & Ponce, M. M., 2006; Pichi Sermolli, R. E. G. & Bizarri, M. P., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, FOR, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1055* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 1306* (PACA)]; PRY[*Prado, J. 268* (SP)].

[Doryopteris raddiana (C. Presl) Fée]
Sin.: *Doryopteris multipartita* (Fée) Sehnem, *Doryopteris pedata* (L.) Fée var. *multipartita* (Fée) R.M. Tryon, *Doryopteris raddiana* (C. Presl) Fée var. *multipartita* Fée
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Doryopteris raddiana (C. Presl) Fée var. *multipartita* Fée = **Doryopteris raddiana** (C. Presl) Fée
Referencias: Pichi Sermolli, R. E. G. & Bizarri, M. P., 2005.

Doryopteris raddiana (C. Presl) Fée var. *patula* Fée = **Doryopteris nobilis** (T. Moore) C. Chr.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Doryopteris rediviva Fée
Sin.: *Doryopteris angularis* Fée, *Doryopteris varians* (Raddi) J. Sm. var. *rediviva* (Fée) Luetzelb.
Referencias: Sehnem, A., 1972; Tryon, R. M., 1942.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 1114* (PACA)].

Doryopteris rivalis Sehnem
Referencias: Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 5041* (PACA)].

Doryopteris sagittifolia (Raddi) J. Sm.
Sin.: *Pteris sagittifolia* Raddi
Referencias: Prado, J., 1992; Sehnem, A., 1972; Tryon, R. M., 1942.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19603* (MBM)].

Doryopteris stierii Rosenst.
Referencias: Pichi Sermolli, R. E. G. & Bizarri, M. P., 2005; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 15355* (HBR)].

Doryopteris triphylla (Lam.) H. Christ = **Cassebeera triphylla** (Lam.) Kaulf.
Referencias: de la Sota, E. R., 1972d, 1977.

Doryopteris triphylla (Lam.) H. Christ var. *pedatifida* (H. Christ) Hassl. = **Cassebeera triphylla** (Lam.) Kaulf.
Referencias: de la Sota, E. R. & Giudice, G. E., 2004.

Doryopteris varians (Raddi) J. Sm. var. *rediviva* (Fée) Luetzelb. = **Doryopteris rediviva** Fée

Eriosorus Fée

Número de especies: 1

Eriosorus myriophyllus (Sw.) Copel.
Sin.: *Gymnogramma felipponei* Herter
Referencias: Sehnem, A., 1972.
Hierba saxícola. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CLA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 11268* (MBM)]; URY[*sin colector 36* (MVM)].

Gymnogramma calomelanos (L.) Kaulf. = **Pityrogramma calomelanos** (L.) Link var. **calomelanos**
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Gymnogramma calomelanos (L.) Kaulf. var. *aureoflava* auct. non Hook. = **Pityrogramma calomelanos** (L.) Link var. **austroamericana** (Domin) Farw.

Gymnogramma chaerophylla Desv. = **Anogramma chaerophylla** (Desv.) Link
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Gymnogramma chrysophylla (Sw.) Kaulf. = **Pityrogramma chrysophylla** (Sw.) Link

Gymnogramma felipponei Herter = **Eriosorus myriophyllus** (Sw.) Copel.

Gymnogramma flavens (Sw.) Kaulf. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **flava** (Hook.) Ponce

Gymnogramma leptophylla (L.) Desv. = **Anogramma leptophylla** (L.) Link
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Gymnogramma lorentzii Hieron. = **Anogramma lorentzii** (Hieron.) Diels
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Sehnem, A., 1972.

Gymnogramma nivea (Poir.) Mett. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **nivea**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Gymnogramma regnelliana Lindm. = **Anogramma lorentzii** (Hieron.) Diels
Referencias: Sehnem, A., 1972.

Gymnogramma regnelliana Lindm. var. *megaspora* Lindm. = **Anogramma lorentzii** (Hieron.) Diels
Referencias: Sehnem, A., 1972.

Gymnogramma sinuata (Lag. ex Sw.) C. Presl = **Astrolepis sinuata** (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham
Referencias: Benham, D. M. & Windham, M., 1992.

Gymnogramma tartarea (Cav.) Desv. var. *aurata* T. Moore = **Pityrogramma tartarea** (Cav.) Maxon var. **aurata** (T. Moore) R.M. Tryon
Referencias: Giúdice, G. E. & Morbelli, M., 1998.

Gymnogramma trifoliata (L.) Desv. = **Trismeria trifoliata** (L.) Diels
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Gymnopteris rufa auct. non (L.) Benth. ex Underw. = **Hemionitis tomentosa** (Lam.) Raddi

Gymnopteris tomentosa (Lam.) Underw. = **Hemionitis tomentosa** (Lam.) Raddi
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Hemionitis L.

Número de especies: 1

Hemionitis pinnata Hook. f. = **Trachypteris pinnata** (Hook. f.) C. Chr.

Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi
Sin.: *Asplenium tomentosum* Lam., *Gymnopteris rufa* auct. non (L.) Benth. ex Underw., *Gymnopteris tomentosa* (Lam.) Underw.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1972; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1600 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 3302* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 632* (PACA)]; PRY[*Peña-Chocarro, M. C. 308* (BM)].

Litobrochia angustata Fée = **Pteris angustata** (Fée) C.V. Morton
Referencias: Prado, J. & Windisch, P. G., 2000; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Litobrochia berteroana (J. Agardh) Fée = **Pteris berteroana** J. Agardh
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Litobrochia decurrens auct. non C. Presl = **Pteris berteroana** J. Agardh
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Litobrochia denticulata (Sw.) C. Presl = **Pteris denticulata** Sw. var. **denticulata**
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Prado, J., 1993.

Litobrochia dissimilis Fée = **Pteris denticulata** Sw. var. **denticulata**
Referencias: Prado, J. & Windisch, P. G., 2000; Prado, J., 1993.

Litobrochia nobilis T. Moore = **Doryopteris nobilis** (T. Moore) C. Chr.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Sehnem, A., 1972.

Litobrochia podophylla (Sw.) C. Presl = **Pteris podophylla** Sw.
Referencias: Prado, J. & Windisch, P. G., 2000.

Litobrochia sericea Fée = **Pteris lechleri** Mett.
Referencias: de la Sota, E. R. & Ponce, M. M., 1992; Prado, J. & Windisch, P. G., 2000.

Litobrochia tristicula (Raddi) C. Presl = **Pteris denticulata** Sw. var. **tristicula** (Raddi) J. Prado
Referencias: Prado, J. & Windisch, P. G., 2000.

Notholaena R. Br.

Número de especies: 1

Notholaena arequipensis Maxon = **Cheilanthes arequipensis** (Maxon) R.M. Tryon & A.F. Tryon
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Notholaena aurea (Poir.) Desv. = **Cheilanthes bonariensis** (Willd.) Proctor
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Notholaena balansae Baker = **Cheilanthes obducta** Mett. ex Kuhn
Referencias: Tryon, R. M., 1956.

Notholaena bonariensis (Willd.) C. Chr. = **Cheilanthes bonariensis** (Willd.) Proctor
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Notholaena brackenridgei Baker = **Cheilanthes peruviana** (Desv.) T. Moore
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Notholaena buchtienii Rosenst. = **Cheilanthes buchtienii** (Rosenst.) R.M. Tryon
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Notholaena buchtienii Rosenst. var. *ventanaensis* Weath. = **Cheilanthes buchtienii** (Rosenst.) R.M. Tryon
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Notholaena chilensis (Fée & J. Remy) J.W. Sturm = **Argyrochosma chilensis** (Fée & J. Remy) Windham
Referencias: Morbelli, M. A., Ponce, M. M., Macluf, C. & Piñeiro, M. R., 2001; Windham, M., 1987.

Notholaena doradilla Colla = **Cheilanthes mollis** (Kunze) C. Presl
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Notholaena ferruginea (Willd. ex Link) Hook., nom. illeg. = **Cheilanthes bonariensis** (Willd.) Proctor
Referencias: Tryon, R. M., 1956.

Notholaena flavens (Sw.) T. Moore = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **flava** (Hook.) Ponce
Referencias: Ponce, M. M., 1996.

Notholaena fraseri (Mett. ex Kuhn) Baker = **Cheilanthes fraseri** Mett. ex Kuhn
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Notholaena fraseri (Mett. ex Kuhn) Baker var. *robusta* Hieron. = **Cheilanthes buchtienii** (Rosenst.) R.M. Tryon
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Notholaena gilliesii Fée = **Cheilanthes squamosa** Gillies ex Hook. & Grev.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Notholaena hassleri Weath. = **Cheilanthes hassleri** (Weath.) Ponce

Notholaena herzogii Rosenst. = **Cheilanthes obducta** Mett. ex Kuhn
Referencias: Tryon, R. M., 1956.

Notholaena hypoleuca Kunze = **Cheilanthes hypoleuca** (Kunze) Mett.
Referencias: Ponce, M. M., 1992; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Notholaena lepida (Phil.) Looser = **Notholaena sulphurea** (Cav.) J. Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Tryon, R. M., 1956.

Notholaena lilloi (Hicken) Hicken = **Cheilanthes squamosa** Gillies ex Hook. & Grev.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Notholaena mathewsii (Kunze) Griseb. = **Cheilanthes pruinata** Kaulf.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Notholaena micropteris (Sw.) Keyserl. = **Cheilanthes micropteris** Sw.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Notholaena mollis Kunze = **Cheilanthes mollis** (Kunze) C. Presl
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Notholaena myriophylla J. Sm. = **Cheilanthes myriophylla** Desv.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Notholaena nivea (Poir.) Desv. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **nivea**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Windham, M., 1987.

Notholaena nivea (Poir.) Desv. var. *flava* Hook. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **flava** (Hook.) Ponce

Notholaena nivea (Poir.) Desv. var. *oblongata* Griseb. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **nivea**
Referencias: Ponce, M. M., 1996.

Notholaena nivea (Poir.) Desv. var. *tenera* (Gillies ex Hook.) Griseb. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **tenera** (Gillies ex Hook.) Ponce

Notholaena obducta (Mett. ex Kuhn) Baker = **Cheilanthes obducta** Mett. ex Kuhn
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Notholaena peruviana Desv. = **Cheilanthes peruviana** (Desv.) T. Moore
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Notholaena rufa C. Presl = **Cheilanthes bonariensis** (Willd.) Proctor
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Notholaena sinuata (Sw.) Kaulf. = **Astrolepis sinuata** (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham
Referencias: Benham, D. M. & Windham, M., 1992; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Notholaena squamosa (Gillies ex Hook. & Grev.) Lowe = **Cheilanthes squamosa** Gillies ex Hook. & Grev.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Notholaena sulphurea (Cav.) J. Sm.
Sin.: *Cheilanthes lepida* Phil., *Chrysochosma sulphurea* (Cav.) Kümmerle, *Notholaena lepida* (Phil.) Looser, *Notholaena sulphurea* (Cav.) J. Sm. var. *flava* Kuhn, *Pteris sulphurea* Cav.
Referencias: de la Sota, E. R., 1968, 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b; Tryon, R. M., 1956.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–2500 m.
Países: ARG(COR, JUJ, LRI, SJU); CHL(III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4962* (SI)].

Notholaena sulphurea (Cav.) J. Sm. var. *flava* Kuhn = **Notholaena sulphurea** (Cav.) J. Sm.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Notholaena tenera Gillies ex Hook. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **tenera** (Gillies ex Hook.) Ponce

Notholaena ternifolia (Cav.) Keyserl. = **Pellaea ternifolia** (Cav.) Link
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Notholaena tomentosa (Desv.) Desv. = **Cheilanthes hypoleuca** (Kunze) Mett.
Referencias: Ponce, M. M., 1992; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pellaea Link, nom. cons.

Número de especies: 4, 1 endémica

Pellaea acutiloba Prantl = **Doryopteris acutiloba** (Prantl) Diels
Referencias: Sehnem, A., 1972.

Pellaea andromedifolia auct. non (Kaulf.) Fée = **Pellaea myrtillifolia** Mett. ex Kuhn
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pellaea chilensis (J. Remy) C. Chr. = **Argyrochosma chilensis** (Fée & J. Remy) Windham
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pellaea chilensis Fée, nom. nud. = **Argyrochosma chilensis** (Fée & J. Remy) Windham
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pellaea concolor (Langsd. & Fisch.) Baker = **Doryopteris concolor** (Langsd. & Fisch.) Kuhn
Referencias: Sehnem, A., 1972.

Pellaea crenulans Fée = **Doryopteris crenulans** (Fée) H. Christ
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Sehnem, A., 1972.

Pellaea flavens (Sw.) C. Chr. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **flava** (Hook.) Ponce

Pellaea flexuosa (Kaulf. ex Cham. & Schltdl.) Link = **Pellaea ovata** (Desv.) Weath
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Pellaea fumariifolia Phil. ex Baker = **Cryptogramma fumariifolia** (Phil. ex Baker) H. Christ
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pellaea fumariifolia Phil., hom. illeg. = **Cryptogramma fumariifolia** (Phil. ex Baker) H. Christ
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pellaea glauca (Cav.) J. Sm. = **Cheilanthes glauca** (Cav.) Mett.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pellaea hirsuta (C. Presl) Hook. = **Cheilanthes glauca** (Cav.) Mett.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pellaea lilloi Hicken = **Cheilanthes squamosa** Gillies ex Hook. & Grev.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Pellaea lomariacea (Kunze ex Klotzsch) Hook. = **Doryopteris lomariacea** Kunze ex Klotzsch

Pellaea lorentzii Hieron. = **Doryopteris lorentzii** (Hieron.) Diels
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Sehnem, A., 1972.

Pellaea marginata (Kunth) Baker = **Cheilanthes marginata** Kunth
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Pellaea myrtillifolia Mett. ex Kuhn
Sin.: *Allosorus andromedifolius* auct. non (Kaulf.) Kunze, *Allosorus myrtifolius* (Mett. ex Kuhn) Kuntze, *Pellaea andromedifolia* auct. non (Kaulf.) Fée
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–2000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 4549* (CONC)].

Pellaea nivea (Poir.) Prantl = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **nivea**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Windham, M., 1987.

Pellaea nivea (Poir.) Prantl f. *flavens* (Sw.) Hieron. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **flava** (Hook.) Ponce

Pellaea nivea (Poir.) Prantl f. *tenera* (Gillies ex Hook.) Hieron. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **tenera** (Gillies ex Hook.) Ponce

Pellaea ovata (Desv.) Weath
Sin.: *Pellaea flexuosa* (Kaulf. ex Cham. & Schltdl.) Link, *Pteris flexuosa* Kaulf. ex Cham. & Schltdl., *Pteris ovata* Desv.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 34802* (SI)].

Pellaea sagittata (Cav.) Link
Sin.: *Pteris sagittata* Cav.
Referencias: de la Sota, E. R. & Ponce, M. M., 1992; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Hierba. Perenne. Nativa. 2400–2600 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hurrell, J. A. 203* (LP)].

Pellaea tenera (Hook.) Prantl = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **tenera** (Gillies ex Hook.) Ponce

Pellaea ternifolia (Cav.) Link
Sin.: *Allosorus ternifolius* Kunze ex Klotzsch, *Cassebeera ternifolia* (Cav.) Farw., *Cheilanthes ternifolia* (Cav.) T. Moore, *Notholaena ternifolia* (Cav.) Keyserl., *Pellaea weddelliana* Fée, *Pteris peruviana* Poir., *Pteris subverticillata* Sw., *Pteris ternifolia* Cav., *Pteris tryphylla* Bertero ex Colla, nom. nud.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–4500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU); CHL(I, II, V, VI, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bianco, C. A. 778* (RIOC)]; CHL[*Garaventa, A. 5491* (CONC)].

Pellaea triphylla (Lam.) Prantl = **Cassebeera triphylla** (Lam.) Kaulf.
Referencias: Cartaginese, M. S., 1977.

Pellaea weddelliana Fée = **Pellaea ternifolia** (Cav.) Link
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pityrogramma Link

Número de especies: 2, 1 introducida

Pityrogramma austroamericana Domin = **Pityrogramma calomelanos** (L.) Link var. **austroamericana** (Domin) Farw.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Pityrogramma calomelanos (L.) Link var. *aureoflava* auct. non (Hook.) Weath. ex L.H. Bailey = **Pityrogramma calomelanos** (L.) Link var. **austroamericana** (Domin) Farw.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Pityrogramma calomelanos (L.) Link var. **austroamericana** (Domin) Farw.
Sin.: *Gymnogramma calomelanos* (L.) Kaulf. var. *aureoflava* auct. non Hook., *Pityrogramma austroamericana* Domin, *Pityrogramma calomelanos* (L.) Link var. *aureoflava* auct. non (Hook.) Weath. ex L.H. Bailey
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Panigrahi, S., 1976[1975]; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–2800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7790* (SI)]; PRY[*Jiménez, B. 1255* (BM, CTES, PY)].
Notas: Citada para Brasil sin indicar localidad precisa (R. M. Tryon & Stolze, 1989).

Pityrogramma calomelanos (L.) Link var. **calomelanos**
Sin.: *Acrostichum calomelanos* L., *Ceropteris calomelanos* (L.) Link, nom. superfl., *Gymnogramma calomelanos* (L.) Kaulf.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Prado, J., 2004b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2300 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, PAI, SPE); URY(ART, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 848* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. s.n.* (SP)]; PRY[*Hassler, E. 4810* (BM, G)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

[Pityrogramma chrysophylla (Sw.) Link]
Sin.: *Gymnogramma chrysophylla* (Sw.) Kaulf.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Pityrogramma tartarea (Cav.) Maxon var. **aurata** (T. Moore) R.M. Tryon
Sin.: *Gymnogramma tartarea* (Cav.) Desv. var. *aurata* T. Moore
Referencias: Arana, M. D., Ponce, M. M. & Vischi, N., 2004; Giúdice, G. E. & Morbelli, M., 1998.
Hierba. Perenne. Introducida. 600–1000 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bridarolli, A. J. 298* (LP)].

Pityrogramma trifoliata (L.) R.M. Tryon = **Trismeria trifoliata** (L.) Diels
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Sehnem, A., 1972; de la Sota, E. R., 1977.

Polypodium confluens Colla, hom. illeg. = **Cheilanthes hypoleuca** (Kunze) Mett.
Referencias: Pichi Sermolli, R. E. G., 1951.

Polypodium leptophyllum L. = **Anogramma leptophylla** (L.) Link
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Pteris L.

Número de especies: 21, 4 endémicas, 4 introducidas

Pteris altissima Poir.
Sin.: *Pteris macroptera* Link, *Pteris sterilis* C. Presl
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Prado, J. & Windisch, P. G., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15268* (K, P, US)]; PRY[*Peña-Chocarro, M. C. 297* (BM)].

Pteris angustata (Fée) C.V. Morton
Sin.: *Litobrochia angustata* Fée, *Pteris paulistana* Rosenst.
Referencias: Prado, J. & Windisch, P. G., 2000; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 543a* (BM, US)].

Pteris aquilina L. = **Pteridium aquilinum** (L.) Kuhn var. **aquilinum**
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Pteris aurea Poir. = **Cheilanthes bonariensis** (Willd.) Proctor
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Pteris berteroana J. Agardh
Sin.: *Litobrochia berteroana* (J. Agardh) Fée, *Litobrochia decurrens* auct. non C. Presl, *Pteris comans* auct. non G. Forst., *Pteris comans* G. Forst. var. *berteroana*, *Pteris decurrens* auct. non C. Presl, *Pteris incisa* auct. non Thunb., *Pteris tenera* auct. non Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(V, IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. 1567* (K)].

Pteris biaurita L. subsp. *quadriaurita* (Retz.) C. Chr. = **Pteris plumula** Desv.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Pteris brasiliensis Raddi
Sin.: *Pteris denticulata* Sw. var. *brasiliensis* (Raddi) Baker
Referencias: Martínez, O. G. & de la Sota, E. R., 2005; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Prado, J. & Windisch, P. G., 2000; Prado, J., 1993.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwarz, G. J. 10370* (BM, LIL)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 10269* (BM, K)]; PRY[*Balansa, B. 385* (K, P)].

Pteris chilensis Desv.
Sin.: *Pteris fernandeziana* F. Phil., *Pteris tenera* Kaulf.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1400 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Dombey, J. s.n.* (P)].

Pteris collina Raddi = **Doryopteris collina** (Raddi) J. Sm.
Referencias: Sehnem, A., 1972.

Pteris comans auct. non G. Forst. = **Pteris berteroana** J. Agardh
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pteris comans G. Forst. var. *berteroana* = **Pteris berteroana** J. Agardh
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pteris concolor Langsd. & Fisch. = **Doryopteris concolor** (Langsd. & Fisch.) Kuhn
Referencias: Sehnem, A., 1972.

[Pteris coriacea Desv.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Pteris cretica L.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; de la Sota, E. R., 1977; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–2100 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TDF, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7849* (SI)].

Pteris decurrens C. Presl
Referencias: Prado, J. & Windisch, P. G., 2000; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Haerchen, F. 120* (P, R, RB)].

Pteris decurrens auct. non C. Presl = **Pteris berteroana** J. Agardh
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pteris deflexa Link
Sin.: *Pteris gaudichaudii* J. Agardh, *Pteris polita* Link
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Prado, J. & Windisch, P. G., 2000; Sehnem, A., 1972; Stutz, L. C., 1983; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI); URY(CLA, DUR, MON, RIV, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 4990* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 43141* (LIL, RB)]; PRY[*Peña-Chocarro, M. C. 250* (BM)]; URY[*Crosa, O. 5509* (MVFA)].

Pteris denticulata Sw. var. *brasiliensis* (Raddi) Baker = **Pteris brasiliensis** Raddi

Pteris denticulata Sw. var. **denticulata**
Sin.: *Litobrochia denticulata* (Sw.) C. Presl, *Litobrochia dissimilis* Fée, *Pteris dissimilis* (Fée) H. Christ
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; de la Sota, E. R., 1977; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Prado, J. & Windisch, P. G., 2000; Prado, J., 1993; Sehnem, A., 1972; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CAA, CAN, CEN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1088* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 6195* (R, RB, US)]; PRY[*Morong, T. 698* (BM, NY)].

Pteris denticulata Sw. var. **tristicula** (Raddi) J. Prado
Sin.: *Litobrochia tristicula* (Raddi) C. Presl, *Pteris tristicula* Raddi
Referencias: Prado, J. & Windisch, P. G., 2000; Prado, J., 1993.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwarz, G. J. 6894* (RB)]; BRA[*Rohr, J. P. B. 344* (LIL, RB)].

Pteris dissimilis (Fée) H. Christ = **Pteris denticulata** Sw. var. **denticulata**
Referencias: Prado, J. & Windisch, P. G., 2000.

Pteris edentula Kunze = **Pteris plumula** Desv.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.

Pteris elegans Vell., hom. illeg. = **Doryopteris nobilis** (T. Moore) C. Chr.

Pteris famatinensis de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.
Hierba. Perenne. Endémica. 2400–2600 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Okada, K. A. 2796* (LP)].

Pteris fernandeziana F. Phil. = **Pteris chilensis** Desv.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pteris flexuosa Kaulf. ex Cham. & Schltdl. = **Pellaea ovata** (Desv.) Weath
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Pteris gaudichaudii J. Agardh = **Pteris deflexa** Link

Pteris glauca (Cav.) Cav. = **Cheilanthes glauca** (Cav.) Mett.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pteris goeldii H. Christ = **Pteris propinqua** J. Agardh
Referencias: Prado, J. & Windisch, P. G., 2000.

Pteris incisa auct. non Thunb. = **Pteris berteroana** J. Agardh
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pteris inermis (Rosenst.) de la Sota
Sin.: *Pteris muricata* Hook. var. *inermis* Rosenst.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–2800 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 4469* (LP)].

Pteris lechleri Mett.
Sin.: *Litobrochia sericea* Fée, *Pteris sericea* (Fée) H. Christ
Referencias: de la Sota, E. R. & Ponce, M. M., 1992; Prado, J. & Windisch, P. G., 2000; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1534* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 22304* (MBM, PACA, UPCB)].

Pteris leptophylla Sw.
Referencias: Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Prado, J. & Windisch, P. G., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Riegel, W. 11918* (P)].

[Pteris longifolia L.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Pteris luederwaldtii Rosenst. = **Pteris podophylla** Sw.
Referencias: Prado, J. & Windisch, P. G., 2000.

Pteris macroptera Link = **Pteris altissima** Poir.
Referencias: Prado, J. & Windisch, P. G., 2000.

Pteris marattiaefolia Hook. = **Pteris semiadnata** Phil.
Referencias: Diem, J., 1943; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pteris microphylla Colla = **Cheilanthes glauca** (Cav.) Mett.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pteris multifida Poir.
Referencias: Burkart, A., 1933.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–300 m.
Países: ARG(BAI); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 3337* (SI)]; URY[*Felippone, F. 4623* (SI)].
Notas: Subespontánea.

Pteris muricata Hook. var. *inermis* Rosenst. = **Pteris inermis** (Rosenst.) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Pteris nivea Poir. = **Argyrochosma nivea** (Poir.) Windham var. **nivea**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Windham, M., 1987.

Pteris notholaenoides Desv. = **Cheilanthes notholaenoides** (Desv.) Maxon ex Weath
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Pteris ornithopus Mett. = **Doryopteris ornithopus** (Mett.) J. Sm.
Referencias: Sehnem, A., 1972.

Pteris ovata Desv. = **Pellaea ovata** (Desv.) Weath
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Pteris palmata auct. non Willd. = **Doryopteris collina** (Raddi) J. Sm.

Pteris palmata Willd. = **Doryopteris pedata** (L.) Fée var. **palmata** (Willd.) Hicken

Pteris paulistana Rosenst. = **Pteris angustata** (Fée) C.V. Morton

Pteris pedata L. = **Doryopteris pedata** (L.) Fée

Pteris pedata L. var. *collina* (Raddi) Baker = **Doryopteris collina** (Raddi) J. Sm.
Referencias: Sehnem, A., 1972.

Pteris peruviana Poir. = **Pellaea ternifolia** (Cav.) Link
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pteris plumula Desv.
Sin.: *Pteris biaurita* L. subsp. *quadriaurita* (Retz.) C. Chr., *Pteris edentula* Kunze
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Prado, J. & Windisch, P. G., 2000; Sehnem, A., 1972; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–2800 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL); BRA(RGS); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7471* (SI)]; BRA[*Reineck, E. M. s.n.* (P)]; PRY[*Hassler, E. 11617* (G)].

Pteris podophylla Sw.
Sin.: *Litobrochia podophylla* (Sw.) C. Presl, *Pteris luederwaldtii* Rosenst.
Referencias: Prado, J. & Windisch, P. G., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Schmalz, E. 202* (HB)].

Pteris polita Link = **Pteris deflexa** Link

Pteris propinqua J. Agardh
Sin.: *Pteris goeldii* H. Christ
Referencias: Prado, J. & Windisch, P. G., 2000; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kummrow, R. 715* (MBM, PACA, SP)]; PRY[*Hassler, E. 8413* (BM, K, RB)].

[Pteris quadriaurita Retz.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Pteris sagittata Cav. = **Pellaea sagittata** (Cav.) Link
Referencias: de la Sota, E. R. & Ponce, M. M., 1992.

Pteris sagittifolia Raddi = **Doryopteris sagittifolia** (Raddi) J. Sm.
Referencias: Sehnem, A., 1972.

Pteris semiadnata Phil.
Sin.: *Pteris marattiaefolia* Hook.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Diem, J., 1943; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–800 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 347* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 21040* (CONC)].

Pteris sericea (Fée) H. Christ = **Pteris lechleri** Mett.
Referencias: Prado, J. & Windisch, P. G., 2000.

Pteris splendens Kaulf.
Referencias: Prado, J. & Windisch, P. G., 2000; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 8044* (MBM)]; PRY[*Balansa, B. 2869* (BM)].
Notas: Cita dudosa para Argentina (Hicken, 1908a).

Pteris sterilis C. Presl = **Pteris altissima** Poir.

Pteris subverticillata Sw. = **Pellaea ternifolia** (Cav.) Link
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pteris sulphurea Cav. = **Notholaena sulphurea** (Cav.) J. Sm.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pteris tenera auct. non Kaulf. = **Pteris berteroana** J. Agardh
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pteris tenera Kaulf. = **Pteris chilensis** Desv.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pteris ternifolia Cav. = **Pellaea ternifolia** (Cav.) Link
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pteris tremula R. Br.
Referencias: Burkart, A., 1933.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–200 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 3934* (SI)].

Pteris tristicula Raddi = **Pteris denticulata** Sw. var. **tristicula** (Raddi) J. Prado
Referencias: Prado, J. & Windisch, P. G., 2000; Prado, J., 1993.

Pteris tryphylla Bertero ex Colla, nom. nud. = **Pellaea ternifolia** (Cav.) Link
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Pteris vittata L.
Referencias: de la Sota, E. R. & Morbelli, M. A., 1985; de la Sota, E. R., 1977; Prado, J. & Windisch, P. G., 2000.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR, SCA); URY(MON, PAY, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 5514* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 19446* (HB, MBM)]; URY[*Marchesi, E. 28689* (MVFA)].

Trachypteris André ex H. Christ

Número de especies: 1

Trachypteris pinnata (Hook. f.) C. Chr.
Sin.: *Acrostichum aureonitens* Hook., *Acrostichum gillianum* Baker, *Hemionitis pinnata* Hook. f.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 5688* (SI)]; PRY[*Fortunato, R. H. 3706* (BAB, FCQ, G)].

Trismeria Fée

Número de especies: 1

Trismeria argentea Fée = **Trismeria trifoliata** (L.) Diels
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Trismeria aurea Fée = **Trismeria trifoliata** (L.) Diels
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Trismeria microphylla Fée = **Trismeria trifoliata** (L.) Diels
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Trismeria trifoliata (L.) Diels
Sin.: *Acrostichum trifoliatum* L., *Gymnogramma trifoliata* (L.) Desv., *Pityrogramma trifoliata* (L.) R.M. Tryon, *Trismeria argentea* Fée, *Trismeria aurea* Fée, *Trismeria microphylla* Fée
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Prado, J., 2004b; Rodríguez Ríos, R., 1995; Sehnem, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR); CHL(I); PRY(APY, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, PHA); URY(PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pozner, R. 422* (CTES, SI)]; BRA[*Piveta, J. s.n.* (PACA)]; PRY[*Hassler, E. 10436* (BM, G)]; URY[*Chebataroff, J. s.n.* (MVM)].
Notas: Numerosos autores consideran a esta especie en *Pityrogramma* (Prado, 2004b).

SALVINIACEAE

Autores: de la Sota, E. R. & Ponce, M. M.
Revisor: Prado, J.

1 género, 4 especies, 1 especie introducida.

Salvinia Ség.

Número de especies: 4, 1 introducida

Salvinia adnata Desv.
Sin.: *Salvinia auriculata* auct. non Aubl., *Salvinia molesta* D.S. Mitch.
Referencias: de la Sota, E. R., 2001.
Hierba acuática. Perenne. Introducida. 0–100 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Forno, I. W. s.n.* (Z)].

Salvinia auriculata auct. non Aubl. = **Salvinia adnata** Desv.
Referencias: de la Sota, E. R., 2001.

Salvinia auriculata Aubl.
Sin.: *Salvinia hispida* Kunth, *Salvinia rotundifolia* Willd.
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; de la Sota, E. R., 1976; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Prado, J., 2006b; Rodríguez Ríos, R., 1995; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1994.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(V); PRY(APY, PHA); URY(ART, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 1345* (NY)]; BRA[*Hatschbach, G. 41452* (PACA)]; CHL[*Gunckel, L. H. 40176* (CONC)]; PRY[*Mereles, F. 6029* (FCQ, MO)]; URY[*Lombardo, A. 2920* (MVJB)].

Salvinia azolla Raddi = **Azolla cristata** Kaulf.

Salvinia biloba Raddi
Sin.: *Salvinia herzogii* de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1976, 1995a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Sehnem, A., 1979c.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY); URY(ART, CAS, CLA, MON, RNO, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, M. s.n.* (LIL)]; BRA[*Reineck, E. M. 39* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 6161* (FCQ, MO)]; URY[*Rosengurtt, B. 4741pe* (MVFA)].

Salvinia herzogii de la Sota = **Salvinia biloba** Raddi
Referencias: de la Sota, E. R., 1995a.

Salvinia hispida Kunth = **Salvinia auriculata** Aubl.
Referencias: de la Sota, E. R., 1976.

Salvinia minima Baker
Sin.: *Salvinia rotundifolia* auct. non Willd.
Referencias: de la Sota, E. R., 1976, 1995a; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1979c; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1994.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, SAL, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(CAN); URY(CLA, COL, DUR, FLA, MAL, MON, RNO, SAO, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. s.n.* (NY, P)]; BRA[*Müller, O. 479* (BM, K)]; PRY[*Marín, G. 194* (BM, PY)]; URY[*Berro, M. B. 1424* (MVFA)].

Salvinia molesta D.S. Mitch. = **Salvinia adnata** Desv.

Salvinia rotundifolia auct. non Willd. = **Salvinia minima** Baker
Referencias: de la Sota, E. R., 1976; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Salvinia rotundifolia Willd. = **Salvinia auriculata** Aubl.
Referencias: de la Sota, E. R., 1976.

SCHIZAEACEAE

Autores: de la Sota, E. R. & Ponce, M. M.
Revisor: Prado, J.

4 géneros, 19 especies, 1 especie endémica.

Acrostichum elegans Vahl = **Schizaea elegans** (Vahl) Sw.

Actinostachys Wall. ex Hook.

Número de especies: 2

Actinostachys pennula (Sw.) Hook.
Sin.: *Schizaea pennula* Sw., *Schizaea trilateralis* Hook. & Grev.
Referencias: Sehnem, A., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 0 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 21413* (MBM)].
Notas: Cita dudosa para Uruguay (Sehnem, 1974).

Actinostachys subtrijuga (Mart.) C. Presl
Sin.: *Schizaea subtrijuga* Mart.
Referencias: Sehnem, A., 1974; Smith, A. R., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 509* (HBR)].

Anemia Sw., nom. cons.

Número de especies: 13, 1 endémica

Anemia alfredi-rohrii Brade
Referencias: Sehnem, A., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 600 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. 3102* (HB)].

Anemia anthriscifolia Schrad. = **Anemia tomentosa** (Savigny) Sw. var. **anthriscifolia** (Schrad.) Mickel
Referencias: de la Sota, E. R. & Mickel, J. T., 1969[1968].

[Anemia anthriscifolia Schrad. f. nana Lindm.]
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].
Notas: Nombre dudoso.

Anemia anthriscifolia Schrad. var. *simplicior* H. Christ = **Anemia simplicior** (H. Christ) Mickel
Referencias: de la Sota, E. R. & Mickel, J. T., 1969[1968].

Anemia ferruginea Humb., Bonpl. & Kunth
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Mickel, J. T., 1962.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16480* (MO, NY, US)]; PRY[*Soria, N. 6087* (FCQ)].

[Anemia flexuosa (Savigny) Sw.]
Sin.: *Anemia tomentosa* (Savigny) Sw. var. *flexuosa* Sw.
Referencias: de la Sota, E. R. & Mickel, J. T., 1969[1968].
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Anemia fulva auct. non (Cav.) Sw. = **Anemia tomentosa** (Savigny) Sw. var. **anthriscifolia** (Schrad.) Mickel
Referencias: de la Sota, E. R. & Mickel, J. T., 1969[1968].

[Anemia fulva (Cav.) Sw.]
Sin.: *Osmunda fulva* Cav.
Referencias: de la Sota, E. R. & Mickel, J. T., 1969[1968]; Sehnem, A., 1974.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Anemia herzogii Rosenst.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; de la Sota, E. R. & Mickel, J. T., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3381* (SI)]; PRY[*Ramella, L. 3027* (BAB)].

[Anemia hirsuta (L.) Sw.]
Sin.: *Osmunda hirsuta* L.
Referencias: de la Sota, E. R. & Mickel, J. T., 1969[1968].
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Anemia imbricata Sturm
Referencias: Sehnem, A., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 2890* (PACA)].

Anemia myriophylla H. Christ
Referencias: Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004; de la Sota, E. R. & Mickel, J. T., 1969[1968]; de la Sota, E. R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(CEN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 4156* (LP)]; PRY[*Zardini, E. M. 26950* (FCQ, MO)].

Anemia oblonga Sturm = **Anemia tomentosa** (Savigny) Sw. var. **oblonga** (Sturm) Farw.

Anemia phyllitidis (L.) Sw. var. **phyllitidis**
Sin.: *Anemia phyllytidis* (L.) Sw. var. *fraxinifolia* (Raddi) C. Chr., *Anemia phyllytidis* (L.) Sw. var. *longifolia* (Raddi) Langsd. & Fisch., *Osmunda phyllitidis* L.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Capurro, R. H., 1940[1938]; de la Sota, E. R. & Mickel, J. T., 1969[1968]; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, CAN, PAI); URY(ART, CLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 12845* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 14748* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 5704* (BM), *Múlgura de Romero, M. E. 3494* (CTES, FCQ, SI)]; URY[*Brescia, R. s.n.* (MVFA)].

Anemia phyllitidis (L.) Sw. var. **tweedieana** (Hook.) Hassl.
Sin.: *Anemia tweedieana* Hook.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; de la Sota, E. R. & Mickel, J. T., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS, SAL); BRA(RGS); PRY(CAN); URY(TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1133* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 43444* (CTES)]; PRY[*Marín, G. 192* (BM, PY)]; URY[*Berro, M. B. 1662* (MVFA)].

Anemia phyllytidis (L.) Sw. var. *fraxinifolia* (Raddi) C. Chr. = **Anemia phyllitidis** (L.) Sw. var. **phyllitidis**
Referencias: de la Sota, E. R. & Mickel, J. T., 1969[1968].

Anemia phyllytidis (L.) Sw. var. *longifolia* (Raddi) Langsd. & Fisch. = **Anemia phyllitidis** (L.) Sw. var. **phyllitidis**
Referencias: de la Sota, E. R. & Mickel, J. T., 1969[1968].

Anemia raddiana Link
Referencias: Mickel, J. T., 1962.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Jürgens, C. 283* (NY)].

Anemia simplicior (H. Christ) Mickel
Sin.: *Anemia anthriscifolia* Schrad. var. *simplicior* H. Christ
Referencias: de la Sota, E. R. & Mickel, J. T., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(CAU, CAN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 1463* (SI)]; BRA[*Leite, J. E. 83* (NY)]; PRY[*Hassler, E. 6900* (BM)].

Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var. **anthriscifolia** (Schrad.) Mickel
Sin.: *Anemia anthriscifolia* Schrad., *Anemia fulva* auct. non (Cav.) Sw.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1974; de la Sota, E. R. & Mickel, J. T., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 873* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 657* (PACA)]; PRY[*Múlgura de Romero, M. E. 3700* (CTES, FCQ, SI)].

Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var. **australis** Mickel
Referencias: de la Sota, E. R. & Mickel, J. T., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 10194* (SI), *Pozner, R. 486* (CTES, SI)].
Notas: Probablemente se encuentre también en Bolivia.

Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var. *flexuosa* Sw. = **Anemia flexuosa** (Savigny) Sw.

[Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var. oblonga (Sturm) Farw.]
Sin.: *Anemia oblonga* Sturm
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var. **tomentosa**
Sin.: *Osmunda tomentosa* Savigny
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; de la Sota, E. R. & Mickel, J. T., 1969[1968]; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1974; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, MIS, RNE, SAL, SDE, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(CAN, COA, PAI); URY(ART, CLA, COL, DUR, FLA, FLO, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 5815* (PACA)]; PRY[*Soria, N. 3185* (FCQ, SI)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Anemia trichorrhiza Gardner ex Hook. var. **paraguariensis** Hassl.
Referencias: Hassler, E., 1928.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CEN, COA, GUA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jorgensen, P. 1393* (F, MO, US)].

Anemia tweedieana Hook. = **Anemia phyllitidis** (L.) Sw. var. **tweedieana** (Hook.) Hassl.
Referencias: de la Sota, E. R. & Mickel, J. T., 1969[1968]; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Anemia villosa Humb. & Bonpl.
Referencias: Sehnem, A., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 900–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10913* (HBR)].

Anemia warmingii Prantl
Referencias: Sehnem, A., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24180* (MBM)].

Anemia wettsteinii H. Christ
Referencias: de la Sota, E. R. & Mickel, J. T., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).

Ejemplares de referencia: ARG[*Capurro, R. H. s.n.* (BA, LP)].

Lygodium Sw., nom. cons.

Número de especies: 2

Lygodium hirtum Kaulf. = **Lygodium volubile** Sw.

Lygodium mucronulatum Sturm = **Lygodium venustum** Sw.

Lygodium polymorphum auct. non (Cav.) Kunth = **Lygodium venustum** Sw.

Lygodium puberulum Sturm = **Lygodium volubile** Sw.

Lygodium venustum Sw.
Sin.: *Lygodium mucronulatum* Sturm, *Lygodium polymorphum* auct. non (Cav.) Kunth
Referencias: Hassler, E., 1928; Sehnem, A., 1974; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 1126* (PACA)]; PRY[*Hassler, E. 742* (G)].
Notas: Citado erróneamente para Argentina (Capurro, 1940 [1938]).

Lygodium volubile Sw.
Sin.: *Lygodium hirtum* Kaulf., *Lygodium puberulum* Sturm, *Lygodium volubile* Sw. var. *hirtum* (Kaulf.) Prantl
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Capurro, R. H., 1940[1938]; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1974; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1989a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, CAN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 416* (SI)]; BRA[*Schmalz, A. 61* (MO)]; PRY[*Marín, G. 150* (BM, CTES, PY)].

Lygodium volubile Sw. var. *hirtum* (Kaulf.) Prantl = **Lygodium volubile** Sw.

Microschizaea fistulosa (Labill.) C.F. Reed = **Schizaea fistulosa** Labill.
Referencias: de la Sota, E. R. & Mickel, J. T., 1969[1968]; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Osmunda fulva Cav. = **Anemia fulva** (Cav.) Sw.

Osmunda hirsuta L. = **Anemia hirsuta** (L.) Sw.

Osmunda phyllitidis L. = **Anemia phyllitidis** (L.) Sw. var. **phyllitidis**
Referencias: de la Sota, E. R. & Mickel, J. T., 1969[1968]; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Osmunda tomentosa Savigny = **Anemia tomentosa** (Savigny) Sw. var. **tomentosa**
Referencias: de la Sota, E. R. & Mickel, J. T., 1969[1968].

Schizaea Sm., nom. cons.

Número de especies: 2

Schizaea attenuata Beyr. = **Schizaea elegans** (Vahl) Sw.

Schizaea australis Gaudich. = **Schizaea fistulosa** Labill.
Referencias: Looser, G., 1961; Moore, D. M., 1968; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Schizaea chilensis F. Phil. = **Schizaea fistulosa** Labill.
Referencias: Looser, G., 1961; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Schizaea elegans (Vahl) Sw.
Sin.: *Acrostichum elegans* Vahl, *Schizaea attenuata* Beyr., *Schizaea flabellum* Mart.
Referencias: Sehnem, A., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3203* (HBR)].

Schizaea fistulosa Labill.
Sin.: *Microschizaea fistulosa* (Labill.) C.F. Reed, *Schizaea australis* Gaudich., *Schizaea chilensis* F. Phil., *Schizaea fistulosa* Labill. var. *australis* (Gaudich.) Hook. f., *Schizaea palmata* Hombr. & Jacq., *Schizaea valdiviana* F. Phil. ex Hook. & Baker
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Looser, G., 1961; Moore, D. M., 1968; Rodríguez Ríos, R., 1995; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Werdermann, E. 298* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 1910* (CONC)].

Schizaea fistulosa Labill. var. *australis* (Gaudich.) Hook. f. = **Schizaea fistulosa** Labill.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Schizaea flabellum Mart. = **Schizaea elegans** (Vahl) Sw.
Referencias: Sehnem, A., 1974.

Schizaea palmata Hombr. & Jacq. = **Schizaea fistulosa** Labill.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.

Schizaea pennula Sw. = **Actinostachys pennula** (Sw.) Hook.
Referencias: Sehnem, A., 1974.

Schizaea subtrijuga Mart. = **Actinostachys subtrijuga** (Mart.) C. Presl
Referencias: Smith, A. R., 1995.

Schizaea trilateralis Hook. & Grev. = **Actinostachys pennula** (Sw.) Hook.
Referencias: Sehnem, A., 1974.

Schizaea valdiviana F. Phil. ex Hook. & Baker = **Schizaea fistulosa** Labill.
Referencias: Looser, G., 1961; Rodríguez Ríos, R., 1995.

SELAGINELLACEAE

Autores: Ponce, M. M. & de la Sota, E. R.
Revisor: Prado, J.

1 género, 18 especies, 2 especies endémicas, 2 especies introducidas.

Lycopodioides rupestris auct. non (L.) Kuntze = **Selaginella peruviana** (Milde) Hieron.
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Lycopodium albidulum Sw. var. *majus* Hook. & Grev. = **Selaginella muscosa** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jenny, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Lycopodium brasiliense Raddi = **Selaginella muscosa** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jenny, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Lycopodium convolutum Arn. = **Selaginella convoluta** (Arn.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Mickel, J. T. & Smith, A. R., 2004; Stolze, R. G., 1983.

Lycopodium crassinervium Desv. = **Selaginella muscosa** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Jørgensen, P. M., 1999b; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Lycopodium hygrometricum Mart. = **Selaginella convoluta** (Arn.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Lycopodium kraussianum Kunze = **Selaginella kraussiana** (Kunze) A. Braun
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Øllgaard, B., 1995.

Lycopodium marginatum Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.

Lycopodium microphyllum Kunth = **Selaginella microphylla** (Kunth) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.

Lycopodium novae-hollandiae Sw. = **Selaginella novae-hollandiae** (Sw.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Davidse, G., Sousa, M. & Knapp, S., 1995; Kessler, M., Krömer, T. & Jiménez, I., 2000.

Lycopodium revolutum Hook. & Grev. = **Selaginella convoluta** (Arn.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Kessler, M., Krömer, T. & Jiménez, I., 2000; Mickel, J. T. & Smith, A. R., 2004.

Lycopodium sulcatum Desv. ex Poir. = **Selaginella sulcata** (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart.
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000; Kessler, M., Krömer, T. & Jiménez, I., 2000; Schulenberg, T. S. & Awbrey, K., 1997.

Selaginella P. Beauv., nom. cons.

Número de especies: 18, 2 endémicas, 2 introducidas

Selaginella amazonica (Milde) Hieron., nom. illeg. = **Selaginella sellowii** Hieron.
Referencias: Tryon, R. M. & Stolze, R. G., 1994.

Selaginella anocardia A. Braun = **Selaginella muscosa** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella apoda (L.) Spring
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba. Introducida.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Montero, G. 9831* (CONC)].
Notas: Originaria de América del Norte.

Selaginella apoda (L.) Spring var. *tetragonostachya* Spring = **Selaginella muscosa** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella arechavaletae Hieron. = **Selaginella sellowii** Hieron.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Selaginella assurgens Baker = **Selaginella decomposita** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella bella Fée = **Selaginella flexuosa** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella beyrichii A. Braun = **Selaginella muscosa** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella biauriculata Hieron. = **Selaginella sulcata** (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart.
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella brasiliensis (Raddi) A. Braun, hom. illeg. = **Selaginella muscosa** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella brasiliensis (Raddi) A. Braun var. *crassinervia* Hieron. ex Bonap., nom. nud. = **Selaginella muscosa** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella breuensis Silveira = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella brevipes Fée, hom. illeg. = **Selaginella muscosa** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella burchelli Hieron. = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella callimorpha Silveira = **Selaginella contigua** Baker
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella camptostachys Fée = **Selaginella erectifolia** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella canescens Fée = **Selaginella kraussiana** (Kunze) A. Braun
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella caraçensis K.I. Goebel = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella caudorrhiza Baker = **Selaginella sulcata** (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart.
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella chromatophylla Silveira = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella ciliata (Willd.) A. Braun, nom. illeg. = **Selaginella novae-hollandiae** (Sw.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella contigua Baker
Sin.: *Selaginella callimorpha* Silveira, *Selaginella wettsteinii* Hieron.
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Mueller 133a* (NY)].

Selaginella convoluta (Arn.) Spring
Sin.: *Lycopodium convolutum* Arn., *Lycopodium hygrometricum* Mart., *Lycopodium revolutum* Hook. & Grev., *Selaginella hygrometrica* (Mart.) Spring ex Mart., *Selaginella longispicata* Underw. ex Millsp., *Selaginella orbignyana* Spring ex Decne., nom. nud.
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; de la Sota, E. R., 1972d, 1977; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000; Morbelli, M., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(FOR, MIS, SAL); PRY(APY, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eyerdam, W. J. 22909* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 3293* (BM)].

Selaginella crassinervia (Desv.) Spring = **Selaginella muscosa** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella cunninghami Baker = **Selaginella tenuissima** Fée
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella decomposita Spring
Sin.: *Selaginella assurgens* Baker, *Selaginella fusca* Silveira, *Selaginella subsegregata* Baker
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 8322* (BM)].

Selaginella deltoides A. Braun = **Selaginella muscosa** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella denticulata auct. non (L.) Spring = **Selaginella kraussiana** (Kunze) A. Braun
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella distorta (Spring) Spring = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring

Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella distorta (Spring) Spring var. *major* Baker = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella distorta (Spring) Spring var. *minor* (Spring) Spring = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella erectifolia Spring
Sin.: *Selaginella camptostachys* Fée, *Selaginella glazioviana* Hieron.
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 50378* (BM)].

Selaginella ericoides Fée = **Selaginella macrostachya** (Spring) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella excurrens Spring = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella feei Hieron. = **Selaginella muscosa** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella flexuosa Spring
Sin.: *Selaginella bella* Fée, *Selaginella longicuspis* Baker, *Selaginella macrorhyza* Silveira
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000; Labiak, P. H. & Prado, J., 1998.
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Barbosa, E. 492* (SI)].

Selaginella flexuosa Spring subsp. *macrostachya* Spring = **Selaginella macrostachya** (Spring) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella fusca Silveira = **Selaginella decomposita** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.

Selaginella gardneri Spring = **Selaginella macrostachya** (Spring) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.

Selaginella geminata Fée = **Selaginella macrostachya** (Spring) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.

Selaginella glazioviana Hieron. = **Selaginella erectifolia** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella glaziovii Fée = **Selaginella suavis** (Spring) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.

Selaginella henriqueana Silveira = **Selaginella macrostachya** (Spring) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella herteri Hieron. = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000; Legrand, C. M. D. E. & Lombardo, A., 1958.

Selaginella hortensis Mett. = **Selaginella kraussiana** (Kunze) A. Braun
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella hygrometrica (Mart.) Spring ex Mart. = **Selaginella convoluta** (Arn.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella increscentifolia Spring = **Selaginella novae-hollandiae** (Sw.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella jamesonii Baker = **Selaginella microphylla** (Kunth) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella jungermannioides auct. non Spring = **Selaginella novae-hollandiae** (Sw.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939.

Selaginella kraussiana auct. non (Kunze) A. Braun = **Selaginella sulcata** (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart.
Referencias: Alston, A. H. G., 1939.

Selaginella kraussiana (Kunze) A. Braun
Sin.: *Lycopodium kraussianum* Kunze, *Selaginella canescens* Fée, *Selaginella denticulata* auct. non (L.) Spring, *Selaginella hortensis* Mett.
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Schmalz, E. 149* (BM, NY)].
Notas: Nativa de África, accidentalmente introducida en el Nuevo Mundo, Brasil.

Selaginella lindbergii Baker = **Selaginella macrostachya** (Spring) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.

Selaginella longicuspis Baker = **Selaginella flexuosa** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.

Selaginella longispicata Underw. ex Millsp. = **Selaginella convoluta** (Arn.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella lorentzii Hieron. = **Selaginella sulcata** (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart.
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella macrorhyza Silveira = **Selaginella flexuosa** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.

Selaginella macrostachya (Spring) Spring
Sin.: *Selaginella ericoides* Fée, *Selaginella flexuosa* Spring subsp. *macrostachya* Spring, *Selaginella gardneri* Spring, *Selaginella geminata* Fée, *Selaginella henriqueana* Silveira, *Selaginella lindbergii* Baker
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 50372* (BM)].

Selaginella marginata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Sin.: *Lycopodium marginatum* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Selaginella breuensis* Silveira, *Selaginella burchelli* Hieron., *Selaginella caraçensis* K.I. Goebel, *Selaginella chromatophylla* Silveira, *Selaginella distorta* (Spring) Spring, *Selaginella distorta* (Spring) Spring var. *major* Baker, *Selaginella distorta* (Spring) Spring var. *minor* (Spring) Spring, *Selaginella excurrens* Spring, *Selaginella herteri* Hieron., *Selaginella marginata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring var. *distorta* Spring, *Selaginella marginata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring var. *minor* Spring, *Selaginella moseni* Hieron., *Selaginella urbanii* Hieron., *Selaginella wielewskii* Hieron. ex Rosenst., *Selaginella ypiranguensis* Hieron. ex Herter, *Selaginella ypiranguensis* Hieron. ex Herter var. *riograndensis* Herter
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Capurro, R. H., 1969[1968]; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000; Morbelli, M., 1977; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, COS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAN, GUA); URY(ART, LAV, MAL, MON, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 5640* (BM, SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 3726* (BM, P)]; PRY[*Balansa, B. 3292* (BM, FM, P)]; URY[*Herter, W. G. F. 82766* (BM)].

Selaginella marginata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring var. *distorta* Spring = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella marginata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring var. *minor* Spring = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Selaginella microphylla (Kunth) Spring
Sin.: *Lycopodium microphyllum* Kunth, *Selaginella jamesonii* Baker, *Selaginella thujifolia* Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; de la Sota, E. R., 1972d, 1977; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000; Morbelli, M., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(COA, PAI); URY(LAV, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 1157* (BA, BM, SI)]; BRA[*Ule, E. H. G. 297* (BM, P)]; PRY[*Hassler, E. 12243* (BM)].

Selaginella mildei Hieron. = **Selaginella sellowii** Hieron.
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella montevidensis Hieron. = **Selaginella sellowii** Hieron.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Alston, A. H. G., 1939.

Selaginella moseni Hieron. = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Selaginella muscosa Spring
Sin.: *Lycopodium albidulum* Sw. var. *majus* Hook. & Grev., *Lycopodium brasiliense* Raddi, *Lycopodium crassinervium* Desv., *Selaginella anocardia* A. Braun, *Selaginella apoda* (L.) Spring var. *tetragonostachya* Spring, *Selaginella beyrichii* A. Braun, *Selaginella brasiliensis* (Raddi) A. Braun var. *crassinervia* Hieron. ex Bonap., nom. nud., *Selaginella brasiliensis* (Raddi) A. Braun, hom. illeg., *Selaginella brevipes* Fée, hom. illeg., *Selaginella crassinervia* (Desv.) Spring, *Selaginella deltoides* A. Braun, *Selaginella feei* Hieron., *Selaginella niederleinii* Hieron., *Selaginella polysperma* Spring, *Selaginella trifurcata* Baker

Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Burkart, A., 1933; Capurro, R. H., 1969[1968]; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000; Morbelli, M., 1977; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, PAI); URY(MON, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2827* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 654a* (C)]; PRY[*Jiménez, B. 1965* (BM, PY)]; URY[*Castellanos, A. 584* (BA, BM)].

Selaginella niederleinii Hieron. = **Selaginella muscosa** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.

Selaginella novae-hollandiae (Sw.) Spring
Sin.: *Lycopodium novae-hollandiae* Sw., *Selaginella ciliata* (Willd.) A. Braun, nom. illeg., *Selaginella increscentifolia* Spring, *Selaginella jungermannioides* auct. non Spring, *Selaginella patula* auct. non Spring, *Selaginella radiata* auct. non (Aubl.) Spring, *Selaginella tucumanensis* Hieron., *Selaginella warscewicziana* Klotzsch, nom. nud.
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Morbelli, M., 1977; de la Sota, E. R., 1972d.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Palací, C. A. 891* (SI)].

Selaginella orbignyana Spring ex Decne., nom. nud. = **Selaginella convoluta** (Arn.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella papagaiensis Silveira = **Selaginella tenuissima** Fée
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.

Selaginella parviarticulata Buck
Referencias: Buck, W. R., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–300 m.
Países: PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Buck, W. R. 12012* (NY, PY)].

Selaginella patula auct. non Spring = **Selaginella novae-hollandiae** (Sw.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939.

Selaginella peruviana (Milde) Hieron.
Sin.: *Lycopodioides rupestris* auct. non (L.) Kuntze, *Selaginella peruviana* (Milde) Hieron. var. *dombeyana* Hieron., *Selaginella rupestris* (L.) Spring f. *peruviana* Milde
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Capurro, R. H., 1969[1968]; de la Sota, E. R., 1972d; Morbelli, M., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 18974* (SI)].

Selaginella peruviana (Milde) Hieron. var. *dombeyana* Hieron. = **Selaginella peruviana** (Milde) Hieron.
Referencias: Alston, A. H. G., 1939.

Selaginella polysperma Spring = **Selaginella muscosa** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.

Selaginella radiata auct. non (Aubl.) Spring = **Selaginella novae-hollandiae** (Sw.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella rubescens Hieron. = **Selaginella sulcata** (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart.
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.

Selaginella rupestris auct. non (L.) Spring = **Selaginella sellowii** Hieron.
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella rupestris (L.) Spring f. *amazonica* Milde = **Selaginella sellowii** Hieron.
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella rupestris (L.) Spring f. *brasiliensis* Milde = **Selaginella sellowii** Hieron.
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella rupestris (L.) Spring f. *peruviana* Milde = **Selaginella peruviana** (Milde) Hieron.
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella sellowii Hieron.
Sin.: *Selaginella amazonica* (Milde) Hieron., nom. illeg., *Selaginella arechavaletae* Hieron., *Selaginella mildei* Hieron., *Selaginella montevidensis* Hieron., *Selaginella rupestris* (L.) Spring f. *amazonica* Milde, *Selaginella rupestris* (L.) Spring f. *brasiliensis* Milde, *Selaginella rupestris* auct. non (L.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; de la Sota, E. R., 1977; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000; Morbelli, M., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS); PRY(APY, COA, PHA); URY(ART, COL, LAV, MAL, MON, PAY, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*van de Venne, H. 30* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 1370* (BM)]; PRY[*Lindman, C. A. M. 2319a* (BM)]; URY[*Herter, W. G. F. 5643* (BM)].

Selaginella serpens auct. non (Desv.) Spring = **Selaginella tenuissima** Fée
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella suavis (Spring) Spring
Sin.: *Selaginella glaziovii* Fée, *Selaginella sulcata* (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart. subsp. *suavis* Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Schreiner, E. J. s.n.* (BM)].

Selaginella subsegregata Baker = **Selaginella decomposita** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.

Selaginella sulcata (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart.
Sin.: *Lycopodium sulcatum* Desv. ex Poir., *Selaginella biauriculata* Hieron., *Selaginella caudorrhiza* Baker, *Selaginella kraussiana* auct. non (Kunze) A. Braun, *Selaginella lorentzii* Hieron., *Selaginella rubescens* Hieron., *Selaginella sulcata* (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart. var. *biauriculata* Hieron. ex Bonap., *Selaginella sulcata* (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart. var. *cruenta* Mart.
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; de la Sota, E. R., 1977; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000; Morbelli, M., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAN, MIE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2981* (SI)]; BRA[*Schmalz, E. 152* (NY)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5427* (BM)].

Selaginella sulcata (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart. var. *biauriculata* Hieron. ex Bonap. = **Selaginella sulcata** (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart.
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.

Selaginella sulcata (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart. var. *cruenta* Mart. = **Selaginella sulcata** (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart.
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella sulcata (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart. subsp. *suavis* Spring = **Selaginella suavis** (Spring) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella tenuissima Fée
Sin.: *Selaginella cunninghami* Baker, *Selaginella papagaiensis* Silveira, *Selaginella serpens* auct. non (Desv.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 131* (BM)].

Selaginella thujifolia Spring = **Selaginella microphylla** (Kunth) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.

Selaginella trifurcata Baker = **Selaginella muscosa** Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.

Selaginella tucumanensis Hieron. = **Selaginella novae-hollandiae** (Sw.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., 1939; Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella urbanii Hieron. = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella warscewicziana Klotzsch, nom. nud. = **Selaginella novae-hollandiae** (Sw.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella wettsteinii Hieron. = **Selaginella contigua** Baker
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.

Selaginella wielewskii Hieron. ex Rosenst. = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981; Hirai, R. Y. & Prado, J., 2000.

Selaginella ypiranguensis Hieron. ex Herter = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

Selaginella ypiranguensis Hieron. ex Herter var. *riograndensis* Herter = **Selaginella marginata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring
Referencias: Alston, A. H. G., Jermy, A. C. & Rankin, J. M., 1981.

THELYPTERIDACEAE

Autores: Ponce, M. M. & Salino, A.
Revisor: Prado, J.

2 géneros, 59 especies, 9 especies endémicas, 3 especies introducidas.

Aspidium abruptum Kunze, hom. illeg. = **Thelypteris grandis** A.R. Sm. var. **kunzeana** (Hook.) A.R. Sm.
Referencias: Smith, A. R., 1971.

Aspidium achalense Hieron. = **Thelypteris achalensis** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Aspidium arechavaletae Hieron. = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Aspidium argentinum Hieron. = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Aspidium caesariaum H. Christ = **Thelypteris scabra** (C. Presl) Lellinger
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 1987.

Aspidium cheilanthoides Kunze = **Thelypteris cheilanthoides** (Kunze) Proctor
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004a.

Aspidium conterminum auct. non Willd. = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti

Aspidium elatior Fée = **Thelypteris tenerrima** (Fée) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1995.

Aspidium galanderi Hieron. = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Aspidium glaziouvii H. Christ = **Thelypteris glaziovii** (H. Christ) C.F. Reed

Aspidium gongylodes Schkuhr = **Thelypteris interrupta** (Willd.) K. Iwats.
Referencias: Ponce, M. M., 1987; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Aspidium hispidulum Decne. = **Thelypteris hispidula** (Decne.) C.F. Reed
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 1987.

Aspidium invisum Sw. = **Thelypteris invisa** (Sw.) Proctor

Aspidium lorentzii Hieron. = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Aspidium lugubre Mett. = **Thelypteris lugubris** (Mett.) R.M. Tryon & A.F. Tryon

Aspidium macrourum Kaulf. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Aspidium molle Sw. = **Thelypteris dentata** (Forssk.) E.P. St. John
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Smith, A. R., 1971.

[Aspidium molle Sw. var. glabrindusiatum Hieron.]
Referencias: Smith, A. R., 1971.
Notas: Nombre dudoso.

Aspidium nephrodioides Fée, hom. illeg. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **dissimilis** (Schrad.) A.R. Sm.
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Aspidium oligocarpum (Willd.) Kunth var. *crassistipitatum* Hieron. = **Thelypteris oligocarpa** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching var. **crassistipitata** (Hieron.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Aspidium pachyrhachis Kunze ex Mett. = **Thelypteris pachyrhachis** (Kunze ex Mett.) Ching
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Aspidium palustre Mez ex Fée, hom. illeg. = **Thelypteris metteniana** Ching
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Aspidium patens (Sw.) Sw. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**

Aspidium pohlianum C. Presl = **Thelypteris interrupta** (Willd.) K. Iwats.
Referencias: Grimes, J. W. & Parris, B. S., 1986.

Aspidium pseudomontanum Hieron. = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Aspidium ptarmicum Kunze ex Mett. = **Thelypteris ptarmica** (Kunze ex Mett.) C.F. Reed var. **ptarmica**
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004a.

Aspidium refractum auct. non Kunze = **Thelypteris riograndensis** (Lindm.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Aspidium rivularioides Fée = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Aspidium siambonense Hieron. = **Thelypteris achalensis** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Aspidium stipulare Willd. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Aspidium tenerrimum Fée = **Thelypteris tenerrima** (Fée) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1995.

Aspidium unitum Mett. = **Thelypteris interrupta** (Willd.) K. Iwats.
Referencias: Grimes, J. W. & Parris, B. S., 1986.

Aspidium violascens Link = **Thelypteris dentata** (Forssk.) E.P. St. John
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Smith, A. R., 1971.

Asplenium decurtatum Kunze, nom. nud. = **Thelypteris decurtata** (Link) de la Sota subsp. **decurtata**
Referencias: de la Sota, E. R., 1983.

Asplenium decurtatum Link = **Thelypteris decurtata** (Link) de la Sota subsp. **decurtata**
Referencias: de la Sota, E. R., 1983.

Athyrium decurtatum (Kunze) C. Presl, nom. illeg. = **Thelypteris decurtata** (Link) de la Sota subsp. **decurtata**
Referencias: de la Sota, E. R., 1983.

Athyrium decurtatum (Link) Fée = **Thelypteris decurtata** (Link) de la Sota subsp. **decurtata**
Referencias: de la Sota, E. R., 1983.

Athyrium decurtatum (Link) Fée var. *platense* Weath. = **Thelypteris decurtata** (Link) de la Sota subsp. **platensis** (Weath.) de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1983.

Ceterach aspidioides Raddi = **Thelypteris ptarmica** (Kunze ex Mett.) C.F. Reed var. **asplenioides**
Referencias: Ponce, M. M., 1995.

Cyclosorus berroi (C. Chr.) Abbiatti = **Thelypteris berroi** (C. Chr.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Cyclosorus dentatus (Forssk.) Ching = **Thelypteris dentata** (Forssk.) E.P. St. John
Referencias: Smith, A. R., 1971.

Cyclosorus dentatus (Forssk.) Ching var. *violascens* (Link) Abbiatti = **Thelypteris dentata** (Forssk.) E.P. St. John
Referencias: Smith, A. R., 1971.

Cyclosorus gongylodes (Schkuhr) Link = **Thelypteris interrupta** (Willd.) K. Iwats.
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Cyclosorus hickenii Abbiatti = **Thelypteris conspersa** (Schrad.) A.R. Sm.
Referencias: Smith, A. R., 1971.

Cyclosorus quadrangularis (Fée) Tardieu = **Thelypteris hispidula** (Decne.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Cyclosorus urens (Rosenst.) Ching = **Thelypteris conspersa** (Schrad.) A.R. Sm.
Referencias: Smith, A. R., 1971.

Dryopteris achalensis (Hieron.) C. Chr. = **Thelypteris achalensis** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris amambayensis H. Christ = **Thelypteris amambayensis** (H. Christ) Ponce
Referencias: Ponce, M. M., 2000.

Dryopteris angustifolia (Willd.) Urb. = **Thelypteris angustifolia** (Willd.) Proctor

Dryopteris arechavaletae (Hieron.) C. Chr. = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti

Dryopteris argentina (Hieron.) C. Chr. = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Dryopteris argentina (Hieron.) C. Chr. var. *lorentzii* (Hieron.) Osten & Herter = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris bangii C. Chr. = **Thelypteris conspersa** (Schrad.) A.R. Sm.
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2002.

Dryopteris berroi C. Chr. = **Thelypteris berroi** (C. Chr.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris biformata Rosenst. = **Thelypteris biformata** (Rosenst.) R.M. Tryon
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris brasiliensis (C. Chr.) C.V. Morton = **Thelypteris decussata** (L.) Proctor var. **brasiliensis** (C. Chr.) A.R. Sm.
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004.

Dryopteris cabrerae Weath. = **Thelypteris confluens** (Thunb.) C.V. Morton
Referencias: Tryon, A. F., Tryon, R. M. & Brade, F., 1980.

Dryopteris cheilanthoides (Kunze) C. Chr. = **Thelypteris cheilanthoides** (Kunze) Proctor
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004a.

Dryopteris concinna (Willd.) Kuntze = **Thelypteris concinna** (Willd.) Ching

Dryopteris concinna (Willd.) Kuntze var. *elongata* (E. Fourn.) C. Chr. = **Thelypteris concinna** (Willd.) Ching

Dryopteris decussata (L.) Urb. var. *brasiliensis* C. Chr. = **Thelypteris decussata** (L.) Proctor var. **brasiliensis** (C. Chr.) A.R. Sm.
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2002.

Dryopteris dentata (Forssk.) C. Chr. = **Thelypteris dentata** (Forssk.) E.P. St. John
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Smith, A. R., 1971.

Dryopteris desvauxii Mett. f. *glandulosa* Maxon & C.V. Morton = **Thelypteris maxoniana** A.R. Sm.

Dryopteris diplazioides (Desv.) Proctor var. *amambayensis* (H. Christ) Rosenst. = **Thelypteris amambayensis** (H. Christ) Ponce
Referencias: Ponce, M. M., 2000.

Dryopteris diplazioides (Desv.) Proctor var. *brevisora* Rosenst. = **Thelypteris amambayensis** (H. Christ) Ponce
Referencias: Ponce, M. M., 2000.

Dryopteris dutrae C. Chr. ex Dutra = **Thelypteris amambayensis** (H. Christ) Ponce
Referencias: Ponce, M. M., 2000.

Dryopteris galanderi (Hieron.) C. Chr. = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris gardneriana (Baker) Kuntze = **Thelypteris gardneriana** (Baker) C.F. Reed
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2002.

Dryopteris gemmulifera Hieron. = **Thelypteris gemmulifera** (Hieron.) A.R. Sm.

Dryopteris gongylodes (Schkuhr) Kuntze = **Thelypteris interrupta** (Willd.) K. Iwats.
Referencias: Ponce, M. M., 1987; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Dryopteris hassleri H. Christ = **Thelypteris mosenii** (C. Chr.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1998b.

Dryopteris iguapensis C. Chr. = **Thelypteris iguapensis** (C. Chr.) Salino
Referencias: Salino, A., 2002.

Dryopteris lorentzii (Hieron.) C. Chr. = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris mollis (Sw.) Hieron. = **Thelypteris dentata** (Forssk.) E.P. St. John
Referencias: Smith, A. R., 1971.

Dryopteris mollis (Sw.) Hieron. var. *glabrindusiata* (Hieron.) Hassl. = **Thelypteris hispidula** (Decne.) C.F. Reed

Dryopteris mosenii C. Chr. = **Thelypteris mosenii** (C. Chr.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1998b.

Dryopteris oligocarpa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze = **Thelypteris oligocarpa** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching var. **oligocarpa**

Dryopteris oligocarpa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze var. *crassistipitata* (Hieron.) Hicken = **Thelypteris oligocarpa** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching var. **crassistipitata** (Hieron.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris oligophylla Maxon var. *kunzeana* (Hook.) C. Chr. = **Thelypteris grandis** A.R. Sm. var. **kunzeana** (Hook.) A.R. Sm.

Dryopteris opposita (Vahl) Urb. = **Thelypteris opposita** (Vahl) Ching
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004a.

Dryopteris opposita (Vahl) Urb. f. *major* Rosenst. = **Thelypteris pachyrhachis** (Kunze ex Mett.) Ching
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004a.

Dryopteris palustris (Mett.) Kuntze = **Thelypteris metteniana** Ching
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris palustris (Mett.) Kuntze var. *uruguayensis* D. Legrand = **Thelypteris metteniana** Ching

Dryopteris parasitica (L.) Kuntze var. *glabrindusiata* (Hieron.) Hicken = **Thelypteris hispidula** (Decne.) C.F. Reed
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Dryopteris parasitica (L.) Kuntze var. *glandulifera* Rosenst. = **Thelypteris hispidula** (Decne.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris patens (Sw.) Kuntze = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris patens (Sw.) Kuntze var. *decrescens* Rosenst. = **Thelypteris conspersa** (Schrad.) A.R. Sm.
Referencias: Smith, A. R., 1971.

Dryopteris patens (Sw.) Kuntze var. *scabriuscula* (C. Presl) C. Chr. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris patens (Sw.) Kuntze var. *stipulare* (Willd.) Desv. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris podotricha Sehnem = **Thelypteris podotricha** (Sehnem) Ponce

Dryopteris pseudomontana (Hieron.) C. Chr. = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti

Dryopteris pseudotetragona Urb. f. *major* Rosenst. = **Thelypteris scabra** (C. Presl) Lellinger
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris pseudotetragona Urb. var. *foecunda* Rosenst. = **Thelypteris scabra** (C. Presl) Lellinger
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris pseudotetragona Urb. var. *gemmulifera* Hieron. ex Rosenst. = **Thelypteris scabra** (C. Presl) Lellinger
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Dryopteris pseudothelypteris (Rosenst.) C. Chr. = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1995.

Dryopteris ptarmica (Kunze ex Mett.) Kuntze = **Thelypteris ptarmica** (Kunze ex Mett.) C.F. Reed var. **ptarmica**
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004a.

Dryopteris ptarmica (Kunze ex Mett.) Kuntze f. *asplenioides* (Sw.) C. Chr. = **Thelypteris ptarmica** (Kunze ex Mett.) C.F. Reed var. **asplenioides**
Referencias: Ponce, M. M., 1995.

Dryopteris quadrangularis (Fée) Alston = **Thelypteris hispidula** (Decne.) C.F. Reed
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris raddii Rosenst. = **Thelypteris raddii** (Rosenst.) Ponce
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004a.

Dryopteris recumbens Rosenst. = **Thelypteris recumbens** (Rosenst.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris recumbens Rosenst. var. *violacea* Rosenst. = **Thelypteris recumbens** (Rosenst.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1995.

Dryopteris refracta (Fisch. & C.A. Mey. ex Kunze) Kuntze = **Polypodium refractum** Fisch. & C.A. Mey. ex Kunze

Dryopteris regnelliana C. Chr. = **Thelypteris regnelliana** (C. Chr.) Ponce
Referencias: Ponce, M. M., 1998a.

Dryopteris reticulata (L.) Urb. var. *longifolia* (Desv.) Rosenst. = **Thelypteris longifolia** (Desv.) R.M. Tryon

Dryopteris retusa (Sw.) C. Chr. = **Thelypteris retusa** (Sw.) C.F. Reed
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004a.

Dryopteris retusa (Sw.) C. Chr. f. *denticulata* Rosenst. = **Thelypteris raddii** (Rosenst.) Ponce
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004a.

Dryopteris retusa (Sw.) C. Chr. var. *austrobrasiliensis* Rosenst. = **Thelypteris raddii** (Rosenst.) Ponce
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004a.

Dryopteris riograndensis (Lindm.) C. Chr. = **Thelypteris riograndensis** (Lindm.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris riopardensis Rosenst. = **Thelypteris pachyrhachis** (Kunze ex Mett.) Ching
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004a.

Dryopteris rioverdensis C. Chr. = **Thelypteris rioverdensis** (C. Chr.) Ponce
Referencias: Ponce, M. M., 1998b.

Dryopteris rivularioides (Fée) C. Chr. ex Rosenst. = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris rivularioides (Fée) C. Chr. ex Rosenst. var. *arechavaletae* (Hieron.) C. Chr. = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris rivularioides (Fée) C. Chr. ex Rosenst. var. *crenata* (Rosenst.) Rosenst. = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987; Salino, A. & Semir, J., 2004.

Dryopteris rojasii H. Christ = **Thelypteris mosenii** (C. Chr.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1998b.

Dryopteris sanctae-catharinae Rosenst. = **Thelypteris sanctae-catharinae** (Rosenst.) Ponce

Dryopteris scabra (C. Presl) C. Chr. = **Thelypteris scabra** (C. Presl) Lellinger
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris scabra (C. Presl) C. Chr. var. *caesariana* (H. Christ) C. Chr. = **Thelypteris scabra** (C. Presl) Lellinger
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris scabra (C. Presl) C. Chr. var. *incompleta* (Lindm.) C. Chr. = **Thelypteris scabra** (C. Presl) Lellinger
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris scariosa Rosenst. = **Thelypteris sanctae-catharinae** (Rosenst.) Ponce

Dryopteris serrata (Cav.) C. Chr. = **Thelypteris serrata** (Cav.) Alston
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris siambonensis (Hieron.) C. Chr. = **Thelypteris achalensis** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris sinuata Sehnem = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004a.

Dryopteris stierii (Rosenst.) C. Chr. = **Thelypteris stierii** (Rosenst.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris stipulare (Willd.) Kuntze = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris supralineata Rosenst. = **Thelypteris gardneriana** (Baker) C.F. Reed
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2002.

Dryopteris tenerrima (Fée) Rosenst. = **Thelypteris tenerrima** (Fée) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1995.

Dryopteris tetragona (Sw.) Urb., nom. illeg. = **Thelypteris tetragona** (Sw.) Small
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Dryopteris urens Rosenst. = **Thelypteris conspersa** (Schrad.) A.R. Sm.
Referencias: Smith, A. R., 1971.

Dryopteris vattuonei Hicken = **Thelypteris vattuonei** (Hicken) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Goniopteris burkartii C. Chr. ex Abbiatti = **Thelypteris abbiattii** C.F. Reed
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 1987.

Goniopteris macrocladia Fée = **Thelypteris interrupta** (Willd.) K. Iwats.
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2002.

Goniopteris riograndensis (Lindm.) Ching = **Thelypteris riograndensis** (Lindm.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Goniopteris tetragona (Sw.) C. Presl = **Thelypteris tetragona** (Sw.) Small
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Gymnogramma asplenioides Sw. = **Thelypteris ptarmica** (Kunze ex Mett.) C.F. Reed var. **asplenioides**
Referencias: Ponce, M. M., 1995.

Gymnogramma stierii Rosenst. = **Thelypteris stierii** (Rosenst.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Lastrea argentina (Hieron.) Copel. = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Capurro, R. H., 1961; Ponce, M. M., 1987; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Lastrea cabrerae (Weath.) Capurro = **Thelypteris confluens** (Thunb.) C.V. Morton
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Lastrea cheilanthoides (Kunze) T. Moore = **Thelypteris cheilanthoides** (Kunze) Proctor
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004a.

Lastrea dutrai (C. Chr. ex Dutra) Brade = **Thelypteris amambayensis** (H. Christ) Ponce
Referencias: Ponce, M. M., 2000.

Lastrea galanderi (Hieron.) Capurro = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Lastrea mettenii Copel. = **Thelypteris metteniana** Ching
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Lastrea mosenii (C. Chr.) Copel. = **Thelypteris mosenii** (C. Chr.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1998b.

Lastrea opposita (Vahl) C. Presl = **Thelypteris opposita** (Vahl) Ching
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004a.

Lastrea pachyrhachis (Kunze ex Mett.) T. Moore = **Thelypteris pachyrhachis** (Kunze ex Mett.) Ching
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004a.

Lastrea ptarmica (Kunze ex Mett.) T. Moore = **Thelypteris ptarmica** (Kunze ex Mett.) C.F. Reed var. **ptarmica**
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004a.

Lastrea recumbens (Rosenst.) Copel. = **Thelypteris recumbens** (Rosenst.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1995.

Lastrea regnelliana (C. Chr.) Brade = **Thelypteris regnelliana** (C. Chr.) Ponce
Referencias: Ponce, M. M., 1995.

Lastrea retusa (Sw.) Copel. = **Thelypteris retusa** (Sw.) C.F. Reed
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004a.

Lastrea riopardensis (Rosenst.) Copel. = **Thelypteris pachyrhachis** (Kunze ex Mett.) Ching
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004a.

Lastrea rioverdensis (C. Chr.) Brade = **Thelypteris rioverdensis** (C. Chr.) Ponce
Referencias: Ponce, M. M., 1998b.

Lastrea rivularioides (Fée) Copel. var. *arechavaletae* (Hieron.) Capurro = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Referencias: Capurro, R. H., 1961.

Lastrea sanctae-catharinae (Rosenst.) Brade = **Thelypteris sanctae-catharinae** (Rosenst.) Ponce

Lastrea scabra (C. Presl) C. Presl = **Thelypteris scabra** (C. Presl) Lellinger
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 1987.

Lastrea scabriuscula C. Presl = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Lastrea scariosa Rosenst. = **Thelypteris sanctae-catharinae** (Rosenst.) Ponce

Lastrea stierii (Rosenst.) Copel. = **Thelypteris stierii** (Rosenst.) C.F. Reed
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004a.

Lastrea tenerrima (Fée) Copel. = **Thelypteris tenerrima** (Fée) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1995.

Macrothelypteris (H. Itô) Ching

Número de especies: 1

Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching
Sin.: *Polystichum torresianum* Gaudich., *Thelypteris torresiana* (Gaudich.) Alston
Referencias: Alston, A. H. G., 1960; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 1987, 2007; Salino, A. & Semir, J., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CAN, COA, GUA, PAI); URY(ART, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1063* (SI)]; BRA[*Haerchen, F. s.n.* (UC)]; PRY[*Jiménez, B. 1288* (BM, PY)]; URY[*Brescia, R. 16357* (MVFA)].

Meniscium angustifolium Willd. = **Thelypteris angustifolia** (Willd.) Proctor

Meniscium longifolium Desv. = **Thelypteris longifolia** (Desv.) R.M. Tryon

Meniscium salzmannii Fée = **Thelypteris salzmannii** (Fée) C.V. Morton

Meniscium serratum Cav. = **Thelypteris serrata** (Cav.) Alston
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 1987.

Nephrodium achalense (Hieron.) Hicken = **Thelypteris achalensis** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Nephrodium argentinum (Hieron.) Hicken = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Nephrodium argentinum (Hieron.) Hicken var. *major* Hicken = **Thelypteris achalensis** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Nephrodium conspersum Schrad. = **Thelypteris conspersa** (Schrad.) A.R. Sm.
Referencias: Smith, A. R., 1971.

Nephrodium dissimile Schrad. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **dissimilis** (Schrad.) A.R. Sm.
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Nephrodium etchichury Hicken = **Thelypteris scabra** (C. Presl) Lellinger

Nephrodium galanderi (Hieron.) Hicken = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Nephrodium gardnerianum Baker = **Thelypteris gardneriana** (Baker) C.F. Reed
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2002.

Nephrodium gongylodes (Schkuhr) Schott = **Thelypteris interrupta** (Willd.) K. Iwats.
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Nephrodium juergensii Rosenst. = **Thelypteris juergensii** (Rosenst.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Nephrodium kunzeanum Hook. = **Thelypteris grandis** A.R. Sm. var. **kunzeana** (Hook.) A.R. Sm.
Referencias: Smith, A. R., 1992.

Nephrodium leprieurii Hook. = **Thelypteris leprieurii** (Hook.) R.M. Tryon

Nephrodium lorentzii (Hieron.) Hicken = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Nephrodium molle Jacq. = **Thelypteris dentata** (Forssk.) E.P. St. John
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938].

Nephrodium oligocarpum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Desv. var. *crassistipitatum* (Hieron.) Hicken = **Thelypteris oligocarpa** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching var. **crassistipitata** (Hieron.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Nephrodium palustre Mett. ex Baker = **Thelypteris metteniana** Ching
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Nephrodium parasiticum (L.) Desv. var. *glabrindusiatum* (Hieron.) Hicken = **Thelypteris hispidula** (Decne.) C.F. Reed

Nephrodium patens (Sw.) Desv. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Nephrodium pseudomontanum (Hieron.) Rosenst. = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti

Nephrodium pseudothelypteris Rosenst. = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Nephrodium pseudothelypteris Rosenst. var. *crenata* Rosenst. = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Nephrodium ptarmicum (Kunze ex Mett.) Baker = **Thelypteris ptarmica** (Kunze ex Mett.) C.F. Reed var. **ptarmica**
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004.

Nephrodium quadrangulare Fée = **Thelypteris hispidula** (Decne.) C.F. Reed
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 1987.

Nephrodium refractum (Fisch. & C.A. Mey. ex Kunze) Hook. = **Polypodium refractum** Fisch. & C.A. Mey. ex Kunze
Referencias: Hicken, C. M., 1908a.

Nephrodium serratum (Cav.) Keyserl., comb. superfl. = **Thelypteris serrata** (Cav.) Alston

Nephrodium siambonense (Hieron.) Hicken = **Thelypteris achalensis** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Nephrodium stipulare (Sw.) Desv. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Nephrodium tetragonum (Sw.) Keyserl., nom. illeg. = **Thelypteris tetragona** (Sw.) Small
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Nephrodium unitum (Mett.) R. Br. = **Thelypteris interrupta** (Willd.) K. Iwats.

Phegopteris concinna (Willd.) Fée = **Thelypteris concinna** (Willd.) Ching
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Phegopteris elongata E. Fourn. = **Thelypteris concinna** (Willd.) Ching
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Polypodium concinnum Willd. = **Thelypteris concinna** (Willd.) Ching

Polypodium dentatum Forssk. = **Thelypteris dentata** (Forssk.) E.P. St. John
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Smith, A. R., 1971.

Polypodium molle Jacq., hom. illeg. = **Thelypteris dentata** (Forssk.) E.P. St. John
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1995; Smith, A. R., 1971.

Polypodium oligocarpum Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Thelypteris oligocarpa** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching var. **oligocarpa**

Polypodium oppositum Vahl = **Thelypteris opposita** (Vahl) Ching
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004.

Polypodium patens Sw. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Polypodium pubescens Raddi = **Thelypteris raddii** (Rosenst.) Ponce
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004a.

[Polypodium refractum Fisch. & C.A. Mey. ex Kunze]
Sin.: *Dryopteris refracta* (Fisch. & C.A. Mey. ex Kunze) Kuntze, *Nephrodium refractum* (Fisch. & C.A. Mey. ex Kunze) Hook.
Notas: Nombre dudoso.

Polypodium retusum Sw. = **Thelypteris retusa** (Sw.) C.F. Reed
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004a.

Polypodium riograndensis Lindm. = **Thelypteris riograndensis** (Lindm.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Polypodium salicifolium Vahl, hom. illeg. = **Thelypteris angustifolia** (Willd.) Proctor

Polypodium scabrum C. Presl = **Thelypteris scabra** (C. Presl) Lellinger
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Polypodium tetragonum Sw. = **Thelypteris tetragona** (Sw.) Small
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Polypodium tetragonum Sw. var. *incompleta* Lindm. = **Thelypteris scabra** (C. Presl) Lellinger
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Polypodium tottum Thunb. = **Thelypteris interrupta** (Willd.) K. Iwats.
Referencias: Ponce, M. M., 1987; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Polypodium triste Kunze = **Thelypteris tristis** (Kunze) R.M. Tryon
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Polypodium viviparum Raddi = **Thelypteris vivipara** (Raddi) C.F. Reed
Referencias: Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002.

Polystichum torresianum Gaudich. = **Macrothelypteris torresiana** (Gaudich.) Ching
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 1987.

Pteris confluens Thunb. = **Thelypteris confluens** (Thunb.) C.V. Morton
Referencias: Tryon, A. F., Tryon, R. M. & Brade, F., 1980.

Pteris interrupta Willd. = **Thelypteris interrupta** (Willd.) K. Iwats.
Referencias: Ponce, M. M., 1987; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Thelypteris Schmidel, nom. cons.

Número de especies: 58, 9 endémicas, 3 introducidas

Thelypteris abbiattii C.F. Reed
Sin.: *Goniopteris burkartii* C. Chr. ex Abbiatti
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 1987, 2007.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tur, N. M. 1825* (LP, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 14800* (MBM)]; PRY[*Jiménez, B. 1783* (BM, CTES, PY)].

Thelypteris achalensis (Hieron.) Abbiatti
Sin.: *Aspidium achalense* Hieron., *Aspidium siambonense* Hieron., *Dryopteris achalensis* (Hieron.) C. Chr., *Dryopteris siambonensis* (Hieron.) C. Chr., *Nephrodium achalense* (Hieron.) Hicken, *Nephrodium argentinum* (Hieron.) Hicken var. *major* Hicken, *Nephrodium siambonense* (Hieron.) Hicken, *Thelypteris siambonensis* (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 1300–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Brown, A. 1345* (LP)].

Thelypteris altitudinis Ponce
Referencias: Ponce, M. M., 1987.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4817* (SI)].

Thelypteris amambayensis (H. Christ) Ponce
Sin.: *Dryopteris amambayensis* H. Christ, *Dryopteris diplazioides* (Desv.) Proctor var. *amambayensis* (H. Christ) Rosenst., *Dryopteris diplazioides* (Desv.) Proctor var. *brevisora* Rosenst., *Dryopteris dutrae* C. Chr. ex Dutra, *Lastrea dutrai* (C. Chr. ex Dutra) Brade, *Thelypteris brevisora* (Rosenst.) Ponce, *Thelypteris dutrae* (C. Chr. ex Dutra) Ponce
Referencias: Ponce, M. M., 2000, 2007; Salino, A. & Semir, J., 2004a.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–400 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1402* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 299* (ICN)]; PRY[*Zardini, E. M. 15794* (MO, PY, UC)].

Thelypteris angustifolia (Willd.) Proctor
Sin.: *Dryopteris angustifolia* (Willd.) Urb., *Meniscium angustifolium* Willd., *Polypodium salicifolium* Vahl, hom. illeg.
Referencias: Ponce, M. M., 2007; Salino, A. & Semir, J., 2004b.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–400 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Foster, M. S. 80-(2)-41* (UC)].

Thelypteris araucariensis Ponce
Referencias: Ponce, M. M., 1995; Salino, A. & Semir, J., 2004a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 900–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dombrowski, L. T. 3451* (PKDC)].

Thelypteris argentina (Hieron.) Abbiatti
Sin.: *Aspidium argentinum* Hieron., *Aspidium conterminum* auct. non Willd., *Aspidium galanderi* Hieron., *Aspidium lorentzii* Hieron., *Dryopteris argentina* (Hieron.) C. Chr., *Dryopteris argentina* (Hieron.) C. Chr. var. *lorentzii* (Hieron.) Osten & Herter, *Dryopteris galanderi* (Hieron.) C. Chr., *Dryopteris lorentzii* (Hieron.) C. Chr., *Lastrea argentina* (Hieron.) Copel., *Lastrea galanderi* (Hieron.) Capurro, *Nephrodium argentinum* (Hieron.) Hicken, *Nephrodium galanderi* (Hieron.) Hicken, *Nephrodium lorentzii* (Hieron.) Hicken, *Thelypteris galanderi* (Hieron.) Abbiatti, *Thelypteris lorentzii* (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Capurro, R. H., 1961; de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L., 1998; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Ponce, M. M., 1987; Rodríguez Ríos, R., 1995.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–3300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(I, III, V, VI, VII, VIII); URY(DUR, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 4662* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 3880* (CONC)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Thelypteris berroi (C. Chr.) C.F. Reed
Sin.: *Cyclosorus berroi* (C. Chr.) Abbiatti, *Dryopteris berroi* C. Chr.

Referencias: Ponce, M. M., 1987, 2007; Salino, A. & Semir, J., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(SCA); PRY(AMA, CON, PAI); URY(RIV, RNO, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Maranta, A. 662* (SI)]; BRA[*Dusén, N. P. 17878* (S, US)]; PRY[*Hassler, E. 11686* (G)]; URY[*Berro, M. B. 5243* (P)].

Thelypteris biformata (Rosenst.) R.M. Tryon
Sin.: *Dryopteris biformata* Rosenst.
Referencias: Ponce, M. M., 1987.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez 1062b* (BAF, LP)].

Thelypteris brasiliensis (C. Chr.) C.V. Morton = **Thelypteris decussata** (L.) Proctor var. **brasiliensis** (C. Chr.) A.R. Sm.
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004.

Thelypteris brevisora (Rosenst.) Ponce = **Thelypteris amambayensis** (H. Christ) Ponce
Referencias: Ponce, M. M., 2000.

Thelypteris browniana Ponce
Referencias: Ponce, M. M., 1987.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 900–3000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Brown, A. 1356* (LP, SI)].

Thelypteris burkartii Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987, 1995; Salino, A. & Semir, J., 2004.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, ERI); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 5644* (SI)]; BRA[*Jürgens, C. s.n.* (UC)].

Thelypteris cabrerae (Weath.) Abbiatti = **Thelypteris confluens** (Thunb.) C.V. Morton
Referencias: Tryon, A. F., Tryon, R. M. & Bradé, F., 1980.

Thelypteris catamarcensis de la Sota = **Thelypteris pachyrhachis** (Kunze ex Mett.) Ching
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Thelypteris cheilanthoides (Kunze) Proctor
Sin.: *Aspidium cheilanthoides* Kunze, *Dryopteris cheilanthoides* (Kunze) C. Chr., *Lastrea cheilanthoides* (Kunze) T. Moore
Referencias: Ponce, M. M., 2007; Salino, A. & Semir, J., 2004a.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 8095* (MBM)].

Thelypteris concinna (Willd.) Ching
Sin.: *Dryopteris concinna* (Willd.) Kuntze, *Dryopteris concinna* (Willd.) Kuntze var. *elongata* (E. Fourn.) C. Chr., *Phegopteris concinna* (Willd.) Fée, *Phegopteris elongata* E. Fourn., *Polypodium concinnum* Willd.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Ponce, M. M., 1987; Salino, A. & Semir, J., 2004a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7476* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 4499* (FCQ, MO)].

Thelypteris confluens (Thunb.) C.V. Morton
Sin.: *Dryopteris cabrerae* Weath., *Lastrea cabrerae* (Weath.) Capurro, *Pteris confluens* Thunb., *Thelypteris cabrerae* (Weath.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987; Tryon, A. F., Tryon, R. M. & Brade, F., 1980.
Hierba terrestre. Perenne. Introducida. 0–100 m.
Países: ARG(BAI, CHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 831* (CTES)].

Thelypteris conspersa (Schrad.) A.R. Sm.
Sin.: *Cyclosorus hickenii* Abbiatti, *Cyclosorus urens* (Rosenst.) Ching, *Dryopteris bangii* C. Chr., *Dryopteris patens* (Sw.) Kuntze var. *decrescens* Rosenst., *Dryopteris urens* Rosenst., *Nephrodium conspersum* Schrad., *Thelypteris hickenii* (Abbiatti) C.F. Reed, *Thelypteris urens* (Rosenst.) C.F. Reed
Referencias: Abbiatti, D., 1964; Ponce, M. M., 1987, 2007; Salino, A. & Semir, J., 2002; Smith, A. R., 1971.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE); URY(MAL, RIV, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1461* (SI)]; BRA[*Jürgens, C. 108* (NY)]; PRY[*Krapovickas, A. 14276* (CTES)]; URY[*Bonifacino, J. M. s.n.* (MVFA)].

Thelypteris decurtata (Link) de la Sota subsp. **decurtata**
Sin.: *Asplenium decurtatum* Kunze, nom. nud., *Asplenium decurtatum* Link, *Athyrium decurtatum* (Kunze) C. Presl, nom. illeg., *Athyrium decurtatum* (Link) Fée
Referencias: de la Sota, E. R., 1983; Ponce, M. M., 1987, 1995, 2007; Salino, A. & Semir, J., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(COA); URY(CLA, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 409a* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 199* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 6702* (G)]; URY[*Arechavaleta, J. s.n.* (SI)].

Thelypteris decurtata (Link) de la Sota subsp. **platensis** (Weath.) de la Sota
Sin.: *Athyrium decurtatum* (Link) Fée var. *platense* Weath.
Referencias: Capurro, R. H., 1961; de la Sota, E. R., 1983; Ponce, M. M., 1987.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(BAI, ERI); URY(CLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19970* (SI)]; URY[*Grela, I. s.n.* (MVJB)].

Thelypteris decussata (L.) Proctor var. **brasiliensis** (C. Chr.) A.R. Sm.
Sin.: *Dryopteris brasiliensis* (C. Chr.) C.V. Morton, *Dryopteris decussata* (L.) Urb. var. *brasiliensis* C. Chr., *Thelypteris brasiliensis* (C. Chr.) C.V. Morton

Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2002, 2004a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Müller, O. s.n.* (S, UC, US)].

Thelypteris dentata (Forssk.) E.P. St. John
Sin.: *Aspidium molle* Sw., *Aspidium violascens* Link, *Cyclosorus dentatus* (Forssk.) Ching, *Cyclosorus dentatus* (Forssk.) Ching var. *violascens* (Link) Abbiatti, *Dryopteris dentata* (Forssk.) C. Chr., *Dryopteris mollis* (Sw.) Hieron., *Nephrodium molle* Jacq., *Polypodium dentatum* Forssk., *Polypodium molle* Jacq., hom. illeg., *Thelypteris dentata* (Forssk.) E.P. St. John var. *violascens* (Link) C.F. Reed
Referencias: Abbiatti, D., 1964; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Ponce, M. M., 1987, 2007; Rodríguez Ríos, R., 1995; Salino, A. & Semir, J., 2002; Smith, A. R., 1971.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI); URY(PAY, RIV, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pozner, R. 483* (CTES, SI)]; BRA[*Leite, J. E. 36* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 13239* (FCQ, MO)]; URY[*Grela, I. s.n.* (MVFA)].

Thelypteris dentata (Forssk.) E.P. St. John var. *violascens* (Link) C.F. Reed = **Thelypteris dentata** (Forssk.) E.P. St. John
Referencias: Smith, A. R., 1971.

Thelypteris dutrae (C. Chr. ex Dutra) Ponce = **Thelypteris amambayensis** (H. Christ) Ponce
Referencias: Ponce, M. M., 2000.

Thelypteris galanderi (Hieron.) Abbiatti = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Thelypteris gardneriana (Baker) C.F. Reed
Sin.: *Dryopteris gardneriana* (Baker) Kuntze, *Dryopteris supralineata* Rosenst., *Nephrodium gardnerianum* Baker
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 900–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3427* (HB, US)].

[Thelypteris gemmulifera (Hieron.) A.R. Sm.]
Sin.: *Dryopteris gemmulifera* Hieron.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Thelypteris glaziovii (H. Christ) C.F. Reed]
Sin.: *Aspidium glaziouvii* H. Christ
Referencias: Ponce, M. M., 1998b.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Thelypteris grandis A.R. Sm. var. **kunzeana** (Hook.) A.R. Sm.
Sin.: *Aspidium abruptum* Kunze, hom. illeg., *Dryopteris oligophylla* Maxon var. *kunzeana* (Hook.) C. Chr., *Nephrodium kunzeanum* Hook., *Thelypteris invisa* (Sw.) Proctor var. *kunzeana* (Hook.) C.V. Morton
Referencias: Ponce, M. M., 1987; Salino, A. & Semir, J., 2002; Smith, A. R., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 450–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7551* (SI)].

Thelypteris hatschbachii A.R. Sm.
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 7106* (US)].

Thelypteris hickenii (Abbiatti) C.F. Reed = **Thelypteris conspersa** (Schrad.) A.R. Sm.
Referencias: Smith, A. R., 1971.

Thelypteris hispidula (Decne.) C.F. Reed
Sin.: *Aspidium hispidulum* Decne., *Cyclosorus quadrangularis* (Fée) Tardieu, *Dryopteris mollis* (Sw.) Hieron. var. *glabrindusiata* (Hieron.) Hassl., *Dryopteris parasitica* (L.) Kuntze var. *glabrindusiata* (Hieron.) Hicken, *Dryopteris parasitica* (L.) Kuntze var. *glandulifera* Rosenst., *Dryopteris quadrangularis* (Fée) Alston, *Nephrodium parasiticum* (L.) Desv. var. *glabrindusiatum* (Hieron.) Hicken, *Nephrodium quadrangulare* Fée, *Thelypteris quadrangularis* (Fée) Schelpe, *Thelypteris quadrangularis* (Fée) Schelpe var. *repens* A.R. Sm.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 1987, 2007; Salino, A. & Semir, J., 2002; Smith, A. R., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, ITA, PAI); URY(PAY, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1659* (SI)]; BRA[*Jürgens, C. 240* (NY)]; PRY[*Schinini, A. 27765* (CTES, SI)]; URY[*Marchesi, E. 27273* (MVFA)].

Thelypteris iguapensis (C. Chr.) Salino
Sin.: *Dryopteris iguapensis* C. Chr.
Referencias: Salino, A., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Luederwaldt s.n.* (BHCB, SPF)].

Thelypteris interrupta (Willd.) K. Iwats.
Sin.: *Aspidium gongylodes* Schkuhr, *Aspidium pohlianum* C. Presl, *Aspidium unitum* Mett., *Cyclosorus gongylodes* (Schkuhr) Link, *Dryopteris gongylodes* (Schkuhr) Kuntze, *Goniopteris macrocladia* Fée, *Nephrodium gongylodes* (Schkuhr) Schott, *Nephrodium unitum* (Mett.) R. Br., *Polypodium tottum* Thunb., *Pteris interrupta* Willd., *Thelypteris totta* (Thunb.) Schelpe
Referencias: Ponce, M. M., 1987, 2007; Rodríguez Ríos, R., 1995; Salino, A. & Semir, J., 2002; Smith, A. R., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(III); PRY(APA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE); URY(RNO).

Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 4896* (SI)]; BRA[*Leite, J. E. 2376* (NY)]; PRY[*Morrone, O. 84* (FCQ, MO)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

[Thelypteris invisa (Sw.) Proctor]
Sin.: *Aspidium invisum* Sw.
Referencias: Ponce, M. M., 1987.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Thelypteris invisa (Sw.) Proctor var. *kunzeana* (Hook.) C.V. Morton = **Thelypteris grandis** A.R. Sm. var. **kunzeana** (Hook.) A.R. Sm.
Referencias: Smith, A. R., 1992.

Thelypteris juergensii (Rosenst.) C.F. Reed
Sin.: *Nephrodium juergensii* Rosenst., *Thelypteris platensis* Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987, 1995.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Priestap 1370* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 5643* (PACA)].

Thelypteris jujuyensis de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Ponce, M. M., 1987.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–2300 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ezcurra, C. 450a* (SI)].

Thelypteris leprieurii (Hook.) R.M. Tryon
Sin.: *Nephrodium leprieurii* Hook.
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Ponce, M. M., 2007; Salino, A. & Semir, J., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–600 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jiménez, B. 1628* (BM, CTES, MO, PY)].

Thelypteris longifolia (Desv.) R.M. Tryon
Sin.: *Dryopteris reticulata* (L.) Urb. var. *longifolia* (Desv.) Rosenst., *Meniscium longifolium* Desv.
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10159* (US)].

Thelypteris longifolia (Desv.) R.M. Tryon f. *glandulosa* (Maxon & C.V. Morton) C.V. Morton = **Thelypteris maxoniana** A.R. Sm.

Thelypteris lorentzii (Hieron.) Abbiatti = **Thelypteris argentina** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Thelypteris lugubris (Mett.) R.M. Tryon & A.F. Tryon
Sin.: *Aspidium lugubre* Mett.
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Ponce, M. M., 2007.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–900 m.
Países: PRY(AMA, CAN, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 13370* (CTES, G)].

Thelypteris maxoniana A.R. Sm.
Sin.: *Dryopteris desvauxii* Mett. f. *glandulosa* Maxon & C.V. Morton, *Thelypteris longifolia* (Desv.) R.M. Tryon f. *glandulosa* (Maxon & C.V. Morton) C.V. Morton
Referencias: Salino, A. & Semir, J., 2004b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 54108* (C, MBM)].

Thelypteris metteniana Ching
Sin.: *Aspidium palustre* Mez ex Fée, hom. illeg., *Dryopteris palustris* (Mett.) Kuntze, *Dryopteris palustris* (Mett.) Kuntze var. *uruguayensis* D. Legrand, *Lastrea mettenii* Copel., *Nephrodium palustre* Mett. ex Baker, *Thelypteris mettenii* (Copel.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987, 1995, 2007; Salino, A. & Semir, J., 2004a.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–600 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 1537* (BAB, SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 430c* (HBR)]; PRY[*Schinini, A. 27098* (CTES, G)].

Thelypteris mettenii (Copel.) Abbiatti = **Thelypteris metteniana** Ching
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Thelypteris mosenii (C. Chr.) C.F. Reed
Sin.: *Dryopteris hassleri* H. Christ, *Dryopteris mosenii* C. Chr., *Dryopteris rojasii* H. Christ, *Lastrea mosenii* (C. Chr.) Copel.
Referencias: Ponce, M. M., 1998b; Salino, A. & Semir, J., 2004a.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–500 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 27098* (G)].

Thelypteris nubicola de la Sota
Referencias: de la Sota, E. R., 1977; Ponce, M. M., 1987.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–2500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 2957* (SI)].

[Thelypteris oligocarpa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching var. oligocarpa]
Sin.: *Dryopteris oligocarpa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze, *Polypodium oligocarpum* Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Ponce, M. M., 1987; Salino, A. & Semir, J., 2004a.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Thelypteris oligocarpa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching var. **crassistipitata** (Hieron.) C.F. Reed
Sin.: *Aspidium oligocarpum* (Willd.) Kunth var. *crassistipitatum* Hieron., *Dryopteris oligocarpa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze var. *crassistipitata* (Hieron.) Hicken, *Nephrodium oligocarpum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Desv. var. *crassistipitatum* (Hieron.) Hicken

Referencias: Ponce, M. M., 1987, 1998b.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–2500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 2910 1/2* (SI)].

Thelypteris opposita (Vahl) Ching
Sin.: *Dryopteris opposita* (Vahl) Urb., *Lastrea opposita* (Vahl) C. Presl, *Polypodium oppositum* Vahl
Referencias: Ponce, M. M., 1995, 2007; Salino, A. & Semir, J., 2004a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CAA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dombrowski, L. T. 5235* (PKDC)]; PRY[*Solomon, J. C. 6908* (MO, PY)].

Thelypteris pachyrhachis (Kunze ex Mett.) Ching
Sin.: *Aspidium pachyrhachis* Kunze ex Mett., *Dryopteris opposita* (Vahl) Urb. f. *major* Rosenst., *Dryopteris riopardensis* Rosenst., *Lastrea pachyrhachis* (Kunze ex Mett.) T. Moore, *Lastrea riopardensis* (Rosenst.) Copel., *Thelypteris catamarcensis* de la Sota
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 1987, 1995, 2007; Salino, A. & Semir, J., 2004a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Brown, A. 2001* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 13079* (HBR)]; PRY[*Marín, G. 349* (CTES)].

Thelypteris paranaensis Salino
Referencias: Salino, A., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Salino, A. 1459* (BHCB, MBM, UC, UEC)].

Thelypteris patens (Sw.) Small var. **dissimilis** (Schrad.) A.R. Sm.
Sin.: *Aspidium nephrodioides* Fée, hom. illeg., *Nephrodium dissimile* Schrad.
Referencias: Ponce, M. M., 1987, 2007; Salino, A. & Semir, J., 2002; Smith, A. R., 1971.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 576* (SI)]; BRA[*Jürgens, C. 307* (NY)]; PRY[*Krapovickas, A. 15746* (CTES, LP, MO)].

Thelypteris patens (Sw.) Small var. **patens**
Sin.: *Aspidium macrourum* Kaulf., *Aspidium patens* (Sw.) Sw., *Aspidium stipulare* Willd., *Dryopteris patens* (Sw.) Kuntze, *Dryopteris patens* (Sw.) Kuntze var. *scabriuscula* (C. Presl) C. Chr., *Dryopteris patens* (Sw.) Kuntze var. *stipulare* (Willd.) Desv., *Dryopteris stipulare* (Willd.) Kuntze, *Lastrea scabriuscula* C. Presl, *Nephrodium patens* (Sw.) Desv., *Nephrodium stipulare* (Sw.) Desv., *Polypodium patens* Sw., *Thelypteris patens* (Sw.) Small var. *scabriuscula* (C. Presl) A.R. Sm.
Referencias: Ponce, M. M., 1987, 2007; Salino, A. & Semir, J., 2002; Smith, A. R., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–1500 m.
Países: ARG(SAL); BRA(RGS, SCA); PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 2762* (SI)]; BRA[*Leite, J. E. 3045* (NY)]; PRY[*Woolston, A. L. 704* (UC)].

Thelypteris patens (Sw.) Small var. *scabriuscula* (C. Presl) A.R. Sm. = **Thelypteris patens** (Sw.) Small var. **patens**
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Thelypteris patens (Sw.) Small var. **smithiana** Ponce
Referencias: Ponce, M. M., 1987, 2007; Salino, A. & Semir, J., 2002; Smith, A. R., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC); PRY(GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7531* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 5226* (G, MO, PY)].

Thelypteris platensis Abbiatti = **Thelypteris juergensii** (Rosenst.) C.F. Reed

Thelypteris pleiophylla (Sehnem) Ponce
Referencias: Ponce, M. M., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kummrow, R. 327* (MBM)].

Thelypteris podotricha (Sehnem) Ponce
Sin.: *Dryopteris podotricha* Sehnem
Referencias: Ponce, M. M., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 7648* (PACA)].

Thelypteris ptarmica (Kunze ex Mett.) C.F. Reed var. **asplenioides**
Sin.: *Ceterach aspidioides* Raddi, *Dryopteris ptarmica* (Kunze ex Mett.) Kuntze f. *asplenioides* (Sw.) C. Chr., *Gymnogramma asplenioides* Sw.
Referencias: Ponce, M. M., 1995; Salino, A. & Semir, J., 2004a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 17912* (MBM, PACA)].

Thelypteris ptarmica (Kunze ex Mett.) C.F. Reed var. **ptarmica**
Sin.: *Aspidium ptarmicum* Kunze ex Mett., *Dryopteris ptarmica* (Kunze ex Mett.) Kuntze, *Lastrea ptarmica* (Kunze ex Mett.) T. Moore, *Nephrodium ptarmicum* (Kunze ex Mett.) Baker
Referencias: Ponce, M. M., 1995; Salino, A. & Semir, J., 2004a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 47184* (UC)].

Thelypteris quadrangularis (Fée) Schelpe = **Thelypteris hispidula** (Decne.) C.F. Reed
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 1987.

Thelypteris quadrangularis (Fée) Schelpe var. *repens* A.R. Sm. = **Thelypteris hispidula** (Decne.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Thelypteris raddii (Rosenst.) Ponce
Sin.: *Dryopteris raddii* Rosenst., *Dryopteris retusa* (Sw.) C. Chr. f. *denticulata* Rosenst., *Dryopteris retusa* (Sw.) C. Chr. var. *austrobrasiliensis* Rosenst., *Polypodium pubescens* Raddi
Referencias: Ponce, M. M., 1995; Salino, A. & Semir, J., 2004a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 33399* (MBM, UC)].

Thelypteris recumbens (Rosenst.) C.F. Reed
Sin.: *Dryopteris recumbens* Rosenst., *Dryopteris recumbens* Rosenst. var. *violacea* Rosenst., *Lastrea recumbens* (Rosenst.) Copel.
Referencias: Ponce, M. M., 1987, 1995, 2007.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 5862* (CTES, SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 16375* (MBM)]; PRY[*Schinini, A. 27046* (CTES, G)].

Thelypteris regnelliana (C. Chr.) Ponce
Sin.: *Dryopteris regnelliana* C. Chr., *Lastrea regnelliana* (C. Chr.) Brade
Referencias: Ponce, M. M., 1995, 1998a; Salino, A. & Semir, J., 2004a.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–1500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1373* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 32616* (MBM, UC)].

Thelypteris retusa (Sw.) C.F. Reed
Sin.: *Dryopteris retusa* (Sw.) C. Chr., *Lastrea retusa* (Sw.) Copel., *Polypodium retusum* Sw.
Referencias: Ponce, M. M., 1995; Salino, A. & Semir, J., 2004a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dombrowski, L. T. 5135* (PKDC)].

Thelypteris riograndensis (Lindm.) C.F. Reed
Sin.: *Aspidium refractum* auct. non Kunze, *Dryopteris riograndensis* (Lindm.) C. Chr., *Goniopteris riograndensis* (Lindm.) Ching, *Polypodium riograndensis* Lindm.
Referencias: Capurro, R. H., 1961; Ponce, M. M., 1987, 2007.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, ERI, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CAA, COA, GUA, PAI); URY(CLA, COL, MAL, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 5720* (CTES, SI)]; BRA[*Leite, J. E. 37* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 7791* (FCQ, UC)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Thelypteris rioverdensis (C. Chr.) Ponce
Sin.: *Dryopteris rioverdensis* C. Chr., *Lastrea rioverdensis* (C. Chr.) Brade
Referencias: Ponce, M. M., 1998b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hertel, R. 814* (PKDC)].

Thelypteris rivularioides (Fée) Abbiatti
Sin.: *Aspidium arechavaletae* Hieron., *Aspidium pseudomontanum* Hieron., *Aspidium rivularioides* Fée, *Dryopteris arechavaletae* (Hieron.) C. Chr., *Dryopteris pseudomontana* (Hieron.) C. Chr., *Dryopteris pseudothelypteris* (Rosenst.) C. Chr., *Dryopteris rivularioides* (Fée) C. Chr. ex Rosenst., *Dryopteris rivularioides* (Fée) C. Chr. ex Rosenst. var. *arechavaletae* (Hieron.) C. Chr., *Dryopteris rivularioides* (Fée) C. Chr. ex Rosenst. var. *crenata* (Rosenst.) Rosenst., *Dryopteris sinuata* Sehnem, *Lastrea rivularioides* (Fée) Copel. var. *arechavaletae* (Hieron.) Capurro, *Nephrodium pseudomontanum* (Hieron.) Rosenst., *Nephrodium pseudothelypteris* Rosenst., *Nephrodium pseudothelypteris* Rosenst. var. *crenata* Rosenst., *Thelypteris rivularioides* (Fée) Abbiatti var. *arechavaletae* (Hieron.) Abbiatti, *Thelypteris rivularioides* (Fée) Abbiatti var. *pseudomontana* (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 1987, 1995, 2007; Salino, A. & Semir, J., 2004a; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, MIE, PAI); URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, RIV, RNO, ROC, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2957* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 36* (ICN)]; PRY[*Peña-Chocarro, M. C. 335* (BM, CTES, MO, PY)]; URY[*Grela, I. s.n.* (MVFA)].

Thelypteris rivularioides (Fée) Abbiatti var. *arechavaletae* (Hieron.) Abbiatti = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Thelypteris rivularioides (Fée) Abbiatti var. *pseudomontana* (Hieron.) Abbiatti = **Thelypteris rivularioides** (Fée) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Thelypteris salzmannii (Fée) C.V. Morton
Sin.: *Meniscium salzmannii* Fée
Referencias: Ponce, M. M., 2007; Salino, A. & Semir, J., 2004b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: PRY(CAU, CAA, COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 20506* (MO)].

Thelypteris sanctae-catharinae (Rosenst.) Ponce
Sin.: *Dryopteris sanctae-catharinae* Rosenst., *Dryopteris scariosa* Rosenst., *Lastrea sanctae-catharinae* (Rosenst.) Brade, *Lastrea scariosa* Rosenst., *Thelypteris scariosa* (Rosenst.) C.F. Reed
Referencias: Ponce, M. M., 1995, 1998a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2821* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 5514* (PACA)].

Thelypteris scabra (C. Presl) Lellinger
Sin.: *Aspidium caesariaum* H. Christ, *Dryopteris pseudotetragona* Urb. f. *major* Rosenst., *Dryopteris pseudotetragona* Urb. var. *foecunda* Rosenst., *Dryopteris pseudotetragona* Urb. var. *gemmulifera* Hieron. ex Rosenst., *Dryopteris scabra* (C. Presl) C. Chr., *Dryopteris scabra* (C. Presl) C. Chr. var. *caesariana* (H. Christ) C. Chr., *Dryopteris scabra* (C. Presl) C. Chr. var. *incompleta* (Lindm.) C. Chr., *Lastrea scabra* (C. Presl) C. Presl, *Nephrodium etchichury* Hicken, *Polypodium scabrum* C. Presl, *Polypodium tetragonum* Sw. var. *incompleta* Lindm.
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 1987, 2007; Stutz, L. C., 1983.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, AMA, CAN, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6687* (SI)]; BRA[*Leite, J. E. 730* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 11463* (MO)].

Thelypteris scariosa (Rosenst.) C.F. Reed = **Thelypteris sanctae-catharinae** (Rosenst.) Ponce

Thelypteris serrata (Cav.) Alston
Sin.: *Dryopteris serrata* (Cav.) C. Chr., *Meniscium serratum* Cav., *Nephrodium serratum* (Cav.) Keyserl., comb. superfl.
Referencias: Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 1987, 2007; Salino, A. & Semir, J., 2004b; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL); BRA(SCA); PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CON, COA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 13390* (CTES)]; BRA[*Rohr, J. A. 1016* (NY)]; PRY[*Peña-Chocarro, M. C. 286* (BM)].

Thelypteris siambonensis (Hieron.) Abbiatti = **Thelypteris achalensis** (Hieron.) Abbiatti
Referencias: Ponce, M. M., 1987.

Thelypteris stierii (Rosenst.) C.F. Reed
Sin.: *Dryopteris stierii* (Rosenst.) C. Chr., *Gymnogramma stierii* Rosenst., *Lastrea stierii* (Rosenst.) Copel.
Referencias: Ponce, M. M., 1987, 1995, 2007; Salino, A. & Semir, J., 2004a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(COS, ERI, JUJ, SAL); BRA(RGS); PRY(CON); URY(PAY, RNO, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7842* (SI)]; BRA[*Jürgens, C. 175* (ICN, NY, UC)]; PRY[*Hassler, E. 11071* (G)]; URY[*Bonifacino, J. M. s.n.* (MVFA)].

Thelypteris tenerrima (Fée) C.F. Reed
Sin.: *Aspidium elatior* Fée, *Aspidium tenerrimum* Fée, *Dryopteris tenerrima* (Fée) Rosenst., *Lastrea tenerrima* (Fée) Copel.
Referencias: Ponce, M. M., 1995.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 6308* (PACA)].

Thelypteris tetragona (Sw.) Small
Sin.: *Dryopteris tetragona* (Sw.) Urb., nom. illeg., *Goniopteris tetragona* (Sw.) C. Presl, *Nephrodium tetragonum* (Sw.) Keyserl., nom. illeg., *Polypodium tetragonum* Sw.
Referencias: Ponce, M. M., 1987.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 192* (SI)].

Thelypteris torresiana (Gaudich.) Alston = **Macrothelypteris torresiana** (Gaudich.) Ching
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Ponce, M. M., 1987.

Thelypteris totta (Thunb.) Schelpe = **Thelypteris interrupta** (Willd.) K. Iwats.
Referencias: Ponce, M. M., 1987; Rodríguez Ríos, R., 1995.

Thelypteris tristis (Kunze) R.M. Tryon
Sin.: *Polypodium triste* Kunze
Referencias: Ponce, M. M., 1987.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Capurro, R. H. 328* (SI)].

Thelypteris urens (Rosenst.) C.F. Reed = **Thelypteris conspersa** (Schrad.) A.R. Sm.
Referencias: Smith, A. R., 1971.

Thelypteris vattuonei (Hicken) Abbiatti
Sin.: *Dryopteris vattuonei* Hicken
Referencias: Ponce, M. M., 1987.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ezcurra, C. 401* (SI)].

Thelypteris vivipara (Raddi) C.F. Reed
Sin.: *Polypodium viviparum* Raddi
Referencias: Mynssen, C. M., Sylvestre, L. S. & Andreata, R. H. P., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Luederwaldt, H. 646* (NY)].

VITTARIACEAE

Autores: Labiak, P. H., Ponce, M. M. & de la Sota, E. R.
Revisor: Prado, J.

5 géneros, 8 especies.

Acrostichum citrifolium L. = **Anetium citrifolium** (L.) Splitg.

Anetium (Kunze) Splitg.

Número de especies: 1

Anetium citrifolium (L.) Splitg.
Sin.: *Acrostichum citrifolium* L.
Referencias: Sehnem, A., 1967b.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Schmalz, P. s.n.* (SI)].

Antrophyum brasilianum (Desv.) C. Chr. = **Polytaenium cajenense** (Desv.) Benedict

Antrophyum cajenense (Desv.) Spreng. = **Polytaenium cajenense** (Desv.) Benedict

Antrophyum lineatum (Sw.) Kaulf. = **Polytaenium lineatum** (Sw.) Sm.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Gymnogramma pumila Spreng. = **Hecistopteris pumila** (Spreng.) J. Sm.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998.

Hecistopteris J. Sm.

Número de especies: 1

Hecistopteris pumila (Spreng.) J. Sm.
Sin.: *Gymnogramma pumila* Spreng.
Referencias: Crane, E. H., 1997; Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Sehnem, A., 1967b.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 87* (SP, UPCB)].

Hemionitis brasiliana Desv. = **Polytaenium cajenense** (Desv.) Benedict

Hemionitis cajenensis Desv. = **Polytaenium cajenense** (Desv.) Benedict

Hemionitis lineata Sw. = **Polytaenium lineatum** (Sw.) Sm.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Polytaenium Desv.

Número de especies: 2

Polytaenium brasilianum (Desv.) Benedict = **Polytaenium cajenense** (Desv.) Benedict

Polytaenium cajenense (Desv.) Benedict
Sin.: *Antrophyum brasilianum* (Desv.) C. Chr., *Antrophyum cajenense* (Desv.) Spreng., *Hemionitis brasiliana* Desv., *Hemionitis cajenensis* Desv., *Polytaenium brasilianum* (Desv.) Benedict
Referencias: Benedict, R. C., 1907, 1911; Labiak, P. H. & Prado, J., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 250* (MBM, SP, UPCB)].

Polytaenium lanceolatum (Sw.) Desv. = **Polytaenium lineatum** (Sw.) Sm.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Polytaenium lineatum (Sw.) Sm.
Sin.: *Antrophyum lineatum* (Sw.) Kaulf., *Hemionitis lineata* Sw., *Polytaenium lanceolatum* (Sw.) Desv., *Vittaria lanceolata* Sw.
Referencias: Capurro, R. H., 1940[1938]; de la Sota, E. R., 1977; Sehnem, A., 1967b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 176* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 669* (ICN)]; PRY[*Hassler, E. 10246* (BM)].

Pteris lineata L. = **Vittaria lineata** (L.) Sm.
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999.

Radiovittaria (J.E. Benedict) E.H. Crane

Número de especies: 1

Radiovittaria stipitata (Kunze) E.H. Crane
Sin.: *Vittaria stipitata* Kunze
Referencias: Crane, E. H., 1997; Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Sehnem, A., 1967b.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 62* (SP, UPCB)].

Vittaria Sm.

Número de especies: 3

Vittaria graminifolia Kaulf.
Sin.: *Vittaria lineata* (L.) Sm. var. *graminifolia* (Kaulf.) Rosenst.
Referencias: Crane, E. H., 1997; Hassler, E., 1928; Sehnem, A., 1967b.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CLA, LAV, MAL, RIV, ROC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 10196* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 11372* (G)]; URY[*Berro, M. B. 5832* (MVFA)].

Vittaria lanceolata Sw. = **Polytaenium lineatum** (Sw.) Sm.
Referencias: de la Sota, E. R., 1977.

Vittaria lineata (L.) Sm.
Sin.: *Pteris lineata* L.
Referencias: Crane, E. H., 1997; Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S., 1999; Sehnem, A., 1967b; de la Sota, E. R., Martínez, O. G. & Ganem, M. A., 1999.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAN, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 641* (SI)]; BRA[*Labiak, P. H. 115* (SP, UPCB)]; PRY[*Jiménez, B. 176* (PY)].

Vittaria lineata (L.) Sm. var. *graminifolia* (Kaulf.) Rosenst. = **Vittaria graminifolia** Kaulf.

Vittaria scabrida Klotzsch ex Fée
Referencias: Labiak, P. H. & Prado, J., 1998; Sehnem, A., 1967b.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Labiak, P. H. 268* (SP, UPCB)]; PRY[*Balansa, B. 377* (BM)].

Vittaria stipitata Kunze = **Radiovittaria stipitata** (Kunze) E.H. Crane
Referencias: Crane, E. H., 1997.

Gymnospermae

ARAUCARIACEAE

1 género, 2 especies, 1 especie endémica.

Araucaria Juss.

Número de especies: 2, 1 endémica

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze f. **catharinensis** Mattos
Referencias: Mattos, J. R., 1972.
Árbol. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Mattos, J. R. 12696* (SP)].

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze f. *monoica* Reitz & Klein = **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze var. **angustifolia**
Referencias: Mattos, J. R., 1972.

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze var. **alba** Reitz
Referencias: Mattos, J. R., 1972; Reitz, R. & Klein, J. T., 1966.
Árbol. Endémica. 600–1100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Cappeller, P. H. s.n.* (HBR)].

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze var. **angustifolia**
Sin.: *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze f. *monoica* Reitz & Klein, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *elegans* (Hort ex Carrière) Reitz & Klein, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *nigra* Reitz & Klein, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *sancti-josephi* Reitz & Klein, *Araucaria bibbiana* Gordon, *Araucaria brasiliana* A. Rich., *Araucaria brasiliana* A. Rich. var. *elegans* (Hort ex Carrière) L.H. Bailey & Raffill, *Araucaria brasiliensis* Loudon, *Araucaria brasiliensis* Loudon var. *saviana* (Parl.) DC., *Araucaria dioica* (Vell.) Stellfeld, *Araucaria elegans* Hort ex Carrière, *Araucaria gracilis* Hort ex Carrière, *Araucaria lindleyana* Gordon, *Araucaria ridolfiana* Savi, *Araucaria saviana* Parl., *Columena angustifolia* Bertol., *Pinus dioica* Vell.
Referencias: Behling, H., 2000; Covas, G., 1939a, 1995b; Francischetti Garcia, R. J., 2002; Mattos, J. R., 1972; Reitz, R. & Klein, J. T., 1966; Vidakovic, M., 1991.
Árbol. Nativa. 700–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 4944* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 15442* (HBR)].

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze var. **caiova** Reitz & Klein
Sin.: *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *caiuva* Mattos, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *semi-alba* Reitz & Klein
Referencias: Mattos, J. R., 1972; Reitz, R. & Klein, J. T., 1966.
Árbol. Endémica. 700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 13090* (HBR)].

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze var. *caiuva* Mattos = **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze var. **caiova** Reitz & Klein
Referencias: Mattos, J. R., 1972.

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze var. *elegans* (Hort ex Carrière) Reitz & Klein = **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze var. **angustifolia**
Referencias: Mattos, J. R., 1972.

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze var. **indehiscens** Mattos
Referencias: Mattos, J. R., 1972; Reitz, R. & Klein, J. T., 1966.
Árbol. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Leontino, J. s.n.* (SP)].

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze var. *nigra* Reitz & Klein = **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze var. **angustifolia**
Referencias: Mattos, J. R., 1972.

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze var. *sancti-josephi* Reitz & Klein = **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze var. **angustifolia**
Referencias: Mattos, J. R., 1972.

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze var. *semi-alba* Reitz & Klein = **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze var. **caiova** Reitz & Klein
Referencias: Mattos, J. R., 1972.

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze var. **striata** Reitz
Referencias: Mattos, J. R., 1972; Reitz, R. & Klein, J. T., 1966.
Árbol. Endémica. 900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 13227* (HBR)].

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze var. **vinacea** Mattos
Referencias: Mattos, J. R., 1997.
Árbol. Endémica. 500–1100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Mattos, J. R. 32410* (FLOR)].

Araucaria araucana (Molina) K. Koch
Sin.: *Araucaria chilensis* Mirb., *Araucaria dombeyi* Rich., *Araucaria imbricata* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Dombeya chilensis* Lam., *Pinus araucana* Molina

Referencias: Barrett, W. H., 1998; Covas, G., 1939a, 1995b; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995; Vidakovic, M., 1991.
Árbol. Endémica. 600–1700 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 14149* (CTES, SI)]; CHL[*Burkart, A. 9472* (SI)].

Araucaria bibbiana Gordon = **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze var. **angustifolia**
Referencias: Mattos, J. R., 1972; Reitz, R. & Klein, J. T., 1966.

Araucaria brasiliana A. Rich. = **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze var. **angustifolia**
Referencias: Mattos, J. R., 1972.

Araucaria brasiliana A. Rich. var. *elegans* (Hort ex Carrière) L.H. Bailey & Raffill = **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze var. **angustifolia**
Referencias: Mattos, J. R., 1972.

Araucaria brasiliensis Loudon = **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze var. **angustifolia**
Referencias: Mattos, J. R., 1972; Reitz, R. & Klein, J. T., 1966.

Araucaria brasiliensis Loudon var. *saviana* (Parl.) DC. = **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze var. **angustifolia**
Referencias: Mattos, J. R., 1972; Reitz, R. & Klein, J. T., 1966.

Araucaria chilensis Mirb. = **Araucaria araucana** (Molina) K. Koch
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

Araucaria dioica (Vell.) Stellfeld = **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze var. **angustifolia**
Referencias: Mattos, J. R., 1972; Reitz, R. & Klein, J. T., 1966.

Araucaria dombeyi Rich. = **Araucaria araucana** (Molina) K. Koch
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

Araucaria elegans Hort ex Carrière = **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze var. **angustifolia**
Referencias: Mattos, J. R., 1972.

Araucaria gracilis Hort ex Carrière = **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze var. **angustifolia**
Referencias: Mattos, J. R., 1972.

Araucaria imbricata Ruiz & Pav., nom. illeg. = **Araucaria araucana** (Molina) K. Koch
Referencias: Covas, G., 1939a; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

Araucaria lindleyana Gordon = **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze var. **angustifolia**
Referencias: Mattos, J. R., 1972; Reitz, R. & Klein, J. T., 1966.

Araucaria ridolfiana Savi = **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze var. **angustifolia**
Referencias: Mattos, J. R., 1972; Reitz, R. & Klein, J. T., 1966.

Araucaria saviana Parl. = **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze var. **angustifolia**
Referencias: Mattos, J. R., 1972; Reitz, R. & Klein, J. T., 1966.

Columbea angustifolia Bertol. = **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze var. **angustifolia**
Referencias: Covas, G., 1939a; Mattos, J. R., 1972.

Dombeya chilensis Lam. = **Araucaria araucana** (Molina) K. Koch
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

Pinus araucana Molina = **Araucaria araucana** (Molina) K. Koch
Referencias: Barrett, W. H., 1998; Covas, G., 1939a; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

Pinus dioica Vell. = **Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze var. **angustifolia**
Referencias: Mattos, J. R., 1972; Reitz, R. & Klein, J. T., 1966.

CUPRESSACEAE

4 géneros, 4 especies, 3 especies endémicas, 1 especie introducida.

Austrocedrus Florin & Boutelje

Número de especies: 1 endémica

Austrocedrus chilensis (D. Don) Florin & Boutelje, nom. illeg. = **Austrocedrus chilensis** (D. Don) Pic. Serm. & Bizzarri
Referencias: Pichi Sermolli, R. E. G. & Bizarri, M. P., 1978; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

Austrocedrus chilensis (D. Don) Pic. Serm. & Bizzarri
Sin.: *Austrocedrus chilensis* (D. Don) Florin & Boutelje, nom. illeg., *Libocedrus chilensis* (D. Don) Endl., *Thuja andina* Poepp. & Endl., *Thuja chilensis* D. Don, *Thuja chilensis* Hook.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Barrett, W. H., 1998; Castor, C., Cuevas, J. G., Arroyo, M. T. K., Rafii, Z., Dodd, R. & Peñaloza, A., 1996; Pichi Sermolli, R. E. G. & Bizarri, M. P., 1978; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995; Vidakovic, M., 1991.

Árbol. Endémica. 900–1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26451* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 994941* (CONC)].

Fitzroya Hook. f. ex Lindl.

Número de especies: 1 endémica

Fitzroya cupressoides (Molina) I.M. Johnst.
Sin.: *Fitzroya patagonica* Hook. f. ex Lindl., nom. illeg., *Libocedrus cupressoides* (Molina) Kuntze, *Pinus cupressoides* Molina
Referencias: Barrett, W. H., 1998; Covas, G., 1939a, 1995c; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.
Árbol. Endémica. 0–1400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Mazzuconi, V. 1313* (BAB)]; CHL[*Gentry, A. H. 53500* (MO), *Hicken, C. M. s.n.* (SI)].

Fitzroya patagonica Hook. f. ex Lindl., nom. illeg. = **Fitzroya cupressoides** (Molina) I.M. Johnst.
Referencias: Barrett, W. H., 1998; Covas, G., 1939a; Devoto, F. E. & Rothkugel, M., 1942; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

Juniperus L.

Número de especies: 1 introducida

Juniperus communis L.
Referencias: Ezcurra, C. & Brion, C. A. M., 2005.
Arbusto. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rechencq, F. 158-a* (BCRU)].

Juniperus uvifera D. Don = **Pilgerodendron uviferum** (D. Don) Florin
Referencias: Barrett, W. H., 1998; Covas, G., 1939a; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

Libocedrus chilensis (D. Don) Endl. = **Austrocedrus chilensis** (D. Don) Pic. Serm. & Bizzarri
Referencias: Barrett, W. H., 1998; Pichi Sermolli, R. E. G. & Bizarri, M. P., 1978; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

Libocedrus cupressoides (Molina) Kuntze = **Fitzroya cupressoides** (Molina) I.M. Johnst.
Referencias: Covas, G., 1939a; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

Libocedrus tetragona (Hook.) Endl. = **Pilgerodendron uviferum** (D. Don) Florin
Referencias: Barrett, W. H., 1998; Covas, G., 1939a; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

Libocedrus uvifera (D. Don) Pilg. = **Pilgerodendron uviferum** (D. Don) Florin
Referencias: Barrett, W. H., 1998; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

Pilgerodendron Florin

Número de especies: 1 endémica

Pilgerodendron uviferum (D. Don) Florin
Sin.: *Juniperus uvifera* D. Don, *Libocedrus tetragona* (Hook.) Endl., *Libocedrus uvifera* (D. Don) Pilg., *Thuja tetragona* Hook.
Referencias: Barrett, W. H., 1998; Covas, G., 1995c; Moore, D. M., 1974; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995; Vidakovic, M., 1991.
Árbol. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guerrido, C. 146* (SI), *Soriano, A. 4290* (BAB)]; CHL[*Gentry, A. H. 53501* (MO), *Junge, C. 35* (SI)].

Pinus cupressoides Molina = **Fitzroya cupressoides** (Molina) I.M. Johnst.
Referencias: Barrett, W. H., 1998; Covas, G., 1939a; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

Thuja andina Poepp. & Endl. = **Austrocedrus chilensis** (D. Don) Pic. Serm. & Bizzarri
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995; Vidakovic, M., 1991.

Thuja chilensis D. Don = **Austrocedrus chilensis** (D. Don) Pic. Serm. & Bizzarri
Referencias: Barrett, W. H., 1998; Pichi Sermolli, R. E. G. & Bizarri, M. P., 1978; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

Thuja chilensis Hook. = **Austrocedrus chilensis** (D. Don) Pic. Serm. & Bizzarri
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

Thuja tetragona Hook. = **Pilgerodendron uviferum** (D. Don) Florin
Referencias: Covas, G., 1995c.

EPHEDRACEAE

1 género, 12 especies, 8 especies endémicas.

Ephedra L.

Número de especies: 12, 8 endémicas

Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd.
Sin.: *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *humboldtii* Stapf, p.p.
Referencias: Hunziker, J. H., 1949, 1995.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. 493* (SI), *Deginani, N. B. 456* (SI)].

Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *andina* (Poepp. ex C.A. Mey.) Stapf = **Ephedra chilensis** C. Presl
Referencias: Hunziker, J. H., 1949; Matthei, O. R., 1995a; Xifreda, C. C. & Hunziker, J. H., 1988[1987].

Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *humboldtii* Stapf, p.p. = **Ephedra americana** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Hunziker, J. H., 1949.

Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *humboldtii* Stapf, p.p. = **Ephedra breana** Phil.
Referencias: Hunziker, J. H., 1949; Matthei, O. R., 1995a.

Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *rupestris* (Benth.) Ball = **Ephedra rupestris** Benth.
Referencias: Hunziker, J. H., 1949; Matthei, O. R., 1995a.

Ephedra andina Poepp. ex C.A. Mey. = **Ephedra chilensis** C. Presl
Referencias: Hunziker, J. H., 1949; Matthei, O. R., 1995a; Xifreda, C. C. & Hunziker, J. H., 1988[1987].

Ephedra andina Poepp. ex C.A. Mey. f. *abbreviata* Stapf = **Ephedra chilensis** C. Presl
Referencias: Hunziker, J. H., 1949; Matthei, O. R., 1995a; Xifreda, C. C. & Hunziker, J. H., 1988[1987].

Ephedra araucana Phil. = **Ephedra chilensis** C. Presl
Referencias: Matthei, O. R., 1995a.

Ephedra boelckei F.A. Roig
Referencias: Hunziker, J. H., 1995; Roig, F. A., 1984.
Arbusto o arbolito. Endémica. 100–600 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 11255* (SI)].

Ephedra bracteata Miers = **Ephedra chilensis** C. Presl
Referencias: Hunziker, J. H., 1949; Matthei, O. R., 1995a; Xifreda, C. C. & Hunziker, J. H., 1988[1987].

Ephedra breana Phil.
Sin.: *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *humboldtii* Stapf, p.p., *Ephedra wraithiana* Johnst.
Referencias: Hunziker, J. H., 1949, 1995; Matthei, O. R., 1995a.
Arbusto. Nativa. 500–4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 15058* (SI), *Zuloaga, F. O. 3706* (SI)]; CHL[*Arancio, G. 10494* (ULS), *Johnston, I. M. 4705* (BA, SI), *Johnston, I. M. 4865* (BA, SI), *Larrañaga, A. s.n.* (SGO, SI), *Werdermann, E. 1031* (SI)].

Ephedra chilense Miers, hom. illeg. = **Ephedra chilensis** C. Presl
Referencias: Hunziker, J. H., 1949, 1995; Matthei, O. R., 1995a.

Ephedra chilensis C. Presl
Sin.: *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *andina* (Poepp. ex C.A. Mey.) Stapf, *Ephedra andina* Poepp. ex C.A. Mey., *Ephedra andina* Poepp. ex C.A. Mey. f. *abbreviata* Stapf, *Ephedra araucana* Phil., *Ephedra bracteata* Miers, *Ephedra chilense* Miers, hom. illeg., *Ephedra dumosa* Miers, *Ephedra monticola* Miers
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Hunziker, J. H., 1949, 1995, 1998a; Matthei, O. R., 1995a; Xifreda, C. C. & Hunziker, J. H., 1988[1987].
Arbusto. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU); CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 13844* (SI), *Skottsberg, C. J. F. s.n.* (SGO, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20134* (CONC, SGO), *Bridges, T. C. 1210* (SI), *Cuming, H. 372* (SI), *Philippi, O. s.n.* (SGO, SI), *Werdermann, E. 1250* (SI)].

Ephedra dumosa Miers = **Ephedra chilensis** C. Presl
Referencias: Hunziker, J. H., 1949, 1995; Matthei, O. R., 1995a; Xifreda, C. C. & Hunziker, J. H., 1988[1987].

Ephedra frustillata Miers
Sin.: *Ephedra nana* Dusén, *Ephedra patagonica* Phil.
Referencias: Hunziker, J. H., 1949, 1995, 1998a; Moore, D. M., 1974; Matthei, O. R., 1995a.
Subarbusto. Endémica. 0–1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 33114* (SI), *Koslowsky, J. 51* (SI)]; CHL[*Zoellner, O. 7472* (CONC)].

Ephedra gracilis Phil. ex Stapf
Referencias: Matthei, O. R., 1995a.
Arbolito. Endémica. 0–1200 m.
Países: CHL(III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*sin colector s.n.* (SGO, SI)].

Ephedra humilis Wedd. = **Ephedra rupestris** Benth.
Referencias: Matthei, O. R., 1995a.

Ephedra monticola Miers = **Ephedra chilensis** C. Presl
Referencias: Hunziker, J. H., 1949; Matthei, O. R., 1995a; Xifreda, C. C. & Hunziker, J. H., 1988[1987].

Ephedra multiflora Phil. ex Stapf
Referencias: Hunziker, J. H., 1995, 1998a; Matthei, O. R., 1995a; Xifreda, C. C. & Hunziker, J. H., 1988[1987].
Arbolito. Endémica. 2300–4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Philippi, F. s.n.* (SI), *Ulibarri, E. A. 1424* (SI)]; CHL[*Martin, H. C. 503* (SI), *Philippi, R. A. s.n.* (B), *sin colector s.n.* (SGO, SI)].

Ephedra nana Dusén = **Ephedra frustillata** Miers
Referencias: Hunziker, J. H., 1949, 1995; Moore, D. M., 1974; Matthei, O. R., 1995a.

Ephedra ochreata Miers
Sin.: *Ephedra ochreata* Miers var. *striata* Gillies ex Miers
Referencias: Hunziker, J. H., 1949, 1969[1968], 1995, 1998a.
Arbolito. Endémica. 0–2100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10188* (SI), *Burkart, A. 19241* (SI)].

Ephedra ochreata Miers var. *striata* Gillies ex Miers = **Ephedra ochreata** Miers
Referencias: Hunziker, J. H., 1949, 1969[1968], 1995.

Ephedra patagonica Phil. = **Ephedra frustillata** Miers
Referencias: Hunziker, J. H., 1949, 1969[1968]; Matthei, O. R., 1995a.

Ephedra rupestris Benth.
Sin.: *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *rupestris* (Benth.) Ball, *Ephedra humilis* Wedd.
Referencias: Hunziker, J. H., 1949, 1995; Matthei, O. R., 1995a.
Subarbusto. Nativa. 2000–4200 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, TUC); CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 3186* (SI)]; CHL[*Schlegel, F. 4790* (CONC)].

Ephedra scandens Miers = **Ephedra tweediana** Fisch. & C.A. Mey. emend. J.H. Hunz.
Referencias: Hunziker, J. H., 1949, 1969[1968], 1995.

Ephedra triandra Tul., p.p. = **Ephedra triandra** Tul. emend. J.H. Hunz.
Referencias: Hunziker, J. H., 1949, 1969[1968], 1995.

Ephedra triandra Tul., p.p. = **Ephedra tweediana** Fisch. & C.A. Mey. emend. J.H. Hunz.
Referencias: Hunziker, J. H., 1949, 1969[1968], 1995.

Ephedra triandra Tul. emend. J.H. Hunz.
Sin.: *Ephedra triandra* Tul., p.p., *Ephedra tweediana* Fisch. & C.A. Mey., p.p.
Referencias: Hunziker, J. H., 1949, 1969[1968], 1995, 1998a.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 15001* (SI), *Hunziker, J. H. 12530* (SI), *Jörgensen, P. 994* (SI)].

Ephedra trifurcata Zoellner
Referencias: Matthei, O. R., 1995a.
Subarbusto. Endémica. 200–300 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zoellner, O. 7928* (CONC)].

Ephedra tweediana Fisch. & C.A. Mey., p.p. = **Ephedra triandra** Tul. emend. J.H. Hunz.
Referencias: Hunziker, J. H., 1949, 1969[1968], 1995.

Ephedra tweediana Fisch. & C.A. Mey., p.p. = **Ephedra tweediana** Fisch. & C.A. Mey. emend. J.H. Hunz.
Referencias: Hunziker, J. H., 1949, 1969[1968], 1995.

Ephedra tweediana Fisch. & C.A. Mey. emend. J.H. Hunz.
Sin.: *Ephedra scandens* Miers, *Ephedra triandra* Tul., p.p., *Ephedra tweediana* Fisch. & C.A. Mey., p.p.
Referencias: Arbo, M. M. & Tressens, S. G., 2002; Hunziker, J. H., 1949, 1969[1968], 1995.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, TUC); BRA(RGS); URY(DUR, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 348* (SI)]; BRA[*Gaudichaud-Beaupré, C. s.n.* (SI)]; URY[*Felippone, F. 2188* (SI)].

Ephedra wraithiana Johnst. = **Ephedra breana** Phil.
Referencias: Hunziker, J. H., 1949, 1995; Matthei, O. R., 1995a.

PINACEAE

2 géneros, 4 especies introducidas.

Pinus L.

Número de especies: 3 introducidas

Pinus contorta Douglas & Loudon
Referencias: Ezcurra, C. & Brion, C. A. M., 2005.
Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ezcurra, C. 3482* (BCRU)].

Pinus ponderosa Douglas ex Lawson & C. Lawson
Referencias: Ezcurra, C. & Brion, C. A. M., 2005.
Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rechencq, F. 153-a* (BCRU)].

Pinus radiata D. Don
Referencias: Ezcurra, C. & Brion, C. A. M., 2005; Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005.
Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ezcurra, C. 3481* (BCRU)].

Pseudotsuga Carrière

Número de especies: 1 introducida

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
Referencias: Ezcurra, C. & Brion, C. A. M., 2005.
Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ezcurra, C. 3471* (BCRU)].

PODOCARPACEAE

4 géneros, 8 especies, 5 especies endémicas.

Dacrydium fonkii (Phil.) Ball = **Lepidothamnus fonkii** Phil.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

Dacrydium fonkii (Phil.) Benth. & Hook., nom. illeg. = **Lepidothamnus fonkii** Phil.
Referencias: Covas, G., 1995a; Quinn, C. J., 1982.

Lepidothamnus Phil.

Número de especies: 1 endémica

Lepidothamnus fonkii Phil.
Sin.: *Dacrydium fonkii* (Phil.) Ball, *Dacrydium fonkii* (Phil.) Benth. & Hook., nom. illeg.
Referencias: Covas, G., 1939a, 1995a; Pérez-Moreau, R. A., 1959; Quinn, C. J., 1982; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.
Arbolito. Endémica. 600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. 2205* (LP)]; CHL[*Gentry, A. H. 53502* (MO)].

Nageia andina (Poepp.) Kuntze = **Prumnopitys andina** (Poepp. ex Endl.) de Laub.
Referencias: Molloy, B. P. J. & Muñoz-Schick, M., 1999.

Podocarpus L'Hér. ex Pers.

Número de especies: 5, 2 endémicas

Podocarpus andinus Poepp. = **Prumnopitys andina** (Poepp. ex Endl.) de Laub.
Referencias: de Laubenfels, D. J., 1978; Molloy, B. P. J. & Muñoz-Schick, M., 1999; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

Podocarpus angustifolia Parl., hom. illeg. = **Podocarpus parlatorei** Pilg.
Referencias: de Laubenfels, D. J., 1985.

Podocarpus angustifolius Niederl., nom. nud. = **Podocarpus lambertii** Klotzsch ex Endl.
Referencias: Cianciulli, P. L. & Mattos, J. R., 1969.

Podocarpus antarctica Hort ex Carrière = **Podocarpus curvifolia** Hort ex Carrière

Podocarpus chilinus Rich. = **Podocarpus salignus** D. Don
Referencias: de Laubenfels, D. J., 1985; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

[Podocarpus curvifolia Hort ex Carrière]
Sin.: *Podocarpus antarctica* Hort ex Carrière
Referencias: Vidakovic, M., 1991.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl.
Sin.: *Podocarpus angustifolius* Niederl., nom. nud.
Referencias: Cianciulli, P. L. & Mattos, J. R., 1969; de Laubenfels, D. J., 1985; Francischetti Garcia, R. J., 2002; Reitz, R., Klein, R. M. & Reis, A., 1983.
Árbol. Nativa. 500–1700 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25050* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 45085* (MO)].

Podocarpus nubigenus Lindl.
Referencias: Barrett, W. H., 1998; Covas, G., 1995a; de Laubenfels, D. J., 1985; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995; Vidakovic, M., 1991.
Árbol. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 7068* (BAB, SI)]; CHL[*Gentry, A. H. 53496* (MO)].

Podocarpus parlatorei Pilg.
Sin.: *Podocarpus angustifolia* Parl., hom. illeg.
Referencias: Covas, G., 1995a; de Laubenfels, D. J., 1985.
Árbol. Nativa. 1200–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 2978* (SI)].

Podocarpus salignus D. Don
Sin.: *Podocarpus chilinus* Rich.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; de Laubenfels, D. J., 1985; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.
Árbol. Endémica. 0–900 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gentry, A. H. 53441* (MO)].

Podocarpus sellowii Klotzsch ex Endl. var. **angustifolia** Pilg.
Referencias: Rizzini, C. T., 1971.
Árbol. Nativa. 800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15428* (MO)].

Podocarpus sellowii Klotzsch ex Endl. var. **sellowii**
Referencias: de Laubenfels, D. J., 1985; Francischetti Garcia, R. J., 2002; Reitz, R., Klein, J. T. & Reis, A., 1983; Rizzini, C. T., 1971.
Árbol. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 35736* (MO)].

Podocarpus spicatus Poepp. = **Prumnopitys andina** (Poepp. ex Endl.) de Laub.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

Podocarpus valdiviana J. Nelson = **Prumnopitys andina** (Poepp. ex Endl.) de Laub.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

Prumnopitys Phil.

Número de especies: 1 endémica

Prumnopitys andina (Poepp. ex Endl.) de Laub.
Sin.: *Nageia andina* (Poepp.) Kuntze, *Podocarpus andinus* Poepp., *Podocarpus spicatus* Poepp., *Podocarpus valdiviana* J. Nelson, *Prumnopitys elegans* Phil., *Prumnopitys spicata* (Poepp. ex Endl.) Molloy & M. Muñoz, nom. illeg., *Stachycarpus andina* (Poepp.) Tiegh.
Referencias: Boelcke, O., 1992; Covas, G., 1939a, 1995a; de Laubenfels, D. J., 1978; Mill, R. R. & Quinn, C. J., 2001; Vidakovic, M., 1991.
Árbol. Endémica. 500–1300 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montero, G. s.n.* (SI)]; CHL[*Landrum, L. R. 7957* (MO)].

Prumnopitys elegans Phil. = **Prumnopitys andina** (Poepp. ex Endl.) de Laub.
Referencias: Molloy, B. P. J. & Muñoz-Schick, M., 1999; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

Prumnopitys spicata (Poepp. ex Endl.) Molloy & M. Muñoz, nom. illeg. = **Prumnopitys andina** (Poepp. ex Endl.) de Laub.
Referencias: Molloy, B. P. J. & Muñoz-Schick, M., 1999; Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995; Vidakovic, M., 1991.

Saxegothaea Lindl.

Número de especies: 1 endémica

Saxegothaea conspicua Lindl.
Referencias: Barrett, W. H., 1998; Covas, G., 1939a, 1995a; Vidakovic, M., 1991.
Árbol. Endémica. 800–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 9313* (BAB)]; CHL[*Roig, F. A. 2650* (BAB)].

Stachycarpus andina (Poepp.) Tiegh. = **Prumnopitys andina** (Poepp. ex Endl.) de Laub.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Quesada, M., 1995.

Monocotyledoneae

AGAPANTHACEAE

1 género, 1 especie introducida.

Agapanthus L'Hér.

Número de especies: 1 introducida

Agapanthus umbellatus L'Hér.
Referencias: Delucchi, G., 1996.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–100 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Delucchi, G. 706* (LP)].

AGAVACEAE

2 géneros, 3 especies introducidas.

Agave L.

Número de especies: 1 introducida

Agave americana L.
Referencias: Cantero, J. J. & Bianco, C. A., 1986.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(COR, LPA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Steibel, P. 11802* (SRFA)].

Yucca L.

Número de especies: 2 introducidas

Yucca aloifolia L.
Referencias: Hunziker, A. T., 1984b.
Arbolito. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(ERI, LPA, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25225* (SI)].

Yucca gloriosa L.
Referencias: Herter, W. G. F., 1949–1956.
Arbolito. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25225* (SI)].

ALISMATACEAE

Autor: Haynes, R. R.

3 géneros, 16 especies, 1 especie endémica, 2 especies introducidas.

Alisma L.

Número de especies: 2 introducidas

Alisma ancile Mart. ex Steud., nom. nud. = **Sagittaria guayanensis** Kunth
Referencias: Rataj, K., 1970a.

Alisma berteroi Spreng. = **Echinodorus berteroi** (Spreng.) Fassett
Referencias: Lot, A. & Novelo, A., 1994.

Alisma boliviana Rusby = **Echinodorus bolivianus** (Rusby) Holm-Niels.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Holm-Nielsen, L. B., 1979.

Alisma cordifolium L. = **Echinodorus cordifolius** (L.) Griseb.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Alisma echinocarpum (Mart.) Seub. = **Sagittaria guayanensis** Kunth
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a.

Alisma floribundum Seub. = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **aureus** (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Alisma grandiflorum Cham. & Schltdl. = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Alisma intermedia Mart. = **Echinodorus subalatus** (Mart.) Griseb.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Alisma lanceolatum With.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–900 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 35721* (CONC)].

Alisma macrophyllum Kunth = **Echinodorus macrophyllus** (Kunth) Micheli subsp. **macrophyllus**
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Alisma palaefolium (Nees & Mart.) Kunth = **Echinodorus palaefolius** (Nees & Mart.) J.F. Macbr.
Referencias: Rataj, K., 1978.

Alisma plantago-aquatica L.
Referencias: Björkqvist, I., 1967, 1968; Correa, M. N., 1969d; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–800 m.
Países: ARG(RNE); CHL(V, VII, VIII, IX, X, RME).

Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 4092* (SI)]; CHL[*Rodríguez Ríos, R. 2367* (CONC)].

Alisma ranunculoides L. var. *brasiliense* A. St.-Hil. = **Echinodorus bolivianus** (Rusby) Holm-Niels.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Alisma subalatum Mart. = **Echinodorus subalatus** (Mart.) Griseb.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Alisma tenellum Mart. = **Echinodorus tenellus** (Mart.) Buchenau
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus Rich. ex Engelm.

Número de especies: 11, 1 endémica

Echinodorus angustifolius Rataj = **Echinodorus bolivianus** (Rusby) Holm-Niels.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus argentinensis Rataj = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus aschersonianus Graebn.
Sin.: *Echinodorus aschersonianus* Graebn. var. *mulliglandulosus* Rataj, *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *pusillus* Micheli, *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *pusillus* Micheli
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a, 1978, 2004.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, COS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(PHA); URY(FLO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 2105* (BA)]; BRA[*Tweedie, J. s.n.* (K)]; PRY[*Rojas, T. 2467* (W)]; URY[*Osten, C. 3249* (MO)].

Echinodorus aschersonianus Graebn. var. *mulliglandulosus* Rataj = **Echinodorus aschersonianus** Graebn.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus australis Rataj
Referencias: Rataj, K., 2004.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19669* (US)]; BRA[*Smith, L. B. 13449* (NY, US)].

Echinodorus austroamericanus Rataj = **Echinodorus bolivianus** (Rusby) Holm-Niels.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Holm-Nielsen, L. B., 1979; Rataj, K., 1978.

Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett
Sin.: *Alisma berteroi* Spreng., *Echinodorus berteroi* (Spreng.) Fassett subsp. *patagonicus* (Speg.) Rataj, *Echinodorus patagonicus* Speg.
Referencias: Correa, M. N., 1969d; Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Lehtonen, S., 2005; Lot, A. & Novelo, A., 1994.
Hierba acuática. Anual. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(RNE); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)]; PRY[*Mereles, F. 708* (FCQ)].

Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett subsp. *patagonicus* (Speg.) Rataj = **Echinodorus berteroi** (Spreng.) Fassett
Referencias: Lot, A. & Novelo, A., 1994.

Echinodorus bolivianus (Rusby) Holm-Niels.
Sin.: *Alisma boliviana* Rusby, *Alisma ranunculoides* L. var. *brasiliense* A. St.-Hil., *Echinodorus angustifolius* Rataj, *Echinodorus austroamericanus* Rataj, *Echinodorus quadricostatus* Fassett, *Echinodorus quadricostatus* Fassett var. *xinguensis* Rataj, *Echinodorus tenellus* (Mart.) Buchenau var. *latifolius* (Seub.) Fassett
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Holm-Nielsen, L. B., 1979.
Hierba acuática. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(COS, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1152* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 5893* (US)]; PRY[*Hassler, E. 9439* (G)].

[Echinodorus cordifolius (L.) Griseb.]
Sin.: *Alisma cordifolium* L.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Echinodorus ellipticus (Mart.) Micheli = **Echinodorus palaefolius** (Nees & Mart.) J.F. Macbr.
Referencias: Rataj, K., 1978.

Echinodorus ellipticus (Mart.) Micheli var. *latifolius* auct. non Micheli = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus ellipticus (Mart.) Micheli var. *ovatus* auct. non Micheli = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus floribundus (Seub.) Seub. = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **aureus** (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *aureus* Fassett = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **aureus** (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *claussenii* (Seub.) Rataj = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **aureus** (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *floribundus* (Seub.) Micheli = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **aureus** (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *longibracteatus* Rataj = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *longiscapus* (Arechav.) Hauman = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *ovatus* Micheli = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *pusillus* Micheli = **Echinodorus aschersonianus** Graebn.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **aureus** (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Sin.: *Alisma floribundum* Seub., *Echinodorus floribundus* (Seub.) Seub., *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *aureus* Fassett, *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *claussenii* (Seub.) Rataj, *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *floribundus* (Seub.) Micheli, *Echinodorus macrophyllus* (Kunth) Micheli var. *muricatus* (Griseb.) Micheli, *Echinodorus muricatus* Griseb., *Echinodorus muricatus* Woodson & Schery, hom. illeg., *Echinodorus pubescens* (Mart.) Seub. var. *claussenii* Seub., *Echinodorus punctatus* Micheli
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, CEN, COA, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2528* (MO)]; BRA[*Hatschbach, G. 30986* (BH, C, UC)]; PRY[*Hassler, E. 1207* (G)].

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Sin.: *Alisma grandiflorum* Cham. & Schltdl., *Echinodorus argentinensis* Rataj, *Echinodorus ellipticus* (Mart.) Micheli var. *latifolius* auct. non Micheli, *Echinodorus ellipticus* (Mart.) Micheli var. *ovatus* auct. non Micheli, *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *longibracteatus* Rataj, *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *longiscapus* (Arechav.) Hauman, *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *ovatus* Micheli, *Echinodorus longiscapus* Arechav., *Echinodorus longiscapus* Arechav. var. *minor* (Buchenau) Tronc., *Echinodorus sellowianus* Buchenau, *Echinodorus sellowianus* Buchenau var. *major* Buchenau, *Echinodorus sellowianus* Buchenau var. *minor* Buchenau
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fassett, N. C., 1955; Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA); URY(ART, CAS, COL, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 1361* (SI), *Guillén, R. 182* (CTES, MNES)]; BRA[*Smith, L. B. 13505* (WIS)]; PRY[*Mereles, F. 5689* (CTES, FCQ, MO)]; URY[*Herter, W. G. F. 8850* (F, G, GH, MO, UC)].

Echinodorus guayanensis (Kunth) Griseb. = **Sagittaria guayanensis** Kunth
Referencias: Rataj, K., 1970a.

Echinodorus horemanii Rataj = **Echinodorus uruguayensis** Arechav.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970b, 1978.

Echinodorus intermedius (Mart.) Griseb. = **Echinodorus subalatus** (Mart.) Griseb.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1978.

Echinodorus longipetalus Micheli
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Rataj, K., 1970a, 1978.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hassler, E. 4723* (SI)]; PRY[*Jiménez, B. 1966* (BM, G, MO, PY)].

Echinodorus longiscapus Arechav. = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus longiscapus Arechav. var. *minor* (Buchenau) Tronc. = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus macrophyllus (Kunth) Micheli var. *muricatus* (Griseb.) Micheli = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **aureus** (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus macrophyllus (Kunth) Micheli subsp. **macrophyllus**
Sin.: *Alisma macrophyllum* Kunth
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1978.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2746* (US)].
Notas: Rataj (2004) cita la especie para Argentina sin indicar ejemplar de referencia.

Echinodorus macrophyllus (Kunth) Micheli subsp. **scaber** (Rataj) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Sin.: *Echinodorus scaber* Rataj
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1978.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 35769* (AAU)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4142* (G)].

Echinodorus martii auct. non Micheli = **Echinodorus uruguayensis** Arechav.

Echinodorus martii Micheli var. *uruguayensis* (Arechav.) Hauman = **Echinodorus uruguayensis** Arechav.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a.

Echinodorus muricatus Griseb. = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **aureus** (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus muricatus Woodson & Schery, hom. illeg. = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **aureus** (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

[Echinodorus opacus Rataj]
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970b, 1978.
Notas: Nombre dudoso. Probable híbrido.

Echinodorus osiris Rataj = **Echinodorus uruguayensis** Arechav.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970b, 1978.

[Echinodorus palaefolius (Nees & Mart.) J.F. Macbr.]
Sin.: *Alisma palaefolium* (Nees & Mart.) Kunth, *Echinodorus ellipticus* (Mart.) Micheli, *Sagittaria palaefolia* Nees & Mart., *Sagittaria palaefolia* Nees & Mart. var. *chilense* Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1953a; Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1978.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Echinodorus paniculatus Micheli emend. Rataj
Sin.: *Echinodorus paniculatus* Micheli emend. Rataj var. *brevifolius* Hauman
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fassett, N. C., 1955; Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1968, 1970a, 1978, 2004.
Hierba acuática. Anual. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR); PRY(APY, CEN, CON, COA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 13387* (AAU)]; BRA[*Hatschbach, G. 9370* (MBM)]; PRY[*Mereles, F. 6058* (FCQ)].

Echinodorus paniculatus Micheli emend. Rataj var. *brevifolius* Hauman = **Echinodorus paniculatus** Micheli emend. Rataj
Referencias: Rataj, K., 1968, 1970a.

Echinodorus patagonicus Speg. = **Echinodorus berteroi** (Spreng.) Fassett
Referencias: Lot, A. & Novelo, A., 1994.

[Echinodorus pellucidus Rataj]
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1978.
Notas: Nombre dudoso. Probablemente sinónimo de *Echinodorus uruguayensis*.

[Echinodorus portoalegrensis Rataj]
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970b, 1978.
Notas: Nombre dudoso. Posible sinónimo de *Echinodorus uruguayensis*.

Echinodorus pubescens (Mart.) Seub. var. *claussenii* Seub. = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **aureus** (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus punctatus Micheli = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **aureus** (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus quadricostatus Fassett = **Echinodorus bolivianus** (Rusby) Holm-Niels.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus quadricostatus Fassett var. *xinguensis* Rataj = **Echinodorus bolivianus** (Rusby) Holm-Niels.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus scaber Rataj = **Echinodorus macrophyllus** (Kunth) Micheli subsp. **scaber** (Rataj) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1978.

Echinodorus sellowianus Buchenau = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus sellowianus Buchenau var. *major* Buchenau = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus sellowianus Buchenau var. *minor* Buchenau = **Echinodorus grandiflorus** (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. **grandiflorus**
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.
Sin.: *Alisma intermedia* Mart., *Alisma subalatum* Mart., *Echinodorus intermedius* (Mart.) Griseb.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1978.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 13995* (WIS)]; PRY[*Balansa, B. 572* (K)].
Notas: Cita dudosa para Argentina bajo *Echinodorus intermedius* (Molfino, 1922a).

Echinodorus subulatus Niederl., hom. illeg. = **Echinodorus uruguayensis** Arechav.
Referencias: Rataj, K., 1970a.

Echinodorus tenellus (Mart.) Buchenau
Sin.: *Alisma tenellum* Mart.
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; Fassett, N. C., 1955; Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Rataj, K., 1978.
Hierba acuática. Anual. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 13739* (LP, MO, UC)]; BRA[*Smith, L. B. 13449* (NY, US)]; PRY[*Marín, G. 264* (BM)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 4406* (MVM)].

Echinodorus tenellus (Mart.) Buchenau var. *latifolius* (Seub.) Fassett = **Echinodorus bolivianus** (Rusby) Holm-Niels.
Referencias: Fassett, N. C., 1955; Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Echinodorus uruguayensis Arechav.
Sin.: *Echinodorus horemanii* Rataj, *Echinodorus martii* auct. non Micheli, *Echinodorus martii* Micheli var. *uruguayensis* (Arechav.) Hauman, *Echinodorus osiris* Rataj, *Echinodorus subulatus* Niederl., hom. illeg.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a, 1978, 2004.
Hierba palustre. Perenne. Endémica. 100–2000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(X); URY(ART, FLO, PAY, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 538* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 13120* (GH, NY, S, UC, US)]; CHL[*André, F. 2951* (K)]; URY[*Herter, W. G. F. 93472* (G, GH, MO, US)].

Lophiocarpus guayanensis (Kunth) Micheli = **Sagittaria guayanensis** Kunth
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a.

Lophiocarpus seubertianus (Mart.) Micheli = **Sagittaria guayanensis** Kunth
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a.

Lophotocarpus guayanensis (Kunth) J.G. Sm. = **Sagittaria guayanensis** Kunth
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a.

Lophotocarpus guayanensis (Kunth) J.G. Sm. var. *echinocarpus* (Mart.) Buchenau = **Sagittaria guayanensis** Kunth
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a.

Lophotocarpus guayanensis (Kunth) J.G. Sm. var. *typicus* Buchenau, nom. inval. = **Sagittaria guayanensis** Kunth
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a.

Lophotocarpus seubertianus (Mart.) Buchenau = **Sagittaria guayanensis** Kunth
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a.

Sagittaria L.

Número de especies: 3

Sagittaria affinis Seub. = **Sagittaria rhombifolia** Cham.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a.

Sagittaria amazonica Huber = **Sagittaria rhombifolia** Cham.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a.

Sagittaria andina Phil. = **Sagittaria montevidensis** Cham. & Schltdl. subsp. **montevidensis**
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994.

Sagittaria bracteata Willd. ex Kunth, nom. nud. = **Sagittaria guayanensis** Kunth
Referencias: Rataj, K., 1970a.

Sagittaria chilensis Cham. & Schltdl. = **Sagittaria montevidensis** Cham. & Schltdl. subsp. **chilensis** (Cham. & Schltdl.) Bogin
Referencias: Bogin, C., 1955.

Sagittaria echinocarpa Mart. = **Sagittaria guayanensis** Kunth
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a.

Sagittaria guayanensis Kunth
Sin.: *Alisma ancile* Mart. ex Steud., nom. nud., *Alisma echinocarpum* (Mart.) Seub., *Echinodorus guayanensis* (Kunth) Griseb., *Lophiocarpus guayanensis* (Kunth) Micheli, *Lophiocarpus seubertianus* (Mart.) Micheli, *Lophotocarpus guayanensis* (Kunth) J.G. Sm., *Lophotocarpus guayanensis* (Kunth) J.G. Sm. var. *echinocarpus* (Mart.) Buchenau, *Lophotocarpus guayanensis* (Kunth) J.G. Sm. var. *typicus* Buchenau, nom. inval., *Lophotocarpus seubertianus* (Mart.) Buchenau, *Sagittaria bracteata* Willd. ex Kunth, nom. nud., *Sagittaria echinocarpa* Mart., *Sagittaria seubertiana* Mart.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a, 1978.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR); PRY(AMA, CEN, COA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 3902* (BR, E, US, WIS)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 823* (E, G)].

Sagittaria lagoensis Seub. & Warm. = **Sagittaria rhombifolia** Cham.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a.

[Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. f. inmaculata Hicken]
Notas: Nombre dudoso.

[Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. f. longipedunculata Kuntze]
Referencias: Hauman, L. L., 1915.
Notas: Nombre dudoso.

[Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. f. maculata Hicken]
Referencias: Hauman, L. L., 1915; Hicken, C. M., 1908b.
Notas: Nombre dudoso.

Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. f. *normalis* Hauman, nom. inval. = **Sagittaria montevidensis** Cham. & Schltdl. subsp. **montevidensis**

Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. subsp. **chilensis** (Cham. & Schltdl.) Bogin
Sin.: *Sagittaria chilensis* Cham. & Schltdl.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Bogin, C., 1955.
Hierba palustre. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(V, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Chamisso, L. K. A. s.n.* (B)].

Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. subsp. **montevidensis**
Sin.: *Sagittaria andina* Phil., *Sagittaria montevidensis* Cham. & Schltdl. f. *normalis* Hauman, nom. inval., *Sagittaria multinervia* Larrañaga, *Sagittaria pugioniformis* L. var. *montevidensis* (Cham. & Schltdl.) Kuntze
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a, 1978.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(X); PRY(APY, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE); URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLA, PAY, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hurrell, J. A. 5327* (SI), *Lorentz, P. G. 103* (BR, G, W, Z)]; BRA[*Hatschbach, G. 7418* (US)]; CHL[*Elliott, S. 571* (GH)]; PRY[*Mereles, F. 6083* (FCQ)]; URY[*Herter, W. G. F. 518* (GH, NY, WIS)].

Sagittaria multinervia Larrañaga = **Sagittaria montevidensis** Cham. & Schltdl. subsp. **montevidensis**
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a.

Sagittaria palaefolia Nees & Mart. = **Echinodorus palaefolius** (Nees & Mart.) J.F. Macbr.
Referencias: Rataj, K., 1978.

Sagittaria palaefolia Nees & Mart. var. *chilense* Kuntze = **Echinodorus palaefolius** (Nees & Mart.) J.F. Macbr.
Referencias: Rataj, K., 1978.

[Sagittaria palaefolia Nees & Mart. var. elliptica Kuntze]
Referencias: Kuntze, C. E. O., 1898.
Notas: Nombre dudoso.

[Sagittaria palaefolia Nees & Mart. var. montevidensis Kuntze]
Referencias: Kuntze, C. E. O., 1898.
Notas: Nombre dudoso.

Sagittaria pugioniformis auct. non L. = **Sagittaria rhombifolia** Cham.
Referencias: Rataj, K., 1970a.

Sagittaria pugioniformis L. var. *affinis* (Seub.) Kuntze = **Sagittaria rhombifolia** Cham.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a.

Sagittaria pugioniformis L. var. *montevidensis* (Cham. & Schltdl.) Kuntze = **Sagittaria montevidensis** Cham. & Schltdl. subsp. **montevidensis**
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a.

Sagittaria pugioniformis L. var. *platyphylla* Micheli = **Sagittaria rhombifolia** Cham.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a.

Sagittaria pugioniformis L. var. *rhombifolia* (Cham.) Kuntze = **Sagittaria rhombifolia** Cham.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a.

Sagittaria rhombifolia Cham.
Sin.: *Sagittaria affinis* Seub., *Sagittaria amazonica* Huber, *Sagittaria lagoensis* Seub. & Warm., *Sagittaria pugioniformis* auct. non L., *Sagittaria pugioniformis* L. var. *affinis* (Seub.) Kuntze, *Sagittaria pugioniformis* L. var. *platyphylla* Micheli, *Sagittaria pugioniformis* L. var. *rhombifolia* (Cham.) Kuntze, *Sagittaria rhomboidalis* Micheli
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a, 1978.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, SCA); CHL(X); PRY(AMA, CAN, CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 2210* (CTES)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 10926* (BM, S)]; CHL[*Hollermayer, A. 1920* (NY, S)]; PRY[*Hassler, E. 8157* (G, NY, UC)].

Sagittaria rhomboidalis Micheli = **Sagittaria rhombifolia** Cham.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a.

Sagittaria seubertiana Mart. = **Sagittaria guayanensis** Kunth
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1994; Rataj, K., 1970a.

ALLIACEAE

10 géneros, 163 especies, 145 especies endémicas, 7 especies introducidas.

Allium L.

Número de especies: 7 introducidas

Allium poeppigii Kunth = **Zoellnerallium andinum** (Poepp.) Crosa
Referencias: Crosa, O., 1975a.

Allium ampeloprasum L.
Referencias: Delucchi, G., 2003; Millán, R., 1952.
Hierba. Perenne. Introducida.
Países: ARG(BAI, CAT, ERI, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25570* (SI)].

Allium ampeloprasum L. var. *commutatum* (Guss.) Fiori = **Allium commutatum** Guss.
Referencias: Bothmer, R., 1974.

Allium ampeloprasum L. var. *porrum* (L.) Gay = **Allium porrum** L.
Referencias: Bonnet, B., 1976.

Allium andicola (Kunth) Regel = **Nothoscordum andicolum** Kunth
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Allium bivalve (L.) Kuntze = **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **bivalve**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Allium bivalve (L.) Kuntze var. *andicola* (Kunth) Kuntze = **Nothoscordum andicolum** Kunth
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Allium bivalve (L.) Kuntze var. *fragrans* (Vent.) Kuntze = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Referencias: Stearn, W. T., 1986.

Allium bivalve (L.) Kuntze var. *gaudichaudianum* (Kunth) Kuntze = **Nothoscordum gaudichaudianum** Kunth
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Allium bivalve (L.) Kuntze var. *sellowianum* (Kunth) Kuntze = **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **bivalve**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Allium bivalve (L.) Kuntze var. *striatum* (Jacq.) Kuntze = **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **bivalve**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Allium bonariense Griseb. = **Nothoscordum montevidense** Beauverd subsp. **montevidense**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Allium bonariense Griseb. var. *flavum* Kuntze = **Nothoscordum montevidense** Beauverd subsp. **montevidense**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Allium cepa L.
Referencias: Delucchi, G., 2003; Millán, R., 1952.
Hierba. Perenne. Introducida.
Países: ARG(BAI, COS, JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 28342* (CTES)].

Allium commutatum Guss.
Sin.: *Allium ampeloprasum* L. var. *commutatum* (Guss.) Fiori
Referencias: Bothmer, R., 1974; Millán, R., 1952.
Hierba. Perenne. Introducida.
Países: ARG(BAI, CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Millán, A. R. 24* (SI)].

Allium compactum Thuill. = **Allium vineale** L. var. **compactum** (Thuill.) Coss. & Germ.
Referencias: Stearn, W. T., 1980.

Allium euosmon Link & Otto = **Nothoscordum nudicaule** (Lehm.) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Allium fragans Vent. = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Referencias: Stearn, W. T., 1986.

Allium fragans Vent. var. *nepalense* Lindl.
= **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Referencias: Stearn, W. T., 1986.

Allium gracile Dryand. ex Aiton = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Referencias: Stearn, W. T., 1986.

Allium inodorum auct. non Sol. ex Aiton
= **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Referencias: Stearn, W. T., 1986.

Allium inodorum Sol. ex Aiton = **Allium neapolitanum** Cirillo
Referencias: Stearn, W. T., 1986.

Allium macrantherum Kuntze = **Nothoscordum macrantherum** (Kuntze) Beauverd
Referencias: Beauverd, G., 1908.

[Allium neapolitanum Cirillo]
Sin.: *Allium inodorum* Sol. ex Aiton
Referencias: Stearn, W. T., 1986.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Allium nudicaule Lehm. = **Nothoscordum nudicaule** (Lehm.) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Allium ornithogaloides Walter = **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **bivalve**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Allium poeppigii Kunth = *Zoellnerallium andinum* (Poepp.) Crosa

Allium porrum L.
Sin.: *Allium ampeloprasum* L. var. *porrum* (L.) Gay
Referencias: Bonnet, B., 1976.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. s.n.* (SI)].

Allium schoenoprasum L.
Referencias: Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Millán, A. R. 976* (SI)].

Allium striatellum Lindl. = **Nothoscordum gramineum** (Sims) Beauverd var. **gramineum**

Allium striatellum Lindl. var. *nanum* Griseb.
= **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **nanum** (Griseb.) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Allium striatum Jacq. = **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **bivalve**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Allium subbiflorum Colla = **Tristagma subbiflorum** (Colla) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1978b.

Allium triquetrum L.
Referencias: Delucchi, G., 1996, 2003; Steibel, P., Troiani, H. O. & Williamson, T., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Delucchi, G. 791* (LP)].

Allium vineale L. var. **compactum** (Thuill.) Coss. & Germ.
Sin.: *Allium compactum* Thuill.
Referencias: Matthei, O. R., 1995b; Stearn, W. T., 1980.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); CHL(IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20069* (SI)].
Notas: Citada para Chile sin indicar material de referencia (Matthei, 1995).

Ancrumia cuspidata Harv. ex Baker = **Gethyum cuspidatum** (Harv. ex Baker) M. Muñoz
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Beauverdia felipponei (Beauverd) Herter = **Ipheion sellowianum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Beauverdia hirtella (Kunth) Herter = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Beauverdia lloydiflora (Beauverd) Herter = **Ipheion vittatum** (Griseb.) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Beauverdia lorentzii Herter = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Beauverdia sellowiana (Kunth) Herter = **Ipheion sellowianum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Beauverdia sellowiana auct. non (Kunth) Herter
= **Ipheion dialystemon** Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1971.

Beauverdia subssesilis (Beauverd) Herter = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Beauverdia uniflora (Lindl.) Herter = **Ipheion uniflorum** (Lindl.) Raf.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Beauverdia vittata (Griseb.) Herter = **Ipheion vittatum** (Griseb.) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Brodiaea ameghinoi Speg. = **Tristagma ameghinoi** (Speg.) Speg.
Referencias: Ravenna, P. F., 1969f, 1971b.

Brodiaea circinata Sandwith = **Tristagma circinatum** (Sandwith) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1963.

Brodiaea felipponei (Beauverd) Herter = **Ipheion sellowianum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Brodiaea hirtella (Kunth) Baker = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Brodiaea ixioides Hook. = **Leucocoryne ixioides** (Hook.) Lindl.
Referencias: Zöllner, O., 1972.

Brodiaea patagonica (Baker) Baker = **Tristagma patagonicum** (Baker) Traub
Referencias: Ravenna, P. F., 1969f.

Brodiaea patagonica Speg., hom. illeg. = **Tristagma spegazzinii** (Macloskie) Traub
Referencias: Ravenna, P. F., 2001i.

Brodiaea porrifolia F. Meigen = **Tristagma bivalve** (Lindl.) Traub

Brodiaea recurvifolia C.H. Wright = **Ipheion sessile** (Phil.) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Brodiaea sellowiana (Kunth) Baker = **Ipheion sellowianum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Brodiaea sellowiana auct. non (Kunth) Baker = **Ipheion dialystemon** Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1971.

Brodiaea sessiliflora (Baker) Baker = **Ipheion sessile** (Phil.) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Brodiaea sessilis (Phil.) F. Meigen = **Ipheion sessile** (Phil.) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Brodiaea spegazzinii Macloskie = **Tristagma spegazzinii** (Macloskie) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1963.

Brodiaea subbiflora (Colla) Baker = **Tristagma subbiflorum** (Colla) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1978b.

Brodiaea tweedieana (Baker) Hicken = **Ipheion tweedieanum** (Baker) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Brodiaea uniflora (Lindl.) Engl. = **Ipheion uniflorum** (Lindl.) Raf.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Brodiaea uniflora (Lindl.) Engl. var. *tweediana* (Baker) Baker = **Ipheion tweedieanum** (Baker) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Brodiaea viridor Killip = **Tristagma patagonicum** (Baker) Traub
Referencias: Ravenna, P. F., 1969f.

Brodiaea vittata (Griseb.) Baker = **Ipheion vittatum** (Griseb.) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Chrysocoryne incrassata (Phil.) Zoellner = **Leucocoryne coronata** Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000n.

Chrysocoryne oxypetala (Phil.) Zoellner = **Leucocoryne macropetala** Phil.

Erinna gilliesioides Phil. = **Leucocoryne gilliesioides** (Phil.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000a.

Gagea bonariensis (Pers.) Roem. & Schult. = **Nothoscordum bonariense** (Pers.) Beauverd
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Garaventia graminifolia (Phil.) Looser = **Tristagma graminifolium** (Phil.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1978b.

Geboscon bivalve (L.) House = **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **bivalve**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Geboscon fragrans (Vent.) House = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**

Gethyum Phil.

Número de especies: 2 endémicas

Gethyum atropurpureum Phil.
Sin.: *Solaria atropurpurea* (Phil.) Ravenna, *Solaria major* Reiche
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a; Ravenna, P. F., 1978b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grandjot, G. F. s.n.* (SI)].

Gethyum cuspidatum (Harv. ex Baker) M. Muñoz
Sin.: *Ancrumia cuspidata* Harv. ex Baker, *Solaria cuspidata* (Harv. ex Baker) Ravenna
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a; Ravenna, P. F., 1978b.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–200 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grandjot, G. F. s.n.* (SI)].

Hesperocles fragans (Vent.) Salisb. = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Referencias: Stearn, W. T., 1986.

Hookera uniflora (Lindl.) Kuntze = **Ipheion uniflorum** (Lindl.) Raf.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Ipheion Raf.

Número de especies: 8, 7 endémicas

Ipheion dialystemon Guagl.
Sin.: *Beauverdia sellowiana* auct. non (Kunth) Herter, *Brodiaea sellowiana* auct. non (Kunth) Baker, *Nothoscordum bonariense* (Pers.) Beauverd var. *flavum* Kuntze, *Nothoscordum dialsystemon* (Guagl.) Crosa, *Nothoscordum felipponei* auct. non Beauverd
Referencias: Crosa, O., 1975b; Guaglianone, E. R., 1971, 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); URY(FLA, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 6254* (SI)]; URY[*Gilbert, B. D. 512p.p.* (MVM)].

Ipheion felipponei (Beauverd) Traub = **Ipheion sellowianum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Ipheion hirtellum (Kunth) Traub
Sin.: *Beauverdia hirtella* (Kunth) Herter, *Beauverdia lorentzii* Herter, *Beauverdia subssesilis* (Beauverd) Herter, *Brodiaea hirtella* (Kunth) Baker, *Ipheion lorentzii* (Herter) Traub, *Ipheion subsessile* (Beauverd) Traub, *Milla hirtella* (Kunth) Baker, *Nothoscordum canescens* Beauverd, *Nothoscordum felipponei* Beauverd subsp. *lorentzii* (Herter) Ravenna, *Nothoscordum hirtellum* (Kunth) Herter, *Nothoscordum hirtellum* (Kunth) Herter subsp. *lorentzii* (Herter) Ravenna, *Nothoscordum lorentzii* (Herter) Ravenna, *Nothoscordum subsessile* Beauverd, *Tristagma hirtellum* (Kunth) Traub, *Tristagma lorentzii* (Herter) Traub, *Triteleia hirtella* Kunth
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); URY(LAV, MAL, MON, RIV, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 14553* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 49a* (SI)].

Ipheion lloydiflorum (Beauverd) Traub = **Ipheion vittatum** (Griseb.) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Ipheion lorentzii (Herter) Traub = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Ipheion recurvifolium (C.H. Wright) Traub = **Ipheion sessile** (Phil.) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Ipheion sellowianum (Kunth) Traub
Sin.: *Beauverdia felipponei* (Beauverd) Herter, *Beauverdia sellowiana* (Kunth) Herter, *Brodiaea felipponei* (Beauverd) Herter, *Brodiaea sellowiana* (Kunth) Baker, *Ipheion felipponei* (Beauverd) Traub, *Milla sellowiana* (Kunth) Baker, *Nothoscordum felipponei* Beauverd, *Tristagma felipponei* (Beauverd) Traub, *Tristagma sellowianum* (Kunth) Traub, *Triteleia sellowiana* Kunth
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); BRA(RGS); URY(FLA, LAV, MAL, MON, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sorarú, S. B. s.n.* (SI)]; BRA[*Sellow, F. 3664* (K)]; URY[*Herter, W. G. F. 434* (SI)].

Ipheion sessile (Phil.) Traub
Sin.: *Brodiaea recurvifolia* C.H. Wright, *Brodiaea sessiliflora* (Baker) Baker, *Brodiaea sessilis* (Phil.) F. Meigen, *Ipheion recurvifolium* (C.H. Wright) Traub, *Milla sessiliflora* Baker, *Tristagma recurvifolium* (C.H. Wright) Traub, *Tristagma sessile* (Phil.) Traub, *Triteleia sessilis* Phil.
Referencias: Crosa, O., 1975b; Guaglianone, E. R., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(VII, RME); URY(CAS, LAV, MAL, MON).
Ejemplares de referencia: CHL[*Germain, P. s.n.* (K)]; URY[*Crosa, O. s.n.* (SI)].
Notas: Probablemente crezca en Argentina.

Ipheion setaceum (Baker) Traub
Sin.: *Milla setacea* Baker, *Nothoscordum setaceum* (Baker) Ravenna, *Tristagma setaceum* (Baker) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tweedie, J. s.n.* (K)].

Ipheion subsessile (Beauverd) Traub = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Ipheion tweedieanum (Baker) Traub
Sin.: *Brodiaea tweedieana* (Baker) Hicken, *Brodiaea uniflora* (Lindl.) Engl. var. *tweediana* (Baker) Baker, *Milla tweedieana* (Baker) Griseb., *Milla uniflora* (Lindl.) Graham ex Jameson var. *tweedieana* Baker, *Tristagma tweedieana* (Baker) Traub
Referencias: Crosa, O. & Marchesi, E., 2002; Crosa, O., 1975b; Guaglianone, E. R., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26918* (SI)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (SI)].

Ipheion uniflorum (Lindl.) Raf.
Sin.: *Beauverdia uniflora* (Lindl.) Herter, *Brodiaea uniflora* (Lindl.) Engl., *Hookera uniflora* (Lindl.) Kuntze, *Leucocoryne uniflora* (Lindl.) Greene, *Milla bonariensis* Gillies ex Baker, *Milla uniflora* (Lindl.) Graham ex Jameson, *Tristagma uniflorum* (Lindl.) Traub, *Triteleia uniflora* Lindl.

Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Crosa, O., 1975b; Guaglianone, E. R., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, SLU); URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 5323* (SI)]; URY[*Osten, C. 3623* (MVM, SI)].

Ipheion vittatum (Griseb.) Traub
Sin.: *Beauverdia lloydiflora* (Beauverd) Herter, *Beauverdia vittata* (Griseb.) Herter, *Brodiaea vittata* (Griseb.) Baker, *Ipheion lloydiflorum* (Beauverd) Traub, *Milla violacea* (Kunth) Baker, *Milla vittata* Griseb., *Nothoscordum lloydiflorum* Beauverd, *Nothoscordum uniflorum* Baker, *Nothoscordum vittatum* (Griseb.) Ravenna, *Tristagma lloydiflorum* (Beauverd) Traub, *Tristagma vittatum* (Griseb.) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); BRA(RGS); URY(CAS, LAV, MAL, MON, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 24134* (SI)]; BRA[*Rosengurtt, B. 9465* (MVFA)]; URY[*Crosa, O. 2157* (SI)].

Latace volkmanni Phil. = **Leucocoryne volkmanni** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1967.

Leucocoryne Lindl.

Número de especies: 45 endémicas

Leucocoryne alliacea Miers ex Lindl.
Sin.: *Leucocoryne angustipetala* Gay, *Leucocoryne reflexa* Grau
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a; Zöllner, O., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–2200 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grandjot, G. F. 871b* (SI)].

Leucocoryne angosturae Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2004b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 5031* (BA)].

Leucocoryne angustipetala Gay = **Leucocoryne alliacea** Miers ex Lindl.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Leucocoryne appendiculata Phil.
Referencias: Zöllner, O., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 400–800 m.
Países: CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 441* (SI)].

Leucocoryne arrayanensis Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2004b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1700–2500 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 3991* (BA)].

Leucocoryne candida Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2005j.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–800 m.
Países: CHL(VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 5278* (BA)].

Leucocoryne codehuensis Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2004b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 5000* (BA)].

Leucocoryne conconensis Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000n.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4106* (BA, BM, Herb. Ravenna, SGO)].

Leucocoryne conferta Zoellner
Referencias: Zöllner, O. & Arriagada, L., 1998a; Zöllner, O., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–1200 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 5618* (SGO)].

Leucocoryne connivens Phil.
Referencias: Philippi, R. A., 1896.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*sin colector s.n.* (SGO)].

Leucocoryne conostyla Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2004b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Wagenknecht, R. s.n.* (BAS)].

Leucocoryne coquimbensis F. Phil. var. **alba** Zoellner
Referencias: Zöllner, O., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 5664* (SGO)].

Leucocoryne coquimbensis F. Phil. var. **coquimbensis**
Referencias: Zöllner, O., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles, C. 4474* (CONC)].

Leucocoryne coronata Ravenna
Sin.: *Chrysocoryne incrassata* (Phil.) Zoellner, *Leucocoryne incrassata* Phil., *Leucocoryne narcissoides* Phil., *Pabellonia incrassata* (Phil.) Quezada & Martic., *Stemmatium narcissoides* Phil.
Referencias: Ravenna, P. F., 1978b, 2000n.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*King, G. s.n.* (SGO)].

Leucocoryne curacavina Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2004b.

Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 5180* (BA)].

Leucocoryne dimorphopetala (Gay) Ravenna
Sin.: *Leucocoryne gayii* Baker, *Tristagma dimorphopetala* Gay
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a; Ravenna, P. F., 1978b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. 49a* (SGO)].

Leucocoryne editiana Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001d.
Hierba. Perenne. Endémica. 2200 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4088* (BA, BM, Herb. Ravenna, SGO)].

Leucocoryne foetida Phil.
Sin.: *Leucocoryne odorata* Lindl.
Referencias: Ravenna, P. F., 2000n; Zöllner, O., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(V, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 5648* (SGO)].

Leucocoryne fragrantissima Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 3205* (Herb. Ravenna)].

Leucocoryne fuscostriata Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000a.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. s.n.* (SGO)].

Leucocoryne gayii Baker = **Leucocoryne dimorphopetala** (Gay) Ravenna
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Leucocoryne gilliesioides (Phil.) Ravenna
Sin.: *Erinna gilliesioides* Phil.
Referencias: Ravenna, P. F., 2000a; Ravenna, P. F., 2004b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1400–1600 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO)].

Leucocoryne inclinata Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000a.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1000 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 6195* (SGO)].

Leucocoryne incrassata Phil. = **Leucocoryne coronata** Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000n.

Leucocoryne ixioides (Hook.) Lindl.
Sin.: *Brodiaea ixioides* Hook., *Leucocoryne pauciflora* Phil.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a; Zöllner, O., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1100 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pfister, A. 14136* (CONC), *Werdermann, E. 759* (SI)].

Leucocoryne ixioides (Hook.) Lindl. var. *purpurea* (Gay) Baker = **Leucocoryne purpurea** Gay
Referencias: Zöllner, O., 1972.

Leucocoryne leucogyna Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002f.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4356* (BA, BM, Herb. Ravenna)].

Leucocoryne lilacea Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000a.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4088* (SGO)].

Leucocoryne lurida Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000a.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 3316* (Herb. Ravenna)].

Leucocoryne macropetala Phil.
Sin.: *Chrysocoryne oxypetala* (Phil.) Zoellner, *Leucocoryne oxypetala* Phil., *Pabellonia oxypetala* (Phil.) Quezada & Martic.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a; Zöllner, O., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 800 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Behn, F. s.n.* (CONC)].

Leucocoryne maulensis Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2004b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4100a* (Herb. Ravenna)].

Leucocoryne modesta Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000n.
Hierba. Perenne. Endémica. 1300 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4093* (BA, BM, Herb. Ravenna, SGO)].

Leucocoryne mollensis Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000n.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4106* (BA, BM, Herb. Ravenna, SGO)].

Leucocoryne montana Phil.
Referencias: Philippi, R. A., 1896.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Borchers, A. s.n.* (*)].

Leucocoryne narcissoides Phil. = **Leucocoryne coronata** Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000n.

Leucocoryne odorata Lindl. = **Leucocoryne foetida** Phil.
Referencias: Ravenna, P. F., 2000n.

Leucocoryne oxypetala Phil. = **Leucocoryne macropetala** Phil.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Leucocoryne pachystyla Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002f.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4348* (BA, BM, Herb. Ravenna)].

Leucocoryne pauciflora Phil. = **Leucocoryne ixioides** (Hook.) Lindl.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a; Ravenna, P. F., 2000n.

Leucocoryne porphyrea Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000a.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1500 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 3314* (Herb. Ravenna)].

Leucocoryne praealta Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1200 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4083* (SGO)].

Leucocoryne purpurea Gay
Sin.: *Leucocoryne ixioides* (Hook.) Lindl. var. *purpurea* (Gay) Baker
Referencias: Zöllner, O., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grandjot, G. F. 450a* (SI)].

Leucocoryne quilimarina Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000n.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4096* (BM, Herb. Ravenna, SGO)].

Leucocoryne reflexa Grau = **Leucocoryne alliacea** Miers ex Lindl.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Leucocoryne rungensis Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2004b.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1100 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4100* (BA)].

Leucocoryne simulans Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1800–2000 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 2902* (Herb. Ravenna)].

Leucocoryne subulata Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000n.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4154* (BA, BM, Herb. Ravenna, SGO)].

Leucocoryne taguataguensis Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2004b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Macaya, J. s.n.* (BA)].

Leucocoryne talinensis L. Mansur & M. Cisternas
Referencias: Mansur, L. M. & Cisternas, M. A., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–300 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Mansur, L. M. 1* (CONC, SI)].

Leucocoryne tricornis Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000n.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4153* (Herb. Ravenna, SGO)].

Leucocoryne ungulifera Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2004b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Medina, R. A. s.n.* (BA)].

Leucocoryne uniflora (Lindl.) Greene = **Ipheion uniflorum** (Lindl.) Raf.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Leucocoryne valparadisea Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000a.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 3454* (Herb. Ravenna)].

Leucocoryne violacescens Phil.
Referencias: Zöllner, O., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 5655* (SGO)].

Leucocoryne vittata Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000a.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 3202* (Herb. Ravenna)].

Leucocoryne volkmanni (Phil.) Engl. = **Leucocoryne volkmanni** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1967.

Leucocoryne volkmanni (Phil.) Traub
Sin.: *Latace volkmanni* Phil., *Leucocoryne volkmanni* (Phil.) Engl.
Referencias: Krause, J. W., 1930; Philippi, R. A., 1889; Ravenna, P. F., 2000f; Traub, H. P., 1967.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Volkmann, H. s.n.* (B)].

Maligia gracilis (Dryand. ex Aiton) Raf. = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Referencias: Stearn, W. T., 1986.

Miersia Lindl.

Número de especies: 4 endémicas

Miersia chilensis Lindl. var. **bicolor** M. Muñoz
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2003a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz-Schick, M. 4120* (SGO)].

Miersia chilensis Lindl. var. **chilensis**
Sin.: *Miersia major* Kunth, *Miersia minor* Kunth, *Miersia myodes* Bertero, *Miersia rusbyi* Britton
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(IV, V, VI, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz, N. s.n.* (SGO), *Werdermann, E. 26* (SI)].

Miersia cornuta Phil.
Referencias: Ravenna, P. F., 2000c.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–900 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grandjot, G. F. s.n.* (SI), *Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Miersia leporina Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000c.
Hierba. Perenne. Endémica. 800 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4180* (BA, BM, Herb. Ravenna, SGO)].

Miersia major Kunth = **Miersia chilensis** Lindl. var. **chilensis**
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Miersia minor Kunth = **Miersia chilensis** Lindl. var. **chilensis**
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Miersia myodes Bertero = **Miersia chilensis** Lindl. var. **chilensis**
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Miersia rusbyi Britton = **Miersia chilensis** Lindl. var. **chilensis**
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Miersia scalae Gunckel = **Gilliesia montana** Poepp. & Endl.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a; Ravenna, P. F., 2000g.

Miersia tenuiseta Ravenna f. **castanea** Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 1300* (BA, Herb. Ravenna)].

Miersia tenuiseta Ravenna f. **tenuiseta**
Referencias: Ravenna, P. F., 2000c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 1299* (BA, Herb. Ravenna)].

Milla aurea (Lindl.) Baker = **Nothoscordum montevidense** Beauverd subsp. **montevidense**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Milla bonariensis Gillies ex Baker = **Ipheion uniflorum** (Lindl.) Raf.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Milla brevipes (Kunze) Baker = **Tristagma brevipes** (Kunze) Traub

Milla hirtella (Kunth) Baker = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Milla leichtlinii Baker = **Tristagma leichtlinii** (Baker) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1971a.

Milla macrostemon (Kunth) Baker = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **macrostemon** (Kunth) Guagl.

Milla macrostemon (Kunth) Baker var. *gracilis* (Dryand. ex Aiton) Baker = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **macrostemon** (Kunth) Guagl.

Milla nivalis (Poepp.) Baker = **Tristagma nivale** Poepp. f. **australe** (Neger ex Dusén) Ravenna
Referencias: Moore Jr., H. E., 1953.

Milla patagonica Baker = **Tristagma patagonicum** (Baker) Traub
Referencias: Ravenna, P. F., 1969f.

Milla poeppigiana (Gay) Baker = **Tristagma poeppigianum** (Gay) Traub

Milla porrifolia (Poepp.) Baker = **Tristagma bivalve** (Lindl.) Traub

Milla sellowiana (Kunth) Baker = **Ipheion sellowianum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Milla sessiliflora Baker = **Ipheion sessile** (Phil.) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Milla setacea Baker = **Ipheion setaceum** (Baker) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Milla tweedieana (Baker) Griseb. = **Ipheion tweedieanum** (Baker) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Milla uniflora (Lindl.) Graham ex Jameson = **Ipheion uniflorum** (Lindl.) Raf.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1995.

Milla uniflora (Lindl.) Graham ex Jameson var. *tweedieana* Baker = **Ipheion tweedieanum** (Baker) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Milla violacea (Kunth) Baker = **Ipheion vittatum** (Griseb.) Traub
Referencias: Moore Jr., H. E., 1953.

Milla vittata Griseb. = **Ipheion vittatum** (Griseb.) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum Kunth

Número de especies: 73, 63 endémicas

Nothoscordum achalense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1990a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1800 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 26318* (MERL)].

Nothoscordum albitractum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001h.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tello, H. 27* (LP)].

Nothoscordum altillanense Ravenna & Biurrun
Referencias: Ravenna, P. F., 2002a, e.
Hierba. Anual. Endémica. 1600–1700 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ravenna, P. F. 4908* (BA, Herb. Ravenna, IZAC)].

Nothoscordum andalgalense Ravenna, nom. nud. = **Nothoscordum arenarium** Herter

Nothoscordum andicolum Kunth
Sin.: *Allium andicola* (Kunth) Regel, *Allium bivalve* (L.) Kuntze var. *andicola* (Kunth) Kuntze
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972; Núñez, O., Frayssinet, N. & Rodríguez, R. H., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4100 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 3121* (SI)].

Nothoscordum andinum (Poepp.) Fuentes = **Zoellnerallium andinum** (Poepp.) Crosa
Referencias: Crosa, O., 1975a.

Nothoscordum aparadense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 3870* (BA, BM, R, RB)].

Nothoscordum arenarium Herter
Sin.: *Nothoscordum andalgalense* Ravenna, nom. nud.
Referencias: Crosa, O., 1972; Guaglianone, E. R., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LRI, SAL); URY(COL, MON, RNO, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22503* (SI)]; URY[*Felippone, F. 4658* (SI)].

Nothoscordum aureum (Lindl.) I.M. Johnst. & Parodi = **Nothoscordum montevidense** Beauverd subsp. **montevidense**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum balaenense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1971a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: URY(MAL).
Ejemplares de referencia: URY[*Ravenna, P. F. 1030* (Herb. Ravenna)].

Nothoscordum basalticum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1991c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ravenna, P. F. 3359* (BA, BM, G, Herb. Ravenna, K, MBM, NY, SI)].

Nothoscordum beauverdianum Herter, nom. nud. = **Nothoscordum gaudichaudianum** Kunth
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum bivalve auct. non (L.) Britton = **Zoellnerallium andinum** (Poepp.) Crosa
Referencias: Crosa, O., 1975a.

Nothoscordum bivalve (L.) Britton var. **bivalve**
Sin.: *Allium bivalve* (L.) Kuntze, *Allium bivalve* (L.) Kuntze var. *sellowianum* (Kunth) Kuntze, *Allium bivalve* (L.) Kuntze var. *striatum* (Jacq.) Kuntze, *Allium ornithogaloides* Walter, *Allium striatum* Jacq., *Geboscon bivalve* (L.) House, *Nothoscordum sellowianum* Kunth, *Nothoscordum striatum* (Jacq.) Kunth, *Oligosma bivalve* (L.) Salisb., *Ornithogalum bivalve* L.

Referencias: Guaglianone, E. R., 1972; Núñez, O., Frayssinet, N. & Rodríguez, R. H., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, ERI, NEU); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26915* (SI)].

Nothoscordum bivalve (L.) Britton var. **nanum** (Griseb.) Guagl.
Sin.: *Allium striatellum* Lindl. var. *nanum* Griseb.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 28571* (SI)].

Nothoscordum boliviense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1978b.
Hierba. Perenne. Nativa. 2300–3500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 2947* (LP)].

Nothoscordum bonariense (Pers.) Beauverd
Sin.: *Gagea bonariensis* (Pers.) Roem. & Schult., *Nothoscordum poiretii* Kunth, *Nothoscordum spathaceum* (Poir.) Parodi, *Ornithogalum bonariense* Pers., *Ornithogalum spathaceum* Poir., hom. illeg.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972; Núñez, O., Frayssinet, N. & Rodríguez, R. H., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(RGS, SCA); URY(CAS, FLA, MAL, MON, PAY, ROC, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 18053* (SI)]; BRA[*Lourteig, A. 2147* (NY)]; URY[*Rosengurtt, B. 10621* (MVFA)].

Nothoscordum bonariense (Pers.) Beauverd var. *flavum* auct. non Kuntze = **Nothoscordum montevidense** Beauverd subsp. **montevidense**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum bonariense (Pers.) Beauverd var. *flavum* Kuntze = **Ipheion dialystemon** Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1971.

[Nothoscordum borbonicum Kunth]
Referencias: Ravenna, P. F., 1991e.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Nothoscordum brevispathum Phil. = **Zoellnerallium andinum** (Poepp.) Crosa
Referencias: Crosa, O., 1975a.

Nothoscordum calderense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003a.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29752* (SI)].

Nothoscordum cambarense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2004a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 12280* (MBM)].

Nothoscordum canescens Beauverd = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum capivarinum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1978b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 1095* (Herb. Ravenna, K, NY, SI)].

Nothoscordum castilloi T.M. Howard
Referencias: Howard, T. M., 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Howard, T. M. 86-6* (MO)].

Nothoscordum catharinense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1988d.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 3205b* (BM, G, HBR, Herb. Ravenna, K, MBM, NY), *Sehnem, A. 4287* (SI)].

Nothoscordum clevelandicum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1991i.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 3347* (Herb. Ravenna)].

Nothoscordum collinum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1989a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 3162* (BM, Herb. Ravenna, MBM, NY, SI)].

Nothoscordum conostylum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1991a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 28573* (SI)].

Nothoscordum correntinum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1991b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 7917* (SI)].

Nothoscordum curvipes Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1991c.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 3388* (BM, Herb. Ravenna, MBM)].

Nothoscordum cuyanum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1800–2500 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 24529* (LP)].

Nothoscordum dialsystemon (Guagl.) Crosa = **Ipheion dialystemon** Guagl.
Referencias: Crosa, O., 1975b.

Nothoscordum dynamiandrum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001h.
Hierba. Perenne. Nativa. 2900–3800 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 27407* (SI)].

Nothoscordum entrerianum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1973b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 16178* (SI), *Ravenna, P. F. 1975* (Herb. Ravenna, SI)].

Nothoscordum euosmum (Link & Otto) Kunth = **Nothoscordum nudicaule** (Lehm.) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum exile Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1978b.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 1016* (Herb. Ravenna, K, NY, SI, TRA)].

Nothoscordum famatinense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002a.
Hierba. Perenne. Nativa. 2800–4000 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Flossdorf, A. 7* (SI)].

Nothoscordum felipponei auct. non Beauverd = **Ipheion dialystemon** Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1971.

Nothoscordum felipponei Beauverd = **Ipheion sellowianum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum felipponei Beauverd subsp. *lorentzii* (Herter) Ravenna = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum flavescens Kunth
Referencias: Fuentes, F., 1921; Traub, H. P., 1954.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Poeppig, E. F. s.n.* (B)].

Nothoscordum fragans (Vent.) Kunth = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Referencias: Stearn, W. T., 1986.

Nothoscordum gaudichaudianum Kunth
Sin.: *Allium bivalve* (L.) Kuntze var. *gaudichaudianum* (Kunth) Kuntze, *Nothoscordum beauverdianum* Herter, nom. nud., *Nothoscordum grossibulbum* Beauverd
Referencias: Crosa, O., 1972; Guaglianone, E. R., 1972; Núñez, O., Frayssinet, N. & Rodríguez, R. H., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); URY(LAV, MAL, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25695* (SI)]; URY[*Izaguirre, P. 1321* (SI)].

Nothoscordum gibbatum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1991k.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Mattos, J. R. 8016* (FLOR, Herb. Ravenna), *Reitz, P. R. 2936* (HBR)].

Nothoscordum glareosum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002e.
Hierba. Anual. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 25816* (CTES)].

Nothoscordum gracile (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Sin.: *Allium bivalve* (L.) Kuntze var. *fragrans* (Vent.) Kuntze, *Allium fragans* Vent., *Allium fragans* Vent. var. *nepalense* Lindl., *Allium gracile* Dryand. ex Aiton, *Allium inodorum* auct. non Sol. ex Aiton, *Geboscon fragrans* (Vent.) House, *Hesperocles fragans* (Vent.) Salisb., *Maligia gracilis* (Dryand. ex Aiton) Raf., *Nothoscordum fragans* (Vent.) Kunth, *Nothoscordum inodorum* (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson, *Nothoscordum inodorum* auct. non (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Stearn, W. T., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, RNE, SFE); BRA(RGS); CHL(IV, V, VI, VIII, IX, X, RME); PRY(ITA); URY(MAL, MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1790* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 4944* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 4578* (CONC)]; PRY[*Schrottky, C. 7* (SI)]; URY[*Felippone, F. 2178* (SI)].

Nothoscordum gracile (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **macrostemon** (Kunth) Guagl.
Sin.: *Milla macrostemon* (Kunth) Baker, *Milla macrostemon* (Kunth) Baker var. *gracilis* (Dryand. ex Aiton) Baker, *Nothoscordum inodorum* (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson subsp. *nocturnum* Ravenna, *Nothoscordum inodorum* (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson var. *macrostemon* (Dryand. ex Aiton) Stearn, *Nothoscordum inodorum* (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson var. *uruguayense* Beauverd, *Nothoscordum macrostemon* Kunth, *Sowerbaea americana* Spreng. ex Baker
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972, 1995; Núñez, O., Frayssinet, N. & Rodríguez, R. H., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI); BRA(RGS); PRY(ITA); URY(FLA, MAL, MON, RIV, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lanfranchi, A. E. 15* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 1642* (SI)]; PRY[*Osten, C. 8015* (MVM)]; URY[*Herter, W. G. F. 354* (SI)].

Nothoscordum gracilipes Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1988d.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24139* (MBM), *Ravenna, P. F. 3229* (BM, Herb. Ravenna, K, MBM, NY)].

Nothoscordum gramineum (Sims) Beauverd var. **gramineum**
Sin.: *Allium striatellum* Lindl., *Nothoscordum striatellum* (Lindl.) Kunth, *Ornithogalum gramineum* Sims
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Cabrera, A. L., 1969[1968]b; Crosa, O., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); CHL(V, VI, VIII, IX, X, RME); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 5412* (BAB, LP)]; CHL[*Looser, G. 3306* (CONC)].

Nothoscordum gramineum (Sims) Beauverd var. **philippianum** (Koch & Bouché) Beauverd
Sin.: *Nothoscordum philippianum* Koch & Bouché
Referencias: Cabrera, A. L., 1969[1968]b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14883* (LP)].

Nothoscordum graminifolium (Phil.) Traub = **Tristagma graminifolium** (Phil.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1978b.

Nothoscordum grossibulbum Beauverd = **Nothoscordum gaudichaudianum** Kunth
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum hirtellum (Kunth) Herter = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum hirtellum (Kunth) Herter subsp. *lorentzii* (Herter) Ravenna = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub

Nothoscordum ibiramense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1990b.
Hierba. Perenne. Endémica. 100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 609* (HBR, Herb. Ravenna)].

Nothoscordum inodorum (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Referencias: Stearn, W. T., 1986.

Nothoscordum inodorum auct. non (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Referencias: Stearn, W. T., 1986.

Nothoscordum inodorum (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson var. *euosmum* (Link & Otto) Beauverd = **Nothoscordum nudicaule** (Lehm.) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum inodorum (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson var. *macrostemon* (Dryand. ex Aiton) Stearn = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **macrostemon** (Kunth) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum inodorum (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson var. *uruguayense* Beauverd = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **macrostemon** (Kunth) Guagl.

[Nothoscordum inodorum (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson subsp. angustius Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 1978b.
Notas: Nombre dudoso.

Nothoscordum inodorum (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson subsp. *nocturnum* Ravenna = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **macrostemon** (Kunth) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1995.

Nothoscordum ipacarainum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1991i.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. s.n.* (SI)].

Nothoscordum itatiense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 5521* (C, CTES)].

Nothoscordum izaguirreae Crosa
Referencias: Crosa, O., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: URY(LAV).
Ejemplares de referencia: URY[*Crosa, O. s.n.* (MVFA, SI)].

Nothoscordum leptogynum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1991a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rosengurtt, B. 9134* (SI)].

Nothoscordum lloydiflorum Beauverd = **Ipheion vittatum** (Griseb.) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum lorentzii (Herter) Ravenna = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum luteomajus Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19880* (Herb. Ravenna, MBM)].

Nothoscordum macrantherum (Kuntze) Beauverd
Sin.: *Allium macrantherum* Kuntze
Referencias: Beauverd, G., 1908.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(PAI).

Nothoscordum macrostemon Kunth = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **macrostemon** (Kunth) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1995.

Nothoscordum mahui Traub
Referencias: Traub, H. P., 1973.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–400 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Mahu, M. s.n.* (TRA)].

Nothoscordum marchesii Crosa
Referencias: Crosa, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Augusto, I. s.n.* (ICN)]; URY[*Crosa, O. s.n.* (MVFA, SI)].

Nothoscordum minarum Beauverd = **Nothoscordum montevidense** Beauverd subsp. **minarum** (Beauverd) Ravenna
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum moconense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1990b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 718* (SI)].

Nothoscordum modestum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1991b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jörgensen, P. 4757* (BM, SI)].

Nothoscordum montevidense Beauverd var. *latitepalum* Guagl. = **Nothoscordum montevidense** Beauverd subsp. **latitepalum** (Guagl.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1978b.

Nothoscordum montevidense Beauverd var. *minarum* (Beauverd) Guagl. = **Nothoscordum montevidense** Beauverd subsp. **minarum** (Beauverd) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1978b.

Nothoscordum montevidense Beauverd subsp. **latitepalum** (Guagl.) Ravenna
Sin.: *Nothoscordum montevidense* Beauverd var. *latitepalum* Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972; Ravenna, P. F., 1978b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA); URY(FLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 728* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 7330b* (SI)].

Nothoscordum montevidense Beauverd subsp. **minarum** (Beauverd) Ravenna
Sin.: *Nothoscordum minarum* Beauverd, *Nothoscordum montevidense* Beauverd var. *minarum* (Beauverd) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972; Núñez, O., Frayssinet, N. & Rodríguez, R. H., 1972; Ravenna, P. F., 1978b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI); BRA(RGS); URY(CLA, LAV, MAL, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 28549* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 43706* (CTES)]; URY[*Osten, C. 5147* (MVM)].

Nothoscordum montevidense Beauverd subsp. **montevidense**
Sin.: *Allium bonariense* Griseb., *Allium bonariense* Griseb. var. *flavum* Kuntze, *Milla aurea* (Lindl.) Baker, *Nothoscordum aureum* (Lindl.) I.M. Johnst. & Parodi, *Nothoscordum bonariense* (Pers.) Beauverd var. *flavum* auct. non Kuntze, *Triteleia aurea* Lindl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1969[1968]b; Guaglianone, E. R., 1972; Núñez, O., Frayssinet, N. & Rodríguez, R. H., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, MIS, SFE); URY(COL, LAV, MAL, MON, RIV, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 28554* (SI)]; URY[*Osten, C. 3717* (MVM)].

Nothoscordum muscorum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1991k.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 4951* (HBR, Herb. Ravenna, PACA)].

Nothoscordum nidulans Phil.
Referencias: Fuentes, F., 1921; Philippi, R. A., 1896; Traub, H. P., 1954.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*sin colector s.n.* (SGO)].

Nothoscordum nublense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1973b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 2053* (Herb. Ravenna, NY, SGO)].

Nothoscordum nudicaule (Lehm.) Guagl.
Sin.: *Allium euosmon* Link & Otto, *Allium nudicaule* Lehm., *Nothoscordum euosmum* (Link & Otto) Kunth, *Nothoscordum inodorum* (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson var. *euosmum* (Link & Otto) Beauverd
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972; Núñez, O., Frayssinet, N. & Rodríguez, R. H., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COS, ERI, MEN, RNE, TUC); BRA(RGS); URY(MAL, RIV, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 2971* (SI)]; BRA[*Rambo, B. s.n.* (SI)]; URY[*Osten, C. 17759* (MVM)].

Nothoscordum nudum Beauverd
Referencias: Beauverd, G., 1908; Crosa, O., 1972; Guaglianone, E. R., 1972; Núñez, O., Frayssinet, N. & Rodríguez, R. H., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); URY(LAV, MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 27672* (SI)]; URY[*Osten, C. 4689* (MVM)].

Nothoscordum nutans Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2004a.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 3200* (Herb. Ravenna, MBM)].

Nothoscordum ostenii Beauverd
Referencias: Beauverd, G., 1908; Guaglianone, E. R., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(PAY).
Ejemplares de referencia: URY[*Herter, W. G. F. 437* (SI)].

Nothoscordum pachyrhizum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1991g.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(CLA).
Ejemplares de referencia: URY[*Felippone, F. 3525* (SI), *Ravenna, P. F. 3331* (BM, SI)].

Nothoscordum paradoxum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1991g.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(DUR).
Ejemplares de referencia: URY[*Del Puerto, O. 60* (SI)].

Nothoscordum patricium Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1991d.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26624* (SI)].

Nothoscordum philippianum Koch & Bouché = **Nothoscordum gramineum** (Sims) Beauverd var. **philippianum** (Koch & Bouché) Beauverd
Referencias: Cabrera, A. L., 1969[1968]b.

Nothoscordum planifolium Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2004a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(LAV).
Ejemplares de referencia: URY[*Ravenna, P. F. 1898* (Herb. Ravenna)].

Nothoscordum poeppigii Kunth = **Zoellnerallium andinum** (Poepp.) Crosa
Referencias: Crosa, O., 1975a.

Nothoscordum poiretii Kunth = **Nothoscordum bonariense** (Pers.) Beauverd
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum portoalegrense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1991h.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 3354* (MBM, SI)].

Nothoscordum punillense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1200 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lossen, W. 262* (SI)].

Nothoscordum rigidiscapum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001h.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(LAV).
Ejemplares de referencia: URY[*Ravenna, P. F. 3116* (Herb. Ravenna)].

Nothoscordum saltense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000h.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 1916* (SI)].

Nothoscordum scabridulum Beauverd = **Zoellnerallium serenense** (Ravenna) Crosa
Referencias: Crosa, O., 2004

Nothoscordum sellowianum Kunth = **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **bivalve**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum sellowianum Kunth var. *brevispathum* (Phil.) Fuertes = **Zoellnerallium andinum** (Poepp.) Crosa
Referencias: Crosa, O., 1975a.

Nothoscordum sengesianum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1991j.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 53624* (BM, MBM, NY, SI)].

Nothoscordum serenense Ravenna = **Zoellnerallium serense** (Ravenna) Crosa
Referencias: Crosa, O., 2004.

Nothoscordum sessile (R.E. Fr.) Beauverd = **Oziroë acaulis** (Baker) Speta

Nothoscordum setaceum (Baker) Ravenna = **Ipheion setaceum** (Baker) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum spathaceum (Poir.) Parodi = **Nothoscordum bonariense** (Pers.) Beauverd
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum stenandrum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1989c.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 3329* (BM, MBM, SI)].

Nothoscordum striatellum (Lindl.) Kunth = **Nothoscordum gramineum** (Sims) Beauverd var. **gramineum**

Nothoscordum striatum (Jacq.) Kunth = **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **bivalve**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum strictum Gay = **Zoellnerallium andinum** (Poepp.) Crosa
Referencias: Crosa, O., 1975a.

Nothoscordum subbiflorum (Colla) Walp. = **Tristagma subbiflorum** (Colla) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1978b.

Nothoscordum subsessile Beauverd = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum subtile Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001h.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(PAY).
Ejemplares de referencia: URY[*Ravenna, P. F. 3117* (Herb. Ravenna)].

Nothoscordum tafiense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002c.
Hierba. Perenne. Endémica. 2900–3100 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gómez Sosa, E. V. 246* (SI), *Venturi, S. 4667* (SI)].

Nothoscordum tarijanum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002c.
Hierba. Perenne. Nativa. 2200–2800 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31564* (SI)].

Nothoscordum tenuifolium Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1989a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 3449* (SI)].

Nothoscordum tibaginum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1991j.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3887* (Herb. Ravenna, MBM)].

Nothoscordum tricostatum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002c.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 34921* (BAB)];

Nothoscordum uniflorum Baker = **Ipheion vittatum** (Griseb.) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum uruguaianum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1989c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 3330* (BM, Herb. Ravenna, MBM, SI)].

Nothoscordum velazcoënse Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002a, b.
Hierba. Perenne. Endémica. 2400–3500 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 976* (SI)].

[Nothoscordum vernum Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

Nothoscordum vittatum (Griseb.) Ravenna = **Ipheion vittatum** (Griseb.) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Nothoscordum yalaënse Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2700–2900 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 10097* (CTES)].

Nothoscordum yatainum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002e.
Hierba. Anual. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 27300* (CTES)].

Oligosma bivalve (L.) Salisb. = **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **bivalve**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Ornithogalum andinum Poepp. = **Zoellnerallium andinum** (Poepp.) Crosa
Referencias: Crosa, O., 1975a.

Ornithogalum bivalve L. = **Nothoscordum bivalve** (L.) Britton var. **bivalve**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Ornithogalum bonariense Pers. = **Nothoscordum bonariense** (Pers.) Beauverd
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Ornithogalum gramineum Sims = **Nothoscordum gramineum** (Sims) Beauverd var. **gramineum**
Referencias: Cabrera, A. L., 1969[1968]b.

Ornithogalum spathaceum Poir., hom. illeg. = **Nothoscordum bonariense** (Pers.) Beauverd
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Pabellonia incrassata (Phil.) Quezada & Martic. = **Leucocoryne coronata** Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000n.

Pabellonia oxypetala (Phil.) Quezada & Martic. = **Leucocoryne macropetala** Phil.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Schickendantzia trichosepala Speg. = **Schickendantziella trichosepala** (Speg.) Speg.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Schickendantziella (Speg.) Speg.

Número de especies: 1 endémica

Schickendantziella trichosepala (Speg.) Speg.
Sin.: *Schickendantzia trichosepala* Speg.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 2476* (SI)].

Solaria atropurpurea (Phil.) Ravenna = **Gethyum atropurpureum** Phil.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Solaria cuspidata (Harv. ex Baker) Ravenna = **Gethyum cuspidatum** (Harv. ex Baker) M. Muñoz
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Solaria major Reiche = **Gethyum atropurpureum** Phil.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Sowerbaea americana Spreng. ex Baker = **Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **macrostemon** (Kunth) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1995.

Speea Loes.

Número de especies: 1 endémica

Speea humilis (Phil.) Loes. ex E.H.L. Krause
Sin.: *Speea triloba* Ravenna
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a; Ravenna, P. F., 1978b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz-Schick, M. 3988* (SGO)].

Speea triloba Ravenna = **Speea humilis** (Phil.) Loes. ex E.H.L. Krause
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Steinmannia graminifolia Phil. = **Tristagma graminifolium** (Phil.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1978b.

Stemmatium narcissoides Phil. = **Leucocoryne coronata** Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000n.

Tristagma Poepp.

Número de especies: 20 endémicas

Tristagma ameghinoi (Speg.) Speg.
Sin.: *Brodiaea ameghinoi* Speg.
Referencias: Faúndez, L. & Macaya, J., 2000; Ravenna, P. F., 1969f, 1971b.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, SCR); CHL(XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 4799* (SI), *Correa, M. N. 4815* (SI)]; CHL[*Faúndez, L. s.n.* (SGO)].

Tristagma anemophilum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1969f.
Hierba. Perenne. Endémica. 2200 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11523* (BAA, BAB, SI)].

Tristagma atreucoense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001i.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11542* (BAA, BAB, SI)].

Tristagma australe Neger ex Dusén = **Tristagma nivale** Poepp. f. **australe** (Neger ex Dusén) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1969f.

Tristagma bivalve (Lindl.) Traub
Sin.: *Brodiaea porrifolia* F. Meigen, *Milla porrifolia* (Poepp.) Baker, *Tristagma porrifolia* (Poepp.) Traub, *Triteleia bivalvis* Lindl., *Triteleia porrifolia* Poepp.
Referencias: Traub, H. P., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 6* (SI)].

[Tristagma brevipes (Kunze) Traub]
Sin.: *Milla brevipes* (Kunze) Baker, *Triteleia brevipes* Kunze
Notas: Nombre dudoso.

Tristagma chubutense Gand. = **Tristagma nivale** Poepp. f. **nivale**
Referencias: Ravenna, P. F., 1969f.

Tristagma circinatum (Sandwith) Traub
Sin.: *Brodiaea circinata* Sandwith
Referencias: Sandwith, N. Y., 1937; Traub, H. P., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 1253* (SI)].

Tristagma dimorphopetala Gay = **Leucocoryne dimorphopetala** (Gay) Ravenna
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Tristagma eremophyllum Speg. = **Tristagma nivale** Poepp. f. **nivale**
Referencias: Ravenna, P. F., 1969f.

Tristagma felipponei (Beauverd) Traub = **Ipheion sellowianum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Tristagma fragans Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001i.
Hierba. Perenne. Endémica. 2300–3200 m.
Países: CHL(IV, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Morrison, J. L. 16663* (SI), *Ravenna, P. F. 3070* (BA, BM)].

Tristagma gracile (Phil.) Traub
Sin.: *Triteleia gracilis* Phil.
Referencias: Traub, H. P., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Volkmann, H. s.n.* (SGO)].

Tristagma graminifolium (Phil.) Ravenna
Sin.: *Garaventia graminifolia* (Phil.) Looser, *Nothoscordum graminifolium* (Phil.) Traub, *Steinmannia graminifolia* Phil.
Referencias: Crosa, O., 1988; Ravenna, P. F., 1978b.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–700 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grandjot, G. F. s.n.* (SI)].
Notas: Probablemente crezca en Argentina.

Tristagma hirtellum (Kunth) Traub = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Tristagma inflatum Rendle = **Tristagma nivale** Poepp. f. **australe** (Neger ex Dusén) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1969f.

Tristagma leichtlinii (Baker) Ravenna
Sin.: *Milla leichtlinii* Baker
Referencias: Ravenna, P. F., 1971a.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(RME).

Tristagma lineatum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001i.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–1000 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 2262* (BA)].

Tristagma lloydiflorum (Beauverd) Traub = **Ipheion vittatum** (Griseb.) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Tristagma lorentzii (Herter) Traub = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Tristagma malalhuense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001i.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2800 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Serra, L. 87* (LP)].

Tristagma nahuelhuapinum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001i.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Richencq, C. 184* (SI)].

Tristagma nivale Poepp. f. **australe** (Neger ex Dusén) Ravenna
Sin.: *Milla nivalis* (Poepp.) Baker, *Tristagma australe* Neger ex Dusén, *Tristagma inflatum* Rendle, *Tristagma pulchellum* Speg.
Referencias: Ravenna, P. F., 1969f.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2633* (BAB, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 870245* (CONC)].

Tristagma nivale Poepp. f. **nivale**
Sin.: *Tristagma chubutense* Gand., *Tristagma eremophyllum* Speg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Ravenna, P. F., 1969f.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–1900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF); CHL(IV, VI, VIII, IX, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Donat, A. 312* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92180* (CONC, SGO)].

Tristagma patagonicum (Baker) Traub
Sin.: *Brodiaea patagonica* (Baker) Baker, *Brodiaea viridor* Killip, *Milla patagonica* Baker, *Tristagma viridor* (Killip) Traub, *Triteleia patagonica* (Speg.) Speg.
Referencias: Faúndez, L. & Macaya, J., 2000; Ravenna, P. F., 1969f, 2001i.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 880* (SI)]; CHL[*Faúndez, L. s.n.* (SGO)].

Tristagma peregrinans Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1978b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(RIV).
Ejemplares de referencia: URY[*Ravenna, P. F. 541* (Herb. Ravenna)].
Notas: Probablemente crezca en Argentina.

[Tristagma philippii Gand.]
Notas: Nombre dudoso.

Tristagma poeppigianum (Gay) Traub
Sin.: *Milla poeppigiana* (Gay) Baker, *Triteleia poeppigiana* Gay
Referencias: Gay, C., 1853; Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Traub, H. P., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica. 2400 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grandjot, G. F. 3526* (SI)].
Notas: Cita dudosa para la flora Argentina.

Tristagma porrifolia (Poepp.) Traub = **Tristagma bivalve** (Lindl.) Traub

Tristagma pulchellum Speg. = **Tristagma nivale** Poepp. f. **australe** (Neger ex Dusén) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1969f.

Tristagma recurvifolium (C.H. Wright) Traub = **Ipheion sessile** (Phil.) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Tristagma sellowianum (Kunth) Traub = **Ipheion sellowianum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Tristagma sessile (Phil.) Traub = **Ipheion sessile** (Phil.) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Tristagma setaceum (Baker) Traub = **Ipheion setaceum** (Baker) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Tristagma sociale Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001i.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–2800 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 8501* (LP, SI)].

Tristagma spegazzinii (Macloskie) Traub
Sin.: *Brodiaea patagonica* Speg., hom. illeg., *Brodiaea spegazzinii* Macloskie
Referencias: Ravenna, P. F., 2001i; Traub, H. P., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU); CHL(XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 1251* (SI), *Koslowsky, J. 12430* (SI)]; CHL[*Faúndez, L. s.n.* (SGO)].

Tristagma staminosum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001i.
Hierba. Perenne. Endémica. 1800 m.
Países: CHL(VI, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 2871* (BA)].

Tristagma subbiflorum (Colla) Ravenna
Sin.: *Allium subbiflorum* Colla, *Brodiaea subbiflora* (Colla) Baker, *Nothoscordum subbiflorum* (Colla) Walp., *Triteleia berteri* Kunth
Referencias: Ravenna, P. F., 1978b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. s.n.* (*)].

Tristagma tweedieana (Baker) Traub = **Ipheion tweedieanum** (Baker) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Tristagma uniflorum (Lindl.) Traub = **Ipheion uniflorum** (Lindl.) Raf.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

[Tristagma violaceum (Kunth) Traub]
Sin.: *Triteleia violacea* Kunth
Notas: Nombre dudoso.

Tristagma viridor (Killip) Traub = **Tristagma patagonicum** (Baker) Traub
Referencias: Ravenna, P. F., 1969f.

Tristagma vittatum (Griseb.) Traub = **Ipheion vittatum** (Griseb.) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Triteleia aurea Lindl. = **Nothoscordum montevidense** Beauverd subsp. **montevidense**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Triteleia berteri Kunth = **Tristagma subbiflorum** (Colla) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1978b.

Triteleia bivalvis Lindl. = **Tristagma bivalve** (Lindl.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1963.

Triteleia brevipes Kunze = **Tristagma brevipes** (Kunze) Traub

Triteleia gracilis Phil. = **Tristagma gracile** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1963.

Triteleia hirtella Kunth = **Ipheion hirtellum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Triteleia patagonica (Speg.) Speg. = **Tristagma patagonicum** (Baker) Traub
Referencias: Ravenna, P. F., 1969f.

[Triteleia patagonica (Speg.) Speg. var. angustiloba Speg.]
Referencias: Ravenna, P. F., 1969f.
Notas: Nombre dudoso.

Triteleia poeppigiana Gay = **Tristagma poeppigianum** (Gay) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1963.

Triteleia porrifolia Poepp. = **Tristagma bivalve** (Lindl.) Traub

Triteleia sellowiana Kunth = **Ipheion sellowianum** (Kunth) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Triteleia sessilis Phil. = **Ipheion sessile** (Phil.) Traub
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Triteleia uniflora Lindl. = **Ipheion uniflorum** (Lindl.) Raf.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1972.

Triteleia violacea Kunth = **Tristagma violaceum** (Kunth) Traub

Zoellnerallium Crosa

Número de especies: 2 endémicas

Zoellnerallium andinum (Poepp.) Crosa
Sin.: *Allium poeppigii* Kunth, *Nothoscordum andinum* (Poepp.) Fuentes, *Nothoscordum bivalve* auct. non (L.) Britton, *Nothoscordum brevispathum* Phil., *Nothoscordum poeppigii* Kunth, *Nothoscordum sellowianum* Kunth var. *brevispathum* (Phil.) Fuertes, *Nothoscordum strictum* Gay, *Ornithogalum andinum* Poepp.
Referencias: Crosa, O., 1975a; Fuentes, F., 1921; Guaglianone, E. R., 1973.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU); CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 3244* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 199* (SI)].

Zoellnerallium serenense (Ravenna) Crosa
Sin.: *Nothoscordum serenense* Ravenna.
Referencias: Crosa, O., 2004; Ravenna, P. F., 1973b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 2003* (NY, SGO)].

ALSTROEMERIACEAE

Autor: Sanso, A. M.
Revisor: Muñoz, M.

3 géneros, 52 especies, 39 especies endémicas.

Alstroemeria L.

Número de especies: 44, 37 endémicas

Alstroemeria achirae M. Muñoz & Brinck
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003; Muñoz-Schick, M., 2000b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–1900 m.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Brinck, A. s.n.* (SGO)].

Alstroemeria albiflora C. Presl = **Alstroemeria pallida** Graham
Referencias: Bayer, E., 1987; Sanso, A. M., 1996.

Alstroemeria amabilis M.C. Assis
Referencias: Assis, M. C., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1400–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kummrow, R. 3387* (MBM)].

Alstroemeria amoena Salisb. = **Alstroemeria pelegrina** L.
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria andina Phil. var. **andina**
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2900–3700 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. s.n.* (SGO), *Marticorena, C. 536* (CONC)].

Alstroemeria andina Phil. var. **venustula** (Phil.) M. Muñoz
Sin.: *Alstroemeria andina* Phil. subsp. *venustula* (Phil.) Ehr. Bayer, *Alstroemeria venustula* Phil.
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Sanso, A. M., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 2300–3700 m.
Países: ARG(SJU); CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8097* (SI)]; CHL[*Volckmann, G. s.n.* (SGO)].

Alstroemeria andina Phil. subsp. *venustula* (Phil.) Ehr. Bayer = **Alstroemeria andina** Phil. var. **venustula** (Phil.) M. Muñoz
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2003b.

Alstroemeria angustifolia Herb. var. *acuminata* Herb. = **Alstroemeria angustifolia** Herb. var. **angustifolia**
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria angustifolia Herb. var. **angustifolia**
Sin.: *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *acuminata* Herb., *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *conferta* Herb., *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *intermedia* Herb., *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *solliana* Herb.
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1700 m.
Países: CHL(III, IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bultman s.n.* (CONC)].

Alstroemeria angustifolia Herb. var. *conferta* Herb. = **Alstroemeria angustifolia** Herb. var. **angustifolia**
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria angustifolia Herb. var. *intermedia* Herb. = **Alstroemeria angustifolia** Herb. var. **angustifolia**
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria angustifolia Herb. var. *solliana* Herb. = **Alstroemeria angustifolia** Herb. var. **angustifolia**
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria angustifolia Herb. var. **velutina** (Ehr. Bayer) M. Muñoz
Sin.: *Alstroemeria angustifolia* Herb. subsp. *velutina* Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003; Muñoz-Schick, M., 2003b.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. 791* (B, BM, M, P)].

Alstroemeria angustifolia Herb. subsp. *velutina* Ehr. Bayer = **Alstroemeria angustifolia** Herb. var. **velutina** (Ehr. Bayer) M. Muñoz
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2003b.

Alstroemeria apertiflora Baker
Sin.: *Alstroemeria insignis* auct. non Kraenzl.
Referencias: Assis, M. C., 2001; Molfino, J. F., 1929a; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Sanso, A. M., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAN, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 34454* (BAF)]; BRA[*Hatschbach, G. 17552* (K)]; PRY[*Hassler, E. 9613* (G, K)].

[Alstroemeria apertiflora Baker f. lucidior Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 2003m.
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria araucana Phil. = **Alstroemeria aurea** Graham
Referencias: Sanso, A. M., 1996.

Alstroemeria argentovittata Lem. = **Alstroemeria cunha** Vell.
Referencias: Assis, M. C., 2001, 2004.

Alstroemeria atrorubra Ravenna = **Alstroemeria psittacina** Lehm.
Referencias: Assis, M. C., 2001.

Alstroemeria aulica Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000k.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4089* (SGO)].

Alstroemeria aurantiaca D. Don = **Alstroemeria aurea** Graham
Referencias: Lauener, L. A., 1984.

Alstroemeria aurea Meyen, hom. illeg. = **Alstroemeria ligtu** L. subsp. **simsii** (Spreng.) Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria aurea Graham
Sin.: *Alstroemeria araucana* Phil., *Alstroemeria aurantiaca* D. Don, *Alstroemeria chiloensis* Phil., *Alstroemeria ligtu* auct. non L., *Alstroemeria mutabilis* Kunze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Bayer, E., 1987; Lauener, L. A., 1984; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Sanso, A. M., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–1900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Xifreda, C. C. 1470* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20025* (CONC, SGO)].

Alstroemeria aurea Graham var. *valparadisiaca* Herb. = **Alstroemeria ligtu** L. subsp. **simsii** (Spreng.) Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria bakeri Pax
Sin.: *Alstroemeria pelegrina* auct. non L.
Referencias: Pax, F. A., 1890; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Sanso, A. M., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 1600–2400 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 2136* (LIL)].

Alstroemeria bicolor Hook. = **Alstroemeria pulchra** Sims subsp. **pulchra**
Referencias: Bayer, E., 1987.

[Alstroemeria bilabiata Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria butantanensis Hoehne = **Alstroemeria isabellana** Herb.
Referencias: Assis, M. C., 2001, 2004.

Alstroemeria campaniflora Hand.-Mazz. = **Alstroemeria isabellana** Herb.
Referencias: Assis, M. C., 2001, 2004.

[Alstroemeria cantillanica Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria chilensis Lem. = **Alstroemeria ligtu** L. subsp. **ligtu**
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria chillanensis Grau & Ehr. Bayer = **Alstroemeria presliana** Herb. subsp. **presliana**
Referencias: Bayer, E., 1987; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003.

Alstroemeria chiloensis Phil. = **Alstroemeria aurea** Graham
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Sanso, A. M., 1996.

Alstroemeria ciliata Poepp. = **Alstroemeria ligtu** L. subsp. **simsii** (Spreng.) Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria crispata Phil.
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1100–3000 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 4000* (CONC), *Gay, C. s.n.* (SGO)].

Alstroemeria crocea Phil. = **Alstroemeria pseudospathulata** Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003.

Alstroemeria cummingiana Herb.
Sin.: *Alstroemeria hookeri* Lodd. subsp. *cummingiana* (Herb.) Ehr. Bayer
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bridges, T. C. s.n.* (K)].

Alstroemeria cunha Vell.
Sin.: *Alstroemeria argentovittata* Lem., *Alstroemeria nemorosa* Gardner
Referencias: Assis, M. C., 2001, 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–1700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Souza, D. S. 506* (GUA)].

[Alstroemeria decora Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria dentata Klotzsch = **Alstroemeria ligtu** L. subsp. **simsii** (Spreng.) Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria diazii auct. non Phil. = **Alstroemeria presliana** Herb. subsp. **presliana**
Referencias: Bayer, E., 1987; Ravenna, P. F., 1969c; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003.

Alstroemeria diazii Phil. = **Alstroemeria exerens** Meyen
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.

Alstroemeria diluta Ehr. Bayer subsp. **chrysantha** Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: CHL(III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grau, A. 2543* (M)].

Alstroemeria diluta Ehr. Bayer subsp. **diluta**
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 300 m.
Países: CHL(VI, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grau, A. 2394* (M)].

[Alstroemeria discolor Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria dulcis Hook. = **Bomarea dulcis** (Hook.) Beauverd

Alstroemeria edulis Andrews, nom. illeg. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Xifreda, C. C., 1992.

Alstroemeria edulis Tussac = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Xifreda, C. C., 1992.

Alstroemeria edulis Tussac var. *grandis* Herb. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Referencias: Xifreda, C. C., 1992.

Alstroemeria epulauquensis Ravenna = **Alstroemeria presliana** Herb. subsp. **presliana**
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Sanso, A. M., 1996.

Alstroemeria exerens Meyen
Sin.: *Alstroemeria diazii* Phil., *Alstroemeria exserens* Meyen, *Alstroemeria pallens* Phil.
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2100 m.
Países: CHL(VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bayer, E. 594* (M)].

Alstroemeria exserens Meyen = **Alstroemeria exerens** Meyen
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.

Alstroemeria flava Phil. = **Alstroemeria ligtu** L. subsp. **ligtu**
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria flos-martinii Ker Gawl. = **Alstroemeria pulchra** Sims subsp. **pulchra**
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria foliosa auct. non Mart. = **Alstroemeria psittacina** Lehm.
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Xifreda, C. C., 1992.

Alstroemeria garaventae Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1200–2000 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 6417* (CONC)].

Alstroemeria gayana Phil. = **Alstroemeria magnifica** Herb. subsp. **magnifica**
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.

[Alstroemeria glaucandra Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria graminea Phil.
Sin.: *Taltalia graminea* (Phil.) Ehr. Bayer

Referencias: Aagesen, L. & Sanso, A. M., 2003; Bayer, E., 1998; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2001.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Larrañaga, A. s.n.* (SGO)].

Alstroemeria haemantha auct. non Ruiz & Pav. = **Alstroemeria ligtu** L. subsp. **simsii** (Spreng.) Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria haemantha Ruiz & Pav. = **Alstroemeria ligtu** L. subsp. **ligtu**
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.

Alstroemeria haemantha Ruiz & Pav. var. *pilosa* (Lindl.) Herb. = **Alstroemeria ligtu** L. subsp. **simsii** (Spreng.) Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria haemantha Ruiz & Pav. var. *simsiana* Herb. = **Alstroemeria ligtu** L. subsp. **simsii** (Spreng.) Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria hassleriana Baker = **Alstroemeria psittacina** Lehm.
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Xifreda, C. C., 1992.

Alstroemeria herbertiana Roem. = **Alstroemeria revoluta** Ruiz & Pav.
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria hirtella Phil. = **Alstroemeria leporina** Ehr. Bayer & Grau

Alstroemeria hookeri Lodd. subsp. *cummingiana* (Herb.) Ehr. Bayer = **Alstroemeria cummingiana** Herb.
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.

Alstroemeria hookeri Lodd. subsp. **hookeri**
Sin.: *Alstroemeria hookeriana* Schult., *Alstroemeria rosea* Hook.
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(V, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bayer, E. 983* (M)].

Alstroemeria hookeri Lodd. subsp. **maculata** Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bayer, E. 386* (M)].

Alstroemeria hookeri Lodd. subsp. **recumbens** (Herb.) Ehr. Bayer
Sin.: *Alstroemeria recumbens* Herb.
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 434* (CONC)].

Alstroemeria hookeriana Schult. = **Alstroemeria hookeri** Lodd. subsp. **hookeri**
Referencias: Bayer, E., 1987.

[Alstroemeria huemulina Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria inodora Herb. = **Alstroemeria psittacina** Lehm.
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Sanso, A. M., 1996.

Alstroemeria insignis auct. non Kraenzl. = **Alstroemeria apertiflora** Baker
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Sanso, A. M., 1996.

Alstroemeria isabellana Herb.
Sin.: *Alstroemeria butantanensis* Hoehne, *Alstroemeria campaniflora* Hand.-Mazz., *Alstroemeria isabellana* Herb. var. *longifolia* Seub. ex Schenk, *Alstroemeria regnelliana* Kraenzl., *Alstroemeria viridiflora* Ravenna, *Bomarea stricta* Pax
Referencias: Assis, M. C., 2001, 2004; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Sanso, A. M., 1996; Xifreda, C. C. & Sanso, A. M., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2700 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PAI); URY(TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sanso, A. M. 5* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 38243* (CTES)]; PRY[*Montes, J. E. 13028* (LP)]; URY[*Castellanos, A. 18596* (LIL)].

Alstroemeria isabellana Herb. var. *longifolia* Seub. ex Schenk = **Alstroemeria isabellana** Herb.
Referencias: Assis, M. C., 2001, 2004.

[Alstroemeria jocunda Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria kingii Phil.
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 4576* (CONC), *King s.n.* (CONC)].

Alstroemeria lacrima-solis Ravenna = **Alstroemeria pseudospathulata** Ehr. Bayer
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Sanso, A. M., 1996.

[Alstroemeria lactilutea Ravenna & Brinck]
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria leporina Ehr. Bayer & Grau
Sin.: *Alstroemeria hirtella* Phil.

Referencias: Bayer, E., 1987.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–2000 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. s.n.* (SGO), *Marticorena, C. 1704* (CONC)].

Alstroemeria ligtu auct. non L. = **Alstroemeria aurea** Graham
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003.

[Alstroemeria ligtu L. f. carnea Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 2000d.
Notas: Nombre dudoso.

[Alstroemeria ligtu L. f. haemantha (Ruiz & Pav.) Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 2000d.
Notas: Nombre dudoso.

[Alstroemeria ligtu L. f. nivea Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 2000d.
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria ligtu L. var. *andina* Phil. = **Alstroemeria pallida** Graham
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2003b.

Alstroemeria ligtu L. var. *pulchra* (Sims) Baker = **Alstroemeria pulchra** Sims subsp. **pulchra**
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria ligtu L. subsp. *incarnata* Ehr. Bayer, nom. illeg. = **Alstroemeria ligtu** L. subsp. **splendens** M. Muñoz
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003; Muñoz-Schick, M., 2003b.

Alstroemeria ligtu L. subsp. **ligtu**
Sin.: *Alstroemeria chilensis* Lem., *Alstroemeria flava* Phil., *Alstroemeria haemantha* Ruiz & Pav., *Alstroemeria lothiana* Utinet
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 20094* (CONC, SGO)].

Alstroemeria ligtu L. subsp. **simsii** (Spreng.) Ehr. Bayer
Sin.: *Alstroemeria aurea* Graham var. *valparadisiaca* Herb., *Alstroemeria aurea* Meyen, hom. illeg., *Alstroemeria ciliata* Poepp., *Alstroemeria dentata* Klotzsch, *Alstroemeria haemantha* auct. non Ruiz & Pav., *Alstroemeria haemantha* Ruiz & Pav. var. *pilosa* (Lindl.) Herb., *Alstroemeria haemantha* Ruiz & Pav. var. *simsiana* Herb., *Alstroemeria macraeana* Herb., *Alstroemeria pulchella* auct. non L. f., *Alstroemeria pulchella* L. f. var. *pilosa* Lindl., *Alstroemeria quillotensis* Herb., *Alstroemeria simsii* Spreng.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1800 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 4215* (CONC)].

Alstroemeria ligtu L. subsp. **splendens** M. Muñoz
Sin.: *Alstroemeria ligtu* L. subsp. *incarnata* Ehr. Bayer, nom. illeg.
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M., 2003b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1100–1400 m.
Países: CHL(VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Vial, M. L. s.n.* (SGO)].

[Alstroemeria longaviensis Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria lothiana Utinet = **Alstroemeria ligtu** L. subsp. **ligtu**
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria lutea M. Muñoz
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000b; Muñoz-Schick, M., Pinto, R. & Mesa, A., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pinto, R. s.n.* (SGO)].

Alstroemeria macraeana Herb. = **Alstroemeria ligtu** L. subsp. **simsii** (Spreng.) Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria macrocephala (Pax) Hunz. = **Bomarea macrocephala** Pax
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 1995.

Alstroemeria magenta Ehr. Bayer = **Alstroemeria magnifica** Herb. subsp. **magenta** (Ehr. Bayer) M. Muñoz
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2003b.

[Alstroemeria magna Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria magnifica Herb. var. **sierrae** (Muñoz) M. Muñoz
Sin.: *Alstroemeria sierrae* Muñoz
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003; Muñoz-Schick, M., 2003b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz s.n.* (SGO)].

Alstroemeria magnifica Herb. var. **tofoensis** M. Muñoz
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003; Muñoz-Schick, M., 2003b.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–700 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz-Schick, M. 4257* (SGO)].

Alstroemeria magnifica Herb. subsp. *gayana* (Phil.) Ehr. Bayer = **Alstroemeria magnifica** Herb. subsp. **magnifica**
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.

Alstroemeria magnifica Herb. subsp. **magenta** (Ehr. Bayer) M. Muñoz
Sin.: *Alstroemeria magenta* Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003; Muñoz-Schick, M., 2003b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 530* (CONC)].

Alstroemeria magnifica Herb. subsp. **magnifica**
Sin.: *Alstroemeria gayana* Phil., *Alstroemeria magnifica* Herb. subsp. *gayana* (Phil.) Ehr. Bayer
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 203* (CONC)].

Alstroemeria magnifica Herb. subsp. *maxima* (Phil.) Ehr. Bayer = **Alstroemeria pulchra** Sims var. **maxima** Phil.
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.

Alstroemeria malmeana Kraenzl.
Referencias: Assis, M. C., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Malme, G. O. A. 554* (S)].

Alstroemeria meyeniana Schauer = **Alstroemeria versicolor** Ruiz & Pav.
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria modesta Phil. = **Alstroemeria schizanthoides** Grau var. **alba** M. Muñoz
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.

Alstroemeria mollensis M. Muñoz & Brinck
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2003a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2200 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Brinck, A. s.n.* (SGO)].

[Alstroemeria monantha Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria mutabilis Kunze = **Alstroemeria aurea** Graham
Referencias: Bayer, E., 1987; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003.

Alstroemeria nana Rendle = **Alstroemeria patagonica** Phil.
Referencias: Bayer, E., 1987; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Sanso, A. M., 1996.

[Alstroemeria neillii Gillies ex Hook.]
Referencias: Bayer, E., 1987; Sanso, A. M., 1996.
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria nemorosa Gardner = **Alstroemeria cunha** Vell.
Referencias: Assis, M. C., 2001, 2004.

[Alstroemeria nidularis Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

[Alstroemeria nivea Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria oculata Lodd. = **Bomarea salsilla** (L.) Herb.
Referencias: Hofreiter, A., 2005.

Alstroemeria ovallei (Phil.) Hunz. = **Leontochir ovallei** Phil. var. **ovallei**
Referencias: Hunziker, A. T., 1973.

Alstroemeria oxyphylla Ravenna, nom. superfl. = **Alstroemeria pseudospathulata** Ehr. Bayer
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Sanso, A. M., 1996.

Alstroemeria pallens Phil. = **Alstroemeria exerens** Meyen
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.

Alstroemeria pallida Graham
Sin.: *Alstroemeria albiflora* C. Presl, *Alstroemeria ligtu* L. var. *andina* Phil., *Alstroemeria rosea* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Bayer, E., 1987; Sanso, A. M., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 1100–2800 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 2917* (CONC)].

Alstroemeria parviflora Ravenna = **Bomarea boliviensis** Baker
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 1995.

Alstroemeria patagonica Phil.
Sin.: *Alstroemeria nana* Rendle, *Alstroemeria patagonica* Phil. f. *biflora* Ravenna, *Alstroemeria pygmaea* auct. non Herb.
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Sanso, A. M., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Xifreda, C. C. 1466* (SI)]; CHL[*Benove, A. 29* (SI)].

Alstroemeria patagonica Phil. f. *biflora* Ravenna = **Alstroemeria patagonica** Phil.
Referencias: Bayer, E., 1987; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Sanso, A. M., 1996.

Alstroemeria paupercula Phil. = **Alstroemeria violacea** Phil.
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.

Alstroemeria pelegrina auct. non L. = **Alstroemeria bakeri** Pax
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Xifreda, C. C., 1992.

Alstroemeria pelegrina L.
Sin.: *Alstroemeria amoena* Salisb., *Alstroemeria pelegrina* L. var. *albescens* Herb.
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Schlegel, F. 875* (CONC)].
Notas: Su presencia en Perú es dudosa.

Alstroemeria pelegrina L. var. *albescens* Herb. = **Alstroemeria pelegrina** L.
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria philippii Baker var. **albicans** M. Muñoz
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003; Muñoz-Schick, M., 2003b.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–400 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz-Schick, M. 4227* (SGO)].

Alstroemeria philippii Baker var. **philippii**
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*King, T. s.n.* (SGO), *Monypenny 52* (CONC)].

[Alstroemeria poetica Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

[Alstroemeria polpaicana Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria polyphylla Phil.
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–900 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*San Román s.n.* (SGO), *Werdermann, E. 147* (BM, E)].

Alstroemeria presliana Herb. subsp. **australis** Ehr. Bayer
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–1500 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 699* (CONC)].

Alstroemeria presliana Herb. subsp. **presliana**
Sin.: *Alstroemeria chillanensis* Grau & Ehr. Bayer, *Alstroemeria diazii* auct. non Phil., *Alstroemeria epulauquensis* Ravenna
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Sanso, A. M., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 1300–2300 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII, VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Xifreda, C. C. 1480* (SI)]; CHL[*Poeppig, E. F. 101* (B, BM, M, P)].

Alstroemeria pseudospathulata Ehr. Bayer
Sin.: *Alstroemeria crocea* Phil., *Alstroemeria lacrima-solis* Ravenna, *Alstroemeria oxyphylla* Ravenna, nom. superfl., *Alstroemeria spathulata* auct. non C. Presl
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Sanso, A. M., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(VII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Xifreda, C. C. 2004* (SI)]; CHL[*Volkmann, H. s.n.* (SGO)].

Alstroemeria psittacina Lehm.
Sin.: *Alstroemeria atrorubra* Ravenna, *Alstroemeria foliosa* auct. non Mart., *Alstroemeria hassleriana* Baker, *Alstroemeria inodora* Herb., *Alstroemeria pulchella* auct. non L. f., *Lilavia psittacina* (Lehm.) Raf.
Referencias: Assis, M. C., 2001; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Sanso, A. M., 1996; Steibel, P., Troiani, H. O. & Williamson, T., 2001[2000]; Xifreda, C. C., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, CAU, CAN, GUA); URY(CAS, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 11743* (CORD)]; BRA[*Hatschbach, G. 27099* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 27419* (CTES)]; URY[*Rodríguez, H. 6725* (MVFA)].

[Alstroemeria pudica Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria pulchella auct. non L. f. = **Alstroemeria ligtu** L. subsp. **simsii** (Spreng.) Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria pulchella auct. non L. f. = **Alstroemeria psittacina** Lehm.
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Xifreda, C. C., 1992.

Alstroemeria pulchella L. f. var. *pilosa* Lindl. = **Alstroemeria ligtu** L. subsp. **simsii** (Spreng.) Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria pulchra Sims var. **maxima** Phil.
Sin.: *Alstroemeria magnifica* Herb. subsp. *maxima* (Phil.) Ehr. Bayer, *Alstroemeria spectabilis* Ravenna
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–400 m.

Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Alstroemeria pulchra Sims subsp. **lavandulacea** Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–300 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hutchison, P. C. 286* (K)].
Notas: Especie descrita en base a semillas propagadas en München, pero no se ha vuelto a coleccionar.

Alstroemeria pulchra Sims subsp. **pulchra**
Sin.: *Alstroemeria bicolor* Hook., *Alstroemeria flos-martinii* Ker Gawl., *Alstroemeria ligtu* L. var. *pulchra* (Sims) Baker, *Alstroemeria tricolor* Hook.
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 558* (CONC)].

Alstroemeria pygmaea auct. non Herb. = **Alstroemeria patagonica** Phil.
Referencias: Sanso, A. M., 1996.

Alstroemeria pygmaea Herb.
Sin.: *Schickendantzia hieronymi* Pax, *Schickendantzia pygmaea* (Herb.) Speg.
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 1999, 2003; Sanso, A. M., 1996; Solms-Laubach, H. M. C. L. F., 1907.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sanso, A. M. 8* (SI)].

Alstroemeria quillotensis Herb. = **Alstroemeria ligtu** L. subsp. **simsii** (Spreng.) Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987.

[Alstroemeria quillotensis Herb. var. foliolosa (Roem.) Herb.]
Referencias: Sanso, A. M., 1996.
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria recumbens Herb. = **Alstroemeria hookeri** Lodd. subsp. **recumbens** (Herb.) Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987.

[Alstroemeria recumbens Herb. f. kingii (Phil.) Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 2003m.
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria reflexa Roem. = **Alstroemeria revoluta** Ruiz & Pav.
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria regnelliana Kraenzl. = **Alstroemeria isabellana** Herb.
Referencias: Assis, M. C., 2001, 2004.

Alstroemeria revoluta Ruiz & Pav.
Sin.: *Alstroemeria herbertiana* Roem., *Alstroemeria reflexa* Roem.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 4217* (CONC)].

Alstroemeria ribeirensis Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003m.
Hierba. Perenne. Endémica. 400–600 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 5325* (BA, Herb. Ravenna)].

Alstroemeria rosea Hook. = **Alstroemeria hookeri** Lodd. subsp. **hookeri**
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria rosea Phil. = **Alstroemeria pallida** Graham
Referencias: Sanso, A. M., 1996.

[Alstroemeria sabulosa Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria salsilla auct. non L. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Referencias: Xifreda, C. C., 1992.

Alstroemeria salsilla L. = **Bomarea salsilla** (L.) Herb.

Alstroemeria salsilloides Mart. ex Roem. & Schult. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Xifreda, C. C., 1992.

Alstroemeria schizanthoides Grau var. **alba** M. Muñoz
Sin.: *Alstroemeria modesta* Phil.
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003; Muñoz-Schick, M., 2003b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Brinck, A. s.n.* (SGO)].

Alstroemeria schizanthoides Grau var. **schizanthoides**
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1900 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grau, A. 2309* (CONC, M)].

Alstroemeria sellowiana Seub. ex Schenk
Referencias: Assis, M. C., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ribas, O. S. 3249* (SI)].

Alstroemeria sericantha Schauer = **Alstroemeria umbellata** Meyen
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002.

Alstroemeria sierrae Muñoz = **Alstroemeria magnifica** Herb. var. **sierrae** (Muñoz) M. Muñoz
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2003b.

Alstroemeria simsii Spreng. = **Alstroemeria ligtu** L. subsp. **simsii** (Spreng.) Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987.

[Alstroemeria simsii Spreng. f. chrysantha Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 2003m.
Notas: Nombre dudoso.

[Alstroemeria simsii Spreng. f. roseopurpurea Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 2003m.
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria sotoana Phil. = **Alstroemeria versicolor** Ruiz & Pav.
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria spathulata C. Presl
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003; Sanso, A. M., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Crisci, J. V. 477* (LP)].
Notas: Su presencia es probable en Argentina.

Alstroemeria spathulata auct. non C. Presl = **Alstroemeria pseudospathulata** Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003.

Alstroemeria spectabilis Ravenna = **Alstroemeria pulchra** Sims var. **maxima** Phil.

[Alstroemeria talcaensis Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria tigrina Phil. = **Alstroemeria versicolor** Ruiz & Pav.
Referencias: Bayer, E., 1987.

[Alstroemeria timida Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria tricolor Hook. = **Alstroemeria pulchra** Sims subsp. **pulchra**
Referencias: Bayer, E., 1987.

Alstroemeria umbellata Meyen
Sin.: *Alstroemeria sericantha* Schauer
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: CHL(VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 4565* (CONC)].

[Alstroemeria venusta Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria venustula Phil. = **Alstroemeria andina** Phil. var. **venustula** (Phil.) M. Muñoz
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2003b.

Alstroemeria versicolor Ruiz & Pav.
Sin.: *Alstroemeria meyeniana* Schauer, *Alstroemeria sotoana* Phil., *Alstroemeria tigrina* Phil.
Referencias: Bayer, E., 1987; Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–2000 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hutchison, P. C. 285* (K)].

Alstroemeria violacea Knight & Perry, nom. nud. = **Alstroemeria violacea** Phil.
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.

Alstroemeria violacea Phil.
Sin.: *Alstroemeria paupercula* Phil., *Alstroemeria violacea* Knight & Perry, nom. nud.
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: CHL(I, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

[Alstroemeria virginalis Ravenna & Brinck]
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria viridiflora Ravenna = **Alstroemeria isabellana** Herb.
Referencias: Assis, M. C., 2001, 2004.

[Alstroemeria werdermannii Ehr. Bayer f. flavescens Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 2003m.
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria werdermannii Ehr. Bayer var. **flavicans** M. Muñoz
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A., 2003; Muñoz-Schick, M., 2000b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eyzaguirre, M. T. s.n.* (SGO)].

Alstroemeria werdermannii Ehr. Bayer var. **werdermannii**
Referencias: Bayer, E., 1987.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 134* (K)].

[Alstroemeria yaelae Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Alstroemeria zoellneri Ehr. Bayer
Referencias: Bayer, E., 1987.
Hierba. Perenne. Endémica. 1100–1800 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Morrison, J. L. 16855* (K, S)].

Bomarea Mirb.

Número de especies: 7, 1 endémica

Bomarea boliviensis Baker
Sin.: *Alstroemeria parviflora* Ravenna, *Bomarea venturii* Killip, nom. nud.
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 1995, 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–3100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 12872* (SI)].

Bomarea bredemeyeriana auct. non Herb. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003.

Bomarea dulcis (Hook.) Beauverd
Sin.: *Alstroemeria dulcis* Hook., *Bomarea engleriana* auct. non Kraenzl.
Referencias: Hofreiter, A., 2005; Ricardi, M., 1961.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–5200 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 4749* (CONC)].

Bomarea edulis (Tussac) Herb.
Sin.: *Alstroemeria edulis* Andrews, nom. illeg., *Alstroemeria edulis* Tussac, *Alstroemeria edulis* Tussac var. *grandis* Herb., *Alstroemeria salsilla* auct. non L., *Alstroemeria salsilloides* Mart. ex Roem. & Schult., *Bomarea bredemeyeriana* auct. non Herb., *Bomarea fimbriata* auct. non (Ruiz & Pav.) Herb., *Bomarea macrophylla* Killip, nom. nud., *Bomarea macrophylla* Schenck ex Killip, nom. nud., *Bomarea multiflora* auct. non Mirb., *Bomarea purpurea* auct. non (Ruiz & Pav.) Herb., *Bomarea rosea* auct. non (Ruiz & Pav.) Herb., *Bomarea spectabilis* Schenk
Referencias: Assis, M. C., 2004; Hofreiter, A., 2005; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 1995, 2003; Xifreda, C. C., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sanso, A. M. 260* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 38334* (CTES)]; PRY[*Fernández Casas, F. J. 7358* (G)].

Bomarea engleriana auct. non Kraenzl. = **Bomarea dulcis** (Hook.) Beauverd

Bomarea fiebrigiana Kraenzl. = **Bomarea macrocephala** Pax
Referencias: Hofreiter, A., 2005.

Bomarea fimbriata auct. non (Ruiz & Pav.) Herb. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 1995.

Bomarea involucrosa (Herb.) Baker
Sin.: *Collania involucrosa* Herb.
Referencias: Ricardi, M., 1961.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–3700 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 4751* (CONC)].

Bomarea macrocephala Pax
Sin.: *Alstroemeria macrocephala* (Pax) Hunz., *Bomarea fiebrigiana* Kraenzl., *Collania involucrata* auct. non Herb.
Referencias: Hofreiter, A., 2005; Pax, F. A., 1890; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 1995, 2003; Xifreda, C. C. & Sanso, A. M., 1996a.
Hierba. Perenne. Nativa. 1800–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Xifreda, C. C. 1183* (SI)].

Bomarea macrophylla Killip, nom. nud. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 1995.

Bomarea macrophylla Schenck ex Killip, nom. nud. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 1995, 2003.

Bomarea multiflora auct. non Mirb. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 1995.

Bomarea oculata (Lodd.) M. Roem. = **Bomarea salsilla** (L.) Herb.
Referencias: Hofreiter, A., 2005.

Bomarea ovallei (Phil.) Ravenna = **Leontochir ovallei** Phil. var. **ovallei**

[Bomarea ovallei (Phil.) Ravenna f. albiplumbea Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 2003m.
Notas: Nombre dudoso.

[Bomarea ovallei (Phil.) Ravenna f. lutea Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 2003m.
Notas: Nombre dudoso.

Bomarea purpurea auct. non (Ruiz & Pav.) Herb. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 1995.

Bomarea rosea auct. non (Ruiz & Pav.) Herb. = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 1995.

Bomarea salsilla (L.) Herb.
Sin.: *Alstroemeria oculata* Lodd., *Alstroemeria salsilla* L., *Bomarea oculata* (Lodd.) M. Roem.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Muñoz-Pizarro, C., 1966.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX);
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 994813* (CONC)].
Notas: Cita dudosa para Argentina (Sanso & Xifreda, 1995, 2003).

Bomarea spectabilis Schenk = **Bomarea edulis** (Tussac) Herb.

Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Xifreda, C. C., 1992.

Bomarea stans Kraenzl.
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 1995, 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sanso, A. M. 234* (SI)].

Bomarea stricta Pax = **Alstroemeria isabellana** Herb.
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Xifreda, C. C. & Sanso, A. M., 1992.

Bomarea venturii Killip, nom. nud. = **Bomarea boliviensis** Baker
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 1995.

Collania involucrata auct. non Herb. = **Bomarea macrocephala** Pax
Referencias: Pax, F. A., 1890; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 1995, 2003.

Collania involucrosa Herb. = **Bomarea involucrosa** (Herb.) Baker
Referencias: Baker, J. G., 1888.

Leontochir Phil.

Número de especies: 1 endémica

Leontochir ovallei Phil. var. **luteus** M. Muñoz
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Elórtegui s.n.* (SGO)].

Leontochir ovallei Phil. var. **ovallei**
Sin.: *Alstroemeria ovallei* (Phil.) Hunz., *Bomarea ovallei* (Phil.) Ravenna
Referencias: Philippi, R. A., 1873.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ovalle, J. s.n.* (SGO)].

Lilavia psittacina (Lehm.) Raf. = **Alstroemeria psittacina** Lehm.
Referencias: Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2003; Xifreda, C. C., 1992.

Schickendantzia hieronymi Pax = **Alstroemeria pygmaea** Herb.
Referencias: Aagesen, L. & Sanso, A. M., 2003; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 1999.

Schickendantzia pygmaea (Herb.) Speg. = **Alstroemeria pygmaea** Herb.
Referencias: Aagesen, L. & Sanso, A. M., 2003; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 1999.

Taltalia graminea (Phil.) Ehr. Bayer = **Alstroemeria graminea** Phil.
Referencias: Aagesen, L. & Sanso, A. M., 2003; Sanso, A. M. & Xifreda, C. C., 2001.

AMARYLLIDACEAE

Autores: Arroyo-Leuenberger, S. & Dutilh, J.
Revisor: Roitman, G.

16 géneros, 121 especies, 93 especies endémicas, 3 especies introducidas.

Amaryllis L.

Número de especies: 1 introducida

Amaryllis advena Ker Gawl. = **Rhodophiala advena** (Ker Gawl.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Amaryllis aglaiae A. Cast. = **Hippeastrum aglaiae** (A. Cast.) Hunz. & Cocucci
Referencias: Hunziker, A. T. & Coccuci, A. E., 1959.

Amaryllis ananuca (Phil.) Traub & Moldenke = **Rhodophiala ananuca** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Amaryllis andersonii (Herb. ex Lindl.) Griseb. = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Holmes, W. C. & Wells, C. J., 1980.

Amaryllis andicola Poepp. = **Rhodophiala andicola** (Poepp.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Amaryllis angustifolia (Pax) Traub & Uphof = **Hippeastrum angustifolium** Pax
Referencias: Brummitt, R. K., 1987; Ravenna, P. F., 1967a.

Amaryllis araucana (Phil.) Traub & Uphof = **Rhodophiala araucana** (Phil.) Traub
Referencias: Ravenna, P. F., 1971b; Traub, H. P., 1956.

Amaryllis arboricola Ravenna = **Hippeastrum striatum** (Lam.) H.E. Moore

Amaryllis argentina (Pax) Ravenna = **Hippeastrum argentinum** (Pax) Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1967c.

[Amaryllis argentina (Pax) Ravenna f. rosea Ravenna]
Notas: Nombre dudoso. Posible sinónimo de *Hippeastrum argentinum*.

[Amaryllis argentina (Pax) Ravenna subsp. plicatilis Ravenna]
Notas: Nombre dudoso. Posible sinónimo de *Hippeastrum argentinum*.

Amaryllis argilagae Traub = **Hippeastrum striatum** (Lam.) H.E. Moore

Amaryllis atacamensis Traub & Uphof = **Rhodophiala pratensis** (Poepp.) Traub
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.

Amaryllis aulica Ker Gawl. = **Hippeastrum aulicum** (Ker Gawl.) Herb.

Amaryllis aulica Ker Gawl. var. *platypetala* Lindl. = **Hippeastrum heuserianum** H. Karst.

Amaryllis aviflora Ravenna = **Hippeastrum glaucescens** (Mart.) Herb.

Amaryllis backeri (Phil.) Traub & Moldenke = **Rhodophiala bakeri** (Phil.) Traub

Amaryllis bagnoldi (Herb.) D. Dietr. = **Rhodophiala bagnoldii** (Herb.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Amaryllis bakeri (Phil.) Traub & Uphof = **Rhodophiala bakeri** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Amaryllis barlowii Traub & Moldenke = **Rhodophiala rosea** (Sweet) Traub
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.

Amaryllis belladona L.
Sin.: *Amaryllis paranaensis* Traub, *Hippeastrum paranaense* (Traub) Meerow
Referencias: Marticorena, C., com. pers.; Meerow, A. W., Scheepen, J. & Dutilh, J. H. A., 1997; Mereles, F. & Pérez de Molas, L., 2004; Traub, H. P., 1958.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); CHL(V); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16749* (US)]; PRY[*Mereles, F. 8945* (FCQ)].
Notas: Citada para Paraguay bajo *Hippeastrum belladona* L.

Amaryllis berterii Spreng. = **Habranthus robustus** Herb. ex Sweet
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Amaryllis berteroana (Phil.) Traub & Moldenke = **Rhodophiala berteroana** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Amaryllis bicolor Ruiz & Pav. = **Phycella bicolor** (Ruiz & Pav.) Herb.

Amaryllis bifida (Herb.) Spreng. = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1956.

Amaryllis bifida (Herb.) Spreng. var. *pulchra* (Herb.) Traub & Moldenke = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Amaryllis bifida (Herb.) Spreng. var. *spathacea* (Herb.) Traub & Moldenke = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Amaryllis biflora (Phil.) Traub & Moldenke = **Rhodophiala biflora** Phil.

Amaryllis blossfeldiae Traub & L.J. Doran = **Hippeastrum blossfeldiae** (Traub & L.J. Doran) Van Scheepen
Referencias: Meerow, A. W., Scheepen, J. & Dutilh, J. H. A., 1997.

Amaryllis blumenavia (K. Koch & C.D. Bouché ex Carrière) Traub & Uphof = **Eithea blumenavia** (K. Koch & C.D. Bouché ex Carrière) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002h.

Amaryllis bonariensis (Kuntze) Traub & Uphof = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Amaryllis breviflora (Herb.) Traub & Uphof = **Hippeastrum breviflorum** Herb.

[Amaryllis brevipodis Larrañaga]
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.
Notas: Nombre dudoso.

[Amaryllis buccinata Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Amaryllis candida (Stapf) Traub & Uphof, nom. illeg. = **Hippeastrum argentinum** (Pax) Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1967c.

Amaryllis candida Herb. ex Lindl. = **Zephyranthes candida** (Herb. ex Lindl.) Herb.
Referencias: Fabris, H. A., 1969[1968]b.

Amaryllis canterai (Arechav.) Traub & Uphof = **Hippeastrum angustifolium** Pax

Amaryllis carinata Spreng. = **Zephyranthes carinata** Herb.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Amaryllis chilensis L'Hér. = **Rhodophiala chilensis** (L'Hér.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Amaryllis coerula Griseb. = **Habranthus coeruleus** (Griseb.) Traub
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Amaryllis colona (Phil.) Traub & Uphof = **Rhodophiala colona** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Amaryllis consobrina (Phil.) Traub & Uphof = **Rhodophiala consobrina** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Amaryllis curitibana Ravenna = **Hippeastrum glaucescens** (Mart.) Herb.

Amaryllis cyrtanthoides Sims = **Phycella cyrtanthoides** (Sims) Lindl.
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.

Amaryllis demissa Steud. = **Phycella cyrtanthoides** (Sims) Lindl.
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.

Amaryllis depauperata Poepp. = **Zephyranthes depauperata** (Poepp.) Herb.

Amaryllis elwesii (C.H. Wright) Traub & Uphof = **Rhodophiala mendocina** (Phil.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1970a, 1971b.

Amaryllis entreriana O. Hoffm. = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

[Amaryllis euryphylla Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Amaryllis flammea Ruiz & Pav. = **Pyrolirion tubiflorum** (L'Hér.) M. Roem.

Amaryllis flammigera (E. Holmb.) Traub & Uphof = **Hippeastrum striatum** (Lam.) H.E. Moore

Amaryllis flava (Phil.) Traub & Uphof = **Rhodophiala flava** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.

Amaryllis fulgens (Hook. f.) Traub & Uphof = **Rhodophiala fulgens** (Hook. f.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Amaryllis gayana (Kuntze) Traub & Uphof = **Phycella gayana** (Kuntze) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Amaryllis gertiana Ravenna = **Hippeastrum striatum** (Lam.) H.E. Moore

Amaryllis gladioloides (Hieron.) Traub & Uphof = **Phycella herbertiana** Lindl.

Amaryllis glaucescens Mart. = **Hippeastrum glaucescens** (Mart.) Herb.

Amaryllis gracilis Spreng. = **Habranthus gracilifolius** Herb.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Amaryllis granatiflora (E. Holmb.) Traub & Uphof = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub
Referencias: Ravenna, P. F., 1970a.

Amaryllis guarapuvica Ravenna = **Hippeastrum vittatum** (L'Hér.) Herb.

Amaryllis harrisonii Lindl. = **Hippeastrum vittatum** (L'Hér.) Herb.

Amaryllis hassleriana Chodat & Lendn. = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Amaryllis hemographes Ravenna = **Hippeastrum glaucescens** (Mart.) Herb.

Amaryllis herbertiana (Lindl.) Traub & Uphof = **Phycella herbertiana** Lindl.
Referencias: Traub, H. P., 1956.

Amaryllis heuseriana (H. Karst.) Ravenna = **Hippeastrum heuserianum** H. Karst.

[Amaryllis heuseriana (H. Karst.) Ravenna f. campanulata Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Amaryllis ignea Lindl. = **Phycella cyrtanthoides** (Sims) Lindl.
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.

Amaryllis iguapensis (R. Wagner) Traub & Uphof = **Eithea blumenavia** (K. Koch & C.D. Bouché ex Carrière) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002h.

Amaryllis iguazuana Ravenna = **Hippeastrum glaucescens** (Mart.) Herb.

Amaryllis illustris Vell. = **Hippeastrum illustre** (Vell.) Dutilh
Referencias: Meerow, A. W., Scheepen, J. & Dutilh, J. H. A., 1997.

Amaryllis immaculata Traub & Moldenke = **Hippeastrum argentinum** (Pax) Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1967c.

Amaryllis jamesonii (Baker) Traub & Uphof = **Habranthus jamesonii** (Baker) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1971b.

Amaryllis laeta (Phil.) Traub & Uphof = **Rhodophiala tiltilensis** (Traub & Moldenke) Traub
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.

Amaryllis lineata (Phil.) Traub & Uphof, hom. illeg. = **Rhodophiala lineata** (Phil.) Traub

Amaryllis lineata Colla = **Hippeastrum vittatum** (L'Hér.) Herb.

[Amaryllis longiflora Larrañaga]
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.
Notas: Nombre dudoso.

Amaryllis maculata L'Hér. = **Rhodophiala maculata** (L'Hér.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1970a.

Amaryllis marginata (R.E. Fr.) Traub & Uphof = **Chlidanthus marginatus** (R.E. Fr.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Amaryllis marumbiensis Ravenna = **Hippeastrum marumbiense** (Ravenna) Van Scheepen
Referencias: Meerow, A. W., Scheepen, J. & Dutilh, J. H. A., 1997.

Amaryllis mesochloa (Herb. ex Lindl.) Steud. = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Amaryllis minima (Herb.) Griseb. = **Zephyranthes minima** Herb.
Referencias: Hume, H. H., 1943.

Amaryllis modesta (Phil.) Traub & Uphof = **Traubia modesta** (Phil.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Amaryllis moelleri (Phil.) Traub & Moldenke = **Rhodophiala moelleri** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Amaryllis montana (Phil.) Traub & Uphof = **Rhodophiala montana** (Phil.) Traub

Amaryllis moreliana (Lem.) Traub = **Hippeastrum morelianum** Lem.

Amaryllis nivea Roem. & Schult. = **Zephyranthes candida** (Herb. ex Lindl.) Herb.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Amaryllis papilio Ravenna = **Hippeastrum papilio** (Ravenna) Van Scheepen
Referencias: Meerow, A. W., Scheepen, J. & Dutilh, J. H. A., 1997.

Amaryllis paranaensis Traub = **Amaryllis belladona** L.
Referencias: Meerow, A. W., Scheepen, J. & Dutilh, J. H. A., 1997.

Amaryllis parodii (Hunz. & Cocucci) Traub = **Hippeastrum parodii** Hunz. & Coccuci
Referencias: Brummitt, R. K., 1987; Hunziker, A. T. & Coccuci, A. E., 1959.

[Amaryllis parvula Griseb.]
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.
Notas: Nombre dudoso.

Amaryllis parvula Seub. = **Zephyranthes seubertii** E.P. Hume
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 1996.

Amaryllis petiolata (Pax) Traub & Uphof = **Hippeastrum striatum** (Lam.) H.E. Moore

[Amaryllis petiolata (Pax) Traub & Uphof subsp. cochunensis Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 1970a.
Notas: Nombre dudoso.

Amaryllis philippiana Traub & Uphof = **Phycella angustifolia** Phil.
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.

Amaryllis phycelloides (Herb.) Steud. = **Rhodophiala phycelloides** (Herb.) Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1985.

Amaryllis platensis (E. Holmb.) Traub & Uphof = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1956.

Amaryllis popetana (Phil.) Traub & Uphof = **Rhodophiala popetana** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Amaryllis pratensis Poepp. = **Rhodophiala pratensis** (Poepp.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Amaryllis psittacina Ker Gawl. = **Hippeastrum psittacinum** (Ker Gawl.) Herb.

Amaryllis pulchra (Herb.) Traub & Uphof = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1956.

Amaryllis purpurata (Phil.) Traub & Uphof = **Rhodophiala andicola** (Poepp.) Traub
Referencias: Ravenna, P. F., 1970a.

Amaryllis reticulata L'Hér. = **Hippeastrum reticulatum** (L'Hér.) Herb.
Referencias: Ravenna, P. F., 1969d.

Amaryllis rhodolirion (Baker) Traub & Uphof = **Rhodophiala rhodolirion** (Baker) Traub
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 1991.

Amaryllis rosea (Sweet) Traub & Uphof = **Rhodophiala rosea** (Sweet) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Amaryllis rubropicta Ravenna = **Hippeastrum glaucescens** (Mart.) Herb.

Amaryllis rutila Ker Gawl. = **Hippeastrum striatum** (Lam.) H.E. Moore

[Amaryllis sanguinea Larrañaga]
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.
Notas: Nombre dudoso.

Amaryllis santacatarina Traub = **Hippeastrum santacatarina** (Traub) Dutilh

Amaryllis solisii (Phil.) Traub & Uphof = **Rhodophiala flava** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.

Amaryllis splendens (Renjifo) Traub & Moldenke = **Rhodophiala splendens** (Renjifo) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Amaryllis striata Lam. = **Hippeastrum striatum** (Lam.) H.E. Moore
Referencias: Dutilh, J. H. A., 2005.

Amaryllis tenuiflora (Phil.) Traub & Moldenke = **Rhodophiala tenuiflora** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Amaryllis teyucuarensis Ravenna = **Hippeastrum glaucescens** (Mart.) Herb.

Amaryllis tiltilensis Traub & Moldenke = **Rhodophiala tiltilensis** (Traub & Moldenke) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Amaryllis tubiflora L'Hér. = **Pyrolirion tubiflorum** (L'Hér.) M. Roem.

[Amaryllis tubispata Larrañaga]
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.
Notas: Nombre dudoso.

Amaryllis tubispatha L'Hér. = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub
Referencias: Holmes, W. C. & Wells, C. J., 1980; Ravenna, P. F., 1970a; Traub, H. P., 1951.

Amaryllis tucumana (E. Holmb.) Traub & Uphof = **Hippeastrum argentinum** (Pax) Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1967c.

Amaryllis uniflora (Phil.) Traub & Uphof = **Rhodophiala uniflora** Phil.

Amaryllis valparadisiaca Steud. = **Rhodophiala advena** (Ker Gawl.) Traub

Amaryllis versicolor (Herb.) Spreng. = **Habranthus versicolor** Herb.

Amaryllis vittata L'Hér. = **Hippeastrum vittatum** (L'Hér.) Herb.

Amaryllis vittata L'Hér. var. *tweediana* (Herb.) Traub = **Hippeastrum vittatum** (L'Hér.) Herb.

Amaryllis vittata L'Hér. subsp. *guarapuavae* Ravenna = **Hippeastrum vittatum** (L'Hér.) Herb.

Androstephanos tarijensis Fern. Casas & R. Lara = **Hieronymiella marginata** (Pax) Hunz.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005; Fernández Casas, F. J. & Rico Lara, R., 1983.

Aulica platypetala (Lindl.) Raf. = **Hippeastrum heuserianum** H. Karst.

Bathya andina (Phil.) Ravenna = **Phycella herbertiana** Lindl.

[Bathya lucida Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Brunsvigia Heist.

Número de especies: 1 introducida

Brunsvigia rosea (Lam.) Hannibal
Referencias: Delucchi, G., 1996.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Delucchi, G. 693* (LP)].

Castellanoa marginata (R.E. Fr.) Traub = **Chlidanthus marginatus** (R.E. Fr.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Castellanoa yaviensis Ravenna = **Chlidanthus yaviensis** (Ravenna) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Chlidanthus Herb.

Número de especies: 2 endémicas

Chlidanthus cumingii C. Presl = **Rhodophiala advena** (Ker Gawl.) Traub

Chlidanthus marginatus (R.E. Fr.) Ravenna
Sin.: *Amaryllis marginata* (R.E. Fr.) Traub & Uphof, *Castellanoa marginata* (R.E. Fr.) Traub, *Hippeastrum marginatum* R.E. Fr., *Sanmartina marginata* (R.E. Fr.) Traub
Referencias: Ravenna, P. F., 1967a, 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 3600 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Claren, F. s.n.* (BAF, CORD, LP, SI)].

Chlidanthus yaviensis (Ravenna) Ravenna
Sin.: *Castellanoa yaviensis* Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 3300 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Werner, T. B. 877* (LP)].

Clinanthus Herb.

Número de especies: 1

Clinanthus humilis (Herb.) Meerow
Sin.: *Clitanthes humilis* Herb., *Crocopsis fulgens* Pax, *Stenomesson acaule* Kraenzl., *Stenomesson humile* (Herb.) Baker, *Zephyranthes pseudocolchicum* Kraenzl.
Referencias: Meerow, A. W., 1990; Meerow, A. W., Guy, C. L., Li, Q.-B. & Yang, S.-L., 2000; Ravenna, P. F., 1971a, 2003i.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4200 m.
Países: ARG(JUJ, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 20235* (LP)]; CHL[*Kuschel, G. s.n.* (SGO)].

Clitanthes humilis Herb. = **Clinanthus humilis** (Herb.) Meerow

Crinum L.

Número de especies: 1

Crinum americanum L.
Sin.: *Crinum erubescens* Aiton, *Crinum salsum* Ravenna
Referencias: Dutilh, J. H. A., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(CEN, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 12019* (CTES)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 9019* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 19096* (AS, MO)].

Crinum argentinum Pax = **Hippeastrum argentinum** (Pax) Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1967c.

Crinum erubescens Aiton = **Crinum americanum** L.
Referencias: Dutilh, J. H. A., 2005.

Crinum salsum Ravenna = **Crinum americanum** L.

Crocopsis fulgens Pax = **Clinanthus humilis** (Herb.) Meerow

Eithea Ravenna

Número de especies: 1 endémica

Eithea blumenavia (K. Koch & C.D. Bouché ex Carrière) Ravenna
Sin.: *Amaryllis blumenavia* (K. Koch & C.D. Bouché ex Carrière) Traub & Uphof, *Amaryllis iguapensis* (R. Wagner) Traub & Uphof, *Griffinia blumenavia* K. Koch & C.D. Bouché ex Carrière, *Hippeastrum blumenavia* (K. Koch & C.D. Bouché ex Carrière) Sealy, *Hippeastrum iguapense* R. Wagner
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 4211* (MBM)].

Eustephia argentina Pax = **Hieronymiella marginata** (Pax) Hunz.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005.

[Eustephia coccinea Cav.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Eustephia latifolia (R.E. Fr.) Traub = **Hieronymiella marginata** (Pax) Hunz.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005.

Eustephia marginata Pax = **Hieronymiella marginata** (Pax) Hunz.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005.

Eustephia pamiana Stapf = **Hieronymiella marginata** (Pax) Hunz.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005.

Eustephia speciosa (R.E. Fr.) Traub = **Hieronymiella speciosa** (R.E. Fr.) Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1969a.

Eustephiopsis latifolia R.E. Fr. = **Hieronymiella marginata** (Pax) Hunz.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005.

Eustephiopsis marginata (Pax) R.E. Fr. = **Hieronymiella marginata** (Pax) Hunz.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005.

Eustephiopsis marginata (Pax) R.E. Fr. subsp. *latifolia* (R.E. Fr.) Ravenna = **Hieronymiella marginata** (Pax) Hunz.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005.

Eustephiopsis speciosa R.E. Fr. = **Hieronymiella speciosa** (R.E. Fr.) Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1969a.

Famatina Ravenna

Número de especies: 2 endémicas

Famatina andina (Phil.) Ravenna = **Phycella herbertiana** Lindl.

Famatina cisandina Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003i.
Hierba. Perenne. Endémica. 1800–2200 m.
Países: CHL(VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 2055* (BM, Herb. Ravenna, SGO)].

Famatina herbertiana (Lindl.) Ravenna = **Phycella herbertiana** Lindl.
Referencias: Ravenna, P. F., 1972b.

Famatina maulensis Ravenna
Sin.: *Miltinea maulensis* (Ravenna) Ravenna

Referencias: Ravenna, P. F., 1972b, 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500 m.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 1999* (Herb. Ravenna, SGO)].

Famatina saxatilis Ravenna = **Phycella herbertiana** Lindl.

Griffinia blumenavia K. Koch & C.D. Bouché ex Carrière = **Eithea blumenavia** (K. Koch & C.D. Bouché ex Carrière) Ravenna

Habranthus Herb.

Número de especies: 27, 24 endémicas

[Habranthus albispiritus Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Habranthus amambaicus Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003h.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Ferrucci, M. S. 1533* (CTES)].

Habranthus andalgalensis Ravenna
Sin.: *Habranthus guachipensis* Ravenna, *Habranthus ischihualastus* Ravenna
Referencias: Arroyo, S. C., 1990; Ravenna, P. F., 1967a, 1974, 1999b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CAT, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 359* (SI)].

Habranthus andersonii Herb. ex Lindl. = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1951.

Habranthus andersonii Herb. ex Lindl. var. *texanus* Herb. = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub
Referencias: Holmes, W. C. & Wells, C. J., 1980; Traub, H. P., 1951.

Habranthus andicola (Poepp.) Herb. = **Rhodophiala andicola** (Poepp.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1956.

Habranthus angustus Herb. = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1956.

[Habranthus argentinus Traub]
Sin.: *Zephyranthes lilacina* Speg., hom. illeg.
Referencias: Traub, H. P., 1951.
Notas: Nombre dudoso. Posible sinónimo de *Habranthus pedunculosus*.

Habranthus auratus Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003h.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Degen, R. 3082* (FCQ)].

Habranthus bagnoldianus Herb. var. *gilliesianus* Herb. = **Rhodophiala mendocina** (Phil.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1970a.

Habranthus bagnoldii Herb. = **Rhodophiala bagnoldii** (Herb.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Habranthus bakeri Phil. = **Rhodophiala bakeri** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Habranthus barrosianus Hunz. & Di Fulvio = **Habranthus versicolor** Herb.

Habranthus berteroanus Phil. = **Rhodophiala berteroana** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Habranthus bifidus Herb. = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Habranthus brachyandrus (Baker) Sealy
Sin.: *Hippeastrum brachyandrum* Baker, *Zephyranthes porphyrospila* E. Holmb.
Referencias: Arroyo, S. C., 1990; Herklots, G. A. C., 1980b; Ravenna, P. F., 1967a, 1974; Uphof, J. C. T., 1946.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, SFE, SLU); PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 206* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2017* (SI)].

Habranthus caaguazuensis Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003h.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAU, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Caballero Mármori, G. s.n.* (CTES)].

Habranthus calderensis Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003h.
Hierba. Perenne. Endémica. 1200–1400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 13941* (C)].

Habranthus cardenasianus Traub & I.S. Nelson = **Habranthus robustus** Herb. ex Sweet

[Habranthus carmineus Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

[Habranthus catamarcensis Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.
Notas: Nombre dudoso.

Habranthus chacoensis Ravenna
Referencias: Arroyo, S. C., 1990; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ravenna, P. F., 1970b, 1972a, 1981d.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA); PRY(PHA).

Ejemplares de referencia: ARG[*Kermes, E. 538* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 1973* (CTES, FCQ)].

Habranthus chilensis (L'Hér.) Herb. = **Rhodophiala chilensis** (L'Hér.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Habranthus coeruleus (Griseb.) Traub
Sin.: *Amaryllis coerula* Griseb., *Zephyranthes coerula* (Griseb.) Baker
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 1996; Ravenna, P. F., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(ERI); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CLA, MAL, RNO, ROC, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 877* (B, BAF, CORD, GOET)]; BRA[*Hatschbach, G. 19722* (MBM)]; URY[*Berro, M. B. 4169* (MVFA)].

Habranthus concinnus Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1999b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 54460* (Herb. Ravenna, MBM)].

Habranthus concordiae Ravenna = **Habranthus pedunculosus** Herb.
Referencias: Ravenna, P. F., 1981d.

Habranthus cordobensis Ravenna = **Habranthus robustus** Herb. ex Sweet

Habranthus crassibulbus Ravenna = **Habranthus robustus** Herb. ex Sweet

[Habranthus erectus Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 1970b.
Notas: Nombre dudoso.

[Habranthus estensis Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Habranthus flavus Phil. = **Rhodophiala flava** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Habranthus fulgens Hook. f. = **Rhodophiala fulgens** (Hook. f.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Habranthus gladioloides Hieron. = **Phycella herbertiana** Lindl.

Habranthus gracilifolius Herb.
Sin.: *Amaryllis gracilis* Spreng., *Hippeastrum gracilifolium* (Herb.) Baker, *Zephyranthes gracilifolia* (Herb.) G. Nicholson var. *bijou* E. Holmb., *Zephyranthes gracilifolia* (Herb.) G. Nicholson var. *bulula* E. Holmb.
Referencias: Arroyo, S. C., 1990; Fabris, H. A., 1969[1968]b; Hunziker, A. T. & Di Fulvio, T. E., 1973; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Uphof, J. C. T., 1946.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, SFE); URY(MAL, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Saint, J. B. s.n.* (SI)]; URY[*Delfino, L. s.n.* (MVJB)].

Habranthus guachipensis Ravenna = **Habranthus andalgalensis** Ravenna

Habranthus hesperius Herb. = **Rhodophiala advena** (Ker Gawl.) Traub

Habranthus holmbergii (Hieron.) Traub = **Habranthus pedunculosus** Herb.
Referencias: Ravenna, P. F., 1970a.

Habranthus ischihualastus Ravenna = **Habranthus andalgalensis** Ravenna

Habranthus jamesonii (Baker) Ravenna
Sin.: *Amaryllis jamesonii* (Baker) Traub & Uphof, *Habranthus melanopotamicus* (Speg.) Fabris, *Hippeastrum jamesonii* Baker, *Rhodophiala jamensonii* (Baker) Traub & Uphof, *Zephyranthes melanopotamica* Speg.
Referencias: Arroyo, S. C., 1990; Ravenna, P. F., 1969e, 1971b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27061* (SI)].

Habranthus jujuyensis (E. Holmb.) Traub = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.

Habranthus juncifolius Traub & W. Hayw. = **Habranthus pedunculosus** Herb.
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Habranthus leonensis Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1999a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Mereles, F. 7397* (FCQ)].

[Habranthus lilaceus Ravenna]
Notas: Nombre dudoso. No se indicó ejemplar tipo.

Habranthus lineatus Phil. = **Rhodophiala lineata** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Habranthus longipes (Baker) Sealy = **Habranthus versicolor** Herb.

Habranthus maasii Ravenna = **Habranthus robustus** Herb. ex Sweet

Habranthus magnoi Ravenna = **Habranthus robustus** Herb. ex Sweet

Habranthus martinezii Ravenna
Referencias: Arroyo, S. C., 1990; Mathew, B., 1987; Ravenna, P. F., 1970b, 1972a.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 24137* (SI)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar distribución o material de referencia (Arroyo, 1990).

Habranthus matacus Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1999b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(FOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Calieres, P. 81* (BAB)].

Habranthus melanopotamicus (Speg.) Fabris = **Habranthus jamesonii** (Baker) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1969e.

Habranthus mendocensis (Baker) Sealy
Sin.: *Habranthus reedii* Traub, nom. illeg., *Zephyranthes mendocensis* Baker
Referencias: Arroyo, S. C., 1990; Sealy, J. R., 1937.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 6061* (SI)].

Habranthus mendocinus Phil. = **Rhodophiala mendocina** (Phil.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1970a.

Habranthus montanus Phil. = **Rhodophiala montana** (Phil.) Traub

Habranthus niveus Ravenna = **Habranthus robustus** Herb. ex Sweet

Habranthus oltanus Ravenna = **Habranthus robustus** Herb. ex Sweet

Habranthus oranensis Ravenna = **Habranthus robustus** Herb. ex Sweet

Habranthus pallidus Lodd. = **Rhodophiala advena** (Ker Gawl.) Traub

Habranthus paxii Traub = **Habranthus pedunculosus** Herb.

Habranthus pedunculosus Herb.
Sin.: *Habranthus concordiae* Ravenna, *Habranthus holmbergii* (Hieron.) Traub, *Habranthus juncifolius* Traub & W. Hayw., *Habranthus paxii* Traub, *Habranthus teretifolius* (C.H. Wright) Traub & Moldenke, *Habranthus unifolius* (Arechav.) Traub, *Hippeastrum holmbergii* Hicken, *Hippeastrum pedunculosum* (Herb.) E. Holmb., *Hippeastrum teretifolium* C.H. Wright, *Hippeastrum tubispathum* Pax var. *grandiflorum* Hicken, *Hippeastrum tubispathum* Pax, hom. illeg., *Zephyranthes unifolia* Arechav.
Referencias: Arroyo, S. C., 1990; Ravenna, P. F., 1970a, 1974, 1981d; Traub, H. P. & Hayward, W., 1945; Uphof, J. C. T., 1946.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(GUA, MIE); URY(ART, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Leuenberger, B. E. 4496* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 63639* (PACA)]; PRY[*Jörgensen, P. 3867* (BA, SI)]; URY[*Berro, M. B. 1567* (MVFA)].

Habranthus philadelphicus Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003h.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Arenas, P. 3310* (FCQ)].

Habranthus phycelloides Herb. = **Rhodophiala phycelloides** (Herb.) Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1985.

Habranthus pictus Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1999a.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1000 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Baló, J. 86/10288* (SI)].

Habranthus pratensis (Poepp.) Herb. = **Rhodophiala pratensis** (Poepp.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Habranthus pulcher Herb. = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Habranthus quilmesianus Ravenna = **Habranthus robustus** Herb. ex Sweet

Habranthus reedii Traub, nom. illeg. = **Habranthus mendocensis** (Baker) Sealy
Referencias: Ravenna, P. F., 1970a.

Habranthus riojanus Ravenna
Referencias: Arroyo, S. C., 1990; Ravenna, P. F., 1970a.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 5553* (BAB)].

Habranthus robustus Herb. ex Sweet
Sin.: *Amaryllis berterii* Spreng., *Habranthus cardenasianus* Traub & I.S. Nelson, *Habranthus cordobensis* Ravenna, *Habranthus crassibulbus* Ravenna, *Habranthus maasii* Ravenna, *Habranthus magnoi* Ravenna, *Habranthus niveus* Ravenna, *Habranthus oltanus* Ravenna, *Habranthus oranensis* Ravenna, *Habranthus quilmesianus* Ravenna, *Habranthus spectabilis* Ravenna, *Habranthus steyermarkii* Ravenna, *Zephyranthes mesochloa* Herb. ex Lindl. f. *rosea* Kuntze, *Zephyranthes robusta* (Herb. ex Sweet) Baker, *Zephyranthes tauberti* Harms
Referencias: Ravenna, P. F., 1967a, 1974; Stapf, O., 1926.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–1300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, TUC); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. 22032* (SI)]; BRA[*Stienstra, B. H. 4* (SI)].

Habranthus roseus Sweet = **Rhodophiala rosea** (Sweet) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Habranthus ruber Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1970a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 1001* (Herb. Ravenna)].

Habranthus ruizlealii Ravenna
Referencias: Arroyo, S. C., 1990; Ravenna, P. F., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 16571* (MERL)].

Habranthus salinarum Ravenna
Referencias: Arroyo, S. C., 1990; Ravenna, P. F., 1970b, 1972a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 6280* (BAB)].

[Habranthus saltensis Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Habranthus schulzianus Ravenna
Referencias: Arroyo, S. C., 1990; Ravenna, P. F., 1972c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Alonso 686* (SI)].

Habranthus spathaceus Herb. = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Habranthus speciosus Herb. = **Rhodophiala pratensis** (Poepp.) Traub
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.

Habranthus spectabilis Ravenna = **Habranthus robustus** Herb. ex Sweet

Habranthus splendens Renjifo = **Rhodophiala splendens** (Renjifo) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Habranthus steyermarkii Ravenna = **Habranthus robustus** Herb. ex Sweet

Habranthus teretifolius (C.H. Wright) Traub & Moldenke = **Habranthus pedunculosus** Herb.
Referencias: Ravenna, P. F., 1974, 1981d.

Habranthus tubispathus (L'Hér.) Traub
Sin.: *Amaryllis andersonii* (Herb. ex Lindl.) Griseb., *Amaryllis tubispatha* L'Hér., *Habranthus andersonii* Herb. ex Lindl., *Habranthus andersonii* Herb. ex Lindl. var. *texanus* Herb., *Habranthus tubispathus* (L'Hér.) Traub f. *bicolor* (Ravenna) Traub, *Habranthus tubispathus* (L'Hér.) Traub f. *roseus* (Ravenna) Traub, *Habranthus tubispathus* (L'Hér.) Traub subsp. *macranthus* Ravenna, *Habranthus tubispathus* (L'Hér.) Traub subsp. *variabilis* Ravenna, *Habranthus variabilis* (Ravenna) Ravenna, *Habranthus variabilis* (Ravenna) Ravenna var. *bicolor* Ravenna, *Habranthus variabilis* (Ravenna) Ravenna var. *roseus* Ravenna, *Hippeastrum tubispathum* (L'Hér.) Baker, *Zephyranthes andersonii* (Herb. ex Lindl.) Benth. & Hook. f., *Zephyranthes commersoniana* Herb.
Referencias: Arroyo, S. C., 1990; Herklots, G. A. C., 1980b; Holmes, W. C. & Wells, C. J., 1980; Ravenna, P. F., 1970a, 1971b; Traub, H. P., 1951, 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE); CHL(VIII); PRY(COA, PHA); URY(CAS, CLO, LAV, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Crespo, S. s.n.* (SI), *Leuenberger, B. E. 4158* (B)]; CHL[*Ugarte, E. s.n.* (CONC)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 1017* (F), *Jörgensen, P. 3876* (SI)]; URY[*Commerson, P. s.n.* (P), *Herter, W. G. F. 85498* (F)].

Habranthus tubispathus (L'Hér.) Traub f. *bicolor* (Ravenna) Traub = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub

Habranthus tubispathus (L'Hér.) Traub f. *roseus* (Ravenna) Traub = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub

Habranthus tubispathus (L'Hér.) Traub subsp. *macranthus* Ravenna = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub
Referencias: Arroyo, S. C., 1990.

Habranthus tubispathus (L'Hér.) Traub subsp. *variabilis* Ravenna = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub
Referencias: Arroyo, S. C., 1990.

Habranthus unifolius (Arechav.) Traub = **Habranthus pedunculosus** Herb.

Habranthus variabilis (Ravenna) Ravenna = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub

Habranthus variabilis (Ravenna) Ravenna var. *bicolor* Ravenna = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub

Habranthus variabilis (Ravenna) Ravenna var. *roseus* Ravenna = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub

Habranthus venturianus Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1999b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SDE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 9948* (LP)].

Habranthus versicolor Herb.
Sin.: *Amaryllis versicolor* (Herb.) Spreng., *Habranthus barrosianus* Hunz. & Di Fulvio, *Habranthus longipes* (Baker) Sealy, *Hippeastrum versicolor* (Herb.) Baker, *Zephyranthes longipes* Baker, *Zephyranthes pluricolor*

Herter, nom. illeg., *Zephyranthes versicolor* (Herb.) Baker
Referencias: Herter, W. G. F., 1949–1956; Hunziker, A. T. & Di Fulvio, T. E., 1973.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); PRY(APY); URY(LAV, MAL, MON, SAO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barros, M. 1863* (BA)]; PRY[*Hassler, E. 2497* (LIL, MO)]; URY[*Herter, W. G. F. 621a* (*)].

Haylockia americana (Hoffmanns.) Herter = **Zephyranthes americana** (Hoffmanns.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1971a.

Haylockia americana (Hoffmanns.) Traub, comb. superfl. = **Zephyranthes americana** (Hoffmanns.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1971a.

Haylockia andina R.E. Fr. = **Zephyranthes andina** (R.E. Fr.) Traub
Referencias: Ravenna, P. F., 1971a; Traub, H. P., 1951.

Haylockia pusilla Herb. = **Zephyranthes americana** (Hoffmanns.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1971a.

Haylockia pusilla Herb. var. *rubella* Herb. = **Zephyranthes americana** (Hoffmanns.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1971a.

Hieronymiella Pax

Número de especies: 5, 4 endémicas

Hieronymiella angacoana Ravenna = **Hieronymiella marginata** (Pax) Hunz.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005.

[Hieronymiella angustissima Ravenna]
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005; Ravenna, P. F., 2001g.
Notas: Nombre dudoso.

Hieronymiella argentina (Pax) Hunz. & S.C. Arroyo = **Hieronymiella marginata** (Pax) Hunz.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005.

Hieronymiella aurea Ravenna
Sin.: *Hieronymiella tintinensis* Hunz.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005; Ravenna, P. F., 1967a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3200 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 3185* (SI)].

Hieronymiella clidanthoides Pax
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005; Hunziker, A. T., 1969a.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2200 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Leuenberger, B. E. 4316* (B, CORD)].

Hieronymiella ferruginea Ravenna = **Hieronymiella marginata** (Pax) Hunz.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005.

Hieronymiella latifolia (R.E. Fr.) Di Fulvio & Hunz. = **Hieronymiella marginata** (Pax) Hunz.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005.

Hieronymiella marginata (Pax) Hunz.
Sin.: *Androstephanos tarijensis* Fern. Casas & R. Lara, *Eustephia argentina* Pax, *Eustephia latifolia* (R.E. Fr.) Traub, *Eustephia marginata* Pax, *Eustephia pamiana* Stapf, *Eustephiopsis latifolia* R.E. Fr., *Eustephiopsis marginata* (Pax) R.E. Fr., *Eustephiopsis marginata* (Pax) R.E. Fr. subsp. *latifolia* (R.E. Fr.) Ravenna, *Hieronymiella angacoana* Ravenna, *Hieronymiella argentina* (Pax) Hunz. & S.C. Arroyo, *Hieronymiella ferruginea* Ravenna, *Hieronymiella latifolia* (R.E. Fr.) Di Fulvio & Hunz., *Hieronymiella marginata* (Pax) Hunz. var. *latifolia* (R.E. Fr.) Hunz., *Hieronymiella pamiana* (Stapf) Hunz., *Hieronymiella tarijensis* (Fern. Casas & R. Lara) Fern. Casas
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Hunziker, A. T., 1995; Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005; Hunziker, A. T., 1967c, 1969a, 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4796* (SI)].

Hieronymiella marginata (Pax) Hunz. var. *latifolia* (R.E. Fr.) Hunz. = **Hieronymiella marginata** (Pax) Hunz.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005.

Hieronymiella pamiana (Stapf) Hunz. = **Hieronymiella marginata** (Pax) Hunz.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005.

Hieronymiella speciosa (R.E. Fr.) Hunz.
Sin.: *Eustephia speciosa* (R.E. Fr.) Traub, *Eustephiopsis speciosa* R.E. Fr.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005; Hunziker, A. T., 1969a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2600–3900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Leuenberger, B. E. 4593a* (B)].

Hieronymiella tarijensis (Fern. Casas & R. Lara) Fern. Casas = **Hieronymiella marginata** (Pax) Hunz.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005.

Hieronymiella tintinensis Hunz. = **Hieronymiella aurea** Ravenna
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005.

Hieronymiella vittata Ravenna
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 2005; Ravenna, P. F., 2001c.
Hierba. Perenne. Endémica. 3300 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kerdel, J. s.n.* (LP)].

Hippeastrum Herb., nom. cons.

Número de especies: 19, 7 endémicas

Hippeastrum advenum (Ker Gawl.) Herb. = **Rhodophiala advena** (Ker Gawl.) Traub

Hippeastrum aglaiae (A. Cast.) Hunz. & Cocucci
Sin.: *Amaryllis aglaiae* A. Cast.
Referencias: Hunziker, A. T. & Coccuci, A. E., 1959.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA)].

Hippeastrum ambiguum Herb. = **Hippeastrum vittatum** (L'Hér.) Herb.

Hippeastrum ambiguum Herb. var. *tweedianum* Herb. = **Hippeastrum vittatum** (L'Hér.) Herb.

Hippeastrum ananuca Phil. = **Rhodophiala ananuca** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Hippeastrum andicola (Poepp.) Baker = **Rhodophiala andicola** (Poepp.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Hippeastrum andinum (Phil.) Phil. = **Phycella herbertiana** Lindl.
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.

Hippeastrum angustifolium (Phil.) Phil., nom. illeg. = **Phycella angustifolia** Phil.

Hippeastrum angustifolium Pax
Sin.: *Amaryllis angustifolia* (Pax) Traub & Uphof, *Amaryllis canterai* (Arechav.) Traub & Uphof, *Hippeastrum canterai* Arechav., *Sprekelia spectabilis* Hoehne
Referencias: Castillo, J., 1986; Ravenna, P. F., 1967a; Traub, H. P. & Uphof, J. C. T., 1938.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(PAI); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 28761* (SI), *de Llamas, A. 26616* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 4591* (AS)]; URY[*Berro, M. B. 5957* (MVFA)].

Hippeastrum araucanum Phil. = **Rhodophiala araucana** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Hippeastrum arboricola (Ravenna) Meerow = **Hippeastrum striatum** (Lam.) H.E. Moore

Hippeastrum arboricolum (Ravenna) J. Castillo, nom. illeg. = **Hippeastrum striatum** (Lam.) H.E. Moore

Hippeastrum arechavaletae Baker = **Hippeastrum vittatum** (L'Hér.) Herb.

Hippeastrum argentinum (Pax) Hunz.
Sin.: *Amaryllis argentina* (Pax) Ravenna, *Amaryllis candida* (Stapf) Traub & Uphof, nom. illeg., *Amaryllis immaculata* Traub & Moldenke, *Amaryllis tucumana* (E. Holmb.) Traub & Uphof, *Crinum argentinum* Pax, *Hippeastrum candidum* Stapf, *Hippeastrum tucumanum* E. Holmb.
Referencias: Castillo, J., 1991; Hunziker, A. T., 1967c; Ravenna, P. F., 1981d.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. s.n.* (B, CORD)].

Hippeastrum argilagae (Traub) Dutilh = **Hippeastrum striatum** (Lam.) H.E. Moore

Hippeastrum aulicum (Ker Gawl.) Herb.
Sin.: *Amaryllis aulica* Ker Gawl.
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. M. 1650* (MBM)].
Notas: Citado para Paraguay sin indicar localidad ni material de referencia (Traub & Moldenke 1949).

Hippeastrum aviflorum (Ravenna) Dutilh = **Hippeastrum glaucescens** (Mart.) Herb.

Hippeastrum bagnoldii (Herb.) Baker = **Rhodophiala bagnoldii** (Herb.) Traub

Hippeastrum bagnoldii (Herb.) Baker var. *minor* Speg. = **Rhodophiala bagnoldii** (Herb.) Traub

Hippeastrum bakeri (Phil.) Traub & Uphof = **Rhodophiala bakeri** (Phil.) Traub

Hippeastrum berteroanum (Phil.) Baker = **Rhodophiala berteroana** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Hippeastrum bicolor (Ruiz & Pav.) Baker = **Phycella bicolor** (Ruiz & Pav.) Herb.

Hippeastrum bifidum (Herb.) Baker = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub
Referencias: Fabris, H. A., 1969[1968]b; Traub, H. P., 1956.

Hippeastrum blossfeldiae (Traub & L.J. Doran) Van Scheepen
Sin.: *Amaryllis blossfeldiae* Traub & L.J. Doran
Referencias: Meerow, A. W., Scheepen, J. & Dutilh, J. H. A., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 57176* (MBM)].

Hippeastrum blumenavia (K. Koch & C.D. Bouché ex Carrière) Sealy = **Eithea blumenavia** (K. Koch & C.D. Bouché ex Carrière) Ravenna

Hippeastrum bonariense Kuntze = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Hippeastrum brachyandrum Baker = **Habranthus brachyandrus** (Baker) Sealy
Referencias: Sealy, J. R., 1937; Uphof, J. C. T., 1946.

Hippeastrum breviflorum Herb.
Sin.: *Amaryllis breviflora* (Herb.) Traub & Uphof
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 61286* (MBM)].

Hippeastrum bulbulosum Herb. var. *rutilum* (Ker Gawl.) Herb. = **Hippeastrum striatum** (Lam.) H.E. Moore

Hippeastrum candidum Stapf = **Hippeastrum argentinum** (Pax) Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1967c.

Hippeastrum canterai Arechav. = **Hippeastrum angustifolium** Pax

Hippeastrum chilense (L'Hér.) Baker = **Rhodophiala chilensis** (L'Hér.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Hippeastrum colonum Phil. = **Rhodophiala colona** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Hippeastrum consobrinum Phil. = **Rhodophiala consobrina** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Hippeastrum curitibanum (Ravenna) Dutilh = **Hippeastrum glaucescens** (Mart.) Herb.

Hippeastrum cybister (Herb.) Benth. ex Baker
Sin.: *Lepidopharynx deflexa* Rusby, *Sprekelia cybister* Herb.
Referencias: Cárdenas, H. M., 1967; Hunziker, A. T., 1971c.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. s.n.* (CORD)].

Hippeastrum elwesii C.H. Wright = **Rhodophiala mendocina** (Phil.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1970a.

Hippeastrum flammigerum E. Holmb. = **Hippeastrum striatum** (Lam.) H.E. Moore

Hippeastrum fulgens (Hook. f.) Phil. = **Rhodophiala fulgens** (Hook. f.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Hippeastrum gayanum Kuntze = **Phycella gayana** (Kuntze) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Hippeastrum gertianum (Ravenna) Dutilh = **Hippeastrum striatum** (Lam.) H.E. Moore

Hippeastrum gladioloides (Hieron.) Pax = **Phycella herbertiana** Lindl.

Hippeastrum glaucescens (Mart.) Herb.
Sin.: *Amaryllis aviflora* Ravenna, *Amaryllis curitibana* Ravenna, *Amaryllis glaucescens* Mart., *Amaryllis hemographes* Ravenna, *Amaryllis iguazuana* Ravenna, *Amaryllis rubropicta* Ravenna, *Amaryllis teyucuarensis* Ravenna, *Hippeastrum aviflorum* (Ravenna) Dutilh, *Hippeastrum curitibanum* (Ravenna) Dutilh, *Hippeastrum hemographes* (Ravenna) Dutilh, *Hippeastrum iguazuanum* (Ravenna) J. Castillo, nom. illeg., *Hippeastrum iguazuanum* (Ravenna) T.R. Dudley & M. Williams, *Hippeastrum rubropictum* (Ravenna) Meerow, *Hippeastrum teyucuarense* (Ravenna) Scheepen
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 6036* (B, CTES)]; BRA[*Silva, J. M. 2725* (MBM)].

Hippeastrum gracilifolium (Herb.) Baker = **Habranthus gracilifolius** Herb.
Referencias: Fabris, H. A., 1969[1968]b.

Hippeastrum granatiflorum E. Holmb. = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub
Referencias: Ravenna, P. F., 1970a.

Hippeastrum guarapuavicum (Ravenna) Van Scheepen = **Hippeastrum vittatum** (L'Hér.) Herb.

Hippeastrum harrisonii (Lindl.) Hook. f. = **Hippeastrum vittatum** (L'Hér.) Herb.

Hippeastrum hemographes (Ravenna) Dutilh = **Hippeastrum glaucescens** (Mart.) Herb.

Hippeastrum herbertianum (Lindl.) Baker = **Phycella herbertiana** Lindl.
Referencias: Traub, H. P., 1956.

Hippeastrum hesperidius Herb. var. *pallidum* Herb. = **Rhodophiala advena** (Ker Gawl.) Traub
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Hippeastrum heuserianum H. Karst.
Sin.: *Amaryllis aulica* Ker Gawl. var. *platypetala* Lindl., *Amaryllis heuseriana* (H. Karst.) Ravenna, *Aulica platypetala* (Lindl.) Raf.
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19560* (MBM)].

Hippeastrum holmbergii Hicken = **Habranthus pedunculosus** Herb.

Hippeastrum igneum (Lindl.) Muñoz = **Phycella cyrtanthoides** (Sims) Lindl.

Hippeastrum iguapense R. Wagner = **Eithea blumenavia** (K. Koch & C.D. Bouché ex Carrière) Ravenna
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.

Hippeastrum iguazuanum (Ravenna) J. Castillo, nom. illeg. = **Hippeastrum glaucescens** (Mart.) Herb.

Hippeastrum iguazuanum (Ravenna) T.R. Dudley & M. Williams = **Hippeastrum glaucescens** (Mart.) Herb.

Hippeastrum illustre (Vell.) Dutilh
Sin.: *Amaryllis illustris* Vell.
Referencias: Meerow, A. W., Scheepen, J. & Dutilh, J. H. A., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 40249* (MBM)].

Hippeastrum jamesonii Baker = **Habranthus jamesonii** (Baker) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1969e.

Hippeastrum laetum Phil. = **Rhodophiala tiltilensis** (Traub & Moldenke) Traub
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.

Hippeastrum lineatum (Phil.) Baker = **Rhodophiala lineata** (Phil.) Traub

Hippeastrum marginatum R.E. Fr. = **Chlidanthus marginatus** (R.E. Fr.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Hippeastrum marumbiense (Ravenna) Van Scheepen
Sin.: *Amaryllis marumbiensis* Ravenna
Referencias: Meerow, A. W., Scheepen, J. & Dutilh, J. H. A., 1997; Ravenna, P. F., 1982a.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24191* (MBM)].

Hippeastrum modestum (Phil.) Baker = **Traubia modesta** (Phil.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Hippeastrum moelleri Phil. = **Rhodophiala moelleri** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Hippeastrum montanum (Phil.) Baker = **Rhodophiala montana** (Phil.) Traub

Hippeastrum morelianum Lem.
Sin.: *Amaryllis moreliana* (Lem.) Traub
Referencias: Ravenna, P. F., 1982a; Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 9815* (HBR)].

Hippeastrum pallidum (Herb.) Pax = **Rhodophiala advena** (Ker Gawl.) Traub
Referencias: Böcher, T. W., Hjerting, J. P. K. & Rahn, K., 1968; Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.

Hippeastrum papilio (Ravenna) Van Scheepen
Sin.: *Amaryllis papilio* Ravenna
Referencias: Meerow, A. W., Scheepen, J. & Dutilh, J. H. A., 1997; Ravenna, P. F., 1971a, 1981d.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 1000* (Herb. Ravenna), *sin colector s.n.* (MVM)].

Hippeastrum paranaense (Traub) Meerow = **Amaryllis belladona** L.

Hippeastrum parodii Hunz. & Coccuci
Sin.: *Amaryllis parodii* (Hunz. & Cocucci) Traub
Referencias: Hunziker, A. T. & Coccuci, A. E., 1959; Traub, H. P., 1961.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 17953* (CORD)].

Hippeastrum pedunculosum (Herb.) E. Holmb. = **Habranthus pedunculosus** Herb.
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Hippeastrum petiolatum Pax = **Hippeastrum striatum** (Lam.) H.E. Moore

Hippeastrum phycelloides (Herb.) Baker = **Rhodophiala phycelloides** (Herb.) Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1985.

Hippeastrum platense E. Holmb. = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1956.

Hippeastrum platense E. Holmb. var. *angustum* (Schult.) E. Holmb. = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Hippeastrum popetanum Phil. = **Rhodophiala popetana** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Hippeastrum pratense (Poepp.) Baker = **Rhodophiala pratensis** (Poepp.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Hippeastrum psittacinum (Ker Gawl.) Herb.
Sin.: *Amaryllis psittacina* Ker Gawl.
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19784* (MBM)].

Hippeastrum pulchrum (Herb.) E. Holmb. = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Hippeastrum purpuratum Phil. = **Rhodophiala andicola** (Poepp.) Traub
Referencias: Ravenna, P. F., 1970a.

Hippeastrum reticulatum (L'Hér.) Herb.
Sin.: *Amaryllis reticulata* L'Hér.
Referencias: Ravenna, P. F., 1969d; Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 8829* (MBM)].

Hippeastrum rhodolirion (Phil.) Baker = **Rhodophiala rhodolirion** (Baker) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Hippeastrum roseum (Sweet) Baker = **Rhodophiala rosea** (Sweet) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Hippeastrum rubropictum (Ravenna) Meerow = **Hippeastrum glaucescens** (Mart.) Herb.

Hippeastrum rutilum (Ker Gawl.) Herb. = **Hippeastrum striatum** (Lam.) H.E. Moore

Hippeastrum santacatarina (Traub) Dutilh
Sin.: *Amaryllis santacatarina* Traub
Referencias: Meerow, A. W., Scheepen, J. & Dutilh, J. H. A., 1997; Traub, H. P., 1958.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 9101* (TRA)].

Hippeastrum solisii Phil. = **Rhodophiala flava** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.

Hippeastrum splendens (Renjifo) Renjifo ex Phil. = **Rhodophiala splendens** (Renjifo) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Hippeastrum striatum (Lam.) H.E. Moore
Sin.: *Amaryllis arboricola* Ravenna, *Amaryllis argilagae* Traub, *Amaryllis flammigera* (E. Holmb.) Traub & Uphof, *Amaryllis gertiana* Ravenna, *Amaryllis petiolata* (Pax) Traub & Uphof, *Amaryllis rutila* Ker Gawl., *Amaryllis striata* Lam., *Hippeastrum arboricola* (Ravenna) Meerow, *Hippeastrum arboricolum* (Ravenna) J. Castillo, nom. illeg., *Hippeastrum argilagae* (Traub) Dutilh, *Hippeastrum bulbulosum* Herb. var. *rutilum* (Ker Gawl.) Herb., *Hippeastrum flammigerum* E. Holmb., *Hippeastrum gertianum* (Ravenna) Dutilh, *Hippeastrum petiolatum* Pax, *Hippeastrum rutilum* (Ker Gawl.) Herb.
Referencias: Dutilh, J. H. A., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS, MIS, TUC); BRA(PAR, SCA); URY(COL, MON, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cardozo, A. 134* (B)]; BRA[*Hatschbach, G. 27082* (Herb. Ravenna, MBM)]; URY[*Felippone, F. 3373* (SI)].

Hippeastrum tenuiflorum Phil. = **Rhodophiala tenuiflora** (Phil.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Hippeastrum teretifolium C.H. Wright = **Habranthus pedunculosus** Herb.
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Hippeastrum teyucuarense (Ravenna) Scheepen = **Hippeastrum glaucescens** (Mart.) Herb.

Hippeastrum tubispathum (L'Hér.) Baker = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1951.

Hippeastrum tubispathum Pax, hom. illeg. = **Habranthus pedunculosus** Herb.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 1996.

Hippeastrum tubispathum Pax var. *grandiflorum* Hicken = **Habranthus pedunculosus** Herb.

Hippeastrum tucumanum E. Holmb. = **Hippeastrum argentinum** (Pax) Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1967c.

Hippeastrum uniflorum (Phil.) Baker = **Rhodophiala uniflora** Phil.

Hippeastrum versicolor (Herb.) Baker = **Habranthus versicolor** Herb.

Hippeastrum vittatum (L'Hér.) Herb.
Sin.: *Amaryllis guarapuvica* Ravenna, *Amaryllis harrisonii* Lindl., *Amaryllis lineata* Colla, *Amaryllis vittata* L'Hér., *Amaryllis vittata* L'Hér. subsp. *guarapuavae* Ravenna, *Amaryllis vittata* L'Hér. var. *tweediana* (Herb.) Traub, *Hippeastrum ambiguum* Herb., *Hippeastrum ambiguum* Herb. var. *tweedianum* Herb., *Hippeastrum arechavaletae* Baker, *Hippeastrum guarapuavicum* (Ravenna) Van Scheepen, *Hippeastrum harrisonii* (Lindl.) Hook. f.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA); PRY(APY, CAN, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cardozo, A. 132* (B)]; BRA[*Klein, R. M. 4085* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 4669* (G)].

Hymenocallis adnata Herb. var. *disticha* Herb.
= **Hymenocallis litoralis** (Jacq.) Salisb. var. **disticha** Herb.

[Hymenocallis calathina (Herb.) Nichols]
Sin.: *Ismene calathina* Herb.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Hymenocallis litoralis (Jacq.) Salisb. var. disticha Herb.]
Sin.: *Hymenocallis adnata* Herb. var. *disticha* Herb.
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

[Hymenocallis niederleinii Pax]
Notas: Nombre dudoso.

Ismene calathina Herb. = **Hymenocallis calathina** (Herb.) Nichols

Lapiedra chilensis F. Phil. = **Traubia modesta** (Phil.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Lepidopharynx deflexa Rusby = **Hippeastrum cybister** (Herb.) Benth. ex Baker
Referencias: Cárdenas, H. M., 1967.

Miltinea maulensis (Ravenna) Ravenna = **Famatina maulensis** Ravenna

Myostemma araucana (Phil.) Ravenna = **Rhodophiala araucana** (Phil.) Traub

Myostemma berteroana (Phil.) Ravenna = **Rhodophiala berteroana** (Phil.) Traub

Myostemma bifida (Herb.) Ravenna = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Myostemma bifida (Herb.) Ravenna f. *granatiflora* (E. Holmb.) Ravenna = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

[Myostemma cautinensis Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Myostemma elwesii (C.H. Wright) Ravenna
= **Rhodophiala mendocina** (Phil.) Ravenna

Myostemma gilliesiana (Herb.) Ravenna = **Rhodophiala mendocina** (Phil.) Ravenna

Myostemma maculata (L'Hér.) Ravenna = **Rhodophiala maculata** (L'Hér.) Ravenna

[Myostemma monantha Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Myostemma montana (Phil.) Ravenna = **Rhodophiala montana** (Phil.) Traub

Myostemma phycelloides (Herb.) Ravenna
= **Rhodophiala phycelloides** (Herb.) Hunz.

Myostemma pratensis (Poepp.) Ravenna = **Rhodophiala pratensis** (Poepp.) Traub

Myostemma tiltilensis (Traub & Moldenke) Ravenna
= **Rhodophiala tiltilensis** (Traub & Moldenke) Traub

Phycella Lindl.

Número de especies: 6 endémicas

Phycella angustifolia Phil.
Sin.: *Amaryllis philippiana* Traub & Uphof, *Hippeastrum angustifolium* (Phil.) Phil., nom. illeg.
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Dávila, B. s.n.* (SGO)].

Phycella australis Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1981d.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 2070* (C, K, NY, SGO, TRA, U)].

[Phycella bicolor (Ruiz & Pav.) Herb.]
Sin.: *Amaryllis bicolor* Ruiz & Pav., *Hippeastrum bicolor* (Ruiz & Pav.) Baker
Notas: Nombre dudoso.

Phycella bonariensis (Kuntze) Traub = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Phycella cyrtanthoides (Sims) Lindl.
Sin.: *Amaryllis cyrtanthoides* Sims, *Amaryllis demissa* Steud., *Amaryllis ignea* Lindl., *Hippeastrum igneum* (Lindl.) Muñoz, *Phycella magnifica* Herb.
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Tome, G. 220* (CONC)].

Phycella gayana (Kuntze) Traub
Sin.: *Amaryllis gayana* (Kuntze) Traub & Uphof, *Hippeastrum gayanum* Kuntze
Referencias: Traub, H. P., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(RME).

Phycella graciliflora Herb. = **Phycella herbertiana** Lindl.
Referencias: Hunziker, A. T., 1985.

Phycella granatiflora (E. Holmb.) Traub = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub
Referencias: Ravenna, P. F., 1970a.

Phycella herbertiana Lindl.
Sin.: *Amaryllis gladioloides* (Hieron.) Traub & Uphof, *Amaryllis herbertiana* (Lindl.) Traub & Uphof, *Bathya andina* (Phil.) Ravenna, *Famatina andina* (Phil.) Ravenna, *Famatina herbertiana* (Lindl.) Ravenna,

Famatina saxatilis Ravenna, *Habranthus gladioloides* Hieron., *Hippeastrum andinum* (Phil.) Phil., *Hippeastrum gladioloides* (Hieron.) Pax, *Hippeastrum herbertianum* (Lindl.) Baker, *Phycella graciliflora* Herb., *Rhodophiala andina* Phil., *Rhodophiala gladioloides* (Hieron.) Traub, *Rhodophiala herbertiana* (Lindl.) Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1985; Ravenna, P. F., 1972b, 1981d; Traub, H. P., 1956.
Hierba. Perenne. Endémica. 1200–2000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU); CHL(V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Leuenberger, B. E. 3778* (B)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Phycella magnifica Herb. = **Phycella cyrtanthoides** (Sims) Lindl.
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.

Phycella phycelloides (Herb.) Traub = **Rhodophiala phycelloides** (Herb.) Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1985.

Phycella scarlatina Ravenna
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Ravenna, P. F., 1981d.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000 m.
Países: CHL(IV, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 2061* (SGO)].

Placea Miers

Número de especies: 5 endémicas

Placea amoena Phil.
Referencias: Arriagada, L. & Zollner, O., 1996; Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–2000 m.
Países: CHL(IV, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Geisse, G. s.n.* (SGO)].

Placea arzae Phil.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 1996; Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–2000 m.
Países: CHL(V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Schlegel, H. 126* (CONC)].

Placea davidii Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1981d.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 2032* (F, K, S, TRA, U, US)].

Placea germainii Phil. = **Placea ornata** Miers ex Lindl.

Placea grandiflora Lem. = **Placea ornata** Miers ex Lindl.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Placea lutea Phil.
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Placea ornata Miers ex Lindl.
Sin.: *Placea germainii* Phil., *Placea grandiflora* Lem.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a; Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1700 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz-Schick, M. 4005* (SGO)].

Placea pratensis F. Phil., nom. nud. = **Rhodophiala pratensis** (Poepp.) Traub
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.

Pyrolirion Herb.

Número de especies: 1 introducida

Pyrolirion flammeum (Ruiz & Pav.) Herb. = **Pyrolirion tubiflorum** (L'Hér.) M. Roem.

Pyrolirion tubiflorum (L'Hér.) M. Roem.
Sin.: *Amaryllis flammea* Ruiz & Pav., *Amaryllis tubiflora* L'Hér., *Pyrolirion flammeum* (Ruiz & Pav.) Herb., *Zephyranthes flammea* (Ruiz & Pav.) Baker
Referencias: Marticorena, C., com. pers.; Ravenna, P. F., 2003i.
Hierba. Perenne. Introducida.
Países: CHL(I).

Rhodolirium andicola (Poepp.) Ravenna = **Rhodophiala andicola** (Poepp.) Traub

Rhodolirium andinum Phil. = **Rhodophiala rhodolirion** (Baker) Traub
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 1991; Ravenna, P. F., 1971b; Traub, H. P., 1956.

Rhodolirium chilense (L'Hér.) Ravenna = **Rhodophiala chilensis** (L'Hér.) Traub

Rhodolirium fulgens (Hook. f.) Ravenna = **Rhodophiala fulgens** (Hook. f.) Traub

Rhodolirium laetum (Phil.) Ravenna = **Rhodophiala laeta** Phil.

Rhodolirium montanum Phil. = **Rhodophiala rhodolirion** (Baker) Traub

Rhodolirium speciosum (Herb.) Ravenna = **Rhodophiala pratensis** (Poepp.) Traub

Rhodophiala C. Presl

Número de especies: 29, 28 endémicas

Rhodophiala advena (Ker Gawl.) Traub
Sin.: *Amaryllis advena* Ker Gawl., *Amaryllis valparadisiaca* Steud., *Chlidanthus cumingii* C. Presl, *Habenaria miniatus* D. Don ex Sweet, *Habranthus hesperius* Herb.,

Habranthus pallidus Lodd., *Hippeastrum advenum* (Ker Gawl.) Herb., *Hippeastrum hesperidius* Herb. var. *pallidum* Herb., *Hippeastrum pallidum* (Herb.) Pax
Referencias: Ravenna, P. F., 1970a; Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 1400 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Tome, G. 273* (CONC)].

Rhodophiala ananuca (Phil.) Traub
Sin.: *Amaryllis ananuca* (Phil.) Traub & Moldenke, *Hippeastrum ananuca* Phil.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 1996; Traub, H. P., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (B)].

Rhodophiala andicola (Poepp.) Traub
Sin.: *Amaryllis andicola* Poepp., *Amaryllis purpurata* (Phil.) Traub & Uphof, *Habranthus andicola* (Poepp.) Herb., *Hippeastrum andicola* (Poepp.) Baker, *Hippeastrum purpuratum* Phil., *Rhodolirium andicola* (Poepp.) Ravenna, *Rhodophiala purpurata* (Phil.) Traub, *Zephyranthes andicola* (Poepp.) Baker
Referencias: Ravenna, P. F., 1970a, 1971b; Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P. & Uphof, J. C. T., 1938; Traub, H. P., 1953, 1956.
Hierba. Perenne. Endémica. 1200–1800 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troiani, H. O. 15782* (SI)]; CHL[*Hollermayer, A. 417* (CONC)].

Rhodophiala andina Phil. = **Phycella herbertiana** Lindl.
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.

Rhodophiala araucana (Phil.) Traub
Sin.: *Amaryllis araucana* (Phil.) Traub & Uphof, *Hippeastrum araucanum* Phil., *Myostemma araucana* (Phil.) Ravenna
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Ravenna, P. F., 1969e, 1971b; Traub, H. P., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 6227* (BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20160* (CONC)].

Rhodophiala bagnoldii (Herb.) Traub
Sin.: *Amaryllis bagnoldi* (Herb.) D. Dietr., *Habranthus bagnoldii* Herb., *Hippeastrum bagnoldii* (Herb.) Baker, *Hippeastrum bagnoldii* (Herb.) Baker var. *minor* Speg.
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Behn, F. s.n.* (CONC)].

Rhodophiala bakeri (Phil.) Traub
Sin.: *Amaryllis backeri* (Phil.) Traub & Moldenke, *Amaryllis bakeri* (Phil.) Traub & Uphof, *Habranthus bakeri* Phil., *Hippeastrum bakeri* (Phil.) Traub & Uphof
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 20169* (CONC)].

Rhodophiala berteroana (Phil.) Traub
Sin.: *Amaryllis berteroana* (Phil.) Traub & Moldenke, *Habranthus berteroanus* Phil., *Hippeastrum berteroanum* (Phil.) Baker, *Myostemma berteroana* (Phil.) Ravenna
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero s.n.* (SGO)].

Rhodophiala bifida (Herb.) Traub
Sin.: *Amaryllis bifida* (Herb.) Spreng., *Amaryllis bifida* (Herb.) Spreng. var. *pulchra* (Herb.) Traub & Moldenke, *Amaryllis bifida* (Herb.) Spreng. var. *spathacea* (Herb.) Traub & Moldenke, *Amaryllis bonariensis* (Kuntze) Traub & Uphof, *Amaryllis granatiflora* (E. Holmb.) Traub & Uphof, *Amaryllis platensis* (E. Holmb.) Traub & Uphof, *Amaryllis pulchra* (Herb.) Traub & Uphof, *Habranthus angustus* Herb., *Habranthus bifidus* Herb., *Habranthus pulcher* Herb., *Habranthus spathaceus* Herb., *Hippeastrum bifidum* (Herb.) Baker, *Hippeastrum bonariense* Kuntze, *Hippeastrum granatiflorum* E. Holmb., *Hippeastrum platense* E. Holmb., *Hippeastrum platense* E. Holmb. var. *angustum* (Schult.) E. Holmb., *Hippeastrum pulchrum* (Herb.) E. Holmb., *Myostemma bifida* (Herb.) Ravenna, *Myostemma bifida* (Herb.) Ravenna f. *granatiflora* (E. Holmb.) Ravenna, *Phycella bonariensis* (Kuntze) Traub, *Phycella granatiflora* (E. Holmb.) Traub, *Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub subsp. *aemantha* Ravenna, *Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub subsp. *granatiflora* (E. Holmb.) Ravenna, *Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub subsp. *purpurea* Ravenna, *Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub var. *pulchra* (Herb.) Traub, *Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub var. *spathacea* (Herb.) Traub
Referencias: Ravenna, P. F., 1971a, 2003h; Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1956.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(RGS); PRY(ITA); URY(CAS, COL, DUR, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Leuenberger, B. E. 4380* (B), *Leuenberger, B. E. 4506* (SI)]; BRA[*Pabst, G. F. J. 7295* (MBM)]; PRY[*Schinini, A. 27677* (CTES)]; URY[*Alonso Paz, E. 3621* (MVFQ)].

Rhodophiala bifida (Herb.) Traub var. *pulchra* (Herb.) Traub = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Rhodophiala bifida (Herb.) Traub var. *spathacea* (Herb.) Traub = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Rhodophiala bifida (Herb.) Traub subsp. *aemantha* Ravenna = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Rhodophiala bifida (Herb.) Traub subsp. *granatiflora* (E. Holmb.) Ravenna = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Rhodophiala bifida (Herb.) Traub subsp. *purpurea* Ravenna = **Rhodophiala bifida** (Herb.) Traub

Rhodophiala biflora Phil.
Sin.: *Amaryllis biflora* (Phil.) Traub & Moldenke
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. s.n.* (SGO)].

Rhodophiala chilensis (L'Hér.) Traub
Sin.: *Amaryllis chilensis* L'Hér., *Habranthus chilensis* (L'Hér.) Herb., *Hippeastrum chilense* (L'Hér.) Baker, *Rhodolirium chilense* (L'Hér.) Ravenna
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 1306* (CONC)].

Rhodophiala colona (Phil.) Traub
Sin.: *Amaryllis colona* (Phil.) Traub & Uphof, *Hippeastrum colonum* Phil.
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*sin colector s.n.* (SGO)].

Rhodophiala consobrina (Phil.) Traub
Sin.: *Amaryllis consobrina* (Phil.) Traub & Uphof, *Hippeastrum consobrinum* Phil.
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(RME).
Notas: No se ha podido localizar material de referencia.

Rhodophiala elwesii (C.H. Wright) Traub = **Rhodophiala mendocina** (Phil.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1970a.

Rhodophiala flava (Phil.) Traub
Sin.: *Amaryllis flava* (Phil.) Traub & Uphof, *Amaryllis solisii* (Phil.) Traub & Uphof, *Habranthus flavus* Phil., *Hippeastrum solisii* Phil.
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000 m.
Países: CHL(VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Niemeyer s.n.* (CONC)].

Rhodophiala fulgens (Hook. f.) Traub
Sin.: *Amaryllis fulgens* (Hook. f.) Traub & Uphof, *Habranthus fulgens* Hook. f., *Hippeastrum fulgens* (Hook. f.) Phil., *Rhodolirium fulgens* (Hook. f.) Ravenna
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(X).

Rhodophiala gladioloides (Hieron.) Traub = **Phycella herbertiana** Lindl.

Rhodophiala herbertiana (Lindl.) Hunz. = **Phycella herbertiana** Lindl.

Rhodophiala jamensonii (Baker) Traub & Uphof = **Habranthus jamesonii** (Baker) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1971b.

Rhodophiala laeta Phil.
Sin.: *Rhodolirium laetum* (Phil.) Ravenna
Referencias: Arriagada, L. & Zollner, O., 1995; Ravenna, P. F., 1970a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. s.n.* (Herb. Ravenna)].

Rhodophiala lineata (Phil.) Traub
Sin.: *Amaryllis lineata* (Phil.) Traub & Uphof, hom. illeg., *Habranthus lineatus* Phil., *Hippeastrum lineatum* (Phil.) Baker
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Rhodophiala maculata (L'Hér.) Ravenna
Sin.: *Amaryllis maculata* L'Hér., *Myostemma maculata* (L'Hér.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1970a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. s.n.* (CONC)].

Rhodophiala mendocina (Phil.) Ravenna
Sin.: *Amaryllis elwesii* (C.H. Wright) Traub & Uphof, *Habranthus bagnoldianus* Herb. var. *gilliesianus* Herb., *Habranthus mendocinus* Phil., *Hippeastrum elwesii* C.H. Wright, *Myostemma elwesii* (C.H. Wright) Ravenna, *Myostemma gilliesiana* (Herb.) Ravenna, *Rhodophiala elwesii* (C.H. Wright) Traub
Referencias: Ravenna, P. F., 1971b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cano, E. 1732* (BAB), *Seijo, G. J. 2091* (SI)].

Rhodophiala modesta Phil. = **Traubia modesta** (Phil.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Rhodophiala moelleri (Phil.) Traub
Sin.: *Amaryllis moelleri* (Phil.) Traub & Moldenke, *Hippeastrum moelleri* Phil.
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.

Hierba. Perenne. Endémica. 900–1000 m.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pfister, A. s.n.* (CONC)].

Rhodophiala montana (Phil.) Traub
Sin.: *Amaryllis montana* (Phil.) Traub & Uphof, *Habranthus montanus* Phil., *Hippeastrum montanum* (Phil.) Baker, *Myostemma montana* (Phil.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003i; Traub, H. P., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Rhodophiala phycelloides (Herb.) Hunz.
Sin.: *Amaryllis phycelloides* (Herb.) Steud., *Habranthus phycelloides* Herb., *Hippeastrum phycelloides* (Herb.) Baker, *Myostemma phycelloides* (Herb.) Ravenna, *Phycella phycelloides* (Herb.) Traub
Referencias: Hunziker, A. T., 1985; Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2200 m.
Países: CHL(III, IV, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ruíz 1759* (CONC)].

Rhodophiala popetana (Phil.) Traub
Sin.: *Amaryllis popetana* (Phil.) Traub & Uphof, *Hippeastrum popetanum* Phil.
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2700 m.
Países: CHL(V, VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO)].

Rhodophiala pratensis (Poepp.) Traub
Sin.: *Amaryllis atacamensis* Traub & Uphof, *Amaryllis pratensis* Poepp., *Habranthus pratensis* (Poepp.) Herb., *Habranthus speciosus* Herb., *Hippeastrum pratense* (Poepp.) Baker, *Myostemma pratensis* (Poepp.) Ravenna, *Placea pratensis* F. Phil., nom. nud., *Rhodolirium speciosum* (Herb.) Ravenna, *Rhodophiala speciosa* (Herb.) Baker, *Rhodophiala volckmannii* Phil.
Referencias: Traub, H. P., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(II, III, IV, VII, VIII, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 4509* (CONC)].

Rhodophiala purpurata (Phil.) Traub = **Rhodophiala andicola** (Poepp.) Traub
Referencias: Ravenna, P. F., 1969e; Traub, H. P., 1956.

Rhodophiala rhodolirion (Baker) Traub
Sin.: *Amaryllis rhodolirion* (Baker) Traub & Uphof, *Hippeastrum rhodolirion* (Phil.) Baker, *Rhodolirium andinum* Phil., *Rhodolirium montanum* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 1991; Ravenna, P. F., 1971b; Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953, 1956.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2700 m.
Países: ARG(MEN); CHL(VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 6748* (SI), *Leuenberger, B. E. 4784* (SI)]; CHL[*Morrison, J. L. 17030* (SI)].

Rhodophiala rosea (Sweet) Traub
Sin.: *Amaryllis barlowii* Traub & Moldenke, *Amaryllis rosea* (Sweet) Traub & Uphof, *Habranthus roseus* Sweet, *Hippeastrum roseum* (Sweet) Baker, *Zephyranthes purpurea* Phil.
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–1800 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, A. 169* (CONC)].

Rhodophiala speciosa (Herb.) Baker = **Rhodophiala pratensis** (Poepp.) Traub

Rhodophiala splendens (Renjifo) Traub
Sin.: *Amaryllis splendens* (Renjifo) Traub & Moldenke, *Habranthus splendens* Renjifo, *Hippeastrum splendens* (Renjifo) Renjifo ex Phil.
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VII).

Rhodophiala tenuiflora (Phil.) Traub
Sin.: *Amaryllis tenuiflora* (Phil.) Traub & Moldenke, *Hippeastrum tenuiflorum* Phil.
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO)].

Rhodophiala tiltilensis (Traub & Moldenke) Traub
Sin.: *Amaryllis laeta* (Phil.) Traub & Uphof, *Amaryllis tiltilensis* Traub & Moldenke, *Hippeastrum laetum* Phil., *Myostemma tiltilensis* (Traub & Moldenke) Ravenna
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 1996; Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (B)].

Rhodophiala uniflora Phil.
Sin.: *Amaryllis uniflora* (Phil.) Traub & Uphof, *Hippeastrum uniflorum* (Phil.) Baker
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Rhodophiala volckmannii Phil. = **Rhodophiala pratensis** (Poepp.) Traub
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.

Sanmartina marginata (R.E. Fr.) Traub = **Chlidanthus marginatus** (R.E. Fr.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Sprekelia cybister Herb. = **Hippeastrum cybister** (Herb.) Benth. ex Baker
Referencias: Hunziker, A. T., 1971c.

Sprekelia spectabilis Hoehne = **Hippeastrum angustifolium** Pax
Referencias: Ravenna, P. F., 1967a.

Stenomesson acaule Kraenzl. = **Clinanthus humilis** (Herb.) Meerow

[Stenomesson chilense Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.
Notas: Nombre dudoso.

Stenomesson humile (Herb.) Baker = **Clinanthus humilis** (Herb.) Meerow

Sternbergia americana Hoffmanns. = **Zephyranthes americana** (Hoffmanns.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1971a.

Traubia Moldenke

Número de especies: 1 endémica

Traubia chilensis (F. Phil.) Moldenke = **Traubia modesta** (Phil.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Traubia modesta (Phil.) Ravenna
Sin.: *Amaryllis modesta* (Phil.) Traub & Uphof, *Hippeastrum modestum* (Phil.) Baker, *Lapiedra chilensis* F. Phil., *Rhodophiala modesta* Phil., *Traubia chilensis* (F. Phil.) Moldenke
Referencias: Ravenna, P. F., 1974; Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Zöllner, O., Olivares, M. & Arriagada, L., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(IV, V, VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 2020* (Herb. Ravenna, SGO)].

Zephyranthes Herb., nom. cons.

Número de especies: 19, 13 endémicas

Zephyranthes acuminata Herb. = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Zephyranthes americana (Hoffmanns.) Ravenna
Sin.: *Haylockia americana* (Hoffmanns.) Herter, *Haylockia americana* (Hoffmanns.) Traub, comb. superfl., *Haylockia pusilla* Herb., *Haylockia pusilla* Herb. var. *rubella* Herb., *Sternbergia americana* Hoffmanns., *Zephyranthes pusilla* (Herb.) D. Dietr., *Zephyranthes pusilla* Herb. var. *aurea* Herter, *Zephyranthes pusilla* Herb. var. *cremea* Herter
Referencias: Herter, W. G. F., 1937; Mathew, B., 1983; Ravenna, P. F., 1971a, 1972c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(RGS); URY(ART, CAS, CLO, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 6319* (SI)]; BRA[*Jürgens, C. 38* (B)]; URY[*Felippone, F. 6018* (SI)].

Zephyranthes amoena Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1999a.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 28355* (MBM)].

Zephyranthes andersonii (Herb. ex Lindl.) Benth. & Hook. f. = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1951.

[Zephyranthes andersonii (Herb. ex Lindl.) Benth. & Hook. f. var. rosea E. Holmb.]
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.
Notas: Nombre dudoso.

Zephyranthes andicola (Poepp.) Baker = **Rhodophiala andicola** (Poepp.) Traub
Referencias: Traub, H. P., 1953.

Zephyranthes andina (R.E. Fr.) Traub
Sin.: *Haylockia andina* R.E. Fr.
Referencias: Ravenna, P. F., 1971a; Traub, H. P., 1951.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–4200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Judica, C. 113* (SI)].

Zephyranthes bakeriana Morong = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Referencias: Ravenna, P. F., 2003c.

Zephyranthes candida (Herb. ex Lindl.) Herb.
Sin.: *Amaryllis candida* Herb. ex Lindl., *Amaryllis nivea* Roem. & Schult.
Referencias: Fabris, H. A., 1969[1968]b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, MIS, SFE); URY(CAS, MON, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hurrell, J. A. 5526* (SI)]; URY[*Felippone, F. 3411* (SI)].

Zephyranthes capivarina Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22723* (MBM)].

Zephyranthes carinata Herb.
Sin.: *Amaryllis carinata* Spreng., *Zephyranthes grandiflora* Lindl., nom. illeg.
Referencias: Herklots, G. A. C., 1980a; Ravenna, P. F., 1977a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR, MIS, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Molina, A. M. 1099* (BAB)].

Zephyranthes coerula (Griseb.) Baker = **Habranthus coeruleus** (Griseb.) Traub
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Zephyranthes commersoniana Herb. = **Habranthus tubispathus** (L'Hér.) Traub

Referencias: Holmes, W. C. & Wells, C. J., 1980; Ravenna, P. F., 1970a.

[Zephyranthes depauperata (Poepp.) Herb.]
Sin.: *Amaryllis depauperata* Poepp.
Notas: Nombre dudoso.

Zephyranthes diluta Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1999a.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27057* (SI)].

Zephyranthes entreriana (O. Hoffm.) Pax = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Zephyranthes filifolia Herb. ex Kraenzl.
Referencias: Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Ravenna, P. F., 1967a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SFE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 10886* (SI)].

Zephyranthes flammea (Ruiz & Pav.) Baker = **Pyrolirion tubiflorum** (L'Hér.) M. Roem.

Zephyranthes flavescens Herb. = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Zephyranthes flavissima Ravenna
Sin.: *Zephyranthes fluvialis* Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1967a, 2001f.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 23292* (SI)]; BRA[*Pabst, G. F. J. 6304* (B)].

Zephyranthes fluvialis Ravenna = **Zephyranthes flavissima** Ravenna

Zephyranthes gracilifolia (Herb.) G. Nicholson var. *bijou* E. Holmb. = **Habranthus gracilifolius** Herb.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Zephyranthes gracilifolia (Herb.) G. Nicholson var. *bulula* E. Holmb. = **Habranthus gracilifolius** Herb.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Zephyranthes grandiflora Lindl., nom. illeg. = **Zephyranthes carinata** Herb.

Zephyranthes gratissima Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001f.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 2722* (BA, BM, MBM)].

Zephyranthes hassleriana (Chodat & Lendn.) Traub = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Zephyranthes hieronymi Pax = **Zephyranthes minima** Herb.
Referencias: Hume, H. H., 1943.

Zephyranthes jujuyensis E. Holmb. = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Referencias: Ravenna, P. F., 2003c.

Zephyranthes jujuyensis E. Holmb. var. *volcanica* E. Holmb. = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Referencias: Ravenna, P. F., 2003c.

Zephyranthes kurtzii Hunz. & Coccuci = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Referencias: Ravenna, P. F., 2003c.

Zephyranthes lagesiana Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001f.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 2700* (R)].

[Zephyranthes lilacina Liebm.]
Notas: Nombre dudoso.

Zephyranthes lilacina Speg., hom. illeg. = **Habranthus argentinus** Traub

Zephyranthes longipes Baker = **Habranthus versicolor** Herb.

Zephyranthes longistyla Pax
Referencias: Pax, F. A., 1890; Ravenna, P. F., 2005d.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(COR, SDE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Leuenberger, B. E. 4763* (B, SI)].

Zephyranthes melanopotamica Speg. = **Habranthus jamesonii** (Baker) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1969e, 1971a, 1974.

Zephyranthes mendocensis Baker = **Habranthus mendocensis** (Baker) Sealy
Referencias: Ravenna, P. F., 1970a; Sealy, J. R., 1937.

Zephyranthes mesochloa Herb. ex Lindl.
Sin.: *Amaryllis entreriana* O. Hoffm., *Amaryllis hassleriana* Chodat & Lendn., *Amaryllis mesochloa* (Herb. ex Lindl.) Steud., *Habranthus jujuyensis* (E. Holmb.) Traub, *Zephyranthes acuminata* Herb., *Zephyranthes bakeriana* Morong, *Zephyranthes entreriana* (O. Hoffm.) Pax, *Zephyranthes flavescens* Herb., *Zephyranthes hassleriana* (Chodat & Lendn.) Traub, *Zephyranthes jujuyensis* E. Holmb., *Zephyranthes jujuyensis* E. Holmb. var. *volcanica* E. Holmb., *Zephyranthes kurtzii* Hunz. & Coccuci, *Zephyranthes mesochloa* Herb. ex Lindl. var. *entreriana* (O. Hoffm.) Pax, *Zephyranthes modesta* Ravenna, *Zephyranthes*

oxypetala Speg., *Zephyranthes stenopetala* Baker, *Zephyranthes timida* E. Holmb.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 1996; Ravenna, P. F., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, TUC); BRA(SCA); PRY(APY, CAN, CEN, COA); URY(ART, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 20160* (CORD)]; BRA[*Rambo, B. 64306* (PACA)]; PRY[*Morong, T. 254* (MO)]; URY[*Rosengurtt, B. 8454b* (MVFA)].

Zephyranthes mesochloa Herb. ex Lindl. f. *rosea* Kuntze = **Habranthus robustus** Herb. ex Sweet

Zephyranthes mesochloa Herb. ex Lindl. var. *entreriana* (O. Hoffm.) Pax = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Zephyranthes microstigma Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2005e.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Nicora, E. G. 4684* (SI)].

Zephyranthes minima Herb.
Sin.: *Amaryllis minima* (Herb.) Griseb., *Zephyranthes hieronymi* Pax, *Zephyranthes minima* Herb. subsp. *hexandra* Ravenna, *Zephyranthes rositae* Herter
Referencias: Fabris, H. A., 1969[1968]b; Hume, H. H., 1943; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Ravenna, P. F., 1971a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE); BRA(RGS); URY(ART, CAS, DUR, FLA, MON, PAY, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Leuenberger, B. E. 4501* (SI)]; BRA[*Pedersen, T. M. 15698* (CTES)]; URY[*Herter, G. 1080* (B)].

Zephyranthes minima Herb. subsp. *hexandra* Ravenna = **Zephyranthes minima** Herb.

Zephyranthes modesta Ravenna = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Referencias: Ravenna, P. F., 2003c.

Zephyranthes oxypetala Speg. = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Zephyranthes paranensis Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19865* (MBM)].

Zephyranthes parvula (Seub.) Herter = **Zephyranthes seubertii** E.P. Hume
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. C., 1997.

Zephyranthes pluricolor Herter, nom. illeg. = **Habranthus versicolor** Herb.
Referencias: Herter, W. G. F., 1949–1956.

Zephyranthes porphyrospila E. Holmb. = **Habranthus brachyandrus** (Baker) Sealy
Referencias: Sealy, J. R., 1937.

Zephyranthes pseudocolchicum Kraenzl. = **Clinanthus humilis** (Herb.) Meerow

Zephyranthes purpurea Phil. = **Rhodophiala rosea** (Sweet) Traub
Referencias: Traub, H. P. & Moldenke, H. N., 1949; Traub, H. P., 1953.

Zephyranthes pusilla (Herb.) D. Dietr. = **Zephyranthes americana** (Hoffmanns.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1971a.

Zephyranthes pusilla Herb. var. *aurea* Herter = **Zephyranthes americana** (Hoffmanns.) Ravenna

Zephyranthes pusilla Herb. var. *cremea* Herter = **Zephyranthes americana** (Hoffmanns.) Ravenna

Zephyranthes robusta (Herb. ex Sweet) Baker = **Habranthus robustus** Herb. ex Sweet
Referencias: Ravenna, P. F., 1967a.

Zephyranthes rositae Herter = **Zephyranthes minima** Herb.
Referencias: Herter, W. G. F., 1943c, 1949–1956.

Zephyranthes seubertii E.P. Hume
Sin.: *Amaryllis parvula* Seub., *Zephyranthes parvula* (Seub.) Herter, *Zephyranthes stellaris* Ravenna
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. & Leuenberger, B. E., 1996; Arroyo-Leuenberger, S. C., 1997; Ravenna, P. F., 1967a, 1978a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(PAI); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*de Llamas, A. 26620* (SI)]; BRA[*Nicora, E. G. s.n.* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 3877* (SI)]; URY[*Sellow, F. 3587* (B)].

Zephyranthes stellaris Ravenna = **Zephyranthes seubertii** E.P. Hume
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. C., 1997.

Zephyranthes stenopetala Baker = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Zephyranthes tauberti Harms = **Habranthus robustus** Herb. ex Sweet
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Zephyranthes timida E. Holmb. = **Zephyranthes mesochloa** Herb. ex Lindl.
Referencias: Ravenna, P. F., 1974.

Zephyranthes tucumanensis Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1969a.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–2000 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 18872* (CORD)].

Zephyranthes unifolia Arechav. = **Habranthus pedunculosus** Herb.

Zephyranthes uruguaianica Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2005e.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 4351* (MBM)].

Zephyranthes versicolor (Herb.) Baker = **Habranthus versicolor** Herb.

[Zephyranthes yaviensis Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 1988a.
Notas: Nombre dudoso.

ANTHERICACEAE

2 géneros, 7 especies, 2 especies endémicas.

Anthericum L.

Número de especies: 5, 2 endémicas

Anthericum argentinense (Hauman) Guagl.
Sin.: *Anthericum ciliatum* (Kunth) Spreng. var. *argentinense* Hauman
Referencias: Guaglianone, E. R., 1995; Hauman, L. L., 1917a.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1553* (SI)].

Anthericum brasiliense Baker = **Hagenbachia angusta** Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1985.

Anthericum caeruleum Ruiz & Pav. = **Pasithea caerulea** (Ruiz & Pav.) D. Don var. **caerulea**

Anthericum ciliatum (Kunth) Spreng. var. *argentinense* Hauman = **Anthericum argentinense** (Hauman) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1995.

Anthericum eccremorrhizum Ruiz & Pav.
Referencias: Hauman, L. L., 1917a.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fiebrig, K. A. G. 2389* (SI)].

Anthericum glaucum Ruiz & Pav.
Referencias: Fries, R. E., 1909.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. 11760* (*)].

Anthericum hickenianum Poelln.
Sin.: *Anthericum parviflorum* Hicken, hom. illeg.
Referencias: Poellnitz, K., 1941.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27363* (SI), *Vattuone, I. C. 86* (SI)].

Anthericum humboldtii Hemsl.
Sin.: *Anthericum peruvianum* Willd. ex Kunth, nom. nud., *Anthericum sprengelii* Rusby, *Echeandia ciliata* (Kunth) Cruden, *Phalangium ciliatum* Kunth
Referencias: Cruden, R. W., 1986; Fries, R. E., 1909.
Hierba. Perenne. Nativa. 2200–2600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 3142* (SI)].

Anthericum parviflorum Hicken, hom. illeg. = **Anthericum hickenianum** Poelln.
Referencias: Poellnitz, K., 1941.

Anthericum peruvianum Willd. ex Kunth, nom. nud. = **Anthericum humboldtii** Hemsl.

[Anthericum scilloides (Poir. ex Lam.) Schult. & Schult. f.]
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.
Notas: Nombre dudoso.

Anthericum sprengelii Rusby = **Anthericum humboldtii** Hemsl.

Chlorophytum hasslerianum Baker = **Hagenbachia hassleriana** (Baker) Cruden
Referencias: Cruden, R. W., 1987.

Echeandia ciliata (Kunth) Cruden = **Anthericum humboldtii** Hemsl.

Hagenbachia Nees & Mart.

Número de especies: 2

Hagenbachia angusta Ravenna
Sin.: *Anthericum brasiliense* Baker
Referencias: Cruden, R. W., 1987; Ravenna, P. F., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–600 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9719* (G)].

Hagenbachia hassleriana (Baker) Cruden
Sin.: *Chlorophytum hasslerianum* Baker
Referencias: Cruden, R. W., 1987; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4690* (BM, G, NY)].

Phalangium ciliatum Kunth = **Anthericum humboldtii** Hemsl.
Referencias: Hemsley, W. B., 1882–1886.

APONOGETONACEAE

1 género, 1 especie introducida.

Aponogeton L. f.

Número de especies: 1 introducida

Aponogeton distachyos L. f.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Introducida.
Paises: CHL(CN).

ARACEAE

Autores: Croat, T. B., Gonçalves, E. & Nadruz, M.

19 géneros, 51 especies, 9 especies endémicas, 5 especies introducidas

Acontias striatipes (Kunth & Bouché) Schott = **Xanthosoma striatipes** (Kunth & Bouché) Madison
Referencias: Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

[Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don]
Sin.: *Arum macrorrhizum* L.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Alocasia odora (Lodd.) Spach]
Sin.: *Arum odorum* Lodd.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Anthurium Schott

Número de especies: 12, 3 endémicas

Anthurium acutum N.E. Br.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Reitz, R., 1957.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Paises: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5176* (HBR)].

Anthurium beyrichianum Kunth = **Anthurium urvilleanum** Schott
Referencias: Coelho, M. A. N., 2004.

Anthurium caudatum Kunth = **Anthurium pentaphyllum** (Aubl.) G. Don

Anthurium chamissonis Schott = **Anthurium gaudichaudianum** Kunth
Referencias: Reitz, R., 1957.

Anthurium coriaceum auct. non G. Don = **Anthurium paraguayense** Engl.
Referencias: Crisci, J. V., 1971.

Anthurium coriaceum G. Don = **Anthurium glaucescens** Kunth

Anthurium crassipes Engl. = **Anthurium sellowianum** Kunth

Anthurium gaudichaudianum Kunth
Sin.: *Anthurium chamissonis* Schott, *Anthurium gaudichaudianum* Kunth var. *chamissonis* (Schott) Engl., *Anthurium gaudichaudianum* Kunth var. *cuneifolium* Engl., *Anthurium gaudichaudinum* Kunth var. *libonianum* (Linden & Regel) Engl., *Anthurium libonianum* Linden & Regel
Referencias: Angely, J. A., 1965; Reitz, R., 1957.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Paises: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2527* (HBR)].

Anthurium gaudichaudianum Kunth var. *chamissonis* (Schott) Engl. = **Anthurium gaudichaudianum** Kunth
Referencias: Reitz, R., 1957.

Anthurium gaudichaudianum Kunth var. *cuneifolium* Engl. = **Anthurium gaudichaudianum** Kunth
Referencias: Reitz, R., 1957.

Anthurium gaudichaudinum Kunth var. *libonianum* (Linden & Regel) Engl. = **Anthurium gaudichaudianum** Kunth
Referencias: Reitz, R., 1957.

Anthurium glaucescens Kunth
Sin.: *Anthurium coriaceum* G. Don, *Anthurium lacerdae* Reitz, *Anthurium rubiflorum* Engl., *Anthurium subcaulescens* (Vell.) Stellfeld, *Pothos coriacea* Graham, *Pothos glaucus* Schott ex Kunth, *Pothos subcaulescens* Vell.
Referencias: Croat, T. B., 1991.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Paises: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 32538* (MO, NY)].

Anthurium harrisii (Graham) Endl. var. *beyrichianum* (Kunth) Engl. = **Anthurium urvilleanum** Schott
Referencias: Coelho, M. A. N., 2004.

[Anthurium intermedium Kunth]
Sin.: *Anthurium rubricaule* Kunth
Referencias: Coelho, M. A. N., 2004.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Anthurium itanhaense Engl. = **Anthurium loefgrenii** Engl.

[Anthurium kastelskii Schott]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Anthurium lacerdae Reitz = **Anthurium glaucescens** Kunth

Anthurium libonianum Linden & Regel = **Anthurium gaudichaudianum** Kunth
Referencias: Reitz, R., 1957.

Anthurium loefgrenii Engl.
Sin.: *Anthurium itanhaense* Engl.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 4053* (MBM)].

Anthurium longilaminatum Engl. = **Anthurium sellowianum** Kunth

Anthurium marense Krause
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 7087* (HBR)].

Anthurium paraguayense Engl.
Sin.: *Anthurium coriaceum* auct. non G. Don, *Anthurium rodrigoi* A. D. Hawkes
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988; Croat, T. B., 1991; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, TUC); PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2233* (SI), *Lorentz, P. G. 543* (CORD)]; PRY[*Lindman, C. A. M. 1823a* (B, S), *Schinini, A. 31671* (CTES)].

Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G. Don
Sin.: *Anthurium caudatum* Kunth, *Anthurium quinquevulnerum* Schott ex Engl., *Anthurium smilaciforme* C. Koch, *Anthurium undatum* Schott, *Dracontium pentaphyllum* Aubl., *Pothos undatus* Hort ex Kunth
Referencias: Madison, M., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 6126* (US)].

Anthurium pilonense Reitz
Referencias: Reitz, R., 1957.
Hierba. Perenne. Endémica. 300 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2955* (HBR)].

Anthurium plowmanii Croat
Referencias: Croat, T. B. & Mount, D., 1988; Croat, T. B., 1991.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Nicora, E. G. 9806* (MO, SI)].

Anthurium quinquevulnerum Schott ex Engl. = **Anthurium pentaphyllum** (Aubl.) G. Don

Anthurium rodrigoi A. D. Hawkes = **Anthurium paraguayense** Engl.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988; Croat, T. B., 1991.

Anthurium rubiflorum Engl. = **Anthurium glaucescens** Kunth

Anthurium rubricaule Kunth = **Anthurium intermedium** Kunth
Referencias: Coelho, M. A. N., 2004.

Anthurium scandens (Aubl.) Engl.
Sin.: *Anthurium scandens* (Aubl.) Engl. var. *violaceum* (Sw.) Engl., *Anthurium violaceum* (Sw.) Schott, *Dracontium scandens* Aubl., *Pothos violaceus* Sw.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Rambo, B., 1950; Reitz, R., 1957.
Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5749* (HBR)].

Anthurium scandens (Aubl.) Engl. var. *violaceum* (Sw.) Engl. = **Anthurium scandens** (Aubl.) Engl.
Referencias: Reitz, R., 1957.

Anthurium sellowianum Kunth
Sin.: *Anthurium crassipes* Engl., *Anthurium longilaminatum* Engl., *Anthurium viride* C. Koch & Bouché
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Heissner, K. s.n.* (MBM)].

Anthurium smilaciforme C. Koch = **Anthurium pentaphyllum** (Aubl.) G. Don

[Anthurium strictum N.E. Br.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Anthurium subcaulescens (Vell.) Stellfeld = **Anthurium glaucescens** Kunth

Anthurium undatum Schott = **Anthurium pentaphyllum** (Aubl.) G. Don
Referencias: Madison, M., 1978.

Anthurium urvilleanum Schott
Sin.: *Anthurium beyrichianum* Kunth, *Anthurium harrisii* (Graham) Endl. var. *beyrichianum* (Kunth) Engl.
Referencias: Coelho, M. A. N., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4409* (HBR)].

Anthurium violaceum (Sw.) Schott = **Anthurium scandens** (Aubl.) Engl.
Referencias: Engler, H. G. A., 1878.

Anthurium viride C. Koch & Bouché = **Anthurium sellowianum** Kunth

[Anthurium willdenowii Kunth]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Aropsis palustris Rojas Acosta = **Spathicarpa hastifolia** Hook.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988; Croat, T. B., 1991.

Arum L.

Número de especies: 1 introducida

Arum bicolor Aiton = **Caladium bicolor** (Aiton) Vent.

Arum colocasia L. = **Colocasia esculenta** (L.) Schott
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997.

Arum cordatum Vell. = **Philodendron cordatum** (Vell.) Kunth
Referencias: Reitz, R., 1957.

Arum esculentum L. = **Colocasia esculenta** (L.) Schott
Referencias: Burkart, A., 1957c; Crisci, J. V., 1971.

Arum italicum Miller
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Forziano, M. J., Crisci, J. V. & Delucchi, G., 1991; Steibel, P., Troiani, H. O. & Williamson, T., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA); URY(CAS, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zardini, E. M. 1107* (LP)]; URY[*Izaguirre, P. 1215* (MVFA)].

Arum macrorrhizum L. = **Alocasia macrorrhizos** (L.) G. Don

Arum odorum Lodd. = **Alocasia odora** (Lodd.) Spach

Arum sagittifolium L. = **Xanthosoma sagittifolium** (L.) Schott

Asterostigma Fisch. & C.A. Mey.

Número de especies: 2 endémicas

Asterostigma fabrisii Crisci = **Gorgonidium vermicidum** (Speg.) Bogner & Nicolson
Referencias: Bogner, J. & Nicolson, D. H., 1988; Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971.

[Asterostigma lividum (Lodd.) Endl.]
Sin.: *Caladium lividum* Lodd.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Asterostigma lorentzianum Endl. = **Gorgonidium vermicidum** (Speg.) Bogner & Nicolson
Referencias: Bogner, J. & Nicolson, D. H., 1988; Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971.

Asterostigma reticulatum E.G. Gonç.
Referencias: Gonçalves, E. G., 2003a.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gonçalves, E. G. 459* (UB)].

Asterostigma tweedianum Schott
Sin.: *Staurostigma tweedianum* C. Koch
Referencias: Angely, J. A., 1965; Barroso, G. M., 1959–1961; Reitz, R., 1957.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gonçalves, E. G. 302* (UB)].

Asterostigma vermicida[um] (Speg.) Hauman & Vanderveken = **Gorgonidium vermicidum** (Speg.) Bogner & Nicolson
Referencias: Bogner, J. & Nicolson, D. H., 1988; Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971.

Asterostigma vermitoxicum Griseb. = **Synandrospadix vermitoxicum** (Griseb.) Engl.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Caladium Vent.

Número de especies: 1

Caladium angustifolium Engl. = **Xanthosoma striatipes** (Kunth & Bouché) Madison
Referencias: Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Caladium bicolor (Aiton) Vent.
Sin.: *Arum bicolor* Aiton
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Nicora, E. G. 9883* (MO, NY, SI)].

Caladium crassifolium Hort = **Philodendron martianum** Engl.
Referencias: Reitz, R., 1957.

Caladium esculentum (L.) Vent. = **Colocasia esculenta** (L.) Schott
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997.

Caladium heterotypicum S. Moore = **Xanthosoma striatipes** (Kunth & Bouché) Madison
Referencias: Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Caladium lividum Lodd. = **Asterostigma lividum** (Lodd.) Endl.

[Caladium sororium Schott]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Caladium striatipes (Kunth & Bouché) Schott = **Xanthosoma striatipes** (Kunth & Bouché) Madison
Referencias: Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Calla aethiopica L. = **Zantedeschia aethiopica** (L.) Spreng.
Referencias: Novara, L. J., 1993a.

Calostigma imbe Schott = **Philodendron imbe** (Schott) Schott

Colocasia Schott, nom. cons.

Número de especies: 1 introducida

Colocasia esculenta (L.) Schott
Sin.: *Arum colocasia* L., *Arum esculentum* L., *Caladium esculentum* (L.) Vent.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Grau, A., 1983.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS, TUC); PRY(CEN); URY(ART, CLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 23572* (CTES, MO)]; PRY[*Mereles, F. 2409* (MO)]; URY[*Berro, M. B. 1535* (MVFA)].

[Colocasia latifolia Rojas Acosta]
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Krapovickas, A., 1970d; Rojas Acosta, N., 1897.
Notas: Nombre dudoso.

Cyrtospadix striatipes (Kunth & Bouché) C. Koch = **Xanthosoma striatipes** (Kunth & Bouché) Madison
Referencias: Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Dieffenbachia Schott

Número de especies: 1

Dieffenbachia aglaonematifolia Engl.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(COA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 3022* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 40596* (K)]; PRY[*Hassler, E. 2117* (G)].

Dracontium L.

Número de especies: 1

Dracontium margaretae Bogner
Referencias: Croat, T. B. & Mount, D., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–600 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10960* (G)].

Dracontium pentaphyllum Aubl. = **Anthurium pentaphyllum** (Aubl.) G. Don

Dracontium scandens Aubl. = **Anthurium scandens** (Aubl.) Engl.
Referencias: Rambo, B., 1950; Reitz, R., 1957.

Endera conophalloidea Regel = **Taccarum peregrinum** (Schott) Endl.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Felipponia uruguayana Hicken = **Mangonia uruguayana** (Hicken) Bogner
Referencias: Bogner, J., 1973.

Felipponiella uruguayana (Hicken) Herter = **Mangonia uruguayana** (Hicken) Bogner
Referencias: Bogner, J., 1973.

Gorgonidium Schott

Número de especies: 2

Gorgonidium bulbostylum Bogner & E.G. Gonç.
Referencias: Bogner, J. & Gonçalves, E. G., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 1700–2300 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1601* (MO)].

Gorgonidium vermicidum (Speg.) Bogner & Nicolson
Sin.: *Asterostigma fabrisii* Crisci, *Asterostigma lorentzianum* Endl., *Asterostigma vermicida[um]* (Speg.) Hauman & Vanderveken, *Staurostigma vermicidum* Speg.
Referencias: Bogner, J. & Nicolson, D. H., 1988; Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–2500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, MIS, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Crisci, J. V. 286* (LP)].

Heteropsis Kunth

Número de especies: 1

Heteropsis rigidifolia Engl.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Barroso, G. M., 1959–1961; Reitz, R., 1957.
Arbusto. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3519* (HBR)].

Lilloa puki Speg. = **Synandrospadix vermitoxicum** (Griseb.) Engl.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Lysistigma peregrinum Schott = **Taccarum peregrinum** (Schott) Endl.
Referencias: Bogner, J., 1989; Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Mangonia Schott

Número de especies: 2 endémicas

Mangonia tweediana Schott
Referencias: Barroso, G. M., 1959–1961; Bogner, J., 1973; Herter, W. G. F., 1943b; Rambo, B., 1950.
Hierba o arbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(ART).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gonçalves, E. G. 611* (UB)]; URY[*Berro, M. B. 1740* (MVFA)].

Mangonia uruguayana (Hicken) Bogner
Sin.: *Felipponia uruguayana* Hicken, *Felipponiella uruguayana* (Hicken) Herter

Referencias: Bogner, J., 1973; Herter, W. G. F., 1943b; Hicken, C. M., 1917b, 1928b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(CLA).
Ejemplares de referencia: URY[*Felippone, F. 5772* (SI)].

Monstera Adans.

Número de especies: 1

Monstera adansonii Schott var. **klotschiana** (Schott) Madison
Sin.: *Monstera klotschiana* Schott, *Monstera modesta* Schott, *Monstera pertusa* (L.) de Vriese var. *klotschiana* (Schott) Engl., *Monstera pertusa* (L.) de Vriese var. *modesta* (Schott) Engl.
Referencias: Madison, M., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3677* (UC)].

Monstera klotschiana Schott = **Monstera adansonii** Schott var. **klotschiana** (Schott) Madison
Referencias: Madison, M., 1977.

Monstera modesta Schott = **Monstera adansonii** Schott var. **klotschiana** (Schott) Madison
Referencias: Madison, M., 1977.

Monstera pertusa (L.) de Vriese var. *klotschiana* (Schott) Engl. = **Monstera adansonii** Schott var. **klotschiana** (Schott) Madison
Referencias: Madison, M., 1977.

Monstera pertusa (L.) de Vriese var. *modesta* (Schott) Engl. = **Monstera adansonii** Schott var. **klotschiana** (Schott) Madison
Referencias: Madison, M., 1977.

Philodendron Schott, nom. cons.

Número de especies: 14, 1 endémica

Philodendron appendiculatum Nadruz & Mayo
Referencias: Nadruz-Coelho, M. A. & Mayo, S. J., 1998; Sakuragui, C. M., Mayo, S. J. & Zappi, D., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lindeman, J. C. 4883* (MO, U)].

Philodendron bipinnatifidum Schott
Sin.: *Philodendron pygmaeum* Chodat & Vischer, *Philodendron selloum* C. Koch, *Sphincterostigma bipinnatifidum* Schott, nom. illeg.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Barroso, G. M., 1959–1961; Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988; Gonçalves, E. G. & Salviani, E. R., 2002; Mayo, S. J., 1991.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Crisci, J. V. 81* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 17386* (F, G, NY, S, US)]; PRY[*Hassler, E. 1729* (G)].

Philodendron bipinnatifidum Schott var. *lundii* (Warm.) Engl. = **Philodendron lundii** Warm.
Referencias: Gonçalves, E. G. & Salviani, E. R., 2002.

Philodendron cannifolium Mart. = **Philodendron martianum** Engl.
Referencias: Reitz, R., 1957.

Philodendron corcovadense Kunth
Sin.: *Philodendron melanorrhizum* Reitz
Referencias: Mayo, S. J., 1991; Reitz, R., 1957.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 2357* (HBR, NY)].

Philodendron cordatum (Vell.) Kunth
Sin.: *Arum cordatum* Vell.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Reitz, R., 1957.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1518* (HBR)].

Philodendron crassinervium Lindl.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Reitz, R., 1957.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1737* (HBR)].

Philodendron dubium Chodat = **Philodendron tweedianum** Schott
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988; Mayo, S. J., 1991.

Philodendron eichleri Engl. = **Philodendron undulatum** Engl.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997.

[Philodendron imbe (Schott) Schott]
Sin.: *Calostigma imbe* Schott
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Philodendron loefgrenii Engl.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Sakuragui, C. M., Mayo, S. J. & Zappi, D., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lindeman, J. C. 2975* (MO)].

Philodendron lundii Warm.
Sin.: *Philodendron bipinnatifidum* Schott var. *lundii* (Warm.) Engl., *Philodendron selloum* C. Koch var. *lundii* (Warm.) Engl.
Referencias: Gonçalves, E. G. & Salviani, E. R., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(sin localidad).
Notas: No se ha podido localizar material de referencia.

Philodendron martianum Engl.
Sin.: *Caladium crassifolium* Hort, *Philodendron cannifolium* Mart.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Reitz, R., 1957.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2528* (HBR)].

Philodendron melanorrhizum Reitz = **Philodendron corcovadense** Kunth
Referencias: Mayo, S. J., 1991.

Philodendron missionum (Hauman) Hauman
Sin.: *Philodendron ochrostemon* Schott var. *uleanum* Engl., *Philodendron sonderianum* Schott var. *missionum* Hauman
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988; Reitz, R., 1957.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*van de Venne, H. s.n.* (BA)]; BRA[*Emrich, K. 645* (HBR, PACA)]; PRY[*Hassler, E. 11194* (G)].

Philodendron obliquifolium Engl.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Reitz, R., 1957.
Arbusto. Nativa. 300 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5736* (HBR)].

Philodendron ochrostemon Schott var. *uleanum* Engl. = **Philodendron missionum** (Hauman) Hauman
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Philodendron petraeum Chodat = **Philodendron tweedianum** Schott
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Philodendron petraeum Chodat var. *tobatiense* Chodat & Vischer = **Philodendron undulatum** Engl.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Philodendron petraeum Chodat var. *triangulare* Chodat & Vischer = **Philodendron tweedianum** Schott
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Philodendron petraeum Chodat var. *valenzuelae* Chodat & Vischer = **Philodendron tweedianum** Schott
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Philodendron propinquum Schott
Sin.: *Philodendron sonderianum* auct. non Schott
Referencias: Angely, J. A., 1965; Reitz, R., 1957.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2353* (HBR)].

[Philodendron pseudoundulatum Grau]
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Grau, A., 1983.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Philodendron pygmaeum Chodat & Vischer = **Philodendron bipinnatifidum** Schott
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Croat, T. B. & Mount, D., 1988; Mayo, S. J., 1991.

Philodendron renauxii Reitz
Referencias: Reitz, R., 1957.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2851* (HBR)].

Philodendron selloum C. Koch = **Philodendron bipinnatifidum** Schott
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988; Mayo, S. J., 1991.

Philodendron selloum C. Koch var. *lundii* (Warm.) Engl. = **Philodendron lundii** Warm.
Referencias: Gonçalves, E. G. & Salviani, E. R., 2002.

Philodendron sonderianum auct. non Schott = **Philodendron propinquum** Schott

Philodendron sonderianum Schott var. *missionum* Hauman = **Philodendron missionum** (Hauman) Hauman
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Philodendron striatipes Kunth & Bouché = **Xanthosoma striatipes** (Kunth & Bouché) Madison
Referencias: Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Philodendron tweedianum Schott
Sin.: *Philodendron dubium* Chodat, *Philodendron petraeum* Chodat, *Philodendron petraeum* Chodat var. *triangulare* Chodat & Vischer, *Philodendron petraeum* Chodat var. *valenzuelae* Chodat & Vischer
Referencias: Angely, J. A., 1965; Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988; Mayo, S. J., 1991.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI); BRA(PAR); PRY(APY, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE); URY(COL, MON, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 13462* (CTES, SI), *Pedersen, T. M. 2978* (LP)]; PRY[*Jörgensen, P. 4598* (DS, F), *Woolston, A. L. 915* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 1233* (MVFA)].

Philodendron undulatum Engl.
Sin.: *Philodendron eichleri* Engl., *Philodendron petraeum* Chodat var. *tobatiense* Chodat & Vischer
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988; Mayo, S. J., 1991.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS); PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hauman, L. L. s.n.* (BA)]; PRY[*Chodat, R. H. 350* (G)].

Pistia L.

Número de especies: 1

Pistia occidentalis Blume = **Pistia stratiotes** L.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Pistia stratiotes L.
Sin.: *Pistia occidentalis* Blume, *Pistia stratiotes* L. var. *linguiformis* (Blume) Engl., *Pistia stratiotes* L. var. *obcordata* (Schleid.) Engl.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Marticorena, C., com. pers.; Rambo, B., 1950; Reitz, R., 1957.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(V); PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI, PHA); URY(CLA, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1244* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 3108* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 2795* (G)]; URY[*Rosengurtt, B. 4689* (MVFA)].

Pistia stratiotes L. var. *linguiformis* (Blume) Engl. = **Pistia stratiotes** L.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Pistia stratiotes L. var. *obcordata* (Schleid.) Engl. = **Pistia stratiotes** L.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Pothos coriacea Graham = **Anthurium glaucescens** Kunth

Pothos glaucus Schott ex Kunth = **Anthurium glaucescens** Kunth

Pothos subcaulescens Vell. = **Anthurium glaucescens** Kunth

Pothos undatus Hort ex Kunth = **Anthurium pentaphyllum** (Aubl.) G. Don
Referencias: Madison, M., 1978.

Pothos violaceus Sw. = **Anthurium scandens** (Aubl.) Engl.
Referencias: Reitz, R., 1957.

Spathantheum Schott

Número de especies: 1

Spathantheum orbignyanum Schott
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 4979* (LIL)].

Spathicarpa Hook.

Número de especies: 2, 1 endémica

Spathicarpa bridgessi Schott = **Spathicarpa hastifolia** Hook.
Referencias: Gonçalves, E. G., 2002.

Spathicarpa hastifolia Hook.
Sin.: *Aropsis palustris* Rojas Acosta, *Spathicarpa bridgessi* Schott, *Spathicarpa tweedieana* Schott
Referencias: Angely, J. A., 1965; Barroso, G. M., 1959–1961; Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988; Rambo, B., 1950; Reitz, R., 1957.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Crisci, J. V. 149* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 42871* (HBR, PACA, S)]; PRY[*Hassler, E. 8052* (G)]; URY[*Herter, W. G. F. 994* (B, G, M)].

Spathicarpa lanceolata Engl.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Croat, T. B. & Mount, D., 1988; Rambo, B., 1950; Reitz, R., 1957.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, COA, GUA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 8754* (HBR, PACA)]; PRY[*Hassler, E. 1986* (G)].

[Spathicarpa sagittifolia Schott]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Spathicarpa tweedieana Schott = **Spathicarpa hastifolia** Hook.
Referencias: Gonçalves, E. G. & Salviani, E. R., 2002; Gonçalves, E. G., 2002.

Sphincterostigma bipinnatifidum Schott, nom. illeg. = **Philodendron bipinnatifidum** Schott
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988; Mayo, S. J., 1991.

Staurostigma tweedianum C. Koch = **Asterostigma tweedianum** Schott
Referencias: Reitz, R., 1957.

Staurostigma vermicidum Speg. = **Gorgonidium vermicidum** (Speg.) Bogner & Nicolson
Referencias: Bogner, J. & Nicolson, D. H., 1988; Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997.

Staurostigma vermitoxicum (Griseb.) Engl. = **Synandrospadix vermitoxicum** (Griseb.) Engl.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Synandrospadix Engl.

Número de especies: 1

Synandrospadix vermitoxicum (Griseb.) Engl.
Sin.: *Asterostigma vermitoxicum* Griseb., *Lilloa puki* Speg., *Staurostigma vermitoxicum* (Griseb.) Engl.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971; Croat, T. B. & Mount, D., 1988; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–1700 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC); PRY(APY, CEN, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 30412* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 2842* (G)].

Taccarum Brongn. ex Schott

Número de especies: 2

Taccarum cylindricum Arcang. = **Taccarum peregrinum** (Schott) Endl.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Taccarum dubium Bertoni = **Taccarum peregrinum** (Schott) Endl.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Taccarum hasslerianum Chodat = **Taccarum weddellianum** Brongn.
Referencias: Bogner, J., 1989; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Taccarum josephinae Bertoni = **Taccarum peregrinum** (Schott) Endl.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Taccarum peregrinum (Schott) Endl.
Sin.: *Endera conophalloidea* Regel, *Lysistigma peregrinum* Schott, *Taccarum cylindricum* Arcang., *Taccarum dubium* Bertoni, *Taccarum josephinae* Bertoni, *Taccarum variabile* Bertoni, *Taccarum variabile* Bertoni var. *elatum* Bertoni, *Taccarum variabile* Bertoni var. *latilobum* Bertoni, *Taccarum variabile* Bertoni var. *multilobum* Bertoni, *Taccarum variabile* Bertoni var. *primum* Bertoni
Referencias: Bogner, J., 1989; Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Croat, T. B. & Mount, D., 1988; Gonçalves, E. G., 2003b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6481* (SI)]; BRA[*Plowmann 632* (RB)]; PRY[*Bertoni, M. S. 2220* (G)].

[Taccarum ulei Engl. & K. Krause]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Taccarum variabile Bertoni = **Taccarum peregrinum** (Schott) Endl.
Referencias: Bogner, J., 1989; Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Taccarum variabile Bertoni var. *elatum* Bertoni = **Taccarum peregrinum** (Schott) Endl.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997.

Taccarum variabile Bertoni var. *latilobum* Bertoni = **Taccarum peregrinum** (Schott) Endl.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Taccarum variabile Bertoni var. *multilobum* Bertoni = **Taccarum peregrinum** (Schott) Endl.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Taccarum variabile Bertoni var. *primum* Bertoni = **Taccarum peregrinum** (Schott) Endl.
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Croat, T. B. & Mount, D., 1988.

Taccarum weddellianum Brongn.
Sin.: *Taccarum hasslerianum* Chodat
Referencias: Croat, T. B. & Mount, D., 1988; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAN, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Chodat, R. H. 351* (G)].

Xanthosoma Schott

Número de especies: 4, 2 introducidas

[Xanthosoma poeppigii Schott]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott
Sin.: *Arum sagittifolium* L.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 45433* (MBM)].

Xanthosoma striatipes (Kunth & Bouché) Madison
Sin.: *Acontias striatipes* (Kunth & Bouché) Schott, *Caladium angustifolium* Engl., *Caladium heterotypicum* S. Moore, *Caladium striatipes* (Kunth & Bouché) Schott, *Cyrtospadix striatipes* (Kunth & Bouché) C. Koch, *Philodendron striatipes* Kunth & Bouché
Referencias: Croat, T. B. & Mount, D., 1988; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5349* (G)].

Xanthosoma syngoniifolia Rusby
Referencias: Crisci, J. V. & Katinas, L., 1997; Crisci, J. V., 1971.
Hierba. Perenne. Nativa. 500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 11504* (LIL)].

Xanthosoma violaceum Schott
Referencias: Croat, T. B. & Mount, D., 1988.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.

Países: PRY(APA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Stutz, L. C. 915* (G)].

Zantedeschia Spreng., nom. cons.

Número de especies: 1 introducida

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.
Sin.: *Calla aethiopica* L.
Referencias: Herter, W. G. F., 1943b; Novara, L. J., 1993a.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, SAL); BRA(PAR, RGS); CHL(V, X, IJF, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 8113* (MCNS)]; BRA[*Landrum, L. R. 2269* (MICH)]; CHL[*Stuessy, T. F. 11483* (CONC)]; URY[*Rosengurtt, B. 3434be* (MVFA)].

ARECACEAE

Autor: Moraes R., M.
Revisor: Noblick, L.

16 géneros, 41 especies, 13 especies endémicas, 3 especies introducidas.

Acanthococos hassleri Barb. Rodr. = **Acrocomia hassleri** (Barb. Rodr.) W.J. Hahn
Referencias: Jiménez, B. & Knapp, S., 1998.

Acrocomia Mart.

Número de especies: 2

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
Sin.: *Acrocomia chunta* Covas & Ragonese, *Acrocomia totai* Mart., *Cocos aculeata* Jacq.
Referencias: Arbo, M. M., 1974; Henderson, A., 1995; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Palmera arbórea. Nativa. 100–200 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL); BRA(PAR); PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Xifreda, C. C. 1286* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 22191* (MBM)]; PRY[*Soria, N. 1896* (FCQ)].

Acrocomia chunta Covas & Ragonese = **Acrocomia aculeata** (Jacq.) Lodd. ex Mart.
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Acrocomia hassleri (Barb. Rodr.) W.J. Hahn
Sin.: *Acanthococos hassleri* Barb. Rodr.
Referencias: Jiménez, B. & Knapp, S., 1998; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Palmera arbórea. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Krapovickas, A. 45931* (CTES)].

Acrocomia totai Mart. = **Acrocomia aculeata** (Jacq.) Lodd. ex Mart.
Referencias: Jiménez, B. & Knapp, S., 1998.

Allagoptera Nees

Número de especies: 2

Allagoptera anisitsii (Barb. Rodr.) H.E. Moore = **Allagoptera leucocalyx** (Drude) Kuntze
Referencias: Moraes R., M., 1996a.

Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze
Sin.: *Allagoptera campestris* (Mart.) Kuntze var. *orbignyi* Drude, *Diplothemium campestre* Mart., *Diplothemium campestre* Mart. var. *genuinum* Drude, nom. inval., *Diplothemium campestre* Mart. var. *glaziovii* Dammer
Referencias: Chediack, S. E., 1999; Hauman, L. L., 1919c; Moore Jr., H. E., 1962; Moraes R., M., 1996a; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Palmera acaule. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(AMA, CAN, COA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1046* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 23313* (CTES, F)]; PRY[*Schinini, A. 20290* (CTES, F, G)].

Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze var. *orbignyi* Drude = **Allagoptera campestris** (Mart.) Kuntze

Allagoptera hassleriana (Barb. Rodr.) H.E. Moore = **Allagoptera leucocalyx** (Drude) Kuntze
Referencias: Moraes R., M., 1996a.

Allagoptera leucocalyx (Drude) Kuntze
Sin.: *Allagoptera anisitsii* (Barb. Rodr.) H.E. Moore, *Allagoptera hassleriana* (Barb. Rodr.) H.E. Moore, *Diplothemium anisitsii* Barb. Rodr., *Diplothemium hasslerianum* Barb. Rodr., *Diplothemium jangadensis* S. Moore, *Diplothemium leucocalyx* Drude
Referencias: Jiménez, B. & Knapp, S., 1998; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Moraes R., M., 1996a.
Palmera acaule. Nativa. 100–1100 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APY, AMA, CAN, CON, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabral, E. L. 182* (G)]; BRA[*Hatschbach, G. 43985* (NY)]; PRY[*Jiménez, B. 1365* (BM, PY)].

Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Becc. = **Syagrus romanzoffiana** (Cham.) Glassman
Referencias: Glassman, S. F., 1968; Jiménez, B. & Knapp, S., 1998.

Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Becc. var. *australe* (Mart.) Becc. = **Syagrus romanzoffiana** (Cham.) Glassman
Referencias: Glassman, S. F., 1968.

Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Becc. var. *genuinun* Becc., nom. inval. = **Syagrus romanzoffiana** (Cham.) Glassman

Astrocaryum G. Mey., nom. cons.

Número de especies: 1

Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret
Sin.: *Astrocaryum ayri* Mart., *Toxophoenix aculeatissima* Schott
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Reitz, R., 1974; Reitz, R., Klein, J. T. & Reis, A., 1978, 1983.
Palmera arbórea. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5731* (HBR)].

Astrocaryum ayri Mart. = **Astrocaryum aculeatissimum** (Schott) Burret
Referencias: Reitz, R., 1974.

Attalea Kunth

Número de especies: 3, 1 endémica

Attalea anisitsiana (Barb. Rodr.) Zona
Sin.: *Attalea parviflora* Barb. Rodr., *Scheelea anisitsiana* Barb. Rodr., *Scheelea parviflora* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr., *Scheelea quadrisperma* Barb. Rodr., *Scheelea quadrisulcata* Barb. Rodr.
Referencias: Glassman, S. F., 1977, 1987; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.
Palmera arbórea. Nativa. 100–300 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4037* (GH)].

Attalea dubia (Mart.) Burret
Sin.: *Attalea indaya* Drude, *Orbignya dubia* Mart.
Referencias: Glassman, S. F., 1977; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Reitz, R., 1974; Reitz, R., Klein, J. T. & Reis, A., 1978.
Palmera arbórea. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1810* (HBR)].

Attalea geraensis Barb. Rodr.
Sin.: *Attalea guaranitica* Barb. Rodr.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Basualdo, I. Z., Soria Rey, N., Keel, S. & Rivarola, N., 1997b; Glassman, S. F., 1977, 1987; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.
Palmera arbórea. Endémica. 300 m.
Países: PRY(AMA, COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 45154* (AS, MO)].

Attalea guaranitica Barb. Rodr. = **Attalea geraensis** Barb. Rodr.
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Lorenzi, H., Moreira de Souza, H., Medeiros-Costa, J. T., Coelho de Cerqueira, L. S. & Behr, N., 1996.

Attalea indaya Drude = **Attalea dubia** (Mart.) Burret
Referencias: Reitz, R., 1974.

Attalea parviflora Barb. Rodr. = **Attalea anisitsiana** (Barb. Rodr.) Zona

Bactris Jacq. ex Scop.

Número de especies: 5, 1 introducida

Bactris anisitsii Barb. Rodr. = **Bactris glaucescens** Drude
Referencias: Henderson, A., 2000a.

Bactris gasipaes Kunth, nom. cons.
Sin.: *Bactris insignis* (Mart.) Baill., *Guilielma insignis* Mart.
Referencias: Balslev, H. & Moraes R., M., 1989; Devoto, F. E. & Rothkugel, M., 1942; Henderson, A., 2000a.
Palmera arbórea multicaule. Introducida. 0–1200 m.
Países: ARG(SAL); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Holmberg, E. L. s.n.* (*)]; PRY[*Schinini, A. 31429* (CTES)].

Bactris glaucescens Drude
Sin.: *Bactris anisitsii* Barb. Rodr.
Referencias: Henderson, A., 1995, 2000a.
Palmera arbórea multicaule. Nativa. 0–300 m.
Países: PRY(APY, AMA, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 20695* (CTES, F, G)].

Bactris hatschbachii Noblick
Referencias: Henderson, A., 2000a.
Palmera arbórea multicaule. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 38105* (MBM)].

Bactris insignis (Mart.) Baill. = **Bactris gasipaes** Kunth, nom. cons.
Referencias: Henderson, A., 2000a.

Bactris lindmanniana Drude ex Lindm. = **Bactris setosa** Mart.
Referencias: Henderson, A., 2000a.

Bactris setosa Mart.
Sin.: *Bactris lindmanniana* Drude ex Lindm.
Referencias: Henderson, A., 2000a; Lorenzi, H., Moreira de Souza, H., Medeiros-Costa, J. T., Coelho de Cerqueira, L. S. & Behr, N., 1996; Reitz, R., 1974; Reitz, R., Klein, J. T. & Reis, A., 1978.
Palmera arbórea multicaule. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 38857* (MO)].

Bactris vulgaris Barb. Rodr.
Referencias: Henderson, A., 2000a.
Palmera arbórea multicaule. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 12049* (F, MO, NY)].

Butia (Becc.) Becc.

Número de especies: 9, 6 endémicas

Butia amadelpha (Barb. Rodr.) Burret = **Butia paraguayensis** (Barb. Rodr.) L.H. Bailey
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005.

Butia arenicola (Barb. Rodr.) Burret = **Butia paraguayensis** (Barb. Rodr.) L.H. Bailey
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Butia bonnettii Becc. = **Butia capitata** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005.

Butia campicola (Barb. Rodr.) Noblick
Sin.: *Cocos campicola* Barb. Rodr., *Syagrus campicola* (Barb. Rodr.) Becc.
Referencias: Glassman, S. F., 1970a; Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Jiménez, B. & Knapp, S., 1998; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Palmera arbórea. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAN, COA, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jiménez, B. 1633* (BM, CTES, MO, PY)].

Butia capitata (Mart.) Becc.
Sin.: *Butia bonnettii* Becc., *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *elegantissima* (Chabaud) Becc., *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *erythrospatha* (Chabaud) Becc., *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *lilaceiflora* (Chabaud) Becc., *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *nehrlingiana* (Abbott ex Nehrl.) L.H. Bailey, *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *odorata* (Barb. Rodr.) Becc., *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *pulposa* (Barb. Rodr.) Becc., *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *strictior* L.H. Bailey, *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *sublobosa* Becc., *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *virescens* Becc., *Butia leiospatha* (Barb. Rodr.) Becc., *Butia nehrlingiana* (Abbott ex Nehrl.) L.H. Bailey, *Cocos capitata* Mart., *Cocos elegantissima* Chabaud, *Cocos erythrospatha* Chabaud, *Cocos leiospatha* Barb. Rodr., *Cocos lilaceiflora* Chabaud, *Cocos nehrlingiana* Abbott ex Nehrl., *Cocos odorata* Barb. Rodr., *Cocos pulposa* Barb. Rodr., *Syagrus capitata* (Mart.) Glassman
Referencias: Glassman, S. F., 1970a, b; Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Lorenzi, H., Moreira de Souza, H., Medeiros-Costa, J. T., Coelho de Cerqueira, L. S. & Behr, N., 1996; Reitz, R., 1974; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Palmera arbórea. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(MON, ROC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4425* (HBR)]; URY[*Herter, W. G. F. 346a* (SI)].

Butia capitata (Mart.) Becc. var. *elegantissima* (Chabaud) Becc. = **Butia capitata** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Butia capitata (Mart.) Becc. var. *erythrospatha* (Chabaud) Becc. = **Butia capitata** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Butia capitata (Mart.) Becc. var. *lilaceiflora* (Chabaud) Becc. = **Butia capitata** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Butia capitata (Mart.) Becc. var. *nehrlingiana* (Abbott ex Nehrl.) L.H. Bailey = **Butia capitata** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Butia capitata (Mart.) Becc. var. *odorata* (Barb. Rodr.) Becc. = **Butia capitata** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Lorenzi, H., Moreira de Souza, H., Medeiros-Costa, J. T., Coelho de Cerqueira, L. S. & Behr, N., 1996.

Butia capitata (Mart.) Becc. var. *pulposa* (Barb. Rodr.) Becc. = **Butia capitata** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Butia capitata (Mart.) Becc. var. *strictior* L.H. Bailey = **Butia capitata** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Butia capitata (Mart.) Becc. var. *sublobosa* Becc. = **Butia capitata** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Butia capitata (Mart.) Becc. var. *virescens* Becc. = **Butia capitata** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Butia dyerana (Barb. Rodr.) Burret = **Butia paraguayensis** (Barb. Rodr.) L.H. Bailey
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005.

Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc.
Sin.: *Butia eriospatha* (Mart. ex Drude) Becc. subsp. *punctata* Bomhard, *Cocos eriospatha* Mart. ex Drude, *Syagrus eriospatha* (Mart. ex Drude) Glassman
Referencias: Glassman, S. F., 1970a, b; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Reitz, R., 1974.
Palmera arbórea. Endémica. 700–1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 16461* (HBR)].

Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc. subsp. *punctata* Bomhard = **Butia eriospatha** (Mart. ex Drude) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Butia exospadix Noblick
Referencias: Noblick, L. R., 2006.
Palmera acaule. Endémica. 200–600 m.
Países: PRY(APA, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Noblick, L. 5305* (FCQ, K, NY, PY)].

Butia leiospatha (Barb. Rodr.) Becc. = **Butia capitata** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005.

Butia leptospatha (Burret) Noblick
Sin.: *Syagrus leptospatha* Burret
Referencias: Noblick, L. R., 2006.
Palmera acaule. Nativa. 300–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Krapovickas, A. 45932* (CEN, CTES)].

Butia marmorii Noblick
Referencias: Noblick, L. R., 2006.
Palmera acaule. Endémica. 200–400 m.
Países: ARG(MIS); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[Múlgura de Romero, M.E. 1657 (SI)]; PRY[*Noblick, L. 5122* (K, NY, PY)].

Butia microspadix Burret
Sin.: *Syagrus hatschbachii* Glassman
Referencias: Glassman, S. F., 1970a; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Lorenzi, H., Moreira de Souza, H., Medeiros-Costa, J. T., Coelho de Cerqueira, L. S. & Behr, N., 1996.
Palmera acaule o arbórea. Endémica. 800–1100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 11668* (F)].

Butia nehrlingiana (Abbott ex Nehrl.) L.H. Bailey = **Butia capitata** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005.

Butia paraguayensis (Barb. Rodr.) L.H. Bailey
Sin.: *Butia amadelpha* (Barb. Rodr.) Burret, *Butia arenicola* (Barb. Rodr.) Burret, *Butia dyerana* (Barb. Rodr.) Burret, *Butia pungens* Becc., *Butia wildemaniana* (Barb. Rodr.) Burret, *Butia yatay* (Mart.) Becc. subsp. *paraguayensis* (Barb. Rodr.) Xifreda & Sanso, *Butia yatay* (Mart.) Becc. var. *paraguayensis* (Barb. Rodr.) Becc., *Cocos amadelpha* Barb. Rodr., *Cocos arenicola* Barb. Rodr., *Cocos dyerana* Barb. Rodr., *Cocos paraguayensis* Barb. Rodr., *Cocos wildemaniana* Barb. Rodr., *Syagrus amadelpha* (Barb. Rodr.) Frambach ex Dahlgren, *Syagrus arenicola* (Barb. Rodr.) Frambach ex Dahlgren, *Syagrus dyerana* (Barb. Rodr.) Becc., *Syagrus paraguayensis* (Barb. Rodr.) Glassman, *Syagrus wildemaniana* (Barb. Rodr.) Frambach ex Dahlgren
Referencias: Glassman, S. F., 1970a, b; Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Xifreda, C. C. & Sanso, A. M., 1996b.
Palmera acaule o arbórea. Nativa. 100–300 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, SPE); URY(ART, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 3476* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 32943* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 3761* (G)]; URY[*Noblick, L. 5459* (MVFA)].

Butia poni (Hauman) Burret = **Butia yatay** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005.

Butia pungens Becc. = **Butia paraguayensis** (Barb. Rodr.) L.H. Bailey
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005.

[Butia stolonifera (Barb. Rodr.) Becc.]
Sin.: *Cocos stolonifera* Barb. Rodr.
Referencias: Glassman, S. F., 1970b; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.
Notas: Nombre dudoso.

Butia wildemaniana (Barb. Rodr.) Burret = **Butia paraguayensis** (Barb. Rodr.) L.H. Bailey
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005.

Butia yatay (Mart.) Becc.
Sin.: *Butia poni* (Hauman) Burret, *Cocos poni* Hauman, *Cocos yatay* Mart., *Syagrus yatay* (Mart.) Glassman
Referencias: Glassman, S. F., 1970b, 1979; Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Martínez Crovetto, R. & Piccinini, B., 1951; Reitz, R., Klein, R. M. & Reis, A., 1983.
Palmera arbórea. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 3476* (BAB), *Zuloaga, F. O. 5674* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 4193* (MVFA)].

Butia yatay (Mart.) Becc. var. *paraguayensis* (Barb. Rodr.) Becc. = **Butia paraguayensis** (Barb. Rodr.) L.H. Bailey
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Butia yatay (Mart.) Becc. subsp. *paraguayensis* (Barb. Rodr.) Xifreda & Sanso = **Butia paraguayensis** (Barb. Rodr.) L.H. Bailey
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005.

Ceroxylon australe Mart. = **Juania australis** (Mart.) Drude ex Hook. f.
Referencias: Glassman, S. F., 1972.

Chamaerops fortunei Hook. = **Trachycarpus fortunei** (Hook.) H. Wendl.
Referencias: Glassman, S. F., 1972.

Chamaethrinax hookeriana H. Wendl. & Pfister = **Trithrinax campestris** (Burmeist.) Drude & Griseb.
Referencias: Glassman, S. F., 1972.

Cocos acaulis Drude subsp. *glauca* Drude ex Lindm. = **Syagrus campylospatha** (Barb. Rodr.) Becc.
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Cocos acrocomoides Drude = **Syagrus romanzoffiana** (Cham.) Glassman
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Cocos aculeata Jacq. = **Acrocomia aculeata** (Jacq.) Lodd. ex Mart.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., 1995.

Cocos amadelpha Barb. Rodr. = **Butia paraguayensis** (Barb. Rodr.) L.H. Bailey
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005.

Cocos apaensis Barb. Rodr. = **Syagrus campylospatha** (Barb. Rodr.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Cocos arechavaletana Barb. Rodr. = **Syagrus romanzoffiana** (Cham.) Glassman

Cocos arenicola Barb. Rodr. = **Butia paraguayensis** (Barb. Rodr.) L.H. Bailey
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Cocos australis Mart. = **Syagrus romanzoffiana** (Cham.) Glassman
Referencias: Glassman, S. F., 1968.

Cocos campicola Barb. Rodr. = **Butia campicola** (Barb. Rodr.) Noblick
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Cocos campylospatha Barb. Rodr. = **Syagrus campylospatha** (Barb. Rodr.) Becc.
Referencias: Jiménez, B. & Knapp, S., 1998.

Cocos capitata Mart. = **Butia capitata** (Mart.) Becc.
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Cocos chilensis (Molina) Kunth = **Jubaea chilensis** (Molina) Baill.
Referencias: Glassman, S. F., 1972.

Cocos datil Drude & Griseb. = **Syagrus romanzoffiana** (Cham.) Glassman
Referencias: Glassman, S. F., 1968.

Cocos dyerana Barb. Rodr. = **Butia paraguayensis** (Barb. Rodr.) L.H. Bailey
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005.

Cocos elegantissima Chabaud = **Butia capitata** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Cocos eriospatha Mart. ex Drude = **Butia eriospatha** (Mart. ex Drude) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Reitz, R., 1974.

Cocos erythrospatha Chabaud = **Butia capitata** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Cocos geriba Barb. Rodr. = **Syagrus romanzoffiana** (Cham.) Glassman
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Cocos glazioviana Dammer = **Syagrus petraea** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Cocos graminifolia Drude = **Syagrus graminifolia** (Drude) Becc.
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Cocos hassleriana Barb. Rodr. = **Syagrus campylospatha** (Barb. Rodr.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Cocos leiospatha Barb. Rodr. = **Butia capitata** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Cocos lilaceiflora Chabaud = **Butia capitata** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Cocos lilliputiana Barb. Rodr. = **Syagrus graminifolia** (Drude) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Cocos martiana Drude = **Syagrus romanzoffiana** (Cham.) Glassman
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Cocos nehrlingiana Abbott ex Nehrl. = **Butia capitata** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005.

Cocos odorata Barb. Rodr. = **Butia capitata** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Cocos oleracea Mart. = **Syagrus oleracea** (Mart.) Becc.
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Lorenzi, H., Moreira de Souza, H., Medeiros-Costa, J. T., Coelho de Cerqueira, L. S. & Behr, N., 1996.

Cocos paraguayensis Barb. Rodr. = **Butia paraguayensis** (Barb. Rodr.) L.H. Bailey
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Cocos petraea Mart. = **Syagrus petraea** (Mart.) Becc.
Referencias: Henderson, A., 1995.

Cocos picrophylla Barb. Rodr. ex Becc. = **Syagrus oleracea** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005.

Cocos plumosa Hook. f. = **Syagrus romanzoffiana** (Cham.) Glassman
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Cocos poni Hauman = **Butia yatay** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005.

Cocos pulposa Barb. Rodr. = **Butia capitata** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Cocos romanzoffiana Cham. = **Syagrus romanzoffiana** (Cham.) Glassman
Referencias: Glassman, S. F., 1968.

Cocos romanzoffiana Cham. var. *macropindo* Becc. = **Syagrus romanzoffiana** (Cham.) Glassman

Cocos rupestris Barb. Rodr. = **Syagrus petraea** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005.

Cocos stolonifera Barb. Rodr. = **Butia stolonifera** (Barb. Rodr.) Becc.
Referencias: Glassman, S. F., 1970b.

Cocos wildemaniana Barb. Rodr. = **Butia paraguayensis** (Barb. Rodr.) L.H. Bailey
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005.

Cocos yatay Mart. = **Butia yatay** (Mart.) Becc.
Referencias: Glassman, S. F., 1979; Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Copernicia Mart. ex Endl.

Número de especies: 1

Copernicia alba Morong
Sin.: *Copernicia australis* Becc., *Copernicia australis* Becc. var. *alba* (Morong) Bertoni ex Hauman, *Copernicia australis* Becc. var. *nigra* (Morong) Bertoni, *Copernicia cerifera* Mart., p.p., *Copernicia chacoana* Rojas Acosta, nom. superfl., *Copernicia nigra* Morong ex Becc., nom. nud., *Copernicia ramulosa* Burret, *Copernicia rubra* Morong, *Coryphomia tectorum* Rojas Acosta
Referencias: Arbo, M. M., 1974; Dahlgren, B. E. & Glassman, S. F., 1961; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Lorenzi, H., Moreira de Souza, H., Medeiros-Costa, J. T., Coelho de Cerqueira, L. S. & Behr, N., 1996; Mereles, F., 1999; Moraes R., M., 1996b.
Palmera arbórea. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE); PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Valla, J. J. 32* (BAA)]; PRY[*Zardini, E. M. 41629a* (AS, MO, SI)].

Copernicia australis Becc. = **Copernicia alba** Morong
Referencias: Dahlgren, B. E. & Glassman, S. F., 1961; Degen, R. & Mereles, F., 1996.

Copernicia australis Becc. var. *alba* (Morong) Bertoni ex Hauman = **Copernicia alba** Morong
Referencias: Dahlgren, B. E. & Glassman, S. F., 1961.

Copernicia australis Becc. var. *nigra* (Morong) Bertoni = **Copernicia alba** Morong
Referencias: Dahlgren, B. E. & Glassman, S. F., 1961.

Copernicia campestris Burmeist. = **Trithrinax campestris** (Burmeist.) Drude & Griseb.
Referencias: Digilio, A. P. L. & Legname, P. R., 1966.

Copernicia cerifera Mart., p.p. = **Copernicia alba** Morong
Referencias: Dahlgren, B. E. & Glassman, S. F., 1961.

Copernicia chacoana Rojas Acosta, nom. superfl. = **Copernicia alba** Morong

Copernicia nigra Morong ex Becc., nom. nud. = **Copernicia alba** Morong
Referencias: Dahlgren, B. E. & Glassman, S. F., 1961.

Copernicia ramulosa Burret = **Copernicia alba** Morong
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005.

Copernicia rubra Morong = **Copernicia alba** Morong
Referencias: Dahlgren, B. E. & Glassman, S. F., 1961.

Coryphomia tectorum Rojas Acosta = **Copernicia alba** Morong

Diodosperma burity H. Wendl. = **Trithrinax schyzophylla** Drude

Diplothemium anisitsii Barb. Rodr. = **Allagoptera leucocalyx** (Drude) Kuntze
Referencias: Moraes R., M., 1996a.

Diplothemium campestre Mart. = **Allagoptera campestris** (Mart.) Kuntze
Referencias: Moore Jr., H. E., 1962.

Diplothemium campestre Mart. var. *genuinum* Drude, nom. inval. = **Allagoptera campestris** (Mart.) Kuntze
Referencias: Moore Jr., H. E., 1962.

Diplothemium campestre Mart. var. *glaziovii* Dammer = **Allagoptera campestris** (Mart.) Kuntze
Referencias: Moraes R., M., 1996a.

Diplothemium hasslerianum Barb. Rodr. = **Allagoptera leucocalyx** (Drude) Kuntze
Referencias: Moraes R., M., 1996a.

Diplothemium jangadensis S. Moore = **Allagoptera leucocalyx** (Drude) Kuntze
Referencias: Moraes R., M., 1996a.

Diplothemium leucocalyx Drude = **Allagoptera leucocalyx** (Drude) Kuntze

Referencias: Moraes R., M., 1996a.

Euterpe Mart., nom. cons.

Número de especies: 1

Euterpe edulis Mart.
Sin.: *Euterpe edulis* Mart. var. *clausa* Mattos, *Euterpe egusquizae* Bertoni, nom. nud.
Referencias: Devoto, F. E. & Rothkugel, M., 1942; Henderson, A. & Galeano, G., 1996; Henderson, A., 2000b; Jiménez, B. & Knapp, S., 1998; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Lorenzi, H., Moreira de Souza, H., Medeiros-Costa, J. T., Coelho de Cerqueira, L. S. & Behr, N., 1996; Reitz, R., 1974; Stutz, L. C., 1983.
Palmera arbórea a multicaule. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Mroginsky, L. 359* (BAA, F, GH, LP, MO)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 17349* (F, NY, US)]; PRY[*Stutz, L. C. 963* (G)].

Euterpe edulis Mart. var. *clausa* Mattos = **Euterpe edulis** Mart.
Referencias: Henderson, A. & Galeano, G., 1996.

Euterpe egusquizae Bertoni, nom. nud. = **Euterpe edulis** Mart.
Referencias: Hauman, L. L., 1919c; Henderson, A. & Galeano, G., 1996.

Geonoma Willd.

Número de especies: 4, 1 endémica

Geonoma brevispatha Barb. Rodr.
Sin.: *Geonoma schottiana* Mart. var. *palustris* Warm. ex Drude
Referencias: Henderson, A., 1995; Jiménez, B. & Knapp, S., 1998; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Lorenzi, H., Moreira de Souza, H., Medeiros-Costa, J. T., Coelho de Cerqueira, L. S. & Behr, N., 1996.
Palmera multicaule. Nativa. 0–1000 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jiménez, B. 171* (BM, CTES, PY)].

Geonoma elegans Mart. = **Geonoma pauciflora** Mart.
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Geonoma gamiova Barb. Rodr.
Referencias: Reitz, R., 1974; Reitz, R., Klein, J. T. & Reis, A., 1978, 1983.
Palmera. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3551* (HBR)].

Geonoma hoehnei Burret = **Geonoma schottiana** Mart.
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Geonoma pauciflora Mart.
Sin.: *Geonoma elegans* Mart.
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Lorenzi, H., Moreira de Souza, H., Medeiros-Costa, J. T., Coelho de Cerqueira, L. S. & Behr, N., 1996; Reitz, R., 1974; Reitz, R., Klein, J. T. & Reis, A., 1978.
Palmera multicaule. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4402* (HBR)].

Geonoma schottiana Mart.
Sin.: *Geonoma hoehnei* Burret, *Geonoma schottiana* Mart. var. *angustifolia* Drude, *Geonoma schottiana* Mart. var. *latifolia* Drude
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Reitz, R., 1974; Reitz, R., Klein, J. T. & Reis, A., 1978, 1983.
Palmera multicaule. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 9005* (HBR)].

Geonoma schottiana Mart. var. *angustifolia* Drude = **Geonoma schottiana** Mart.
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Geonoma schottiana Mart. var. *latifolia* Drude = **Geonoma schottiana** Mart.
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Geonoma schottiana Mart. var. *palustris* Warm. ex Drude = **Geonoma brevispatha** Barb. Rodr.
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Guilielma insignis Mart. = **Bactris gasipaes** Kunth, nom. cons.

Juania Drude

Número de especies: 1 endémica

Juania australis (Mart.) Drude ex Hook. f.
Sin.: *Ceroxylon australe* Mart., *Morenia chonta* Phil., *Nunnezharia chonta* (Phil.) Kuntze
Referencias: Glassman, S. F., 1972; Grau, J., 2004; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Stuessy, T. F., Sanders, R. W. & Matthei, O. R., 1983.
Palmera. Endémica. 200–800 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. 1447* (M)].

Jubaea Kunth

Número de especies: 1 endémica

Jubaea chilensis (Molina) Baill.
Sin.: *Cocos chilensis* (Molina) Kunth, *Jubaea spectabilis* Kunth, *Micrococos chilensis* (Molina) Phil., *Molinaea micrococos* Bertero, *Palma chilensis* Molina
Referencias: Glassman, S. F., 1972; Grau, J., 2004; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Zizka, G., 1989.
Palmera arbórea. Endémica. 300 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Burkart, A. 9376* (SI)].

Jubaea spectabilis Kunth = **Jubaea chilensis** (Molina) Baill.
Referencias: Glassman, S. F., 1972.

Lytocaryum Toledo

Número de especies: 1

Lytocaryum hoehnei (Burret) Toledo
Sin.: *Syagrus hoehnei* Burret
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.
Palmera arbórea. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. M. 4347* (MBM, SI)].

Micrococos chilensis (Molina) Phil. = **Jubaea chilensis** (Molina) Baill.
Referencias: Glassman, S. F., 1972.

Molinaea micrococos Bertero = **Jubaea chilensis** (Molina) Baill.
Referencias: Glassman, S. F., 1972.

Morenia chonta Phil. = **Juania australis** (Mart.) Drude ex Hook. f.
Referencias: Glassman, S. F., 1972.

Nunnezharia chonta (Phil.) Kuntze = **Juania australis** (Mart.) Drude ex Hook. f.
Referencias: Glassman, S. F., 1972.

Orbignya dubia Mart. = **Attalea dubia** (Mart.) Burret
Referencias: Reitz, R., 1974.

Palma chilensis Molina = **Jubaea chilensis** (Molina) Baill.
Referencias: Glassman, S. F., 1972.

Phoenix L.

Número de especies: 1 introducida

Phoenix canariensis Chabaud
Referencias: Delucchi, G., 2000; Steibel, P., Troiani, H. O. & Williamson, T., 2001[2000].
Palmera arbórea. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, SDE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Delucchi, G. 418* (LP)].

Scheelea anisitsiana Barb. Rodr. = **Attalea anisitsiana** (Barb. Rodr.) Zona

Scheelea parviflora (Barb. Rodr.) Barb. Rodr. = **Attalea anisitsiana** (Barb. Rodr.) Zona

Scheelea quadrisperma Barb. Rodr. = **Attalea anisitsiana** (Barb. Rodr.) Zona

Scheelea quadrisulcata Barb. Rodr. = **Attalea anisitsiana** (Barb. Rodr.) Zona

Syagrus Mart.

Número de especies: 5, 1 endémica

Syagrus amadelpha (Barb. Rodr.) Frambach ex Dahlgren = **Butia paraguayensis** (Barb. Rodr.) L.H. Bailey
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005.

Syagrus apaensis (Barb. Rodr.) Becc. = **Syagrus campylospatha** (Barb. Rodr.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Syagrus arenicola (Barb. Rodr.) Frambach ex Dahlgren = **Butia paraguayensis** (Barb. Rodr.) L.H. Bailey
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Syagrus campicola (Barb. Rodr.) Becc. = **Butia campicola** (Barb. Rodr.) Noblick
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Syagrus campylospatha (Barb. Rodr.) Becc.
Sin.: *Cocos acaulis* Drude subsp. *glauca* Drude ex Lindm., *Cocos apaensis* Barb. Rodr., *Cocos campylospatha* Barb. Rodr., *Cocos hassleriana* Barb. Rodr., *Syagrus apaensis* (Barb. Rodr.) Becc., *Syagrus hassleriana* (Barb. Rodr.) Becc.
Referencias: Glassman, S. F., 1970a; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Jiménez, B. & Knapp, S., 1998.
Palmera acaule. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CEN, CON, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 1733* (K)].

Syagrus capitata (Mart.) Glassman = **Butia capitata** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Syagrus dyerana (Barb. Rodr.) Becc. = **Butia paraguayensis** (Barb. Rodr.) L.H. Bailey
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005.

Syagrus eriospatha (Mart. ex Drude) Glassman = **Butia eriospatha** (Mart. ex Drude) Becc.
Referencias: Reitz, R., 1974.

Syagrus glazioviana (Dammer) Becc. = **Syagrus petraea** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Syagrus gomesii Glassman = **Syagrus oleracea** (Mart.) Becc.
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Lorenzi, H., Moreira de Souza, H., Medeiros-Costa, J. T., Coelho de Cerqueira, L. S. & Behr, N., 1996.

Syagrus graminifolia (Drude) Becc.
Sin.: *Cocos graminifolia* Drude, *Cocos lilliputiana* Barb. Rodr., *Syagrus graminifolia* (Drude) Becc. var. *glazioviana* (Dammer) Becc., *Syagrus graminifolia*

(Drude) Becc. var. *nana* (Drude) Becc., *Syagrus lilliputiana* (Barb. Rodr.) Becc.
Referencias: Glassman, S. F., 1970a; Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Jiménez, B. & Knapp, S., 1998; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Palmera acaule. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jiménez, B. 1354* (BM, CTES, MO, PY)].

Syagrus graminifolia (Drude) Becc. var. *glazioviana* (Dammer) Becc. = **Syagrus graminifolia** (Drude) Becc.
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Syagrus graminifolia (Drude) Becc. var. *nana* (Drude) Becc. = **Syagrus graminifolia** (Drude) Becc.
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Syagrus hassleriana (Barb. Rodr.) Becc. = **Syagrus campylospatha** (Barb. Rodr.) Becc.
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Syagrus hatschbachii Glassman = **Butia microspadix** Burret
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Lorenzi, H., Moreira de Souza, H., Medeiros-Costa, J. T., Coelho de Cerqueira, L. S. & Behr, N., 1996.

Syagrus hoehnei Burret = **Lytocaryum hoehnei** (Burret) Toledo

Syagrus leptospatha Burret = **Butia leptospatha** (Burret) Noblick
Referencias: Noblick, L. R., 2006.

Syagrus lilliputiana (Barb. Rodr.) Becc. = **Syagrus graminifolia** (Drude) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Syagrus loefgrenii Glassman = **Syagrus petraea** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Syagrus oleracea (Mart.) Becc.
Sin.: *Cocos oleracea* Mart., *Cocos picrophylla* Barb. Rodr. ex Becc., *Syagrus gomesii* Glassman
Referencias: Glassman, S. F., 1970a; Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Lorenzi, H., Moreira de Souza, H., Medeiros-Costa, J. T., Coelho de Cerqueira, L. S. & Behr, N., 1996.
Palmera arbórea. Nativa. 400–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Glassman, S. F. 8001* (MO)]; PRY[*Zardini, E. M. 44882* (AS, MO)].

Syagrus paraguayensis (Barb. Rodr.) Glassman = **Butia paraguayensis** (Barb. Rodr.) L.H. Bailey
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Syagrus petraea (Mart.) Becc.
Sin.: *Cocos glazioviana* Dammer, *Cocos petraea* Mart., *Cocos rupestris* Barb. Rodr., *Syagrus glazioviana* (Dammer) Becc., *Syagrus loefgrenii* Glassman, *Syagrus rachidii* Glassman
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 2002; Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., 1995; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Jiménez, B. & Knapp, S., 1998; Lorenzi, H., Moreira de Souza, H., Medeiros-Costa, J. T., Coelho de Cerqueira, L. S. & Behr, N., 1996.
Palmera acaule. Nativa. 300–900 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 4090* (K)].

Syagrus rachidii Glassman = **Syagrus petraea** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
Sin.: *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc., *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc. var. *australe* (Mart.) Becc., *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc. var. *genuinun* Becc., nom. inval., *Cocos acrocomoides* Drude, *Cocos arechavaletana* Barb. Rodr., *Cocos australis* Mart., *Cocos datil* Drude & Griseb., *Cocos geriba* Barb. Rodr., *Cocos martiana* Drude, *Cocos plumosa* Hook. f., *Cocos romanzoffiana* Cham., *Cocos romanzoffiana* Cham. var. *macropindo* Becc.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Glassman, S. F., 1968, 1970a; Jiménez, B. & Knapp, S., 1998; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Lorenzi, H., Moreira de Souza, H., Medeiros-Costa, J. T., Coelho de Cerqueira, L. S. & Behr, N., 1996; Montani, R. G. & Ferro, E. N., 1961; Reitz, R., 1974; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Palmera arbórea. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MEN, MIS, SFE, SJU, SLU); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI); URY(MAL, MON, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2520* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 1878* (HBR)]; PRY[*Stutz, L. C. 964* (G)]; URY[*Herter, W. G. F. 345* (SI)].

Syagrus wildemaniana (Barb. Rodr.) Frambach ex Dahlgren = **Butia paraguayensis** (Barb. Rodr.) L.H. Bailey
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005.

Syagrus yatay (Mart.) Glassman = **Butia yatay** (Mart.) Becc.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Thrinax brasiliensis (Mart.) Mart. = **Trithrinax brasiliensis** Mart.
Referencias: Govaerts, R. & Dransfield, J., 2005.

Toxophoenix aculeatissima Schott = **Astrocaryum aculeatissimum** (Schott) Burret
Referencias: Reitz, R., 1974.

Trachycarpus H. Wendl.

Número de especies: 1 introducida

Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.
Sin.: *Chamaerops fortunei* Hook.
Referencias: Delucchi, G., 2000.
Palmera arbórea. Introducida.
Países: ARG(BAI, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 3533* (LIL)].

Trithrinax Mart.

Número de especies: 3, 2 endémicas

Trithrinax acanthocoma Drude = **Trithrinax brasiliensis** Mart.
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Lorenzi, H., Moreira de Souza, H., Medeiros-Costa, J. T., Coelho de Cerqueira, L. S. & Behr, N., 1996.

Trithrinax biflabellata Barb. Rodr. = **Trithrinax schyzophylla** Drude
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995.

Trithrinax brasiliensis Mart.
Sin.: *Thrinax brasiliensis* (Mart.) Mart., *Trithrinax acanthocoma* Drude
Referencias: Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Lorenzi, H., Moreira de Souza, H., Medeiros-Costa, J. T., Coelho de Cerqueira, L. S. & Behr, N., 1996; Reitz, R., 1974; Reitz, R., Klein, J. T. & Reis, A., 1978.
Palmera arbórea. Endémica. 400–1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 34220* (CTES, SI), *Smith, L. B. 9940* (HBR, US)]; PRY[*Schinini, A. 30221* (CTES)].

Trithrinax campestris (Burmeist.) Drude & Griseb.
Sin.: *Chamaethrinax hookeriana* H. Wendl. & Pfister, *Copernicia campestris* Burmeist.
Referencias: Castellanos, A., 1926; Digilio, A. P. L. & Legname, P. R., 1966; Glassman, S. F., 1972; Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R., 1995; Reitz, R., Klein, J. T. & Reis, A., 1983.
Palmera arbórea. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS); PRY(PHA); URY(SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bartlett, H. H. 20154* (SI)]; PRY[*Bernardi, L. 20166* (BM)]; URY[*Berro, M. B. 371* (MVFA)].
Notas: Citada para el estado de Rio Grande do Sul, Brasil, sin indicar material de referencia.

Trithrinax schizophylla Drude
Sin.: *Diodosperma burity* H. Wendl., *Trithrinax biflabellata* Barb. Rodr.
Referencias: Balslev, H. & Moraes, M., 1989; de Guth, E. B., 1970.
Palmera arbórea. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL); PRY(APY, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 18645* (LP, SI)]; PRY[*Vanni, R. O. 2161* (CTES, SI)].

ASPARAGACEAE

1 género, 5 especies introducidas.

Asparagopsis densiflora Kunth = **Asparagus densiflorus** (Kunth) Jessop
Referencias: Jessop, J. P., 1966.

Asparagopsis setacea Kunth = **Asparagus setaceus** (Kunth) Jessop
Referencias: Jessop, J. P., 1966.

Asparagus L.

Número de especies: 5 introducidas

Asparagus asparagoides (L.) Wight
Sin.: *Medeola asparagoides* L.
Referencias: Mendoza, E., 1942; Williamson, J., 1966.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA); URY(CAS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hurrell, J. A. 5201* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 3398* (MVFA)].

Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop
Sin.: *Asparagopsis densiflora* Kunth, *Asparagus sprengeri* Regel
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Jessop, J. P., 1966; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, SFE, TUC); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Clos, E. C. 6937* (BAB)]; URY[*Rosengurtt, B. 3569be* (MVFA)].

Asparagus officinalis L. var. **altilis** L.
Sin.: *Asparagus tenuifolius* auct. non Lam.
Referencias: Mendoza, E., 1942.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); URY(CAS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 12286* (SI), *Cialdella, A. M. 69* (CTES, MU, SI), *Hicken, C. M. s.n.* (SI)]; URY[*Gibert, J. E. s.n.* (BAB)].

Asparagus plumosus Baker = **Asparagus setaceus** (Kunth) Jessop
Referencias: Jessop, J. P., 1966.

Asparagus scoparius Lowe
Referencias: Williamson, J., 1966.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(LPA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Steibel, P. 11513* (SI)].

Asparagus setaceus (Kunth) Jessop
Sin.: *Asparagopsis setacea* Kunth, *Asparagus plumosus* Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Jessop, J. P., 1966; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, LPA, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Clos, E. C. 5160* (BAB)].

Asparagus sprengeri Regel = **Asparagus densiflorus** (Kunth) Jessop
Referencias: Jessop, J. P., 1966.

[Asparagus tenuifolius Lam.]
Referencias: Mendoza, E., 1942.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Asparagus tenuifolius auct. non Lam. = **Asparagus officinalis** L. var. **altilis** L.
Referencias: Mendoza, E., 1942.

Medeola asparagoides L. = **Asparagus asparagoides** (L.) Wight

ASPHODELACEAE

1 género,1 especie introducida.

Asphodelus L.

Número de especies: 1 introducida

Asphodelus fistulosus L.
Referencias: Matthei, O. R. & Rodríguez Ríos, R., 1987; Medán, D., 1981; Ravenna, P. F., 1987.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(COR, LPA); CHL(III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 23039* (BAA)]; CHL[*Matthei, O. R. 127* (CONC)].

ASTELIACEAE

1 género, 1 especie endémica.

Astelia Banks & Sol. ex R. Br., nom. cons.

Número de especies: 1 endémica

Astelia pumila (G. Forst.) R. Br., nom. illeg. = **Astelia pumila** (G. Forst.) Gaudich.
Referencias: Skottsberg, C. J. F., 1934.

Astelia pumila (G. Forst.) Gaudich.
Sin.: *Astelia pumila* (G. Forst.) R. Br., nom. illeg., *Melanthium pumilum* G. Forst.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. C., 2001c; Broughton, D. A., Adam, J. H. M. & Brännström, R., 2000; Godley, E. J., 1963; Ravenna, P. F., 1969f; Skottsberg, C. J. F., 1934.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 476* (SI)]; CHL[*Godley, E. J. 490* (BM, SGO), *Reed, E. C. s.n.* (K)].

Melanthium pumilum G. Forst. = **Astelia pumila** (G. Forst.) Gaudich.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. C., 2001c; Skottsberg, C. J. F., 1934.

BROMELIACEAE

Autores: Schinini, A., Wanderley, M. G. L., Strehl, T. (Sur de Brasil), Martins, Z(Sur de Brasil). & Moreira, B.

24 géneros, 291 especies, 139 especies endémicas.

Abromeitiella abstrusa A. Cast. = **Deuterocohnia lorentziana** (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1992.

Abromeitiella brevifolia (Griseb.) A. Cast. = **Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1992.

Abromeitiella brevifolia (Griseb.) A. Cast. subsp. *chlorantha* (Speg.) Schulze-Motel = **Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1992.

Abromeitiella chlorantha (Speg.) Mez = **Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1992.

Abromeitiella lorentziana (Mez) A. Cast. = **Deuterocohnia lorentziana** (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1992.

Acanthostachys Klotzsch

Número de especies: 1

Acanthostachys ananassoides Baker = **Ananas ananassoides** (Baker) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Acanthostachys exilis Bertoni = **Acanthostachys strobilacea** (Schult. f.) Klotzsch
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Acanthostachys strobilacea (Schult. f.) Klotzsch
Sin.: *Acanthostachys exilis* Bertoni, *Hohenbergia strobilacea* Schult. f.
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1955.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 700–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA, AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5259* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 16467* (BM, GH, S, US)]; PRY[*Hassler, E. 11441* (BAF, BM, P), *Schinini, A. 27391* (CTES)].

Aechmea Ruiz & Pav., nom. cons.

Número de especies: 26, 12 endémicas

Aechmea ampullacea Mez = **Aechmea recurvata** (Klotzsch) L.B. Sm. var. **recurvata**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea ampullacea Mez var. *longifolia* Hassl. = **Aechmea recurvata** (Klotzsch) L.B. Sm. var. **recurvata**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea apocalyptica Reitz
Sin.: *Ortgiesia apocalyptica* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 900–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4056* (HBR)].

Aechmea augusta (Vell.) Baker = **Hohenbergia augusta** (Vell.) E. Morren
Referencias: Reitz, R., 1983.

Aechmea benrathii Mez = **Aechmea recurvata** (Klotzsch) L.B. Sm. var. **benrathii** (Mez) Reitz
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea bicolor L.B. Sm.
Sin.: *Ortgiesia bicolor* (L.B. Sm.) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 400–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Foster, M. B. 2514* (US)].

Aechmea blumenavii Reitz var. **alba** Reitz
Sin.: *Ortgiesia blumenavii* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *alba* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 300–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 7409* (HBR)].

Aechmea blumenavii Reitz var. **blumenavii**
Sin.: *Ortgiesia blumenavii* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4679* (HBR)].

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker
Sin.: *Aechmea pulchra* (Beer) Mez, *Aechmea tinctoria* (Mart.) Mez, *Macrochordion bromeliifolium* (Rudge) Beer, *Tillandsia bromeliifolia* Rudge
Referencias: Dimitri, M. J., 1974b; Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1955, 1979; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–1600 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CEN, COA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hauman, L. L. s.n.* (BA)]; BRA[*Hatschbach, G. 29834* (MBM, US)]; PRY[*Balansa, B. 706* (P), *Jörgensen, P. 3961* (SI)].

Aechmea calyculata (E. Morren) Baker var. **calyculata**
Sin.: *Aechmea gamosepala* A. Cast., nom. illeg., *Aechmea selloana* Baker, *Aechmea thyrsigera* Speg., *Chevaliera thyrsigera* (Speg.) Mez, *Echinostachys pineliana* auct. non Brongn. ex Planch., *Hohenbergia calyculata* (E. Morren) Baker, *Hoplophytum calyculatum* E. Morren, *Macrochordion luteum* Regel & Linden, *Macrochordion nudiusculum* K. Koch, *Ortgiesia calyculata* (E. Morren) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Castellanos, A., 1944; Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1972b, 1979; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 100–700 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1018* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 3992* (HBR, US)].

Aechmea calyculata (E. Morren) Baker var. **variegata** Strehl
Referencias: Strehl, T., 2004b.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica. 500–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Strehl, T. 1324* (HAS)].

Aechmea candida E. Morren ex Baker
Sin.: *Ortgiesia candida* (E. Morren ex Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Guimarães, O. 28* (UPCB, US)].

Aechmea caudata Lindm.
Sin.: *Aechmea caudata* Lindm. var. *variegata* M.B. Foster, *Aechmea henningsiana* Wittm., *Aechmea platzmannii* Wittm., *Ortgiesia caudata* (Lindm.) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979; Winkler, S., 1982.
Hierba terrestre, epífita o rupícola. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kuhlmann, M. s.n.* (SP), *Martinelli, G. 15015* (SP), *Reitz, P. R. 1746* (HBR, US)].

Aechmea caudata Lindm. var. *eipperi* Reitz = **Aechmea organensis** Wawra
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea caudata Lindm. var. *variegata* M.B. Foster
= **Aechmea caudata** Lindm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea coelestis (K. Koch) E. Morren
Sin.: *Hohenbergia coelestis* (K. Koch) Baker, *Hoplophytum coeleste* K. Koch, *Ortgiesia coelestis* (K. Koch) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 600–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Foster, M. S. 505* (GH)].

Aechmea comata (Gaudich.) Baker, nom. illeg.
= **Aechmea lindenii** (E. Morren) Baker var. **lindenii**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea comata (Gaudich.) Baker var. *makoyana* (Mez) L.B. Sm., nom. illeg. = **Aechmea lindenii** (E. Morren) Baker var. **makoyana** Mez

Aechmea crocophylla (E. Morren) Baker = **Aechmea pectinata** Baker
Referencias: Reitz, R., 1983.

Aechmea cylindrata Lindm.
Sin.: *Aechmea cylindrata* Lindm. var. *micrantha* Lindm., *Aechmea hyacinthus* F. Muell., *Ortgiesia cylindrata* (Lindm.) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Winkler, S. 7486* (ICN)].

Aechmea cylindrata Lindm. var. *micrantha* Lindm.
= **Aechmea cylindrata** Lindm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea dealbata E. Morren ex Baker
Sin.: *Aechmea esseri* E. Gross & Rauh, *Platyaechmea dealbata* (E. Morren ex Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress, nom. illeg.
Referencias: Gross, E., 1998; Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Rauh, W., 1986; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Esser, G. s.n.* (HEID)].

Aechmea distichantha Lem. f. **albiflora** L.B. Sm.
Sin.: *Platyaechmea distichantha* (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress f. *albiflora* (L.B. Sm.) L.B. Sm. & W.J. Kress, nom. illeg.
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 300–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Foster 406a* (GH)].

Aechmea distichantha Lem. f. **distichantha**
Sin.: *Aechmea excavata* Baker, *Aechmea hookeri* Lem., *Aechmea platyphylla* Hassl., *Aechmea polystachia* (Vell.) Mez, *Aechmea polystachia* (Vell.) Mez var. *excavata* (Baker) Mez, *Aechmea polystachia* (Vell.) Mez var. *myriophylla* Hassl., *Hohenbergia distichantha* (Lem.) Baker, *Platyaechmea distichantha* (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress, nom. illeg.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Pingitore, E., 1975; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1955, 1979; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 700–2200 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gamerro, J. C. 80* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 43476* (CTES), *Smith, L. B. 7353* (HBR, R, US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5433* (SI), *Zardini, E. M. 6043* (FCQ, MO)].

Aechmea distichantha Lem. var. **glaziovii** (Baker) L.B. Sm.
Sin.: *Aechmea glaziovii* Baker, *Platyaechmea distichantha* (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *glaziovii* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress, nom. illeg.
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 800–1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1566* (MBM, US)].

Aechmea distichantha Lem. var. **schlumbergeri** E. Morren ex Mez
Sin.: *Aechmea grandiceps* (Griseb.) Mez, *Aechmea polystachia* (Vell.) Mez var. *longifolia* A. Cast., *Chevaliera grandiceps* Griseb., *Platyaechmea distichantha* (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *schlumbergeri* (E. Morren ex Mez) L.B. Sm. & W.J. Kress, nom. illeg.
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Pingitore, E., 1975; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1955, 1972, 1979.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 200–1800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1216* (SI)]; PRY [*Morong, T. 741* (GH, US), *Schinini, A. 31469* (CTES)].

Aechmea eburnea (E. Morren) Baker = **Edmundoa lindenii** (Regel) Leme var. **lindenii**
Referencias: Reitz, R., 1983.

Aechmea esseri E. Gross & Rauh = **Aechmea dealbata** E. Morren ex Baker
Referencias: Gross, E., 1998.

Aechmea excavata Baker = **Aechmea distichantha** Lem. f. **distichantha**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea gamosepala A. Cast., nom. illeg. = **Aechmea calyculata** (E. Morren) Baker var. **calyculata**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea gamosepala Wittm. var. *angustifolia* Wittm. = **Aechmea gamosepala** Wittm. var. **gamosepala**
Referencias: Reitz, R., 1983.

Aechmea gamosepala Wittm. var. **gamosepala**
Sin.: *Aechmea gamosepala* Wittm. var. *angustifolia* Wittm., *Ortgiesia gamosepala* (Wittm.) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3675* (HBR)].

Aechmea gamosepala Wittm. var. **nivea** Reitz
Sin.: *Ortgiesia gamosepala* (Wittm.) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *nivea* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 42117* (CTES), *Reitz, P. R. 9093* (HBR)].

Aechmea glaziovii Baker = **Aechmea distichantha** Lem. var. **glaziovii** (Baker) L.B. Sm.
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Aechmea gracilis Lindm.
Sin.: *Ortgiesia gracilis* (Lindm.) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 9241* (MBM, US)].

Aechmea grandiceps (Griseb.) Mez = **Aechmea distichantha** Lem. var. **schlumbergeri** E. Morren ex Mez
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea guaratubensis E. Pereira
Sin.: *Ortgiesia guaratubensis* (E. Pereira) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Leining, M. 506* (HB)].

Aechmea henningsiana Wittm. = **Aechmea caudata** Lindm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea hookeri Lem. = **Aechmea distichantha** Lem. f. **distichantha**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea hyacinthus F. Muell. = **Aechmea cylindrata** Lindm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea hystrix E. Morren = **Aechmea ornata** Baker var. **ornata**
Referencias: Reitz, R., 1983.

Aechmea joannis Strehl var. **alvipetala** Strehl
Referencias: Strehl, T., 2004b.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica. 100–300 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Freitas, E. s.n.* (HAS)].

Aechmea joannis Strehl var. **joannis**
Referencias: Strehl, T., 2004b.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica. 300–1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Nardin, J. L. s.n.* (HAS)].

Aechmea kertesziae Reitz var. **kertesziae**
Sin.: *Ortgiesia kertesziae* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4165* (HBR)].

Aechmea kertesziae Reitz var. **viridi-aurata** Reitz
Sin.: *Ortgiesia kertesziae* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *viridi-aurata* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1981b, 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 300–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 7945* (HBR)].

Aechmea kleinii Reitz
Sin.: *Pothuava kleinii* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 1000–1300 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 935* (HBR)].

Aechmea leppardii Philcox
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Philcox, D., 1992.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Leppard 540* (K)].

Aechmea lindenii (E. Morren) Baker var. **lindenii**
Sin.: *Aechmea comata* (Gaudich.) Baker, nom. illeg., *Hoplophytum lindenii* E. Morren, *Macrochordion lindenii* (E. Morren) Wittm., *Ortgiesia lindenii* (E. Morren) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Pothuava comata* Gaudich., nom. illeg.
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 6204* (R, RB, US)].

Aechmea lindenii (E. Morren) Baker var. **makoyana** Mez
Sin.: *Aechmea comata* (Gaudich.) Baker var. *makoyana* (Mez) L.B. Sm., nom. illeg.
Referencias: Reitz, R., 1983.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 100–300 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Seidel, A. s.n.* (HBR)].

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. f. *tabuleirensis* (Reitz) Reitz = **Aechmea nudicaulis** (L.) Griseb. var. **tabuleirensis** Reitz
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. var. **cuspidata** Baker
Sin.: *Pothuava nudicaulis* (L.) Regel var. *cuspidata* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Pothuava spicata* Gaudich., nom. illeg.
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6467* (MBM, US), *Krapovickas, A. 43502* (CTES)].

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. var. **flavomarginata** E. Pereira
Sin.: *Pothuava nudicaulis* (L.) Regel var. *flavomarginata* (E. Pereira) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Pereira, E., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Seidel, A. 704* (HB)].

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. var. **tabuleirensis** Reitz
Sin.: *Aechmea nudicaulis* (L.) Griseb. f. *tabuleirensis* (Reitz) Reitz
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1981b, 1983.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. s.n.* (HBR)].

Aechmea organensis Wawra
Sin.: *Aechmea caudata* Lindm. var. *eipperi* Reitz, *Ortgiesia organensis* (Wawra) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1965a; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14460* (MBM, US)].

Aechmea ornata Baker var. **hoehneana** L.B. Sm.
Sin.: *Pothuava ornata* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *hoehneana* (L.B. Sm.) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5430* (HBR, NY, US)].

Aechmea ornata Baker var. **nationalis** Reitz
Sin.: *Pothuava ornata* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *nationalis* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica. 500–700 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4764* (HBR)].

Aechmea ornata Baker var. **ornata**
Sin.: *Aechmea hystrix* E. Morren, *Chevaliera ornata* Gaudich., nom. illeg., *Echinostachys hystrix* (E. Morren) Wittm., *Pothuava ornata* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13639* (MBM)].

Aechmea ortgiesii Baker = **Aechmea recurvata** (Klotzsch) L.B. Sm. var. **ortgiesii** (Baker) Reitz
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Smith, L. B., 1979.

Aechmea pectinata Baker
Sin.: *Aechmea crocophylla* (E. Morren) Baker, *Chevaliera crocophylla* E. Morren, *Pothuava pectinata* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 5706* (R, RB, US)].

Aechmea pimenti-velosoi Reitz var. *etomentosa* Reitz, nom. nud. = **Aechmea pimenti-velosoi** Reitz var. **glabra** Reitz
Referencias: Reitz, R., 1983.

Aechmea pimenti-velosoi Reitz var. **glabra** Reitz
Sin.: *Aechmea pimenti-velosoi* Reitz var. *etomentosa* Reitz, nom. nud., *Ortgiesia pimenti-velosoi* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *glabra* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5707* (HBR)].

Aechmea pimenti-velosoi Reitz var. **pimenti-velosoi**
Sin.: *Ortgiesia pimenti-velosoi* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979.

Hierba epífita. Perenne. Endémica. 300–400 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4051* (HBR, US)].

Aechmea platyphylla Hassl. = **Aechmea distichantha** Lem. f. **distichantha**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea platzmannii Wittm. = **Aechmea caudata** Lindm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea polystachia (Vell.) Mez = **Aechmea distichantha** Lem. f. **distichantha**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea polystachia (Vell.) Mez var. *excavata* (Baker) Mez = **Aechmea distichantha** Lem. f. **distichantha**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea polystachia (Vell.) Mez var. *longifolia* A. Cast. = **Aechmea distichantha** Lem. var. **schlumbergeri** E. Morren ex Mez
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea polystachia (Vell.) Mez var. *myriophylla* Hassl. = **Aechmea distichantha** Lem. f. **distichantha**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea pulchra (Beer) Mez = **Aechmea bromeliifolia** (Rudge) Baker
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea purpurea Baker = **Nidularium procerum** Lindm.
Referencias: Tardivo, R. C. & Cervi, A. C., 1997a.

Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B. Sm. var. **albobracteata** Strehl
Referencias: Strehl, T., 2004b.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Strehl, T. 475* (HAS)].

Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B. Sm. var. **benrathii** (Mez) Reitz
Sin.: *Aechmea benrathii* Mez, *Ortgiesia recurvata* (Klotzsch) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *benrathii* (Mez) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3503* (HBR)].

Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B. Sm. var. **ortgiesii** (Baker) Reitz
Sin.: *Aechmea ortgiesii* Baker, *Ortgiesia recurvata* (Klotzsch) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *ortgiesii* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Ortgiesia tillandsioides* Regel
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3282* (HBR, US)].

Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B. Sm. var. **recurvata**
Sin.: *Aechmea ampullacea* Mez, *Aechmea ampullacea* Mez var. *longifolia* Hassl., *Macrochordion recurvatum* Klotzsch, *Ortgiesia recurvata* (Klotzsch) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Hassler, E., 1919; Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Pingitore, E., 1975; Reitz, R., 1983; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1972b, 1979; Stutz, L. C., 1983; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAN, GUA); URY(CLA, RNO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1241* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 16171* (MBM, US)]; PRY[*Jörgensen, P. 4487* (SI), *Stutz, L. C. 1851* (G)]; URY[*Felippone, F. 3534* (SI), *Legrand, C. M. D. H. 4207* (MVM)].

Aechmea selloana Baker = **Aechmea calyculata** (E. Morren) Baker var. **calyculata**
Referencias: Reitz, R., 1983.

Aechmea thyrsigera Speg. = **Aechmea calyculata** (E. Morren) Baker var. **calyculata**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea tinctoria (Mart.) Mez = **Aechmea bromeliifolia** (Rudge) Baker
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aechmea viridis (E. Morren) Baker = **Edmundoa lindenii** (Regel) Leme var. **lindenii**

Aechmea winkleri Reitz
Sin.: *Ortgiesia winkleri* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Smith, L. B. & Kress, W. J., 1989; Smith, L. B., 1979; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Winkler, S. 21* (HBR, ICN)].

Amalia aëris-incola Schult. f., nom. nud. = **Tillandsia aëranthos** (Loisel.) L.B. Sm. var. **aëranthos**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Ananas Mill.

Número de especies: 3

Ananas ananassoides (Baker) L.B. Sm.
Sin.: *Acanthostachys ananassoides* Baker, *Ananas guaraniticus* Bertoni
Referencias: Basualdo, I. Z., Soria Rey, N., Keel, S. & Rivarola, N., 1997a; Smith, L. B., 1979.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: PRY(AMA, CEN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Archer 4906* (US), *Schinini, A. 31711* (CTES)].

Ananas arvensis (Vell.) Steud. = **Quesnelia arvensis** (Vell.) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. f. var. **bracteatus**
Sin.: *Ananas bracteatus* (Lindl.) Schult. f. var. *rudis* Bertoni, *Ananassa bracteata* Lindl.
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1979.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1635* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 44031* (CTES), *Reitz, P. R. 35* (HBR)]; PRY[*Bertoni s.n.* (*), *Schinini, A. 31442* (CTES)].

Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. f. var. *rudis* Bertoni = **Ananas bracteatus** (Lindl.) Schult. f. var. **bracteatus**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. f. var. *sagenarius* (Arruda) Bertoni = **Pseudananas sagenarius** (Arruda) Camargo
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. f. var. *striatus* M.B. Foster = **Ananas bracteatus** (Lindl.) Schult. f. var. **tricolor** (Bertoni) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. f. var. **tricolor** (Bertoni) L.B. Sm.
Sin.: *Ananas bracteatus* (Lindl.) Schult. f. var. *striatus* M.B. Foster, *Ananas comosus* (L.) Merr. var. *tricolor* (Bertoni) Camargo
Referencias: Smith, L. B., 1979.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(RGS); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Camargo, A. 25* (RB)]; PRY[*Bertoni, M. S. s.n.* (*)].

Ananas bracteaus (Lindl.) Schult. f. var. *albus* L.B. Sm. = **Ananas fritzmuelleri** Camargo
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Ananas comosus (L.) Merr. var. *tricolor* (Bertoni) Camargo = **Ananas bracteatus** (Lindl.) Schult. f. var. **tricolor** (Bertoni) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Ananas fritzmuelleri Camargo
Sin.: *Ananas bracteaus* (Lindl.) Schult. f. var. *albus* L.B. Sm.
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1979.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lourteig, A. 2376* (P, US)].

Ananas guaraniticus Bertoni = **Ananas ananassoides** (Baker) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Ananas macrodontes E. Morren = **Pseudananas sagenarius** (Arruda) Camargo
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Ananas microcephalus auct. non Baker = **Pseudananas sagenarius** (Arruda) Camargo
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Ananas sativus Schult. f. var. *macrodontes* (E. Morren) Bertoni = **Pseudananas sagenarius** (Arruda) Camargo
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Ananas sativus Schult. f. var. *sagenarius* (Arruda) Bertoni = **Pseudananas sagenarius** (Arruda) Camargo
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Ananassa bracteata Lindl. = **Ananas bracteatus** (Lindl.) Schult. f. var. **bracteatus**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Anoplophytum aëranthus (Loisel.) Beer = **Tillandsia aëranthos** (Loisel.) L.B. Sm. var. **aëranthos**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Anoplophytum dianthoideum (G. Rossi) Beer = **Tillandsia aëranthos** (Loisel.) L.B. Sm. var. **aëranthos**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Anoplophytum didistichum E. Morren = **Tillandsia didisticha** (E. Morren) Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Anoplophytum lineare (Vell.) Baker = **Tillandsia linearis** Vell.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Anoplophytum luteum E. Morren ex Baker, nom. nud. = **Tillandsia ixioides** Griseb.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Anoplophytum xyphyoides Beer, nom. nud. = **Tillandsia xiphioides** Ker Gawl. var. **xiphioides**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Aregelia chlorosticta (Baker) Mez = **Neoregelia chlorosticta** (Baker) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aregelia laevis Mez = **Neoregelia laevis** (Mez) L.B. Sm. f. **laevis**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Aregelia microps (E. Morren ex Mez) Mez = **Nidularium microps** E. Morren ex Mez

Billbergia Thunb.

Número de especies: 8, 2 endémicas

Billbergia alfonsi-joannis Reitz
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 600–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4674* (HBR)].

Billbergia amoena (Lodd.) Lindl. var. **amoena**
Sin.: *Tillandsia amoena* Lodd.
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 8745* (HBR, US)].

Billbergia amoena (Lodd.) Lindl. var. **rubra** M.B. Foster
Referencias: Reitz, R., 1983.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 300–700 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4033* (HBR)].

Billbergia amoena (Lodd.) Lindl. var. **viridis** L.B. Sm.
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. M. 1345* (MBM)].

Billbergia bakeri E. Morren var. *straussiana* Wittm. = **Billbergia distachia** (Vell.) Mez var. **straussiana** (Wittm.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Billbergia bicolor (Ruiz & Pav.) Schult. f. = **Fascicularia bicolor** (Ruiz & Pav.) Mez subsp. **bicolor**
Referencias: Zizka, G., Horres, R., Nelson, E. C. & Weising, K., 1999.

Billbergia bonplandiana Gaudich. ex Mez = **Billbergia nutans** H. Wendl. ex Regel var. **nutans**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

[Billbergia brasiliensis L.B. Sm.]
Referencias: Smith, L. B., 1979.
Notas: Nombre dudoso. Probable híbrido natural.

Billbergia canterae André = **Billbergia zebrina** (Herb.) Lindl.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Billbergia chlorosticta Baker, nom. nud. = **Neoregelia chlorosticta** (Baker) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Billbergia distachia (Vell.) Mez var. **concolor** Reitz
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4152* (HBR)].

Billbergia distachia (Vell.) Mez var. **distachia**
Sin.: *Tillandsia distachia* Vell.
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1979; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 7733* (FLOR, HBR)].

Billbergia distachia (Vell.) Mez var. **maculata** Reitz
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4763* (HBR)].

Billbergia distachia (Vell.) Mez var. **straussiana** (Wittm.) L.B. Sm.
Sin.: *Billbergia bakeri* E. Morren var. *straussiana* Wittm.
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1979.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reiche, C. F. 780* (HBR, US)].

[Billbergia hydrofera Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d; Rojas Acosta, N., 1897.
Notas: Nombre dudoso.

Billbergia linearifolia Baker = **Billbergia nutans** H. Wendl. ex Regel var. **nutans**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Billbergia magnifica Mez var. **acutisepala** Hassl.
Referencias: Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, A. 40362* (CTES, MBM)]; PRY[*Hassler, E. 10726* (G)].

Billbergia magnifica Mez var. **magnifica**
Referencias: Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10780* (GH, S, US), *Hatschbach, A. 1610* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 8220* (G)].

Billbergia nutans H. Wendl. ex Regel f. *rupestris* Hassl. = **Billbergia schimperiana** Wittm. ex Baker
Referencias: Reitz, R., 1983.

Billbergia nutans H. Wendl. ex Regel var. **nutans**
Sin.: *Billbergia bonplandiana* Gaudich. ex Mez, *Billbergia linearifolia* Baker
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1955, 1979; Stutz, L. C., 1983; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI); URY(MON, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 911* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 13169* (HBR, US)]; PRY[*Jörgensen, P. 3970* (SI)]; URY[*Castellanos, A. s.n.* (LIL)].

Billbergia nutans H. Wendl. ex Regel var. *schimperiana* (Wittm. ex Baker) Mez = **Billbergia schimperiana** Wittm. ex Baker
Referencias: Reitz, R., 1983.

Billbergia nutans H. Wendl. ex Regel var. **striata** Reitz
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Reitz, R., 1965a, 1983.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Seidel, A. s.n.* (HBR)].

Billbergia porteana auct. non Brongn. ex Beer = **Billbergia zebrina** (Herb.) Lindl.

Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl.
Sin.: *Bromelia pyramidalis* Sims
Referencias: Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rivas, O. S. 4673* (MBM)].

Billbergia schimperiana Wittm. ex Baker
Sin.: *Billbergia nutans* H. Wendl. ex Regel f. *rupestris* Hassl., *Billbergia nutans* H. Wendl. ex Regel var. *schimperiana* (Wittm. ex Baker) Mez
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 300–1000 m.
Países: BRA(SCA); PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 7038* (HBR), *Schimper 270* (K)]; PRY[*Hassler, E. 3283* (G)].

Billbergia sphacelata (Ruiz & Pav.) Schult. f. = **Greigia sphacelata** (Ruiz & Pav.) Regel
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Billbergia zebrina (Herb.) Lindl.
Sin.: *Billbergia canterae* André, *Billbergia porteana* auct. non Brongn. ex Beer, *Bromelia zebrina* Herb.
Referencias: Castellanos, A., 1925a; Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1979; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA, GUA, ITA, PAI); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 281* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 12706* (HBR, R, US)]; PRY[*Chodat, R. H. 130* (G), *Schinini, A. 24779* (CTES)]; URY[*Arechavaleta, J. s.n.* (*)].

Bromelia Plum. ex L.

Número de especies: 5, 1 endémica

Bromelia albobracteata Steud. ex Lechl., nom. nud. = **Fascicularia bicolor** (Ruiz & Pav.) Mez subsp. **canaliculata** E.C. Nelson & Zizka
Referencias: Zizka, G., Horres, R., Nelson, E. C. & Weising, K., 1999.

Bromelia antiacantha Bertol.
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1979; Winkler, S., 1982.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(MAL, RIV, ROC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 7929* (RB), *Smith, L. B. 13806* (HBR, R, US)]; URY[*Bartlett, H. H. 21400* (GH, US)].

Bromelia argentina Baker = **Bromelia balansae** Mez
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Bromelia arvensis Vell. = **Quesnelia arvensis** (Vell.) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Bromelia balansae Mez
Sin.: *Bromelia argentina* Baker, *Bromelia laciniosa* auct. non Mart. ex Schult. f., *Bromelia pinguin* auct. non L.
Referencias: Amat, A. G., 1988; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1955, 1979; Winkler, S., 1982.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. 22790* (CTES), *Deginani, N. B. 991* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 9258* (HBR, R, US)]; PRY[*Jiménez, B. 1804* (BM, CTES, PY), *Jörgensen, P. 3959* (SI)].

Bromelia bicolor Ruiz & Pav. = **Fascicularia bicolor** (Ruiz & Pav.) Mez subsp. **bicolor**
Referencias: Zizka, G., Horres, R., Nelson, E. C. & Weising, K., 1999.

Bromelia carnea Beer = **Ochagavia carnea** (Beer) L.B. Sm. & Looser
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Bromelia clandestina Carrière, nom. nud. = **Greigia sphacelata** (Ruiz & Pav.) Regel
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Bromelia crassa Steud., nom. nud. = **Greigia sphacelata** (Ruiz & Pav.) Regel
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Bromelia discolor Lindl. = **Greigia sphacelata** (Ruiz & Pav.) Regel
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Bromelia hieronymi Mez
Referencias: Amat, A. G., 1988; Caffini, N. O., Bongiorno de Pfirter, G. M. & Buttazoni de Cozzarin, M. S., 1976; Castellanos, A., 1938; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Smith, L. B., 1979.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–700 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20214* (SI), *Charpin, A. 20341* (SI), *Schulz, A. G. 818* (CTES)]; PRY[*Degen, R. 3449* (FCQ)].

Bromelia joinvillei E. Morren = **Fascicularia bicolor** (Ruiz & Pav.) Mez subsp. **bicolor**
Referencias: Zizka, G., Horres, R., Nelson, E. C. & Weising, K., 1999.

Bromelia laciniosa auct. non Mart. ex Schult. f.
= **Bromelia balansae** Mez

Bromelia landbeckii Lechl. ex Phil. = **Greigia landbeckii** (Lechl. ex Phil.) Phil. ex F. Phil.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Bromelia lindleyana Lem., nom. illeg. = **Ochagavia carnea** (Beer) L.B. Sm. & Looser
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Bromelia longifolia auct. non Rudge = **Ochagavia carnea** (Beer) L.B. Sm. & Looser
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Bromelia pinguin auct. non L. = **Bromelia balansae** Mez
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Bromelia pitcairniifolia (B. Verl.) K. Koch = **Ochagavia litoralis** (Phil.) Zizka, Trumpler & Zoellner
Referencias: Zizka, G., Trumpler, K. & Zoellner, O., 2002.

Bromelia pyramidalis Sims = **Billbergia pyramidalis** (Sims) Lindl.

Bromelia sagenaria Arruda = **Pseudananas sagenarius** (Arruda) Camargo
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Bromelia serra Griseb.
Sin.: *Rhodostachys argentina* Baker
Referencias: Amat, A. G., 1988; Caffini, N. O., Bongiorno de Pfirter, G. M. & Buttazoni de Cozzarin, M. S., 1976; Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Smith, L. B., 1979; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1200 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, CEN, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 23250* (CTES), *Venturi, S. 2889* (SI)]; PRY[*Vanni, R. O. 2360* (CTES)].

Bromelia sphacelata Ruiz & Pav. = **Greigia sphacelata** (Ruiz & Pav.) Regel
Referencias: Smith, L. B., 1979.

[Bromelia textilis Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d; Rojas Acosta, N., 1897.
Notas: Nombre dudoso.

Bromelia urbaniana (Mez) L.B. Sm.
Sin.: *Deinacanthon urbanianum* (Mez) Mez, *Rhodostachys urbaniana* Mez
Referencias: Amat, A. G., 1988; Smith, L. B., 1979.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rotman, A. D. 299* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 7555* (GH), *Vanni, R. O. 2038* (CTES)].

Bromelia zebrina Herb. = **Billbergia zebrina** (Herb.) Lindl.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Canistropsis billbergioides (Schult. f.) Leme
= **Nidularium billbergioides** (Schult. f.) L.B. Sm.

Canistropsis microps (E. Morren ex Mez) Leme
= **Nidularium microps** E. Morren ex Mez

Canistrum amazonicum (Baker) Mez = **Nidularium amazonicum** (Baker) Linden & E. Morren ex Lindm.
Referencias: Leme, E. M. C., 2000.

Canistrum cruentum F. Muell. = **Wittrockia superba** Lindm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Canistrum cyathiforme (Vell.) Mez = **Wittrockia cyathiformis** (Vell.) Leme

Canistrum eburneum E. Morren, nom. illeg.
= **Edmundoa lindenii** (Regel) Leme var. **lindenii**

Canistrum lindenii (Regel) Mez = **Edmundoa lindenii** (Regel) Leme var. **lindenii**

Canistrum lindenii (Regel) Mez f. *elatum* Reitz, nom. nud. = **Edmundoa lindenii** (Regel) Leme var. **rosea** (E. Morren) Leme

Canistrum lindenii (Regel) Mez f. *exiguum* Reitz
= **Edmundoa lindenii** (Regel) Leme var. **lindenii**

Canistrum lindenii (Regel) Mez f. *humile* Reitz
= **Edmundoa lindenii** (Regel) Leme var. **rosea** (E. Morren) Leme

Canistrum lindenii (Regel) Mez f. *magnum* Reitz
= **Edmundoa lindenii** (Regel) Leme var. **lindenii**

Canistrum lindenii (Regel) Mez f. *parvum* Reitz
= **Edmundoa lindenii** (Regel) Leme var. **lindenii**

Canistrum lindenii (Regel) Mez f. *procerum* Reitz
= **Edmundoa lindenii** (Regel) Leme var. **rosea** (E. Morren) Leme

Canistrum lindenii (Regel) Mez var. *pehnkii* Reitz
= **Edmundoa lindenii** (Regel) Leme var. **lindenii**

Canistrum purpureum E. Morren, nom. nud.
= **Nidularium procerum** Lindm.
Referencias: Tardivo, R. C. & Cervi, A. C., 1997a.

Canistrum regnellii Mez, p.p. = **Wittrockia cyathiformis** (Vell.) Leme

Canistrum schwackeanum Mez = **Wittrockia cyathiformis** (Vell.) Leme

Canistrum superbum (Lindm.) Mez = **Wittrockia superba** Lindm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Catopsis Griseb.

Número de especies: 2

Catopsis berteroniana (Schult. f.) Mez
Sin.: *Catopsis mosenii* Mez, *Tillandsia berteroniana* Schult. f.
Referencias: Gouda, E. J., 1987; Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3762* (HBR)].

Catopsis maculata E. Morren ex Baker = **Racinaea aeris-incola** (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm.

Catopsis modesta F.J. Müll. = **Catopsis sessiliflora** (Ruiz & Pav.) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Catopsis mosenii Mez = **Catopsis berteroniana** (Schult. f.) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Catopsis penduliflora C.H. Wright = **Fosterella penduliflora** (C.H. Wright) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez
Sin.: *Catopsis modesta* F.J. Müll., *Catopsis sessiliflora* (Ruiz & Pav.) Mez var. *dioica* L.B. Sm., *Tillandsia sessiliflora* Ruiz & Pav.
Referencias: Gouda, E. J., 1987; Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3688* (HBR)].

Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez var. *dioica* L.B. Sm. = **Catopsis sessiliflora** (Ruiz & Pav.) Mez
Referencias: Reitz, R., 1983.

Chevaliera crocophylla E. Morren = **Aechmea pectinata** Baker
Referencias: Reitz, R., 1983.

Chevaliera grandiceps Griseb. = **Aechmea distichantha** Lem. var. **schlumbergeri** E. Morren ex Mez
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Chevaliera ornata Gaudich., nom. illeg. = **Aechmea ornata** Baker var. **ornata**
Referencias: Reitz, R., 1983.

Chevaliera thyrsigera (Speg.) Mez = **Aechmea calyculata** (E. Morren) Baker var. **calyculata**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Cottendorfia albicans Griseb. = **Fosterella albicans** (Griseb.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Deinacanthon urbanianum (Mez) Mez = **Bromelia urbaniana** (Mez) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Deuterocohnia Mez

Número de especies: 10, 4 endémicas

Deuterocohnia brevifolia (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Sin.: *Abromeitiella brevifolia* (Griseb.) A. Cast., *Abromeitiella brevifolia* (Griseb.) A. Cast. subsp. *chlorantha* (Speg.) Schulze-Motel, *Abromeitiella chlorantha* (Speg.) Mez, *Dyckia grisebachii* Baker, *Lindmania brevifolia* (Griseb.) Hauman, *Lindmania chlorantha* (Speg.) Hauman, *Meziothamnus brevifolius* (Griseb.) Harms, *Navia brevifolia* Griseb., *Pitcairnia brevifolia* (Griseb.) R.E. Fr., *Pitcairnia chlorantha* (Speg.) A. Cast., *Tillandsia chlorantha* Speg.
Referencias: Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Luther, H. E. & Sieff, E., 1997; Smith, L. B., 1974; Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 30418* (SI)].

Deuterocohnia chrysantha (Phil.) Mez
Sin.: *Pitcairnia chrysantha* Phil.
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1997; Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. 939* (B)].

Deuterocohnia digitata L.B. Sm.
Sin.: *Deuterocohnia strobilifera* auct. non Mez
Referencias: Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 2900 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA)].

Deuterocohnia divaricata Mez = **Deuterocohnia meziana** Kuntze ex Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Deuterocohnia haumanii A. Cast.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 1400 m.
Países: ARG(CAT, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 24543* (SI)].

Deuterocohnia longipetala (Baker) Mez
Sin.: *Deuterocohnia longipetala* (Baker) Mez f. *uberrima* A. Cast., *Dyckia decomposita* Baker, *Dyckia longipetala* Baker, *Puya flava* Willd. ex Baker, nom. nud., *Puya weberii* Schlumb.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–2100 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1580* (SI), *Kiesling, R. 4825* (SI)].

Deuterocohnia longipetala (Baker) Mez f. *uberrima* A. Cast. = **Deuterocohnia longipetala** (Baker) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Deuterocohnia lorentziana (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Sin.: *Abromeitiella abstrusa* A. Cast., *Abromeitiella lorentziana* (Mez) A. Cast., *Hepetis lorentziana* (Mez) Mez, *Pitcairnia lorentziana* Mez
Referencias: Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Luther, H. E. & Sieff, E., 1997; Smith, L. B., 1974; Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 1700–1900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1773* (SI)].

Deuterocohnia meziana Kuntze ex Mez
Sin.: *Deuterocohnia divaricata* Mez, *Deuterocohnia paraguariensis* Hassl.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: PRY(APY, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Kiesling, R. 9554* (G, PY, SI), *Rojas, T. 2270* (G, MVM)].

Deuterocohnia paraguariensis Hassl. = **Deuterocohnia meziana** Kuntze ex Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Deuterocohnia recurvipetala E. Gross
Referencias: Gross, E., 1998; Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Rauh, W. & Gross, E., 1991.
Hierba. Perenne. Endémica. 500 m.
Países: ARG(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rauh, W. 64236* (HEID)].
Notas: Conocida sólo de la localidad típica, Cerro Colorado, una localidad ambigua.

Deuterocohnia schreiteri A. Cast.
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1997; Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(MEN, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1740* (SI), *Schreiter, R. 1098* (LIL)].

Deuterocohnia strobilifera auct. non Mez = **Deuterocohnia digitata** L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Deuterocohnia strobilifera Mez var. **inermis** L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1969, 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–3400 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*West 6176* (UC)].

Diaphoranthema capillaris (Ruiz & Pav.) Beer = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **capillaris**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Diaphoranthema recurvata (L.) Beer = **Tillandsia recurvata** (L.) L.
Referencias: Reitz, R., 1983.

Diaphoranthema virescens (Ruiz & Pav.) Beer = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **virescens** (Ruiz & Pav.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

[Distiacanthus communis Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d; Rojas Acosta, N., 1897.
Notas: Nombre dudoso.

Dyckia Schult. f.

Número de especies: 55, 40 endémicas

[Dyckia acrosoma Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d; Rojas Acosta, N., 1897.
Notas: Nombre dudoso.

Dyckia affinis Baker
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 534* (G)].

Dyckia agudensis Irgang & Sobral
Referencias: Irgang, B. E. & Sobral, M., 1987; Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 400 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sobral, M. 5581* (ICN, MBM)].

Dyckia alba S. Winkl.
Referencias: Winkler, S., 1982.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 400 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Winkler, S. 747* (ICN)].

Dyckia altissima auct. non Lindl. = **Dyckia encholirioides** (Gaudich.) Mez var. **encholirioides**
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia apensis Mez = **Dyckia leptostachya** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia boliviensis Mez = **Dyckia leptostachya** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia bracteata (Wittm.) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–400 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Cordeiro, J. 1356* (MBM)].

Dyckia brevifolia Baker
Sin.: *Dyckia gemellaria* E. Morren ex Mez, *Dyckia sulphurea* K. Koch
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–400 m.
Países: BRA(SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3988* (HBR, US)].

Dyckia cabrerae L.B. Sm. & Reitz
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 9262* (HBR, US)].

Dyckia catharinensis K. Koch = **Dyckia encholirioides** (Gaudich.) Mez var. **encholirioides**
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia catharinensis K. Koch var. *dentata* Wittm. = **Dyckia encholirioides** (Gaudich.) Mez var. **encholirioides**
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia chaguar A. Cast. = **Dyckia floribunda** Griseb. var. **floribunda**
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia choristaminea Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974; Winkler, S., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Costa Sacco, J. 1200* (RB)].

Dyckia coccinea Mez = **Dyckia tuberosa** (Vell.) Beer
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia coccinea Mez var. *deltoidea* L.B. Sm. = **Dyckia deltoidea** (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia commixta Hassl.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: BRA(PAR); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16942* (US)]; PRY[*Chodat, R. H. 97pp* (G)].

Dyckia conspicua Mez = **Dyckia leptostachya** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia crocea L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 17391* (US)].

Dyckia decomposita Baker = **Deuterocohnia longipetala** (Baker) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia delicata Larocca & Sobral
Referencias: Larocca, J. & Sobral, M., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–400 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Larocca, J. 96001* (ICN, MBM, US)].

Dyckia deltoidea (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Sin.: *Dyckia coccinea* Mez var. *deltoidea* L.B. Sm., *Dyckia tuberosa* (Vell.) Beer var. *deltoidea* (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 17357* (GH, S)].

Dyckia distachya auct. non Hassl., p.p. = **Dyckia microcalyx** Baker var. **ostenii** L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia distachya Hassl.
Sin.: *Dyckia distachya* Hassl. f. *induta* Hassl., *Dyckia interrupta* Mez
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1955, 1974; Winkler, S., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1645* (SI), *Tressens, S. G. 4573* (CTES, SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 3818a* (HBR, US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5648* (G), *Fiebrig, K. A. G. 5824* (SI)].

Dyckia distachya Hassl. f. *induta* Hassl. = **Dyckia distachya** Hassl.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia domfelicianensis Strehl
Referencias: Strehl, T., 2004a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Strehl, T. 1283* (HAS)].

Dyckia dusenii L.B. Sm.
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 18081* (GH)].

Dyckia elisabethae S. Winkl.
Referencias: Winkler, S., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Winkler, S. 741* (ICN)].

Dyckia encholirioides (Gaudich.) Mez var. **encholirioides**
Sin.: *Dyckia altissima* auct. non Lindl., *Dyckia catharinensis* K. Koch, *Dyckia catharinensis* K. Koch var. *dentata* Wittm., *Encholirion catharinense* (K. Koch) Benth. & Hook. f. ex Mez, nom. nud., *Encholirion garreli* Beer, nom. illeg., *Garrelia encholirioides* Gaudich.
Referencias: Irgang, B. E. & Sobral, M., 1987; Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1974; Winkler, S., 1982.
Hierba terrestre o rupícola. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4264* (HBR)].

Dyckia encholirioides (Gaudich.) Mez var. **rubra** (Wittm.) Reitz
Sin.: *Dyckia rubra* Wittm.

Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1974.
Hierba terrestre o rupícola. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4027* (HBR)].

Dyckia exserta L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba rupícola. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 76697* (SPF)]; PRY[*Rojas, T. 7563* (GH)].

Dyckia ferox Mez
Sin.: *Dyckia ferox* Mez f. *australis* Hassl., *Dyckia ferox* Mez f. *hamosa* (Mez) A. Cast., *Dyckia ferox* Mez f. *vulgaris* Hassl., *Dyckia ferox* Mez subsp. *hamosa* (Mez) Hassl., *Dyckia hamosa* Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 1200 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR); PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26426* (SI)]; BRA[*Ziller, S. 1588* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 1447* (NY)].

Dyckia ferox Mez f. *australis* Hassl. = **Dyckia ferox** Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia ferox Mez f. *hamosa* (Mez) A. Cast. = **Dyckia ferox** Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia ferox Mez f. *vulgaris* Hassl. = **Dyckia ferox** Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia ferox Mez subsp. *hamosa* (Mez) Hassl. = **Dyckia ferox** Mez

Dyckia floribunda Griseb. var. **floribunda**
Sin.: *Dyckia chaguar* A. Cast., *Dyckia gilliesii* Baker
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba terrestre o rupícola. Perenne. Endémica. 800–1200 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22153* (SI), *Burkart, A. 7147* (SI)]; PRY[*Bernardi, L. 18149* (BM)].

Dyckia fosteriana L.B. Sm. var. **fosteriana**
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1974.
Hierba rupícola. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Foster 1154* (GH)].

Dyckia fosteriana L.B. Sm. var. **robustior** L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba rupícola. Perenne. Endémica. 1900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 17310* (US)].

Dyckia frigida Hook. f.
Sin.: *Dyckia regalis* Linden & E. Morren ex Baker, nom. nud., *Pourretia frigida* auct. non Linden
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 2801* (S)].

Dyckia gemellaria E. Morren ex Mez = **Dyckia brevifolia** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia gilliesii Baker = **Dyckia floribunda** Griseb. var. **floribunda**
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia gracilis Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–500 m.
Países: ARG(CHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 9763* (CTES)].

Dyckia grandiflora Mez = **Dyckia insignis** Hassl.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia grandifolia Baker = **Dyckia selloa** (K. Koch) Baker
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia grisebachii Baker = **Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1992.

Dyckia hamosa Mez = **Dyckia ferox** Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia hassleri Mez = **Dyckia leptostachya** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia hatschbachii L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2725* (MBM, US)].

Dyckia hebdingii L.B. Sm.
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Smith, L. B., 1974; Winkler, S., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Croizat 22495* (US)].

Dyckia ibicuiensis Strehl
Referencias: Strehl, T., 1997.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 100–200 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Strehl, T. 1098* (HAS)].

Dyckia ibiramensis Reitz
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1974.
Hierba terrestre o rupícola. Perenne. Endémica. 100–200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2635* (HBR, US)].

Dyckia insignis Hassl.
Sin.: *Dyckia grandiflora* Mez, *Dyckia insignis* Hassl. var. *flaviflora* Hassl., *Dyckia insignis* Hassl. var. *macrantha* Hassl., *Dyckia insignis* Hassl. var. *obtusiflora* Hassl.

Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba terrestre o rupícola. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4615* (G)].

Dyckia insignis Hassl. var. *flaviflora* Hassl. = **Dyckia insignis** Hassl.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia insignis Hassl. var. *macrantha* Hassl. = **Dyckia insignis** Hassl.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia insignis Hassl. var. *obtusiflora* Hassl. = **Dyckia insignis** Hassl.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia interrupta Mez = **Dyckia distachya** Hassl.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia irmgardiae L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974; Winkler, S., 1982.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 200–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. s.n.* (US)].

Dyckia julianae Strehl
Referencias: Strehl, T., 2004a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Strehl, T. 1427* (HAS)].

Dyckia leptostachya Baker
Sin.: *Dyckia apensis* Mez, *Dyckia boliviensis* Mez, *Dyckia conspicua* Mez, *Dyckia hassleri* Mez, *Dyckia longifolia* Mez, *Dyckia orobanchoides* auct. non Mez, *Dyckia rojasii* Mez
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1969, 1974; Winkler, S., 1982.
Hierba terrestre o rupícola. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CEN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26162* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 5846* (R, RB, US)]; PRY[*Jörgensen, P. 4775* (SI)].

Dyckia longifolia Mez = **Dyckia leptostachya** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia longipetala Baker = **Deuterocohnia longipetala** (Baker) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia lutziana L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 59434* (MBM)].

Dyckia macrantha Baker = **Dyckia selloa** (K. Koch) Baker
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia maritima Baker
Sin.: *Dyckia tomentosa* Mez, *Prionophyllum maritimum* (Baker) Mez
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1974; Winkler, S., 1982.
Hierba rupícola. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 5824* (R, RB, US)].

Dyckia microcalyx Baker var. *inermis* Hassl. = **Dyckia microcalyx** Baker var. **microcalyx**
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia microcalyx Baker var. *micrantha* Hassl. = **Dyckia microcalyx** Baker var. **microcalyx**
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia microcalyx Baker var. **microcalyx**
Sin.: *Dyckia microcalyx* Baker var. *inermis* Hassl., *Dyckia microcalyx* Baker var. *micrantha* Hassl., *Dyckia minutiflora* Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba terrestre o rupícola. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hicken, C. M. s.n.* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5941* (SI)].

Dyckia microcalyx Baker var. **ostenii** L.B. Sm.
Sin.: *Dyckia distachya* auct. non Hassl., p.p.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hauman, L. L. s.n.* (BA)]; BRA[*Hatschbach, G. 19820* (SI)].

Dyckia minarum Mez
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1974.
Hierba rupícola. Perenne. Nativa. 900–1300 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3912* (HBR)].

Dyckia minutiflora Mez = **Dyckia microcalyx** Baker var. **microcalyx**
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia missionum Mez = **Dyckia niederleinii** Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia missionum Mez var. *breviflora* Hassl. = **Dyckia niederleinii** Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia mitis A. Cast.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba terrestre o rupícola. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (BA)].

Dyckia montevidensis K. Koch = **Dyckia remotiflora** Otto & A. Dietr. var. **montevidensis** (K. Koch) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia montevidensis K. Koch var. *tandilensis* Speg. = **Dyckia remotiflora** Otto & A. Dietr. var. **tandilensis** (Speg.) Cabrera
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia monticola L.B. Sm. & Reitz
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–1500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4789* (HBR, US)].

Dyckia myriostachya Baker = **Dyckia selloa** (K. Koch) Baker
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia niederleinii Mez
Sin.: *Dyckia missionum* Mez, *Dyckia missionum* Mez var. *breviflora* Hassl.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 1529* (BAA), *Rodríguez, F. M. 701* (SI)].

Dyckia orobanchoides auct. non Mez = **Dyckia leptostachya** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia polycladus L.B. Sm.
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Foster, R. 3096* (NY, US)].

Dyckia pseudococcinea L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6102* (MBM)].

Dyckia ragonesei A. Cast.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, SDE, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. 19465* (CTES)].

[Dyckia rariflora Schult. f.]
Referencias: Grisebach, A. H. R., 1879; Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Smith, L. B., 1974.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Dyckia rariflora auct. non Schult. f. = **Dyckia remotiflora** Otto & A. Dietr. var. **remotiflora**
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia rariflora Schult. f. var. *cunninghami* Baker = **Dyckia remotiflora** Otto & A. Dietr. var. **remotiflora**
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia rariflora Schult. f. var. *montevidensis* (K. Koch) Baker ex Hauman & Vanderveken = **Dyckia remotiflora** Otto & A. Dietr. var. **montevidensis** (K. Koch) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia rariflora Schult. f. var. *remotiflora* (Otto & A. Dietr.) Baker, nom. illeg. = **Dyckia remotiflora** Otto & A. Dietr. var. **remotiflora**
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia regalis Linden & E. Morren ex Baker, nom. nud. = **Dyckia frigida** Hook. f.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia reitzii L.B. Sm.
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1974; Winkler, S., 1982.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–2500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2690* (HBR, US)].

Dyckia remotiflora Otto & A. Dietr. var. **angustior** L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bornmüller, J. F. N. 351* (GH)].

Dyckia remotiflora Otto & A. Dietr. var. **montevidensis** (K. Koch) L.B. Sm.
Sin.: *Dyckia montevidensis* K. Koch, *Dyckia rariflora* Schult. f. var. *montevidensis* (K. Koch) Baker ex Hauman & Vanderveken
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1974; Winkler, S., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(RGS); URY(CAS, CLA, COL, LAV, RNO, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6568* (SI)]; BRA[*Leite, J. E. 218* (MBM, SP, SPF)]; URY[*Cabrera, A. 32386* (SI)].

Dyckia remotiflora Otto & A. Dietr. var. **remotiflora**
Sin.: *Dyckia rariflora* auct. non Schult. f., *Dyckia rariflora* Schult. f. var. *cunninghami* Baker, *Dyckia rariflora* Schult. f. var. *remotiflora* (Otto & A. Dietr.) Baker, nom. illeg., *Dyckia vaginosa* Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974; Winkler, S., 1982.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, RGS); URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Henz, E. 35698* (SI), *Miers, J. 2518* (BM)]; URY[*Cabrera, A. 32325* (SI), *Legrand, C. M. D. H. 4667* (MVM)].

Dyckia remotiflora Otto & A. Dietr. var. **tandilensis** (Speg.) Cabrera
Sin.: *Dyckia montevidensis* K. Koch var. *tandilensis* Speg.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. 219* (LP)].

Dyckia retardata S. Winkl.
Referencias: Winkler, S., 1982.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 300–1200 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Winkler, S. 7424* (ICN)].

Dyckia retroflexa S. Winkl.
Referencias: Winkler, S., 1982.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 300–1200 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Winkler, S. 7410* (ICN)].

Dyckia rigida Strehl
Referencias: Strehl, T., 2004a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Strehl, T. 1502* (HAS)].

Dyckia rojasii Mez = **Dyckia leptostachya** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia rubra Wittm. = **Dyckia encholirioides** (Gaudich.) Mez var. **rubra** (Wittm.) Reitz
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia selloa (K. Koch) Baker
Sin.: *Dyckia grandifolia* Baker, *Dyckia macrantha* Baker, *Dyckia myriostachya* Baker, *Prionophyllum selloum* K. Koch
Referencias: Smith, L. B., 1974; Winkler, S., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24853* (RB)]; URY[*Sellow, F. 3339* (B, GH, NY, US)].

Dyckia subinermis Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Niederlein, G. 1205* (B)].

Dyckia sulphurea K. Koch = **Dyckia brevifolia** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia tobatiensis Hassl.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 2099* (G)].

Dyckia tomentella Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4046* (B, GH)].

Dyckia tomentosa Mez = **Dyckia maritima** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia tuberosa (Vell.) Beer
Sin.: *Dyckia coccinea* Mez, *Tillandsia tuberosa* Vell.
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2620* (US)].

Dyckia tuberosa (Vell.) Beer var. *deltoidea* (L.B. Sm.) L.B. Sm. = **Dyckia deltoidea** (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia tweediei Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SAL, SDE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tweedie, J. s.n.* (K)].

Dyckia vaginosa Mez = **Dyckia remotiflora** Otto & A. Dietr. var. **remotiflora**
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Dyckia velascana Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba terrestre o rupícola. Perenne. Endémica. 700–3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 10767* (SI)].

Dyckia velloziifolia Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba rupícola. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9576* (B)].

Dyckia vestita Hassl.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba rupícola. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5311* (G)].

Dyckia virgata Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba rupícola. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 46* (B)].

Echinostachys hystrix (E. Morren) Wittm. = **Aechmea ornata** Baker var. **ornata**
Referencias: Reitz, R., 1983.

Echinostachys pineliana auct. non Brongn. ex Planch. = **Aechmea calyculata** (E. Morren) Baker var. **calyculata**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Edmundoa Leme

Número de especies: 1 endémica

Edmundoa lindenii (Regel) Leme var. **lindenii**
Sin.: *Aechmea eburnea* (E. Morren) Baker, *Aechmea viridis* (E. Morren) Baker, *Canistrum eburneum* E. Morren, nom. illeg., *Canistrum lindenii* (Regel) Mez, *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *exiguum* Reitz, *Canistrum*

lindenii (Regel) Mez f. *magnum* Reitz, *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *parvum* Reitz, *Canistrum lindenii* (Regel) Mez var. *pehnkii* Reitz, *Nidularium lindenii* Regel
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1979; Tardivo, R. C. & Cervi, A. C., 1997b; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 56438* (MBM)].

Edmundoa lindenii (Regel) Leme var. **rosea** (E. Morren) Leme
Sin.: *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *elatum* Reitz, nom. nud., *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *humile* Reitz, *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *procerum* Reitz
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1979; Tardivo, R. C. & Cervi, A. C., 1997b; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Tardivo, R. C. 120* (UPCB)].

Encholirion catharinense (K. Koch) Benth. & Hook. f. ex Mez, nom. nud. = **Dyckia encholirioides** (Gaudich.) Mez var. **encholirioides**
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Encholirion garreli Beer, nom. illeg. = **Dyckia encholirioides** (Gaudich.) Mez var. **encholirioides**
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Encholirion roseum Antoine var. *variegatum* Guillon = **Vriesea platynema** Gaudich. var. **variegata** (Guillon) Reitz
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Encholirion saundersii Carrière = **Vriesea saundersii** (Carrière) E. Morren ex Mez

Fascicularia Mez

Número de especies: 1 endémica

Fascicularia bicolor (Ruiz & Pav.) Mez subsp. **bicolor**
Sin.: *Billbergia bicolor* (Ruiz & Pav.) Schult. f., *Bromelia bicolor* Ruiz & Pav., *Bromelia joinvillei* E. Morren, *Fascicularia micrantha* (Phil.) Mez, *Fascicularia parviflora* Mez, *Rhodostachys bicolor* (Ruiz & Pav.) Benth. ex Hook. f. ex Baker, *Rhodostachys micrantha* Phil.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Smith, L. B., 1979; Zizka, G., Horres, R., Nelson, E. C. & Weising, K., 1999.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica. 600 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 609* (CONC), *Jürgens, C. 52* (SI)].

Fascicularia bicolor (Ruiz & Pav.) Mez subsp. **canaliculata** E.C. Nelson & Zizka
Sin.: *Bromelia albobracteata* Steud. ex Lechl., nom. nud., *Fascicularia kirchhoffiana* (Wittm.) Mez, *Rhodostachys albo-bracteata* (Steud. ex Baker) Baker, *Rhodostachys pitcairniifolia* (B. Verl.) Benth. var. *kirchoffiana* Wittm.
Referencias: Zizka, G., Horres, R., Nelson, E. C. & Weising, K., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Sparre, B. B. 3546* (S)].

Fascicularia kirchhoffiana (Wittm.) Mez = **Fascicularia bicolor** (Ruiz & Pav.) Mez subsp. **canaliculata** E.C. Nelson & Zizka
Referencias: Zizka, G., Horres, R., Nelson, E. C. & Weising, K., 1999.

Fascicularia litoralis (Phil.) Mez = **Ochagavia litoralis** (Phil.) Zizka, Trumpler & Zoellner
Referencias: Zizka, G., Trumpler, K. & Zoellner, O., 2002.

Fascicularia micrantha (Phil.) Mez = **Fascicularia bicolor** (Ruiz & Pav.) Mez subsp. **bicolor**
Referencias: Zizka, G., Horres, R., Nelson, E. C. & Weising, K., 1999.

Fascicularia parviflora Mez = **Fascicularia bicolor** (Ruiz & Pav.) Mez subsp. **bicolor**
Referencias: Zizka, G., Horres, R., Nelson, E. C. & Weising, K., 1999.

Fascicularia pitcairniifolia (B. Verl.) Mez = **Ochagavia litoralis** (Phil.) Zizka, Trumpler & Zoellner
Referencias: Zizka, G., Trumpler, K. & Zoellner, O., 2002.

Fosterella L.B. Sm.

Número de especies: 3, 1 endémica

Fosterella albicans (Griseb.) L.B. Sm.
Sin.: *Cottendorfia albicans* Griseb., *Lindmania albicans* (Griseb.) Mez
Referencias: Ibisch, P. L., Vásquez, R. & Gross, E., 1999; Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Smith, L. B. & Read, R. W., 1992; Smith, L. B., 1955, 1974.
Hierba rupícola. Perenne. Nativa. 900–2100 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 502* (CORD)].

Fosterella penduliflora (C.H. Wright) L.B. Sm.
Sin.: *Catopsis penduliflora* C.H. Wright, *Lindmania penduliflora* (C.H. Wright) Stapf
Referencias: Ibisch, P. L., Vásquez, R. & Gross, E., 1999; Smith, L. B. & Read, R. W., 1992; Smith, L. B., 1974.
Hierba rupícola. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 5054* (SI), *Venturi, S. 9721* (LP)].

Fosterella rojasii (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Sin.: *Lindmania rojasii* L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba rupícola. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 6771* (GH)].

Garrelia encholirioides Gaudich. = **Dyckia encholirioides** (Gaudich.) Mez var. **encholirioides**
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Greigia Regel

Número de especies: 4 endémicas

Greigia berteroi Skottsb.
Sin.: *Hesperogreigia berteroi* (Skottsb.) Skottsb.
Referencias: Smith, L. B., 1979.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–700 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. 1219* (K)].

Greigia landbeckii (Lechl. ex Phil.) Phil. ex F. Phil.
Sin.: *Bromelia landbeckii* Lechl. ex Phil.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Luther, H. E. & Sieff, E., 1997; Smith, L. B., 1979.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(VIII, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Lechler, W. 3098* (K, SGO)].

Greigia pearcei Mez
Referencias: Smith, L. B., 1979.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–400 m.
Países: CHL(VIII, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pearce, S. A. 269* (BM)].

Greigia sphacelata (Ruiz & Pav.) Regel
Sin.: *Billbergia sphacelata* (Ruiz & Pav.) Schult. f., *Bromelia clandestina* Carrière, nom. nud., *Bromelia crassa* Steud., nom. nud., *Bromelia discolor* Lindl., *Bromelia sphacelata* Ruiz & Pav.
Referencias: Smith, L. B., 1979.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 3185* (GH)].

Hechtia carnea Wittm., nom. nud. = **Ochagavia litoralis** (Phil.) Zizka, Trumpler & Zoellner
Referencias: Zizka, G., Trumpler, K. & Zoellner, O., 2002.

Hechtia pitcairniifolia B. Verl. = **Ochagavia litoralis** (Phil.) Zizka, Trumpler & Zoellner
Referencias: Zizka, G., Trumpler, K. & Zoellner, O., 2002.

Hepetis lorentziana (Mez) Mez = **Deuterocohnia lorentziana** (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1992.

Hesperogreigia berteroi (Skottsb.) Skottsb. = **Greigia berteroi** Skottsb.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Hohenbergia Schult. f.

Número de especies: 1

Hohenbergia augusta (Vell.) E. Morren
Sin.: *Aechmea augusta* (Vell.) Baker, *Hoplophytum augustum* (Vell.) Beer, *Tillandsia augusta* Vell.
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4182* (HBR)].

Hohenbergia billbergioides Schult. f. = **Nidularium billbergioides** (Schult. f.) L.B. Sm.
Referencias: Tardivo, R. C. & Cervi, A. C., 1997a.

Hohenbergia calyculata (E. Morren) Baker = **Aechmea calyculata** (E. Morren) Baker var. **calyculata**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Hohenbergia coelestis (K. Koch) Baker = **Aechmea coelestis** (K. Koch) E. Morren
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Hohenbergia cyathiformis (Vell.) Beer = **Wittrockia cyathiformis** (Vell.) Leme
Referencias: Tardivo, R. C. & Cervi, A. C., 1997b.

Hohenbergia distichantha (Lem.) Baker = **Aechmea distichantha** Lem. f. **distichantha**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Hohenbergia strobilacea Schult. f. = **Acanthostachys strobilacea** (Schult. f.) Klotzsch
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Hoplophytum augustum (Vell.) Beer = **Hohenbergia augusta** (Vell.) E. Morren
Referencias: Reitz, R., 1983.

Hoplophytum calyculatum E. Morren = **Aechmea calyculata** (E. Morren) Baker var. **calyculata**
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Hoplophytum coeleste K. Koch = **Aechmea coelestis** (K. Koch) E. Morren
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Smith, L. B., 1979.

Hoplophytum lindenii E. Morren = **Aechmea lindenii** (E. Morren) Baker var. **lindenii**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Karatas amazonica Baker = **Nidularium amazonicum** (Baker) Linden & E. Morren ex Lindm.
Referencias: Leme, E. M. C., 2000.

Karatas candida Mez, nom. illeg. = **Neoregelia laevis** (Mez) L.B. Sm. f. **laevis**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Karatas chlorosticta Baker = **Neoregelia chlorosticta** (Baker) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Karatas innocentii (Lem.) Antoine = **Nidularium innocentii** Lem. var. **innocentii**
Referencias: Tardivo, R. C. & Cervi, A. C., 1997a.

Karatas purpurea (Beer) Antoine = **Nidularium purpureum** Beer
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Karatas scheremetiewii (Regel) Antoine = **Nidularium scheremetiewii** Regel
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Lindmania albicans (Griseb.) Mez = **Fosterella albicans** (Griseb.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Lindmania brevifolia (Griseb.) Hauman = **Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1992.

Lindmania chlorantha (Speg.) Hauman = **Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1992.

Lindmania penduliflora (C.H. Wright) Stapf = **Fosterella penduliflora** (C.H. Wright) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Lindmania rojasii L.B. Sm. = **Fosterella rojasii** (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Macrochordion bromeliifolium (Rudge) Beer = **Aechmea bromeliifolia** (Rudge) Baker
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Macrochordion lindenii (E. Morren) Wittm. = **Aechmea lindenii** (E. Morren) Baker var. **lindenii**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Macrochordion luteum Regel & Linden = **Aechmea calyculata** (E. Morren) Baker var. **calyculata**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Macrochordion nudiusculum K. Koch = **Aechmea calyculata** (E. Morren) Baker var. **calyculata**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Macrochordion recurvatum Klotzsch = **Aechmea recurvata** (Klotzsch) L.B. Sm. var. **recurvata**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Massangea hieroglyphica Carrière = **Vriesea hieroglyphica** (Carrière) E. Morren
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Meziothamnus brevifolius (Griseb.) Harms = **Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1992.

Mosenia sicarius Lindm. = **Wittrockia cyathiformis** (Vell.) Leme
Referencias: Tardivo, R. C. & Cervi, A. C., 1997b.

Navia brevifolia Griseb. = **Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1992.

Neoregelia L.B. Sm.

Número de especies: 3

Neoregelia chlorosticta (Baker) L.B. Sm.
Sin.: *Aregelia chlorosticta* (Baker) Mez, *Billbergia chlorosticta* Baker, nom. nud., *Karatas chlorosticta* Baker, *Neoregelia marmorata* L.B. Sm., *Neoregelia sarmentosa* (Regel) L.B. Sm. var. *chlorosticta* (Baker) L.B. Sm., *Nidularium chlorosticta* E. Morren ex Baker, nom. nud., *Regelia chlorosticta* (Baker) Lindm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5818* (HBR, US)].

Neoregelia doeringiana L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 300–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 61207* (MBM)].

Neoregelia laevis (Mez) L.B. Sm. f. **laevis**
Sin.: *Aregelia laevis* Mez, *Karatas candida* Mez, nom. illeg.
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 5733* (US)].

Neoregelia laevis (Mez) L.B. Sm. f. **maculata** H. Luther
Sin.: *Neoregelia maculata* L.B. Sm.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 900–1300 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20247* (MBM)].

Neoregelia maculata L.B. Sm. = **Neoregelia laevis** (Mez) L.B. Sm. f. **maculata** H. Luther

Neoregelia marmorata L.B. Sm. = **Neoregelia chlorosticta** (Baker) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

[Neoregelia princeps (Baker) L.B. Sm.]
Referencias: Reitz, R., 1983.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Neoregelia sarmentosa (Regel) L.B. Sm. var. *chlorosticta* (Baker) L.B. Sm. = **Neoregelia chlorosticta** (Baker) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Nidularium Lem.

Número de especies: 14, 3 endémicas

Nidularium affine Mez = **Nidularium procerum** Lindm.
Referencias: Tardivo, R. C. & Cervi, A. C., 1997a.

Nidularium amazonicum (Baker) Linden & E. Morren ex Lindm.
Sin.: *Canistrum amazonicum* (Baker) Mez, *Karatas amazonica* Baker, *Wittrockia amazonica* (Baker) L.B. Sm., *Wittrockia smithii* Reitz
Referencias: Leme, E. M. C. & Britto, A. L. T., 1993; Leme, E. M. C., 1997, 2000; Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 200–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4207* (HBR)].

Nidularium angustifolium Ule
Sin.: *Nidularium viridium* E. Pereira & Leme
Referencias: Leme, E. M. C., 2000.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 300–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Seidel, A. 756* (HB)].

Nidularium billbergioides (Schult. f.) L.B. Sm.
Sin.: *Canistropsis billbergioides* (Schult. f.) Leme, *Hohenbergia billbergioides* Schult. f., *Nidularium billbergioides* (Schult. f.) L.B. Sm. var. *citrinum* (Burch. ex Baker) Reitz, *Nidularium citrinum* Mez, *Tillandsia citrina* Burch. ex Baker
Referencias: Pereira, E. & Leme, E., 1986; Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1979; Tardivo, R. C. & Cervi, A. C., 1997a.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22090* (MBM)].

Nidularium billbergioides (Schult. f.) L.B. Sm. var. *citrinum* (Burch. ex Baker) Reitz = **Nidularium billbergioides** (Schult. f.) L.B. Sm.
Referencias: Reitz, R., 1965b; Tardivo, R. C. & Cervi, A. C., 1997a.

Nidularium campo-alegrense Leme
Sin.: *Nidularium purpureum* Beer var. *albiflorum* auct. non Beer
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1997; Reitz, R., 1965b; Tardivo, R. C. & Cervi, A. C., 1997a.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5946* (HBR)].

Nidularium campos-portoi (L.B. Sm.) Wand. & B.A. Moreira
Sin.: *Wittrockia campos-portoi* L.B. Sm.
Referencias: Leme, E. M. C., 1997; Wanderley, M. G. L. & Moreira, B. A., 2000.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. s.n.* (RB)].

Nidularium catarinense Leme
Referencias: Leme, E. M. C., 2000.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 300–900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Leme, E. M. C. 1525* (HB, RB)].

Nidularium chlorosticta E. Morren ex Baker, nom. nud. = **Neoregelia chlorosticta** (Baker) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Nidularium citrinum Mez = **Nidularium billbergioides** (Schult. f.) L.B. Sm.
Referencias: Tardivo, R. C. & Cervi, A. C., 1997a.

Nidularium corcovadense Ule = **Nidularium scheremetiewii** Regel
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Nidularium discolor Beer = **Nidularium purpureum** Beer
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Nidularium exostigmum Tardivo = **Nidularium innocentii** Lem. var. **innocentii**
Referencias: Leme, E. M. C., 2000.

Nidularium fulgens auct. non Lem. = **Nidularium rutilans** E. Morren

Nidularium gracile Tardivo = **Nidularium procerum** Lindm.
Referencias: Leme, E. M. C., 2000.

[Nidularium hydrophorum Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d; Rojas Acosta, N., 1897.
Notas: Nombre dudoso.

Nidularium innocentii Lem. var. *bauense* Reitz = **Nidularium innocentii** Lem. var. **striatum** (Bull.) Wittm.
Referencias: Leme, E. M. C., 2000.

Nidularium innocentii Lem. var. **innocentii**
Sin.: *Karatas innocentii* (Lem.) Antoine, *Nidularium exostigmum* Tardivo, *Nidularium innocentii* Lem. var. *paxianum* (Mez) L.B. Sm., *Nidularium paxianum* Mez
Referencias: Leme, E. M. C., 2000; Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1979; Tardivo, R. C. & Cervi, A. C., 1997a; Wanderley, M. G. L. & Moreira, B. A., 2000; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 21331* (MBM, US)].

Nidularium innocentii Lem. var. **lineatum** (Mez) L.B. Sm.
Sin.: *Nidularium lineatum* Mez
Referencias: Leme, E. M. C., 2000.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. C. s.n.* (RB)].

Nidularium innocentii Lem. var. *paxianum* (Mez) L.B. Sm. = **Nidularium innocentii** Lem. var. **innocentii**
Referencias: Leme, E. M. C., 2000.

Nidularium innocentii Lem. var. **striatum** (Bull.) Wittm.
Sin.: *Nidularium innocentii* Lem. var. *bauense* Reitz, *Nidularium striatum* Bull.
Referencias: Leme, E. M. C., 2000.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica. 200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 7962* (HBR)].

Nidularium innocentii Lem. var. **wittmackianum** (Harms) L.B. Sm.
Sin.: *Nidularium wittmackianum* Harms
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1979; Tardivo, R. C. & Cervi, A. C., 1997a.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5739* (B, US)].

Nidularium insularis E. Pereira & Leme = **Nidularium procerum** Lindm.
Referencias: Leme, E. M. C., 2000.

Nidularium jonesianum Leme
Referencias: Leme, E. M. C., 1995; Luther, H. E. & Sieff, E., 1997.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 200 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Jones, C. S. 326* (HB)].

Nidularium kermesianum F.J. Müll. ex Mez = **Nidularium procerum** Lindm.
Referencias: Leme, E. M. C., 2000.

Nidularium lindenii Regel = **Edmundoa lindenii** (Regel) Leme var. **lindenii**
Referencias: Tardivo, R. C. & Cervi, A. C., 1997b.

Nidularium lineatum Mez = **Nidularium innocentii** Lem. var. **lineatum** (Mez) L.B. Sm.
Referencias: Leme, E. M. C., 2000; Smith, L. B., 1955.

Nidularium microps E. Morren ex Mez
Sin.: *Aregelia microps* (E. Morren ex Mez) Mez, *Canistropsis microps* (E. Morren ex Mez) Leme
Referencias: Reitz, R., 1983.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 200–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6039* (HBR)].

Nidularium paxianum Mez = **Nidularium innocentii** Lem. var. **innocentii**
Referencias: Leme, E. M. C., 2000.

Nidularium porphyreum Mez = **Nidularium procerum** Lindm.
Referencias: Leme, E. M. C., 2000.

Nidularium procerum Lindm.
Sin.: *Aechmea purpurea* Baker, *Canistrum purpureum* E. Morren, nom. nud., *Nidularium affine* Mez, *Nidularium gracile* Tardivo, *Nidularium insularis* E. Pereira & Leme, *Nidularium kermesianum* F.J. Müll. ex Mez, *Nidularium porphyreum* Mez, *Nidularium procerum* Lindm. var. *kermesianum* (F.J. Müll. ex Mez) Reitz, *Nidularium terminale* Ule
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1979; Tardivo, R. C. & Cervi, A. C., 1997a.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 46276* (MBM)].

Nidularium procerum Lindm. var. *kermesianum* (F.J. Müll. ex Mez) Reitz = **Nidularium procerum** Lindm.
Referencias: Leme, E. M. C., 2000.

Nidularium purpureum Beer
Sin.: *Karatas purpurea* (Beer) Antoine, *Nidularium discolor* Beer
Referencias: Smith, L. B., 1979.
Hierba rupícola. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dombrowski, L. T. 7415* (MBM)].

Nidularium purpureum Beer var. *albiflorum* auct. non Beer = **Nidularium campo-alegrense** Leme
Referencias: Tardivo, R. C. & Cervi, A. C., 1997a.

Nidularium regelioides Ule = **Nidularium rutilans** E. Morren
Referencias: Leme, E. M. C., 2000.

Nidularium rosulatum Ule
Referencias: Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Foster 402* (GH)].

Nidularium rutilans E. Morren
Sin.: *Nidularium fulgens* auct. non Lem., *Nidularium regelioides* Ule
Referencias: Leme, E. M. C., 2000.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Winkler, S. 153* (ICN)].

Nidularium scheremetiewii Regel
Sin.: *Karatas scheremetiewii* (Regel) Antoine, *Nidularium corcovadense* Ule
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 300–1200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6080* (HBR, US)].

Nidularium striatum Bull. = **Nidularium innocentii** Lem. var. **striatum** (Bull.) Wittm.
Referencias: Leme, E. M. C., 2000.

Nidularium superbum (Lindm.) Ule = **Wittrockia superba** Lindm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Nidularium terminale Ule = **Nidularium procerum** Lindm.

Referencias: Leme, E. M. C., 2000.

Nidularium viridium E. Pereira & Leme = **Nidularium angustifolium** Ule

Nidularium wittmackianum Harms = **Nidularium innocentii** Lem. var. **wittmackianum** (Harms) L.B. Sm.
Referencias: Tardivo, R. C. & Cervi, A. C., 1997a.

Ochagavia Phil.

Número de especies: 4 endémicas

Ochagavia andina (Phil.) Zizka, Trumpler & Zoellner
Sin.: *Rhodostachys andina* Phil.
Referencias: Zizka, G., Trumpler, K. & Zoellner, O., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–2500 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Reed, E. C. 183* (CONC)].

Ochagavia carnea (Beer) L.B. Sm. & Looser
Sin.: *Bromelia carnea* Beer, *Bromelia lindleyana* Lem., nom. illeg., *Bromelia longifolia* auct. non Rudge, *Ochagavia chamissonis* (Mez) L.B. Sm. & Looser, *Ochagavia grandiflora* (Phil.) Mez, *Pourretia argentea* Wittm., nom. nud., *Rhodostachys carnea* (Beer) Mez, *Rhodostachys chamissonis* Mez, *Rhodostachys grandiflora* Phil., *Ruckia ellemeti* Regel
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Smith, L. B., 1979; Zizka, G., Trumpler, K. & Zoellner, O., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1100 m.
Países: CHL(V, VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. s.n.* (CONC, SGO)].

Ochagavia chamissonis (Mez) L.B. Sm. & Looser = **Ochagavia carnea** (Beer) L.B. Sm. & Looser
Referencias: Smith, L. B., 1979; Zizka, G., Trumpler, K. & Zoellner, O., 2002.

Ochagavia elegans Phil.
Sin.: *Rhodostachys elegans* (Phil.) Mez
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1997; Smith, L. B., 1979; Zizka, G., Trumpler, K. & Zoellner, O., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. 941* (B, W)].

Ochagavia grandiflora (Phil.) Mez = **Ochagavia carnea** (Beer) L.B. Sm. & Looser
Referencias: Smith, L. B., 1979.

[Ochagavia leiboldiana (Mez) L.B. Sm. & Looser]
Sin.: *Rhodostachys leiboldiana* Mez
Referencias: Zizka, G., Trumpler, K. & Zoellner, O., 2002.
Nota: Nombre dudoso.

Ochagavia lindleyana Mez = **Ochagavia litoralis** (Phil.) Zizka, Trumpler & Zoellner
Referencias: Zizka, G., Trumpler, K. & Zoellner, O., 2002.

Ochagavia litoralis (Phil.) Zizka, Trumpler & Zoellner
Sin.: *Bromelia pitcairniifolia* (B. Verl.) K. Koch, *Fascicularia litoralis* (Phil.) Mez, *Fascicularia pitcairniifolia* (B. Verl.) Mez, *Hechtia carnea* Wittm., nom. nud., *Hechtia pitcairniifolia* B. Verl., *Ochagavia lindleyana* Mez, *Placseptalia rebecae* Espinosa, *Rhodostachys litoralis* Phil., *Rhodostachys pitcairniifolia* (B. Verl.) Benth.
Referencias: Zizka, G., Trumpler, K. & Zoellner, O., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(IV, V, VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 5497* (US)].

Ortgiesia apocalyptica (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea apocalyptica** Reitz
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Ortgiesia bicolor (L.B. Sm.) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea bicolor** L.B. Sm.

Ortgiesia blumenavii (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea blumenavii** Reitz var. **blumenavii**
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Ortgiesia blumenavii (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *alba* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea blumenavii** Reitz var. **alba** Reitz
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Ortgiesia calyculata (E. Morren) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea calyculata** (E. Morren) Baker var. **calyculata**
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Ortgiesia candida (E. Morren ex Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea candida** E. Morren ex Baker
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Ortgiesia caudata (Lindm.) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea caudata** Lindm.
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Ortgiesia coelestis (K. Koch) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea coelestis** (K. Koch) E. Morren
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Ortgiesia cylindrata (Lindm.) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea cylindrata** Lindm.
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Ortgiesia gamosepala (Wittm.) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea gamosepala** Wittm. var. **gamosepala**
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Ortgiesia gamosepala (Wittm.) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *nivea* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea gamosepala** Wittm. var. **nivea** Reitz
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Ortgiesia gracilis (Lindm.) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea gracilis** Lindm.
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Ortgiesia guaratubensis (E. Pereira) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea guaratubensis** E. Pereira
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Ortgiesia kertesziae (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea kertesziae** Reitz var. **kertesziae**
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Ortgiesia kertesziae (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *viridi-aurata* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea kertesziae** Reitz var. **viridi-aurata** Reitz
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Ortgiesia lindenii (E. Morren) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea lindenii** (E. Morren) Baker var. **lindenii**
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Ortgiesia organensis (Wawra) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea organensis** Wawra
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Ortgiesia pimenti-velosoi (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea pimenti-velosoi** Reitz var. **pimenti-velosoi**
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Ortgiesia pimenti-velosoi (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *glabra* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea pimenti-velosoi** Reitz var. **glabra** Reitz
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Ortgiesia recurvata (Klotzsch) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea recurvata** (Klotzsch) L.B. Sm. var. **recurvata**
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Smith, L. B., 1977.

Ortgiesia recurvata (Klotzsch) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *benrathii* (Mez) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea recurvata** (Klotzsch) L.B. Sm. var. **benrathii** (Mez) Reitz
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Ortgiesia recurvata (Klotzsch) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *ortgiesii* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea recurvata** (Klotzsch) L.B. Sm. var. **ortgiesii** (Baker) Reitz
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Ortgiesia tillandsioides Regel = **Aechmea recurvata** (Klotzsch) L.B. Sm. var. **ortgiesii** (Baker) Reitz
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Ortgiesia winkleri (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea winkleri** Reitz
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Phytarrhiza crocata E. Morren = **Tillandsia crocata** (E. Morren) N.E. Br.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Phytarrhiza uniflora E. Morren ex Baker, nom. nud. = **Tillandsia mallemontii** Glaz. ex Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Phytarrhiza xiphioides (Ker Gawl.) E. Morren, nom. nud. = **Tillandsia xiphioides** Ker Gawl. var. **xiphioides**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Pitcairnia L'Hér., nom. cons.

Número de especies: 5, 4 endémicas

Pitcairnia alpestris L.H. Bailey, nom. nud. = **Puya berteroniana** Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Pitcairnia brevifolia (Griseb.) R.E. Fr. = **Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1992.

Pitcairnia chilensis Lodd. ex Loudon, nom. nud. = **Puya chilensis** Molina
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Pitcairnia chiriguana A. Cast.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 600 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 3611* (LIL)].

Pitcairnia chlorantha (Speg.) A. Cast. = **Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1992.

Pitcairnia chrysantha Phil. = **Deuterocohnia chrysantha** (Phil.) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Pitcairnia coarctata (Ruiz & Pav.) Pers. = **Puya chilensis** Molina
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Pitcairnia coerulea (Lindl.) Benth. ex Baker = **Puya coerulea** Lindl. var. **violacea** (Brongn.) L.B. Sm. & Looser
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Pitcairnia dyckioides Baker = **Puya dyckioides** (Baker) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Pitcairnia flammea Lindl. var. **floccosa** L.B. Sm.
Sin.: *Pitcairnia muscosa* Mart. ex Schult. f.
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–1900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 25741* (SI), *Reitz, P. R. 10012* (HBR, US)].

Pitcairnia flammea Lindl. var. **glabrior** L.B. Sm.
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7245* (S)].

Pitcairnia lorentziana Mez = **Deuterocohnia lorentziana** (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1992.

Pitcairnia mirabilis Mez = **Puya mirabilis** (Mez) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Pitcairnia mirabilis Mez var. *tucumana* A. Cast. = **Puya mirabilis** (Mez) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Pitcairnia muscosa Mart. ex Schult. f. = **Pitcairnia flammea** Lindl. var. **floccosa** L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Pitcairnia oranensis L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 800 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eyerdam, W. J. 22795* (GH)].

Pitcairnia paraguayensis L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Endémica. 400–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 6791* (GH)].

Pitcairnia philippii Baker = **Puya coerulea** Lindl. var. **violacea** (Brongn.) L.B. Sm. & Looser
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Pitcairnia saltensis L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pierotti, A. s.n.* (LIL)].

Pitcairnia spathacea Griseb. = **Puya spathacea** (Griseb.) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Pitcairnia sphaerocephala Baker = **Puya venusta** Phil.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Pitcairnia venusta Baker = **Puya venusta** Phil.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Pitcairnia violacea Brongn. = **Puya coerulea** Lindl. var. **violacea** (Brongn.) L.B. Sm. & Looser
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Placseptalia rebecae Espinosa = **Ochagavia litoralis** (Phil.) Zizka, Trumpler & Zoellner
Referencias: Zizka, G., Trumpler, K. & Zoellner, O., 2002.

Platyaechmea dealbata (E. Morren ex Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress, nom. illeg. = **Aechmea dealbata** E. Morren ex Baker
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Platyaechmea distichantha (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress, nom. illeg. = **Aechmea distichantha** Lem. f. **distichantha**
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Platyaechmea distichantha (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress f. *albiflora* (L.B. Sm.) L.B. Sm. & W.J. Kress, nom. illeg. = **Aechmea distichantha** Lem. f. **albiflora** L.B. Sm.
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Platyaechmea distichantha (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *glaziovii* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress, nom. illeg. = **Aechmea distichantha** Lem. var. **glaziovii** (Baker) L.B. Sm.
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Platyaechmea distichantha (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *schlumbergeri* (E. Morren ex Mez) L.B. Sm. & W.J. Kress, nom. illeg. = **Aechmea distichantha** Lem. var. **schlumbergeri** E. Morren ex Mez
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Pothuava comata Gaudich., nom. illeg. = **Aechmea lindenii** (E. Morren) Baker var. **lindenii**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Pothuava kleinii (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea kleinii** Reitz
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Pothuava nudicaulis (L.) Regel var. *cuspidata* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea nudicaulis** (L.) Griseb. var. **cuspidata** Baker
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Pothuava nudicaulis (L.) Regel var. *flavomarginata* (E. Pereira) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea nudicaulis** (L.) Griseb. var. **flavomarginata** E. Pereira
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Pothuava ornata (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea ornata** Baker var. **ornata**
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Pothuava ornata (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *hoehneana* (L.B. Sm.) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea ornata** Baker var. **hoehneana** L.B. Sm.
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Pothuava ornata (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *nationalis* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea ornata** Baker var. **nationalis** Reitz
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Pothuava pectinata (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress = **Aechmea pectinata** Baker
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Pothuava spicata Gaudich., nom. illeg. = **Aechmea nudicaulis** (L.) Griseb. var. **cuspidata** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Pourretia aëranthos Loisel. = **Tillandsia aëranthos** (Loisel.) L.B. Sm. var. **aëranthos**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Pourretia alpestris Poepp. = **Puya alpestris** (Poepp.) Gay
Referencias: Rossow, R. A., 1993b; Smith, L. B., 1974.

Pourretia argentea Wittm., nom. nud. = **Ochagavia carnea** (Beer) L.B. Sm. & Looser
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Pourretia caerulea Miers, nom. nud. = **Puya coerulea** Lindl. var. **coerulea**
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Pourretia coarctata Ruiz & Pav. = **Puya chilensis** Molina
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Pourretia frigida auct. non Linden = **Dyckia frigida** Hook. f.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Pourretia rubricaulis Miers = **Puya coerulea** Lindl. var. **violacea** (Brongn.) L.B. Sm. & Looser
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Pourretia violacea Linden = **Puya coerulea** Lindl. var. **violacea** (Brongn.) L.B. Sm. & Looser
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Prionophyllum maritimum (Baker) Mez = **Dyckia maritima** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Prionophyllum selloum K. Koch = **Dyckia selloa** (K. Koch) Baker
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Pseudananas Hassl. ex Harms

Número de especies: 1

Pseudananas macrodontes (E. Morren) Harms = **Pseudananas sagenarius** (Arruda) Camargo
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Pseudananas sagenarius (Arruda) Camargo
Sin.: *Ananas bracteatus* (Lindl.) Schult. f. var. *sagenarius* (Arruda) Bertoni, *Ananas macrodontes* E. Morren, *Ananas microcephalus* auct. non Baker, *Ananas sativus* Schult. f. var. *macrodontes* (E. Morren) Bertoni, *Ananas sativus* Schult. f. var. *sagenarius* (Arruda) Bertoni, *Bromelia sagenaria* Arruda, *Pseudananas macrodontes* (E. Morren) Harms
Referencias: Fredericksen, T. S., Wanderley, M. G. L., McDonald, E., Wright, K. & Montacedo, B., 1999; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Leal, F., Coppens d' Eeckenbrugge, G. & Holst, B. K., 1998; Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1955, 1969, 1979; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR); PRY(APY, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15290* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 7448* (MBM, US)]; PRY[*Jörgensen, P. 3960* (SI), *Soria, N. 1898* (FCQ)].

Puya Molina

Número de especies: 21, 17 endémicas

Puya alpestris (Poepp.) Gay
Sin.: *Pourretia alpestris* Poepp.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Ravenna, P. F., 2000i; Rossow, R. A., 1993b; Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(NEU, SJU); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9396* (SI), *Rossow, R. A. 4528* (BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996022* (CONC, SGO)].

Puya assurgens L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barry, R. 33* (GH)].

Puya berteroniana Mez
Sin.: *Pitcairnia alpestris* L.H. Bailey, nom. nud.
Referencias: Ravenna, P. F., 2000i; Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: CHL(V, VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Sparre, B. B. 3071* (S), *Werdermann, E. 563* (SI)].

Puya boliviensis Baker
Sin.: *Puya copiapina* Phil., *Puya wbytei* Hook. f.
Referencias: Ravenna, P. F., 2000i; Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5321* (GH, US)].

Puya castellanosii L.B. Sm.
Sin.: *Puya fiebrigii* auct. non Mez, p.p.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 2800–3000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (CTES)].

Puya chilensis Molina
Sin.: *Pitcairnia chilensis* Lodd. ex Loudon, nom. nud., *Pitcairnia coarctata* (Ruiz & Pav.) Pers., *Pourretia coarctata* Ruiz & Pav., *Puya chilensis* Molina var. *gigantea* (Phil.) Baker, *Puya coarctata* (Ruiz & Pav.) Fisch., *Puya gigantea* Phil., *Puya quillotana* W. Weber, *Puya suberosa* Molina
Referencias: Ravenna, P. F., 2000i; Smith, L. B., 1974.

Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Goodspeed, T. H. 16916* (SI), *West 3936* (GH)].

Puya chilensis Molina var. *gigantea* (Phil.) Baker = **Puya chilensis** Molina
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Puya coarctata (Ruiz & Pav.) Fisch. = **Puya chilensis** Molina
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Puya coerulea Lindl. var. **coerulea**
Sin.: *Pourretia caerulea* Miers, nom. nud.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. 859* (B), *Werdermann, E. 539* (SI)].

Puya coerulea Lindl. var. **intermedia** (L.B. Sm. & Looser) L.B. Sm. & Looser
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 400–700 m.
Países: CHL(V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 2015* (GH)].

Puya coerulea Lindl. var. **monteroana** (L.B. Sm. & Looser) L.B. Sm. & Looser
Sin.: *Puya violacea* (Brongn.) Mez var. *monteroana* L.B. Sm. & Looser
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.
Países: CHL(VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Montero 26* (GH)].

Puya coerulea Lindl. var. **violacea** (Brongn.) L.B. Sm. & Looser
Sin.: *Pitcairnia coerulea* (Lindl.) Benth. ex Baker, *Pitcairnia philippii* Baker, *Pitcairnia violacea* Brongn., *Pourretia rubricaulis* Miers, *Pourretia violacea* Linden, *Puya glabrata* Phil. ex Baker, nom. nud., *Puya rubricaulis* (Steud.) Miers, *Puya violacea* (Brongn.) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 400–1200 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 539* (B, GH)].

Puya copiapina Phil. = **Puya boliviensis** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Puya coquimbensis Mez = **Puya venusta** Phil.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Puya dyckioides (Baker) Mez
Sin.: *Pitcairnia dyckioides* Baker
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 1300–3400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Iudica, C. 125* (SI), *Venturi, S. 4073* (SI)].

[Puya fiebrigii Mez]
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Puya fiebrigii auct. non Mez, p.p. = **Puya castellanosii** L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Puya flava Willd. ex Baker, nom. nud. = **Deuterocohnia longipetala** (Baker) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Puya flora Speg. = **Puya weberiana** E. Morren ex Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Puya formosa Speg. = **Puya spathacea** (Griseb.) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Puya gaudichaudii Mez = **Puya venusta** Phil.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Puya gigantea Phil. = **Puya chilensis** Molina
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Puya gilmartiniae G.S. Varad. & A.R. Flores
Referencias: Ravenna, P. F., 2000i.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Varadarajan, G. S. 1481* (MO)].

Puya glabrata Phil. ex Baker, nom. nud. = **Puya coerulea** Lindl. var. **violacea** (Brongn.) L.B. Sm. & Looser
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Puya harmsii (A. Cast.) A. Cast.
Sin.: *Puya spathacea* (Griseb.) Mez var. *harmsii* A. Cast.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 5526* (BA)].

Puya hauthalii Mez = **Puya hofstenii** Mez
Referencias: Smith, A. C., 1940.

Puya hofstenii Mez
Sin.: *Puya hauthalii* Mez
Referencias: Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 3400–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. s.n.* (LIL)].

Puya lilloi A. Cast.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 1154* (SI)].

Puya micrantha Mez
Referencias: Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Smith, L. B., 1974.

Hierba. Perenne. Endémica. 1700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 10294* (CTES)].

Puya mirabilis (Mez) L.B. Sm.
Sin.: *Pitcairnia mirabilis* Mez, *Pitcairnia mirabilis* Mez var. *tucumana* A. Cast.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–2600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 1950b* (SI), *Vervoorst, F. B. 3401* (LIL)].

Puya pumila Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000i.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 3903* (BA, CONC, SGO)].

Puya quillotana W. Weber = **Puya chilensis** Molina

Puya rubricaulis (Steud.) Miers = **Puya coerulea** Lindl. var. **violacea** (Brongn.) L.B. Sm. & Looser
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Puya smithii A. Cast.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 2200–3100 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 6616* (BA, LIL)].

Puya spathacea (Griseb.) Mez
Sin.: *Pitcairnia spathacea* Griseb., *Puya formosa* Speg.
Referencias: Gómez, S. E., Slanis, A. & Grau, A., 2006; Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–2100 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1579* (SI)].

Puya spathacea (Griseb.) Mez var. *harmsii* A. Cast. = **Puya harmsii** (A. Cast.) A. Cast.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Puya suberosa Molina = **Puya chilensis** Molina
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Puya venusta Phil. ex Baker, nom. nud. = **Puya venusta** Phil.
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Puya venusta Phil.
Sin.: *Pitcairnia sphaerocephala* Baker, *Pitcairnia venusta* Baker, *Puya coquimbensis* Mez, *Puya gaudichaudii* Mez, *Puya venusta* Phil. ex Baker, nom. nud.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hicken, C. M. s.n.* (SI), *Philippi, R. A. 940* (B)].

Puya violacea (Brongn.) Mez = **Puya coerulea** Lindl. var. **violacea** (Brongn.) L.B. Sm. & Looser
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Puya violacea (Brongn.) Mez var. *monteroana* L.B. Sm. & Looser = **Puya coerulea** Lindl. var. **monteroana** (L.B. Sm. & Looser) L.B. Sm. & Looser
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Puya volcanensis Castillón
Referencias: Gómez, S. E., Slanis, A. & Grau, A., 2006; Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 7246* (LIL)].

Puya whytei Hook. f. = **Puya boliviensis** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Puya weberiana E. Morren ex Mez
Sin.: *Puya flora* Speg.
Referencias: Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 3800–4000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4546* (SI)].

Puya weberii Schlumb. = **Deuterocohnia longipetala** (Baker) Mez
Referencias: Castellanos, A., 1925a.

Puya yakespala A. Cast.
Referencias: Gómez, S. E., Slanis, A. & Grau, A., 2006; Smith, L. B., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 253* (LP)].

Quesnelia Gaudich.

Número de especies: 2, 1 endémica

Quesnelia arvensis (Vell.) Mez
Sin.: *Ananas arvensis* (Vell.) Steud., *Bromelia arvensis* Vell., *Quesnelia arvensis* (Vell.) Mez var. *sororocabae* (Lindm.) Mez, *Quesnelia rufa* Gaudich. var. *sororocabae* Lindm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Martinelli, G. 15031* (RB)].

Quesnelia arvensis (Vell.) Mez var. *sororocabae* (Lindm.) Mez = **Quesnelia arvensis** (Vell.) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1979.

[Quesnelia chacoensis Rojas Acosta]
Referencias: Smith, L. B., 1979.
Notas: Nombre dudoso.

Quesnelia imbricata L.B. Sm.
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1979.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica. 300–2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Foster 405* (GH, R, US)].

Quesnelia rufa Gaudich. var. *sororocabae* Lindm. = **Quesnelia arvensis** (Vell.) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Racinaea M.A. Spencer & L.B. Sm.

Número de especies: 2

Racinaea aeris-incola (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Sin.: *Catopsis maculata* E. Morren ex Baker, *Tillandsia aeris-incola* (Mez) Mez, *Vriesea aerisincola* Mez
Referencias: Reitz, R., 1965b; Smith, L. B., 1977; Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1993.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3947* (HBR, US)].

Racinaea spiculosa (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm. var. **ustulata** (Reitz) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Sin.: *Tillandsia spiculosa* Griseb. var. *ustulata* (Reitz) L.B. Sm., *Tillandsia triticea* Burch. ex Baker, *Tillandsia triticea* Burch. ex Baker var. *ustulata* Reitz, *Tillandsia viridis* Baker, *Vriesea viridis* E. Morren ex Baker, nom. nud.
Referencias: Reitz, R., 1965b; Smith, L. B., 1977; Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1993.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–2500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3462* (HBR)].

Regelia chlorosticta (Baker) Lindm. = **Neoregelia chlorosticta** (Baker) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Renealmia polystachya L. = **Tillandsia polystachia** (L.) L.

Renealmia recurvata L. = **Tillandsia recurvata** (L.) L.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Renealmia usneoides L. = **Tillandsia usneoides** (L.) L.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Rhodostachys albo-bracteata (Steud. ex Baker) Baker = **Fascicularia bicolor** (Ruiz & Pav.) Mez subsp. **canaliculata** E.C. Nelson & Zizka
Referencias: Zizka, G., Horres, R., Nelson, E. C. & Weising, K., 1999.

Rhodostachys andina Phil. = **Ochagavia andina** (Phil.) Zizka, Trumpler & Zoellner
Referencias: Zizka, G., Trumpler, K. & Zoellner, O., 2002.

Rhodostachys argentina Baker = **Bromelia serra** Griseb.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Rhodostachys bicolor (Ruiz & Pav.) Benth. ex Hook. f. ex Baker = **Fascicularia bicolor** (Ruiz & Pav.) Mez subsp. **bicolor**
Referencias: Zizka, G., Horres, R., Nelson, E. C. & Weising, K., 1999.

Rhodostachys carnea (Beer) Mez = **Ochagavia carnea** (Beer) L.B. Sm. & Looser
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Rhodostachys chamissonis Mez = **Ochagavia carnea** (Beer) L.B. Sm. & Looser
Referencias: Zizka, G., Trumpler, K. & Zoellner, O., 2002.

Rhodostachys elegans (Phil.) Mez = **Ochagavia elegans** Phil.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Rhodostachys grandiflora Phil. = **Ochagavia carnea** (Beer) L.B. Sm. & Looser
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Rhodostachys leiboldiana Mez = **Ochagavia leiboldiana** (Mez) L.B. Sm. & Looser
Referencias: Zizka, G., Trumpler, K. & Zoellner, O., 2002.

Rhodostachys litoralis Phil. = **Ochagavia litoralis** (Phil.) Zizka, Trumpler & Zoellner
Referencias: Zizka, G., Trumpler, K. & Zoellner, O., 2002.

Rhodostachys micrantha Phil. = **Fascicularia bicolor** (Ruiz & Pav.) Mez subsp. **bicolor**
Referencias: Zizka, G., Horres, R., Nelson, E. C. & Weising, K., 1999.

Rhodostachys pitcairniifolia (B. Verl.) Benth. = **Ochagavia litoralis** (Phil.) Zizka, Trumpler & Zoellner
Referencias: Zizka, G., Trumpler, K. & Zoellner, O., 2002.

Rhodostachys pitcairniifolia (B. Verl.) Benth. var. *kirchoffiana* Wittm. = **Fascicularia bicolor** (Ruiz & Pav.) Mez subsp. **canaliculata** E.C. Nelson & Zizka
Referencias: Zizka, G., Horres, R., Nelson, E. C. & Weising, K., 1999.

Rhodostachys urbaniana Mez = **Bromelia urbaniana** (Mez) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Ruckia ellemeti Regel = **Ochagavia carnea** (Beer) L.B. Sm. & Looser
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Tillandsia L.

Número de especies: 77, 35 endémicas

Tillandsia aëranthos Desf. ex Steud., nom. nud. = **Tillandsia aëranthos** (Loisel.) L.B. Sm. var. **aëranthos**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia aëranthos (Loisel.) L.B. Sm. var. **aemula** Strehl
Referencias: Strehl, T., 2000.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(RGS).

Ejemplares de referencia: BRA[*Strehl, T. s.n.* (HAS)].

Tillandsia aëranthos (Loisel.) L.B. Sm. var. **aëranthos**
Sin.: *Amalia aëris-incola* Schult. f., nom. nud., *Anoplophytum aëranthus* (Loisel.) Beer, *Anoplophytum dianthoideum* (G. Rossi) Beer, *Pourretia aëranthos* Loisel., *Tillandsia aëranthos* (Loisel.) L.B. Sm. var. *rosea* Strehl, *Tillandsia aëranthos* Desf. ex Steud., nom. nud., *Tillandsia bicolor* Brongn., *Tillandsia dianthoidea* G. Rossi, *Tillandsia microxiphion* Baker, *Tillandsia stricta* auct. non Sol. ex Sims, *Tillandsia unca* Griseb.
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1970, 1977; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Strehl, T., 2000; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(COA, PAI); URY(CAS, FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 18774* (CTES), *Venturi, S. 237* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 8412* (US)]; PRY[*Zardini, E. M. 13117* (MO)]; URY[*Herter, W. G. F. 628b* (SI), *Legrand, C. M. D. H. 1137* (MVM)].

Tillandsia aëranthos (Loisel.) L.B. Sm. var. *rosea* Strehl = **Tillandsia aëranthos** (Loisel.) L.B. Sm. var. **aëranthos**

Tillandsia aeris-incola (Mez) Mez = **Racinaea aeris-incola** (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1993.

Tillandsia afonsoana Strehl
Referencias: Strehl, T., 2000.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Strehl, T. 499* (HAS)].

Tillandsia aizoides Mez
Referencias: Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Morello, J., 1951; Smith, L. B., 1935, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (SI), *Morello, J. 1209* (SI)].

Tillandsia alberi Ehlers = **Tillandsia muhriae** W. Weber
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Palací, C. A. & Brown, G. K., 1993.

Tillandsia albertiana Verv.
Referencias: Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 800 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 7255* (LIL, US)].

Tillandsia amoena Lodd. = **Billbergia amoena** (Lodd.) Lindl. var. **amoena**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Tillandsia andicola Gillies ex Baker
Referencias: Castellanos, A., 1945d; Luther, H. E. & Sieff, E., 1997; Smith, L. B., 1970, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica.
Países: ARG(BAI, CAT, MEN, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Haene, E. 996* (SI), *Ruíz Leal, R. A. 4448* (BA, CTES)].

Tillandsia andicola auct. non Gillies ex Baker = **Tillandsia gilliesii** Baker subsp. **gilliesii**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia angulosa Mez
Referencias: Castellanos, A., 1945d; Smith, L. B., 1970, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–900 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 851* (BA, CORD)].

[Tillandsia araujei Mez]
Referencias: Winkler, S., 1982.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Tillandsia arequitae (André) André ex Mez
Sin.: *Tillandsia xiphioides* Ker Gawl. var. *arequitae* André
Referencias: Smith, L. B., 1935, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 100–300 m.
Países: URY(LAV).
Ejemplares de referencia: URY[*André, F. 320* (F, GH, K, NY)].

Tillandsia argentina C.H. Wright
Sin.: *Tillandsia unca* auct. non Griseb.
Referencias: Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Smith, L. B., 1970, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 400–1300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. 99* (SI)].

Tillandsia arhiza Mez
Sin.: *Tillandsia arhiza* Mez var. *rupestris* (Mez) Hassl., *Tillandsia rupestris* Mez, *Tillandsia rupestris* Mez var. *pendens* Chodat & Vischer
Referencias: Chodat, R. H. & Vischer, W., 1916; Smith, L. B., 1935, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 4747* (P), *Jörgensen, P. 4484* (SI)].

Tillandsia arhiza Mez var. *rupestris* (Mez) Hassl. = **Tillandsia arhiza** Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia astragaloides Mez = **Tillandsia tenuifolia** L. var. **tenuifolia**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia augusta Vell. = **Hohenbergia augusta** (Vell.) E. Morren
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Tillandsia australis Mez
Sin.: *Tillandsia maxima* Lillo & Hauman, hom. illeg., *Tillandsia rubra* auct. non Ruiz & Pav.
Referencias: Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Luther, H. E. & Sieff, E., 1997; Mabberley, D. J., 1984; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 700–3900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 26286* (SI), *Venturi, S. 784* (SI)].

Tillandsia autumnalis F. Muell. = **Tillandsia tenuifolia** L. var. **tenuifolia**
Referencias: Gouda, E. J., 1987; Smith, L. B., 1977.

Tillandsia bandensis Baker
Sin.: *Tillandsia bandensis* Baker var. *intermedia* Hassl., *Tillandsia recurvata* (L.) L. var. *majuscula* Mez
Referencias: Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(PHA); URY(COL, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2010* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 2778* (BM, G, GH)]; URY[*Schroeder, J. s.n.* (GH, MVM)].

Tillandsia bandensis Baker var. *intermedia* Hassl. = **Tillandsia bandensis** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia bella Strehl
Referencias: Strehl, T., 2000.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Strehl, T. 1097* (HAS)];

Tillandsia bergeri Mez
Sin.: *Tillandsia dianthoidea* G. Rossi var. *grisea* Guillaumin
Referencias: Castellanos, A., 1944; Smith, L. B., 1977; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 17115* (LP)]; BRA[*Winkler, S. 117* (ICN)].

Tillandsia berteroniana Schult. f. = **Catopsis berteroniana** (Schult. f.) Mez
Referencias: Gouda, E. J., 1987.

Tillandsia bicolor auct. non Brongn. = **Tillandsia tenuifolia** L. var. **tenuifolia**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia bicolor Brongn. = **Tillandsia aëranthos** (Loisel.) L.B. Sm. var. **aëranthos**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia brealitoensis L. Hrom.
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Till, W. & Hromadnik, L., 1984.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hromadnik, H. 7152b* (WU)].

Tillandsia bromeliifolia Rudge = **Aechmea bromeliifolia** (Rudge) Baker
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Smith, L. B., 1979.

Tillandsia bryoides Griseb. ex Baker
Sin.: *Tillandsia coarctata* Gillies ex Baker var. *pedicellata* Mez, *Tillandsia coarctata* Gillies ex Baker, nom. illeg., *Tillandsia pedicellata* (Mez) A. Cast.
Referencias: Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Smith, L. B., 1970, 1977; Till, W., 1989.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 800–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. 46* (SI), *Lutz, A. 33* (CTES), *Till, S. 5181* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 15008* (CTES)].

Tillandsia buchlohii Rauh
Referencias: Gross, E., 1998; Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: PRY[*Stellfeld, M. s.n.* (HEID)].

Tillandsia caespitosa Gillies ex Baker, nom. nud. = **Tillandsia retorta** Griseb. ex Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia caliginosa W. Till
Sin.: *Tillandsia crocata* (E. Morren) N.E. Br. f. *major* Rauh. nom. nud., *Tillandsia crocata* (E. Morren) N.E. Br. var. *tristis* Rauh, *Tillandsia myosura* auct. non Griseb. ex Baker
Referencias: Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Till, W. & Hromadnik, L., 1984.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 1900–3000 m.
Países: ARG(ERI, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26578* (SI), *Muhr, D. s.n.* (HEID)].

Tillandsia canescens Baker, nom. nud. = **Tillandsia ixioides** Griseb.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia capillaris Ruiz & Pav. f. **capillaris**
Sin.: *Diaphoranthema capillaris* (Ruiz & Pav.) Beer, *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. f. *typica* L.B. Sm., nom. inval., *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. var. *lanuginosa* Mez, *Tillandsia lanuginosa* Gillies ex Baker, nom. nud.
Referencias: Smith, L. B., 1935, 1977; Zizka, G. & Muñoz-Schick, M., 1993.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–3600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II, III, IV, V); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 1970* (SI)]; CHL[*Sparre, B. B. 2704* (S)]; URY[*Marchesi, E. 1240* (L)].

Tillandsia capillaris Ruiz & Pav. f. **cordobensis** (Hieron.) L.B. Sm.
Sin.: *Tillandsia cordobensis* Hieron., *Tillandsia recurvata* auct. non (L.) L.
Referencias: Smith, L. B., 1970, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 900–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC); CHL(IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 6353* (SI)]; CHL[*Jiles, C. 1868pp* (US)].

Tillandsia capillaris Ruiz & Pav. f. **hieronymi** (Mez) L.B. Sm.
Sin.: *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez, *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez f. *percordobensis* (Mez) A. Cast., *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez f. *perusneoides* (Mez) A. Cast., *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez var. *percordobensis* Mez, *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez var. *perusneoides* Mez, *Tillandsia hieronymi* Mez, *Tillandsia propinqua* auct. non Gay
Referencias: Smith, L. B., 1970, 1977; Till, W., 1989.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–3600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1581* (SI)].

Tillandsia capillaris Ruiz & Pav. f. **incana** (Mez) L.B. Sm.
Sin.: *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. var. *incana* Mez, *Tillandsia incana* Gillies ex Baker, nom. nud., *Tillandsia permutata* A. Cast., *Tillandsia propinqua* Gay var. *saxicola* Hieron.
Referencias: Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 700–4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MEN, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA), *Venturi, S. 1917* (SI)].

Tillandsia capillaris Ruiz & Pav. f. *typica* L.B. Sm., nom. inval. = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **capillaris**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia capillaris Ruiz & Pav. f. **virescens** (Ruiz & Pav.) L.B. Sm.
Sin.: *Diaphoranthema virescens* (Ruiz & Pav.) Beer, *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez var. *sanzinii* Hicken, *Tillandsia hieronymi* Mez var. *lichenoides* (Hieron.) A. Cast., *Tillandsia lichenoides* Hieron., *Tillandsia propinqua* Gay, *Tillandsia pusilla* Gillies ex Baker, *Tillandsia stolpi* Phil., *Tillandsia virescens* Ruiz & Pav., *Tillandsia virescens* Ruiz & Pav. var. *sanzinii* (Hicken) A. Cast., *Tillandsia williamsii* Rusby
Referencias: Smith, L. B., 1935, 1969, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–4000 m.
Países: ARG(BAI, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, TUC); CHL(I, IV, V, VI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 5376* (SI)]; CHL[*Gay, C. 285* (P)].

Tillandsia capillaris Ruiz & Pav. var. *incana* Mez = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **incana** (Mez) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia capillaris Ruiz & Pav. var. *lanuginosa* Mez = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **capillaris**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia carinata (Wawra) Baker = **Vriesea carinata** Wawra
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia carinata auct. non (Wawra) Baker = **Vriesea erythrodactylon** (E. Morren) E. Morren ex Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia castellanii L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1970, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA), *Krapovickas, A. 47378* (CTES), *Till, S. 5196* (SI)].

Tillandsia chilensis Baker = **Tillandsia paleacea** C. Presl
Referencias: Zizka, G. & Muñoz-Schick, M., 1993.

Tillandsia chlorantha Speg. = **Deuterocohnia brevifolia** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1992.

Tillandsia circinalis Griseb. = **Tillandsia duratii** Vis. var. **duratii**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia citrina Burch. ex Baker = **Nidularium billbergioides** (Schult. f.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Tillandsia coarctata Gillies ex Baker, nom. illeg. = **Tillandsia bryoides** Griseb. ex Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia coarctata Gillies ex Baker var. *pedicellata* Mez = **Tillandsia bryoides** Griseb. ex Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia confusa Hassl. = **Tillandsia duratii** Vis. var. **saxatilis** (Hassl.) L.B. Sm.
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Tillandsia confusa Hassl. var. *minor* Hassl. = **Tillandsia duratii** Vis. var. **saxatilis** (Hassl.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia confusa Hassl. var. *saxatilis* Hassl. = **Tillandsia duratii** Vis. var. **saxatilis** (Hassl.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia corcovadensis Britten = **Vriesea corcovadensis** (Britten) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia cordobensis Hieron. = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **cordobensis** (Hieron.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia crassifolia Baker = **Tillandsia didisticha** (E. Morren) Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia crocata (E. Morren) N.E. Br.
Sin.: *Phytarrhiza crocata* E. Morren, *Tillandsia mandonii* E. Morren ex Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(ERI); BRA(PAR, RGS); URY(SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pereira 8273* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 9796* (HB, MBM, US)]; URY[*Osten, C. 3055* (MVM)].

Tillandsia crocata (E. Morren) N.E. Br. f. *major* Rauh, nom. nud. = **Tillandsia caliginosa** W. Till
Referencias: Till, W. & Hromadnik, L., 1984.

Tillandsia crocata (E. Morren) N.E. Br. var. *tristis* Rauh = **Tillandsia caliginosa** W. Till
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Till, W. & Hromadnik, L., 1984.

Tillandsia cyathiformis Vell. = **Wittrockia cyathiformis** (Vell.) Leme
Referencias: Tardivo, R. C. & Cervi, A. C., 1997b.

Tillandsia decomposita Baker = **Tillandsia duratii** Vis. var. **saxatilis** (Hassl.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia dependens Hieron. ex Mez = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **hieronymi** (Mez) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia dependens Hieron. ex Mez f. *percordobensis* (Mez) A. Cast. = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **hieronymi** (Mez) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia dependens Hieron. ex Mez f. *perusneoides* (Mez) A. Cast. = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **hieronymi** (Mez) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia dependens Hieron. ex Mez var. *percordobensis* Mez = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **hieronymi** (Mez) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia dependens Hieron. ex Mez var. *perusneoides* Mez = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **hieronymi** (Mez) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia dependens Hieron. ex Mez var. *sanzinii* Hicken = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **virescens** (Ruiz & Pav.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia diaguitensis A. Cast.
Referencias: Castellanos, A., 1938, 1944; Smith, L. B., 1970, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 7224* (BA), *Daguerre, J. B. s.n.* (CTES)]; PRY[*Rojas, T. 7512* (BA)].

Tillandsia dianthoidea G. Rossi = **Tillandsia aëranthos** (Loisel.) L.B. Sm. var. **aëranthos**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia dianthoidea G. Rossi var. *grisea* Guillaumin = **Tillandsia bergeri** Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia didisticha (E. Morren) Baker
Sin.: *Anoplophytum didistichum* E. Morren, *Tillandsia crassifolia* Baker, *Tillandsia disticha* auct. non Kunth, *Tillandsia oranensis* Baker, *Tillandsia purpurea* Griseb., hom. illeg., *Tillandsia vernicosa* A. Cast., hom. illeg.
Referencias: Smith, L. B., 1969, 1977; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, SAL, TUC); PRY(APY, CON, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 4466* (LP), *Venturi, S. 1201* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 13127* (MO)].

Tillandsia distachia Vell. = **Billbergia distachia** (Vell.) Mez var. **distachia**
Referencias: Smith, L. B., 1979.

Tillandsia disticha auct. non Kunth = **Tillandsia didisticha** (E. Morren) Baker
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996.

Tillandsia dorotheae Rauh
Referencias: Gross, E., 1998; Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Rauh, W., 1987.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–900 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Muhr, D. s.n.* (HEID)].

Tillandsia drepanocarpa Baker = **Vriesea drepanocarpa** (Baker) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia drepanophylla Baker = **Tillandsia vernicosa** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia dura Baker
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 7994* (HBR, R, US)].

Tillandsia duratii Vis. var. *confusa* (Hassl.) L.B. Sm. = **Tillandsia duratii** Vis. var. **saxatilis** (Hassl.) L.B. Sm.

Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Tillandsia duratii Vis. var. **duratii**
Sin.: *Tillandsia circinalis* Griseb.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Smith, L. B., 1969, 1970, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY); URY(ART, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 23625* (SI), *Lourteig, A. 1216* (MU, SI), *Venturi, S. 1910* (SI)]; PRY[*Burkart, A. 23625* (SI), *Mereles, F. 6306* (CTES, FCQ)]; URY[*Burkart, A. 23625* (SI), *Lombardo, A. 2912* (GH)].

Tillandsia duratii Vis. var. **saxatilis** (Hassl.) L.B. Sm.
Sin.: *Tillandsia confusa* Hassl., *Tillandsia confusa* Hassl. var. *minor* Hassl., *Tillandsia confusa* Hassl. var. *saxatilis* Hassl., *Tillandsia confusa* Hassl. var. *saxitilis* Hassl., *Tillandsia decomposita* Baker, *Tillandsia duratii* Vis. var. *confusa* (Hassl.) L.B. Sm., *Tillandsia tomentosa* N.E. Br., *Tillandsia weddellii* Baker
Referencias: Smith, L. B., 1970, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 200–3000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE); BRA(RGS); PRY(APY, AMA, CEN, COA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2801* (SI)]; BRA[*Winkler, S. 207* (ICN)]; PRY[*Hassler, E. 3416* (BM, G, K, P)].

Tillandsia ensiformis Vell. = **Vriesea ensiformis** (Vell.) Beer var. **ensiformis**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia erecta Gillies ex Baker
Sin.: *Tillandsia rigida* Gillies ex Baker, nom. illeg.
Referencias: Smith, L. B., 1935, 1970, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 1300–2700 m.
Países: ARG(LRI, MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 4465* (CTES)].

Tillandsia erectifolia Baker = **Vriesea procera** (Mart. ex Schult. f.) Wittm. var. **procera**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia esseriana Rauh & L.B. Sm.
Referencias: Rauh, W. & Smith, L. B., 1971.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 100–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rauh, W. 14853-es* (US)].

Tillandsia euosma Speg. = **Tillandsia reichenbachii** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

[Tillandsia festucoides Brongn. ex Mez]
Referencias: Smith, L. B., 1977.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Tillandsia friesii Mez
Referencias: Smith, L. B., 1935, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA), *Fries, R. E. 828* (S)].

Tillandsia friesii auct. non Mez = **Tillandsia xiphioides** Ker Gawl. var. **tafiensis** L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia funebris A. Cast.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Smith, L. B., 1969, 1970, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–900 m.
Países: ARG(CAT, FOR, SAL, TUC); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. s.n.* (CTES)]; PRY[*Degen, R. 3152* (FCQ)].

Tillandsia gardneri Lindl.
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reiche, C. F. 465* (GH, HBR, US)].

Tillandsia geissei Phil.
Referencias: Smith, L. B., 1977; Zizka, G. & Muñoz-Schick, M., 1993.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 200–600 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Geisse, G. s.n.* (SGO)].

Tillandsia geminiflora Brongn.
Referencias: Gouda, E. J., 1987; Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1955, 1970, 1977; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, GUA); URY(LAV, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 850* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 1448* (SI)]; PRY[*Lourteig, A. 1976* (P)]; URY[*Schroeder, J. 16358* (MVM)].

[Tillandsia geminiflora Brongn. var. incana (Wawra) Mez]
Sin.: *Tillandsia incana* Wawra
Referencias: Smith, L. B., 1977.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Tillandsia genseri Rauh
Referencias: Gross, E., 1998; Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Rauh, W., 1988.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 1500–1800 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Genser, J. s.n.* (HEID)].

Tillandsia gigantea (Gaudich.) Griseb. = **Vriesea gigantea** Gaudich.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia gilliesii Baker subsp. **gilliesii**
Sin.: *Tillandsia andicola* auct. non Gillies ex Baker, *Tillandsia myosura* Griseb. ex Baker var. *saxicola* A. Cast., nom. nud.

Referencias: Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Smith, L. B., 1969, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 1800–2800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (CTES), *Jörgensen, P. 1772* (SI)].

Tillandsia gilliesii Baker subsp. **polysticha** W. Till & L. Hrom.
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Till, W. & Hromadnik, L., 1984.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 7340* (LIL)].

Tillandsia glutinosa Mart. ex Schult. f. = **Vriesea neoglutinosa** Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia guasamayensis Palací & Gilmartin = **Tillandsia muhriae** W. Weber
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Palací, C. A. & Brown, G. K., 1993.

Tillandsia guelzii Rauh
Referencias: Gross, E., 1998; Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Rauh, W., 1988.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Muhr, D. s.n.* (HEID)].

Tillandsia guttata (Linden & André) Baker = **Vriesea guttata** Linden & André var. **guttata**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia herzogii Wittm. = **Tillandsia reichenbachii** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia hieroglyphica (Carrière) Baker = **Vriesea hieroglyphica** (Carrière) E. Morren
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia hieronymi Mez = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **hieronymi** (Mez) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia hieronymi Mez var. *lichenoides* (Hieron.) A. Cast. = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **virescens** (Ruiz & Pav.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia hirta W. Till & L. Hrom.
Referencias: Till, W. & Hromadnik, L., 1984.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 9155* (LIL)].

[Tillandsia humilis C. Presl]
Referencias: Smith, L. B., 1977.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Tillandsia incana Gillies ex Baker, nom. nud. = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **incana** (Mez) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia incana Wawra = **Tillandsia geminiflora** Brongn. var. **incana** (Wawra) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia incurvata (Gaudich.) Baker = **Vriesea incurvata** Gaudich.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia inflata (Wawra) Baker = **Vriesea inflata** (Wawra) Wawra
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia itaubensis Strehl
Referencias: Strehl, T., 2000.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rocha, M. 1172* (HAS)].

Tillandsia ixioides Griseb.
Sin.: *Anoplophytum luteum* E. Morren ex Baker, nom. nud., *Tillandsia canescens* Baker, nom. nud., *Tillandsia ixioides* Griseb. var. *occidentalis* A. Cast., *Tillandsia lutea* Baker
Referencias: Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Smith, L. B., 1977; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–2200 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC); BRA(RGS); PRY(APY, PAI); URY(COL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. s.n.* (CTES), *Venturi, S. 334* (SI)]; PRY[*Christie s.n.* (K)]; URY[*Gibert, J. E. s.n.* (MVM)].

Tillandsia ixioides Griseb. var. *occidentalis* A. Cast. = **Tillandsia ixioides** Griseb.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia jonesii Strehl
Referencias: Strehl, T., 2000.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Strehl, T. 1302* (HAS)].

Tillandsia jonghei K. Koch = **Vriesea jonghei** (K. Koch) E. Morren

Tillandsia jucunda A. Cast.
Referencias: Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Smith, L. B., 1970, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 600–900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. s.n.* (CTES), *Venturi, S. 1000* (SI)].

Tillandsia landbeckii Phil.
Referencias: Rundel, P. W., Palma, B., Dillon, M. O., Sharifi, M. R., Nilsen, E. T. & Boonpragob, K., 1997; Smith, L. B., 1935, 1977; Zizka, G. & Muñoz-Schick, M., 1993.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–1500 m.
Países: CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Landbeck s.n.* (G, GH, SGO, US)].

Tillandsia lanuginosa Gillies ex Baker, nom. nud. = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **capillaris**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia leonamiana E. Pereira
Sin.: *Tillandsia meridionalis* Baker var. *subsecundifolia* W. Weber & Ehlers
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Weber, W., 1983.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 1000–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Thieken s.n.* (HAL, WU)].

Tillandsia lichenoides Hieron. = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **virescens** (Ruiz & Pav.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia linearis Vell.
Sin.: *Anoplophytum lineare* (Vell.) Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7397* (BM, S, US)].

Tillandsia loliacea Mart. ex Schult. f.
Sin.: *Tillandsia undulata* Baker
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Smith, L. B., 1969, 1970, 1977; Till, W., 1989.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR); PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, MIE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 3396* (SI)]; BRA[*Fabro 24* (MBM)]; PRY[*Mereles, F. 5753* (FCQ)].

Tillandsia longicaulis Baker = **Vriesea longicaulis** (Baker) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia lorentziana Griseb.
Sin.: *Tillandsia lorentziana* Griseb. f. *simplex* Kuntze, *Tillandsia lorentzii* André
Referencias: Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1969, 1970, 1977; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 100–3300 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, CON, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 5130* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 14452* (HBR, R, US)]; PRY[*Rojas, T. 2070* (SI)].

Tillandsia lorentziana Griseb. f. *simplex* Kuntze = **Tillandsia lorentziana** Griseb.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia lorentzii André = **Tillandsia lorentziana** Griseb.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia lubbersii Baker = **Vriesea lubbersii** (Baker) E. Morren ex Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia lutea Baker = **Tillandsia ixioides** Griseb.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia macrocnemis Griseb. = **Tillandsia xiphioides** Ker Gawl. var. **xiphioides**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia mallemontii Glaz. ex Mez
Sin.: *Phytarrhiza uniflora* E. Morren ex Baker, nom. nud.
Referencias: Rambo, B., 1967; Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1935, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4413* (HBR)].

Tillandsia mandonii E. Morren ex Mez = **Tillandsia crocata** (E. Morren) N.E. Br.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia marconae W. Till & Vitek
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1997; Zizka, G. & Muñoz-Schick, M., 1993.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 600–800 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*González, I. s.n.* (SGO)].

Tillandsia maxima Lillo & Hauman, hom. illeg. = **Tillandsia australis** Mez
Referencias: Mabberley, D. J., 1984.

Tillandsia maxoniana L.B. Sm. = **Vriesea maxoniana** (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia meridionalis Baker
Sin.: *Tillandsia pulchella* Mez, hom. illeg., *Tillandsia stricta* Mez, hom. illeg., *Tillandsia stricta* Sol. ex Sims var. *paraguariensis* Hassl.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Smith, L. B., 1970, 1972a, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(RGS); PRY(APY, AMA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Descole, H. R. 3022* (LIL), *Jörgensen, P. 2802* (SI)]; BRA[*Teodoro 231* (R, US)]; PRY[*Jörgensen, P. 3966* (SI), *Mereles, F. 5609* (FCQ)]; URY[*Dematteis, M. 1403* (CTES)].

Tillandsia meridionalis Baker var. *subsecundifolia* W. Weber & Ehlers = **Tillandsia leonamiana** E. Pereira
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.

Tillandsia microxiphion Baker = **Tillandsia aëranthos** (Loisel.) L.B. Sm. var. **aëranthos**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia monostachys Gillies ex Baker, nom. nud. = **Tillandsia recurvata** (L.) L.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia montana Reitz
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 700–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5910* (HBR, US)].

Tillandsia muhriae W. Weber
Sin.: *Tillandsia alberi* Ehlers, *Tillandsia guasamayensis* Palací & Gilmartin
Referencias: Gross, E., 1998; Hromadnik, L., 1989; Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Luther, H. E. & Sieff, E., 1997; Till, W., 1990; Weber, W., 1986.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 2600–3400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 7702* (LP), *Muhr, D. s.n.* (HEID)].

Tillandsia muhrii Rauh, hom. illeg. = **Tillandsia zecheri** W. Till var. **cafayatensis** Palací & G.K. Br.
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1997; Palací, C. A. & Brown, G. K., 1994.

Tillandsia myosura auct. non Griseb. ex Baker = **Tillandsia caliginosa** W. Till
Referencias: Till, W. & Hromadnik, L., 1984.

Tillandsia myosura Griseb. ex Baker
Sin.: *Tillandsia nappi* Lorentz & Niederl.
Referencias: Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 700–2600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 1703* (SI), *Castellanos, A. 105* (SI)]; URY[*André, F. 326* (GH)].

Tillandsia myosura Griseb. ex Baker var. *saxicola* A. Cast., nom. nud. = **Tillandsia gilliesii** Baker subsp. **gilliesii**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia nappi Lorentz & Niederl. = **Tillandsia myosura** Griseb. ex Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia nappi Lorentz & Niederl. var. *darwinii* Lorentz & Niederl. = **Tillandsia retorta** Griseb. ex Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia odorata Gillies ex Baker, nom. illeg. = **Tillandsia xiphioides** Ker Gawl. var. **xiphioides**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia oranensis Baker = **Tillandsia didisticha** (E. Morren) Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia pabstiana E. Pereira = **Vriesea drepanocarpa** (Baker) Mez
Referencias: Reitz, R., 1983.

[Tillandsia paleacea C. Presl]
Sin.: *Tillandsia chilensis* Baker
Referencias: Zizka, G. & Muñoz-Schick, M., 1993.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Tillandsia pedicellata (Mez) A. Cast. = **Tillandsia bryoides** Griseb. ex Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia peiranoi A. Cast. var. **alba** Rutschm. ex Rauh
Referencias: Gross, E., 1998; Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Rauh, W., 1986.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 800–900 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rutschmann, J. 85/1* (HEID)].

Tillandsia peiranoi A. Cast. var. **peiranoi**
Referencias: Smith, L. B., 1970, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 13077* (LP)].

Tillandsia permutata A. Cast. = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **incana** (Mez) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia pfeufferi Rauh
Referencias: Gross, E., 1998; Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Rauh, W., 1988.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 1000–1800 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Muhr, D. s.n.* (HEID)].

Tillandsia philippocoburgii (Wawra) Baker = **Vriesea philippocoburgii** Wawra
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia platynema (Gaudich.) Griseb. = **Vriesea platynema** Gaudich. var. **platynema**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

[Tillandsia platystachya Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d; Rojas Acosta, N., 1897.
Notas: Nombre dudoso.

Tillandsia platzmannii (E. Morren) Baker = **Vriesea platzmannii** E. Morren
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia pohliana Mez
Referencias: Smith, L. B., 1969, 1970, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 700–1500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL); BRA(PAR); PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, GUA, ITA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 5622* (GH, US)]; BRA[*Carneiro, J. 371* (MBM)]; PRY[*Jörgensen, P. 4482* (SI), *Schwartz 11370* (LIL)].

Tillandsia polystachia (L.) L.
Sin.: *Renealmia polystachya* L.
Referencias: Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18095* (MBM, US)].

Tillandsia polytrichoides E. Morren = **Tillandsia tricholepis** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977; Till, W., 1989.

Tillandsia porongoensis L. Hrom. & P. Schneid.
Referencias: Hromadnik, L. & Schneider, P., 1988; Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hromadnik, H. 7321a* (WU)].

Tillandsia procera Mart. ex Schult. f. = **Vriesea procera** (Mart. ex Schult. f.) Wittm. var. **procera**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia propinqua auct. non Gay = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **hieronymi** (Mez) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia propinqua Gay = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **virescens** (Ruiz & Pav.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia propinqua Gay var. *rectangula* (Baker) Griseb. = **Tillandsia rectangula** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia propinqua Gay var. *saxicola* Hieron. = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **incana** (Mez) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia pseudomontana W. Weber & Ehlers
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Weber, W., 1983.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Thieken s.n.* (HAL, WU)].

Tillandsia pulchella Hook. = **Tillandsia tenuifolia** L. var. **tenuifolia**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia pulchella Mez, hom. illeg. = **Tillandsia meridionalis** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia pulchella Hook. var. *disticha* L.B. Sm. = **Tillandsia tenuifolia** L. var. **disticha** (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia pulchella Hook. var. *rosea* Mez, p.p. = **Tillandsia tenuifolia** L. var. **tenuifolia**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia pulchella Hook. var. *surinamensis* Mez = **Tillandsia tenuifolia** L. var. **tenuifolia**
Referencias: Gouda, E. J., 1987.

Tillandsia pulchella Hook. var. *vaginata* (Wawra) A. Cast. = **Tillandsia tenuifolia** L. var. **vaginata** (Wawra) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia pulchra Hook. var. *vaginata* Wawra = **Tillandsia tenuifolia** L. var. **vaginata** (Wawra) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia purpurea Griseb., hom. illeg. = **Tillandsia didisticha** (E. Morren) Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia pusilla Gillies ex Baker = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **virescens** (Ruiz & Pav.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia ramellae W. Till & S. Till
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1997; Till, W. & Till, S., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 600–700 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Ramella, L. 2879* (CTES, FCQ, G, MO, WU)].

Tillandsia rectangula Baker
Sin.: *Tillandsia propinqua* Gay var. *rectangula* (Baker) Griseb.
Referencias: Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Smith, L. B., 1935, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 1702* (SI), *Hieronymus, G. H. E. W. 483* (SI)].

Tillandsia recurvata auct. non (L.) L. = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **cordobensis** (Hieron.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia recurvata (L.) L.
Sin.: *Diaphoranthema recurvata* (L.) Beer, *Renealmia recurvata* L., *Tillandsia monostachys* Gillies ex Baker, nom. nud., *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *argentea*

André, *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *brevifolia* André, *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *caespitosa* André, *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *contorta* André, *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *elongata* André, *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *genuina* André, nom. inval., *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *major* André, *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *minor* André, *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *minuta* (Mez) A. Cast., *Tillandsia recurvata* (L.) L. var. *ciliata* E. Morren ex Mez, *Tillandsia recurvata* (L.) L. var. *minuta* Mez

Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Rambo, B., 1967; Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1969, 1977; Winkler, S., 1982.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–3000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CON, GUA, MIE, PAI, PHA); URY(ART, CLA, MON, SOR).

Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 3395* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 14394* (HBR, US)]; PRY[*Jörgensen, P. 3964* (SI)]; URY[*Felippone, F. 5816* (SI)].

Tillandsia recurvata (L.) L. f. *argentea* André = **Tillandsia recurvata** (L.) L.

Referencias: Reitz, R., 1983.

Tillandsia recurvata (L.) L. f. *brevifolia* André = **Tillandsia recurvata** (L.) L.

Referencias: Reitz, R., 1983.

Tillandsia recurvata (L.) L. f. *caespitosa* André = **Tillandsia recurvata** (L.) L.

Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia recurvata (L.) L. f. *contorta* André = **Tillandsia recurvata** (L.) L.

Referencias: Reitz, R., 1983.

Tillandsia recurvata (L.) L. f. *elongata* André = **Tillandsia recurvata** (L.) L.

Referencias: Reitz, R., 1983.

Tillandsia recurvata (L.) L. f. *genuina* André, nom. inval. = **Tillandsia recurvata** (L.) L.

Referencias: Reitz, R., 1983.

Tillandsia recurvata (L.) L. f. *major* André = **Tillandsia recurvata** (L.) L.

Referencias: Reitz, R., 1983.

Tillandsia recurvata (L.) L. f. *minor* André = **Tillandsia recurvata** (L.) L.

Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia recurvata (L.) L. f. *minuta* (Mez) A. Cast. = **Tillandsia recurvata** (L.) L.

Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia recurvata (L.) L. var. *ciliata* E. Morren ex Mez = **Tillandsia recurvata** (L.) L.

Referencias: Reitz, R., 1983.

Tillandsia recurvata (L.) L. var. *majuscula* Mez = **Tillandsia bandensis** Baker

Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia recurvata (L.) L. var. *minuta* Mez = **Tillandsia recurvata** (L.) L.

Referencias: Reitz, R., 1983.

Tillandsia reichenbachii Baker

Sin.: *Tillandsia euosma* Speg., *Tillandsia herzogii* Wittm., *Tillandsia tucumanensis* Mez

Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Smith, L. B., 1970, 1977.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 200–2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC); PRY(APY, PHA).

Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 7759* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5741* (FCQ)].

Tillandsia reticulata Baker = **Vriesea gigantea** Gaudich.

Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia retorta Griseb. ex Baker

Sin.: *Tillandsia caespitosa* Gillies ex Baker, nom. nud., *Tillandsia nappi* Lorentz & Niederl. var. *darwinii* Lorentz & Niederl.

Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1997; Smith, L. B., 1935, 1970, 1977.

Hierba epífita. Perenne. Endémica. 600–1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 1371* (SI)].

Tillandsia rigida Gillies ex Baker, nom. illeg. = **Tillandsia erecta** Gillies ex Baker

Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia rodigasiana (E. Morren) Baker = **Vriesea rodigasiana** E. Morren

Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia rohdenardini Strehl

Referencias: Strehl, T., 2004a.

Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–600 m.

Países: BRA(RGS).

Ejemplares de referencia: BRA[*Rohde, G. s.n.* (HAS)].

Tillandsia rubra auct. non Ruiz & Pav. = **Tillandsia australis** Mez

Referencias: Mabberley, D. J., 1984.

Tillandsia rupestris Mez = **Tillandsia arhiza** Mez

Referencias: Chodat, R. H. & Vischer, W., 1916; Smith, L. B., 1977.

Tillandsia rupestris Mez var. *pendens* Chodat & Vischer = **Tillandsia arhiza** Mez

Referencias: Chodat, R. H. & Vischer, W., 1916; Smith, L. B., 1977.

Tillandsia scalaris (E. Morren) Baker = **Vriesea scalaris** E. Morren

Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia schreiteri Lillo & A. Cast. = **Tillandsia sphaerocephala** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia seideliana E. Pereira
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Pereira, E., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 200–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Seidel, A. 789* (HB, K, MBM)].

Tillandsia selloana Baker = **Vriesea ensiformis** (Vell.) Beer var. **ensiformis**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia sericea E. Morren, nom. nud. = **Tillandsia xiphioides** Ker Gawl. var. **xiphioides**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia sessiliflora Ruiz & Pav. = **Catopsis sessiliflora** (Ruiz & Pav.) Mez
Referencias: Gouda, E. J., 1987; Smith, L. B., 1977.

Tillandsia sphaerocephala Baker
Sin.: *Tillandsia schreiteri* Lillo & A. Cast.
Referencias: Smith, L. B., 1969, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 900–3500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 1218* (SI)].

Tillandsia spiculosa Griseb. var. *ustulata* (Reitz) L.B. Sm. = **Racinaea spiculosa** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm. var. **ustulata** (Reitz) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1992.

Tillandsia stolpi Phil. = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **virescens** (Ruiz & Pav.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia streptocarpa Baker
Sin.: *Tillandsia streptocarpa* Baker var. *filifolia* Hassl., *Tillandsia streptocarpa* Baker var. *pungens* Chodat & Vischer
Referencias: Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Smith, L. B., 1969, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–2300 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6472* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 17542* (HBR, US)]; PRY[*Hassler, E. 1673* (K, P), *Rojas 2068* (SI)].

Tillandsia streptocarpa Baker var. *filifolia* Hassl. = **Tillandsia streptocarpa** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia streptocarpa Baker var. *pungens* Chodat & Vischer = **Tillandsia streptocarpa** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia stricta auct. non Sol. ex Sims = **Tillandsia aëranthos** (Loisel.) L.B. Sm. var. **aëranthos**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia stricta Mez, hom. illeg. = **Tillandsia meridionalis** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia stricta Sol. ex Sims var. **disticha** L.B. Sm.
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Foster 411a* (GH)].

Tillandsia stricta Sol. ex Sims var. *paraguariensis* Hassl. = **Tillandsia meridionalis** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia stricta Sol. ex Sims var. **stricta**
Referencias: Gouda, E. J., 1987; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rambo, B., 1967; Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1955, 1970, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(COS, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, GUA, PAI); URY(TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14399* (SI)]; BRA[*Lourteig, A. 2385* (HBR, P, SI)]; PRY[*Schinini, A. 3sa* (US)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. s.n.* (BA)].

Tillandsia suaveolens Lem. = **Tillandsia xiphioides** Ker Gawl. var. **xiphioides**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia tenebra L. Hrom. & W. Till
Referencias: Hromadnik, L. & Till, W., 1991; Luther, H. E. & Sieff, E., 1994, 1997.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 300–1100 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hromadnik, H. 72575* (WU)].

[Tillandsia tenuifolia L. var. disticha (L.B. Sm.) L.B. Sm.]
Sin.: *Tillandsia pulchella* Hook. var. *disticha* L.B. Sm.
Referencias: Pingitore, E., 1975; Smith, L. B., 1977.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Tillandsia tenuifolia L. var. *surinamensis* (Mez) L.B. Sm. = **Tillandsia tenuifolia** L. var. **tenuifolia**
Referencias: Gouda, E. J., 1987.

Tillandsia tenuifolia L. var. **tenuifolia**
Sin.: *Tillandsia astragaloides* Mez, *Tillandsia autumnalis* F. Muell., *Tillandsia bicolor* auct. non Brongn., *Tillandsia pulchella* Hook., *Tillandsia pulchella* Hook. var. *rosea* Mez, p.p., *Tillandsia pulchella* Hook. var. *surinamensis* Mez, *Tillandsia tenuifolia* L. var. *surinamensis* (Mez) L.B. Sm.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Gouda, E. J., 1987; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1970, 1977; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Stutz, L. C., 1983; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–2500 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, CAA, CAN, GUA, MIE, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1390* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 8576* (HBR, US), *Sehnem, A. 2094* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 3963* (SI), *Zardini, E. M. 9958* (MO)].

Tillandsia tenuifolia L. var. **vaginata** (Wawra) L.B. Sm.
Sin.: *Tillandsia pulchella* Hook. var. *vaginata* (Wawra) A. Cast., *Tillandsia pulchra* Hook. var. *vaginata* Wawra
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CEN, CON, GUA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7112* (S)]; PRY[*Lourteig, A. 1998* (P)].

Tillandsia tessellata Linden = **Vriesea gigantea** Gaudich.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia tomentosa N.E. Br. = **Tillandsia duratii** Vis. var. **saxatilis** (Hassl.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia toropiensis Rauh
Referencias: Gross, E., 1998; Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 100–300 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rauh, W. 56059* (HEID)].

Tillandsia tragophoba M.O. Dillon
Referencias: Dillon, M. O., 1991; Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Zizka, G. & Muñoz-Schick, M., 1993.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 200–500 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Dillon, M. O. 5869* (F, SGO, US)].

Tillandsia tricholepis Baker
Sin.: *Tillandsia polytrichoides* E. Morren, *Tillandsia tricholepis* Baker var. *argentea* Hassl.
Referencias: Rambo, B., 1967; Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1969, 1970, 1977; Till, W., 1989; Winkler, S., 1982; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1917* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15827* (MBM)]; PRY[*Balansa, B. 617* (BM, GH, S, US)].

Tillandsia tricholepis Baker var. *argentea* Hassl. = **Tillandsia tricholepis** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia triticea Burch. ex Baker = **Racinaea spiculosa** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm. var. **ustulata** (Reitz) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1992.

Tillandsia triticea Burch. ex Baker var. *ustulata* Reitz = **Racinaea spiculosa** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm. var. **ustulata** (Reitz) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1993.

Tillandsia tuberosa Vell. = **Dyckia tuberosa** (Vell.) Beer
Referencias: Smith, L. B., 1974.

Tillandsia tucumanensis Mez = **Tillandsia reichenbachii** Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia tweedieana Baker = **Vriesea rodigasiana** E. Morren
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia unca auct. non Griseb. = **Tillandsia argentina** C.H. Wright
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia unca Griseb. = **Tillandsia aëranthos** (Loisel.) L.B. Sm. var. **aëranthos**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia unca Hicken, hom. illeg. = **Tillandsia xiphioides** Ker Gawl. var. **xiphioides**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia undulata Baker = **Tillandsia loliacea** Mart. ex Schult. f.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia unilateralis Baker = **Vriesea unilateralis** (Baker) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia usneoides (L.) L.
Sin.: *Renealmia usneoides* L., *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *cretacea* Mez, *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *crispa* André, *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *ferruginea* André, *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *filiformis* André, *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *genuina* André, nom. inval., *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *longissima* André, *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *major* André, *Tillandsia usneoides* (L.) L. var. *cretacea* (Mez) Mez, *Tillandsia usneoides* (L.) L. var. *ferruginea* (André) Mez, *Tillandsia usneoides* (L.) L. var. *longissima* (André) Mez, *Tillandsia usneoides* (L.) L. var. *robusta* (Mez) Mez
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Gouda, E. J., 1987; Rambo, B., 1967; Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1969, 1970, 1977; Winkler, S., 1982; Zizka, G. & Muñoz-Schick, M., 1993.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–3300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IV, V, VIII, IX, X); PRY(CAU, CAA, CON, GUA, ITA, PHA); URY(ART, FLA, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 858* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 17673* (BM, GH, S, US)]; CHL[*Behn, F. s.n.* (SI), *Bertero, C. L. G. 1359* (GH)]; PRY[*Jörgensen, P. 4483* (SI), *Morong, T. 886* (BM, F, MO, NY, US)]; URY[*Herter, W. G. F. 1350* (SI), *Osten, C. 3287* (MVM)].

Tillandsia usneoides (L.) L. f. *cretacea* Mez = **Tillandsia usneoides** (L.) L.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia usneoides (L.) L. f. *crispa* André = **Tillandsia usneoides** (L.) L.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia usneoides (L.) L. f. *ferruginea* André = **Tillandsia usneoides** (L.) L.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia usneoides (L.) L. f. *filiformis* André = **Tillandsia usneoides** (L.) L.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia usneoides (L.) L. f. *genuina* André, nom. inval. = **Tillandsia usneoides** (L.) L.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia usneoides (L.) L. f. *longissima* André = **Tillandsia usneoides** (L.) L.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia usneoides (L.) L. f. *major* André = **Tillandsia usneoides** (L.) L.
Referencias: Reitz, R., 1983.

Tillandsia usneoides (L.) L. var. *cretacea* (Mez) Mez = **Tillandsia usneoides** (L.) L.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia usneoides (L.) L. var. *ferruginea* (André) Mez = **Tillandsia usneoides** (L.) L.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia usneoides (L.) L. var. *longissima* (André) Mez = **Tillandsia usneoides** (L.) L.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia usneoides (L.) L. var. *robusta* (Mez) Mez = **Tillandsia usneoides** (L.) L.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia ventricosa Wawra, hom. illeg. = **Vriesea corcovadensis** (Britten) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia vernicosa A. Cast., hom. illeg. = **Tillandsia didisticha** (E. Morren) Baker
Referencias: Castellanos, A., 1945d.

Tillandsia vernicosa Baker
Sin.: *Tillandsia drepanophylla* Baker
Referencias: Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R., 1999; Smith, L. B., 1969, 1970, 1977; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL); PRY(APY, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2004* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 5644* (BA, GH)].

Tillandsia virescens Ruiz & Pav. = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **virescens** (Ruiz & Pav.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia virescens Ruiz & Pav. var. *sanzinii* (Hicken) A. Cast. = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **virescens** (Ruiz & Pav.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia viridis Baker = **Racinaea spiculosa** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm. var. **ustulata** (Reitz) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia weddellii Baker = **Tillandsia duratii** Vis. var. **saxatilis** (Hassl.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia williamsii Rusby = **Tillandsia capillaris** Ruiz & Pav. f. **virescens** (Ruiz & Pav.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Tillandsia winkleri Strehl
Referencias: Strehl, T., 2000.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. C. 1863* (HAS)].

Tillandsia xiphioides Ker Gawl. var. *arequitae* André = **Tillandsia arequitae** (André) André ex Mez

Tillandsia xiphioides Ker Gawl. var. **minor** L. Hrom.
Referencias: Hromadnik, L., 1989; Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hromadnik, H. 7315* (WU)].

Tillandsia xiphioides Ker Gawl. var. **tafiensis** L.B. Sm.
Sin.: *Tillandsia friesii* auct. non Mez
Referencias: Hromadnik, L., 1989; Smith, L. B., 1970, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 7176* (GH, LIL, NY, US)].

Tillandsia xiphioides Ker Gawl. var. **xiphioides**
Sin.: *Anoplophytum xyphyoides* Beer, nom. nud., *Phytarrhiza xiphioides* (Ker Gawl.) E. Morren, nom. nud., *Tillandsia macrocnemis* Griseb., *Tillandsia odorata* Gillies ex Baker, nom. illeg., *Tillandsia sericea* E. Morren, nom. nud., *Tillandsia suaveolens* Lem., *Tillandsia unca* Hicken, hom. illeg.
Referencias: Reitz, R., 1965b; Smith, L. B., 1969, 1970, 1977; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 700–2600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); URY(SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 1252* (SI)]; BRA[*Schulz, A. R. 767* (US)]; URY[*Chebataroff, J. s.n.* (MVM)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (L. B. Smith, 1977).

Tillandsia zecheri W. Till f. **brealitoensis** Palací & G.K. Br.
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1997; Palací, C. A. & Brown, G. K., 1994.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1800 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Palací, C. A. 1172* (MCNS)].

Tillandsia zecheri W. Till var. **cafayatensis** Palací & G.K. Br.
Sin.: *Tillandsia muhrii* Rauh, hom. illeg.
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1997; Palací, C. A. & Brown, G. K., 1994.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Palací, C. A. 534* (MCNS)].

Tillandsia zecheri W. Till var. **zecheri**
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994; Palací, C. A. & Brown, G. K., 1994; Till, W., 1983.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1200 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Palací, C. A. 1141* (MCNS)].

Vriesea Lindl., nom. cons.

Número de especies: 40, 9 endémicas

Vriesea aerisincola Mez = **Racinaea aeris-incola** (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Spencer, M. A. & Smith, L. B., 1993.

Vriesea altodaserrae L.B. Sm.
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3591* (HBR, US)].

Vriesea argentinensis Speg. = **Vriesea friburgensis** Mez var. **tucumanensis** (Mez) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

[Vriesea atra Mez]
Referencias: Reitz, R., 1983.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Vriesea biguassuensis Reitz
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Bianual. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4134a* (HBR)].

Vriesea brusquensis Reitz
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3624 p.p.* (HBR)].

Vriesea carinata auct. non Wawra = **Vriesea erythrodactylon** (E. Morren) E. Morren ex Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea carinata Wawra
Sin.: *Tillandsia carinata* (Wawra) Baker, *Vriesea psittacina* (Hook.) Lindl. var. *carinata* (Wawra) E. Morren
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15221* (S, US)].

Vriesea carinata Wawra var. *inflata* Wawra = **Vriesea inflata** (Wawra) Wawra
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea catharinensis F. Muell. = **Vriesea procera** (Mart. ex Schult. f.) Wittm. var. **procera**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea corallina Regel var. *striata* Wittm. = **Vriesea platynema** Gaudich. var. **striata** (Wittm.) Wittm. ex Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea corcovadensis (Britten) Mez
Sin.: *Tillandsia corcovadensis* Britten, *Tillandsia ventricosa* Wawra, hom. illeg., *Vriesea rubida* E. Morren ex Baker, nom. nud., *Vriesea rubida* E. Morren ex Mez, *Vriesea ventricosa* (Wawra) Mez, nom. illeg.
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 200–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 9366* (HBR, US)].

Vriesea declinata Leme
Referencias: Leme, E. M. C., 1989; Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 400 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Seidel, A. 1094* (HB)];

Vriesea drepanocarpa (Baker) Mez
Sin.: *Tillandsia drepanocarpa* Baker, *Tillandsia pabstiana* E. Pereira, *Vriesea dusenii* L.B. Sm.
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3703* (HBR)].

Vriesea dusenii L.B. Sm. = **Vriesea drepanocarpa** (Baker) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea duvaliana auct. non E. Morren = **Vriesea erythrodactylon** (E. Morren) E. Morren ex Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea eltoniana E. Pereira & Ivo
Referencias: Pereira, E. & Neto, J. L. M., 1981.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Carneiro, J. 525* (MBM)].

Vriesea ensiformis (Vell.) Beer var. **ensiformis**
Sin.: *Tillandsia ensiformis* Vell., *Tillandsia selloana* Baker
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 5760* (R, RB, US)].

Vriesea ensiformis (Vell.) Beer var. **striata** A. Seidel
Referencias: Reitz, R., 1965b; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Seidel, A. s.n.* (US)].

[Vriesea ensiformis (Vell.) Beer var. warmingii (E. Morren) L.B. Sm.]
Referencias: Smith, L. B., 1977.
Notas: Nombre dudoso.

Vriesea erythrodactylon (E. Morren) E. Morren ex Mez
Sin.: *Tillandsia carinata* auct. non (Wawra) Baker, *Vriesea carinata* auct. non Wawra, *Vriesea duvaliana* auct. non E. Morren, *Vriesea psittacina* (Hook.) Lindl. var. *erythrodactylon* E. Morren
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2070* (HBR, US)].

Vriesea flammea L.B. Sm.
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 17486* (GH, S, SP), *Sehnem, A. 3069* (SI)].

Vriesea flava A.F. Costa, H. Luther & Wand.
Referencias: Costa, A. F., Luther, H. E. & Wanderley, M. G. L., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 700–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 11145* (HB, HBR, MBM, UPCB)].

[Vriesea foetida Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d; Rojas Acosta, N., 1897.
Notas: Nombre dudoso.

Vriesea friburgensis Mez var. **friburgensis**
Referencias: Smith, L. B., 1977; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS); PRY(CAU, CAA, GUA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1857* (US)]; PRY[*Zardini, E. M. 23748* (AS, MO)].

Vriesea friburgensis Mez var. **paludosa** (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Sin.: *Vriesea paludosa* L.B. Sm.
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Foster 459* (GH, R)].

Vriesea friburgensis Mez var. **tucumanensis** (Mez) L.B. Sm.
Sin.: *Vriesea argentinensis* Speg., *Vriesea glutinosa* Lindl. var. *viridis* Hassl., *Vriesea tucumanensis* Mez
Referencias: Meyer, T., 1963; Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1955, 1977.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 700–900 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CEN, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1200* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 14877* (HBR, US)]; PRY[*Jörgensen, P. 4489* (SI)].

Vriesea gamba F. Muell. = **Vriesea jonghei** (K. Koch) E. Morren

Vriesea gigantea Gaudich.
Sin.: *Tillandsia gigantea* (Gaudich.) Griseb., *Tillandsia reticulata* Baker, *Tillandsia tessellata* Linden, *Vriesea mosenii* Mez, *Vriesea reticulata* (Baker) Mez, *Vriesea tessellata* (Linden) E. Morren
Referencias: Rambo, B., 1967; Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 43563* (CTES)].

Vriesea glutinosa Wawra, hom. illeg. = **Vriesea neoglutinosa** Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea glutinosa Lindl. var. *viridis* Hassl. = **Vriesea friburgensis** Mez var. **tucumanensis** (Mez) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea guttata Linden & André var. **eguttata** Reitz
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6037* (HBR)].

Vriesea guttata Linden & André var. **guttata**
Sin.: *Tillandsia guttata* (Linden & André) Baker
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–1700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reiche, C. F. 316* (GH, HBR)].

Vriesea guttata Linden & André var. **striata** Reitz
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Seidel, A. s.n.* (HBR)].

Vriesea hieroglyphica (Carrière) E. Morren
Sin.: *Massangea hieroglyphica* Carrière, *Tillandsia hieroglyphica* (Carrière) Baker
Referencias: Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.

Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. s.n.* (S)].

Vriesea hoehneana L.B. Sm.
Referencias: Reitz, R., 1983.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 900–1300 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6135* (HBR)].

Vriesea icterica A. Cast. = **Vriesea maxoniana** (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea incurvata Gaudich.
Sin.: *Tillandsia incurvata* (Gaudich.) Baker, *Vriesea inflata* auct. non (Wawra) Wawra, *Vriesea psittacina* (Hook.) Lindl. var. *truffautina* André, *Vriesea rostrum-aquillae* Mez
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 23357* (MBM)].

Vriesea incurvata Gaudich. var. *inflata* (Wawra) Mez = **Vriesea inflata** (Wawra) Wawra
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea inflata auct. non (Wawra) Wawra = **Vriesea incurvata** Gaudich.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea inflata (Wawra) Wawra
Sin.: *Tillandsia inflata* (Wawra) Baker, *Vriesea carinata* Wawra var. *inflata* Wawra, *Vriesea incurvata* Gaudich. var. *inflata* (Wawra) Mez
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. s.n.* (S)].

Vriesea jonghei (K. Koch) E. Morren
Sin.: *Tillandsia jonghei* K. Koch, *Vriesea gamba* F. Muell.
Hierba epífita. Bianual. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 9789* (HBR, US)].

Vriesea longicaulis (Baker) Mez
Sin.: *Tillandsia longicaulis* Baker, *Vriesea longicaulis* (Baker) Mez var. *secunda* Mez
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 700–1900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4185* (HBR)].

Vriesea longicaulis (Baker) Mez var. *secunda* Mez = **Vriesea longicaulis** (Baker) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea lubbersii (Baker) E. Morren ex Mez
Sin.: *Tillandsia lubbersii* Baker
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4280* (HBR)].

Vriesea maxoniana (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Sin.: *Tillandsia maxoniana* L.B. Sm., *Vriesea icterica* A. Cast.
Referencias: Smith, L. B., 1969, 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 900–1500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Palací, C. A. 752* (LP)].

Vriesea morreniana E. Morren
Referencias: Reitz, R., 1983.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4271* (HBR)].

Vriesea mosenii Mez = **Vriesea gigantea** Gaudich.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea muelleri Mez
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 300–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. C. s.n.* (RB)].

[Vriesea neoglutinosa Mez]
Sin.: *Tillandsia glutinosa* Mart. ex Schult. f., *Vriesea glutinosa* Wawra, hom. illeg.
Referencias: Smith, L. B., 1977.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Vriesea paludosa L.B. Sm. = **Vriesea friburgensis** Mez var. **paludosa** (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea paratiensis E. Pereira
Referencias: Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Bianual. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. M. 1881* (MBM)].

Vriesea pauperrima E. Pereira
Referencias: Pereira, E., 1972.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Carneiro, J. 365* (MBM)].

Vriesea philippocoburgii Wawra
Sin.: *Tillandsia philippocoburgii* (Wawra) Baker
Referencias: Rambo, B., 1967; Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 36701* (SI), *Reitz, P. R. 1019* (HBR, S)].

Vriesea philippocoburgii Wawra var. *vagans* L.B. Sm. = **Vriesea vagans** (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea pinottii Reitz
Referencias: Luther, H. E., 2004; Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4023* (HBR, US)].

Vriesea platynema Gaudich. var. **flava** Reitz
Referencias: Luther, H. E., 2004; Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4665* (HBR)].

Vriesea platynema Gaudich. var. **platynema**
Sin.: *Tillandsia platynema* (Gaudich.) Griseb.
Referencias: Castellanos, A., 1925a, 1945d; Gouda, E. J., 1987; Rambo, B., 1967; Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–1400 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1550* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 3629* (SI)].

Vriesea platynema Gaudich. var. **striata** (Wittm.) Wittm. ex Mez
Sin.: *Vriesea corallina* Regel var. *striata* Wittm.
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 400–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 7877* (HBR)].

Vriesea platynema Gaudich. var. **variegata** (Guillon) Reitz
Sin.: *Encholirion roseum* Antoine var. *variegatum* Guillon
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5765* (HBR)].

Vriesea platzmannii E. Morren
Sin.: *Tillandsia platzmannii* (E. Morren) Baker
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1997; Luther, H. E., 2004; Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 5744* (RB)].

[Vriesea poenulata (Baker) E. Morren ex Mez]
Referencias: Reitz, R., 1983.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Vriesea procera (Mart. ex Schult. f.) Wittm. var. **debilis** Mez
Referencias: Luther, H. E., 2004; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 5725* (R, US)].

Vriesea procera (Mart. ex Schult. f.) Wittm. var. *gracilis* (Gaudich.) Mez = **Vriesea procera** (Mart. ex Schult. f.) Wittm. var. **procera**
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea procera (Mart. ex Schult. f.) Wittm. var. **procera**
Sin.: *Tillandsia erectifolia* Baker, *Tillandsia procera* Mart. ex Schult. f., *Vriesea catharinensis* F. Muell., *Vriesea procera* (Mart. ex Schult. f.) Wittm. var. *gracilis* (Gaudich.) Mez
Referencias: Gouda, E. J., 1987; Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(sin localidad); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 811* (GH)]; BRA[*Reitz, P. R. 3520* (HBR, US)]; PRY[*Albov, N. M. s.n.* (NY)].
Notas: Citada para Argentina sin indicar localidad precisa (L. B. Smith, 1977).

Vriesea psittacina (Hook.) Lindl. var. *carinata* (Wawra) E. Morren = **Vriesea carinata** Wawra
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea psittacina (Hook.) Lindl. var. **decolor** Wawra
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(RGS, SCA); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Palacios 661* (LIL)]; PRY[*Jörgensen, P. 4776* (SI), *Rojas, T. 5182* (GH)].

Vriesea psittacina (Hook.) Lindl. var. *erythrodactylon* E. Morren = **Vriesea erythrodactylon** (E. Morren) E. Morren ex Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea psittacina (Hook.) Lindl. var. *truffautina* André = **Vriesea incurvata** Gaudich.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea rastrensis Leme
Referencias: Leme, E. M. C., 1989; Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1400 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Seidel, A. 1088* (HB, RB)].

Vriesea reitzii Leme & A.F. Costa
Referencias: Luther, H. E. & Sieff, E., 1994.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 58218* (MBM)].

Vriesea reticulata (Baker) Mez = **Vriesea gigantea** Gaudich.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea rodigasiana E. Morren
Sin.: *Tillandsia rodigasiana* (E. Morren) Baker, *Tillandsia tweedieana* Baker, *Vriesea tweedieana* (Baker) F. Muell., *Vriesea vitellina* F. Muell.
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 539* (GH, HBR)].

Vriesea rostrum-aquillae Mez = **Vriesea incurvata** Gaudich.
Referencias: Reitz, R., 1983.

Vriesea rubida E. Morren ex Baker, nom. nud. = **Vriesea corcovadensis** (Britten) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea rubida E. Morren ex Mez = **Vriesea corcovadensis** (Britten) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

[Vriesea saundersii (Carrière) E. Morren ex Mez]
Sin.: *Encholirion saundersii* Carrière
Referencias: Reitz, R., 1983.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Vriesea scalaris E. Morren
Sin.: *Tillandsia scalaris* (E. Morren) Baker
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 5770* (US)].

[Vriesea sceptrum Mez]
Referencias: Reitz, R., 1983.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Vriesea tessellata (Linden) E. Morren = **Vriesea gigantea** Gaudich.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea triangularis Reitz
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4279* (HBR)].

Vriesea tucumanensis Mez = **Vriesea friburgensis** Mez var. **tucumanensis** (Mez) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea tweedieana (Baker) F. Muell. = **Vriesea rodigasiana** E. Morren
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea unilateralis (Baker) Mez
Sin.: *Tillandsia unilateralis* Baker
Referencias: Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 6294* (US)].

Vriesea vagans (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Sin.: *Vriesea philippocoburgii* Wawra var. *vagans* L.B. Sm.
Referencias: Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1977; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1592* (HBR, US)].

Vriesea ventricosa (Wawra) Mez, nom. illeg. = **Vriesea corcovadensis** (Britten) Mez
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea viridis E. Morren ex Baker, nom. nud. = **Racinaea spiculosa** (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm. var. **ustulata** (Reitz) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Vriesea vitellina F. Muell. = **Vriesea rodigasiana** E. Morren
Referencias: Smith, L. B., 1977.

Wittrockia Lindm.

Número de especies: 2

Wittrockia amazonica (Baker) L.B. Sm. = **Nidularium amazonicum** (Baker) Linden & E. Morren ex Lindm.
Referencias: Leme, E. M. C., 2000.

Wittrockia campos-portoi L.B. Sm. = **Nidularium campos-portoi** (L.B. Sm.) Wand. & B.A. Moreira
Referencias: Wanderley, M. G. L. & Moreira, B. A., 2000.

Wittrockia cyathiformis (Vell.) Leme
Sin.: *Canistrum cyathiforme* (Vell.) Mez, *Canistrum regnellii* Mez, p.p., *Canistrum schwackeanum* Mez, *Hohenbergia cyathiformis* (Vell.) Beer, *Mosenia sicarius* Lindm., *Tillandsia cyathiformis* Vell.
Referencias: Leme, E. M. C., 1997; Luther, H. E., 2004; Reitz, R., 1983; Smith, L. B., 1979; Tardivo, R. C. & Cervi, A. C., 1997b.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–1900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24110* (MBM)].

Wittrockia smithii Reitz = **Nidularium amazonicum** (Baker) Linden & E. Morren ex Lindm.
Referencias: Leme, E. M. C., 2000.

Wittrockia superba Lindm.
Sin.: *Canistrum cruentum* F. Muell., *Canistrum superbum* (Lindm.) Mez, *Nidularium superbum* (Lindm.) Ule
Referencias: Leme, E. M. C., 1997; Luther, H. E., 2004; Reitz, R., 1965b, 1983; Smith, L. B., 1979; Winkler, S., 1982.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 493* (GH, HBR, US)].

BURMANNIACEAE

6 géneros, 9 especies.

Anonymos capitatus Walter, nom. nud. = **Burmannia capitata** (Walter ex J.F. Gmel.) Mart.

Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.

Apteria Nutt.

Número de especies: 1

Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small
Sin.: *Apteria gentianoides* Jonker, *Apteria lilacina* (Miers) Miers, *Lobelia aphylla* Nutt.
Referencias: Maas, P. J. M. & Maas, H., 1989, 1994; Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986; Molfino, J. F., 1922b; Schinini, A., 1975.
Saprófita. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Molfino, J. F. s.n.* (BA, BAF)]; BRA[*Reitz, P. R. 5373* (HBR)]; PRY[*Rojas, T. 10128* (BM, G, K, NY, P, S, UC)].

Apteria gentianoides Jonker = **Apteria aphylla** (Nutt.) Barnhart ex Small
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.

Apteria lilacina (Miers) Miers = **Apteria aphylla** (Nutt.) Barnhart ex Small
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.

Apteria orobanchoides Hook. = **Dictyostega orobanchoides** (Hook.) Miers subsp. **orobanchoides**
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.

Burmannia L.

Número de especies: 4

Burmannia alba Mart.
Sin.: *Burmannia sellowiana* Seub. var. *albiflora* Seub., *Burmannia sellowiana* Seub. var. *violacea* Seub., *Tripterella alba* (Mart.) Schult. & Schult. f.
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 469* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 5326* (CAS, G, GH, NY, P, S, U)].

Burmannia australis Malme
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.
Hierba. Anual. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(RGS, SCA); PRY(APA, CAU, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Malme, G. O. A. 424* (BM, C, R, S, U)]; PRY[*Hassler, E. 5654* (BM, G, NY, P, UC)].

Burmannia capitata (Walter ex J.F. Gmel.) Mart.
Sin.: *Anonymos capitatus* Walter, nom. nud., *Tripterella capitata* (Walter ex J.F. Gmel.) Michx., *Vogelia capitata* Walter ex J.F. Gmel.
Referencias: Maas, P. J. M. & Maas, H., 1989, 1994; Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986; Schinini, A., 1975.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, CAU, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 8456* (CTES, HB, MO)]; BRA[*Hatschbach, G. 8035* (HB, HBR, LIL, RB)]; PRY[*Marín, G. 275* (CTES, PY)].

Burmannia flava Mart.
Sin.: *Burmannia flava* Mart. var. *macroptera* Jonker, *Tripterella flava* (Mart.) Schult. & Schult. f.
Referencias: Maas, P. J. M. & Maas, H., 1989, 1994; Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986; Schinini, A., 1975.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(SCA); PRY(CON, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Molfino, J. F. s.n.* (BA)]; BRA[*Reitz, P. R. 5876* (HBR)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5263* (BM, E, G, GH)].

Burmannia flava Mart. var. *macroptera* Jonker = **Burmannia flava** Mart.
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.

Burmannia sellowiana Seub. var. *albiflora* Seub. = **Burmannia alba** Mart.
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.

Burmannia sellowiana Seub. var. *violacea* Seub. = **Burmannia alba** Mart.
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.

Cymbocarpa Miers

Número de especies: 1

Cymbocarpa refracta Miers
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.
Saprófita. Perenne. Nativa. 100–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 2408* (HBR)].

Dictyostega Miers

Número de especies: 1

Dictyostega orobanchoides (Hook.) Miers var. *parviflora* (Benth.) Jonker = **Dictyostega orobanchoides** (Hook.) Miers subsp. **parviflora** (Benth.) Snelders & Maas
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.

Dictyostega orobanchoides (Hook.) Miers subsp. **orobanchoides**
Sin.: *Apteria orobanchoides* Hook., *Dictyostega schomburgkii* Miers

Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.
Saprófita. Perenne. Nativa. 900–2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 2406* (HBR, NY, UC, US)].

Dictyostega orobanchoides (Hook.) Miers subsp. **parviflora** (Benth.) Snelders & Maas
Sin.: *Dictyostega orobanchoides* (Hook.) Miers var. *parviflora* (Benth.) Jonker, *Dictyostega schomburgkii* Miers var. *parviflora* Benth.
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.
Saprófita. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 9599* (HBR)].

Dictyostega schomburgkii Miers = **Dictyostega orobanchoides** (Hook.) Miers subsp. **orobanchoides**
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.

Dictyostega schomburgkii Miers var. *parviflora* Benth. = **Dictyostega orobanchoides** (Hook.) Miers subsp. **parviflora** (Benth.) Snelders & Maas
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.

Dictyostega umbellata Miers = **Miersiella umbellata** (Miers) Urb.
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.

Gymnosiphon Blume

Número de especies: 1

Gymnosiphon divaricatus (Benth.) Benth. & Hook.
Sin.: *Ptychomeria divaricata* Benth.
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.
Saprófita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14160* (US)].

Lobelia aphylla Nutt. = **Apteria aphylla** (Nutt.) Barnhart ex Small
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.

Miersiella Urb.

Número de especies: 1

Miersiella umbellata (Miers) Urb.
Sin.: *Dictyostega umbellata* Miers
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.
Saprófita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 9601* (HBR)].

Ptychomeria divaricata Benth. = **Gymnosiphon divaricatus** (Benth.) Benth. & Hook.
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.

Tripterella alba (Mart.) Schult. & Schult. f. = **Burmannia alba** Mart.
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.

Tripterella capitata (Walter ex J.F. Gmel.) Michx. = **Burmannia capitata** (Walter ex J.F. Gmel.) Mart.
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.

Tripterella flava (Mart.) Schult. & Schult. f. = **Burmannia flava** Mart.
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986; Schinini, A., 1975.

Vogelia capitata Walter ex J.F. Gmel. = **Burmannia capitata** (Walter ex J.F. Gmel.) Mart.
Referencias: Maas, P. J. M., Maas, H., Benthem, J. van, Snelders, H. C. & Rübsamen, T., 1986.

CANNACEAE

Autor: Maas, P. J. M.

1 género, 9 especies,1 especie endémica, 2 especies introducidas.

Canna L.

Número de especies: 9, 1 endémica, 2 introducidas

Canna achiras Gillies = **Canna indica** L.

Canna amabilis T. Koyama & Nb. Tanaka = **Canna glauca** L.

Canna amambayensis Kraenzl. = **Canna paniculata** Ruiz & Pav.
Referencias: Maas, P. J. M. & Maas, H., 1988.

Canna brasiliensis Link = **Canna indica** L.

Canna coccinea Mill.
Referencias: Tanaka, N., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS); URY(ART, RNO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 3174* (CTES, K)]; URY[*Berro, M. B. 3012* (MVFA)].

Canna compacta Roscoe
Referencias: Tanaka, N., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pire, S. M. 107* (CTES, K)].

Canna confusa J.W. Richardson & L.B. Sm., nom. illeg. = **Canna paniculata** Ruiz & Pav.
Referencias: Maas, P. J. M. & Maas, H., 1988.

Canna denudata Roscoe = **Canna paniculata** Ruiz & Pav.
Referencias: Maas, P. J. M. & Maas, H., 1988.

Canna edulis Ker Gawl. = **Canna indica** L.
Referencias: Maas, P. J. M. & Maas, H., 1988.

Canna esculenta Lodd., nom. nud. = **Canna indica** L.
Referencias: Maas, P. J. M. & Maas, H., 1988.

Canna flaccida Salisb.
Referencias: Richardson, J. W. & Smith, L. B., 1972.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 2806* (HBR, US)].

Canna glauca L.
Sin.: *Canna amabilis* T. Koyama & Nb. Tanaka, *Canna glauca* L. var. *angusta* J.W. Richardson, *Canna glauca* L. var. *rubro-lutea* Hook., *Canna hassleriana* Kraenzl., *Canna jacobiniflora* T. Koyama & Nb. Tanaka, *Canna stenantha* Nb. Tanaka
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fabris, H. A., 1969[1968]c; Novara, L. J., 1995a; Richardson, J. W. & Smith, L. B., 1972; Tanaka, N., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN, MIE, PAI, PHA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Renvoize, S. A. 3692* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 4463* (SI)]; PRY[*Woolston, A. L. 1034* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 355* (F, G, GH, LE, M, MO, NY, S, SI, U, UC, US)].

Canna glauca L. var. *angusta* J.W. Richardson = **Canna glauca** L.
Referencias: Tanaka, N., 2001.

Canna glauca L. var. *rubro-lutea* Hook. = **Canna glauca** L.
Referencias: Tanaka, N., 2001.

Canna hassleriana Kraenzl. = **Canna glauca** L.
Referencias: Maas, P. J. M. & Maas, H., 1988.

Canna indica Ruiz & Pav., nom. illeg. = **Canna indica** L.

Canna indica L.
Sin.: *Canna achiras* Gillies, *Canna brasiliensis* Link, *Canna edulis* Ker Gawl., *Canna esculenta* Lodd., nom. nud., *Canna indica* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Canna lanuginosa* Roscoe, *Canna limbata* Roscoe, *Canna rubricaulis* Link, *Canna variegatifolia* Ciciarelli, *Canna warszewiczii* A. Dietr.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Maas, P. J. M. & Maas, H., 1988; Novara, L. J., 1995a, 2001; Richardson, J. W. & Smith, L. B., 1972; Stutz, L. C., 1983.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, PAI, PHA, SPE); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3811* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 12497* (SI)]; PRY[*Woolston, A. L. 403* (SI)]; URY[*Burkart, A. 21538* (SI)].

Canna jacobiniflora T. Koyama & Nb. Tanaka = **Canna glauca** L.

Canna jacquinii Bouché = **Canna paniculata** Ruiz & Pav.
Referencias: Novara, L. J., 2001.

Canna kunzei (Bouché) Kraenzl. = **Canna paniculata** Ruiz & Pav.
Referencias: Novara, L. J., 2001.

Canna lanuginosa Roscoe = **Canna indica** L.
Referencias: Maas, P. J. M. & Maas, H., 1988.

Canna limbata Roscoe = **Canna indica** L.
Referencias: Maas, P. J. M. & Maas, H., 1988.

Canna linkii Bouché = **Canna paniculata** Ruiz & Pav.
Referencias: Novara, L. J., 2001.

Canna ottonis (Bouché) Kraenzl. = **Canna paniculata** Ruiz & Pav.
Referencias: Maas, P. J. M. & Maas, H., 1988.

Canna paniculata Ruiz & Pav.
Sin.: *Canna amambayensis* Kraenzl., *Canna confusa* J.W. Richardson & L.B. Sm., nom. illeg., *Canna denudata* Roscoe, *Canna jacquinii* Bouché, *Canna kunzei* (Bouché) Kraenzl., *Canna linkii* Bouché, *Canna ottonis* (Bouché) Kraenzl., *Distemon ottonis* Bouché
Referencias: Maas, P. J. M. & Maas, H., 1988; Tanaka, N., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Molfino, J. F. s.n.* (BA)]; BRA[*Reitz, P. R. 13516* (L)]; PRY[*Zardini, E. M. 46100* (AS, MO)].

Canna pedunculata Sims
Referencias: Tanaka, N., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 1384* (HBG, US)].

Canna plurituberosa T. Koyama & Nb. Tanaka
Referencias: Tanaka, N. & Koyama, T. M., 2000; Tanaka, N., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 1700–1800 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Koyama, T. M. 15858* (MAK, TNS)].

Canna rubricaulis Link = **Canna indica** L.

Canna speciosa Roscoe ex Sims
Referencias: Tanaka, N., 2001.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pire, S. M. 167* (CTES, F)]; BRA[*Reitz, P. R. 16620* (B)].

Canna stenantha Nb. Tanaka = **Canna glauca** L.

Canna variegatifolia Ciciarelli = **Canna indica** L.

Canna warszewiczii A. Dietr. = **Canna indica** L.
Referencias: Maas, P. J. M. & Maas, H., 1988; Richardson, J. W. & Smith, L. B., 1972; Woodson, R. E. & Schery, R. W., 1945.

Distemon ottonis Bouché = **Canna paniculata** Ruiz & Pav.
Referencias: Maas, P. J. M. & Maas, H., 1988.

CENTROLEPIDACEAE

1 género, 1 especie endémica.

Gaimardia Gaudich.

Número de especies: 1 endémica

Gaimardia australis Gaudich.
Sin.: *Gaimardia pusilla* Gaudich.
Referencias: Castellanos, A., 1945e; Pérez-Moreau, R. L., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 736* (SI), *Nicora, E. G. 7258* (SI)]; CHL[*Dusén, P. K. H. s.n.* (LIL), *Goodspeed, T. H. 17656* (SI)].

Gaimardia pusilla Gaudich. = **Gaimardia australis** Gaudich.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1969[1968].

COMMELINACEAE

8 géneros, 26 especies,1 especie endémica, 1 especie introducida.

Aneilema geniculata (Jacq.) Woodson = **Gibasis geniculata** (Jacq.) Rohweder
Referencias: Hunt, D. R., 1986a.

[Aneilema paraguayensis C.B. Clarke]
Referencias: Clarke, C. B., 1901a.
Notas: Nombre dudoso.

Aploleia diffusa Raf. = **Callisia monandra** (Sw.) Schult. & Schult. f.
Referencias: Hunt, D. R., 1986b.

Aploleia monandra (Sw.) H.E. Moore = **Callisia monandra** (Sw.) Schult. & Schult. f.
Referencias: Hunt, D. R., 1986b.

Callisia Loefl.

Número de especies: 2

Callisia monandra (Sw.) Schult. & Schult. f.
Sin.: *Aploleia diffusa* Raf., *Aploleia monandra* (Sw.) H.E. Moore, *Callisia umbellulata* Lam., *Leptocallisia monandra* (Sw.) A. Ludw. & Rohweder, *Leptocallisia umbellulata* (Lam.) Pichon, *Tradescantia monandra* Sw.
Referencias: Hunt, D. R., 1986b; Moore, H. E., 1961.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 507* (SI)].

Callisia repens (Jacq.) L.
Sin.: *Hapalanthus repens* Jacq.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1964; Hunt, D. R., 1986b; Moore, H. E., 1958; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, TUC); PRY(CEN, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 5372* (BAA, BAB, SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 13114* (MO)].

Callisia umbellulata Lam. = **Callisia monandra** (Sw.) Schult. & Schult. f.
Referencias: Hunt, D. R., 1986b.

Commelina L.

Número de especies: 5

Commelina alpestris Standl. & Steyerm. = **Commelina tuberosa** L.
Referencias: Hunt, D. R., 1994.

Commelina angustifolia Michx. = **Commelina erecta** L. var. **angustifolia** (Michx.) Fernald
Referencias: Brashier, C. K., 1966; Fernald, M. L., 1940.

[Commelina assurgens Larrañaga]
Notas: Nombre dudoso.

Commelina balansae (C.B. Clarke) Herter = **Commelina platyphylla** Klotzsch ex Seub.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1964.

Commelina cayennensis Rich. = **Commelina diffusa** Burm. f.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Uittien, H., 1966.

Commelina cayennensis Rich. var. *pubescens* Griseb. = **Commelina diffusa** Burm. f.
Referencias: Clarke, C. B., 1881.

Commelina coelestis Willd. = **Commelina tuberosa** L.
Referencias: Hunt, D. R., 1994; Rohweder, O., 1956.

[Commelina cyanantha Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d.
Notas: Nombre dudoso.

Commelina dielsii Herter = **Commelina erecta** L. f. **dielsii** (Herter) Bacigalupo
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1995.

Commelina diffusa Burm. f.
Sin.: *Commelina cayennensis* Rich., *Commelina cayennensis* Rich. var. *pubescens* Griseb., *Commelina longicaulis* Jacq., *Commelina nudiflora* auct. non L., *Commelina sellowiana* Kunth
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1969[1968]; Brashier, C. K., 1966; Hunt, D. R., 1994; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Standley, P. C. & Steyermark, J. A., 1952; Uittien, H., 1966.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(CON, GUA, PAI); URY(ART, CLA, RNO, SAO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 579* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 4248* (NY)]; PRY[*Kiesling, R. 9619* (PY, SI)]; URY[*Berro, M. B. 6477* (MVFA)].

Commelina elegans Kunth = **Commelina erecta** L. var. **erecta**
Referencias: Hunt, D. R., 1994.

Commelina elliptica Kunth = **Commelina tuberosa** L.
Referencias: Hunt, D. R., 1994.

Commelina erecta L. f. **candida** Standl. & Steyerm.
Sin.: *Commelina virginica* auct. non L. var. *massonii* C.B. Clarke
Referencias: Molfino, J. F., 1929a; Standley, P. C. & Steyermark, J. A., 1944.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sorarú, S. B. 114* (SI)].

Commelina erecta L. f. **dielsii** (Herter) Bacigalupo
Sin.: *Commelina dielsii* Herter
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1995; Herter, W. G. F., 1940.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 1264* (BAF)].

Commelina erecta L. f. **hamipila** (Wright) Brashier
Sin.: *Commelina erecta* L. var. *hamipila* (Wright) Fernald, *Commelina hamipila* Wright
Referencias: Brashier, C. K., 1966.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. A. 7811* (SI)].

Commelina erecta L. f. **roseo-purpurea** (Herter) Bacigalupo
Sin.: *Commelina roseo-purpurea* Herter
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1995; Herter, W. G. F., 1940.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, ERI, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 4299* (SI)].

[Commelina erecta L. f. villosa (C.B. Clarke) Standl. & Steyerm.]
Sin.: *Commelina villosa* (C.B. Clarke) C.B. Clarke, *Commelina virginica* L. var. *villosa* C.B. Clarke
Notas: Nombre dudoso.

Commelina erecta L. var. **angustifolia** (Michx.) Fernald
Sin.: *Commelina angustifolia* Michx., *Commelina virginica* L. var. *angustifolia* (Michx.) C.B. Clarke
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1969[1968]; Fernald, M. L., 1940; Standley, P. C. & Steyermark, J. A., 1952.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SJU, SLU); BRA(RGS); PRY(COA); URY(MON, PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 2180* (SI)]; BRA[*Henz, E. 35392* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 18* (SI)]; URY[*Felippone, F. 3138bis* (SI)].

Commelina erecta L. var. **erecta**
Sin.: *Commelina elegans* Kunth, *Commelina pohliana* Seub., *Commelina sulcata* Willd., *Commelina virginica* auct. non L., *Commelina virginica* L. var. *australis* C.B. Clarke
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Bacigalupo, N. M., 1969[1968]; Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Clarke, C. B., 1881; Fernald, M. L., 1940; Hunt, D. R., 1994; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN, CEN, PAI, PHA); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25218* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 52358* (CTES)]; PRY[*Krapovickas, A. 28552* (CTES, SI)]; URY[*Alonso Paz, E. 3723* (MVFQ)].

Commelina erecta L. var. *hamipila* (Wright) Fernald = **Commelina erecta** L. f. **hamipila** (Wright) Brashier
Referencias: Brashier, C. K., 1966.

Commelina fasciculata auct. non Ruiz & Pav. = **Commelina tuberosa** L.
Referencias: Rohweder, O., 1956.

[Commelina guaranitica C.B. Clarke]
Notas: Nombre dudoso.

Commelina hamipila Wright = **Commelina erecta** L. f. **hamipila** (Wright) Brashier
Referencias: Brashier, C. K., 1966.

Commelina hexandra Aubl. = **Dichorisandra hexandra** (Aubl.) Standl.

Referencias: Hunt, D. R., 1994.

Commelina longicaulis Jacq. = **Commelina diffusa** Burm. f.
Referencias: Hunt, D. R., 1994.

Commelina nudiflora auct. non L. = **Commelina diffusa** Burm. f.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1969[1968]; Hunt, D. R., 1994.

Commelina obliqua Vahl
Sin.: *Commelina robusta* Kunth
Referencias: Hunt, D. R., 1994; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Stutz, L. C., 1983.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(SCA); PRY(APA, AMA, CAN, COA); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5569* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 2906* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 20514* (MO, SI)]; URY[*Del Puerto, O. 2051* (MVFA)].

Commelina platyphylla Klotzsch ex Seub.
Sin.: *Commelina balansae* (C.B. Clarke) Herter, *Commelina platyphylla* Klotzsch ex Seub. var. *balansae* C.B. Clarke
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1964; Clarke, C. B., 1881; Mereles, F., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS); BRA(RGS); PRY(CAU, CEN, COA, PAI, PHA); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 7252* (SI)]; BRA[*Arbo, M. M. 2451* (CTES)]; PRY[*Mereles, F. 1766* (SI)]; URY[*Seijo, G. J. 2440* (CTES, SI)].

Commelina platyphylla Klotzsch ex Seub. var. *balansae* C.B. Clarke = **Commelina platyphylla** Klotzsch ex Seub.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1964.

Commelina pohliana Seub. = **Commelina erecta** L. var. **erecta**
Referencias: Clarke, C. B., 1881.

Commelina robusta Kunth = **Commelina obliqua** Vahl
Referencias: Hunt, D. R., 1994.

Commelina roseo-purpurea Herter = **Commelina erecta** L. f. **roseo-purpurea** (Herter) Bacigalupo
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1995.

[Commelina schomburgkiana Klotzsch]
Referencias: Clarke, C. B., 1901a.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Commelina sellowiana Kunth = **Commelina diffusa** Burm. f.
Referencias: Clarke, C. B., 1881.

Commelina sulcata Willd. = **Commelina erecta** L. var. **erecta**
Referencias: Clarke, C. B., 1881.

Commelina tuberosa L.
Sin.: *Commelina alpestris* Standl. & Steyerm., *Commelina coelestis* Willd., *Commelina elliptica* Kunth, *Commelina fasciculata* auct. non Ruiz & Pav.
Referencias: Hunt, D. R., 1994; Rohweder, O., 1956.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–2800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3782* (SI)].

[Commelina vestita Seub.]
Notas: Nombre dudoso. Posible sinónimo de *Commelina obliqua* Vahl.

Commelina villosa (C.B. Clarke) C.B. Clarke = **Commelina erecta** L. f. **villosa** (C.B. Clarke) Standl. & Steyerm.

Commelina virginica auct. non L. = **Commelina erecta** L. var. **erecta**
Referencias: Hunt, D. R., 1994.

Commelina virginica L. var. *angustifolia* (Michx.) C.B. Clarke = **Commelina erecta** L. var. **angustifolia** (Michx.) Fernald
Referencias: Fernald, M. L., 1940.

Commelina virginica L. var. *australis* C.B. Clarke = **Commelina erecta** L. var. **erecta**
Referencias: Clarke, C. B., 1881.

Commelina virginica auct. non L. var. *massonii* C.B. Clarke = **Commelina erecta** L. f. **candida** Standl. & Steyerm.
Referencias: Molfino, J. F., 1929a; Standley, P. C. & Steyermark, J. A., 1944.

Commelina virginica L. var. *villosa* C.B. Clarke = **Commelina erecta** L. f. **villosa** (C.B. Clarke) Standl. & Steyerm.

Descantaria disgrega auct. non (Kunth) G. Brückn. = **Tripogandra purpurascens** (Schauer) Handlos subsp. **australis** Handlos
Referencias: Handlos, W. L., 1975.

Descantaria elongata auct. non (G. Mey.) G. Brückn. = **Tripogandra diuretica** (Mart.) Handlos
Referencias: Handlos, W. L., 1975.

Descantaria glandulosa (Seub.) G. Brückn. = **Tripogandra glandulosa** (Seub.) Rohweder
Referencias: Handlos, W. L., 1975.

Descantaria pflanzii G. Brückn. = **Tripogandra glandulosa** (Seub.) Rohweder
Referencias: Handlos, W. L., 1975.

Descantaria radiata (C.B. Clarke) G. Brückn. = **Tripogandra glandulosa** (Seub.) Rohweder
Referencias: Handlos, W. L., 1975.

Dichorisandra J.C. Mikan, nom. cons.

Número de especies: 4, 1 endémica

Dichorisandra aubletiana Schult. f. = **Dichorisandra hexandra** (Aubl.) Standl.
Referencias: Standley, P. C. & Steyermark, J. A., 1952.

Dichorisandra aubletiana Schult. f. f. *intermedia* (Mart.) C.B. Clarke = **Dichorisandra hexandra** (Aubl.) Standl.

Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.
Sin.: *Commelina hexandra* Aubl., *Dichorisandra aubletiana* Schult. f., *Dichorisandra aubletiana* Schult. f. f. *intermedia* (Mart.) C.B. Clarke
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1964; Hunt, D. R., 1994; Standley, P. C. & Steyermark, J. A., 1952; Uittien, H., 1966.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CEN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1695* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 11647* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 28006* (CTES)].

Dichorisandra paranaënsis D. Corrêa da Maia, Cervi & Tardivo
Referencias: da Maia, D. C., Cervi, A. C. & Tardivo, R. C., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*da Maia, D. C. 6* (MBM, UPCB)].

Dichorisandra pubescens Mart.
Referencias: Rosario, R. P. G. & Bianchini, R. S., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kirizawa, M. 1534* (SP)].

Dichorisandra thyrsiflora J.C. Mikan
Referencias: Rosario, R. P. G. & Bianchini, R. S., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lourteig, A. 2371* (SI)].

Dithyrocarpus glabratus Kunth = **Floscopa glabrata** (Kunth) Hassk.
Referencias: Clarke, C. B., 1881.

Floscopa Lour.

Número de especies: 1

Floscopa glabrata (Kunth) Hassk.
Sin.: *Dithyrocarpus glabratus* Kunth
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1964; Clarke, C. B., 1881; Hunt, D. R., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, MIE, PAI); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 15728* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 1214* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 3985* (FCQ, SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 8417* (MVFA)].

Gibasis Raf.

Número de especies: 1

Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder
Sin.: *Aneilema geniculata* (Jacq.) Woodson, *Tradescantia geniculata* Jacq.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Hunt, D. R., 1986a, 1994; Rosario, R. P. G. & Bianchini, R. S., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN, CON, GUA, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 8072* (SI)]; BRA[*Sugiyama, M. 753* (SP)]; PRY[*Degen, R. 3133* (FCQ)].

Hapalanthus repens Jacq. = **Callisia repens** (Jacq.) L.
Referencias: Hunt, D. R., 1994.

Leptocallisia monandra (Sw.) A. Ludw. & Rohweder = **Callisia monandra** (Sw.) Schult. & Schult. f.
Referencias: Hunt, D. R., 1986b.

Leptocallisia umbellulata (Lam.) Pichon = **Callisia monandra** (Sw.) Schult. & Schult. f.
Referencias: Hunt, D. R., 1986b.

Mandonia boliviana Hassk. = **Tradescantia boliviana** (Hassk.) J.R. Grant

Setcreasea pallida Rose = **Tradescantia pallida** (Rose) D.R. Hunt
Referencias: Hunt, D. R., 1975b.

Tinantia Scheidw., nom. cons.

Número de especies: 1

Tinantia erecta (Jacq.) Schltdl.
Sin.: *Tinantia fugax* Scheidw., *Tinantia fugax* Scheidw. var. *erecta* (Jacq.) Drumm. ex C.B. Clarke, *Tradescantia erecta* Jacq., *Tradescantia latifolia* Ruiz & Pav.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1964; Hunt, D. R., 1994; Rohweder, O., 1956.
Hierba. Anual. Nativa. 600–1600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 2770* (SI)].

Tinantia fugax Scheidw. = **Tinantia erecta** (Jacq.) Schltdl.
Referencias: Hunt, D. R., 1994; Rohweder, O., 1956.

Tinantia fugax Scheidw. var. *erecta* (Jacq.) Drumm. ex C.B. Clarke = **Tinantia erecta** (Jacq.) Schltdl.
Referencias: Clarke, C. B., 1881.

Tradescantia L.

Número de especies: 8, 1 introducida

Tradescantia albiflora Kunth = **Tradescantia fluminensis** Vell.
Referencias: Clarke, C. B., 1881; Hunt, D. R., 1980.

Tradescantia ambigua Mart. ex Schult. f.
Referencias: Clarke, C. B., 1881; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 1400–2200 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC); PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 340* (SI), *Hunziker, J. H. 12750* (SI), *Morrone, O. 2390* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 27437* (SI)].

Tradescantia anagallidea Seub.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1964; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(APA, CAN); URY(CLA, LAV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2447* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 4956* (SI)]; PRY[*Marín, G. 191* (BM, CTES, MO, PY)]; URY[*Herter, W. G. F. 1132* (SI)].

Tradescantia blossfeldiana Mildbraed
Referencias: Martínez, A., 1984; Poole, M. M. & Hunt, D. R., 1980; Stearn, W. T., 1955.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(BAI); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 4526* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 45805* (MBM)].

Tradescantia boliviana (Hassk.) J.R. Grant
Sin.: *Mandonia boliviana* Hassk.
Referencias: Grant, J. R., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(COR, SAL, TUC); PRY(APY, COA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 2921* (GH, US)]; PRY[*Hassler, E. 4016* (G)].

Tradescantia crassula Link & Otto
Referencias: Clarke, C. B., 1881; Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Martínez, A., 1984.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PAI); URY(CLA, MON, ROC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1356* (SI)]; BRA[*Burkart, A. 25584* (SI)]; PRY[*Aguayo, A. 183* (MO, PY)]; URY[*Del Puerto, O. 5239* (MVFA)].

Tradescantia disgrega auct. non (Kunth) Woodson = **Tripogandra purpurascens** (Schauer) Handlos subsp. **australis** Handlos
Referencias: Handlos, W. L., 1975.

Tradescantia disgrega Kunth = **Tripogandra disgrega** (Kunth) Woodson

Tradescantia diuretica Mart. = **Tripogandra diuretica** (Mart.) Handlos
Referencias: Handlos, W. L., 1975.

Tradescantia elongata auct. non G. Mey. = **Tripogandra diuretica** (Mart.) Handlos
Referencias: Handlos, W. L., 1975.

Tradescantia elongata G. Mey. var. *diuretica* (Mart.) C.B. Clarke = **Tripogandra diuretica** (Mart.) Handlos
Referencias: Handlos, W. L., 1975.

Tradescantia erecta Jacq. = **Tinantia erecta** (Jacq.) Schltdl.

Tradescantia fluminensis Vell.
Sin.: *Tradescantia albiflora* Kunth
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1969[1968]; Clarke, C. B., 1881; Hunt, D. R., 1980; Martínez, A., 1984; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Poole, M. M. & Hunt, D. R., 1980; Stutz, L. C., 1983.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(X); PRY(APA, CEN, COA, PAI); URY(CLA, ROC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 3497* (SI), *Zuloaga, F. O. 6478* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 3527* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 10018* (CONC)]; PRY[*Stutz, L. C. 1773* (G)]; URY[*Felippone, F. 4565* (SI)].
Notas: Introducida en Chile.

[Tradescantia fluminensis Vell. var. tenella (Kunth) C.B. Clarke]
Sin.: *Tradescantia tenella* Kunth
Referencias: Molfino, J. F., 1929a.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Tradescantia geniculata Jacq. = **Gibasis geniculata** (Jacq.) Rohweder
Referencias: Hunt, D. R., 1986a.

Tradescantia glandulosa Seub. = **Tripogandra glandulosa** (Seub.) Rohweder
Referencias: Handlos, W. L., 1975.

Tradescantia guianensis auct. non Miq. = **Tripogandra diuretica** (Mart.) Handlos
Referencias: Handlos, W. L., 1975.

Tradescantia latifolia Ruiz & Pav. = **Tinantia erecta** (Jacq.) Schltdl.
Referencias: Hunt, D. R., 1983.

Tradescantia monandra Sw. = **Callisia monandra** (Sw.) Schult. & Schult. f.
Referencias: Hunt, D. R., 1986b.

Tradescantia multiflora Sw. = **Tripogandra multiflora** (Sw.) Raf.
Referencias: Handlos, W. L., 1975.

Tradescantia multiflora Sw. var. *parviflora* (Ruiz & Pav.) C.B. Clarke = **Tripogandra multiflora** (Sw.) Raf.
Referencias: Handlos, W. L., 1975.

[Tradescantia mundula Kunth]
Notas: Nombre dudoso.

Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt
Sin.: *Setcreasea pallida* Rose
Referencias: Hunt, D. R., 1975b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5573* (SI)].

Tradescantia parviflora Ruiz & Pav. = **Tripogandra multiflora** (Sw.) Raf.
Referencias: Handlos, W. L., 1975.

Tradescantia pendula (Schnizl.) D.R. Hunt = **Tradescantia zebrina** Bosse

Tradescantia pflanzii G. Brückn. = **Tripogandra glandulosa** (Seub.) Rohweder
Referencias: Handlos, W. L., 1975.

Tradescantia radiata C.B. Clarke = **Tripogandra glandulosa** (Seub.) Rohweder
Referencias: Handlos, W. L., 1975.

Tradescantia tenella Kunth = **Tradescantia fluminensis** Vell. var. **tenella** (Kunth) C.B. Clarke

Tradescantia zebrina Bosse
Sin.: *Tradescantia pendula* (Schnizl.) D.R. Hunt, *Zebrina pendula* Schnizl., *Zebrina purpusii* G. Brückn.
Referencias: Hunt, D. R., 1994.
Hierba. Perenne. Introducida. 400–700 m.
Países: ARG(SAL); BRA(RGS); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 1658* (SI)]; BRA[*Brinker, J. 8460* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 5698* (SI)].

Tripogandra Raf.

Número de especies: 4

[Tripogandra disgrega (Kunth) Woodson]
Sin.: *Tradescantia disgrega* Kunth
Referencias: Handlos, W. L., 1975.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos
Sin.: *Descantaria elongata* auct. non (G. Mey.) G. Brückn., *Tradescantia diuretica* Mart., *Tradescantia elongata* auct. non G. Mey., *Tradescantia elongata* G. Mey. var. *diuretica* (Mart.) C.B. Clarke, *Tradescantia guianensis* auct. non Miq., *Tripogandra elongata* (G. Mey.) Woodson f. *diuretica* (Mart.) Standl. & Steyerm., *Tripogandra elongata* auct. non (G. Mey.) Woodson
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1967; Handlos, W. L., 1975; Rosario, R. P. G. & Bianchini, R. S., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CAN, CEN, GUA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6736* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 18037* (F, MO, NY, US)]; PRY[*Jiménez, B. 19* (BM, CTES, MO, PY)]; URY[*Herter, W. G. F. 149* (B, BH, F, GH, MICH, MO, NY, SI, U, UC, WIS)].

Tripogandra elongata auct. non (G. Mey.) Woodson = **Tripogandra diuretica** (Mart.) Handlos
Referencias: Handlos, W. L., 1975.

Tripogandra elongata (G. Mey.) Woodson f. *diuretica* (Mart.) Standl. & Steyerm. = **Tripogandra diuretica** (Mart.) Handlos
Referencias: Handlos, W. L., 1975.

Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohweder
Sin.: *Descantaria glandulosa* (Seub.) G. Brückn., *Descantaria pflanzii* G. Brückn., *Descantaria radiata* (C.B. Clarke) G. Brückn., *Tradescantia glandulosa* Seub., *Tradescantia pflanzii* G. Brückn., *Tradescantia radiata* C.B. Clarke, *Tripogandra pflanzii* (G. Brückn.) Burkart, comb. superfl., *Tripogandra pflanzii* (G. Brückn.) Celarier, comb. superfl., *Tripogandra pflanzii* (G. Brückn.) Rohweder, *Tripogandra radiata* (C.B. Clarke) Bacigalupo
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1964; Berry, P. E., 1998; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Handlos, W. L., 1975; Poole, M. M. & Hunt, D. R., 1980.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PHA, SPE); URY(CLA, RIV, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6576* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 13339* (US)]; PRY[*Kiesling, R. 9749* (PY, SI)]; URY[*Seijo, G. J. 2519* (CTES)].

Tripogandra multiflora (Sw.) Raf.
Sin.: *Tradescantia multiflora* Sw., *Tradescantia multiflora* Sw. var. *parviflora* (Ruiz & Pav.) C.B. Clarke, *Tradescantia parviflora* Ruiz & Pav., *Tripogandra multiflora* (Sw.) Woodson f. *parviflora* (Ruiz & Pav.) Bacigalupo
Referencias: Handlos, W. L., 1975; Hunt, D. R., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 1289* (LIL)].

Tripogandra multiflora (Sw.) Woodson f. *parviflora* (Ruiz & Pav.) Bacigalupo = **Tripogandra multiflora** (Sw.) Raf.
Referencias: Handlos, W. L., 1975.

Tripogandra pflanzii (G. Brückn.) Burkart, comb. superfl. = **Tripogandra glandulosa** (Seub.) Rohweder
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1964.

Tripogandra pflanzii (G. Brückn.) Celarier, comb. superfl. = **Tripogandra glandulosa** (Seub.) Rohweder
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1964.

Tripogandra pflanzii (G. Brückn.) Rohweder = **Tripogandra glandulosa** (Seub.) Rohweder
Referencias: Handlos, W. L., 1975.

Tripogandra purpurascens (Schauer) Handlos subsp. **australis** Handlos
Sin.: *Descantaria disgrega* auct. non (Kunth) G. Brückn., *Tradescantia disgrega* auct. non (Kunth) Woodson
Referencias: Handlos, W. L., 1975.
Hierba. Anual. Nativa. 200–1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 4348* (SI)].

Tripogandra radiata (C.B. Clarke) Bacigalupo = **Tripogandra glandulosa** (Seub.) Rohweder
Referencias: Handlos, W. L., 1975.

Zebrina pendula Schnizl. = **Tradescantia zebrina** Bosse
Referencias: Hunt, D. R., 1994.

Zebrina purpusii G. Brückn. = **Tradescantia zebrina** Bosse
Referencias: Hunt, D. R., 1994.

CORSIACEAE

1 género,1 especie endémica.

Arachnitis Phil., nom. cons.

Número de especies: 1 endémica

Arachnitis quetrihuensis Dimitri = **Arachnitis uniflora** Phil.
Referencias: Ibisch, P. L., Neinhuis, C. & Rojas, P., 1996.

Arachnitis uniflora Phil.
Sin.: *Arachnitis quetrihuensis* Dimitri
Referencias: Correa, M. N., 1969c; Cribb, P. J., Wilkin, P. & Clements, M. A., 1995; Dimitri, M. J., 1972a; Ibisch, P. L., Neinhuis, C. & Rojas, P., 1996; Minoletti, M. L., 1986; Pisano, E., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 1738* (SI)]; CHL[*Grandjot, G. F. s.n.* (SI), *Hollermayer, A. 1939* (B, MO)].

COSTACEAE

1 género, 3 especies.

Alpinia spiralis Jacq. = **Costus spiralis** (Jacq.) Roscoe
Referencias: Maas, P. J. M., 1972.

Costus L.

Número de especies: 3

Costus arabicus L.
Sin.: *Costus pilgeri* K. Schum., *Costus verschaffeltii* Lem.
Referencias: Maas, P. J. M., 1972; Martínez Crovetto, R., 1977; Mereles, F., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 5409* (LIL)]; BRA[*Reitz, P. R. 3798* (US)]; PRY[*Hassler, E. 5974* (BM, G, K, NY, US)].

Costus pilgeri K. Schum. = **Costus arabicus** L.
Referencias: Maas, P. J. M., 1972.

Costus scaber Ruiz & Pav.
Referencias: Maas, P. J. M., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Vincent, s.n.* (L)].

Costus spiralis (Jacq.) Roscoe
Sin.: *Alpinia spiralis* Jacq.
Referencias: Maas, P. J. M., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6664* (L, LIL, US)].

Costus verschaffeltii Lem. = **Costus arabicus** L.
Referencias: Maas, P. J. M., 1972.

CYCLANTHACEAE

1 género, 2 especies endémicas.

Asplundia Harling

Número de especies: 2 endémicas

Asplundia glaucophylla Harling
Referencias: Harling, G. W., 1958.
Hierba o arbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 11968* (S, US)].

Asplundia polymera (Hand.-Mazz.) Harling subsp. **reitzii** Harling
Referencias: Harling, G. W., 1958; Reitz, R., 1968a.
Arbusto o liana. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5155* (HBR, S)].

CYMODOCEACEAE

1 género, 1 especie.

Halodule Endl.

Número de especies: 1

Halodule brasiliensis Lipkin = **Halodule wrightii** Asch.
Referencias: Pirani, J. R., 2002a.

Halodule wrightii Asch.
Sin.: *Halodule brasiliensis* Lipkin
Referencias: Oliveira F., E. C., Pirani, J. R. & Giulietti, A. M., 1983; Pirani, J. R., 2002a.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Oliveira, F. s.n.* (SPF)].

CYPERACEAE

Coordinador: Guaglianone, E. R.
Autores: Guaglianone, E. R.(Argentina), Marchesi, E. (Uruguay), Marticorena, C. (Chile), Araújo, A. C. (Sur de Brasil) & Mereles, F. (Paraguay); Alves, M. V. (*Hypolytrum, Lagenocarpus* y *Pleurostachys*); Araújo, A. C. (*Carex* y *Rhynchospora*); Dhooge, S. (*Amphiscirpus*, *Trichophorum, Phylloscirpus* y *Zameioscirpus*); González Elizondo, M. S. (*Eleocharis*); Guaglianone, E. R. (*Bolboschoenus, Carex, Cyperus, Eleocharis, Ficinia, Isolepis, Pycreus, Rhynchospora* y *Schoenoplectus*); Hefler, S. (*Cyperus*); López, M. G. (*Bulbostylis* y *Fimbristylis*); López Sepúlveda, P. (*Cyperus*); Marchesi, E. (*Bolboschoenus*, *Carex, Cyperus, Eleocharis, Pycreus* y *Schoenoplectus*); Mereles, F. (*Cyperus*, *Eleocharis* y *Fimbristylis*); Trevisan, R. (*Eleocharis*); Wheeler, G. A. (*Carex* y *Uncinia).*
Revisores: Goetghebeur, P. & Reznicek, A. A.

37 géneros, 470 especies, 148 especies endémicas, 13 especies introducidas.

Abildgaardia Vahl

Número de especies: 1

Abildgaardia capillaris (L.) Lye = **Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clarke var. **capillaris**

Abildgaardia monostachya (L.) Vahl = **Abildgaardia ovata** (Burm. f.) Kral
Referencias: Kral, R., 1971.

Abildgaardia ovata (Burm. f.) Kral
Sin.: *Abildgaardia monostachya* (L.) Vahl, *Carex ovata* Burm. f., *Cyperus monostachyus* L., *Fimbristylis micrantha* Boeck., *Fimbristylis monostachya* (L.) Hassk., *Fimbristylis ovata* (Burm. f.) J. Kern.
Referencias: Adams, C. D., 1994a; Kral, R. & Strong, M. T., 1999; Kral, R., 1971; Marchesi, E., 1984.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CON, GUA, PHA, SPE); URY(ART, CAS, CLA, DUR, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 24737* (SI), *Pedersen, T. M. 6213* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 6613* (SI)]; PRY [*Rojas, T. 13419* (SI)]; URY[*Chebataroff, J. 8151* (SI)].

Abildgaardia polycephala Brongn. = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1947.

Acorellus laevigatus (L.) Palla = **Cyperus laevigatus** L.
Referencias: Barros, M., 1947.

Acorellus pallae Kneuck. = **Cyperus laevigatus** L.
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

Acrocarpus polyphyllus Nees = **Lagenocarpus polyphyllus** (Nees) Kuntze

Agylla ensifolia F. Phil. = **Machaerina scirpoidea** (Steud.) T. Koyama
Referencias: Strong, M. T., 1997.

Amphiscirpus Oteng-Yeb.

Número de especies: 1

Amphiscirpus nevadensis (S. Watson) Oteng-Yeb.
Sin.: *Isolepis oreophila* Phil., *Schoenoplectus nevadensis* (S. Watson) Soják, *Scirpus nevadensis* S. Watson, *Scirpus nevadensis* S. Watson var. *remireoides* (Griseb.) Beetle, *Scirpus remireoides* Griseb.
Referencias: Dhooge, S., 2005; Goetghebeur, P. & Simpson, D. A., 1991; Oteng-Yeboah, A. A., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, NEU, RNE, SAL, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12991* (SI), *Hicken, C. M. 436* (SI)]; CHL[*Dusén, P. K. H. 5854* (K)].

Androcoma speciosa Nees = **Scirpus giganteus** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Androtrichum (Brongn.) Brongn.

Número de especies: 1

Androtrichum giganteum (Kunth) H. Pfeiff. = **Scirpus giganteus** Kunth
Referencias: Herter, W. G. F., 1949–1956.

Androtrichum montevidense (Link) Barros, nom. illeg. = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Referencias: Pfeiffer, H. H., 1939–1941.

Androtrichum montevidense (Link) H. Pfeiff. = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1947.

Androtrichum polycephalum (Brongn.) Kunth = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1947.

Androtrichum speciosum (Nees) Herter = **Scirpus giganteus** Kunth
Referencias: Guaglianone, E. R., 1996a.

Androtrichum trigynum (Spreng.) H. Pfeiff.
Sin.: *Abildgaardia polycephala* Brongn., *Androtrichum montevidense* (Link) Barros, nom. illeg., *Androtrichum montevidense* (Link) H. Pfeiff., *Androtrichum polycephalum* (Brongn.) Kunth, *Comostemon globuliferum* (J. Presl & C. Presl) Nees, *Comostemon montevidense* (Link) Nees, *Cyperus globuliferum* J. Presl & C. Presl, *Cyperus preslii* A. Dietr., *Cyperus trigynum* Spreng., *Eriophorum montevidense* Link, *Scirpus montevidensis* (Link) C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Burkart, A., 1964a; Herter, W. G. F., 1949–1956; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(BAI, ERI); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, CLA, COL, MAL, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22377* (SI), *Contreras, J. s.n.* (SI)]; BRA[*Gonçales, P. 28009* (SI), *Lindeman, J. C. 2623* (SI)]; URY[*Burkart, A. 21537* (SI)].

Anosporum ablepharum (Griseb.) Maury = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Palla f. **cubense**

Anosporum cubense (Poepp. & Kunth) Boeck. = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Palla f. **cubense**
Referencias: Lye, K. A., 1971.

Anosporum paraguayense Maury = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Palla f. **paraguayense** (Maury) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1995.

Anosporum piliferum Maury = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Palla f. **cubense**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1996a.

Ascolepis Nees ex Steud., nom. cons.

Número de especies: 1

Ascolepis brasiliensis (Kunth) Benth. ex C.B. Clarke
Sin.: *Ascolepis leucocephala* (Nees) L.T. Eiten, *Platylepis brasiliensis* Kunth, *Platylepis leucocephala* Nees, *Platylepis xanthocephala* Nees
Referencias: Adams, C. D., 1994b; Barros, M., 1960; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Goetghebeur, P., 1980; Herter, W. G. F., 1949–1956.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI); URY(COL, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2848* (SI)]; BRA[*Fontella Pereira, J. 1210* (RB)]; PRY[*Jörgensen, P. 4492* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 1902* (MVM)].

Ascolepis leucocephala (Nees) L.T. Eiten = **Ascolepis brasiliensis** (Kunth) Benth. ex C.B. Clarke
Referencias: Goetghebeur, P., 1980.

Baumea ensifolia (Boeck.) Palla = **Machaerina ensifolia** (Boeck.) T. Koyama
Referencias: Strong, M. T., 1997.

Becquerelia Brongn.

Número de especies: 2

Becquerelia cymosa Brongn.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Barros, M., 1960; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4561* (HBR)].

Becquerelia glomerulata Brongn. = **Calyptrocarya glomerulata** (Brongn.) Urb.
Referencias: Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.

Becquerelia muricata Nees
Sin.: *Scleria muricata* (Nees) Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960; Boeckeler, J. O., 1874.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4400* (HBR)].

[Becquerelia tuberculata (Boeck.) H. Pfeiff.]
Sin.: *Scleria tuberculata* Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Bisboeckelera berroi (C.B. Clarke) Standl. = **Cyperus berroi** (C.B. Clarke) Barros
Referencias: Barros, M., 1944.

Blepharolepis leucoblepharis Nees = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Palla f. **cubense**

Bolboschoenus (Asch.) Palla

Número de especies: 2

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla subsp. *cymosus* (Rchb.) Soják = **Bolboschoenus maritimus** (L.) Palla subsp. **maritimus**

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla subsp. **maritimus**
Sin.: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla subsp. *cymosus* (Rchb.) Soják, *Schoenoplectus maritimus* (L.) Lye, *Scirpus maritimus* L., *Scirpus maritimus* L. f. *cymosus* (Rchb.) T. Koyama, *Scirpus maritimus* L. var. *cymosus* Rchb.
Referencias: Beetle, A. A., 1953; Koyama, T. M., 1980; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Smith, S. G., 2002a.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 2695* (LP)].

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla subsp. **paludosus** (A. Nelson) T. Koyama
Sin.: *Bolboschoenus paludosus* (A. Nelson) Oteng-Yeb., *Scirpus maritimus* L. var. *digynus* Godr., *Scirpus maritimus* L. var. *paludosus* (A. Nelson) Kük., *Scirpus paludosus* A. Nelson, *Scirpus robustus* Pursh var. *paludosus* (A. Nelson) Fernald
Referencias: Barros, M., 1960, 1969a; Beetle, A. A., 1953; Koyama, T. M., 1980; Oteng-Yeboah, A. A., 1974; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Smith, S. G., 2002a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, FOR, MEN, RNE, SFE, TUC); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. s.n.* (SI)].

Bolboschoenus paludosus (A. Nelson) Oteng-Yeb. = **Bolboschoenus maritimus** (L.) Palla subsp. **paludosus** (A. Nelson) T. Koyama

Bolboschoenus robustus (Pursh) T. Koyama, comb. superfl. = **Bolboschoenus robustus** (Pursh) Soják

Bolboschoenus robustus (Pursh) Soják
Sin.: *Bolboschoenus robustus* (Pursh) T. Koyama, comb. superfl., *Schoenoplectus robustus* (Pursh) M.T. Strong, *Scirpus maritimus* L. var. *macrostachyus* (Lam.) Michx., *Scirpus maritimus* L. var. *robustus* (Pursh) Kük., *Scirpus robustus* Pursh
Referencias: Adams, C. D., 1994c; Barros, M., 1960; Beetle, A. A., 1953; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Marchesi, E., 1984; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, FOR, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(PHA); URY(MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1291* (SI)]; BRA[*Bertels, A. 1045* (HBR)]; PRY[*Morong, T. 927* (NY)]; URY[*Brescia, R. 3262* (MVFA)].

Bulbostylis Kunth

Número de especies: 25, 2 endémicas

Bulbostylis amambayensis Barros
Sin.: *Bulbostylis spectabilis* Kral & M.T. Strong
Referencias: López, M. G., Prata, A. P. & Thomas, W. W., 2007.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Koyama, T. M. 13848* (NY, SP)]; PRY[*Rojas, T. 6780* (AS, MO, SI)].

Bulbostylis aphylla Barros = **Bulbostylis brevifolia** Palla
Referencias: López, M. G., Prata, A. P. & Thomas, W. W., 2007.

Bulbostylis arenaria (Nees) Lindm.
Sin.: *Isolepis arenaria* Nees, nom. nud., *Oncostylis arenaria* Nees
Referencias: Angely, J. A., 1965; Prata, A. P., 2004.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Riedel, L. 922* (SI)].

Bulbostylis argentina Palla = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **lorentzii** (Boeck.) Kük. ex Osten

Bulbostylis aspera M.G. López
Referencias: López, M. G., 2007.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(AMA, CAU, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 921* (CTES)]; PRY[*Pedersen, T. M. 8512* (CTES)].

Bulbostylis barbata auct. non (Rottb.) C.B. Clarke = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter f. **leucocarpa** (Barros) Barros
Referencias: Barros, M., 1945; Guaglianone, E. R. 1996a.

Bulbostylis brevifolia Palla
Sin.: *Bulbostylis aphylla* Barros
Referencias: Angely, J. A., 1965; López, M. G., Prata, A. P. & Thomas, W. W., 2007.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, COA, PAI); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*López, M. G. 39* (CTES)]; BRA[*Pedersen, T. M. 12617* (CTES)]; PRY[*Krapovickas, A. 44923* (CTES, G)]; URY[*Castellanos, A. s.n.* (LIL, SI)].

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke f. ***contracta*** Kük. ex Osten
Referencias: Barros, M., 1947; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Paises: ARG(BAI, CHA, COR, ERI, JUJ, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giardelli, M. L. 1154* (SI)].

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke f. **stenantha** Kük. ex Barros
Referencias: Barros, M., 1945, 1947.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m
Paises: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barros, M. 544* (SI)].

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke var. **capillaris**
Sin.: *Abildgaardia capillaris* (L.) Lye, *Fimbristylis capillaris* (L.) A. Gray, *Isolepis capillaris* (L.) Roem. & Schult., *Scirpus capillaris* L., *Stenophyllus capillaris* (L.) Britton

Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Herter, W. G. F., 1949–1956; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Lye, K. A., 1971; Osten, C., 1931. Pedersen, T. M., 1969[1968]; Svenson, H. K., 1957.
Hierba anual. Nativa. 0–1200 m
Paises: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, PAI); URY(ART, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6647* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 4930* (HBR)]; PRY[*Zardini, E. M. 3089* (FCQ, MO)]; URY[*Herter, W. G. F. 43* (MVM)].

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke var. **elatior** (Griseb.) Osten
Sin.: *Scirpus capillaris* L. var. *elatior* Griseb.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Osten, C., 1931.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Paises: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(BOQ); URY(SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1011* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 1424* (HBR)]; PRY[*Vanni, R. O. 2480* (CTES)].

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke var. **microstachys** (Boeck.) Barros
Sin.: *Scirpus microstachys* Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947; Guaglione, E. R., 1996a.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1600 m.
Países: ARG(COR, JUJ, MIS).
Ejemplares de referencia: ARG(*Pérez-Moreau, R. L. 3427* (SI)].

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke var. **pyriformis** C.B. Clarke ex Lindm.
Sin.: *Bulbostylis capillaris* (L.) C.B. Clarke var. *tenuifolia* auct. non (Rudge) C.B. Clarke, *Fimbristylis capillaris* (L.) A. Gray var. *pyriformis* (C.B. Clarke ex Lindm.) Hauman
Referencias: Clarke, C. B., 1900–1901; Guaglianone, E. R., 1996a; Lindman, C. A. M. 1900.
Hábito: Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Paises: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SDE); PRY(CEN, COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2796* (SI)] PRY[*Hassler, E. 3676* (G)].

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke var. *tenuifolia* auct. non (Rudge) C.B. Clarke = **Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clarke var. **pyriformis** C.B. Clarke ex Lindm.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1996a.

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke var. *tenuifolia* (Rudge) C.B. Clarke = **Bulbostylis tenuifolia** (Rudge) J.F. Macbr.

[Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke var. tenuifolia (Rudge) J.F. Macbr.]
Sin.: *Bulbostylis tenuifolia* (Rudge) J.F. Macbr., *Bulbostylis capillaris* (L.) C.B. Clarke var. *tenuifolia* (Rudge) C.B. Clarke, *Scirpus tenuifolius* Rudge
Referencias: Kral, R., 1971.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Bulbostylis closii Barros = **Bulbostylis major** Palla
Referencias: López, M. G., Prata, A. P. & Thomas, W. W., 2007.

Bulbostylis consanguinea (Kunth) C.B. Clarke
Sin.: *Isolepis consanguinea* Kunth, *Oncostylis kunthiana* Nees, *Scirpus consanguineus* (Kunth) Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Guaglianone, E. R., 1996a; Herter, W. G. F., 1949–1956; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; López, M. G., 2006; Osten, C., 1931.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA); URY(TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 3314* (SI)]; BRA[*Pedersen, T. M. 13834* (NY)]; PRY[*Schinini, A. 29252a* (CTES)]; URY[*Herter, W. G. F. 1151* (MVM)].

Bulbostylis eleocharoides Kral & M.T. Strong
Referencias: Kral, R. & Strong, M. T., 1999; Prata, A. P., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10040* (G, MO)].

Bulbostylis fendleri C.B. Clarke
Referencias: Prata, A. P., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Koyama, T. M. 13844* (NY)].

[Bulbostylis filamentosa (Vahl) C.B. Clarke]
Sin.: *Scirpus filamentosus* Vahl
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Bulbostylis fimbriata (Nees) C.B. Clarke
Sin.: *Fimbristylis jacobinae* Steud., *Oncostylis fimbriata* Nees
Referencias: Prata, A. P., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 13249* (SI)].

[Bulbostylis fluviatilis Kral & Davidse]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Bulbostylis funckii (Steud.) C.B. Clarke
Sin.: *Bulbostylis tenuispicata* (Boeck.) Barros, *Isolepis funckii* Steud., *Scirpus tenuispicatus* Boeck.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1996a; Kral, R., 1971.
Hierba. Anual. Nativa. 1800–2100 m.
Países: ARG(COR, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 3603* (LIL)].

Bulbostylis glaziovii (Boeck.) C.B. Clarke = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **juncoides**
Referencias: Barros, M., 1947.

Bulbostylis guaglianonae M.G. López
Referencias: López, M. G., 2007.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 863* (SI)].

Bulbostylis hirtella (Schrad. ex Schult.) Urb.
Sin.: *Bulbostylis langsdorffiana* (Kunth) C.B. Clarke, *Isolepis hirtella* Schrad. ex Schult., *Isolepis langsdorffiana* Kunth, *Oncostylis hirtella* (Schrad. ex Schult.) Nees, *Scirpus hirtellus* (Schrad. ex Nees) Boeck., *Stenophyllus hirtellus* (Schrad. ex Schult.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Guaglianone, E. R., 1996a; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, COA, GUA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1889* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 5380* (HBR)]; PRY[*Zuloaga, F. O. 7286* (SI)].

Bulbostylis jacobinae (Steud.) Lindm.
Sin.: *Scirpus glaucophyllus* Boeck.
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903; Prata, A. P., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 8493* (MBM)]; PRY[*Basualdo, I. 6446* (CTES, FCQ)].

Bulbostylis junciformis (Kunth) C.B. Clarke
Sin.: *Isolepis junciformis* Kunth, *Oncostylis junciformis* (Kunth) Nees var. *humboldtiana* (Spreng.) Nees, *Scirpus humboldtii* Spreng., *Scirpus junciformis* (Kunth) Kuntze, nom. illeg., *Scirpus junciformis* (Kunth) Poir., nom. illeg., *Scirpus juncoides* Willd. ex Kunth, nom. nud.
Referencias: Adams, C. D., 1994d; Herter, W. G. F., 1949–1956; Kükenthal, G., 1933; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Osten, C., 1931.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 12158* (CTES)]; PRY[*Schinini, A. 28209* (CTES)].

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Osten, comb. superfl. = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **juncoides**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1996a.

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter f. **hirtella** Osten
Referencias: Guaglianone, E. R., 1996a; Osten, C., 1931.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR); URY(CLA, DUR, FLO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Osten, C. 2706* (MVM)]; URY[*Herter, G. 18679* (MVM)].

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter f. **leucocarpa** (Barros) Barros
Sin.: *Bulbostylis barbata* auct. non (Rottb.) C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1945, 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barros, M. 1720* (SI)].

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter f. **subfimbriata** Kük. ex Osten
Referencias: Barros, M., 1947; Osten, C., 1931.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 2309* (SI)]; URY[*Cabrera, A. L. 32351* (SI)].

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. **ampliceps** Kük. ex Osten
Referencias: Barros, M., 1947; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, SFE, TUC); URY(DUR, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 14750* (CTES)]; URY[*Pedersen, T. M. 13883* (CTES)].

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. *genuina* Osten, nom. inval. = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **juncoides**

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. **juncoides**
Sin.: *Bulbostylis glaziovii* (Boeck.) C.B. Clarke, *Bulbostylis juncoides* (Vahl) Kük. ex Herter var. *genuina* Osten, nom. inval., *Bulbostylis juncoides* (Vahl) Kük. ex Osten, comb. superfl., *Schoenus juncoides* Vahl, *Scirpus glaziovii* Boeck., *Scirpus humilis* Willd. ex J. Presl & C. Presl, nom. nud., *Scirpus niederleinianus* Boeck., *Scirpus sphaerolepis* Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960; Herter, W. G. F., 1930, 1949–1956; Kral, R., 1971; Marchesi, E., 1984; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CEN, COA, PAI); URY(MON, PAY, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5110* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 9583* (HBR)]; PRY[*Mereles, F. 4024* (FCQ)]; URY[*Herter, W. G. F. 1510* (MVM)].

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. **lorentzii** (Boeck.) Kük. ex Osten
Sin.: *Bulbostylis argentina* Palla, *Fimbristylis argentina* (Palla) Molfino, *Scirpus lorentzii* Boeck., *Stenophyllus argentinus* (Palla) Killip
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Osten, C., 1931; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Nativa. 200–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SDE, SLU, TUC); BRA(SCA); URY(CLA, COL, FLA, PAY, SAO, SJO, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giardelli, M. L. 789* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 9560* (HBR)]; URY[*Pedersen, T. M. 15871* (CTES)].

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. **nana** (Griseb.) Barros
Sin.: *Scirpus juncoides* Willd. ex Kunth var. *nanus* Griseb.
Referencias: Barros, M., 1945; Guaglianone, E. R., 1996a.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: ARG(CAT, COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 58* (SI)];

Bulbostylis langsdorffiana (Kunth) C.B. Clarke = **Bulbostylis hirtella** (Schrad. ex Schult.) Urb.
Referencias: Barros, M., 1947.

Bulbostylis loefgrenii (Boeck.) Prata & M.G. López
Sin.: *Scirpus loefgrenii* Boeck.
Referencias: López, M. G., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 7237* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 28113* (CTES)].

Bulbostylis major Palla
Sin.: *Bulbostylis closii* Barros, *Bulbostylis scabra* (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke f. *evolutior* Lindm., *Stenophyllus scabrus* (J. Presl & C. Presl) H. Pfeiff. f. *evolutior* (Lindm.) H. Pfeiff.
Referencias: López, M. G., Prata, A. P. & Thomas, W. W., 2007.; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–900 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*López, M. G. 101* (CTES, MO)]; BRA[*Orth, C. 2816* (SI)]; PRY[*López, M. G. 267* (CTES, PY, SI)]; URY[*Cabrera, A. L. 32397* (SI)].

Bulbostylis papillosa Kük.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1996a; López, M. G., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 29252* (CTES, G, GH, LIL)].

Bulbostylis paradoxa (Spreng.) Lindm.
Sin.: *Schoenus paradoxus* Spreng.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19698* (MBM)].

Bulbostylis rugosa M.G. López
Referencias: Guaglianone, E. R., 1996a; López, M. G., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 14853* (CTES)]; PRY[*Kiesling, R. 9642* (SI)].

Bulbostylis scabra (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke
Sin.: *Fimbristylis scabra* (J. Presl & C. Presl) Hauman & Vanderveken, *Fimbristylis urvilleana* Steud., *Isolepis scabra* J. Presl & C. Presl
Referencias: Barros, M., 1960.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, ITA, MIE, PHA, SPE); URY(COL, MAL, RNO, RIV, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 5541* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2581* (SI)]; PRY[*Morrone, O. 433* (SI), *Rojas, T. 8577* (SI)]; URY[*Izaguirre, P. 2668* (CTES, MVFA)].

Bulbostylis scabra (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke f. *evolutior* Lindm. = **Bulbostylis major** Palla

Bulbostylis sellowiana (Kunth) Palla
Sin.: *Fimbristylis sellowiana* (Kunth) Hauman & Vanderveken, *Isolepis sellowiana* Kunth
Referencias: López, M. G., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–1200 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 27161* (CTES, MBM)]; PRY[*Hassler, E. 9429* (G)].

Bulbostylis spectabilis Kral & M.T. Strong = **Bulbostylis amambayensis** Barros
Referencias: López, M. G., Prata, A. P. & Thomas, W. W., 2007.

Bulbostylis sphaerocephala (Boeck.) Lindm.
Sin.: *Bulbostylis sphaerocephala* (Boeck.) Lindm. var. *brunneo-vaginata* (Boeck.) C.B. Clarke, *Bulbostylis sphaerocephala* (Boeck.) Lindm. var. *macrocephala* (Maury) Barros, nom. illeg., *Bulbostylis sphaerocephala* (Boeck.) Lindm. var. *macrocephala* (Maury) Kük. ex Osten, *Fimbristylis brunneo-vaginata* (Boeck.) H. Pfeiff., *Fimbristylis sphaerocephala* (Boeck.) Hauman & Vanderveken, *Fimbristylis sphaerocephala* (Boeck.) Hauman & Vanderveken var. *brunneo-vaginata* (Boeck.) Hauman & Vanderveken, *Scirpus brunneo-vaginatus* Boeck., *Scirpus setifolius* Boeck., *Scirpus sphaerocephalus* Boeck., *Scirpus sphaerocephalus* Boeck. var. *macrocephalus* Maury
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Clarke, C. B., 1903.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CON, COA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 9* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 3437* (HBR)]; PRY[*Krapovickas, A. 45694* (AAU, CTES, G, K, LIL, MBM, MO)].

Bulbostylis sphaerocephala (Boeck.) Lindm. var. *brunneo-vaginata* (Boeck.) C.B. Clarke = **Bulbostylis sphaerocephala** (Boeck.) Lindm.
Referencias: Clarke, C. B., 1903.

Bulbostylis sphaerocephala (Boeck.) Lindm. var. *macrocephala* (Maury) Barros, nom. illeg. = **Bulbostylis sphaerocephala** (Boeck.) Lindm.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1996a.

Bulbostylis sphaerocephala (Boeck.) Lindm. var. *macrocephala* (Maury) Kük. ex Osten = **Bulbostylis sphaerocephala** (Boeck.) Lindm.
Referencias: Barros, M., 1947.

Bulbostylis subtilis M.G. López
Referencias: López, M. G., 2007.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL); PRY(APA, AMA, CAU, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 6165* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 27175* (CTES, G)].

Bulbostylis svensoniana Steyerm.
Referencias: Kral, R., 1998; Prata, A. P., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Solomon, J. C. 6817* (FCQ, MO)].

[Bulbostylis tenuifolia (Rudge) J.F. Macbr.]
Sin: *Bulbostylis capillaris* (L.) C.B. Clarke var. *tenuifolia* (Rudge) J.F. Macbr., *Scirpus tenuifolius* Rudge
Referencias: Kral, R., 1971.
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Bulbostylis tenuispicata (Boeck.) Barros = **Bulbostylis funckii** (Steud.) C.B. Clarke
Referencias: Kral, R., 1971.

Calyptrocarya Nees
Número de especies: 2

Calyptrocarya glomerulata (Brongn.) Urb.
Sin.: *Becquerelia glomerulata* Brongn.
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24403* (NY)]; PRY[*Jiménez, B. 1960* (BM, G, MO, PY)].

Calyptrocarya longifolia (Rudge) Kunth
Sin.: *Dichromena longifolia* Spreng., *Schoenus longifolius* Rudge
Referencias: Barros, M., 1960.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(SCA); PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 613* (HBR)]; PRY[*Rojas, T. 12519* (UMO)].

Calyptrostylis asperula Nees = **Rhynchospora asperula** (Nees) Steud.
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001.

Calyptrostylis fascicularis Nees = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **corymbosa**
Referencias: Barros, M., 1960; Kükenthal, G., 1949.

Calyptrostylis florida (Rudge) Nees = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **corymbosa**
Referencias: Barros, M., 1947; Guaglianone, E. R., 2001.

Calyptrostylis gigantea (Link) Nees = **Rhynchospora gigantea** Link
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001; Kükenthal, G., 1949.

Carex L.
Número de especies: 107, 70 endémicas, 4 introducidas

Carex acaulis d'Urv.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a; Wheeler, G. A., 1987b, 1988d.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 294* (SI)]; CHL[*Skottsberg, C. J. F. 705* (UPS)].

[Carex acuta L.]
Sin.: *Carex gracilis* Curtis, hom. illeg.
Referencias: Barros, M., 1929, 1935.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Carex acutata Boott
Sin.: *Carex anwandteri* Phil., *Carex foeminea* Steud.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1100 m.
Países: CHL(III, VII, VIII, X, XI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 2066* (CONC)].

Carex acutata Boott var. *hirtisquama* Kük. = **Carex niederleiniana** Boeck.
Referencias: Kükenthal, G., 1909.

Carex acutata Boott var. *niederleiniana* (Boeck.) Kük. = **Carex niederleiniana** Boeck.

Carex acutata Boott var. *multispicata* (Kunze ex Kunth) Kük. = **Carex multispicata** Kunze ex Kunth

Carex aematorhyncha E. Desv. var. **aematorhyncha**
Sin.: *Carex campyloxis* Steud., *Carex filiformis* L. subsp. *aematorrhyncha* (E. Desv.) Kük., *Carex potamostauros* Steud.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 1326* (LIL)]; CHL[*Montero, G. 7131* (CONC)].

Carex aematorhyncha E. Desv. var. **corralensis** (Phil.) Kük.
Sin.: *Carex corralensis* Phil., *Carex filiforme* auct. non Gooden., *Carex filiformis* L. var. *gracilis* Kurtz ex Kük.
Referencias: Barros, M., 1969a; Kalela, A. A. A., 1940.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 297* (SI)]; CHL[*Pfister, A. s.n.* (CONC)].

Carex albolutescens Schwein. var. *meridionalis* Kük. = **Carex longii** Mack. subsp. **meridionalis** (Kük.) Luceño & M.V. Alves
Referencias: Luceño, M., 1999; Wheeler, G. A., 1987a.

Carex allomacros Steud. = **Carex macloviana** d'Urv. var. **macloviana**
Referencias: Gunckel, L. H., 1948.

Carex andersonii Boott
Sin.: *Carex eleopsammodes* Steud.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 11264* (LIL)]; CHL[*Pisano, E. 2831* (CONC)].

Carex andicola G.A. Wheeler = **Carex firmicaulis** Kalela

Carex andina Phil.
Sin.: *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *neuquensis* Barros
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Wheeler, G. A. & Muñoz-Schick, M., 1990.
Hierba. Perenne. Endémica. 1200–3300 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(IV, V, VII, VIII, IX, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 9620* (SI)]; CHL[*Biese, W. 907* (LIL)].

Carex andina Phil. var. *subabscondita* auct. non Kük. = **Carex austroamericana** G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 1986b.

Carex andina Phil. var. *subabscondita* Kük., p.p. = **Carex austroamericana** G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A. & Muñoz-Schick, M., 1990.

Carex andina Phil. var. *subabscondita* Kük., p.p. = **Carex nelmesiana** Barros
Referencias: Wheeler, G. A. & Muñoz-Schick, M., 1990.

Carex antarctogena Roiv. = **Carex capitata** L.
Referencias: Moore, D. M., 1983.

[Carex antucensis Kunze]
Notas: Nombre dudoso.

Carex anwandteri Phil. = **Carex acutata** Boott
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex aphylla Kunth
Sin.: *Carex ebracteata* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Barros, M., 1969a.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–2700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(IV, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 1681* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20128* (CONC, SGO)].

Carex araucana Phil. = **Carex fuscula** d'Urv. subsp. **fuscula**

Carex arctogena Harry Sm. = **Carex capitata** L.
Referencias: Chater, A. O., 1980.

Carex argentina Barros
Referencias: Barros, M., 1969a; Wheeler, G. A., 1986b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2211* (SI)].

Carex aristata auct. non R. Br. = **Carex trifida** Cav.
Referencias: Barros, M., 1969a.

Carex atrata L. var. *magellanica* (Lam.) Wahlenb. = **Carex magellanica** Lam.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Carex atropicta Steud.
Sin.: *Carex fuegina* Phil., *Carex lechleri* Phil., hom. illeg., *Carex leporina* auct. non L., p.p., *Carex pampae* Kalela, p.p., *Carex peraltae* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Barros, M., 1947, 1969a; Wheeler, G. A., 1986a, 1990.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(III, IV, V, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 137b* (SI)]; CHL[*Lechler, W. 1188* (GOET, P, S, SGO)].

Carex atropicta Steud. f. *monodynama* (Griseb.) Kük., p.p. = **Carex monodynama** (Griseb.) G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 1990.

Carex atropicta Steud. f. *pallescens* (Kurtz ex Kük.) Kük. = **Carex monodynama** (Griseb.) G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 1990.

Carex atropicta Steud. var. *monodynama* Griseb. = **Carex monodynama** (Griseb.) G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 1990.

Carex atropicta Steud. var. *pallescens* Kurtz ex Kük. = **Carex monodynama** (Griseb.) G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 1990.

Carex atropurpurea Boeck. = **Carex fecunda** Steud.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex atrovirens Boeck. = **Carex aureolensis** Steud.
Referencias: Ford, B. A. & Reznicek, A. A., 2002.

Carex aueri Kalela = **Carex reichei** Kük.
Referencias: Wheeler, G. A., 1988b.

Carex aureolensis Steud.
Sin.: *Carex atrovirens* Boeck., *Carex involucrata* Boeck.
Referencias: Ford, B. A. & Reznicek, A. A., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS); PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwarz, G. J. 3615* (LIL)]; BRA[*Rambo, B. 53082* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 1088* (*)].

Carex austroamericana G.A. Wheeler
Sin.: *Carex andina* Phil. var. *subabscondita* auct. non Kük., *Carex andina* Phil. var. *subabscondita* Kük., p.p.
Referencias: Wheeler, G. A., 1986b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(CHU, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 2795* (BAB)]; CHL[*Moore, D. M. 243* (RNG, UPS)].

Carex banksii Boott var. **abbreviata** Kük.
Referencias: Barros, M., 1947; Kükenthal, G., 1899.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Iter Patagonicum 94* (BAF, SI)].

Carex banksii Boott var. **banksii**
Sin.: *Carex germana* Boott, *Carex trifida* Cav. var. *franchetii* Kurtz, *Carex trifida* Franch., hom. illeg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Barros, M., 1969a; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1900 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*James, P. 2281* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20012* (CONC, SGO)].

Carex banksii Boott var. **fonkii** (Phil.) Kük.
Sin.: *Carex fonkii* Phil.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Illin, N. s.n.* (BAF, SI)]; CHL[*Fonk, F. s.n.* (SGO)].

Carex banksii Boott var. **gilliesii** (Phil.) Kük.
Sin.: *Carex dessaueri* Phil., *Carex gilliesii* Phil.
Referencias: Philippi, R. A., 1873.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*sin colector s.n.* (SGO)].

Carex banksii Boott var. *odontolepis* (Phil.) Kük. = **Carex odontolepis** Phil.

Carex barrosii Nelmes
Referencias: Barros, M., 1969a; Nelmes, E., 1955; Wheeler, G. A., 1988d.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII, IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 14148* (SI)]; CHL[*Donat, A. 476* (BM, GH, SI)].

Carex beecheyana Boott ex E. Desv. = **Carex hookeri** Kunth

Carex berteroana E. Desv.
Sin.: *Carex colchaguensis* Phil., *Carex moelleri* Phil., *Carex pungens* Boeck., *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *berteroana* (E. Desv.) Gunckel, *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *colchaguensis* (Phil.) Kük., *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *pungens* (Boeck.) Kük.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zoellner, O. 10163* (CONC)].
Notas: Probablemente crezca en Argentina (M. Barros 1947, 1969).

Carex berteroniana Steud.
Referencias: Wheeler, G. A., 1988b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Montero, G. 175* (CONC)].

Carex boelckeiana Barros
Referencias: Barros, M., 1969a; Wheeler, G. A., 1988e.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2100 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11405* (BAB, SI)].

Carex boliviensis Van Heurck & Müll. Arg.
Sin.: *Carex galbana* L.H. Bailey, *Carex lorentziana* Griseb.
Referencias: Barros, M., 1947; McVaugh, R., 1993; Reznicek, A. A. & González Elizondo, M. S., 2001; Reznicek, A. A. & Wheeler, G. A., 1993.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–2300 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 522* (SI)].

Carex bonariensis auct. non Desf. ex Poir. = **Carex brongniartii** Kunth
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Carex bonariensis auct. non Desf. ex Poir. = **Carex sororia** Kunth subsp. **sororia**
Referencias: Barros, M., 1960; Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Carex bonariensis Desf. ex Poir. f. *remota* Kük. = **Carex trachycystis** Griseb.

Carex bonariensis Desf. ex Poir. var. *achalensis* Kurtz = **Carex feddeana** H. Pfeiff.
Referencias: Wheeler, G. A., 1996b.

Carex bonariensis Desf. ex Poir. var. **bonariensis**
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Marchesi, E., 1984; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, MEN, RNE, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS); CHL(V, VIII, IX); PRY(CAN, PHA); URY(CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eyerdam, W. J. 23388* (SI)]; BRA[*Rossato, M. 4601* (NY)]; CHL[*Gunckel, L. H. 24767* (CONC)]; PRY[*Hassler, E. 5252* (BM)]; URY[*Berro, M. B. 5323* (MVFA)].

Carex bonariensis Desf. ex Poir. var. **glabrescens** Kurtz ex Kük.
Referencias: Barros, M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(COR, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Stuckert, T. J. V. 12031* (LIL)].

Carex bonariensis Desf. ex Poir. var. *remota* Kük. = **Carex trachycystis** Griseb.

Carex bonariensis Desf. ex Poir. var. *rupicola* Pedersen = **Carex rupicola** (Pedersen) G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 1996b.

Carex bonariensis Desf. ex Poir. var. *trachycystis* (Griseb.) Kük. = **Carex trachycystis** Griseb.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Carex bonplandii auct. non Kunth = **Carex macrorrhiza** Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex brachycalama Griseb.
Referencias: Barros, M., 1947; Wheeler, G. A., 1988a.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 759* (F, P)].

Carex bracteosa Kunze ex Kunth
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Kükenthal, G., 1909.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(V, VI, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Kunkel, G. W. H. 326* (CONC)].

Carex brasiliensis A. St.-Hil.
Sin.: *Carex gynaecandra* H. Pfeiff., *Carex procera* Kunth, *Carex tetrasticha* Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Wheeler, G. A., 1996b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2971* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 944a* (BREM)]; PRY[*Schinini, A. 29993* (CTES)]; URY[*Berro, M. B. 4699* (MVFA)].

Carex brevicaulis Thouars = **Uncinia brevicaulis** (Thouars) Kunth

Carex brongniartii Kunth
Sin.: *Carex bonariensis* auct. non Desf. ex Poir., *Carex glomerata* auct. non Thunb., *Carex hypoxanthos* Steud., *Carex hypoxanthus* Steud., *Carex muehlenbergii* Brongn., hom. illeg.
Referencias: Barros, M., 1947; Herter, W. G. F., 1949–1956; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COS, DFE, ERI, MIS, TUC); CHL(VII, VIII, IX, X); URY(CAS, CLA, MAL, MON, RNO, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1289* (SI)]; CHL[*Matthei, O. R. s.n.* (CONC)]; URY[*Gallinal, J. P. 1669* (MVFA)].

Carex brunnescens Boeck., hom. illeg. = **Carex crassiflora** Kük.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex caduca Boott
Sin.: *Carex caduca* Boott var. *ortegae* (Phil.) Kük., *Carex ortegae* Phil., *Carex trichodes* auct. non Steud. ex Boott
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Barros, M., 1947, 1969a; Moore, D. M., 1983; Wheeler, G. A., 1989b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(NEU, SCR, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goodall, N. 3344* (BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92052* (CONC, SGO)].

Carex caduca Boott var. *ortegae* (Phil.) Kük. = **Carex caduca** Boott
Referencias: Wheeler, G. A., 1989b.

Carex calbucana Phil. = **Carex fuscula** d'Urv. subsp. **fuscula**
Referencias: Barros, M., 1969a.

Carex camptoglochin V.I. Krecz.
Sin.: *Carex incurva* auct. non Lightf., *Carex microglochin* Wahlenb. subsp. *fuegina* Kük., *Carex microglochin* Wahlenb. var. *oligantha* (Boott) Kük., *Carex oligantha* Boott, *Uncinia microglochin* (Wahlenb.) Spreng. var. *fuegina* (Kük.) Macloskie
Referencias: Wheeler, G. A. & Guaglianone, E. R., 2003b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(LRI, SCR, SJU, TDF, TUC); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 4406* (LIL)]; CHL[*Pisano, E. 6317* (HIP, MIN)].

Carex campyloxis Steud. = **Carex aematorhyncha** E. Desv. var. **aematorhyncha**
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex canescens L. var. **robustior** Blytt ex Anderss.
Sin.: *Carex canescens* L. var. *alpicola* Kurtz, hom. illeg., *Carex canescens* L. var. *curta* (Gooden.) Macloskie, *Carex canescens* L. var. *dubia* Kük., hom. illeg., *Carex canescens* L. var. *fallax* Kurtz ex Kük., *Carex curta* Gooden. var. *robustior* (Blytt ex Andersson) D.M. Moore & Chater, *Carex curta* Hook. f., hom. illeg., *Carex similis* d'Urv., *Carex skottsbergii* Gand.
Referencias: Moore, D. M. & Chater, A. D., 1971; Moore, D. M., 1983; Toivonen, H., 1981, 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grondona, E. M. 4373* (LIL)]; CHL[*Pisano, E. 3885* (CONC)].

Carex canescens L. var. *alpicola* Kurtz, hom. illeg. = **Carex canescens** L. var. **robustior** Blytt ex Anderss.

Carex canescens L. var. *curta* (Gooden.) Macloskie = **Carex canescens** L. var. **robustior** Blytt ex Anderss.

Carex canescens L. var. *dubia* Kük., hom. illeg. = **Carex canescens** L. var. **robustior** Blytt ex Anderss.

Carex canescens L. var. *fallax* Kurtz ex Kük. = **Carex canescens** L. var. **robustior** Blytt ex Anderss.

Carex capitata L.
Sin.: *Carex antarctogena* Roiv., *Carex arctogena* Harry Sm., *Carex capitata* L. f. *arctogena* (Harry Sm.) Raymond, *Carex rahuiensis* Kurtz ex V.I. Krecz.
Referencias: Barros, M., 1969a; Chater, A. O., 1980; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dusén, P. K. H. 5965* (BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 850201* (CONC)].

Carex capitata L. f. *arctogena* (Harry Sm.) Raymond = **Carex capitata** L.

Carex capitellata Boeck. = **Carex phalaroides** Kunth var. **capitellata** (Boeck.) Kük.

Carex castellanosii Barros = **Carex vallis-pulchrae** Phil. var. **vallis-pulchrae**
Referencias: Wheeler, G. A., 1989b.

Carex catamarcensis C.B. Clarke ex Kük.
Sin.: *Carex latibracteolata* Kük., *Carex lemaniana* auct. non Boott
Referencias: Barros, M., 1935.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(CAT, TUC); CHL(IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 8947* (LIL)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (*)].

Carex cataractae R. Br. = **Carex oederi** Retz. var. **cataractae** (R. Br.) Kük.

Carex catharinensis Boeck.
Sin.: *Carex fuscula* d'Urv. subsp. *catharinensis* (Boeck.) Luceño & M.V. Alves, *Carex fuscula* d'Urv. var. *hieronymi* auct. non (Boeck.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1960; Luceño, M., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1700 m.
Países: ARG(BAI); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (SI)]; BRA[*Ule, E. H. G. 1610* (*)].

Carex cernua Phil., hom. illeg. = **Carex magellanica** Lam.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex chilensis Brongn. ex Duperrey
Sin.: *Carex incrassata* Schltdl., *Carex procera* auct. non Kunth, *Carex riparia* Curtis f. *incrassata* (Schltdl.) Kük., *Carex riparia* Curtis subsp. *chilensis* (Brongn. ex Duperrey) Kük., *Carex riparia* Curtis var. *chilensis* (Brongn. ex Duperrey) Kük., *Carex vacillans* Steud.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a; Herter, W. G. F., 1949–1956; Marchesi, E., 1984; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, MIS, NEU, RNE, SFE, SJU); CHL(VIII, IX, X, XI); PRY(PAI); URY(CAS, MON, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barros, M. 596* (SI)]; CHL[*Montaldo, P. 5* (CONC)]; PRY[*Zardini, E. M. 16158* (FCQ, MO)]; URY[*Del Puerto, O. 2177* (MVFA)].

Carex chillanensis Phil.
Sin.: *Carex goodenovii* auct. non J. Gay, *Carex melanolepis* Phil., *Carex nigra* auct. non (L.) Reichard, *Carex vulgaris* R.E. Fr.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*de Barba s.n.* (LIL)]; CHL[*Teillier A., S. 4939* (CONC)].

Carex chlorolepis Steud. = **Carex phalaroides** Kunth subsp. **phalaroides**
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex chubutensis C.B. Clarke = **Carex subantarctica** Speg.
Referencias: Barros, M., 1969a; Wheeler, G. A., 1986a, 1987b.

Carex cladostachya Wahlenb. = **Carex polystachya** Sw. ex Wahlenb.
Referencias: McVaugh, R., 1993.

Carex cladostachya Wahlenb. var. *maxima* Kük. = **Carex polystachya** Sw. ex Wahlenb.
Referencias: McVaugh, R., 1993.

Carex colchaguensis Phil. = **Carex berteroana** E. Desv.

Carex corralensis Phil. = **Carex aematorhyncha** E. Desv. var. **corralensis** (Phil.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1969a.

Carex crassiflora Kük.
Sin.: *Carex brunnescens* Boeck., hom. illeg.
Referencias: Barros, M., 1947; Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4656* (SI)].

[Carex curta Gooden.]
Referencias: Moore, D. M., 1983.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Carex curta Hook. f., hom. illeg. = **Carex canescens** L. var. **robustior** Blytt ex Anderss.

Carex curta Gooden. var. *robustior* (Blytt ex Andersson) D.M. Moore & Chater = **Carex canescens** L. var. **robustior** Blytt ex Anderss.

Carex curvifolia Boeck. = **Carex macrorrhiza** Boeck.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Wheeler, G. A., 2006.

Carex darwinii Boott var. *aristata* C.B. Clarke ex Kük. = **Carex darwinii** Boott var. **urolepis** (Franch.) Kük.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Carex darwinii Boott var. **darwinii**
Sin.: *Carex incompta* Franch.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6074* (LIL)]; CHL[*Villagrán, C. 6765* (CONC)].

Carex darwinii Boott var. *robustior* Kük. = **Carex darwinii** Boott var. **serranoi** (Phil.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex darwinii Boott var. **serranoi** (Phil.) Kük.
Sin.: *Carex darwinii* Boott var. *robustior* Kük., *Carex serranoi* Phil.
Referencias: Barros, M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hicken, C. M. s.n.* (SI)].
Notas: Su presencia es probable en la Argentina (M. Barros, 1947).

Carex darwinii Boott var. **urolepis** (Franch.) Kük.
Sin.: *Carex darwinii* Boott var. *aristata* C.B. Clarke ex Kük., *Carex urolepis* Franch.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(CHU, RNE); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 11772* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 6557* (CONC)].

Carex decidua Boott
Sin.: *Carex decidua* Boott var. *minor* Kük., *Carex pedicellata* Phil., *Carex rahmeri* Phil., *Carex vulgaris* R.E. Fr. var. *antucensis* Kük.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2400 m.
Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2634* (SI)]; CHL[*Teillier A., S. 4946* (CONC)].

Carex decidua Boott var. *minor* Kük. = **Carex decidua** Boott
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex delacosta Kuntze = **Uncinia macloviana** Gaudich.

Carex dessaueri Phil. = **Carex banksii** Boott var. **gilliesii** (Phil.) Kük.

[Carex diclina Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

Carex distenta Kunze ex Kunth
Sin.: *Carex fuscula* d'Urv. var. *distenta* (Kuntze ex Kunth) Kük., *Carex huitensis* Steud., *Carex indecora* auct. non Kunth, *Carex pseudopunctata* Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960, 1969a; Kükenthal, G., 1909.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SLU, TDF); BRA(SCA); CHL(V, VII, VIII, X, XI); URY(LAV, MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2997* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 2395* (HBR)]; CHL[*García 71* (CONC)]; URY[*Herter, W. G. F. 5183* (MVM)].

[Carex divisa Huds.]
Referencias: Barros, M., 1935.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Carex divulsa Gooden., hom. illeg. = **Carex divulsa** Stokes

Carex divulsa Stokes
Sin.: *Carex divulsa* Gooden., hom. illeg.
Referencias: Luceño, M., 1994.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–100 m.
Países: ARG(BAI, DFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. 275* (SI)].

Carex dusenii Kük. ex Dusén
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dusén, P. K. H. 6056* (*)].

Carex ebracteata Phil. = **Carex aphylla** Kunth
Referencias: Barros, M., 1969a.

Carex ecuadorica auct. non Kük. = **Carex subfuegiana** G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 2006.

Carex eleopsammodes Steud. = **Carex andersonii** Boott
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex erinacea Cav. = **Uncinia erinacea** (Cav.) Pers.
Referencias: Kükenthal, G., 1909.

Carex excelsa auct. non Poepp. ex Kunth = **Carex polysticha** Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex excelsa Poepp. ex Kunth
Sin.: *Carex lechleri* Steud., *Carex pseudocyperus* L. subsp. *haenkeana* auct. non (J. Presl & C. Presl) Kük., *Carex pseudocyperus* L. var. *haenkeana* auct. non (J. Presl & C. Presl) Kük., *Carex pseudocyperus* L. var. *lechleri* Boott, *Carex psilostachys* Steud.
Referencias: Wheeler, G. A., 1996a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, MIS, NEU, RNE); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 9477* (LIL)]; CHL[*Baeza, C. M. 1420* (CONC)].

Carex extensa Gooden. var. *vixdentata* Kük. = **Carex vixdentata** (Kük. ex Osten) G.A. Wheeler
Referencias: Luceño, M., 1999; Wheeler, G. A., 1988b.

Carex fecunda Steud.
Sin.: *Carex atropurpurea* Boeck., *Carex seditiosa* Steud. ex Boott
Referencias: Barros, M., 1947; Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 8340* (SI), *Zuloaga, F. O. 7813* (SI)].

Carex feddeana H. Pfeiff.
Sin.: *Carex bonariensis* Desf. ex Poir. var. *achalensis* Kurtz
Referencias: Angely, J. A., 1965; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Wheeler, G. A., 1996b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR); PRY(GUA); URY(SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2912* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 1134a* (BREM, GH, MO, S)]; PRY[*Schinini, A. 28351* (CTES)]; URY[*Osten, C. 22094* (MVM)].

Carex festiva Dewey = **Carex macloviana** d'Urv. var. **macloviana**
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex filiforme auct. non Gooden. = **Carex aematorhyncha** E. Desv. var. **corralensis** (Phil.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1969a.

Carex filiformis L. var. *gracilis* Kurtz ex Kük. = **Carex aematorhyncha** E. Desv. var. **corralensis** (Phil.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1969a.

Carex filiformis L. subsp. *aematorrhyncha* (E. Desv.) Kük. = **Carex aematorhyncha** E. Desv. var. **aematorhyncha**
Referencias: Barros, M., 1969a.

Carex firmicaulis Kalela
Sin.: *Carex andicola* G.A. Wheeler, *Carex nebularum* Phil. f. *major* (Kük.) Kük., *Carex pycnostachya* Kar. & Kir. var. *major* Kük.
Referencias: Kalela, A. A. A., 1940.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–1300 m.
Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IV, VI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hogberg, C. s.n.* (SI)]; CHL[*Worth, C. R. 16681* (DS, MO, NA, UC)].

Carex flacca Schreb.
Referencias: Moore, D. M., 1968.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Moore, D. M. 557* (LP)].

Carex foeminea Steud. = **Carex acutata** Boott
Referencias: Barros, M., 1969a.

Carex fonkii Phil. = **Carex banksii** Boott var. **fonkii** (Phil.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1969a.

Carex fossa G.A. Wheeler
Sin.: *Carex involucrata* Boott, hom. illeg., *Carex sororia* Kunth var. *involucrata* (Boott) Kük.
Referencias: Wheeler, G. A., 2002b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, RNE, SAL, SFE); BRA(RGS); URY(LAV, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 5274* (BAB)]; BRA[*Malme, G. O. A. 678* (*)]; URY[*Osten, C. 3303* (MVM)].
Notas: Citada para Paraguay sin mencionar localidad o ejemplar de referencia (Wheeler, 2002b).

[Carex frankii Kunth]
Sin.: *Carex stenolepis* Torr., hom. illeg.
Referencias: Ford, B. A. & Reznicek, A. A., 2002.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Carex fuegina Phil. = **Carex atropicta** Steud.
Referencias: Wheeler, G. A., 1990.

Carex fuscula d'Urv. f. *elatior* Kurtz = **Carex fuscula** d'Urv. subsp. **fuscula**

Carex fuscula d'Urv. f. **indecora** (Kunth) Kük.
Sin.: *Carex indecora* Kunth
Referencias: Kükenthal, G., 1909; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(RNE, TDF); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Skottsberg, C. J. F. s.n.* (*)]; CHL[*Buchtien, O. 227* (*)].

Carex fuscula d'Urv. var. *distenta* (Kuntze ex Kunth) Kük. = **Carex distenta** Kunze ex Kunth

Carex fuscula d'Urv. var. *hieronymi* (Boeck.) Kük. = **Carex fuscula** d'Urv. subsp. **fuscula**

Carex fuscula d'Urv. var. *hieronymi* auct. non (Boeck.) Kük. = **Carex catharinensis** Boeck.
Referencias: Luceño, M., 1999.

Carex fuscula d'Urv. var. **pseudextensa** Kük.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (*)].

Carex fuscula d'Urv. subsp. *catharinensis* (Boeck.) Luceño & M.V. Alves = **Carex catharinensis** Boeck.

Carex fuscula d'Urv. subsp. **fuscula**
Sin.: *Carex araucana* Phil., *Carex calbucana* Phil., *Carex fuscula* d'Urv. f. *elatior* Kurtz, *Carex fuscula* d'Urv. var. *hieronymi* (Boeck.) Kük., *Carex hieronymi* Boeck., *Carex inconspicua* Steud. var. *fuscula* (d'Urv.) Kük., *Carex indecora* Kunth var. *humilis* Kunth, *Carex riparia* auct. non Curtis, *Carex sagei* Phil., *Carex valdiviana* Phil.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a; Gunckel, L. H., 1944; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(IV, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 1729* (SI), *Eyerdam, W. J. 24612* (SI)]; BRA[*Araújo, A. C. 556* (ICN)]; CHL[*Pisano, E. 7960* (CONC)].
Notas: Citada para Uruguay (Herter, 1949–1956) sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Wheeler, 2002b).

Carex gaimardioides E. Desv. = **Zameioscirpus gaimardiodes** (E. Desv.) Dhooge & Goetgh.
Referencias: Dhooge, S., Goetghebeur, P. & Muasya, A. M., 2003.

Carex galbana L.H. Bailey = **Carex boliviensis** Van Heurck & Müll. Arg.

Carex gayana E. Desv. var. **densa** Kük.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, SCR, SJU, TDF); CHL(III, VII, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 2002* (SI)]; CHL[*Barrientos, R. 194* (CONC)].

Carex gayana E. Desv. var. **gayana**
Sin.: *Carex nitens* Phil.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, MEN, RNE, SCR, SJU, TDF); CHL(II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 1231* (LIL)]; CHL[*Tsujii, T. 464* (CONC)].

Carex gayana E. Desv. var. **rufa** Kük.
Sin.: *Carex gayana* E. Desv. var. *taurina* (Phil.) Kük., *Carex taurina* Phil.
Referencias: Kükenthal, G., 1899; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2300 m.
Países: ARG(CAT, CHU, MEN, NEU, SJU); CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA)]; CHL[*Barros, E. 5068* (SI)].

Carex gayana E. Desv. var. **schedonautos** (Steud.) Kük.
Sin.: *Carex schedonautos* Steud.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burmeister, H. C. C. 97* (SI)].

Carex gayana E. Desv. var. *taurina* (Phil.) Kük. = **Carex gayana** E. Desv. var. **rufa** Kük.

Carex germana Boott = **Carex banksii** Boott var. **banksii**
Referencias: Barros, M., 1969a.

Carex gibertii G.A. Wheeler = **Carex phalaroides** Kunth subsp. **crassiflora** (Kük.) Luceño & M.V. Alves
Referencias: Luceño, M., 1999.

Carex gilliesii Phil. = **Carex banksii** Boott var. **gilliesii** (Phil.) Kük.

Carex glazioviana Boeck. = **Carex hilairei** Boott var. **glazioviana** (Boeck.) Kük.
Referencias: Kükenthal, G., 1909.

Carex glomerata auct. non Thunb. = **Carex brongniartii** Kunth
Referencias: Kükenthal, G., 1909.

Carex glomerata auct. non Thunb. = **Carex sororia** Kunth subsp. **sororia**
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Carex goodenovii auct. non J. Gay = **Carex chillanensis** Phil.

Carex gracilis Curtis, hom. illeg. = **Carex acuta** L.
Referencias: Barros, M., 1929, 1935.

Carex gynaecandra H. Pfeiff. = **Carex brasiliensis** A. St.-Hil.
Referencias: Wheeler, G. A., 1996b.

Carex hamata Sw. = **Uncinia hamata** (Sw.) Urb.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex hermaphrodita Jacq. = **Cyperus hermaphroditus** (Jacq.) Standl.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex herteri G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 1996c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(FLA).
Ejemplares de referencia: URY[*Herter, W. G. F. s.n.* (S)].

Carex hieronymi Boeck. = **Carex fuscula** d'Urv. subsp. **fuscula**

Carex hilairei Boott var. **glazioviana** (Boeck.) Kük.
Sin.: *Carex glazioviana* Boeck.
Referencias: Kükenthal, G., 1909; Molfino, J. F., 1925a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hatschbach, G. 4316* (SI)].

[Carex hispida Willd. ex Schkuhr]
Sin.: *Carex pratensis* Phil., hom. Illeg, (1858)
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Notas: Especie excluida del área del proyecto, se considera que fue ocasionalmente introducida en Chile pero no existe actualmente en ese país.

Carex hookeri Kunth
Sin.: *Carex beecheyana* Boott ex E. Desv.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VIII, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Carex huitensis Steud. = **Carex distenta** Kunze ex Kunth

Carex humahuacaensis G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 1989a.
Hierba. Perenne. Endémica. 3700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruthsatz, B. 340/1* (NY), *Ulibarri, E. A. 693* (SI)].

Carex hypoleucos auct. non E. Desv. = **Carex macrorrhiza** Boeck.
Referencias: Wheeler, G. A., 2006.

Carex hypoleucos E. Desv.
Sin.: *Carex kurtziana* Kük., *Carex nebularum* Phil. var. *kurtziana* (Kük.) Kük.
Referencias: Wheeler, G. A., 1996a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2300 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(VIII, IX, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*O'Donell, C. A. 3845* (LIL)]; CHL[*Teillier A., S. 2477* (CONC)].

Carex hypoxanthos Steud. = **Carex brongniartii** Kunth
Referencias: Gunckel, L. H., 1948.

Carex hypoxanthus Steud. = **Carex brongniartii** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex hypsipedos C.B. Clarke
Sin.: *Carex phalaroides* Kunth var. *parvula* R. Gross, *Carex umbellata* Schkuhr ex Willd. var. *depressa* Kük.
Referencias: Wheeler, G. A., 1988a.
Hierba. Perenne. Nativa. 3200–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 6642* (LIL)].

Carex inciso-dentata Steud. = **Carex macloviana** d'Urv. var. **macloviana**
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex incompta Franch. = **Carex darwinii** Boott var. **darwinii**
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex inconspicua Steud.
Referencias: Wheeler, G. A. & Zöllner, O., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2800 m.
Países: ARG(LRI); CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jiménez s.n.* (CORD, MIN, MO)]; CHL[*Lechler, W. 695* (GH, K, MICH, P, S, UPS)].

Carex inconspicua Steud. var. *fuscula* (d'Urv.) Kük. = **Carex fuscula** d'Urv. subsp. **fuscula**

Carex incrassata Schltdl. = **Carex chilensis** Brongn. ex Duperrey

Carex incurva auct. non Lightf. = **Carex camptoglochin** V.I. Krecz.

Carex incurva Lightf. = **Carex maritima** Gunnerus
Referencias: Moore, D. M., 1983.

Carex incurva Lightf. var. *melanocystis* (E. Desv.) Kük. = **Carex maritima** Gunnerus
Referencias: Moore, D. M. & Chater, A. D., 1971.

Carex incurva Lightf. var. *misera* (Phil.) Kük. = **Carex maritima** Gunnerus
Referencias: Moore, D. M. & Chater, A. D., 1971.

Carex indecora auct. non Kunth = **Carex distenta** Kunze ex Kunth

Carex indecora Kunth = **Carex fuscula** d'Urv. f. **indecora** (Kunth) Kük.

Carex indecora Kunth var. *humilis* Kunth = **Carex fuscula** d'Urv. subsp. **fuscula**
Referencias: Barros, M., 1969a.

Carex involucrata Boeck. = **Carex aureolensis** Steud.
Referencias: Ford, B. A. & Reznicek, A. A., 2002.

Carex involucrata Boott, hom. illeg. = **Carex fossa** G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 2002b.

Carex involucrata Steud. ex Lechl., nom. nud. = **Carex lateriflora** Phil.
Referencias: Wheeler, G. A., 1989b.

Carex involucrata Boott var. *angustata* Kük. = **Carex uruguensis** Boeck.

Carex involucrata Boott var. *pseudobracteosa* Kük. = **Carex sororia** Kunth var. **pseudobracteosa** (Kük.) Kük.
Referencias: Kükenthal, G., 1909.

Carex involucrata Boott var. *subdivulsa* Kük. = **Carex subdivulsa** (Kük.) G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 2002b.

Carex involucrata Boott var. *submuricata* C.B. Clarke ex Kük. = **Carex sororia** Kunth subsp. **sororia**

Carex kingii (Boott) Reznicek
Sin.: *Uncinia kingii* Boott
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Barros, M., 1969a; Reznicek, A. A., 1990; Wheeler, G. A., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–1000 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Alboff, N. 953* (LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92390* (CONC)].

Carex kurtziana Kük. = **Carex hypoleucos** E. Desv.

Carex lamprocarpa Phil.
Referencias: Wheeler, G. A., 1988b.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zoellner, O. 2913* (CONC)].

Carex lamprocarpa Phil. var. *rotundata* Kük. = **Carex poeppigii** C.B. Clarke ex G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 1988b.

Carex lateriflora Phil.
Sin.: *Carex involucrata* Steud. ex Lechl., nom. nud., *Carex reicheana* Boeck., *Carex trichodes* Steud. ex Boott var. *lateriflora* (Phil.) Kük., *Carex trichodes* Steud. ex Boott var. *major* Kük.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Wheeler, G. A., 1989b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 1595-24* (SI)]; CHL[*Sparre, B. B. 4794* (S, SGO)].

Carex latibracteolata Kük. = **Carex catamarcensis** C.B. Clarke ex Kük.
Referencias: Kükenthal, G., 1909.

Carex lechleri Phil., hom. illeg. = **Carex atropicta** Steud.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Wheeler, G. A., 1990.

Carex lechleri Steud. = **Carex excelsa** Poepp. ex Kunth

Carex lemaniana auct. non Boott = **Carex catamarcensis** C.B. Clarke ex Kük.
Referencias: Barros, M., 1935.

[Carex leporina L.]
Referencias: Barros, M., 1935.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Carex leporina auct. non L., p.p. = **Carex atropicta** Steud.
Referencias: Kükenthal, G., 1909; Wheeler, G. A., 1990.

Carex leporina auct. non L., p.p. = **Carex macloviana** d'Urv. var. **pseudoleporina** Kük.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex leporina L. var. *elatior* Boeck. = **Carex macloviana** d'Urv. var. **pseudoleporina** Kük.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex leucocarpa Phil. = **Carex macloviana** d'Urv. var. **pseudoleporina** Kük.
Referencias: Barros, M., 1969a.

Carex longii Mack. var. *meridionalis* (Kük.) G.A. Wheeler = **Carex longii** Mack. subsp. **meridionalis** (Kük.) Luceño & M.V. Alves
Referencias: Luceño, M., 1999.

Carex longii Mack. subsp. **meridionalis** (Kük.) Luceño & M.V. Alves
Sin.: *Carex albolutescens* Schwein. var. *meridionalis* Kük., *Carex longii* Mack. var. *meridionalis* (Kük.) G.A. Wheeler, *Carex meridionalis* (Kük.) Herter
Referencias: Barros, M., 1960; Luceño, M., 1999; Wheeler, G. A., 1987a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CLA, COL, LAV, MAL, RNO, RIV, ROC, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2893* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 9422* (GH, MO)]; URY[*Herter, W. G. F. 1667* (F, GH, MO, US)].

Carex lorentziana Griseb. = **Carex boliviensis** Van Heurck & Müll. Arg.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex macella Kunth = **Carex phalaroides** Kunth var. **macella** (Kunth) Kük.
Referencias: Barros, M., 1960.

Carex macloviana d'Urv. f. *bracteata* Kük. = **Carex macloviana** d'Urv. var. **macloviana**

Carex macloviana d'Urv. var. *incrassata* Kük. = **Carex macloviana** d'Urv. var. **thermarum** (Phil.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex macloviana d'Urv. var. **macloviana**
Sin.: *Carex allomacros* Steud., *Carex festiva* Dewey, *Carex inciso-dentata* Steud., *Carex macloviana* d'Urv. f. *bracteata* Kük., *Carex ovalis* auct. non Gooden., *Carex pratensis* Phil., hom. illeg. (1896), *Carex propinqua* Nees & Meyen
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a; Moore, D. M. & Chater, A. D., 1971; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3800 m.
Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF, TUC); CHL(X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 1160* (SI)]; CHL[*Montero, G. 1004* (CONC)].

Carex macloviana d'Urv. var. **pseudoleporina** Kük.
Sin.: *Carex leporina* auct. non L., p.p., *Carex leporina* L. var. *elatior* Boeck., *Carex leucocarpa* Phil.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Illin, N. 108* (SI)]; CHL[*Joseph, F. C. 5547* (CONC)].

Carex macloviana d'Urv. var. **thermarum** (Phil.) Kük.
Sin.: *Carex macloviana* d'Urv. var. *incrassata* Kük., *Carex thermarum* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Barros, M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, TUC); CHL(V, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 7580* (LIL)]; CHL[*Barros, E. s.n.* (CONC)].

Carex macrocarpa Phil. = **Carex macrosolen** Steud.
Referencias: Barros, M., 1969a; Wheeler, G. A., 1987b.

Carex macrolepis Decne., nom. nud. = **Uncinia macrolepis** Decne.
Referencias: Boelcke, O., Correa, M. N., Moore, D. M. & Roig, F. A., 1985.

Carex macrorrhiza Boeck.
Sin.: *Carex bonplandii* auct. non Kunth, *Carex curvifolia* Boeck., *Carex hypoleucos* auct. non E. Desv., *Carex macrorrhiza* Boeck. var. *simplex* Kük.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a; Herter, W. G. F., 1949–1956; Wheeler, G. A., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4200 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SCR, TUC); CHL(I); URY(RIV, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 600* (CORD, S)]; CHL[*Ruthsatz, B. 8430* (MIN)]; URY[*Herter, W. G. F. 1666* (MVM)].

Carex macrorrhiza Boeck. var. *simplex* Kük. = **Carex macrorrhiza** Boeck.
Referencias: Wheeler, G. A., 2006.

Carex macrosolen Steud.
Sin.: *Carex macrocarpa* Phil.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a; Wheeler, G. A., 1987b, 1988d, 2002a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goodall, N. 1988* (MICH, NA, RNG)]; CHL[*Moore, D. M. 2220* (BAB, NA, RNG, UPS)].

Carex magellanica Lam.
Sin.: *Carex atrata* L. var. *magellanica* (Lam.) Wahlenb., *Carex cernua* Phil., hom. illeg.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a; Chater, A. O., 1980; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grondona, E. M. 4392* (LIL)]; CHL[*Montero, G. 11462* (CONC)].

Carex malmei Kalela
Referencias: Kalela, A. A. A., 1940; Wheeler, G. A., 1990.
Hierba. Perenne. Endémica. 2600–4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(III, IV, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1435* (SI)]; CHL[*Johnston, I. M. 6029* (GH, NY)].

Carex mandoniana Boeck.
Referencias: Boeckeler, J. O., 1896.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 481* (LIL)].

Carex marcida auct. non Boott = **Carex praegracilis** W. Boott

Carex maritima Gunnerus
Sin.: *Carex incurva* Lightf., *Carex incurva* Lightf. var. *melanocystis* (E. Desv.) Kük., *Carex incurva* Lightf. var. *misera* (Phil.) Kük., *Carex melanocystis* E. Desv., *Carex melanocystis* E. Desv. var. *misera* (Phil.) Kük., *Carex misera* Phil., *Carex psammogaea* Steud.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Barros, M., 1963; Moore, D. M. & Chater, A. D., 1971; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–4200 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, SCR, SJU, TDF, TUC); CHL(I, II, III, IV, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 6075* (LIL)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 94073* (CONC)].

Carex melanocystis E. Desv. = **Carex maritima** Gunnerus
Referencias: Moore, D. M. & Chater, A. D., 1971.

Carex melanocystis E. Desv. var. *misera* (Phil.) Kük. = **Carex maritima** Gunnerus
Referencias: Moore, D. M. & Chater, A. D., 1971.

Carex melanolepis Phil. = **Carex chillanensis** Phil.

Carex meridionalis (Kük.) Herter = **Carex longii** Mack. subsp. **meridionalis** (Kük.) Luceño & M.V. Alves
Referencias: Luceño, M., 1999.

Carex microglochin Wahlenb.
Referencias: Wheeler, G. A. & Guaglianone, E. R., 2003b.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–4100 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC); CHL(IV, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 31756* (SI)]; CHL[*Ruthsatz, B. 6508* (MIN)].

Carex microglochin Wahlenb. var. *oligantha* (Boott) Kük. = **Carex camptoglochin** V.I. Krecz.
Referencias: Barros, M., 1969a; Wheeler, G. A. & Guaglianone, E. R., 2003b.

Carex microglochin Wahlenb. subsp. *fuegina* Kük. = **Carex camptoglochin** V.I. Krecz.
Referencias: Wheeler, G. A. & Guaglianone, E. R., 2003b.

Carex minutissima Barros
Referencias: Barros, M., 1969a; Wheeler, G. A., 1985–1986, 1989b; Zöllner, O. & Nilo S., M., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1700 m.
Países: ARG(NEU, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 305* (BAB, SI)]; CHL[*Dollenz, O. 768* (HIP)].

Carex misera Phil. = **Carex maritima** Gunnerus
Referencias: Moore, D. M. & Chater, A. D., 1971.

Carex moelleri Phil. = **Carex berteroana** E. Desv.

Carex moesta Kunth = **Carex phalaroides** Kunth subsp. **moesta** (Kunth) Luceño & M.V. Alves
Referencias: Luceño, M., 1999.

Carex molinae Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 2200–2400 m.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zoellner, O. 3632* (CONC)].

Carex monodynama (Griseb.) G.A. Wheeler
Sin.: *Carex atropicta* Steud. f. *monodynama* (Griseb.) Kük., p.p., *Carex atropicta* Steud. f. *pallescens* (Kurtz ex Kük.) Kük., *Carex atropicta* Steud. var. *monodynama* Griseb., *Carex atropicta* Steud. var. *pallescens* Kurtz ex Kük.
Referencias: Wheeler, G. A., 1990.
Hierba. Perenne. Endémica. 2600–2900 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 776* (F, GOET)].

Carex moorei G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 1988c.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–800 m.
Países: ARG(SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*T.B.P.A. 2436* (BAB, HIP, MIN, RNG)]; CHL[*T.B.P.A. 790* (HIP, RNG)].

Carex muehlenbergii Brongn., hom. illeg. = **Carex brongniartii** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

[Carex muelleri Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

Carex multispicata Kunze ex Kunth
Sin.: *Carex acutata* Boott var. *multispicata* (Kunze ex Kunth) Kük.
Referencias: Kükenthal, G., 1909; Wheeler, G. A., 1988b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Poeppig, E. F. 247* (B)].

Carex nebularum Phil.
Sin.: *Carex propinqua* auct. non Nees & Meyen, *Carex pycnostachya* auct. non Kar. & Kir.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Barros, M., 1947, 1969a; Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Wheeler, G. A., 1996a.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–2200 m.
Países: ARG(CHU, COR, JUJ, MEN, NEU, SCR, TUC); CHL(VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 9720* (SI)]; CHL[*Finot, V. L. 1900* (CONC)].

Carex nebularum Phil. f. *major* (Kük.) Kük. = **Carex firmicaulis** Kalela
Referencias: Kalela, A. A. A., 1940.

Carex nebularum Phil. var. *kurtziana* (Kük.) Kük. = **Carex hypoleucos** E. Desv.

Carex nelmesiana Barros
Sin.: *Carex andina* Phil. var. *subabscondita* Kük., p.p.
Referencias: Barros, M., 1969a; Wheeler, G. A., 1986b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 4744* (BAB, SI)].

Carex niederleiniana Boeck.
Sin.: *Carex acutata* Boott var. *hirtisquama* Kük., *Carex acutata* Boott var. *niederleiniana* (Boeck.) Kük.
Referencias: Wheeler, G. A., 1996a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2100 m.
Países: ARG(CAT, LRI, RNE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4648* (BA, LIL)].

Carex nigra auct. non (L.) Reichard = **Carex chillanensis** Phil.

Carex nitens Phil. = **Carex gayana** E. Desv. var. **gayana**

Carex ochrostachya Phil.
Referencias: Philippi, R. A., 1896.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ortega, P. s.n.* (SGO)].

Carex odontolepis Phil.
Sin.: *Carex banksii* Boott var. *odontolepis* (Phil.) Kük., *Carex promaucana* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–2300 m.
Países: ARG(CHU); CHL(VI, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*sin colector s.n.* (BAF)]; CHL[*Gay, C. s.n.* (SGO)].

[Carex oederi Retz. var. cataractae (R. Br.) Kük.]
Sin.: *Carex cataractae* R. Br.
Referencias: Nelmes, E., 1955.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Carex oligantha Phil., hom. illeg.]
Notas: Nombre dudoso.

Carex oligantha Boott = **Carex camptoglochin** V.I. Krecz.
Referencias: Barros, M., 1969a; Wheeler, G. A. & Guaglianone, E. R., 2003b.

Carex ortegae Phil. = **Carex caduca** Boott
Referencias: Wheeler, G. A., 1989b.

Carex otrubae Podp.
Referencias: Marchesi, E., 1984.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–100 m.
Países: URY(MON).
Ejemplares de referencia: URY[*Rosengurtt, B. 7761* (MVFA)].

Carex ovalis auct. non Gooden. = **Carex macloviana** d'Urv. var. **macloviana**
Referencias: Moore, D. M., 1983.

Carex ovata Burm. f. = **Abildgaardia ovata** (Burm. f.) Kral
Referencias: Kral, R., 1971.

Carex pampae Kalela, p.p. = **Carex atropicta** Steud.
Referencias: Wheeler, G. A., 1986a.

Carex pampae Kalela, p.p. = **Carex subantarctica** Speg.
Referencias: Wheeler, G. A., 1986a, 1990.

Carex paraguayensis Maury = **Carex phalaroides** Kunth subsp. **paraguayensis** (Maury) Luceño & M.V. Alves
Referencias: Luceño, M., 1999.

Carex patagonica Speg.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a; Kalela, A. A. A., 1940.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–1800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2864* (SI)].

Carex pedicellata Phil. = **Carex decidua** Boott
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex peraltae Phil. = **Carex atropicta** Steud.
Referencias: Wheeler, G. A., 1990.

Carex phalaroides auct. non Kunth = **Carex sellowiana** Schltdl.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex phalaroides Kunth var. **capitellata** (Boeck.) Kük.
Sin.: *Carex capitellata* Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 970* (*)].

Carex phalaroides Kunth var. *crassiflora* Kük. = **Carex phalaroides** Kunth subsp. **crassiflora** (Kük.) Luceño & M.V. Alves
Referencias: Luceño, M., 1999.

Carex phalaroides Kunth var. **elongata** Kük.
Referencias: Kükenthal, G., 1909.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC); URY(FLA, MAL, MON, SAO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Smith, L. B. 7691* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 5289pee* (MVFA)].

Carex phalaroides Kunth var. **humilis** Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960.
Hierba. Perenne. Nativa. 1400–1600 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 7828* (HBR, US)].

Carex phalaroides Kunth var. **macella** (Kunth) Kük.
Sin.: *Carex macella* Kunth
Referencias: Barros, M., 1960.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LRI); BRA(RGS, SCA); URY(SOR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2729* (HBR, SI)]; URY[*Osten, C. 2878* (MVM)].

Carex phalaroides Kunth var. *moesta* (Kunth) Kük. = **Carex phalaroides** Kunth subsp. **moesta** (Kunth) Luceño & M.V. Alves
Referencias: Luceño, M., 1999.

Carex phalaroides Kunth var. *paraguayensis* (Maury) Kük. = **Carex phalaroides** Kunth subsp. **paraguayensis** (Maury) Luceño & M.V. Alves
Referencias: Luceño, M., 1999.

Carex phalaroides Kunth var. *parvula* R. Gross = **Carex hypsipedos** C.B. Clarke
Referencias: Wheeler, G. A., 1988a.

Carex phalaroides Kunth subsp. **crassiflora** (Kük.) Luceño & M.V. Alves
Sin.: *Carex gibertii* G.A. Wheeler, *Carex phalaroides* Kunth var. *crassiflora* Kük.
Referencias: Kükenthal, G., 1909; Luceño, M., 1999; Wheeler, G. A., 1996c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, MIS); BRA(RGS); URY(MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Stuckert, T. J. V. 21543* (LIL)]; BRA[*Sacco, J. C. 404* (F)]; URY[*Gibert, J. E. 593* (MVM, S)].

Carex phalaroides Kunth subsp. **moesta** (Kunth) Luceño & M.V. Alves
Sin.: *Carex moesta* Kunth, *Carex phalaroides* Kunth var. *moesta* (Kunth) Kük.
Referencias: Barros, M., 1960; Kükenthal, G., 1909; Luceño, M., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(MON, SAO).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 7335* (HBR, US)]; URY[*Chebataroff, J. 1973* (SI)].

Carex phalaroides Kunth subsp. **paraguayensis** (Maury) Luceño & M.V. Alves
Sin.: *Carex paraguayensis* Maury, *Carex phalaroides* Kunth var. *paraguayensis* (Maury) Kük.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Luceño, M., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA); PRY(CAU); URY(CAS, FLA, MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2516* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 7706* (HBR, US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 2639* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 902* (MVM)].

Carex phalaroides Kunth subsp. **phalaroides**
Sin.: *Carex chlorolepis* Steud., *Carex schenkiana* Boeck., *Uncinia phalaroides* (Kunth) Nees
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Luceño, M., 1999; Marchesi, E., 1984; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS); CHL(V, VIII, IX, X); PRY(sin localidad); URY(CAS, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 3090* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 37760* (PACA)]; CHL[*Zoellner, O. 10495* (CONC)]; URY[*Herter, W. G. F. 905* (MVM)].

Carex phleoides Cav. = **Uncinia phleoides** (Cav.) Pers.
Referencias: Barros, M., 1969a.

Carex pisanoi G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 1987b, 2002a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pisano, E. 4214* (HIP)].

Carex pissisii Phil. = **Carex setifolia** Kunze ex Kunth

Carex pleioneura G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 1987a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1900–3300 m.
Países: ARG(SJU); CHL(I, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Herb. Cat. Geobotan. 10085* (SI)]; CHL[*Looser, G. 2141* (GH)];

Carex poeppigii C.B. Clarke ex G.A. Wheeler
Sin.: *Carex lamprocarpa* Phil. var. *rotundata* Kük.
Referencias: Wheeler, G. A., 1988b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Poeppig, E. F. 247* (BM, P)].

Carex polystachya Sw. ex Wahlenb.
Sin.: *Carex cladostachya* Wahlenb., *Carex cladostachya* Wahlenb. var. *maxima* Kük.
Referencias: Barros, M., 1947; McVaugh, R., 1993.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–1400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 5451* (SI)].

Carex polysticha Boeck.
Sin.: *Carex excelsa* auct. non Poepp. ex Kunth, *Carex pseudocyperus* auct. non L., *Carex pseudocyperus* L. var. *platygluma* C.B. Clarke ex Kük., *Carex pseudocyperus* L. var. *polysticha* (Boeck.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1947; Chater, A. O., 1994; Herter, W. G. F., 1949–1956; Marchesi, E., 1984.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MEN, MIS, NEU, RNE, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA); URY(CLA, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2890* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 15760* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 31392* (CTES)]; URY[*Herter, W. G. F. 595* (MVM)].

Carex potamostauros Steud. = **Carex aematorhyncha** E. Desv. var. **aematorhyncha**
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex praegracilis W. Boott
Sin.: *Carex marcida* auct. non Boott
Referencias: Kükenthal, G., 1909.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 1773* (GH, LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 2122* (MVFA)].

Carex pratensis Phil., hom. illeg. (1858) = **Carex hispida** Willd. ex Schkuhr

Carex pratensis Phil., hom. illeg. (1896) = **Carex macloviana** d'Urv. var. **macloviana**

Carex procera auct. non Kunth = **Carex chilensis** Brongn. ex Duperrey

Carex procera Kunth = **Carex brasiliensis** A. St.-Hil.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960.

Carex promaucana Phil. = **Carex odontolepis** Phil.

Carex propinqua auct. non Nees & Meyen = **Carex nebularum** Phil.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex propinqua Nees & Meyen = **Carex macloviana** d'Urv. var. **macloviana**
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex psammogaea Steud. = **Carex maritima** Gunnerus

Carex pseudocyperus auct. non L. = **Carex polysticha** Boeck.
Referencias: Kükenthal, G., 1909.

Carex pseudocyperus L. var. *haenkeana* auct. non (J. Presl & C. Presl) Kük. = **Carex excelsa** Poepp. ex Kunth

Carex pseudocyperus L. var. *lechleri* Boott = **Carex excelsa** Poepp. ex Kunth

Carex pseudocyperus L. var. *platygluma* C.B. Clarke ex Kük. = **Carex polysticha** Boeck.
Referencias: Barros, M., 1949, 1960.

Carex pseudocyperus L. var. *polysticha* (Boeck.) Kük. = **Carex polysticha** Boeck.
Referencias: Herter, W. G. F., 1949–1956.

Carex pseudocyperus L. subsp. *haenkeana* auct. non (J. Presl & C. Presl) Kük. = **Carex excelsa** Poepp. ex Kunth

Carex pseudoechinata Boeck. = **Carex uruguensis** Boeck.

Carex pseudopunctata Boeck. = **Carex distenta** Kunze ex Kunth

Carex pseudomacloviana G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 1996a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2900 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 3980* (MIN, SI)].

Carex psilostachys Steud. = **Carex excelsa** Poepp. ex Kunth

[Carex pulicaris L.]
Referencias: Barros, M., 1935.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Carex pumila Thunb.
Sin.: *Carex sepulta* Phil., *Carex urvillei* Brongn.
Referencias: Koyama, T. M., 1978b.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–400 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 2905* (SI)].

Carex pungens Boeck. = **Carex berteroana** E. Desv.

Carex purpureovaginata Boeck.
Sin.: *Carex sphaerogyna* Baker var. *brasiliensis* H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1960; Wheeler, G. A., 1996b.
Hierba. Perenne. Nativa. 1200–2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16091* (BREM, GH, MO)].

Carex pycnostachya auct. non Kar. & Kir. = **Carex nebularum** Phil.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex pycnostachya Kar. & Kir. var. *major* Kük. = **Carex firmicaulis** Kalela

Carex rahmeri Phil. = **Carex decidua** Boott
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex rahuiensis Kurtz ex V.I. Krecz. = **Carex capitata** L.
Referencias: Barros, M., 1969a.

Carex reicheana Boeck. = **Carex lateriflora** Phil.
Referencias: Wheeler, G. A., 1989b.

Carex reichei Kük.
Sin.: *Carex aueri* Kalela
Referencias: Barros, M., 1969a; Wheeler, G. A., 1988b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(CHU, SCR); CHL(VII, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12343* (BAB, MIN, SI)]; CHL[*Reiche, C. F. 514* (SGO)].

Carex riparia auct. non Curtis = **Carex fuscula** d'Urv. subsp. **fuscula**
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex riparia Curtis f. *incrassata* (Schltdl.) Kük. = **Carex chilensis** Brongn. ex Duperrey

Carex riparia Curtis var. *chilensis* (Brongn. ex Duperrey) Kük. = **Carex chilensis** Brongn. ex Duperrey

Carex riparia Curtis subsp. *chilensis* (Brongn. ex Duperrey) Kük. = **Carex chilensis** Brongn. ex Duperrey

Carex rupicola (Pedersen) G.A. Wheeler
Sin.: *Carex bonariensis* Desf. ex Poir. var. *rupicola* Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1969[1968]; Wheeler, G. A., 1996b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); URY(CAS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 7353* (LP)];

Carex sagei Phil. = **Carex fuscula** d'Urv. subsp. **fuscula**
Referencias: Barros, M., 1969a.

Carex saltaensis R. Gross
Referencias: Gross, R., 1941.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. s.n.* (US)].

Carex schedonautos Steud. = **Carex gayana** E. Desv. var. **schedonautos** (Steud.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex schenkiana Boeck. = **Carex phalaroides** Kunth subsp. **phalaroides**
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex seditiosa Steud. ex Boott = **Carex fecunda** Steud.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex sellowiana Schltdl.
Sin.: *Carex phalaroides* auct. non Kunth, *Carex sellowiana* Schltdl. var. *tenuis* Boeck., *Uncinia sellowiana* (Schltdl.) Nees

Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, GUA); URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MAL, RNO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1677* (SI)]; BRA[*Silva, J. C. 3977* (RB)]; PRY[*Schinini, A. 27780* (CTES)]; URY[*Herter, W. G. F. 1133* (MVM)].

Carex sellowiana Schltdl. var. *tenuis* Boeck. = **Carex sellowiana** Schltdl.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960.

Carex sepulta Phil. = **Carex pumila** Thunb.

Carex serranoi Phil. = **Carex darwinii** Boott var. **serranoi** (Phil.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex seticulmis Boeck.
Sin.: *Carex uleana* Boeck., *Uncinia phyllostachya* Nees
Referencias: Barros, M., 1960.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2451* (*)].

Carex setifolia Kunze ex Kunth
Sin.: *Carex pissisii* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2400 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 20051* (CONC, SGO)].

Carex setifolia Kunze ex Kunth var. *berteroana* (E. Desv.) Gunckel = **Carex berteroana** E. Desv.

Carex setifolia Kunze ex Kunth var. *colchaguensis* (Phil.) Kük. = **Carex berteroana** E. Desv.

Carex setifolia Kunze ex Kunth var. *neuquensis* Barros = **Carex andina** Phil.
Referencias: Wheeler, G. A. & Muñoz-Schick, M., 1990.

Carex setifolia Kunze ex Kunth var. *pungens* (Boeck.) Kük. = **Carex berteroana** E. Desv.

Carex similis d'Urv. = **Carex canescens** L. var. **robustior** Blytt ex Anderss.

[Carex skottsbergiana Kük.]
Referencias: Barros, M., 1935.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Carex skottsbergii Gand. = **Carex canescens** L. var. **robustior** Blytt ex Anderss.

Carex sorianoi Barros
Referencias: Barros, M., 1969a; Wheeler, G. A., 1988c.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–800 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 3297* (BAB)]; CHL[*Pisano, E. 8129* (CONC)].

Carex sororia auct. non Kunth = **Carex trachycystis** Griseb.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Carex sororia Kunth f. *subdivulsa* (Kük.) Kük. = **Carex subdivulsa** (Kük.) G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 2002b.

Carex sororia Kunth var. *involucrata* (Boott) Kük. = **Carex fossa** G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 2002b.

Carex sororia Kunth var. **pseudobracteosa** (Kük.) Kük.
Sin.: *Carex involucrata* Boott var. *pseudobracteosa* Kük.
Referencias: Wheeler, G. A., 2002b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 457* (*)].

Carex sororia Kunth subsp. **sororia**
Sin.: *Carex bonariensis* auct. non Desf. ex Poir., *Carex glomerata* auct. non Thunb., *Carex involucrata* Boott var. *submuricata* C.B. Clarke ex Kük.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Luceño, M., 1999; Marchesi, E., 1984; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MIS, RNE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI); URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5599* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 11028* (HBR, US)]; PRY[*Ramirez, J. R. 458* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 5350* (SI)].

Carex sororia Kunth subsp. *uruguensis* (Boeck.) Luceño & M.V. Alves = **Carex uruguensis** Boeck.
Referencias: Luceño, M., 1999.

Carex sphaerogyna Baker var. *brasiliensis* H. Pfeiff. = **Carex purpureovaginata** Boeck.
Referencias: Wheeler, G. A., 1996b.

Carex stenolepis Torr., hom. illeg. = **Carex frankii** Kunth

Carex subandrogyna G.A. Wheeler & Guagl.
Referencias: Wheeler, G. A. & Guaglianone, E. R., 2003a, 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2265* (MIN, SI)].

Carex subantarctica Speg.
Sin.: *Carex chubutensis* C.B. Clarke, *Carex pampae* Kalela, p.p.

Referencias: Barros, M., 1969a; Wheeler, G. A., 1986a, 1987b, 2002a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4218* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 2763* (CONC)].

Carex subdivulsa (Kük.) G.A. Wheeler
Sin.: *Carex involucrata* Boott var. *subdivulsa* Kük., *Carex sororia* Kunth f. *subdivulsa* (Kük.) Kük.
Referencias: Wheeler, G. A., 2002b.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–2800 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. 15000* (CORD, MIN, SI)].

Carex subfuegiana G.A. Wheeler
Sin.: *Carex ecuadorica* auct. non Kük.
Referencias: Wheeler, G. A., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grondona, E. M. 3567* (BAA, BAB, MIN, SI)].

Carex taurina Phil. = **Carex gayana** E. Desv. var. **rufa** Kük.

Carex tetrasticha Boeck. = **Carex brasiliensis** A. St.-Hil.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex thermarum Phil. = **Carex macloviana** d'Urv. var. **thermarum** (Phil.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex toroensis G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 1989b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*T.B.P.A. 1804* (HIP)].

Carex trachycystis Griseb.
Sin.: *Carex bonariensis* Desf. ex Poir. f. *remota* Kük., *Carex bonariensis* Desf. ex Poir. var. *remota* Kük., *Carex bonariensis* Desf. ex Poir. var. *trachycystis* (Griseb.) Kük., *Carex sororia* auct. non Kunth
Referencias: Barros, M., 1960; Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Herter, W. G. F., 1949–1956.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MEN, RNE, SDE, SFE, TUC); BRA(SCA); CHL(VIII); PRY(PHA); URY(MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 29769* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 7834* (HBR, US)]; CHL[*Barros, E. 2597* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 3540* (FCQ)]; URY[*Felippone, F. 4922bis* (SI)].

Carex transandina G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 1989b.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–600 m.
Países: CHL(XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*T.B.P.A. 779* (BAB)].

Carex trichodes Steud. ex Boott
Referencias: Wheeler, G. A., 1989b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Lechler, W. 3055* (G, K, P, S, UPS)].

Carex trichodes auct. non Steud. ex Boott = **Carex caduca** Boott
Referencias: Moore, D. M., 1983.

Carex trichodes Steud. ex Boott var. *lateriflora* (Phil.) Kük. = **Carex lateriflora** Phil.
Referencias: Wheeler, G. A., 1989b.

Carex trichodes Steud. ex Boott var. *major* Kük. = **Carex lateriflora** Phil.
Referencias: Wheeler, G. A., 1989b.

Carex trifida Franch., hom. illeg. = **Carex banksii** Boott var. **banksii**
Referencias: Barros, M., 1969a; Moore, D. M., 1983.

Carex trifida Cav.
Sin.: *Carex aristata* auct. non R. Br.
Referencias: Barros, M., 1969a; Marticorena, C., com. pers.; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Skottsberg, C. J. F. 68* (BA)].

Carex trifida Cav. var. *franchetii* Kurtz = **Carex banksii** Boott var. **banksii**
Referencias: Barros, M., 1969a; Moore, D. M., 1983.

Carex tucumanensis G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 1996a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 3193* (BAB, LIL, SI)].

Carex tweediana Nees
Referencias: Barros, M., 1947; Herter, W. G. F., 1949–1956; Marchesi, E., 1984; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Sin.: Hierba. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(COA); URY(CAS, COL, FLA, LAV, MON, RNO, RIV, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 3103* (SI)]; BRA[*Lindeman, J. C. s.n.* (ICN, NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 16662* (AS, MO)]; URY[*Herter, W. G. F. 1665* (MVM)].

Carex uleana Boeck. = **Carex seticulmis** Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960.

Carex umbellata Schkuhr ex Willd. var. *depressa* Kük. = **Carex hypsipedos** C.B. Clarke
Referencias: Wheeler, G. A., 1988a.

[Carex urbanii Boeck.]
Referencias: Barros, M., 1935.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Carex urolepis Franch. = **Carex darwinii** Boott var. **urolepis** (Franch.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1969a.

Carex uruguensis C.B. Clarke, hom. illeg. = **Carex uruguensis** Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex uruguensis Boeck.
Sin.: *Carex involucrata* Boott var. *angustata* Kük., *Carex pseudoechinata* Boeck., *Carex sororia* Kunth subsp. *uruguensis* (Boeck.) Luceño & M.V. Alves, *Carex uruguensis* Boeck. var. *angustata* (Kük.) Kük., *Carex uruguensis* Boeck. var. *pseudoechinata* (Boeck.) Kük., *Carex uruguensis* C.B. Clarke, hom. illeg.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Luceño, M., 1999; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS, TUC); BRA(RGS, SCA); URY(CAS, CLA, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6498* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 7355* (HBR, US)]; URY[*Herter, W. G. F. 1664* (MVM)].

Carex uruguensis Boeck. var. *angustata* (Kük.) Kük. = **Carex uruguensis** Boeck.

Carex uruguensis Boeck. var. *pseudoechinata* (Boeck.) Kük. = **Carex uruguensis** Boeck.

Carex urvillei Brongn. = **Carex pumila** Thunb.

Carex vacillans Steud. = **Carex chilensis** Brongn. ex Duperrey
Referencias: Gunckel, L. H., 1948.

Carex valdiviana Phil. = **Carex fuscula** d'Urv. subsp. **fuscula**
Referencias: Barros, M., 1969a.

Carex vallis-pulchrae Phil. var. **barrosiana** G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 1989b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 1846* (BAB)]; CHL[*Roivainen, H. s.n.* (H)].

Carex vallis-pulchrae Phil. var. **vallis-pulchrae**
Sin.: *Carex castellanosii* Barros
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Barros, M., 1969a; Wheeler, G. A., 1989b.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU); CHL(III, IV, VI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11367* (BAB, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92558* (CONC)].

Carex vixdentata (Kük. ex Osten) G.A. Wheeler
Sin.: *Carex extensa* Gooden. var. *vixdentata* Kük.
Referencias: Barros, M., 1947; Luceño, M., 1999; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Wheeler, G. A., 1988b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, RNE, SFE); BRA(RGS); PRY(CAA); URY(CAS, MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sparre, B. B. 5502* (LIL)]; BRA[*Carvalhal, C. M. s.n.* (PACA, PEL)]; PRY[*Zardini, E. M. 3027* (MO, SI)]; URY[*Osten, C. 5229* (MVM)].

Carex vulgaris R.E. Fr. = **Carex chillanensis** Phil.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex vulgaris R.E. Fr. var. *antucensis* Kük. = **Carex decidua** Boott
Referencias: Barros, M., 1947.

Carex werdermannii Gross
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hollermayer, A. 1305* (CONC)].

Carpha Banks & Sol. ex R. Br.

Número de especies: 1

[Carpha alpina R. Br.]
Sin.: *Chaetospora alpina* (R. Br.) F. Muell., *Rhynchospora alpina* (R. Br.) Spreng.
Referencias: Zhang, X. C., Wilson, K. L. & Bruhl, J. J., 2006.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Carpha alpina R. Br. var. *schoenoides* (Banks & Sol. ex Hook. f.) Kük. = **Carpha schoenoides** Banks & Sol. ex Hook. f.
Referencias: Gunckel, L. H., 1971.

Carpha andina Phil. = **Schoenus andinus** (Phil.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carpha antarctica (Hook. f.) C.B. Clarke = **Schoenus antarcticus** (Hook. f.) Dusén
Referencias: Barros, M., 1947.

Carpha laxa (Hook. f.) Macloskie = **Schoenus rhynchosporoides** (Steud.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carpha paniculata Phil. = **Schoenus rhynchosporoides** (Steud.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1947.

Carpha schoenoides Banks & Sol. ex Hook. f.
Sin.: *Carpha alpina* R. Br. var. *schoenoides* (Banks & Sol. ex Hook. f.) Kük., *Carpha viridis* Phil.
Referencias: Zhang, X. C., Wilson, K. L. & Bruhl, J. J., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 738* (SI)]; CHL[*Hicken, C. M. s.n.* (SI)].

Carpha viridis Phil. = **Carpha schoenoides** Banks & Sol. ex Hook. f.
Referencias: Gunckel, L. H., 1971.

Cephaloschoenus globosus (Kunth) Nees = **Rhynchospora globosa** (Kunth) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1947; Kükenthal, G., 1949.

Cephaloschoenus pohlianus Nees = **Rhynchospora globosa** (Kunth) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1960; Kükenthal, G., 1949, 1950–1952.

Cephaloschoenus polycephalus (Pers.) Nees = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
Referencias: Guaglianone, E. R., 1981; Koyama, T. M., 1972.

Chaetocyperus albibracteatus (Nees & Meyen ex Kunth) Nees & Meyen = **Eleocharis albibracteata** Nees & Meyen ex Kunth

Chaetocyperus baldwinii Chapm. = **Eleocharis baldwinii** (Torr.) Chapm.

Chaetocyperus bonariensis (Nees) Nees = **Eleocharis bonariensis** Nees
Referencias: Barros, M., 1947.

Chaetocyperus capillaceus (Kunth) Nees = **Eleocharis capillacea** Kunth
Referencias: Barros, M., 1960.

Chaetocyperus costulatus (Nees & Meyen) Nees = **Eleocharis radicans** (Poir.) Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Chaetocyperus obtusatus Nees = **Eleocharis bonariensis** Nees
Referencias: Barros, M., 1947.

Chaetocyperus polymorphus Nees & Lindl., p.p. = **Eleocharis minima** Kunth
Referencias: Barros, M., 1960; Svenson, H. K., 1957.

Chaetocyperus punctatus Nees = **Eleocharis nana** Kunth
Referencias: Barros, M., 1960.

Chaetocyperus stoloniferus Nees = **Eleocharis dombeyana** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Chaetocyperus subarticulatus Nees = **Eleocharis subarticulata** (Nees) Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960.

Chaetosperma rhynchospermoides F. Phil. = **Schoenus rhynchosporoides** (Steud.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1945.

Chaetospora alpina (R. Br.) F. Muell. = **Carpha alpina** R. Br.

Chaetospora antarctica Hook. f. = **Schoenus antarcticus** (Hook. f.) Dusén
Referencias: Barros, M., 1947.

Chaetospora globosa Kunth = **Rhynchospora globosa** (Kunth) Roem. & Schult.
Referencias: Kükenthal, G., 1949.

Chaetospora laxa Hook. f. = **Schoenus rhynchosporoides** (Steud.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1947.

Chaetospora rhynchosporoides Steud. = **Schoenus rhynchosporoides** (Steud.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1947.

Chillania pusilla Roiv. = **Eleocharis uniflora** Seberg
Referencias: Seberg, O., 1985.

Chlorocharis capitata (R. Br.) Rikli = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Referencias: Koyama, T. M., 1961.

Chlorocyperus balansae (Maury) Palla = **Cyperus impolitus** Kunth
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Chlorocyperus cordobensis Palla = **Cyperus corymbosus** Rottb. var. **subnodosus** (Nees & Meyen) Kük.
Referencias: Barros, M., 1960.

Chlorocyperus giganteus (Vahl) Palla = **Cyperus giganteus** Vahl
Referencias: Barros, M., 1947.

Chlorocyperus laevigatus (L.) Palla = **Cyperus laevigatus** L.
Referencias: Barros, M., 1947.

Chlorocyperus oostachyus (Nees) Palla = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens**
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Chlorocyperus paranaguensis Palla = **Cyperus meyenianus** Kunth

Chlorocyperus phymatodes (Mühlenb.) Palla = **Cyperus esculentus** L. var. **leptostachyus** Boeck.
Referencias: Kükenthal, G., 1935–1936.

Chlorocyperus rotundus (L.) Palla = **Cyperus rotundus** L.
Referencias: Kükenthal, G., 1935–1936.

Chlorocyperus serrae Palla = **Cyperus impolitus** Kunth
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Chondrolomia sellowiana (Kunth) Nees = **Scleria sellowiana** Kunth

Referencias: Barros, M., 1947, 1960.

Cladium P. Browne

Número de especies: 1

Cladium effusum Torr. = **Cladium jamaicense** Crantz
Referencias: Ahumada, O., 1985.

Cladium ensifolium (Boeck.) Benth. = **Machaerina ensifolia** (Boeck.) T. Koyama
Referencias: Strong, M. T., 1997.

Cladium ensifolium (F. Phil.) H. Pfeiff. = **Machaerina scirpoidea** (Steud.) T. Koyama
Referencias: Strong, M. T., 1997.

Cladium ficticium Hemsl. = **Machaerina ficticia** (Hemsl.) T. Koyama

Cladium jamaicense Crantz
Sin.: *Cladium effusum* Torr., *Cladium mariscus* (L.) Pohl subsp. *jamaicense* (Crantz) Kük., *Mariscus jamaicense* (Crantz) Britton, *Rhynchospora arundinacea* Boeck.
Referencias: Ahumada, O., 1985; Barros, M., 1960; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: ARG(COS, SAL); BRA(PAR, SCA); PRY(APY); URY(CAS, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 2725* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 17051* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2280* (SI)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 24* (SI)].

Cladium mariscus (L.) Pohl subsp. *jamaicense* (Crantz) Kük. = **Cladium jamaicense** Crantz
Referencias: Ahumada, O., 1985.

Cladium scirpoideum (Steud.) Benth. & Hook. f. ex Hemsl. = **Machaerina scirpoidea** (Steud.) T. Koyama
Referencias: Strong, M. T., 1997.

Comostemon globuliferum (J. Presl & C. Presl) Nees = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1938.

Comostemon montevidense (Link) Nees = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1947.

Comostemon schottii Nees = **Cyperus prolixus** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Cryptangium tenuifolium Boeck. = **Lagenocarpus rigidus** (Kunth) Nees subsp. **tenuifolius** (Boeck.) T. Koyama & Maguire
Referencias: Koyama, T. M. & Maguire, B., 1965.

Cryptangium triquetum Boeck. = **Lagenocarpus triqueter** (Boeck.) Kuntze

Cyperus L.

Número de especies: 68, 10 endémicas, 4 introducidas

Cyperus achalensis Hieron. = **Cyperus andinus** Palla ex Kük.
Referencias: Barros, M., 1938; Tucker, G. C., 1994.

Cyperus acicularis (Nees) Steud. = **Cyperus odoratus** L.
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

Cyperus acutangulus Boeck. = **Cyperus virens** Michx. var. **virens**
Referencias: Barros, M., 1947, 1960.

Cyperus adenophorus Schrad. = **Cyperus haspan** L. var. **haspan**

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. var. **aggregatus**
Sin.: *Cyperus argentinus* Boeck., *Cyperus cayennensis* (Lam.) Britton, nom. illeg., *Cyperus flavomariscus* Griseb., *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *aggregatus* (Willd.) Kük., *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *angustatus* Kük., *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *argentinus* (Boeck.) Kük. ex Osten, *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *laevis* (Kunth) Kük., *Cyperus flavus* (Vahl) Nees, nom. illeg., *Didymia cyperomorpha* Phil., *Kyllinga cayennensis* Lam., *Mariscus aggregatus* Willd., *Mariscus cayennensis* (Lam.) Urb., *Mariscus flavus* Vahl
Referencias: Adams, C. D., 1994e; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; McVaugh, R., 1993; Philippi, R. A., 1887; Tucker, G. C., 1985a, 1994; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VIII); PRY(APY, APA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE); URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 1503* (SI), *Deginani, N. B. 1392* (SI), *Pedersen, T. M. 9647b* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 29246* (SI), *Hatschbach, G. 6772* (SI), *Reitz, P. R. 11851* (SI)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)]; PRY[*Pedersen, T. M. 9290* (SI)]; URY[*Cabrera, A. 3264* (SI), *Rosengurtt, B. 805* (SI)].

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. var. **gigas** (Lindm.) Guagl.
Sin.: *Cyperus cayennensis* (Lam.) Britton var. *gigas* (Lindm.) Barros, *Cyperus cayennensis* (Lam.) Britton var. *umbellato-flavus* (C.B. Clarke) Barros, *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *gigas* (Lindm.) Kük., *Cyperus retrorsus* Chapm. var. *australis* (Lindm.) Kük., *Mariscus cylindricus* Elliot var. *australis* Lindm., *Mariscus flavus* Vahl f. *umbellato-flava* C.B. Clarke, *Mariscus flavus* Vahl var. *gigas* Lindm.

Referencias: Guaglianone, E. R., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CEN, COA, GUA); URY(PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 3192* (SI), *Schulz, A. G. 10979* (SI)]; BRA[*Riedel, L. 896* (SI), *Sehnem, A. 1581* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4572* (SI), *Pedersen, T. M. 9447* (SI), *Rojas, T. 13937* (SI)]; URY[*Chebataroff, J. 8454* (SI), *Rosengurtt, B. 4621* (SI)].

Cyperus albomarginatus (Mart. & Schrad. ex Nees) Steud. = **Pycreus flavicomus** (Michx.) C.D. Adams
Referencias: Adams, C. D., 1991; Tucker, G. C., 1985b.

Cyperus albomarginatus (Mart. & Schrad. ex Nees) Steud. var. *pachyanthemos* Kük. = **Pycreus flavicomus** (Michx.) C.D. Adams
Referencias: Adams, C. D., 1991; Tucker, G. C., 1985b.

Cyperus albomarginatus (Mart. & Schrad. ex Nees) Steud. var. *sabulosus* (Mart. & Schrad. ex Nees) Kük. = **Pycreus flavicomus** (Michx.) C.D. Adams
Referencias: Adams, C. D., 1991; Tucker, G. C., 1985b.

[Cyperus alternifolius L.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cyperus alternifolius auct. non L. = **Cyperus involucratus** Rottb.

Cyperus americanus (Boeck.) Palla = **Cyperus haspan** L. var. **haspan**
Referencias: Tucker, G. C., 1998.

Cyperus amplissimus Steud. = **Cyperus prolixus** Kunth
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

Cyperus andinus Palla ex Kük.
Sin.: *Cyperus achalensis* Hieron., *Cyperus seslerioides* auct. non Kunth
Referencias: Barros, M., 1938, 1947; Tucker, G. C., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4100 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 508* (SI), *Morrone, O. 2608* (SI)].

Cyperus andreanus Maury var. **andreanus**
Referencias: Araújo, A. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1996; Barros, M., 1960.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 10496* (SI)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o material de referencia. Su presencia es probable en el estado de Paraná, Brasil (M. Barros, 1960; Araujo & Longhi-Wagner, 1996).

Cyperus andreanus Maury var. **capitinduensis** (Maury) Kük.
Sin.: *Cyperus capitinduensis* Maury, *Cyperus ferrugineus* Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–900 m.
Países: ARG(JUJ, MIS); BRA(SCA); PRY(APA, CAA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2824* (SI), *Guaglianone, E. R. 2889* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 7898* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 26961* (CTES)].

Cyperus andreanus Maury var. **foliosissimus** (Boeck.) Kük.
Sin.: *Cyperus foliosissimus* Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Niederlein, G. 2120* (*)].

Cyperus andreanus Maury var. **yguazuensis** Kük.
Referencias: Barros, M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Osten, C. 8035* (SI)].

Cyperus angulatus Nees = **Pycreus unioloides** (R. Br.) C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus anisitsii Kük.
Referencias: Kükenthal, G., 1935–1936.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Anisits, J. D. 2868* (S)].

Cyperus araeus Phil. = **Cyperus volckmannii** Phil.

Cyperus arechavaletae Boeck. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **arechavaletae** (Boeck.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus argentinus Boeck. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1996a.

Cyperus argentinus C.B. Clarke, hom. illeg. = **Pycreus rivularis** (Kunth) Palla

Cyperus aristatus Rottb., nom. illeg. = **Cyperus squarrosus** L.
Referencias: Adams, C. D., 1994e; Tucker, G. C., 1994.

Cyperus aristatus Rottb. var. *inflexus* (H.L. Mühl.) Boeck. ex Kük. = **Cyperus squarrosus** L.
Referencias: Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.

[Cyperus articulatus L.]
Sin.: *Cyperus articulatus* L. var. *nodosus* (Willd.) Kük., *Cyperus nodosus* Willd.
Referencias: Kükenthal, G., 1935–1936; Tucker, G. C., 1994.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Cyperus articulatus L. var. *nodosus* (Willd.) Kük. = **Cyperus articulatus** L.
Referencias: Kükenthal, G., 1935–1936; Tucker, G. C., 1994.

Cyperus aurescens Boeck. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens**
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus autummalis (Rottb.) Vahl = **Cyperus haspan** L. var. **haspan**
Referencias: Tucker, G. C., 1998.

Cyperus baenitzii Boeck. = **Cyperus virens** Michx. var. **virens**
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus balansae Maury = **Cyperus impolitus** Kunth
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus bangianus Gand. = **Cyperus luzulae** (L.) Rottb. ex Retz.
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

Cyperus barrosianus Herter = **Pycreus tener** C.B. Clarke ex Chodat & Hassl.

Cyperus berroi (C.B. Clarke) T. Koyama, comb. superfl. = **Cyperus berroi** (C.B. Clarke) Barros

Cyperus berroi (C.B. Clarke) Barros
Sin.: *Bisboeckelera berroi* (C.B. Clarke) Standl., *Cyperus berroi* (C.B. Clarke) T. Koyama, comb. superfl., *Hoppia berroi* C.B. Clarke
Referencias: Herter, W. G. F., 1949–1956; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba acuática. Anual o perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); URY(CAS, DUR, MAL, RNO, ROC, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 23277* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 5296* (SI)].

Cyperus bipartitus Torr. = **Pycreus bipartitus** (Torr.) C.B. Clarke
Referencias: Adams, C. D., 1994i.

Cyperus biradiatus Boeck. = **Pycreus niger** (Ruiz & Pav.) Cufod.
Referencias: Barros, M., 1960.

Cyperus bisumellatus Steud. = **Cyperus prolixus** Kunth
Referencias: Kükenthal, G., 1935–1936.

[Cyperus boeckeleri Phil.]
Referencias: Kükenthal, G., 1935–1936.
Notas: Nombre dudoso.

Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk. = **Kyllinga brevifolia** Rottb.
Referencias: Tucker, G. C., 1984a.

Cyperus bromoides Willd. ex Link = **Pycreus unioloides** (R. Br.) C.B. Clarke

Cyperus burkartii Guagl.
Referencias: Araújo, A. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1997; Guaglianone, E. R., 1990.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–400 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 735* (NY, SI)]; BRA[*Bassan, M. 709* (HAS)].

Cyperus capitinduensis Maury = **Cyperus andreanus** Maury var. **capitinduensis** (Maury) Kük.
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus caracasanus Kunth = **Cyperus tenuis** Sw.

Cyperus cayennensis (Lam.) Britton, nom. illeg. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

Cyperus cayennensis Willd. ex Link = **Cyperus haspan** L. var. **haspan**

Cyperus cayennensis (Lam.) Britton var. *gigas* (Lindm.) Barros = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **gigas** (Lindm.) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1995.

Cyperus cayennensis (Lam.) Britton var. *umbellato-flavus* (C.B. Clarke) Barros = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **gigas** (Lindm.) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1995.

Cyperus celluloso-reticulatus Boeck.
Referencias: Araujo, A. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1996; Barros, M., 1960.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hefler, S. M. 685* (ICN)].

Cyperus cephalanthus Torr. & Hook.
Sin.: *Cyperus laetus* J. Presl var. *cephalanthus* (Torr. & Hook.) Kük., *Cyperus rigens* J. Presl & C. Presl subsp. *cephalanthus* (Torr. & Hook.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1972; Tucker, G. C., Marcks, B. G. & Carter, J. R., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(COS); PRY(CAU, CEN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 10228* (MO)]; PRY[*Zardini, E. M. 26757* (FCQ, MO)].

Cyperus cephalophorus J. Presl & C. Presl = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus chalaranthus J. Presl & C. Presl
Sin.: *Cyperus diffusus* Vahl subsp. *chalaranthus* (J. Presl & C. Presl) Kük., *Cyperus diffusus* Vahl var. *chalaranthus* (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke
Referencias: Tucker, G. C., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CEN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 5627* (SI)]; PRY[*Krapovickas, A. 41893* (CTES, SI)].

Cyperus chamissoi Schrad. ex Nees = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus chilensis Boeck. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens**
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus ciliolatus Boeck. = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus cimicinus J. Presl & C. Presl = **Pycreus niger** (Ruiz & Pav.) Cufod.
Referencias: Brako, L., 1993e.

Cyperus cinereus Maury = **Cyperus incomtus** Kunth var. **incomtus**
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus comosus Poir. = **Cyperus giganteus** Vahl
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

Cyperus compressus L.
Referencias: Tucker, G. C., 1994.
Hierba. Anual. Nativa. 100–200 m.
Países: ARG(COS); BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 13375* (NY, SI)].

Cyperus compressus Jacq. = **Cyperus eragrostis** Lam. var. **eragrostis**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1996a.

Cyperus conceptionis Steud. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens**
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

[Cyperus confertus Sw.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cyperus conglobatus Link = **Cyperus odoratus** L.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1996a.

Cyperus conoideus Rich. = **Cyperus entrerianus** Boeck. var. **entrerianus**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1996a.

Cyperus consanguineus Kunth = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus consanguineus Kunth var. *chamissoi* (Schrad. ex Nees) Kük. = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus consanguineus Kunth var. *minarum* (Boeck.) Kük. = **Cyperus virens** Michx. var. **minarum** (Boeck.) Denton
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus consanguineus Kunth var. *usterii* (Palla) Kük. = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus consanguineus Kunth var. *varius* (Boeck.) Kük. = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus consors C.B. Clarke var. **riedelianus** (C.B. Clarke) Kük.
Sin.: *Cyperus riedelianus* C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1960.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Riedel, J. 970* (P)].

Cyperus cordobensis (Palla) Hicken = **Cyperus corymbosus** Rottb. var. **subnodosus** (Nees & Meyen) Kük.
Referencias: Kükenthal, G., 1935–1936.

Cyperus cornelii-ostenii Kük. var. **cornelii-ostenii**
Referencias: Barros, M., 1947.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1600 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, MIS); PRY(APY, CAU, CEN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31340* (SI), *Zardini, E. M. 763* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 1062* (SI)].

Cyperus cornelii-ostenii Kük. var. **pilcomayensis** Kük.
Referencias: Barros, M., 1947.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(CHA, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 2017* (SI), *Maranta, A. 360* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 13808* (SI)].

Cyperus corymbosus Rottb. var. **subnodosus** (Nees & Meyen) Kük.
Sin.: *Chlorocyperus cordobensis* Palla, *Cyperus cordobensis* (Palla) Hicken, *Cyperus nodosus* Willd. var. *subnodosus* (Nees & Meyen) Boeck., *Cyperus subnodosus* Nees & Meyen
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Marchesi, E., 1984; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Tucker, G. C., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); BRA(RGS); PRY(APY, CEN, PHA); URY(ART, CLA, COL, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27573* (SI)]; BRA[*Capparelli, P. N. 205* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2297* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 975* (SI)].

Cyperus curvifolius Boeck. = **Cyperus incomtus** Kunth var. **incomtus**
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus declinatus Moench = **Cyperus eragrostis** Lam. var. **eragrostis**
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus densicaespitosus Mattf. & Kük. = **Kyllinga pumila** Michx.
Referencias: Tucker, G. C., 1984a.

Cyperus densiflorus G. Mey. = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus denticulatus Schrad. ex Schult. = **Cyperus surinamensis** Rottb. var. **surinamensis**
Referencias: Barros, M., 1960; Denton, M. A., 1978.

Cyperus diandrus auct. non Torr. = **Pycreus rivularis** (Kunth) Palla

Cyperus difformis L.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Introducida. 100–200 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 1462* (CONC)]; URY[*Del Puerto, O. 21668* (MVFA)].

Cyperus diffusus Vahl = **Cyperus laxus** Lam.
Referencias: McVaugh, R., 1993; Raynal, J., 1978.

Cyperus diffusus Vahl var. *chalaranthus* (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke = **Cyperus chalaranthus** J. Presl & C. Presl

Cyperus diffusus Vahl var. *umbrosus* (Lindl. & Nees) Kük. = **Cyperus laxus** Lam.
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

Cyperus diffusus Vahl subsp. *chalaranthus* (J. Presl & C. Presl) Kük. = **Cyperus chalaranthus** J. Presl & C. Presl

Cyperus digitatus Roxb.
Sin.: *Cyperus digitatus* Roxb. f. *contractior* Kük., *Cyperus digitatus* Roxb. var. *obtusifructus* Kük., *Cyperus hieronymi* auct. non Boeck.
Referencias: Tucker, G. C., 1994.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY, CEN, COA, ÑEE, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 237* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 8263* (SI)].

Cyperus digitatus Roxb. f. *contractior* Kük. = **Cyperus digitatus** Roxb.

Cyperus digitatus Roxb. var. *obtusifructus* Kük. = **Cyperus digitatus** Roxb.

Cyperus distans L. f.
Sin.: *Cyperus purpureo-vaginatus* Boeck., *Cyperus squamulatus* Steud.
Referencias: Barros, M., 1960; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Tucker, G. C., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(JUJ); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30325* (SI)]; BRA[*Hefler, S. M. 841* (ICN)].

Cyperus drummondii Torr. & Hook.
Sin.: *Cyperus robustus* Kunth, *Cyperus virens* Michx. var. *drummondii* (Torr. & Hook.) Kük., *Cyperus virens* Michx. var. *robustus* (Kunth) Kük.
Referencias: Carter, R., Alexander, D. K., Bryson, C. T. & Lazari, A., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kermes, E. 612b* (DAO)]; BRA[*Reineck, E. M. s.n.* (E)].

Cyperus efoliatus Boeck. = **Cyperus haspan** L. var. **haspan**
Referencias: Araújo, A. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1996.

Cyperus elegans auct. non L. = **Cyperus laxus** Lam.
Referencias: Adams, C. D., 1992.

Cyperus elegantulus Steud. = **Pycreus elegantulus** (Steud.) C.B. Clarke

Cyperus elongatus Steud. = **Pycreus polystachyos** (Rottb.) P. Beauv. subsp. **polystachyos**

Cyperus engelmannii Steud. = **Cyperus odoratus** L.
Referencias: Tucker, G. C., 1984b.

Cyperus entrerianus Boeck. var. **entrerianus**
Sin.: *Cyperus conoideus* Rich., *Cyperus luzulae* (L.) Rottb. ex Retz. f. *conoideus* (Rich.) Nees, *Cyperus luzulae* (L.) Rottb. ex Retz. var. *entrerianus* (Boeck.) Barros, *Cyperus luzulae* (L.) Rottb. ex Retz. var. *tucumanensis* (Boeck.) C.B. Clarke ex Chodat, *Cyperus surinamensis* Rottb. var. *strictus* Kük., *Cyperus tucumanensis* Boeck.
Referencias: Araújo, A. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1996; Carter, R., 1990; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Herter, W. G. F., 1949–1956; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Tucker, G. C., 1994, 1998.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PHA, SPE); URY(ART, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2833* (SI), *Múlgura de Romero, M. E. 1402* (SI)]; BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 2327* (ICN), *Reitz, P. R. 16743* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 4628* (FCQ), *Pedersen, T. M. 5938* (SI)]; URY[*Schroeder, J. 18762* (MVM)].

Cyperus entrerianus Boeck. var. **parvicapitulatus** Kük.
Referencias: Kükenthal, G., 1935–1936.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, FOR, MIS, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Brown, A. s.n.* (SI), *Guaglianone, E. R. 985* (SI), *Pedersen, T. M. 9097* (SI)].

Cyperus eragrostis Lam. f. *latifrons* Kük. = **Cyperus eragrostis** Lam. var. **eragrostis**
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus eragrostis Lam. f. *tener* Kük. = **Cyperus eragrostis** Lam. var. **eragrostis**
Referencias: Barros, M., 1947; Denton, M. A., 1978.

Cyperus eragrostis Lam. var. **compactus** (E. Desv.) Kük.
Sin.: *Cyperus lutescens* Phil., hom. illeg., *Cyperus vegetus* Willd. var. *compactus* E. Desv., *Cyperus vegetus* Willd. var. *trigonus* Kuntze
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(BAI, COR, MEN, NEU, RNE, SLU); CHL(V, VIII, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barros, M. 1932* (SI)]; CHL[*Buchtien, O. s.n.* (SI)].

Cyperus eragrostis Lam. var. **eragrostis**
Sin.: *Cyperus compressus* Jacq., *Cyperus declinatus* Moench, *Cyperus eragrostis* Lam. f. *latifrons* Kük., *Cyperus eragrostis* Lam. f. *tener* Kük., *Cyperus monandrus* Roth, *Cyperus vegetus* Willd., *Cyperus vegetus* Willd. var. *obtusangulus* Kuntze
Referencias: Araujo, A. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1996; Barros, M., 1947, 1960, 1969a; Denton, M. A., 1978; Herter, W. G. F., 1949–1956; Pedersen, T. M., 1969[1968]; San Martín, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SFE, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21123* (SI)]; BRA[*Bertels, A. 1051* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 14325* (SI)]; URY[*Felippone, F. 4557* (SI)].

[Cyperus esculentus L. var. esculentus]
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Cyperus esculentus L. var. **leptostachyus** Boeck.
Sin.: *Chlorocyperus phymatodes* (Mühlenb.) Palla, *Cyperus esculentus* L. var. *phymatodes* (Mühlenb.) Kük., *Cyperus phymatodes* Mühlenb.
Referencias: Barros, M., 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Kükenthal, G., 1935–1936; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Schippers, P., Borg, S. J. T. & Bos, J. J., 1995.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA); URY(ART, CAS, CLA, DUR, MAL, MON, RNO, ROC, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Muñoz, J. D. 4694* (SI)]; BRA[*Hefler, S. M. 717* (ICN)]; PRY[*Rojas, T. 7923* (SI)]; URY[*Felippone, F. 4463* (SI)].

Cyperus esculentus L. var. *lutescens* (Torr. & Hook.) Kük. ex Osten = **Cyperus esculentus** L. var. **macrostachyus** Boeck.
Referencias: Kükenthal, G., 1935–1936.

Cyperus esculentus L. var. **macrostachyus** Boeck.
Sin.: *Cyperus esculentus* L. var. *lutescens* (Torr. & Hook.) Kük. ex Osten, *Cyperus lutescens* Torr. & Hook.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Schippers, P., Borg, S. J. T. & Bos, J. J., 1995.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, DFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Clos, E. C. 836* (SI)]; BRA[*Hefler, S. M. 583* (ICN)]; URY[*Felippone, F. 4906a* (SI)].

Cyperus esculentus L. var. *phymatodes* (Mühlenb.) Kük. = **Cyperus esculentus** L. var. **leptostachyus** Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960; Pedersen, T. M., 1969[1968].

[Cyperus exaltatus Retz.]
Referencias: Barros, M., 1947; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cyperus felipponei Kük.
Referencias: Barros, M., 1947; Herter, W. G. F., 1949–1956.
Hierba. Anual o perenne. Endémica. 0–500m.
Países: ARG(COS, ERI); URY(CAS, FLO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 519* (SI), *Nicora, E. G. 3082* (LIL, SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 570* (SI)].

Cyperus ferax Rich. = **Cyperus odoratus** L.
Referencias: Exell, A. W., 1944; Tucker, G. C., 1984b.

Cyperus ferax Rich. var. *acicularis* (Nees) Kük. = **Cyperus odoratus** L.
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

Cyperus ferax Rich. var. *bulbiferus* Barros = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus ferax Rich. var. *conglobatus* (Link) Kük. = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus ferax Rich. var. *maximilianii* (Schrad. ex Nees) Boeck. = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus ferax Rich. subsp. *engelmanni* (Steud.) Kük. = **Cyperus odoratus** L.
Referencias: Tucker, G. C., 1984b, 1994.

Cyperus ferax Rich. subsp. *speciosus* (Vahl) Kük. = **Cyperus odoratus** L.
Referencias: Tucker, G. C., 1984b, 1994.

Cyperus ferox Vahl = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus ferrugineus Boeck. = **Cyperus andreanus** Maury var. **capitinduensis** (Maury) Kük.
Referencias: Barros, M., 1960.

Cyperus flavescens L. var. *paraensis* (Nees) Boeck. = **Pycreus flavescens** (L.) Rchb. var. **piceus** (Liebm.) Fernald

Cyperus flavicomus Michx. = **Pycreus flavicomus** (Michx.) C.D. Adams
Referencias: Adams, C. D., 1991.

Cyperus flavomariscus Griseb. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**

Cyperus flavus (Vahl) Nees, nom. illeg. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**
Referencias: McVaugh, R., 1993; Tucker, G. C., 1994.

Cyperus flavus (Vahl) Nees var. *aggregatus* (Willd.) Kük. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**
Referencias: McVaugh, R., 1993.

Cyperus flavus (Vahl) Nees var. *angustatus* Kük. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**

Cyperus flavus (Vahl) Nees var. *argentinus* (Boeck.) Kük. ex Osten = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**

Cyperus flavus (Vahl) Nees var. *australis* Osten = **Cyperus meridionalis** Barros
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus flavus (Vahl) Nees var. *gigas* (Lindm.) Kük. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **gigas** (Lindm.) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1995.

Cyperus flavus (Vahl) Nees var. *laevis* (Kunth) Kük. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

Cyperus flavus (Vahl) Nees subsp. *redolens* (Maury) Osten = **Cyperus redolens** Maury
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus flexuosus Vahl = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus foliosissimus Boeck. = **Cyperus andreanus** Maury var. **foliosissimus** (Boeck.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus formosus Vahl = **Cyperus virens** Michx. var. **virens**
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus fraternus Kunth
Sin.: *Cyperus reflexus* Vahl var. *fraternus* (Kunth) Kuntze
Referencias: Herter, W. G. F., 1949–1956.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, FOR, MIS, RNE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VII, X); PRY(AMA, CAN); URY(ART, CAS, CLA, FLO, PAY, RNO, RIV, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fernández 947* (SI)]; BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 2269* (ICN)]; PRY[*Hassler, E. 5251* (BM)]; URY[*Herter, W. G. F. 2264* (MVM)].

Cyperus friburgensis Boeck.
Sin.: *Cyperus fusco-ferrugineus* Boeck., *Cyperus martianus* Schrad. ex Nees, hom. illeg.
Referencias: Araujo, A. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1996; Barros, M., 1938, 1960.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 28262* (SI), *Hunziker, A. T. 845* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 7997* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 8001* (SI)].

Cyperus fusco-ferrugineus Boeck. = **Cyperus friburgensis** Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus gardneri Nees
Referencias: Barros, M., 1947.
Hierba acuática flotante. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 10959* (SI), *Schulz, A. G. 10960* (SI)].

Cyperus giganteus Vahl
Sin.: *Chlorocyperus giganteus* (Vahl) Palla, *Cyperus comosus* Poir.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Herter, W. G. F., 1949–1956; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Tucker, G. C., 1994.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CEN, CON, ITA, PHA); URY(ART, CLA, COL, RNO, RIV, ROC, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 12841* (SI), *Montes, J. E. 103b* (SI), *Venturi, S. 89* (SI)]; BRA[*Hefler, S. M. 593* (ICN)]; PRY[*Mereles, F. 4768* (FCQ), *Rojas, T. 13606* (SI), *Rojas, T. 5551* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 1728* (SI), *Rosengurtt, B. 808* (SI)].

Cyperus glauco-viridis Boeck. = **Cyperus ligularis** L.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960.

Cyperus glaziovianus Boeck. = **Cyperus mundulus** Kunth
Referencias: Barros, M., 1960.

Cyperus globuliferum J. Presl & C. Presl = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus grammicus Kunze ex Kunth = **Pycreus grammicus** (Kunze ex Kunth) C.B. Clarke

Cyperus haematostachys Steud. = **Cyperus reflexus** Vahl
Referencias: Denton, M. A., 1978; Gunckel, L. H., 1948.

Cyperus hamatus Schrad. ex Nees = **Cyperus uncinulatus** Schrad. ex Nees
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus hamiltonii Kunth = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus haspan L. var. *adenophorus* (Schrad.) Kük. = **Cyperus haspan** L. var. **haspan**

Cyperus haspan L. var. *americanus* Boeck. = **Cyperus haspan** L. var. **haspan**

Cyperus haspan L. var. **amplissimus** Kük.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(CHA, ERI, MIS); BRA(SCA); PRY(APA, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 6861* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 5109* (HBR)]; PRY[*López, M. G. 281* (CTES)].

Cyperus haspan L. var. **coarctatus** Nees
Referencias: Araújo, A. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1996; Barros, M., 1947; Marchesi, E., 1984.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA); BRA(RGS); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 682* (SI)]; BRA[*Camargo, O. 27* (MVFA)]; URY[*Hauman, L. L. s.n.* (BA)].

Cyperus haspan L. var. **haspan**
Sin.: *Cyperus adenophorus* Schrad., *Cyperus americanus* (Boeck.) Palla, *Cyperus autummalis* (Rottb.) Vahl, *Cyperus cayennensis* Willd. ex Link, *Cyperus efoliatus* Boeck., *Cyperus haspan* L. subsp. *juncoides* (Lam.) Kük., *Cyperus haspan* L. var. *adenophorus* (Schrad.) Kük., *Cyperus haspan* L. var. *americanus* Boeck., *Cyperus haspan* L. var. *riparius* (Schrad. ex Nees) Kük., *Cyperus juncoides* Lam., *Cyperus riparius* Schrad. ex Nees, *Scirpus autumnalis* Rottb., hom. illeg.
Referencias: Araújo, A. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1996; Herter, W. G. F., 1949–1956; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Marchesi, E., 1984; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Tucker, G. C., 1994.
Hierba. Anual o perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA); URY(ART, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 1900* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 685* (SI)]; PRY[*Jiménez, B. 1958* (BM, G, MO, PY)]; URY[*Osten, C. 6509* (MVM)].

Cyperus haspan L. var. *riparius* (Schrad. ex Nees) Kük. = **Cyperus haspan** L. var. **haspan**

Cyperus haspan L. subsp. *juncoides* (Lam.) Kük. = **Cyperus haspan** L. var. **haspan**
Referencias: Tucker, G. C., 1998.

Cyperus helvus Liebm., nom. superfl. = **Pycreus lanceolatus** (Poir.) C.B. Clarke
Referencias: Adams, C. D., 1994i.

Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl.
Sin.: *Carex hermaphrodita* Jacq., *Cyperus hermaphroditus* (Jacq.) Standl. var. *longespicatus* (Boeck.) Kük., *Cyperus incompletus* Link, *Cyperus longespicatus* Boeck., *Cyperus ruizianus* Boeck., *Kyllinga incompleta* Jacq., *Mariscus hermaphroditus* (Jacq.) Urb., *Mariscus jacquinii* Kunth
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Tucker, G. C., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2600 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7756* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 2792* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 9667* (SI)].

Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. var. *longespicatus* (Boeck.) Kük. = **Cyperus hermaphroditus** (Jacq.) Standl.

Cyperus hieronymi Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 1115* (SI)].

Cyperus hieronymi auct. non Boeck. = **Cyperus digitatus** Roxb.
Referencias: Kükenthal, G., 1935–1936.

Cyperus huarmensis (Kunth) M.C. Johnst. = **Cyperus odoratus** L.
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

Cyperus imbricatus Retz.
Sin.: *Cyperus imbricatus* Retz. var. *viridispicatus* (Boeck.) Kük., *Cyperus involucratus* Poir., *Cyperus radiatus* Vahl, *Cyperus viridispicatus* Boeck.
Referencias: Barros, M., 1938, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, APA, ITA, SPE); URY(ART, CLA, DUR, FLO, FLA, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28814* (SI), *Deginani, N. B. 1388* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 45861* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 9237* (SI)]; URY[*Felippone, F. 3592* (SI)].

Cyperus imbricatus Retz. var. *viridispicatus* (Boeck.) Kük. = **Cyperus imbricatus** Retz.
Referencias: Barros, M., 1938.

Cyperus impolitus Kunth
Sin.: *Chlorocyperus balansae* (Maury) Palla, *Chlorocyperus serrae* Palla, *Cyperus balansae* Maury, *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *balansae* (Maury) Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *capitatus* Boeck., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *hassleri* (C.B. Clarke) Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *impolitus* (Kunth) Kük., p.p., *Cyperus wacketii* Kük., *Mariscus balansae* (Maury) C.B. Clarke, *Mariscus hassleri* C.B. Clarke, *Mariscus impolitus* (Kunth) J. Raynal
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Herter, W. G. F., 1949–1956; Pedersen, T. M., 1972.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE); URY(CAS, CLA, FLO, MAL, MON, RIV, SAO, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 30712* (SI)]; BRA[*Hefler, S. M. 869* (ICN)]; PRY[*Mereles, F. 5255* (CTES, FCQ, MO)]; URY[*Osten, C. 18681* (MVM)].

Cyperus incompletus Link = **Cyperus hermaphroditus** (Jacq.) Standl.
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus incomtus Kunth var. **incomtus**
Sin.: *Cyperus cinereus* Maury, *Cyperus curvifolius* Boeck., *Cyperus ochraceus* auct. non Vahl
Referencias: Araujo, A. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1996; Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI); URY(ART, COL, DUR, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22488* (SI), *Deginani, N. B. 1175* (SI), *Morrone, O. 1579* (SI), *Taylor, C. M. 11511* (SI)]; BRA[*Sobral, M. 4347* (ICN, MBM)]; PRY[*Rojas, T. 8083* (SI)]; URY[*Felippone, F. 4905* (SI)].

Cyperus incomtus Kunth var. **venturii** (Kük.) Barros
Sin.: *Cyperus venturii* Kük.
Referencias: Barros, M., 1938, 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30617* (SI)].

Cyperus inflexus H.L. Mühl. = **Cyperus squarrosus** L.
Referencias: McVaugh, R., 1993.

Cyperus infucatus Kunth
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Kükenthal, G., 1935–1936.
Hierba. Perenne. Nativa. 1300–1800 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rambo, B. 34801* (SI)].

Cyperus inops C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1960.
Hierba. Anual o perenne. Endémica. 200–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2935* (SI)].

Cyperus intricatus Schrad. ex Schult.
Sin.: *Cyperus chamissoi* Schrad. ex Nees, *Cyperus ciliolatus* Boeck., *Cyperus consanguineus* Kunth, *Cyperus consanguineus* Kunth var. *chamissoi* (Schrad. ex Nees) Kük., *Cyperus consanguineus* Kunth var. *usterii* (Palla) Kük., *Cyperus consanguineus* Kunth var. *varius* (Boeck.) Kük., *Cyperus longicaulis* Boeck., *Cyperus reflexus* Vahl var. *intricatus* (Schrad. ex Schult.) Kük., *Cyperus schenckianus* Boeck., *Cyperus schraderi* Herter, hom. illeg., *Cyperus usterii* Palla, *Cyperus varius* Boeck., *Cyperus virens* auct. non Michx., *Cyperus virens* Michx. var. *widgrenii* (Boeck.) C.B. Clarke ex Barros, *Cyperus widgrenii* Boeck.
Referencias: Araujo, A. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1996; Barros, M., 1938; Denton, M. A., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 1300–1800 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1139* (SI)]; BRA[*Camargo, O. 138* (PACA)].

Cyperus involucratus Poir. = **Cyperus imbricatus** Retz.
Referencias: Kukkonen, I. T. K., 1990.

Cyperus involucratus Rottb.
Sin.: *Cyperus alternifolius* auct. non L.
Referencias: Kukkonen, I. T. K., 1990; Tucker, G. C., 1994.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, MEN, SAL, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(II, VII, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 14133* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 5365* (SI)]; CHL[*Barros, E. 2929* (SI)].

Cyperus iria L.
Sin.: *Cyperus panicoides* Lam.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1976; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Tucker, G. C., 1994.
Hierba. Anual. Introducida. 100–1600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 13656* (SI)]; BRA[*Hefler, S. M. 846* (ICN)]; URY[*Del Puerto, O. 23561* (MVFA)].

Cyperus jaeggii Boeck. = **Pycreus megapotamicus** (Kunth) Nees var. **jaeggii** (Boeck.) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1995.

Cyperus jubaeflorus Rudge = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus juncoides Lam. = **Cyperus haspan** L. var. **haspan**

Cyperus lacustris Phil. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens**
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

[Cyperus laetus J. Presl & C. Presl]
Referencias: Barros, M., 1929; Pedersen, T. M., 1972.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cyperus laetus auct. non J. Presl & C. Presl = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **serrae** (Boeck.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl f. *contracta* Osten = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl var. **capitatus** J. Presl & C. Presl
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl var. *arechavaletae* (Boeck.) Kük. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **arechavaletae** (Boeck.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl var. *balansae* (Maury) Kük. = **Cyperus impolitus** Kunth
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl var. *capitatus* Boeck. = **Cyperus impolitus** Kunth
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus laetus J. Presl var. *cephalanthus* (Torr. & Hook.) Kük. = **Cyperus cephalanthus** Torr. & Hook.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl var. *conceptionis* (Steud.) Kük. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens**
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl var. *hassleri* (C.B. Clarke) Kük. = **Cyperus impolitus** Kunth
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl var. *impolitus* (Kunth) Kük., p.p. = **Cyperus impolitus** Kunth
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl var. *impolitus* (Kunth) Kük., p.p. = **Cyperus meridionalis** Barros
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl var. *laeviculmis* Kük. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens**
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl var. *maximus* Kük. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl var. **maximus** (Kük.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl var. *parciflorus* Kük. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens**
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl subsp. *oostachyus* (Nees) Kük. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens**
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus laevigatus L.
Sin.: *Acorellus laevigatus* (L.) Palla, *Acorellus pallae* Kneuck., *Chlorocyperus laevigatus* (L.) Palla, *Cyperus laevigatus* L. f. *reptans* C.B. Clarke, *Cyperus laevigatus* L. var. *junciformis* C.B. Clarke, *Cyperus laevigatus* L. var. *pallae* (Kneuck.) Kük., *Cyperus laevigatus* L. var. *reptans* (C.B. Clarke) Kük., *Cyperus mucronatus* Rottb., *Juncellus laevigatus* (L.) C.B. Clarke, *Juncellus laevigatus* (L.) C.B. Clarke var. *junciformis* C.B. Clarke, *Juncellus laevigatus* (L.) C.B. Clarke var. *reptans* (Boeck.) C.B. Clarke, *Pycreus laevigatus* (L.) Nees, *Pycreus mucronatus* (Roxb.) Nees
Referencias: Barros, M., 1947; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Tucker, G. C., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, SAL, SDE, SFE, TUC); CHL(I, II, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 2821* (SI)]; CHL[*Zoellner, O. 5014* (CONC)].

Cyperus laevigatus L. f. *reptans* C.B. Clarke = **Cyperus laevigatus** L.
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

Cyperus laevigatus L. var. *junciformis* C.B. Clarke = **Cyperus laevigatus** L.

Cyperus laevigatus L. var. *pallae* (Kneuck.) Kük. = **Cyperus laevigatus** L.
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

Cyperus laevigatus L. var. *reptans* (C.B. Clarke) Kük. = **Cyperus laevigatus** L.
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

Cyperus lagunetto Steud. = **Pycreus rivularis** (Kunth) Palla

Cyperus lanceolatus Poir. = **Pycreus lanceolatus** (Poir.) C.B. Clarke
Referencias: Adams, C. D., 1994i.

Cyperus lanceolatus Poir. var. *tener* (C.B. Clarke ex Chodat & Hassl.) Kük. = **Pycreus tener** C.B. Clarke ex Chodat & Hassl.

Cyperus laxus auct. non Lam. = **Cyperus laxus** Lam.
Referencias: Tucker, G. C., 1998.

Cyperus laxus Lam.
Sin.: *Cyperus diffusus* Vahl, *Cyperus diffusus* Vahl var. *umbrosus* (Lindl. & Nees) Kük., *Cyperus elegans* auct. non L., *Cyperus laxus* auct. non Lam., *Cyperus limbatus* Maury, *Cyperus umbrosus* Lindl. & Nees ex Nees
Referencias: Adams, C. D., 1992, 1994e; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; McVaugh, R., 1993; Raynal, J., 1978; Tucker, G. C., 1994.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30402* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 17339* (SI)]; PRY[*Zuloaga, F. O. 7290* (SI)].

Cyperus lechlerii Steud. = **Cyperus xanthostachyus** Steud.
Referencias: Gunckel, L. H., 1948.

Cyperus lepidus Phil. = **Pycreus lanceolatus** (Poir.) C.B. Clarke

[Cyperus leptophyes C.B. Clarke]
Referencias: Clarke, C. B., 1902.
Notas: Nombre dudoso.

Cyperus ligularis L.
Sin.: *Cyperus glauco-viridis* Boeck., *Cyperus trigonus* Boeck., *Mariscus ligularis* (L.) Urb., *Mariscus longus* Schrad. ex Nees, *Mariscus rufus* Kunth
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(CON, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 11373* (SI), *Reitz, P. R. 5803* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2281* (SI)].
Notas: Probablemente crezca en Argentina.

Cyperus limbatus Maury = **Cyperus laxus** Lam.
Referencias: Barros, M., 1960.

Cyperus longespicatus Boeck. = **Cyperus hermaphroditus** (Jacq.) Standl.
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

Cyperus longicaulis Boeck. = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus longicruris Boeck. = **Pycreus niger** (Ruiz & Pav.) Cufod.

Cyperus lorentzianus Boeck. = **Pycreus niger** (Ruiz & Pav.) Cufod.

Cyperus lorentzianus Boeck. var. *compressus* Boeck. = **Pycreus niger** (Ruiz & Pav.) Cufod.

Cyperus lorentzianus Boeck. var. *elatus* Boeck. = **Pycreus niger** (Ruiz & Pav.) Cufod.

Cyperus lutescens Phil., hom. illeg. = **Cyperus eragrostis** Lam. var. **compactus** (E. Desv.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus lutescens Torr. & Hook. = **Cyperus esculentus** L. var. **macrostachyus** Boeck.
Referencias: Kükenthal, G., 1935–1936.

Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz.
Sin.: *Cyperus bangianus* Gand., *Cyperus sphaerostachys* Link, *Scirpus luzulae* L.
Referencias: Araújo, A. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1996; Barros, M., 1947, 1960; Denton, M. A., 1978; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; McVaugh, R., 1993; Tucker, G. C., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CON, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arenas, P. 2336* (SI)]; BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 2417* (ICN)]; PRY[*Rojas, T. 5470* (SI)].

Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz. f. *conoideus* (Rich.) Nees = **Cyperus entrerianus** Boeck. var. **entrerianus**

Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz. var. *entrerianus* (Boeck.) Barros = **Cyperus entrerianus** Boeck. var. **entrerianus**
Referencias: Carter, R., 1990.

Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz. var. *tucumanensis* (Boeck.) C.B. Clarke ex Chodat = **Cyperus entrerianus** Boeck. var. **entrerianus**

Cyperus macrostachyos Lam. = **Pycreus macrostachyos** (Lam.) J. Raynal

Cyperus manimae auct. non Kunth = **Cyperus spectabilis** Link var. **jujuyensis** Kük.

Cyperus manimae Kunth
Sin.: *Cyperus spectabilis* Link var. *coarctatus* Boeck., *Mariscus manimae* (Kunth) C.B. Clarke
Referencias: Adams, C. D., 1994e; Barros, M., 1947; McVaugh, R., 1993; Tucker, G. C., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–2700 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kristensen, M. J. 279* (SI)].

Cyperus manimae Kunth var. *phaeocephalus* (Griseb.) O'Neill & Ben. Ayers = **Cyperus phaeocephalus** Griseb.

Cyperus martianus Schrad. ex Nees, hom. illeg. = **Cyperus friburgensis** Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus mauryi Kuntze = **Pycreus megapotamicus** (Kunth) Nees var. **megapotamicus**
Referencias: Kükenthal, G., 1935–1936.

Cyperus maximilianii (Schrad. ex Nees) Griseb. = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus megapotamicus auct. non Kunth = **Pycreus rivularis** (Kunth) Palla

Cyperus megapotamicus Kunth = **Pycreus megapotamicus** (Kunth) Nees var. **megapotamicus**

Cyperus megapotamicus Kunth var. *jaeggii* (Boeck.) Kük. ex Barros = **Pycreus megapotamicus** (Kunth) Nees var. **jaeggii** (Boeck.) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1995.

Cyperus melanostachyus Kunth = **Pycreus niger** (Ruiz & Pav.) Cufod.
Referencias: Adams, C. D., 1994i.

Cyperus melanostachyus Kunth f. *variegata* (Kunth) Kurtz, nom. inval. = **Pycreus niger** (Ruiz & Pav.) Cufod.

Cyperus meridionalis Barros
Sin.: *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *australis* Osten, *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *impolitus* (Kunth) Kük., p.p.
Referencias: Barros, M., 1947; Herter, W. G. F., 1949–1956; Marchesi, E., 1984; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); BRA(RGS); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26900* (SI), *Hurrell, J. A. 3847* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 36635* (SI)]; URY[*Osten, C. 5673* (SI), *Pedersen, T. M. 11579* (SI)].

Cyperus meyenianus Kunth
Sin.: *Chlorocyperus paranaguensis* Palla, *Cyperus meyenianus* Kunth var. *breviradiatus* Maury, *Cyperus meyenianus* Kunth var. *oligostachys* (Schrad.) Kük., *Cyperus meyenianus* Kunth var. *paranaguensis* (Palla) Kük., *Cyperus meyenianus* Kunth var. *patentissimus* Kük., *Cyperus palustris* (Schrad.) Kük., hom. illeg., *Cyperus prionensis* Boeck., *Mariscus meyenianus* (Kunth) Nees, *Mariscus oligostachys* Schrad., *Mariscus palustris* Schrad.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Simpson, D. A., 1989.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, COA, GUA); URY(ART, CLA, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1155* (SI)]; BRA[*Hefler, S. M. 236* (ICN)]; PRY[*Schinini, A. 28071* (CTES)]; URY[*Rosengurtt, B. 4530* (MVFA, SI)].

Cyperus meyenianus Kunth var. *breviradiatus* Maury = **Cyperus meyenianus** Kunth

Cyperus meyenianus Kunth var. *oligostachys* (Schrad.) Kük. = **Cyperus meyenianus** Kunth

Cyperus meyenianus Kunth var. *paranaguensis* (Palla) Kük. = **Cyperus meyenianus** Kunth

Cyperus meyenianus Kunth var. *patentissimus* Kük. = **Cyperus meyenianus** Kunth

Cyperus minarum Boeck. = **Cyperus virens** Michx. var. **minarum** (Boeck.) Denton
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus monandrus Roth = **Cyperus eragrostis** Lam. var. **eragrostis**
Referencias: Barros, M., 1947; Denton, M. A., 1978.

Cyperus monostachyus L. = **Abildgaardia ovata** (Burm. f.) Kral
Referencias: Kral, R., 1971.

Cyperus montanus Boeck. = **Cyperus virens** Michx. var. **montanus** (Boeck.) Denton
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus mucronatus Rottb. = **Cyperus laevigatus** L.
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus mundulus Kunth
Sin.: *Cyperus glaziovianus* Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960; Kükenthal, G., 1935–1936.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 5977* (SI), *Klein, R. M. 5978* (SI), *Klein, R. M. 6025* (SI)].

Cyperus nematodes Cham. & Schrad. ex Nees, nom. nud. = **Pycreus megapotamicus** (Kunth) Nees var. **megapotamicus**

Cyperus niederleinianus Boeck. = **Pycreus niederleinianus** (Boeck.) Lindm.
Referencias: Lindman, C. A. M., 1900.

Cyperus niger Ruiz & Pav. = **Pycreus niger** (Ruiz & Pav.) Cufod.
Referencias: Adams, C. D., 1994i.

Cyperus niger Ruiz & Pav. var. *lorentzianus* (Boeck.) Kük. = **Pycreus niger** (Ruiz & Pav.) Cufod.

Cyperus nocha Phil. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens**
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus nodosus Willd. = **Cyperus articulatus** L.
Referencias: Kükenthal, G., 1935–1936; Tucker, G. C., 1994.

Cyperus nodosus Willd. var. *subnodosus* (Nees & Meyen) Boeck. = **Cyperus corymbosus** Rottb. var. **subnodosus** (Nees & Meyen) Kük.
Referencias: Kükenthal, G., 1935–1936.

Cyperus obtusatus (J. Presl & C. Presl) Mattf. & Kük. = **Kyllinga vaginata** Lam.
Referencias: Tucker, G. C., 1984a.

Cyperus ochraceus auct. non Vahl = **Cyperus incomtus** Kunth var. **incomtus**
Referencias: Osten, C., 1931.

Cyperus ochraceus Vahl
Sin.: *Cyperus ochraceus* Vahl var. *excelsior* Kük.
Referencias: Denton, M. A., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2400 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, SAL); PRY(APY, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1958* (SI), *Zuloaga, F. O. 2541* (SI)]; PRY[*Basualdo, I. 1371* (SI)].

Cyperus ochraceus Vahl var. *excelsior* Kük. = **Cyperus ochraceus** Vahl
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

[Cyperus ochraceus Vahl var. humilis Griseb.]
Notas: Nombre dudoso.

Cyperus odoratus L.
Sin.: *Cyperus acicularis* (Nees) Steud., *Cyperus cephalophorus* J. Presl & C. Presl, *Cyperus conglobatus* Link, *Cyperus densiflorus* G. Mey., *Cyperus engelmannii* Steud., *Cyperus ferax* Rich., *Cyperus ferax* Rich. subsp. *engelmanni* (Steud.) Kük., *Cyperus ferax* Rich. subsp. *speciosus* (Vahl) Kük., *Cyperus ferax* Rich. var. *acicularis* (Nees) Kük., *Cyperus ferax* Rich. var. *bulbiferus* Barros, *Cyperus ferax* Rich. var. *conglobatus* (Link) Kük., *Cyperus ferax* Rich. var. *maximilianii* (Schrad. ex Nees) Boeck., *Cyperus ferox* Vahl, *Cyperus flexuosus* Vahl, *Cyperus hamiltonii* Kunth, *Cyperus huarmensis* (Kunth) M.C. Johnst., *Cyperus jubaeflorus* Rudge, *Cyperus maximilianii* (Schrad. ex Nees) Griseb., *Cyperus pohlianus* (Nees) Kuntze, *Cyperus speciosus* Vahl, *Diclidium lenticulare* Schrad. ex Nees, *Diclidium lomentaceum* Nees, *Diclidium maximilianii* Schrad. ex Nees, *Diclidium odoratum* Schrad. ex Nees, *Diclidium uliginosum* Schrad. ex Nees, *Mariscus ferax* (Rich.) C.B. Clarke, *Mariscus pohlianus* Nees, *Torulinium confertum* Desv., *Torulinium ferax* (Rich.) Urb., *Torulinium odoratum* (L.) Hooper
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; López, S. & Mathei, J., 1994; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Tucker, G. C., 1984b, 1994.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VI, VII); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA); URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1021* (SI)]; BRA[*Reineck, E. M. 228* (SI)]; CHL[*Rodríguez Ríos, R. 2368* (CONC)]; PRY[*Mereles, F. 6013* (FCQ), *Rojas, T. 8602* (SI)]; URY[*Osten, C. 6125* (SI), *Scolnik, R. 45* (SI)].

Cyperus olfersianus Kunth = **Pycreus lanceolatus** (Poir.) C.B. Clarke
Referencias: Adams, C. D., 1994i.

Cyperus olfersianus Kunth var. *maximilianii* Boeck. = **Pycreus lanceolatus** (Poir.) C.B. Clarke
Referencias: Kükenthal, G., 1935–1936.

Cyperus oostachyus Nees = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens**
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus oxylepis Nees ex Steud.
Referencias: Barros, M., 1947; Tucker, G. C., 1994.
Hierba palustre. Anual o perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, ERI, FOR, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Martínez Achenbach, G. 426* (SI), *Venturi, S. 7903* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 3087* (SI)].

Cyperus palustris (Schrad.) Kük., hom. illeg. = **Cyperus meyenianus** Kunth

[Cyperus paniceus (Rottb.) Boeck.]
Sin.: *Kyllinga panicea* Rottb.
Referencias: Barros, M., 1929.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cyperus panicoides Lam. = **Cyperus iria** L.
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

Cyperus paniculatus Rottb. = **Pycreus polystachyos** (Rottb.) P. Beauv. subsp. **polystachyos**

Cyperus paposanus Phil. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens**
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus paraguayensis C.B. Clarke = **Cyperus uncinulatus** Schrad. ex Nees
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus parvulus Steud. = **Pycreus grammicus** (Kunze ex Kunth) C.B. Clarke
Referencias: Gunckel, L. H., 1948.

Cyperus pauper Phil., hom. illeg. = **Pycreus rivularis** (Kunth) Palla

Cyperus pergracilis Boeck. = **Pycreus niger** (Ruiz & Pav.) Cufod.

Cyperus phaeocephalus Griseb.
Sin.: *Cyperus manimae* Kunth var. *phaeocephalus* (Griseb.) O'Neill & Ben. Ayers, *Cyperus phaeocephalus* Griseb. var. *major* Kük., *Mariscus phaeocephalus* (Griseb.) C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1947.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 5287* (SI)].

Cyperus phaeocephalus Griseb. var. *major* Kük. = **Cyperus phaeocephalus** Griseb.
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus phymatodes Mühlenb. = **Cyperus esculentus** L. var. **leptostachyus** Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960.

Cyperus piceus Liebm. = **Pycreus flavescens** (L.) Rchb. var. **piceus** (Liebm.) Fernald

Cyperus poeppigii Kunth
Sin.: *Torulinium poeppigii* (Kunth) C.B. Clarke
Referencias: Clarke, C. B., 1900–1901; Kükenthal, G., 1935–1936.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(VI, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. 213pp* (*)].

[Cyperus poeppigii Kunth var. pallescens Kurtz]
Notas: Nombre dudoso.

Cyperus pohlianus (Nees) Kuntze = **Cyperus odoratus** L.

Cyperus pohlii (Nees) Steud.
Sin.: *Cyperus strigosus* auct. non L., *Mariscus setiglumis* C.B. Clarke, *Papyrus pohlii* Nees
Referencias: Barros, M., 1960; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, JUJ, MIS, NEU, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CEN, COA, PHA, SPE); URY(RNO, RIV, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barañao, J. A. 108* (SI)]; BRA[*Burkart, A. 7618* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 11160* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 4694* (MVFA, SI)].

Cyperus polystachyos Rottb. = **Pycreus polystachyos** (Rottb.) P. Beauv. subsp. **polystachyos**
Referencias: Clarke, C. B., 1900–1901.

Cyperus polystachyos Rottb. var. *paniculatus* (Rottb.) C.B. Clarke = **Pycreus polystachyos** (Rottb.) P. Beauv. subsp. **polystachyos**

Cyperus preslii A. Dietr. = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1938.

Cyperus prionensis Boeck. = **Cyperus meyenianus** Kunth

Cyperus prolixus Kunth
Sin.: *Comostemon schottii* Nees, *Cyperus amplissimus* Steud., *Cyperus bisumellatus* Steud.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Tucker, G. C., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, CEN, COA, GUA, MIE); URY(CAS, CLA, COL, FLO, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 801* (SI)]; BRA[*Hefler, S. M. 296* (ICN)]; PRY[*Rojas, T. 6885* (SI)]; URY[*Chebataroff, J. 9528* (SI)].

Cyperus pumilio Steud. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Cyperus purpureo-vaginatus Boeck. = **Cyperus distans** L. f.
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

Cyperus purpureovariegatus Boeck. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **arechavaletae** (Boeck.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus quinquespicatus Boeck. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens**
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus radiatus Vahl = **Cyperus imbricatus** Retz.
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus rancoanus Phil. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens**
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus ranko Steud. = **Isolepis ranko** (Steud.) Vegetti
Referencias: Vegetti, A. C., 1995.

Cyperus redolens Maury
Sin.: *Cyperus flavus* (Vahl) Nees subsp. *redolens* (Maury) Osten, *Mariscus flavus* Vahl var. *humilis* C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1947; Herter, W. G. F., 1949–1956; Kükenthal, G., 1935–1936; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, SFE); PRY(APY); URY(MAL, PAY, RIV, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 278* (SI)]; PRY[*Arenas, P. 471* (SI)]; URY[*Felippone, F. 4911b* (SI)].

Cyperus reflexus Vahl
Sin.: *Cyperus haematostachys* Steud., *Cyperus reflexus* Vahl f. *capitata* Osten, *Cyperus reflexus* Vahl f. *major*

Maury, *Cyperus reflexus* Vahl var. *macrostachys* Boeck., *Cyperus sellowii* Link
Referencias: Araújo, A. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1996; Barros, M., 1947, 1960, 1969a; Denton, M. A., 1978; Herter, W. G. F., 1949–1956; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, RNE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(V, VII, VIII, IX, X, IJF); PRY(CEN); URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 14052* (SI)]; BRA[*Bertels, A. 460* (SI)]; CHL[*Pedersen, T. M. 14142* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 9323* (C)]; URY[*Berro, M. B. 2193* (MVFA)].

Cyperus reflexus Vahl f. *capitata* Osten = **Cyperus reflexus** Vahl
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus reflexus Vahl f. *major* Maury = **Cyperus reflexus** Vahl
Referencias: Barros, M., 1969a.

Cyperus reflexus Vahl var. *fraternus* (Kunth) Kuntze = **Cyperus fraternus** Kunth

Cyperus reflexus Vahl var. *intricatus* (Schrad. ex Schult.) Kük. = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus reflexus Vahl var. *macrostachys* Boeck. = **Cyperus reflexus** Vahl
Referencias: Barros, M., 1947; Denton, M. A., 1978.

Cyperus retrorsus Chapm. var. *australis* (Lindm.) Kük. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **gigas** (Lindm.) Guagl.

Cyperus riedelianus C.B. Clarke = **Cyperus consors** C.B. Clarke var. **riedelianus** (C.B. Clarke) Kük.
Referencias: Barros, M., 1960.

Cyperus rigens J. Presl & C. Presl var. **capitatus** J. Presl & C. Presl
Sin.: *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl f. *contracta* Osten
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: URY(CAS).
Ejemplares de referencia: URY[*Rosengurtt, B. 1111* (MVFA, SI)].

Cyperus rigens J. Presl & C. Presl var. **maximus** (Kük.) Pedersen
Sin.: *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *maximus* Kük.
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: URY(CAS, MAL).
Ejemplares de referencia: URY[*Osten, C. 5670* (MVM)].

Cyperus rigens J. Presl & C. Presl var. **selmirae** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, ERI, FOR); PRY(COA, MIE, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 7222* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 13229* (SI)].

Cyperus rigens J. Presl & C. Presl var. *umbellatus* J. Presl & C. Presl = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens**
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus rigens J. Presl & C. Presl subsp. **arechavaletae** (Boeck.) Pedersen
Sin.: *Cyperus arechavaletae* Boeck., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *arechavaletae* (Boeck.) Kük., *Cyperus purpureovariegatus* Boeck.
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(MON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Juergens, I. C. 142* (B)]; URY[*Arechavaleta, J. s.n.* (B)].

Cyperus rigens J. Presl & C. Presl subsp. *cephalanthus* (Torr. & Hook.) Pedersen = **Cyperus cephalanthus** Torr. & Hook.

Cyperus rigens J. Presl & C. Presl subsp. **rigens**
Sin.: *Chlorocyperus oostachyus* (Nees) Palla, *Cyperus aurescens* Boeck., *Cyperus chilensis* Boeck., *Cyperus conceptionis* Steud., *Cyperus lacustris* Phil., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl subsp. *oostachyus* (Nees) Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *conceptionis* (Steud.) Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *laeviculmis* Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *parciflorus* Kük., *Cyperus nocha* Phil., *Cyperus oostachyus* Nees, *Cyperus paposanus* Phil., *Cyperus quinquespicatus* Boeck., *Cyperus rancoanus* Phil., *Cyperus rigens* J. Presl & C. Presl var. *umbellatus* J. Presl & C. Presl, *Cyperus surinamensis* Rottb. var. *formosus* (Vahl) Kük., *Mariscus conceptionis* (Steud.) C.B. Clarke, *Mariscus laetus* auct. non (J. Presl & C. Presl) Lindm., *Mariscus rigens* (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Pedersen, T. M., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(II, VII, VIII, IX, X, RME); PRY(APY, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE); URY(CAS, CLA, COL, FLO, MAL, MON, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 24111* (SI), *Guaglianone, E. R. 3028* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 1036* (SI), *Reitz, P. R. 4908* (SI), *Sacco, J. C. 915* (SI)]; CHL[*Barros, E. 9342* (SI), *Gunckel, L. H. 13761* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2299* (SI), *Rojas, T. 6500* (SI)]; URY[*Felippone, F. 436* (SI), *Rosengurtt, B. 992* (SI)].

Cyperus rigens J. Presl & C. Presl subsp. **serrae** (Boeck.) Pedersen
Sin.: *Cyperus laetus* auct. non J. Presl & C. Presl, *Cyperus serrae* Boeck.
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI); BRA(RGS); URY(CAS, CLA, FLO, MAL, MON, SAO, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 27649* (SI), *Burkart, A. 4180* (SI)]; BRA[*Gaudichaud-Beaupré, C. 117* (P)]; URY[*Osten, C. 18704* (MVM)].

Cyperus riparius Schrad. ex Nees = **Cyperus haspan** L. var. **haspan**

Cyperus rivularis Kunth = **Pycreus rivularis** (Kunth) Palla
Referencias: Kneucker, J. A., 1907.

Cyperus rivularis Kunth f. *subacaulis* Kük. = **Pycreus rivularis** (Kunth) Palla

Cyperus rivularis Kunth subsp. *lagunetto* (Steud.) Kük. = **Pycreus rivularis** (Kunth) Palla

Cyperus robustus Kunth = **Cyperus drummondii** Torr. & Hook.

Cyperus rotundus L.
Sin.: *Chlorocyperus rotundus* (L.) Palla
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IV, V, VII, VIII, RME); PRY(COA); URY(CAS, MON, PAY, RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1901* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 11261* (SI)]; CHL[*Barros, E. 2928* (SI)]; PRY[*Osten, C. 7419* (SI)]; URY[*Felippone, F. 5562* (SI)].

Cyperus ruizianus Boeck. = **Cyperus hermaphroditus** (Jacq.) Standl.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960.

Cyperus sabulosus (Mart. & Schrad. ex Nees) Steud. = **Pycreus flavicomus** (Michx.) C.D. Adams
Referencias: Adams, C. D., 1991; Tucker, G. C., 1985b.

[Cyperus scaberrimus Boeck.]
Referencias: Denton, M. A., 1978.
Notas: Nombre dudoso.

Cyperus schenckianus Boeck. = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus schomburgkianus Nees
Referencias: Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–1200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 8756* (SI)].

Cyperus schraderi Herter, hom. illeg. = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.

Cyperus sellowianus (Kunth) T. Koyama = **Lipocarpha humboldtiana** Nees
Referencias: Goetghebeur, P. & Van den Borre, A., 1989.

Cyperus sellowii Link = **Cyperus reflexus** Vahl
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus serrae Boeck. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **serrae** (Boeck.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus seslerioides Kunth
Sin.: *Cyperus achalensis* Hieron., *C. andinus* Palla ex Kük.
Referencias: Barros, M., 1938, 1947; Tucker, G. C., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4100.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2608* (SI)].

Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük. ex Kük. = **Kyllinga odorata** Vahl
Referencias: Tucker, G. C., 1984a.

Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük. ex Kük. f. *bulbiferus* (Kük.) Kük. = **Kyllinga odorata** Vahl

Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük. ex Kük. f. *gracilis* (Boeck.) Kük. = **Kyllinga brevifolia** Rottb.

Cyperus speciosus Vahl = **Cyperus odoratus** L.
Referencias: Tucker, G. C., 1984b.

Cyperus spectabilis Link var. *coarctatus* Boeck. = **Cyperus manimae** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus spectabilis Link var. **jujuyensis** Kük.
Sin.: *Cyperus manimae* auct. non Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 1100–2400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 1665* (SI), *Venturi, S. 2759* (SI)].

Cyperus sphacelatus Rottb.
Referencias: Adams, C. D., 1994e.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hefler, S. M. 500* (ICN)].

Cyperus sphaerostachys Link = **Cyperus luzulae** (L.) Rottb. ex Retz.
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

Cyperus squamulatus Steud. = **Cyperus distans** L. f.
Referencias: Barros, M., 1960.

Cyperus squarrosus L.
Sin.: *Cyperus aristatus* Rottb. var. *inflexus* (H.L. Mühl.) Boeck. ex Kük., *Cyperus aristatus* Rottb., nom. illeg., *Cyperus inflexus* H.L. Mühl., *Mariscus squarrosus* (L.) C.B. Clarke ex Hook. f., *Scirpus intricatus* L.
Referencias: Adams, C. D., 1994e; Kükenthal, G., 1935–1936; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; McVaugh, R., 1993; Tucker, G. C., 1994.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(CAT, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SJU, TUC); CHL(IV, VI, VII, VIII, X, RME); PRY(APY, CON, COA); URY(CLA, DUR, ROC, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 7367* (SI), *Tur, N. M. 1881* (SI), *Venturi, S. 4361* (SI)]; CHL[*Barros, E. 3119* (SI), *Taylor, C. M. 10998* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 12626* (BM)]; URY[*Chebataroff, J. 4705* (SI)].

Cyperus strigosus auct. non L. = **Cyperus pohlii** (Nees) Steud.
Referencias: Barros, M., 1938.

Cyperus subnodosus Nees & Meyen = **Cyperus corymbosus** Rottb. var. **subnodosus** (Nees & Meyen) Kük.
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus surinamensis Rottb. var. *formosus* (Vahl) Kük. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens**
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus surinamensis Rottb. var. **lutescens** Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 1082* (SI)].
Notas: Citada para Corrientes, Argentina sin indicar material de referencia (M. Barros, 1947).

Cyperus surinamensis Rottb. var. *strictus* Kük. = **Cyperus entrerianus** Boeck. var. **entrerianus**

Cyperus surinamensis Rottb. var. **surinamensis**
Sin.: *Cyperus denticulatus* Schrad. ex Schult.
Referencias: Araújo, A. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1996; Barros, M., 1947, 1960; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Herter, W. G. F., 1949–1956; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Tucker, G. C., 1994.
Hierba. Anual o perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PHA); URY(ART, CLA, COL, DUR, FLA, PAY, RNO, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1396* (SI), *Schulz, A. G. 11042* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 2844* (SI), *Reitz, P. R. 12134* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5905* (FCQ), *Rojas, T. 12616* (SI), *Rojas, T. 3094* (SI)]; URY[*Felippone, F. 4867* (SI)].

Cyperus taubertii Boeck. = **Pycreus unioloides** (R. Br.) C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1960.

Cyperus tener (Chodat & Hassl.) Osten ex Herter, hom. illeg. = **Pycreus tener** C.B. Clarke ex Chodat & Hassl.

Cyperus tenuifolius (Steud.) Dandy ex Exell = **Kyllinga pumila** Michx.
Referencias: Tucker, G. C., 1984a.

Cyperus tenuis Sw.
Sin.: *Cyperus caracasanus* Kunth
Referencias: Barros, M., 1960; Kükenthal, G., 1935–1936.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(SCA); PRY(CAU, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sobral, M. 4774* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 15667* (MO, PY)].

Cyperus teretifructus Steud. = **Pycreus polystachyos** (Rottb.) P. Beauv. subsp. **polystachyos**

Cyperus trigonus Boeck. = **Cyperus ligularis** L.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960.

Cyperus trigynum Spreng. = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus tristachyus Boeck. = **Pycreus flavescens** (L.) Rchb. var. **piceus** (Liebm.) Fernald

Cyperus tucumanensis Boeck. = **Cyperus entrerianus** Boeck. var. **entrerianus**

Cyperus tweediei C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1947.
Hierba. Anual o perenne. Endémica. 200–2700 m.
Países: ARG(TUC); CHL(V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1064* (SI)]; CHL[*Savatier, L. 1136* (K)].

Cyperus uleanus Boeck. = **Cyperus virens** Michx. var. **montanus** (Boeck.) Denton
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus umbrosus Lindl. & Nees ex Nees = **Cyperus laxus** Lam.
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

Cyperus uncinulatus Schrad. ex Nees
Sin.: *Cyperus hamatus* Schrad. ex Nees, *Cyperus paraguayensis* C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1947; Tucker, G. C., 1998.
Hierba palustre. Anual o perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL, SFE); PRY(APY, COA, PAI, SPE); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 340* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 9362* (SI)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Cyperus unicolor Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL); BRA(SCA); PRY(APA); URY(PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 982* (SI), *Burkart, A. 14536* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 5403* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 7959* (SI)]; URY[*Chebataroff, J. 3259* (SI), *Chebataroff, J. 7358* (SI)].

Cyperus unioloides R. Br. = **Pycreus unioloides** (R. Br.) C.B. Clarke
Referencias: Adams, C. D., 1994i.

Cyperus unioloides R. Br. var. *bromoides* (Link) C.B. Clarke = **Pycreus unioloides** (R. Br.) C.B. Clarke

Cyperus urvilleanus Steud. = **Isolepis nigricans** Kunth
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Cyperus usterii Palla = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus variegatus Kunth = **Pycreus niger** (Ruiz & Pav.) Cufod.

Cyperus varius Boeck. = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus vegetus Willd. = **Cyperus eragrostis** Lam. var. **eragrostis**
Referencias: Barros, M., 1947; Denton, M. A., 1978.

Cyperus vegetus Willd. var. *acutangulus* (Boeck.) Kuntze = **Cyperus virens** Michx. var. **virens**
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus vegetus Willd. var. *compactus* E. Desv. = **Cyperus eragrostis** Lam. var. **compactus** (E. Desv.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1969a.

Cyperus vegetus Willd. var. *obtusangulus* Kuntze = **Cyperus eragrostis** Lam. var. **eragrostis**
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus vegetus Willd. var. *trigonus* Kuntze = **Cyperus eragrostis** Lam. var. **compactus** (E. Desv.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus venturii Kük. = **Cyperus incomtus** Kunth var. **venturii** (Kük.) Barros
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus virens auct. non Michx. = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus virens Michx. var. *acutangulus* (Boeck.) Kük. = **Cyperus virens** Michx. var. **virens**
Referencias: Barros, M., 1947.

Cyperus virens Michx. var. *drummondii* (Torr. & Hook.) Kük. = **Cyperus drummondii** Torr. & Hook.
Referencias: Carter, R., Alexander, D. K., Bryson, C. T. & Lazari, A., 1999.

[Cyperus virens Michx. var. glauco-pallidus Boeck.]
Referencias: Denton, M. A., 1978.
Notas: Nombre dudoso.

Cyperus virens Michx. var. **minarum** (Boeck.) Denton
Sin.: *Cyperus consanguineus* Kunth var. *minarum* (Boeck.) Kük., *Cyperus minarum* Boeck.
Referencias: Denton, M. A., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodrigo Trigo, A. P. 2503* (NY)].

Cyperus virens Michx. var. **montanus** (Boeck.) Denton
Sin.: *Cyperus montanus* Boeck., *Cyperus uleanus* Boeck.
Referencias: Denton, M. A., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS, SFE); CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 3001* (SI), *Múlgura de Romero, M. E. 2511* (SI)]; CHL[*Elliott, C. 336* (BM)].

Cyperus virens Michx. var. *robustus* (Kunth) Kük. = **Cyperus drummondii** Torr. & Hook.

Cyperus virens Michx. var. *scaberrimus* (Boeck.) Kük. = **Cyperus scaberrimus** Boeck.
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus virens Michx. var. **virens**
Sin.: *Cyperus acutangulus* Boeck., *Cyperus baenitzii* Boeck., *Cyperus formosus* Vahl, *Cyperus vegetus* Willd. var. *acutangulus* (Boeck.) Kuntze, *Cyperus virens* Michx. var. *acutangulus* (Boeck.) Kük.
Referencias: Araújo, A. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1996; Barros, M., 1947, 1960; Denton, M. A., 1978; Herter, W. G. F., 1949–1956; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Marchesi, E., 1984; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(VII, IX); PRY(APY, CEN, CON, COA, PHA, SPE); URY(ART, CLA, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 3413* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 16419* (SI)]; CHL[*Zöllner, O. 13853* (MO)]; PRY[*Rojas, T. 2286* (SI)]; URY[*Marchesi, E. 16912* (MVFA)].

Cyperus virens Michx. var. *widgrenii* (Boeck.) C.B. Clarke ex Barros = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus viridispicatus Boeck. = **Cyperus imbricatus** Retz.
Referencias: Barros, M., 1938.

Cyperus volckmannii Phil.
Sin.: *Cyperus araeus* Phil.
Referencias: Kükenthal, G., 1935–1936.
Hierba. Anual. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(IV, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Volckmann, G. s.n.* (SGO)].

Cyperus wacketii Kük. = **Cyperus impolitus** Kunth
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Cyperus widgrenii Boeck. = **Cyperus intricatus** Schrad. ex Schult.
Referencias: Denton, M. A., 1978.

Cyperus xanthostachyus Steud.
Sin.: *Cyperus lechlerii* Steud.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(V, VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Buchtien, O. s.n.* (SI), *Gunckel, L. H. 1832* (SI), *Hicken, C. M. s.n.* (SI)].

Dichromena atrosanguinea E. Desv. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **spoliatus** (Barros) Vegetti

Dichromena canescens Maury = **Rhynchospora albiceps** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Dichromena ciliata Vahl, hom. illeg. = **Rhynchospora ciliata** (G. Mey.) Kük.

Dichromena ciliata Vahl var. *vahliana* Griseb. = **Rhynchospora nervosa** (Vahl) Boeck.
Referencias: Thomas, W. W., 1984.

Dichromena consanguinea Kunth = **Rhynchospora consanguinea** (Kunth) Boeck.

Dichromena corymbosa (L.) J.F. Macbr. = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **corymbosa**
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001.

Dichromena exaltata (Kunth) J.F. Macbr. = **Rhynchospora exaltata** Kunth
Referencias: Thomas, W. W., 1992, 1998.

Dichromena gigantea (Link) J.F. Macbr. = **Rhynchospora gigantea** Link
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001; Kükenthal, G., 1949.

Dichromena glauca (Vahl) J.F. Macbr. = **Rhynchospora rugosa** (Vahl) Gale
Referencias: Guaglianone, E. R., 1979.

Dichromena junciformis Kunth = **Rhynchospora junciformis** (Kunth) Boeck.
Referencias: Rocha, E. A. & Luceño, M., 2002.

Dichromena leucocephala Michx. = **Rhynchospora colorata** (L.) H. Pfeiff.
Referencias: Thomas, W. W., 1984.

Dichromena linkii J.F. Macbr., nom. superfl. = **Rhynchospora tenuis** Link subsp. **tenuis**
Referencias: Koyama, T. M., 1972.

Dichromena longifolia Spreng. = **Calyptrocarya longifolia** (Rudge) Kunth
Referencias: Barros, M., 1960.

Dichromena marisculus (Nees) J.F. Macbr. = **Rhynchospora marisculus** Nees
Referencias: Guaglianone, E. R., 1979; Koyama, T. M., 1972; Kükenthal, G., 1950–1952.

Dichromena micrantha (Vahl) Kunth, nom. illeg. = **Rhynchospora contracta** (Nees) J. Raynal

Dichromena microcephala Bertero ex Spreng. = **Rhynchospora radicans** (Schltdl. & Cham.) H. Pfeiff. subsp. **microcephala** (Bertero ex Spreng.) W.W. Thomas
Referencias: Thomas, W. W., 1984.

Dichromena nardifolia Kunth = **Rhynchospora nardifolia** (Kunth) Boeck.
Referencias: Rocha, E. A. & Luceño, M., 2002.

Dichromena nervosa Vahl = **Rhynchospora nervosa** (Vahl) Boeck.
Referencias: Kükenthal, G., 1950–1952; Thomas, W. W., 1984.

Dichromena persooniana Nees = **Rhynchospora nervosa** (Vahl) Boeck.
Referencias: Thomas, W. W., 1984.

Dichromena pilosa Kunth = **Rhynchospora pilosa** (Kunth) Boeck.
Referencias: Kükenthal, G., 1949.

Dichromena radicans Schltdl. & Cham. = **Rhynchospora radicans** (Schltdl. & Cham.) H. Pfeiff. subsp. **radicans**
Referencias: Kükenthal, G., 1950–1952.

Dichromena rigida Kunth = **Rhynchospora rigida** (Kunth) Boeck.
Referencias: Kükenthal, G., 1949.

Dichromena robusta Kunth = **Rhynchospora robusta** (Kunth) Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947; Koyama, T. M., 1972.

Dichromena sellowiana Kunth = **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.
Referencias: Koyama, T. M., 1972.

Dichromena setigera Kunth = **Rhynchospora setigera** (Kunth) Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947.

Dichromena triflora (Vahl) J.F. Macbr. = **Rhynchospora triflora** Vahl
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001; Kükenthal, G., 1949.

Dichromena velutina Kunth = **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.
Referencias: Koyama, T. M., 1972.

Diclidium lenticulare Schrad. ex Nees = **Cyperus odoratus** L.

Diclidium lomentaceum Nees = **Cyperus odoratus** L.

Diclidium maximilianii Schrad. ex Nees = **Cyperus odoratus** L.

Diclidium odoratum Schrad. ex Nees = **Cyperus odoratus** L.

Diclidium uliginosum Schrad. ex Nees = **Cyperus odoratus** L.

Didymia cyperomorpha Phil. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**

Echinoschoenus beyrichi Nees = **Rhynchospora exaltata** Kunth
Referencias: Thomas, W. W., 1992, 1998.

Eleocharis R. Br.

Número de especies: 65, 17 endémicas, 2 introducidas

Eleocharis acicullariformis Greenm. = **Eleocharis bonariensis** Nees
Referencias: Barros, M., 1947.

[Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.]
Sin.: *Scirpus acicularis* L.
Referencias: Gómez Laurito, J., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Eleocharis acicularis (L.) R. Br. var. *lilliputiana* Speg. = **Eleocharis radicans** (Poir.) Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. subsp. *bonariensis* (Nees) Osten = **Eleocharis bonariensis** Nees
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult.
Sin.: *Eleocharis fistulosa* (Poir.) Schult., nom. illeg., *Eleocharis mutata* auct. non R. Br., *Eleocharis planiculmis* Steud., *Limnochloa acutangula* (Roxb.) Nees, *Limnochloa fistulosa* (Poir.) Nees, nom. illeg., *Scirpus acutangulus* Roxb., *Scirpus fistulosus* Poir., hom. illeg.
Referencias: Barros, M., 1960; Koyama, T. M., 1978b; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; McVaugh, R., 1993; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Trevisan, R., 2005.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI); URY(CLA, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2196* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 6201* (HBR)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6148* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 8041* (MVFA)].

Eleocharis albibracteata auct. non Nees & Meyen ex Kunth = **Eleocharis pseudoalbibracteata** S. González & Guagl.

[Eleocharis albibracteata Nees & Meyen ex Kunth]
Sin.: *Chaetocyperus albibracteatus* (Nees & Meyen ex Kunth) Nees & Meyen
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Eleocharis albibracteata Nees & Meyen ex Kunth var. *nubigena* (C.B. Clarke) Barros = **Eleocharis nubigena** C.B. Clarke
Referencias: González Elizondo, M. S. & Peterson, P. M., 1996.

Eleocharis albivaginata Boeck. var. *flaccida* (Rchb. ex Spreng.) Boeck. = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis albivaginata Boeck. var. *humilis* Boeck. = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis albivaginata Boeck. var. *macrostachya* Boeck. = **Eleocharis sellowiana** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis albivaginata Boeck. var. *stricta* Boeck. = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Referencias: Barros, M., 1947.

[Eleocharis appendiculata Phil.]
Referencias: Clarke, C. B., 1902.
Notas: Nombre dudoso.

Eleocharis arechavaletae Boeck. = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1996a.

Eleocharis arenicola Torr. = **Eleocharis montevidensis** Kunth
Referencias: Barros, M., 1960.

Eleocharis argentina Barros
Referencias: Barros, M., 1947.
Hierba. Anual. Endémica. 200–700 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 9927* (SI)].

Eleocharis atacamensis Phil.
Referencias: Walters, S. M., 1980.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–3600 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, SAL, SCR, SJU); CHL(II, III, VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1685* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 966* (SI)].

Eleocharis atropurpurea (Retz.) Kunth, comb. superfl. = **Eleocharis atropurpurea** (Retz.) J. Presl & C. Presl
Referencias: Kern, J. H., 1974.

Eleocharis atropurpurea (Retz.) J. Presl & C. Presl
Sin.: *Eleocharis atropurpurea* (Retz.) Kunth, comb. superfl., *Eleocharis erratica* (Rota ex De Not.) Steud., *Eleocharis laetevirens* (Nees) Nees ex Steud., *Eleocharis monandra* Hochst. ex Steud., *Eleogenus atropurpureus* (Retz.) Nees, *Eleogenus laetevirens* Nees, *Isolepis atropurpurea* (Retz.) Roem. & Schult., *Scirpus atropurpureus* Retz., *Scirpus erraticus* Rota ex De Not.
Referencias: Barros, M., 1947; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; McVaugh, R., 1993; Mereles, F., 1990a.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 100–1100 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2942* (SI), *Morrone, O. 2961* (SI), *Schreiter, R. 10953* (SI)]; PRY[*Billiet, E. 3228* (PY)].

Eleocharis balansaiana Boeck. = **Eleocharis filiculmis** Kunth
Referencias: Barros, M., 1960.

Eleocharis baldwinii (Torr.) Chapm.
Sin.: *Chaetocyperus baldwinii* Chapm.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–100 m.
Países: URY(MON).
Ejemplares de referencia: URY[*Legrand, C. M. D. E. 1462* (SI)].

Eleocharis barrosii Svenson
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE); BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 3310* (LIL)]; BRA[*Smith, L. B. 9116* (HBR, SI)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o material de referencia (M. Barros, 1960).

Eleocharis bicolor Chapm.
Sin.: *Eleocharis minima* Kunth var. *bicolor* (Chapm.) Svenson, *Eleocharis villaricensis* Maury, *Scirpus exiguus* Griseb., hom. illeg.
Referencias: Barros, M., 1960; Svenson, H. K., 1937.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA); PRY(APY, APA, CAA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hauman, L. L. s.n.* (BA)]; BRA[*Smith, L. B. 9458* (HBR)]; PRY[*Soria, N. 4138a* (FCQ, MO)].

Eleocharis bivaginata Steud. = **Eleocharis dombeyana** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis bonariensis Nees
Sin.: *Chaetocyperus bonariensis* (Nees) Nees, *Chaetocyperus obtusatus* Nees, *Eleocharis acicullariformis* Greenm., *Eleocharis acicularis* (L.) Roem. & Schult. subsp. *bonariensis* (Nees) Osten, *Eleocharis striatula* E. Desv., *Scirpus striatulus* (E. Desv.) Griseb.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; San Martín, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R., 2001; Trevisan, R., 2005.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(III, IV, V, VII, VIII, IX, X, RME); PRY(APA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI); URY(CAS, DUR, FLA, MON, PAY, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 7315* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 10449* (HBR)]; CHL[*Hollermayer, A. 1314* (CONC)]; PRY[*Hassler, E. 1457* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 985* (SI)].

Eleocharis brehmeriana Boeck. = **Eleocharis crinalis** (Griseb.) C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis caduca (Delile) Schult. = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1947; Koyama, T. M., 1961.

Eleocharis canindeyuensis Mereles & S. González
Referencias: Mereles, F. & González Elizondo, M. S., 2003.
Hierba acuática. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hahn, W. J. 2069* (FCQ, GENT, MO, US)].

Eleocharis capillacea Kunth
Sin.: *Chaetocyperus capillaceus* (Kunth) Nees
Referencias: Barros, M., 1960; Guaglianone, E. R., 1993.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 200–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, COA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fontana, J. L. 171-2* (CTESN, SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 5341* (HBR, SI), *Smith, L. B. 9460* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 9431* (SI), *Pedersen, T. M. 11158* (SI)].

Eleocharis capitata R. Br. = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Referencias: Kern, J. H., 1974; Pedersen, T. M., 1969[1968].

Eleocharis caribaea (Rottb.) S.F. Blake = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Referencias: González Elizondo, M. S., 1994.

Eleocharis chaetaria Roem. & Schult. = **Eleocharis retroflexa** (Poir.) Urb.
Referencias: Kern, J. H., 1974.

Eleocharis confervoides (Poir.) T. Koyama = **Websteria confervoides** (Poir.) Hooper
Referencias: Adams, C. D., 1992.

Eleocharis consanguinea Kunth = **Eleocharis montana** (Kunth) Roem. & Schult.
Referencias: McVaugh, R., 1993.

Eleocharis contracta Maury
Sin.: *Eleocharis nodulosa* (Roth) Schult. var. *subnodulosa* Svenson, p.p., *Eleocharis nodulosa* (Roth) Schult. var. *tenuis* Boeck., *Eleocharis posadensis* Kük.
Referencias: Barros, M., 1960; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Herter, W. G. F., 1949–1956; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Trevisan, R., 2005.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA); URY(ART, PAY, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ferrucci, M. S. 1206* (CTES)]; BRA[*Reitz, P. R. 6960* (NY)]; PRY[*Mereles, F. 4532* (FCQ)]; URY[*Rosengurtt, B. 6810b* (MVFA)].

[Eleocharis coronata Steud.]
Notas: Nombre dudoso.

Eleocharis costulata Nees & Meyen ex Kunth = **Eleocharis radicans** (Poir.) Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis crinalis (Griseb.) C.B. Clarke
Sin.: *Eleocharis brehmeriana* Boeck., *Scirpus crinalis* Griseb.
Referencias: Barros, M., 1947; Mereles, F., 1994.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 500–3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC); PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 5267* (SI)]; PRY[*Soria, N. 4721* (FCQ)].

Eleocharis cylindrica Buckley
Sin.: *Eleocharis spegazzinii* Barros, *Eleocharis texana* Britton
Referencias: Guaglianone, E. R. & Ueno, O., 1991[1990]; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE); PRY(APY, CAA, CEN, GUA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 29801* (SI), *Guaglianone, E. R. 2318* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 2606* (SI)].

Eleocharis debilis Kunth
Referencias: Barros, M., 1960; Mereles, F., 2001.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 200–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CAA, CEN, PHA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 2154* (HBR, SI)]; PRY[*Soria, N. 4410* (FCQ, MO)].

Eleocharis dombeyana Kunth
Sin.: *Chaetocyperus stoloniferus* Nees, *Eleocharis bivaginata* Steud., *Eleocharis montana* C.B. Clarke, hom. illeg., *Eleocharis stolonifera* (Nees) Boeck., *Eleocharis truncata* Schltdl., *Limnochloa truncata* (Schltdl.) Liebm.
Referencias: Barros, M., 1947.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC); CHL(III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Herrera, S. M. E. 832* (SI)]; CHL[*Marticorena, C. 83372* (CONC)].

Eleocharis dubia Phil. = **Eleocharis pachycarpa** E. Desv.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis dunensis Kük.
Referencias: Barros, M., 1947; Herter, W. G. F., 1949–1956; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, SFE); BRA(RGS); URY(ART, CAS, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 1704* (SI)]; BRA[*Trevisan, R. 217* (ICN)]; URY[*Herter, W. G. F. 1713* (MVM)].

Eleocharis durandii Boeck. = **Eleocharis minima** Kunth
Referencias: Barros, M., 1960.

Eleocharis elata Boeck. = **Eleocharis plicarhachis** (Griseb.) Svenson
Referencias: González Elizondo, M. S., 1998.

Eleocharis elegans (Kunth) Roem. & Schult.
Sin.: *Eleocharis geniculata* auct. non (L.) Roem. & Schult., *Scirpus crassiculmis* Griseb., *Scirpus elegans* Kunth
Referencias: Barros, M., 1947; Gómez Laurito, J., 2003; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Trevisan, R., 2005; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE); URY(ART, CLA, PAY, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 1474* (BAF), *Popoff, O. 1234* (CTES)]; BRA[*Falkenberg, D. 2198* (ICN)]; PRY[*Vanni, R. O. 2146* (CTES)]; URY[*Berro, M. B. 6502* (MVFA)].

Eleocharis elongata Chapm.
Referencias: Trevisan, R. & Boldrini, I. J., 2005.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Souza, D. S. 347* (ICN)].

Eleocharis erratica (Rota ex De Not.) Steud. = **Eleocharis atropurpurea** (Retz.) J. Presl & C. Presl
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis exigua (Kunth) Roem. & Schult. = **Eleocharis radicans** (Poir.) Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis filiculmis Kunth
Sin.: *Eleocharis balansaiana* Boeck., *Eleocharis purpureovaginata* Boeck., *Eleocharis rothiana* Boeck., *Eleocharis sulcata* Nees ex Boeck., *Eleocharis sulcata* Nees ex Boeck. var. *filiculmis* (Kunth) Kurtz, *Eleocharis sulcata* Nees, nom. nud., *Scirpidium sulcatum* Nees, *Scirpus filiculmis* Schrad., nom. nud., *Scirpus sulcatus* Roth, hom. illeg.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Gómez Laurito, J., 2003; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Svenson, H. K., 1937; Trevisan, R., 2005.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, RNE, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 7108* (CTES)]; BRA[*Reitz, P. R. 12378* (HBR)]; PRY[*Zardini, E. M. 26630* (FCQ, MO)].

Eleocharis fistulosa (Poir.) Schult., nom. illeg. = **Eleocharis acutangula** (Roxb.) Schult.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1996a.

Eleocharis fistulosa (Poir.) Schult., nom. illeg. var. *obtusetrigona* (Lindl. & Nees) Barros, nom. inval. = **Eleocharis obtusetrigona** (Lindl. & Nees) Steud.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1996a.

Eleocharis flaccida (Rich. ex A. Spreng.) Urb. = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960.

Eleocharis flaccida (Rich. ex A. Spreng.) Urb. var. *arechavaletae* (Boeck.) Osten = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis flavescens (Poir.) Urb.
Sin.: *Eleocharis albivaginata* Boeck. var. *flaccida* (Rchb. ex Spreng.) Boeck., *Eleocharis albivaginata* Boeck. var. *humilis* Boeck., *Eleocharis albivaginata* Boeck. var. *stricta* Boeck., *Eleocharis arechavaletae* Boeck., *Eleocharis flaccida* (Rich. ex A. Spreng.) Urb., *Eleocharis flaccida* (Rich. ex A. Spreng.) Urb. var. *arechavaletae* (Boeck.) Osten, *Eleocharis ochreata* (Nees) Steud., *Eleogenus ocreatus* Nees var. *flaccidus* Nees, *Eleogenus ocreatus* Nees var. *minor* Nees, *Eleogenus ocreatus* Nees var. *pallens* Nees, *Scirpus flaccidus* Rchb. ex Spreng., *Scirpus flavescens* Poir., *Scirpus gaudichaudianus* Kunth
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Gómez Laurito, J., 2003; Herter, W. G. F., 1949–1956; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Trevisan, R., 2005.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, DFE, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VII, VIII, RME); PRY(AMA, CAU, CAA, CON, COA, ITA, PAI); URY(CAS, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hurrell, J. A. 5467* (SI), *Zuloaga, F. O. 5250* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 5534* (HBR)]; CHL[*Bliss 942* (CONC)]; PRY[*Zardini, E. M. 9042* (MO, PY)].

Eleocharis funebris Speg. = **Eleocharis melanostachys** (d'Urv.) C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis fuscopurpurea (Steud.) H. Pfeiff.
Sin.: *Eleocharis hyalinovaginata* Boeck., *Eleocharis maculosa* E. Desv., hom. illeg., *Eleocharis melanocarpa* Phil., *Eleocharis univaginata* Boeck., *Eleocharis vincentina* Phil., *Eleocharis vincentina* Phil. var. *arcuata* (Kuntze) C.B. Clarke, *Isolepis fuscopurpurea* Steud., *Scirpus desvauxii* Phil.
Referencias: Barros, M., 1947; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MEN, SFE, SJU, TUC); CHL(VII, VIII, X, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1646* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 17027* (CONC)].

Eleocharis fuscosanguinea Boeck. = **Eleocharis pachycarpa** E. Desv.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis galapagensis Svenson = **Eleocharis sellowiana** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis geniculata auct. non (L.) Roem. & Schult. = **Eleocharis elegans** (Kunth) Roem. & Schult.
Referencias: González Elizondo, M. S., 1994.

Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult.
Sin.: *Chlorocharis capitata* (R. Br.) Rikli, *Eleocharis caduca* (Delile) Schult., *Eleocharis capitata* R. Br., *Eleocharis caribaea* (Rottb.) S.F. Blake, *Eleocharis geniculata* (L.) Roem. & Schult. var. *minor* (Vahl) Roem. & Schult., *Eleocharis microformis* Buckley, *Eleogenus capitatus* (R. Br.) Nees ex Wight, *Limnochloa geniculata* (L.) Nees, *Scirpus brownii* Spreng., *Scirpus caducus* Delile, *Scirpus capitatus* auct. non L., *Scirpus capitatus* Willd., *Scirpus caribaeus* Rottb., *Scirpus geniculatus* L. var. *minor* Vahl, *Scirpus geniculatus* L., p.p.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; González Elizondo, M. S., 1994; Kern, J. H., 1974; Koyama, T. M., 1961; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; McVaugh, R., 1993.
Hierba palustre. Anual o perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE); URY(sin localidad).

Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 31353* (CTES)]; BRA[*Smith, L. B. 5967* (HBR)]; PRY[*Zardini, E. M. 38886* (AS, MO)].

Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. var. *minor* (Vahl) Roem. & Schult. = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis glauco-virens Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 8264* (HBR)]; PRY[*Degen, R. 61* (CTES, FCQ)].

Eleocharis gracilis Nees = **Eleocharis maculosa** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis grandirostris (Lindm.) Mereles
Sin.: *Eleocharis sulcata* Nees ex Boeck. var. *grandirostris* Lindm.
Referencias: Mereles, F., 1988.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CEN, COA, GUA, ITA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Mereles, F. 1523* (FCQ)].

Eleocharis grandis (Nees) Boeck. = **Eleocharis nudipes** (Kunth) Palla
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis haumaniana Barros
Referencias: Barros, M., 1947; Herter, W. G. F., 1949–1956; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, RNE, SFE); URY(CAS, COL, FLA, MON, RNO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 421* (LP)]; URY[*Berro, M. B. 2189* (MVFA)].

Eleocharis hyalinovaginata Boeck. = **Eleocharis fuscopurpurea** (Steud.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult.
Sin.: *Scirpus interstinctus* Vahl
Referencias: Barros, M., 1960; Gómez Laurito, J., 2003; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Pedersen, T. M., 1961b; Trevisan, R. & Boldrini, I. J., 2005.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CON, COA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 5044* (C)]; BRA[*Reitz, P. R. 1780* (HBR, PACA)]; PRY[*Mereles, F. 1171* (FCQ, MO)].

Eleocharis kleinii Barros
Referencias: Barros, M. 1966.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: CHL[*Klein, R. M. 3718a* (SI)].

Eleocharis laetevirens (Nees) Nees ex Steud. = **Eleocharis atropurpurea** (Retz.) J. Presl & C. Presl
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis laeviglumis Trevisan & Boldrini
Referencias: Trevisan, R. & Boldrini, I. J., 2006.
Hierba palustre. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Boldrini, I. J. 1311* (ICN, K, MO)].

Eleocharis laxiflora (Thwaites) H. Pfeiff. = **Eleocharis ochrostachys** Steud.
Referencias: Koyama, T. M., 1961.

Eleocharis lechleri Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–900 m.
Países: ARG(JUJ, RNE, SAL, TUC); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. 608* (SI)]; CHL[*Hollermayer, A. 1328* (CONC)].

Eleocharis lehmanniana Boeck. = **Eleocharis maculosa** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis lepida Phil. = **Eleocharis pachycarpa** E. Desv.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis leptocaulis Steud. = **Eleocharis pachycarpa** E. Desv.
Referencias: Barros, M., 1947.

[Eleocharis leptocaulos Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

Eleocharis leptostachys Lindm. = **Eleocharis loefgreniana** Boeck.

Eleocharis lindheimeri (C.B. Clarke) Svenson = **Eleocharis radicans** (Poir.) Kunth
Referencias: Svenson, H. K., 1939.

Eleocharis liocarpa Phil. = **Eleocharis pachycarpa** E. Desv.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis litoralis Phil. = **Eleocharis melanostachys** (d'Urv.) C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis loefgreniana Boeck.
Sin.: *Eleocharis leptostachys* Lindm.
Referencias: Svenson, H. K., 1939; Trevisan, R., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 28241* (MBM)].

Eleocharis macrorrhiza Boeck. = **Eleocharis melanostachys** (d'Urv.) C.B. Clarke

Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis macrostachya Britton
Sin.: *Eleocharis palustris* auct. non (L.) R. Br., *Scirpus palustris* auct. non L.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Barros, M., 1969a; Herter, W. G. F., 1949–1956; Marchesi, E., 1984; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Svenson, H. K., 1939.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, TDF, TUC); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME); URY(CAS, FLA, LAV, MON, PAY, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gerling, G. F. 3017* (SI)]; CHL[*Barros, E. 5099* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 2275* (MVM)].

Eleocharis maculosa E. Desv., hom. illeg. = **Eleocharis fuscopurpurea** (Steud.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis maculosa (Vahl) Roem. & Schult.
Sin.: *Eleocharis gracilis* Nees, *Eleocharis lehmanniana* Boeck., *Eleocharis maculosa* (Vahl) Roem. & Schult. var. *genuina* Osten, nom. inval., *Eleogenus ocreatus* Nees var. *albo-ater* Nees, *Eleogenus ocreatus* Nees var. *binocreatus* Nees, *Eleogenus schottianus* Nees, *Scirpus maculosus* Vahl
Referencias: Barros, M., 1947, 1960, 1969a; Herter, W. G. F., 1949–1956; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Marchesi, E., 1984; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Trevisan, R., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, NEU, RNE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(V, VII, VIII, X); URY(CAS, MON, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 10091* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 5480* (HBR)]; CHL[*Barros, E. 9429* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 603* (MVM)].

Eleocharis maculosa (Vahl) Roem. & Schult. var. *genuina* Osten, nom. inval. = **Eleocharis maculosa** (Vahl) Roem. & Schult.

Eleocharis melanocarpa Phil. = **Eleocharis fuscopurpurea** (Steud.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis melanocephala E. Desv.
Sin.: *Scirpus melanocephalus* (E. Desv.) Griseb.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, NEU, RNE, SAL, TUC); CHL(V, VII, VIII, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruthsatz, B. s.n.* (SI)]; CHL[*Zöllner, O. 10901* (MO)].

Eleocharis melanomphala C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU, TUC); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 3803* (BAB)]; CHL[*Ruthsatz, B. 6823* (CONC)].

Eleocharis melanostachys (d'Urv.) C.B. Clarke
Sin.: *Eleocharis funebris* Speg., *Eleocharis litoralis* Phil., *Eleocharis macrorrhiza* Boeck., *Eleocharis simulans* C.B. Clarke, *Eleocharis valdiviana* Phil., *Fimbristylis melanostachys* (C.B. Clarke) Brongn., *Isolepis heteromorpha* Steud., *Scirpus melanostachys* d'Urv.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(III, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vanni, R. O. 4428* (CTES)]; CHL[*Pisano, E. 6454* (CONC)].

Eleocharis mendocina Phil.
Referencias: Barros, M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 15946* (SI)].

Eleocharis mesopotamica Boeck. = **Eleocharis sellowiana** Kunth
Referencias: Osten, C., 1931.

Eleocharis microformis Buckley = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1947; Koyama, T. M., 1961.

Eleocharis minarum Boeck.
Referencias: Svenson, H. K., 1939.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(MIE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Pedersen, T. M. 3209* (CTES, FCQ)].

Eleocharis minima Kunth
Sin.: *Chaetocyperus polymorphus* Nees & Lindl., p.p., *Eleocharis durandii* Boeck., *Eleocharis tenuissima* Boeck., *Eleocharis wrightiana* Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Svenson, H. K., 1957; Trevisan, R., 2005.
Hierba palustre. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1100* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 11187* (HBR)]; PRY[*Mereles, F. 4730* (FCQ, MO)].

Eleocharis minima Kunth var. *bicolor* (Chapm.) Svenson = **Eleocharis bicolor** Chapm.

Eleocharis monandra Hochst. ex Steud. = **Eleocharis atropurpurea** (Retz.) J. Presl & C. Presl
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis montana C.B. Clarke, hom. illeg. = **Eleocharis dombeyana** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis montana (Kunth) Roem. & Schult.
Sin.: *Eleocharis consanguinea* Kunth, *Eleocharis montana* (Kunth) Roem. & Schult. var. *nodulosa* (Roth) Svenson, *Eleocharis nodulosa* (Roth) Schult., *Eleocharis nodulosa* (Roth) Schult. f. *trigyna* Barros, *Eleogenus nodulosus* (Roth) Nees, *Scirpus montanus* Kunth, *Scirpus nodulosus* Roth
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Marchesi, E., 1984; McVaugh, R., 1993; Svenson, H. K., 1957; Trevisan, R., 2005.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VII, VIII, IX); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE); URY(ART, CAS, COL, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2849* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 8138* (NY)]; PRY[*Mereles, F. 4741* (FCQ)]; URY[*Berro, M. B. 2192* (MVFA)].

Eleocharis montana (Kunth) Roem. & Schult. var. *nodulosa* (Roth) Svenson = **Eleocharis montana** (Kunth) Roem. & Schult.
Referencias: González Elizondo, M. S., 1994.

Eleocharis montana (Kunth) Roem. & Schult. subsp. *montevidensis* (Kunth) Osten = **Eleocharis montevidensis** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis montevidensis Kunth
Sin.: *Eleocharis arenicola* Torr., *Eleocharis montana* (Kunth) Roem. & Schult. subsp. *montevidensis* (Kunth) Osten, *Limnochloa montevidensis* (Kunth) Nees
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Marchesi, E., 1984; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Trevisan, R., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 2714* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 808* (HBR)]; URY[*Herter, W. G. F. 604* (MVM)].

Eleocharis mutata auct. non R. Br. = **Eleocharis acutangula** (Roxb.) Schult.
Referencias: Barros, M., 1960.

Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult.
Sin.: *Scirpus mutatus* L.
Referencias: Barros, M., 1960; Trevisan, R. & Boldrini, I. J., 2005.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6716* (PACA)]; PRY[*Mereles, F. 1619* (FCQ)].

Eleocharis nana Kunth
Sin.: *Chaetocyperus punctatus* Nees, *Eleocharis punctata* Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 619* (HBR)]; URY[*García Zorrón, N. 2311* (MVFA)].

Eleocharis niederleinii Boeck.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 9471* (SI)].

Eleocharis nigrescens (Nees) Steud.
Sin.: *Scirpidium nigrescens* Nees
Referencias: Gómez Laurito, J., 2003; Mereles, F., 1994.
Hierba acuática. Anual o perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Mereles, F. 1320* (CTES, FCQ, G, SI)].

Eleocharis nodulosa (Roth) Schult. = **Eleocharis montana** (Kunth) Roem. & Schult.

Eleocharis nodulosa (Roth) Schult. f. *trigyna* Barros = **Eleocharis montana** (Kunth) Roem. & Schult.
Referencias: McVaugh, R., 1993.

Eleocharis nodulosa (Roth) Schult. var. *subnodulosa* Svenson, p.p. = **Eleocharis contracta** Maury
Referencias: Pedersen, T. M., 1969[1968].

Eleocharis nodulosa (Roth) Schult. var. *tenuis* Boeck. = **Eleocharis contracta** Maury
Referencias: Pedersen, T. M., 1969[1968].

Eleocharis nubigena C.B. Clarke
Sin.: *Eleocharis albibracteata* Nees & Meyen ex Kunth var. *nubigena* (C.B. Clarke) Barros
Referencias: Barros, M., 1947; González Elizondo, M. S. & Peterson, P. M., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 900–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (SI)].

Eleocharis nudipes (Kunth) Palla
Sin.: *Eleocharis grandis* (Nees) Boeck., *Eleocharis pachystyla* C.B. Clarke var. *angustostachya* H. Pfeiff., *Eleocharis pachystyla* C.B. Clarke var. *macrostachya* H. Pfeiff., *Isolepis nudipes* Kunth, *Scirpidium grande* Nees
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Trevisan, R., 2005.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, SPE); URY(RNO, RIV, TAC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 6691* (CTES)]; BRA[*Smith, L. B. 8947* (HBR)]; PRY[*Jiménez, B. 1512* (BM, CTES, MO, PY)]; URY[*Rosengurtt, B. 8094* (MVFA)].

Eleocharis obtusa (Willd.) Schult.
Sin.: *Scirpus obtusus* Willd.
Referencias: Pedersen, T. M., 1969[1968]; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (SI)].

Eleocharis obtusetrigona (Lindl. & Nees) Steud.
Sin.: *Eleocharis fistulosa* (Poir.) Schult., nom. illeg. var. *obtusetrigona* (Lindl. & Nees) Barros, nom. inval., *Eleocharis strobilacea* Pedersen, *Limnochloa obtusetrigona* Lindl. & Nees
Referencias: Barros, M., 1960; Trevisan, R., 2005.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN, COA, SPE); URY(ART, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 14845* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 46925* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 12750* (G)]; URY[*Marchesi, E. 23235* (MVFA)].

Eleocharis occidentalis Mereles
Referencias: Mereles, F., 1990b.
Hierba palustre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Mereles, F. 1238* (FCQ, G)].
Notas: Su presencia es probable en la Argentina.

Eleocharis ochreata (Nees) Steud. = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.

Eleocharis ochrostachys Steud.
Sin.: *Eleocharis laxiflora* (Thwaites) H. Pfeiff., *Eleocharis subulata* Boeck., *Scirpus laxiflorus* Thwaites
Referencias: Trevisan, R. & Boldrini, I. J., 2005.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Trevisan, R. 133* (ICN)].

Eleocharis pachycarpa E. Desv.
Sin.: *Eleocharis dubia* Phil., *Eleocharis fuscosanguinea* Boeck., *Eleocharis lepida* Phil., *Eleocharis leptocaulis* Steud., *Eleocharis liocarpa* Phil.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Barros, M., 1947, 1969a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barros, M. 2336* (SI)]; CHL[*Meza, I. P. 5421* (CONC)].

Eleocharis pachystyla C.B. Clarke var. *angustostachya* H. Pfeiff. = **Eleocharis nudipes** (Kunth) Palla
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis pachystyla C.B. Clarke var. *macrostachya* H. Pfeiff. = **Eleocharis nudipes** (Kunth) Palla
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis palustris auct. non (L.) R. Br. = **Eleocharis macrostachya** Britton
Referencias: Barros, M., 1969a; Svenson, H. K., 1939.

[Eleocharis paraguayensis Maury]
Notas: Nombre dudoso.

Eleocharis parodii Barros
Referencias: Barros, M., 1947; Herter, W. G. F., 1943c; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Trevisan, R., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(FLO, FLA, LAV, PAY, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. s.n.* (SI)]; BRA[*Boldrini, I. J. 1283* (ICN)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Eleocharis pauciflora (Lightf.) Link = **Eleocharis quinqueflora** (Hartmann) O. Schwarz
Referencias: Tutin, T. G., 1980.

Eleocharis planiculmis Steud. = **Eleocharis acutangula** (Roxb.) Schult.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis plicarhachis (Griseb.) Svenson
Sin.: *Eleocharis elata* Boeck., *Scirpus plicarhachis* Griseb.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Pedersen, T. M., 1961b.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(CHA, COS, SAL); BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CEN, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 1712* (C)]; BRA[*Lindeman, J. C. 868* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 12570* (MO)].

Eleocharis posadensis Kük. = **Eleocharis contracta** Maury

Eleocharis prolifera auct. non Torr. = **Eleocharis viridans** Kük. ex Osten
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis pseudoalbibracteata S. González & Guagl.
Sin.: *Eleocharis albibracteata* auct. non Nees & Meyen ex Kunth
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 2200–4400 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC); CHL(I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IDE, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guiñazú, J. R. 2* (SI), *Ruíz Leal, R. A. 6517* (SI)]; CHL[*Burkart, A. 9359* (SI)].

Eleocharis punctata Boeck. = **Eleocharis nana** Kunth
Referencias: Barros, M., 1960.

Eleocharis purpureovaginata Boeck. = **Eleocharis filiculmis** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis quinquangularis Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Trevisan, R., 2005; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, AMA, CAN, CEN, COA, GUA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Niederlein, G. 595* (SI)]; BRA[*Hagelund, K. 6989* (ICN)]; PRY[*Zardini, E. M. 52340* (AS, BM, MO)].

Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz
Sin.: *Eleocharis pauciflora* (Lightf.) Link, *Isolepis andina* Phil., *Scirpus andinus* Phil., *Scirpus baeothryon* Ehrh. ex L. f., *Scirpus pauciflorus* Lightf., *Scirpus quinqueflorus* Hartmann
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002; Walters, S. M., 1980.
Hierba. Perenne. Nativa. 2200–4000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, SAL, SCR, SJU); CHL(II, III, VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2374* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 1297* (CONC)].

Eleocharis rabenii Boeck.
Referencias: Herter, W. G. F., 1949–1956; Marchesi, E., 1984; Trevisan, R., 2005.
Hierba. Anual o perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS); URY(MON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Tessmann, G. 31* (SI)]; URY[*Osten, C. 22477* (MVFA, MVM, SI)].

Eleocharis radicans (Poir.) Kunth
Sin.: *Chaetocyperus costulatus* (Nees & Meyen) Nees, *Eleocharis acicularis* (L.) R. Br. var. *lilliputiana* Speg., *Eleocharis costulata* Nees & Meyen ex Kunth, *Eleocharis exigua* (Kunth) Roem. & Schult., *Eleocharis lindheimeri* (C.B. Clarke) Svenson, *Eleocharis rivularis* Phil., *Scirpus exiguus* Kunth, *Scirpus radicans* Poir.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Marchesi, E., 1984; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Trevisan, R., 2005.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(V, VI, VII, VIII, X); PRY(APA, MIE); URY(CAS, COL, MON, ROC, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1586* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 51835* (SI)]; CHL[*Jaffuel, F. 757* (CONC)]; PRY[*Rojas, T. 7957* (FCQ, G)]; URY[*Herter, W. G. F. 612* (MVM)].

[Eleocharis reichei Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

[Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb.]
Sin.: *Eleocharis chaetaria* Roem. & Schult., *Scirpus retroflexus* Poir.
Referencias: González Elizondo, M. S., 1994.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Eleocharis rivularis Phil. = **Eleocharis radicans** (Poir.) Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis rostellata (Torr.) Torr.
Sin.: *Scirpus rostellatus* Torr.
Referencias: Barros, M., 1949; Svenson, H. K., 1934.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–1800 m.
Países: ARG(SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1650* (SI)].

Eleocharis rothiana Boeck. = **Eleocharis filiculmis** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

[Eleocharis sanguinea Maury]
Notas: Nombre dudoso.

Eleocharis sellowiana Kunth
Sin.: *Eleocharis albivaginata* Boeck. var. *macrostachya* Boeck., *Eleocharis galapagensis* Svenson, *Eleocharis mesopotamica* Boeck., *Eleogenus sellowianus* (Kunth) Nees, *Scirpus sellowianus* (Kunth) Griseb.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Trevisan, R., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE); URY(CAS, MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2234* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 8757* (HBR)]; PRY[*Zardini, E. M. 24600* (AS, MO)]; URY[*Berro, M. B. 8256* (MVFA)].

Eleocharis simulans C.B. Clarke = **Eleocharis melanostachys** (d'Urv.) C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis spegazzinii Barros = **Eleocharis cylindrica** Buckley
Referencias: Guaglianone, E. R. & Ueno, O., 1991[1990].

[Eleocharis spiralis R. Br.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Eleocharis squamigera Svenson
Referencias: Barros, M., 1960; Trevisan, R., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 11718* (BAF)].

Eleocharis stolonifera (Nees) Boeck. = **Eleocharis dombeyana** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis striatula E. Desv. = **Eleocharis bonariensis** Nees
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis strobilacea Pedersen = **Eleocharis obtusetrigona** (Lindl. & Nees) Steud.

Eleocharis subarticulata (Nees) Boeck.
Sin.: *Chaetocyperus subarticulatus* Nees, *Eleocharis widgrenii* Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960; Trevisan, R., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, COA, PHA, SPE); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 8990* (HBR)]; PRY[*Mereles, F. 1516* (FCQ)]; URY[*Osten, C. 22215* (MVM)].

Eleocharis subulata Boeck. = **Eleocharis ochrostachys** Steud.
Referencias: Koyama, T. M., 1961.

Eleocharis sulcata Nees ex Boeck. = **Eleocharis filiculmis** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis sulcata Nees, nom. nud. = **Eleocharis filiculmis** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis sulcata Nees ex Boeck. var. *filiculmis* (Kunth) Kurtz = **Eleocharis filiculmis** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis sulcata Nees ex Boeck. var. *grandirostris* Lindm. = **Eleocharis grandirostris** (Lindm.) Mereles

Eleocharis tenuissima auct. non Boeck. = **Eleocharis viridans** Kük. ex Osten
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis tenuissima Boeck. = **Eleocharis minima** Kunth
Referencias: Barros, M., 1960.

Eleocharis texana Britton = **Eleocharis cylindrica** Buckley
Referencias: Guaglianone, E. R. & Ueno, O., 1991[1990].

Eleocharis truncata Schltdl. = **Eleocharis dombeyana** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis tucumanensis Barros
Referencias: Guaglianone, E. R., Ueno, O. & Ruthsatz, B., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 3900–4600 m.
Países: ARG(JUJ, SJU, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 7071* (LIL)]; CHL[*Ruthsatz, B. 8374* (SI)].

Eleocharis uniflora Seberg
Sin.: *Chillania pusilla* Roiv.
Referencias: Seberg, O., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Roivainen, H. s.n.* (H)].

[Eleocharis uniglumis (Link) Schult.]
Sin.: *Scirpus uniglumis* Link
Referencias: Fernald, M. L. & Brackett, A. E., 1929.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Eleocharis univaginata Boeck. = **Eleocharis fuscopurpurea** (Steud.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis valdiviana Phil. = **Eleocharis melanostachys** (d'Urv.) C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis villaricensis Maury = **Eleocharis bicolor** Chapm.
Referencias: Barros, M., 1960.

Eleocharis vincentina Phil. = **Eleocharis fuscopurpurea** (Steud.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis vincentina Phil. var. *arcuata* (Kuntze) C.B. Clarke = **Eleocharis fuscopurpurea** (Steud.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleocharis viridans Kük. ex Osten
Sin.: *Eleocharis prolifera* auct. non Torr., *Eleocharis tenuissima* auct. non Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Marchesi, E., 1984; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Trevisan, R., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, PHA); URY(CAS, COL, FLA, LAV, MON, ROC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. s.n.* (BAF)]; BRA[*Hatschbach, G. 22690* (MBM)]; PRY[*Zardini, E. M. 7457* (MO, PY)]; URY[*Herter, W. G. F. 605* (MVM)].

Eleocharis widgrenii Boeck. = **Eleocharis subarticulata** (Nees) Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960.

Eleocharis wrightiana Boeck. = **Eleocharis minima** Kunth
Referencias: Barros, M., 1960; Osten, C., 1931.

Eleogenus atropurpureus (Retz.) Nees = **Eleocharis atropurpurea** (Retz.) J. Presl & C. Presl
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleogenus capitatus (R. Br.) Nees ex Wight = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Referencias: Koyama, T. M., 1961.

Eleogenus laetevirens Nees = **Eleocharis atropurpurea** (Retz.) J. Presl & C. Presl
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleogenus nodulosus (Roth) Nees = **Eleocharis montana** (Kunth) Roem. & Schult.
Referencias: McVaugh, R., 1993.

Eleogenus ocreatus Nees var. *albo-ater* Nees = **Eleocharis maculosa** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleogenus ocreatus Nees var. *binocreatus* Nees = **Eleocharis maculosa** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleogenus ocreatus Nees var. *flaccidus* Nees = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleogenus ocreatus Nees var. *minor* Nees = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleogenus ocreatus Nees var. *pallens* Nees = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleogenus schottianus Nees = **Eleocharis maculosa** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1947.

Eleogenus sellowianus (Kunth) Nees = **Eleocharis sellowiana** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Elynanthus antarcticus (Hook. f.) Franch. = **Schoenus antarcticus** (Hook. f.) Dusén
Referencias: Barros, M., 1947.

Elynanthus ensifolium Boeck. = **Machaerina ensifolia** (Boeck.) T. Koyama
Referencias: Strong, M. T., 1997.

Elynanthus laxus (Hook. f.) Macloskie = **Schoenus rhynchosporoides** (Steud.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1947.

Elynanthus sodalium Franch. = **Schoenus andinus** (Phil.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1947.

Elytrospermum californicus C.A. Mey. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **californicus**
Referencias: Soják, J., 1972.

Ephippiorhynchium polycephalum (Pers.) Nees = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
Referencias: Guaglianone, E. R., 1981; Koyama, T. M., 1972.

Ephippiorhynchium tenuirostre Nees = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
Referencias: Koyama, T. M., 1972.

Ephippiorhynchium triflorum (Vahl) Nees = **Rhynchospora triflora** Vahl
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001; Kükenthal, G., 1949.

Ephippiorhynchium trispicatum Nees = **Rhynchospora trispicata** (Nees) Schrad. ex Steud.
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001; Koyama, T. M., 1972.

Eriophorum montevidense Link = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1947.

Ficinia Schrad.

Número de especies: 1

Ficinia nodosa (Rottb.) Goetgh., Muasya & D.A. Simpson
Sin.: *Isolepis monocephala* Steud., *Isolepis nodosa* (Rottb.) R. Br., *Scirpus molinianus* Beetle, *Scirpus nodosus* Rottb.
Referencias: Beetle, A. A., 1953; Browning, J., 1989; Muasya, A. M., Simpson, D. A. & Goetghebeur, P., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Burkart, A. 9382* (SI)].

Fimbristylis Vahl

Número de especies: 9, 1 introducida

Fimbristylis annua (All.) Roem. & Schult. = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
Referencias: Adams, C. D., 1994f.

Fimbristylis annua (All.) Roem. & Schult. f. *tomentosa* (Vahl) Kük. = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl

Fimbristylis annua (All.) Roem. & Schult. var. *diphylla* (Retz.) Kük. = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
Referencias: Svenson, H. K., 1957.

Fimbristylis argentina (Palla) Molfino = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **lorentzii** (Boeck.) Kük. ex Osten

Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. & Schult.
Sin.: *Isolepis autumnalis* (L.) J. Presl & C. Presl, *Scirpus autumnalis* L., *Scirpus mucronulatus* Michx.
Referencias: Adams, C. D., 1994f; Barros, M., 1947, 1960; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Marchesi, E., 1984; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.

Hierba palustre. Anual o perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE); URY(ART, CAS, CLA, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 2731* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 6108* (HBR)]; PRY[*Walter, M. A. 179* (BM)]; URY[*Humboldt, F. W. H. A. s.n.* (B, F)].

Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. & Schult. var. *complanata* (Retz.) Barros, comb. superfl. = **Fimbristylis complanata** (Retz.) Link

Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. & Schult. var. *complanata* (Retz.) Kük. = **Fimbristylis complanata** (Retz.) Link

Fimbristylis brachyphylla Schult. = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl

Fimbristylis brunneo-vaginata (Boeck.) H. Pfeiff. = **Bulbostylis sphaerocephala** (Boeck.) Lindm.
Referencias: Barros, M., 1947.

Fimbristylis capillaris (L.) A. Gray var. *pyriformis* (C.B. Clarke ex Lindm.) Hauman = **Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clarke var. **pyriformis** C.B. Clarke ex Lindm.

Fimbristylis castanea (Michx.) Vahl
Sin.: *Scirpus castaneus* Michx.
Referencias: Kral, R., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Koyama, T. M. 13835* (CTES)].

Fimbristylis communis Kunth = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl

Fimbristylis complanata (Retz.) Link
Sin.: *Fimbristylis autumnalis* (L.) Roem. & Schult. var. *complanata* (Retz.) Barros, comb. superfl., *Fimbristylis autumnalis* (L.) Roem. & Schult. var. *complanata* (Retz.) Kük., *Scirpus complanatus* Retz.
Referencias: Barros, M., 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Koyama, T. M., 1978b; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(CAU, CAA, CEN, COA, ITA, ÑEE, SPE); URY(CAS, MAL, MON, RIV, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 6891* (CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 15140* (MBM)]; PRY[*Schinini, A. 5741* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 997* (SI)].

Fimbristylis cymosa R. Br.
Sin.: *Fimbristylis glomerata* (Retz.) Nees, *Fimbristylis spathacea* Roth
Referencias: Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dombrowski, L. T. 4706* (CTES)].

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl
Sin.: *Fimbristylis annua* (All.) Roem. & Schult., *Fimbristylis annua* (All.) Roem. & Schult. f. *tomentosa* (Vahl) Kük., *Fimbristylis annua* (All.) Roem. & Schult. var. *diphylla* (Retz.) Kük., *Fimbristylis brachyphylla* Schult., *Fimbristylis communis* Kunth, *Fimbristylis diphylla* (Retz.) Vahl, *Fimbristylis diphylla* (Retz.) Vahl var. *tomentosa* (Vahl) Barros, *Fimbristylis dregeana* Kunth, *Fimbristylis ecklonii* Nees, *Fimbristylis laxa* Vahl, *Fimbristylis polymorpha* Boeck., *Fimbristylis subtristachya* Steud., *Fimbristylis tomentosa* Vahl, *Scirpus annuus* All., *Scirpus dichotomus* L., *Scirpus diphyllus* Retz.
Referencias: Adams, C. D., 1994f; Barros, M., 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Kral, R., 2002; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; McVaugh, R., 1993.
Hierba acuática. Perenne. Introducida. 0–1200 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE); URY(ART, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1172* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 2851* (NY)]; PRY[*Schinini, A. 27815* (CTES)]; URY[*Herter, W. G. F. 2285* (MVM)].

Fimbristylis diphylla (Retz.) Vahl = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
Referencias: Adams, C. D., 1994f.

Fimbristylis diphylla (Retz.) Vahl var. *tomentosa* (Vahl) Barros = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
Referencias: Svenson, H. K., 1957.

Fimbristylis dregeana Kunth = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl

Fimbristylis ecklonii Nees = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl

Fimbristylis ferruginea auct. non (L.) Vahl = **Scirpus bonariensis** Poir.

[Fimbristylis ferruginea (L.) Vahl]
Sin.: *Scirpus ferrugineus* L.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Fimbristylis glomerata (Retz.) Nees = **Fimbristylis cymosa** R. Br.
Referencias: Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.

Fimbristylis hirta (Kunth) Roem. & Schult. = **Fimbristylis squarrosa** Vahl
Referencias: Barros, M., 1947.

Fimbristylis jacobinae Steud. = **Bulbostylis fimbriata** (Nees) C.B. Clarke

Fimbristylis laxa Vahl = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
Referencias: Adams, C. D., 1994f.

Fimbristylis littoralis Gaudich. = **Fimbristylis miliacea** (L.) Vahl

Fimbristylis melanostachys (C.B. Clarke) Brongn. = **Eleocharis melanostachys** (d'Urv.) C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1947.

Fimbristylis micrantha Boeck. = **Abildgaardia ovata** (Burm. f.) Kral

Fimbristylis miliacea (L.) Vahl
Sin.: *Fimbristylis littoralis* Gaudich., *Scirpus miliaceus* L.
Referencias: Adams, C. D., 1994f; Kral, R., 2002; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Anual. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS); PRY(ITA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 2525* (ICN)]; PRY[*Schinini, A. 27705p.p.* (CTES)].

Fimbristylis monostachya (L.) Hassk. = **Abildgaardia ovata** (Burm. f.) Kral
Referencias: Kral, R., 1971.

Fimbristylis ovata (Burm. f.) J. Kern. = **Abildgaardia ovata** (Burm. f.) Kral
Referencias: Kral, R., 1971.

Fimbristylis polymorpha Boeck. = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
Referencias: Kral, R., 1971.

Fimbristylis pygmaeum Vahl = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Fimbristylis scabra (J. Presl & C. Presl) Hauman & Vanderveken = **Bulbostylis scabra** (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke

Fimbristylis sellowiana (Kunth) Hauman & Vanderveken = **Bulbostylis sellowiana** (Kunth) Palla

Fimbristylis spadicea (L.) Vahl
Sin.: *Scirpus spadiceus* L.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, ERI, FOR, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN); URY(MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rojas, T. 8912* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 1494* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 1172* (BM)]; URY[*Marchesi, E. 12738* (MVFA)].

Fimbristylis spathacea Roth = **Fimbristylis cymosa** R. Br.
Referencias: Adams, C. D., 1994f; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.

Fimbristylis sphaerocephala (Boeck.) Hauman & Vanderveken = **Bulbostylis sphaerocephala** (Boeck.) Lindm.
Referencias: Barros, M., 1947.

Fimbristylis sphaerocephala (Boeck.) Hauman & Vanderveken var. *brunneo-vaginata* (Boeck.) Hauman & Vanderveken = **Bulbostylis sphaerocephala** (Boeck.) Lindm.

Fimbristylis squarrosa Vahl
Sin.: *Fimbristylis hirta* (Kunth) Roem. & Schult., *Fimbristylis squarrosa* Vahl var. *glabrescens* auct. non Boeck., *Isolepis hirta* Kunth, *Pogonostylis squarrosus* Bertol.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Herter, W. G. F., 1949–1956; Kral, R., 1971; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, CEN, CON, PHA); URY(CLA, DUR, PAY, RNO, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 75* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 17027* (MBM)]; PRY[*Mereles, F. 5855* (CTES, FCQ)]; URY[*Herter, W. G. F. 1771* (MVM)].

Fimbristylis squarrosa Vahl var. *glabrescens* auct. non Boeck. = **Fimbristylis squarrosa** Vahl

Fimbristylis subtristachya Steud. = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl

Fimbristylis tomentosa Vahl = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
Referencias: Svenson, H. K., 1957.

Fimbristylis urvilleana Steud. = **Bulbostylis scabra** (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke

Fimbristylis vahlii (Lam.) Link
Sin.: *Isolepis vahlii* (Lam.) Kunth, *Scirpus vahlii* Lam.
Referencias: Barros, M., 1947.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); PRY(CON, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2864* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 27699* (CTES)].

Fuirena Rottb.

Número de especies: 3

Fuirena bahiensis Nees = **Fuirena robusta** Kunth
Referencias: Angely, J. A., 1965; Kral, R., 1978.

Fuirena gracilis Spreng. = **Rhynchospora tenuis** Link subsp. **tenuis**
Referencias: Koyama, T. M., 1972.

Fuirena hexachaeta Schltdl. = **Fuirena incompleta** Nees f. **incompleta**
Referencias: Kral, R., 1978; Svenson, H. K., 1957.

Fuirena incompleta Nees f. **glabra** Maury
Referencias: Barros, M., 1960.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(RGS); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 45214* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 449* (G)].

Fuirena incompleta Nees f. **incompleta**
Sin.: *Fuirena hexachaeta* Schltdl., *Scirpus incompletus* (Nees) T. Koyama
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Koyama, T. M., 1958; Kral, R., 1978; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(CEN, COA, SPE); URY(CLA, PAY, RNO, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 4496* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 14857* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 9402* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 18693* (MVM)].

Fuirena robusta Kunth
Sin.: *Fuirena bahiensis* Nees
Referencias: Angely, J. A., 1965; Barros, M., 1947, 1960; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2212* (SI), *Jörgensen, P. 2795* (SI)]; BRA[*Sobral, M. 2048a* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 4814* (CTES, FCQ, MO), *Zardini, E. M. 17916* (SI)].

Fuirena umbellata Rottb.
Sin.: *Scirpus umbellatus* (Rottb.) Kuntze
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APY, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5656* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 5805a* (SI), *Tessmann, G. 30* (SI)]; PRY[*Jiménez, B. 80* (BM, CTES, MO, PY, SI), *Woolston, A. L. 1089* (SI)].

Gaimardia australis auct. non Gaudich. = **Oreobolus obtusangulus** Gaudich.
Referencias: Gunckel, L. H., 1971; Seberg, O., 1988.

Haloschoenus capillaris Nees, nom. illeg. = **Rhynchospora tenuis** Link subsp. **tenuis**
Referencias: Koyama, T. M., 1972.

Haloschoenus capillaris Nees var. *congestus* Nees, nom. inval. = **Rhynchospora tenuis** Link subsp. **tenuis**
Referencias: Koyama, T. M., 1972.

Haloschoenus capillaris Nees var. *minor* Nees, nom. inval. = **Rhynchospora tenuis** Link subsp. **austro-brasiliensis** T. Koyama
Referencias: Koyama, T. M., 1972.

Haloschoenus contractus Nees = **Rhynchospora contracta** (Nees) J. Raynal

Haloschoenus emaciatus Nees = **Rhynchospora emaciata** (Nees) Boeck.
Referencias: Kükenthal, G., 1950–1952.

Haloschoenus riparius Nees = **Rhynchospora riparia** (Nees) Boeck.

Haloschoenus sparsus (Sieber ex C. Presl) Nees, nom. illeg. = **Rhynchospora contracta** (Nees) J. Raynal

Haplostylis albiceps (Kunth) Nees = **Rhynchospora albiceps** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Haplostylis minor Nees = **Rhynchospora elatior** Kunth var. **brevispiculosa** (Kük.) A.C. Araújo
Referencias: Araújo, A. C., Thomas, W. W. & Longhi-Wagner, H. M., 2004.

Hemicarpha micrantha (Vahl) Britton, comb. superfl. = **Lipocarpha micrantha** (Vahl) G.C. Tucker
Referencias: Goetghebeur, P. & Van den Borre, A., 1989.

Hemicarpha micrantha (Vahl) Pax = **Lipocarpha micrantha** (Vahl) G.C. Tucker
Referencias: Goetghebeur, P. & Van den Borre, A., 1989.

Hemicarpha subsquarrosa (Mühlenb.) Nees = **Lipocarpha micrantha** (Vahl) G.C. Tucker

Hoppia berroi C.B. Clarke = **Cyperus berroi** (C.B. Clarke) Barros
Referencias: Barros, M., 1944.

Hygrocharis luzulaeformis Nees ex Osten, nom. nud. = **Rhynchospora megapotamica** (A. Spreng.) H. Pfeiff. var. **megapotamica**
Referencias: Pfeiffer, H. H., 1942–1943.

Hypolytrum Rich.

Número de especies: 1

Hypolytrum glomeratum Schrad. ex Nees, nom. nud. = **Lipocarpha humboldtiana** Nees
Referencias: Goetghebeur, P. & Van den Borre, A., 1989.

Hypolytrum schraderianum Nees
Referencias: Alves, M. V., 2003; Barros, M., 1960; Koyama, T. M., 1970; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6153* (SI), *Reitz, P. R. 4627* (SI)].

Hypoporum compositum Nees = **Scleria composita** (Nees) Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947; Core, E. L., 1942.

Hypoporum humile Nees, nom. nud. = **Scleria distans** Poir.
Referencias: Raynal, J., 1976.

Hypoporum leptostachyum (Kunth) Nees = **Scleria leptostachya** Kunth
Referencias: Barros, M., 1960; Core, E. L., 1942.

Hypoporum nutans (Willd. ex Kunth) Nees = **Scleria distans** Poir.
Referencias: Raynal, J., 1976; Robinson, E. A., 1964.

Hypoporum variegatum Nees = **Scleria variegata** (Nees) Steud.
Referencias: Core, E. L., 1952.

Hypoporum virgatum Nees = **Scleria virgata** (Nees) Steud.
Referencias: Core, E. L., 1936, 1952.

Isolepis R. Br.

Número de especies: 5, 2 endémicas

Isolepis albescens E. Desv. = **Isolepis nigricans** Kunth
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis andina Phil. = **Eleocharis quinqueflora** (Hartmann) O. Schwarz

Isolepis angachillensis Steud. = **Isolepis nigricans** Kunth
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis arenaria Nees, nom. nud. = **Bulbostylis arenaria** (Nees) Lindm.

Isolepis atacamensis Phil. = **Zameioscirpus atacamensis** (Phil.) Dhooge & Goetgh.
Referencias: Dhooge, S., Goetghebeur, P. & Muasya, A. M., 2003.

Isolepis atropurpurea (Retz.) Roem. & Schult. = **Eleocharis atropurpurea** (Retz.) J. Presl & C. Presl
Referencias: Barros, M., 1947.

Isolepis aucklandica Hook. f.
Sin.: *Scirpus aucklandicus* (Hook. f.) Boeck.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.
Hierba. Anual. Nativa.
Países: ARG(RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Laegaard, S. 12889* (K)].

Isolepis autumnalis (L.) J. Presl & C. Presl = **Fimbristylis autumnalis** (L.) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1947.

Isolepis brachyphylla J. Presl & C. Presl = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis brevis (d'Urv.) Brongn. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis bridgesii Palla = **Isolepis nigricans** Kunth

Isolepis capillaris (L.) Roem. & Schult. = **Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clarke var. **capillaris**

Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult.
Sin.: *Cyperus pumilio* Steud., *Fimbristylis pygmaeum* Vahl, *Isolepis brachyphylla* J. Presl & C. Presl, *Isolepis brevis* (d'Urv.) Brongn., *Isolepis cernua* (Vahl) Roem. & Schult. f. *aphylla* (Boeck.) Vegetti, *Isolepis chlorostachya* Nees, *Isolepis chlorotica* Steud., *Isolepis erubescens* Steud., *Isolepis heterophylla* Steud., *Isolepis leptalea* (Koch) Schult., *Isolepis magellanica* Gaudich., *Isolepis microstachys* F. Phil. ex C.B. Clarke, *Isolepis modesta* F. Phil., *Isolepis monostachya* F. Phil., *Isolepis pholioides* Steud., *Isolepis pumilio* (Steud.) Boeck., *Isolepis purpurascens* Steud., *Isolepis pygmaea* (Vahl) Kunth, *Isolepis pygmaea* (Vahl) Kunth var. *brevis* Hook. f., *Isolepis pygmaea* (Vahl) Kunth var. *elongata* Hook. f., *Isolepis saviana* (Sebast. & Mauri) Schult., *Schoenoplectus cernuus* (Vahl) Hayek, *Scirpus aphyllus* Boeck., *Scirpus arechavaletae* Boeck., *Scirpus brevis* d'Urv., *Scirpus brevis* Griseb., hom. illeg., *Scirpus cernuus* Vahl, *Scirpus cernuus* Vahl f. *aphyllus* (Boeck.) Barros, *Scirpus chloroticus* F. Phil., *Scirpus hookeri* Desv., hom. illeg., *Scirpus hookeri* Kunth, *Scirpus leptaleus* Koch, *Scirpus microstachyus* F. Phil., *Scirpus minimum* Hook. & Arn., hom. illeg., *Scirpus modestus* (F. Phil.) F. Phil., *Scirpus nudipes* Griseb., *Scirpus pygmaeus* (Vahl) A. Gray, *Scirpus riparius* Poir., hom. illeg., *Scirpus savii* Sebast. & Mauri, *Scirpus terminalis* F. Phil.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002; Wilson, K. A., 1981.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2800 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC);

BRA(RGS, SCA); CHL(I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME); URY(CAS, DUR, MAL, MON, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. 3135* (SI), *Dudley, T. R. 1033* (SI), *Guaglianone, E. R. 1409* (SI), *Troiani, H. O. 15984* (SI, SRFA)]; BRA[*Lindman, C. A. M. 703a* (K)]; CHL[*Werdermann, E. 838* (GH, SI, US)]; URY[*Felippone, F. 4391* (SI), *Herter, W. G. F. 76913* (GH, K, NY)].

Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult. f. *aphylla* (Boeck.) Vegetti = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis chlorostachya Nees = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis chlorotica Steud. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.

Isolepis conceptionis Steud. = **Isolepis nigricans** Kunth
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis consanguinea Kunth = **Bulbostylis consanguinea** (Kunth) C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1947.

Isolepis erubescens Steud. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis funckii Steud. = **Bulbostylis funckii** (Steud.) C.B. Clarke
Referencias: Kral, R., 1971; Svenson, H. K., 1957.

Isolepis fuscopurpurea Steud. = **Eleocharis fuscopurpurea** (Steud.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1947.

[Isolepis gaudichaudiana Kunth]
Sin.: *Scirpus gaudichaudii* (Kunth) Boeck.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Isolepis heteromorpha Steud. = **Eleocharis melanostachys** (d'Urv.) C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1947.

Isolepis heterophylla Steud. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis hirta Kunth = **Fimbristylis squarrosa** Vahl
Referencias: Barros, M., 1947.

Isolepis hirtella Schrad. ex Schult. = **Bulbostylis hirtella** (Schrad. ex Schult.) Urb.
Referencias: Barros, M., 1947.

[Isolepis inundata R. Br.]
Sin.: *Scirpus inundatus* (R. Br.) Poir., *Scirpus inundatus* (R. Br.) Spreng., comb. superfl.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Isolepis junciformis Kunth = **Bulbostylis junciformis** (Kunth) C.B. Clarke
Referencias: Herter, W. G. F., 1949–1956; Svenson, H. K., 1957.

Isolepis krausei Phil. = **Schoenus nitens** (R. Br.) Poir. subsp. **krausei** (Phil.) Kük.

Isolepis langsdorffiana Kunth = **Bulbostylis hirtella** (Schrad. ex Schult.) Urb.
Referencias: Barros, M., 1960.

Isolepis leptalea (Koch) Schult. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis magellanica Gaudich. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis micrantha (Vahl) Roem. & Schult. = **Lipocarpha micrantha** (Vahl) G.C. Tucker
Referencias: Goetghebeur, P. & Van den Borre, A., 1989.

Isolepis microstachys F. Phil. ex C.B. Clarke = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis modesta F. Phil. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis monocephala Steud. = **Ficinia nodosa** (Rottb.) Goetgh., Muasya & D.A. Simpson
Referencias: Muasya, A. M., Simpson, D. A. & Goetghebeur, P., 2000.

Isolepis monostachya F. Phil. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis nana F. Phil. = **Isolepis nigricans** Kunth
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis nigricans Kunth
Sin.: *Cyperus urvilleanus* Steud., *Isolepis albescens* E. Desv., *Isolepis angachillensis* Steud., *Isolepis bridgesii* Palla, *Isolepis conceptionis* Steud., *Isolepis nana* F. Phil., *Isolepis phaecocarpa* Phil., hom. illeg., *Isolepis psilocarpa* Kunth, nom. nud., *Isolepis ramulosa* Steud., *Isolepis tristachya* F. Phil., *Isolepis urvillei* Steud., *Isolepis vivipara* Schrad. ex E. Desv., *Scirpus albescens* (E. Desv.) F. Phil., *Scirpus angachilensis* (Steud.) Boeck., *Scirpus bridgesii* Boeck., *Scirpus constitutionis*

F. Phil., *Scirpus didymostachyus* F. Phil., *Scirpus gaudichaudii* Boeck. var. *tenuis* Boeck., *Scirpus nigricans* (Kunth) Poir., *Scirpus phaeocharpus* F. Phil., *Scirpus philippii* C.B. Clarke, *Scirpus trichocaulos* F. Phil.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.
Hierba. Anual. Nativa. 500–4000 m.
Países: ARG(LPA, NEU, RNE, SCR); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Laegaard, S. 13712* (K)]; CHL[*Eyerdam, W. J. 10767* (US)].

Isolepis nodosa (Rottb.) R. Br. = **Ficinia nodosa** (Rottb.) Goetgh., Muasya & D.A. Simpson
Referencias: Muasya, A. M., Simpson, D. A. & Goetghebeur, P., 2000.

Isolepis nudipes Kunth = **Eleocharis nudipes** (Kunth) Palla
Referencias: Barros, M., 1947.

Isolepis oreophila Phil. = **Amphiscirpus nevadensis** (S. Watson) Oteng-Yeb.
Referencias: Dhooge, S., 2005.

Isolepis perpusilla (Boeck.) F. Phil., nom. inval. = **Isolepis ranko** (Steud.) Vegetti
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002; Vegetti, A. C., 1995.

Isolepis phaecocarpa Phil., hom. illeg. = **Isolepis nigricans** Kunth
Referencias: Vegetti, A. C., 1996.

Isolepis pholioides Steud. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis psilocarpa Kunth, nom. nud. = **Isolepis nigricans** Kunth
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis pumilio (Steud.) Boeck. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis purpurascens Steud. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis pygmaea (Vahl) Kunth = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis pygmaea (Vahl) Kunth var. *brevis* Hook. f. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis pygmaea (Vahl) Kunth var. *elongata* Hook. f. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis ramulosa Steud. = **Isolepis nigricans** Kunth
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis ranko (Steud.) Vegetti
Sin.: *Cyperus ranko* Steud., *Isolepis perpusilla* (Boeck.) F. Phil., nom. inval., *Scirpus perpusillus* Boeck., nom. illeg., *Scirpus philippii* auct. non C.B. Clarke, *Scirpus ranko* (Steud.) Beetle, comb. superfl., *Scirpus ranko* (Steud.) Gunckel
Referencias: Barros, M., 1969a; Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002; Vegetti, A. C., 1995.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, RNE); CHL(VIII, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 3013* (SI)]; CHL[*Barros, E. 6005* (SI)].

Isolepis rigida Steud. ex Lechl. = **Trichophorum rigidum** (Steud. Ex Lechler) Goetgh., Muasya & D.A. Simpson
Referencias: Muasya, A. M., Simpson, D. A. & Goetghebeur, P., 2000.

Isolepis saviana (Sebast. & Mauri) Schult. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis scabra J. Presl & C. Presl = **Bulbostylis scabra** (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke

Isolepis sellowiana Kunth = **Bulbostylis sellowiana** (Kunth) Palla

Isolepis supina (L.) R. Br. = **Schoenoplectus supinus** (L.) Palla

Isolepis tristachya F. Phil. = **Isolepis nigricans** Kunth
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis urvillei Steud. = **Isolepis nigricans** Kunth

Isolepis vahlii (Lam.) Kunth = **Fimbristylis vahlii** (Lam.) Link
Referencias: Barros, M., 1947.

Isolepis valdiviae F. Phil. ex Boeck., nom. superfl. = **Isolepis varians** Steud.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis valdiviae Steud. = **Isolepis varians** Steud.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Isolepis varians Steud.
Sin.: *Isolepis valdiviae* F. Phil. ex Boeck., nom. superfl., *Isolepis valdiviae* Steud., *Scirpus varians* (Steud.) Boeck.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.
Hierba. Anual. Endémica. 700–1200 m.
Países: ARG(BAI, CHU); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Beetle, A. A. 420* (GH, US)]; CHL[*Eyerdam, W. J. 10176* (GH, K, NY)].

Isolepis vivipara Schrad. ex E. Desv. = **Isolepis nigricans** Kunth

Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Juncellus laevigatus (L.) C.B. Clarke = **Cyperus laevigatus** L.
Referencias: Barros, M., 1947.

Juncellus laevigatus (L.) C.B. Clarke var. *junciformis* C.B. Clarke = **Cyperus laevigatus** L.
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

Juncellus laevigatus (L.) C.B. Clarke var. *reptans* (Boeck.) C.B. Clarke = **Cyperus laevigatus** L.
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

Kyllinga Rottb., nom. cons.

Número de especies: 4

Kyllinga brevifolia Rottb.
Sin.: *Cyperus brevifolius* (Rottb.) Hassk., *Cyperus sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük. ex Kük. f. *gracilis* (Boeck.) Kük., *Kyllinga brevifolia* Rottb. var. *longifolia* Boeck., *Kyllinga cruciformis* Schrad. ex Roem. & Schult., *Kyllinga sororia* Kunth, *Kyllinga tenuis* Baldwin
Referencias: Barros, M., 1935; Herter, W. G. F., 1949–1956; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Tucker, G. C., 1984a.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CEN, GUA); URY(COL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 29126* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 660* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 6582* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 18767* (MVM)].

Kyllinga brevifolia Rottb. var. *longifolia* Boeck. = **Kyllinga brevifolia** Rottb.

Kyllinga caespitosa Nees = **Kyllinga pumila** Michx.
Referencias: Tucker, G. C., 1984a.

Kyllinga cayennensis Lam. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**
Referencias: Adams, C. D., 1994e.

Kyllinga cruciformis Schrad. ex Roem. & Schult. = **Kyllinga brevifolia** Rottb.
Referencias: Tucker, G. C., 1984a.

Kyllinga flexuosa Boeck. = **Kyllinga pumila** Michx.
Referencias: Tucker, G. C., 1984a.

Kyllinga incompleta Jacq. = **Cyperus hermaphroditus** (Jacq.) Standl.
Referencias: Tucker, G. C., 1994.

Kyllinga leucocephala Baldwin = **Kyllinga odorata** Vahl
Referencias: Tucker, G. C., 1984a.

Kyllinga martiana Schrad. ex Nees = **Kyllinga odorata** Vahl
Referencias: Tucker, G. C., 1984a.

Kyllinga monocephala Kunth, nom. illeg. = **Kyllinga odorata** Vahl
Referencias: Tucker, G. C., 1984a.

Kyllinga obtusata J. Presl & C. Presl = **Kyllinga vaginata** Lam.
Referencias: Tucker, G. C., 1984a.

Kyllinga odorata Vahl
Sin.: *Cyperus sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük. ex Kük., *Cyperus sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük. ex Kük. f. *bulbiferus* (Kük.) Kük., *Kyllinga leucocephala* Baldwin, *Kyllinga martiana* Schrad. ex Nees, *Kyllinga monocephala* Kunth, nom. illeg., *Kyllinga odorata* Vahl var. *bulbifera* Kük., *Kyllinga odorata* Vahl var. *genuina* Osten, nom. inval., *Kyllinga odorata* Vahl var. *gracilis* Boeck., *Kyllinga odorata* Vahl var. *rigida* Boeck., *Kyllinga pellucido-albida* Boeck., *Kyllinga sesquiflora* Torr., *Kyllinga triceps* auct. non Rottb.
Referencias: Adams, C. D., 1994g; Herter, W. G. F., 1949–1956; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Tucker, G. C., 1984a.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SCR, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE); URY(ART, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 48* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 37431* (SI), *Reitz, P. R. 5261* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 3579* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 339* (SI), *Rosengurtt, B. 4762* (SI)].

Kyllinga odorata Vahl var. *bulbifera* Kük. = **Kyllinga odorata** Vahl

Kyllinga odorata Vahl var. *genuina* Osten, nom. inval. = **Kyllinga odorata** Vahl

Kyllinga odorata Vahl var. *gracilis* Boeck. = **Kyllinga odorata** Vahl

Kyllinga odorata Vahl var. *rigida* Boeck. = **Kyllinga odorata** Vahl
Referencias: Tucker, G. C., 1984a.

Kyllinga panicea Rottb. = **Cyperus paniceus** (Rottb.) Boeck.
Referencias: Kükenthal, G., 1935–1936.

Kyllinga pellucido-albida Boeck. = **Kyllinga odorata** Vahl
Referencias: Osten, C., 1931.

Kyllinga peruviana Lam. = **Kyllinga vaginata** Lam.
Referencias: Tucker, G. C., 1984a.

Kyllinga pumila Michx.
Sin.: *Cyperus densicaespitosus* Mattf. & Kük., *Cyperus tenuifolius* (Steud.) Dandy ex Exell, *Kyllinga caespitosa* Nees, *Kyllinga flexuosa* Boeck., *Kyllinga tenuifolia* Steud.

Referencias: Herter, W. G. F., 1949–1956; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Tucker, G. C., 1984a.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, COA); URY(CLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1430* (SI), *Guaglianone, E. R. 1042* (SI), *Guaglianone, E. R. 2846* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 41128* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 67* (SI), *Rojas, T. 7948* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 18683* (MVM)].

Kyllinga pungens Link = **Kyllinga vaginata** Lam.
Referencias: Tucker, G. C., 1984a.

Kyllinga rigida Baldwin = **Kyllinga vaginata** Lam.
Referencias: Tucker, G. C., 1984a.

Kyllinga sesquiflora Torr. = **Kyllinga odorata** Vahl
Referencias: Tucker, G. C., 1984a.

Kyllinga sororia Kunth = **Kyllinga brevifolia** Rottb.
Referencias: Kükenthal, G., 1935–1936.

Kyllinga stricta Schrad. ex Nees = **Kyllinga vaginata** Lam.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Tucker, G. C., 1984a.

Kyllinga tenuifolia Steud. = **Kyllinga pumila** Michx.
Referencias: Tucker, G. C., 1984a.

Kyllinga tenuis Baldwin = **Kyllinga brevifolia** Rottb.
Referencias: Tucker, G. C., 1984a.

Kyllinga tenuis Boeck., hom. illeg. = **Kyllinga vaginata** Lam.
Referencias: Tucker, G. C., 1984a.

Kyllinga triceps auct. non Rottb. = **Kyllinga odorata** Vahl
Referencias: Barros, M., 1935.

Kyllinga vaginata Lam.
Sin.: *Cyperus obtusatus* (J. Presl & C. Presl) Mattf. & Kük., *Kyllinga obtusata* J. Presl & C. Presl, *Kyllinga peruviana* Lam., *Kyllinga pungens* Link, *Kyllinga rigida* Baldwin, *Kyllinga stricta* Schrad. ex Nees, *Kyllinga tenuis* Boeck., hom. illeg.
Referencias: Adams, C. D., 1994g; Barros, M., 1960; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Tucker, G. C., 1984a.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, COA, PAI); URY(CAS, CLA, COL, DUR, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2844* (SI), *Zuloaga, F. O. 6893* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 30379* (NY)]; PRY[*Rojas, T. 13220* (SI), *Zardini, E. M. 8204* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 340a* (SI)].

Lagenocarpus Nees emend. H. Pfeiff.

Número de especies: 4

Lagenocarpus dusenii H. Pfeiff. = **Lagenocarpus rigidus** (Kunth) Nees subsp. **rigidus**
Referencias: Koyama, T. M. & Maguire, B., 1965.

Lagenocarpus giganteus H. Pfeiff. = **Lagenocarpus rigidus** (Kunth) Nees subsp. **rigidus**
Referencias: Koyama, T. M. & Maguire, B., 1965.

Lagenocarpus junciformis (Kunth) Kuntze
Sin.: *Scleria junciformis* Kunth
Referencias: Koyama, T. M., 2004.
Hierba, Perenne. Nativa. 800–1300 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sellow, F. s.n.* (B)].

Lagenocarpus lapaensis H. Pfeiff. = **Lagenocarpus rigidus** (Kunth) Nees subsp. **tenuifolius** (Boeck.) T. Koyama & Maguire
Referencias: Koyama, T. M. & Maguire, B., 1965.

Lagenocarpus polyphyllus (Nees) Kuntze
Sin.: *Acrocarpus polyphyllus* Nees
Referencias: Koyama, T. M. & Maguire, B., 1965.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Von Linsigen 42* (MBM)].

Lagenocarpus rigidus (Kunth) Nees subsp. **rigidus**
Sin.: *Lagenocarpus dusenii* H. Pfeiff., *Lagenocarpus giganteus* H. Pfeiff., *Lagenocarpus rigidus* (Kunth) Nees subsp. *tremulus* (Nees) T. Koyama & Maguire, *Lagenocarpus scalariformis* H. Pfeiff., *Lagenocarpus topazinus* Nees, *Lagenocarpus tremulus* Nees, *Scleria rigida* Kunth
Referencias: Angely, J. A., 1965; Koyama, T. M. & Maguire, B., 1965; Koyama, T. M., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 13251* (NY, SI)].

Lagenocarpus rigidus (Kunth) Nees subsp. **tenuifolius** (Boeck.) T. Koyama & Maguire
Sin.: *Cryptangium tenuifolium* Boeck., *Lagenocarpus lapaensis* H. Pfeiff., *Lagenocarpus tenuifolius* (Boeck.) C.B. Clarke
Referencias: Koyama, T. M. & Maguire, B., 1965.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Riedel, J. 944* (B)].

Lagenocarpus rigidus (Kunth) Nees subsp. *tremulus* (Nees) T. Koyama & Maguire = **Lagenocarpus rigidus** (Kunth) Nees subsp. **rigidus**

Lagenocarpus scalariformis H. Pfeiff. = **Lagenocarpus rigidus** (Kunth) Nees subsp. **rigidus**

Lagenocarpus tenuifolius (Boeck.) C.B. Clarke
= **Lagenocarpus rigidus** (Kunth) Nees subsp. **tenuifolius** (Boeck.) T. Koyama & Maguire
Referencias: Koyama, T. M. & Maguire, B., 1965.

Lagenocarpus topazinus Nees = **Lagenocarpus rigidus** (Kunth) Nees subsp. **rigidus**
Referencias: Koyama, T. M. & Maguire, B., 1965.

Lagenocarpus tremulus Nees = **Lagenocarpus rigidus** (Kunth) Nees subsp. **rigidus**
Referencias: Koyama, T. M. & Maguire, B., 1965.

Lagenocarpus triqueter (Boeck.) Kuntze
Sin.: *Cryptangium triquetum* Boeck.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Barros, M., 1960; Koyama, T. M. & Maguire, B., 1965; Koyama, T. M., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 900–1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6424* (HBR, SI, US)].

Limnochloa acutangula (Roxb.) Nees = **Eleocharis acutangula** (Roxb.) Schult.

Limnochloa fistulosa (Poir.) Nees, nom. illeg.
= **Eleocharis acutangula** (Roxb.) Schult.

Limnochloa geniculata (L.) Nees = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1947.

Limnochloa montevidensis (Kunth) Nees = **Eleocharis montevidensis** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Limnochloa obtusetrigona Lindl. & Nees = **Eleocharis obtusetrigona** (Lindl. & Nees) Steud.

Limnochloa truncata (Schltdl.) Liebm. = **Eleocharis dombeyana** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Lipocarpha R. Br., nom. cons.

Número de especies: 2

Lipocarpha argentea auct. non (Vahl) R. Br.
= **Lipocarpha humboldtiana** Nees
Referencias: Goetghebeur, P. & Van den Borre, A., 1989.

Lipocarpha glomerata Nees = **Lipocarpha humboldtiana** Nees
Referencias: Goetghebeur, P. & Van den Borre, A., 1989.

Lipocarpha humboldtiana Nees
Sin.: *Cyperus sellowianus* (Kunth) T. Koyama, *Hypolytrum glomeratum* Schrad. ex Nees, nom. nud., *Lipocarpha argentea* auct. non (Vahl) R. Br., *Lipocarpha glomerata* Nees, *Lipocarpha sellowiana* Kunth
Referencias: Barros, M., 1960; Goetghebeur, P. & Van den Borre, A., 1989; Herter, W. G. F., 1949–1956; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Marchesi, E., 1984.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, MIE, PAI, SPE); URY(CLA, DUR, MON, RNO, RIV, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 16775* (SI), *Zuloaga, F. O. 5652* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 34806* (SI), *Smith, L. B. 14697* (SI)]; PRY[*Jiménez, B. 104* (BM, PY, SI), *Woolston, A. L. 1183* (SI)]; URY[*Burkart, A. 21533* (SI), *Legrand, C. M. D. H. 2048* (SI)].

Lipocarpha micrantha (Vahl) G.C. Tucker
Sin.: *Hemicarpha micrantha* (Vahl) Britton, comb. superfl., *Hemicarpha micrantha* (Vahl) Pax, *Hemicarpha subsquarrosa* (Mühlenb.) Nees, *Isolepis micrantha* (Vahl) Roem. & Schult., *Scirpus micranthus* Vahl
Referencias: Angely, J. A., 1965; Goetghebeur, P. & Van den Borre, A., 1989; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Anual. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(COA); URY(CLA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pott, V. J. 1530* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 35a* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 1770* (G, MO, U, Z)].

Lipocarpha sellowiana Kunth = **Lipocarpha humboldtiana** Nees
Referencias: Goetghebeur, P. & Van den Borre, A., 1989.

Machaerina Vahl

Número de especies: 4, 2 endémicas

Machaerina austrobrasiliensis M.T. Strong
Referencias: Strong, M. T., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22776* (C, F, MBM, MO), *Hatschbach, G. 6525* (SI)].

Machaerina ensifolia (Boeck.) T. Koyama
Sin.: *Baumea ensifolia* (Boeck.) Palla, *Cladium ensifolium* (Boeck.) Benth., *Elynanthus ensifolium* Boeck.
Referencias: Strong, M. T., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 900–2600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 507* (C, MBM, MO), *Smith, L. B. 8570* (SI)].

Machaerina ficticia (Hemsl.) T. Koyama
Sin.: *Cladium ficticium* Hemsl.
Referencias: Barros, M., 1960.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2419* (SI)].

Machaerina scirpoidea (Steud.) T. Koyama
Sin.: *Agylla ensifolia* F. Phil., *Cladium ensifolium* (F. Phil.) H. Pfeiff., *Cladium scirpoideum* (Steud.) Benth. & Hook. f. ex Hemsl., *Mariscus scirpoideus* (Steud.) Kuntze, *Terobera scirpoidea* Steud., *Vincentia scirpoidea* (Steud.) Boeck.

Referencias: Gunckel, L. H., 1971; Strong, M. T., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–700 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 9035* (CONC, M)].

Malacochaete assimilis Ces. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **californicus**

Malacochaete chilense Nees & Meyen ex Boeck. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **californicus**

Malacochaete oligostachya Phil. ex Boeck. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **californicus**

Malacochaete riparia Nees & Meyen = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **californicus**
Referencias: Vegetti, A. C., 1996.

Malacochaete riparia Nees & Meyen var. *chamissoi* Nees = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **spoliatus** (Barros) Vegetti

Malacochaete sanguinolenta Nees & Meyen ex Boeck. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **californicus**

Malacochaete tatora Nees & Meyen, nom. nud. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **californicus**

Mariscus aggregatus Willd. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**
Referencias: McVaugh, R., 1993.

Mariscus balansae (Maury) C.B. Clarke = **Cyperus impolitus** Kunth
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Mariscus cayennensis (Lam.) Urb. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**

Mariscus conceptionis (Steud.) C.B. Clarke = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens**
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Mariscus cylindricus Elliot var. *australis* Lindm. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **gigas** (Lindm.) Guagl.

Mariscus ferax (Rich.) C.B. Clarke = **Cyperus odoratus** L.
Referencias: Tucker, G. C., 1984b.

Mariscus flavus Vahl = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **aggregatus**
Referencias: McVaugh, R., 1993.

Mariscus flavus Vahl f. *umbellato-flava* C.B. Clarke = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **gigas** (Lindm.) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1995.

Mariscus flavus Vahl var. *gigas* Lindm. = **Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl. var. **gigas** (Lindm.) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1995.

Mariscus flavus Vahl var. *humilis* C.B. Clarke = **Cyperus redolens** Maury
Referencias: Barros, M., 1947.

Mariscus hassleri C.B. Clarke = **Cyperus impolitus** Kunth
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Mariscus hermaphroditus (Jacq.) Urb. = **Cyperus hermaphroditus** (Jacq.) Standl.
Referencias: Barros, M., 1947.

Mariscus impolitus (Kunth) J. Raynal = **Cyperus impolitus** Kunth

Mariscus jacquinii Kunth = **Cyperus hermaphroditus** (Jacq.) Standl.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960.

Mariscus jamaicense (Crantz) Britton = **Cladium jamaicense** Crantz
Referencias: Ahumada, O., 1985.

Mariscus laetus auct. non (J. Presl & C. Presl) Lindm. = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens**
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Mariscus ligularis (L.) Urb. = **Cyperus ligularis** L.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960.

Mariscus longus Schrad. ex Nees = **Cyperus ligularis** L.
Referencias: Kükenthal, G., 1935–1936.

Mariscus manimae (Kunth) C.B. Clarke = **Cyperus manimae** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Mariscus meyenianus (Kunth) Nees = **Cyperus meyenianus** Kunth

Mariscus oligostachys Schrad. = **Cyperus meyenianus** Kunth

Mariscus palustris Schrad. = **Cyperus meyenianus** Kunth

Mariscus phaeocephalus (Griseb.) C.B. Clarke = **Cyperus phaeocephalus** Griseb.
Referencias: Barros, M., 1947.

Mariscus pohlianus Nees = **Cyperus odoratus** L.

Mariscus rigens (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke = **Cyperus rigens** J. Presl & C. Presl subsp. **rigens**
Referencias: Pedersen, T. M., 1972.

Mariscus rufus Kunth = **Cyperus ligularis** L.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960.

Mariscus scirpoideus (Steud.) Kuntze = **Machaerina scirpoidea** (Steud.) T. Koyama
Referencias: Strong, M. T., 1997.

Mariscus setiglumis C.B. Clarke = **Cyperus pohlii** (Nees) Steud.
Referencias: Barros, M., 1947.

Mariscus squarrosus (L.) C.B. Clarke ex Hook. f. = **Cyperus squarrosus** L.
Referencias: Kern, J. H., 1974.

Mastigoscleria reflexa (Kunth) Nees = **Scleria secans** (L.) Urb.
Referencias: Barros, M., 1960; Core, E. L., 1952.

Nemochloa beyrichii Nees = **Pleurostachys beyrichii** (Nees) Steud. var. **beyrichii**
Referencias: Barros, M., 1960; Kükenthal, G., 1950–1952.

Nemochloa millegrana Nees = **Pleurostachys millegrana** (Nees) Steud.
Referencias: Barros, M., 1960.

Nemochloa urvillei (Brongn.) Nees = **Pleurostachys urvillei** Brongn.
Referencias: Kükenthal, G., 1950–1952.

Nomochloa foliosa (Kunth) Nees = **Pleurostachys foliosa** Kunth

Nomochloa tenuiflora (Brongn.) Nees = **Pleurostachys tenuiflora** Brongn.

Oncostylis arenaria Nees = **Bulbostylis arenaria** (Nees) Lindm.

Oncostylis fimbriata Nees = **Bulbostylis fimbriata** (Nees) C.B. Clarke

Oncostylis hirtella (Schrad. ex Schult.) Nees = **Bulbostylis hirtella** (Schrad. ex Schult.) Urb.
Referencias: Barros, M., 1960.

Oncostylis junciformis (Kunth) Nees var. *humboldtiana* (Spreng.) Nees = **Bulbostylis junciformis** (Kunth) C.B. Clarke
Referencias: Herter, W. G. F., 1949–1956; Svenson, H. K., 1957.

Oncostylis kunthiana Nees = **Bulbostylis consanguinea** (Kunth) C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956.

Oreobolopsis T. Koyama & Guagl.

Oreobolopsis tepalifera T. Koyama & Guagl.
Nota: Descripta para Bolivia, podría encontrarse en Chile y Argentina.

Oreobolus R. Br.

Número de especies: 1 endémica

Oreobolus clandestinus Phil. = **Oreobolus obtusangulus** Gaudich.
Referencias: Gunckel, L. H., 1971; Seberg, O., 1988.

Oreobolus obtusangulus Gaudich.
Sin.: *Gaimardia australis* auct. non Gaudich., *Oreobolus clandestinus* Phil., *Oreobolus obtusangulus* Gaudich. f. *borealis* Skottsb.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Barros, M., 1947, 1969a; Gunckel, L. H., 1971; Seberg, O., 1988.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1600 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII, IX, X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dudley, T. R. 1528* (SI), *Goodall, N. 2237* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92392* (CONC), *Gunckel, L. H. 1939* (SI)].

Oreobolus obtusangulus Gaudich. f. *borealis* Skottsb. = **Oreobolus obtusangulus** Gaudich.
Referencias: Seberg, O., 1988.

Oxycaryum Nees

Número de especies: 1

Oxycaryum cubense (Poepp. & Kunth) Palla f. **cubense**
Sin.: *Anosporum ablepharum* (Griseb.) Maury, *Anosporum cubense* (Poepp. & Kunth) Boeck., *Anosporum piliferum* Maury, *Blepharolepis leucoblepharis* Nees, *Oxycaryum piliferum* (Maury) Palla, *Oxycaryum schomburgkianum* Nees, *Scirpus ablepharus* Griseb., *Scirpus cubensis* Poepp. & Kunth, *Scirpus cubensis* Poepp. & Kunth var. *gracilis* (Boeck.) Beetle
Referencias: Adams, C. D., 1994h; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Lye, K. A., 1971; Maury, P. J. B., 1889.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR); BRA(SCA); PRY(APY, CEN, PHA); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 11024* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 13485* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 8243* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 6122* (MVFA)].

Oxycaryum cubense (Poepp. & Kunth) Palla f. **paraguayense** (Maury) Pedersen
Sin.: *Anosporum paraguayense* Maury, *Oxycaryum paraguayense* (Maury) Palla, *Scirpus cubensis* Poepp. & Kunth var. *paraguayensis* (Maury) Kük. ex Barros, *Scirpus paraguayensis* (Maury) Herter
Referencias: Pedersen, T. M., 1995.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, SFE); BRA (RGS); PRY(APY, CEN, PHA); URY(RNO, TAC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 10953* (SI), *Troncoso, N. S. 3666* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 41141* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 405* (SI)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 2060* (SI)].

Oxycaryum paraguayense (Maury) Palla = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Palla f. **paraguayense** (Maury) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1995.

Oxycaryum piliferum (Maury) Palla = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Palla f. **cubense**

Oxycaryum schomburgkianum Nees = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Palla f. **cubense**
Referencias: Lye, K. A., 1971.

Papyrus pohlii Nees = **Cyperus pohlii** (Nees) Steud.
Referencias: Barros, M., 1947.

Phylloscirpus C.B. Clarke

Número de especies: 3

Phylloscirpus acaulis (Phil.) Goetgh. & D.A. Simpson
Sin.: *Phylloscirpus andesinus* C.B. Clarke, *Scirpus acaulis* Phil., *Scirpus atacamensis* Phil. var. *exscapus* Kurtz, *Scirpus atacamensis* auct. non Phil., *Scirpus macrolepis* Phil., *Scirpus nubigenus* Phil., *Scirpus sessiliflorus* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Barros, M., 1969a; Goetghebeur, P. & Simpson, D. A., 1991.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–3500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TUC); CHL(I, II, III, IV, VII, VIII, IX, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 3246* (SI), *Vervoorst, F. B. 721* (SI)]; CHL[*Johnston, I. M. 4712* (K)].

Phylloscirpus andesinus C.B. Clarke = **Phylloscirpus acaulis** (Phil.) Goetgh. & D.A. Simpson
Referencias: Goetghebeur, P. & Simpson, D. A., 1991.

Phylloscirpus boliviensis (Barros) Dhooge & Goetgh.
Sin.: *Scirpus boliviensis* Barros
Referencias: Dhooge, S. & Goetghebeur, P., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 4100–4800 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Troll, C. 3175* (B)].

Phylloscirpus deserticola (Phil.) Dhooge & Goetgh.
Sin.: *Scirpus deserticola* Phil., *Scirpus deserticola* Phil. var. *semisubterrraneus* (Boeck.) Barros, *Scirpus distichophyllus* Boeck., *Scirpus hieronymi* auct. non Boeck., *Scirpus semisubterraneus* Boeck., *Scirpus thermalis* Spruce, nom. inval.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Barros, M., 1947; Beetle, A. A., 1953; Dhooge, S. & Goetghebeur, P., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SCR, SJU, TUC); CHL(I, II, III, IV, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 8948* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 3382* (CONC)].

Platylepis brasiliensis Kunth = **Ascolepis brasiliensis** (Kunth) Benth. ex C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956.

Platylepis leucocephala Nees = **Ascolepis brasiliensis** (Kunth) Benth. ex C.B. Clarke
Referencias: Goetghebeur, P., 1980.

Platylepis xanthocephala Nees = **Ascolepis brasiliensis** (Kunth) Benth. ex C.B. Clarke
Referencias: Goetghebeur, P., 1980.

Pleurostachys Brongn.

Número de especies: 13, 2 endémicas

Pleurostachys beyrichii (Nees) Steud. var. **beyrichii**
Sin.: *Nemochloa beyrichii* Nees
Referencias: Barros, M., 1960; Kükenthal, G., 1950–1952.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3923* (HBR)].

Pleurostachys beyrichii (Nees) Steud. var. **panicoides** H. Pfeiff.
Sin.: *Pleurostachys panicoides* (H. Pfeiff.) H. Pfeiff.
Referencias: Kükenthal, G., 1950–1952.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hoehne, F. C. 24350* (*)].

Pleurostachys calyptrocaryoides R. Gross = **Pleurostachys stricta** Kunth

Pleurostachys cimaensis H. Pfeiff.
Referencias: Pfeiffer, H. H., 1925.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Jönsson, G. 558* (*)].

Pleurostachys densefoliata H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1960; Kükenthal, G., 1950–1952.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4524* (HBR)].

Pleurostachys dusenii (H. Pfeiff.) H. Pfeiff. = **Pleurostachys urvillei** Brongn.

Pleurostachys foliosa Kunth
Sin.: *Nomochloa foliosa* (Kunth) Nees, *Rhynchospora foliosa* (Kunth) L.B. Sm.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Schwacke, C. A. W. 13205* (RB)].

Pleurostachys gaudichaudii Brongn.
Sin.: *Pleurostachys gaudichaudii* Brongn. f. *minor* Nees
Referencias: Barros, M., 1960; Kükenthal, G., 1950–1952.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5590* (HBR)].

Pleurostachys gaudichaudii Brongn. f. *minor* Nees = **Pleurostachys gaudichaudii** Brongn.

Pleurostachys gracilis Boeck. = **Pleurostachys graminifolia** Brongn. var. **gracilis** (Boeck.) Kük. & R. Gross
Referencias: Kükenthal, G., 1950–1952.

Pleurostachys graminifolia Brongn. var. **gracilis** (Boeck.) Kük. & R. Gross
Sin.: *Pleurostachys gracilis* Boeck.
Referencias: Kükenthal, G., 1950–1952.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 1612* (*)].

Pleurostachys hoehneana R. Gross
Referencias: Barros, M., 1960.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 56420* (PACA)].

Pleurostachys millegrana (Nees) Steud.
Sin.: *Nemochloa millegrana* Nees, *Pleurostachys orbigniana* Brongn., *Rhynchospora orbigniana* (Brongn.) L.B. Sm.
Referencias: Barros, M., 1960.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2879* (HBR)].

Pleurostachys montana Palla = **Pleurostachys puberula** Boeck. var. **montana** (Palla) Kük. & R. Gross
Referencias: Barros, M., 1960.

Pleurostachys muelleri Boeck. = **Pleurostachys stricta** Kunth

Pleurostachys orbigniana Brongn. = **Pleurostachys millegrana** (Nees) Steud.

Pleurostachys panicoides (H. Pfeiff.) H. Pfeiff. = **Pleurostachys beyrichii** (Nees) Steud. var. **panicoides** H. Pfeiff.
Referencias: Kükenthal, G., 1950–1952.

Pleurostachys paranensis Palla = **Pleurostachys urvillei** Brongn.

Pleurostachys paranensis Palla var. *dusenii* H. Pfeiff. = **Pleurostachys urvillei** Brongn.

Pleurostachys paranensis Palla var. *ypirangensis* H. Pfeiff. = **Pleurostachys urvillei** Brongn.

Pleurostachys puberula Boeck. var. **montana** (Palla) Kük. & R. Gross
Sin.: *Pleurostachys montana* Palla
Referencias: Barros, M., 1960.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2813* (MBM)].

Pleurostachys rabenii Boeck. = **Pleurostachys stricta** Kunth

Pleurostachys sellowii Kunth
Referencias: Barros, M., 1960; Kükenthal, G., 1950–1952.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1903* (HBR)].

Pleurostachys stricta Kunth
Sin.: *Pleurostachys calyptrocaryoides* R. Gross, *Pleurostachys muelleri* Boeck., *Pleurostachys rabenii* Boeck., *Pleurostachys stricta* Kunth var. *rabenii* (Boeck.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1960.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1860* (HBR)].

Pleurostachys stricta Kunth var. *rabenii* (Boeck.) H. Pfeiff. = **Pleurostachys stricta** Kunth

Pleurostachys tenuiflora Brongn.
Sin.: *Nomochloa tenuiflora* (Brongn.) Nees, *Rhynchospora tenuiflora* (Brongn.) L.B. Sm.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. M. 1342* (HUEFS)].

Pleurostachys ulei Boeck. = **Pleurostachys urvillei** Brongn.
Referencias: Kükenthal, G., 1950–1952.

Pleurostachys urvillei Brongn.
Sin.: *Nemochloa urvillei* (Brongn.) Nees, *Pleurostachys dusenii* (H. Pfeiff.) H. Pfeiff., *Pleurostachys paranensis* Palla, *Pleurostachys paranensis* Palla var. *dusenii* H. Pfeiff., *Pleurostachys paranensis* Palla var. *ypirangensis* H. Pfeiff., *Pleurostachys ulei* Boeck., *Pleurostachys urvillei* Brongn. f. *dusenii* (H. Pfeiff.) Kük. & R. Gross, *Pleurostachys urvillei* Brongn. f. *ypirangensis* (H. Pfeiff.) Kük. & R. Gross, *Pleurostachys urvillei* Brongn. var. *paranensis* (Palla) Kük. & R. Gross, *Pleurostachys ypirangensis* (H. Pfeiff.) H. Pfeiff.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Barros, M., 1960; Kükenthal, G., 1950–1952.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2284* (HBR)].

Pleurostachys urvillei Brongn. f. *dusenii* (H. Pfeiff.) Kük. & R. Gross = **Pleurostachys urvillei** Brongn.

Pleurostachys urvillei Brongn. f. *ypirangensis* (H. Pfeiff.) Kük. & R. Gross = **Pleurostachys urvillei** Brongn.

Pleurostachys urvillei Brongn. var. *paranensis* (Palla) Kük. & R. Gross = **Pleurostachys urvillei** Brongn.

Pleurostachys ypirangensis (H. Pfeiff.) H. Pfeiff. = **Pleurostachys urvillei** Brongn.

Pogonostylis squarrosus Bertol. = **Fimbristylis squarrosa** Vahl
Referencias: Barros, M., 1947.

Psilocarya conferta (Maury) Nees = **Rhynchospora robusta** (Kunth) Boeck.
Referencias: Barros, M., 1945.

Psilocarya pohlii Nees = **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.
Referencias: Koyama, T. M., 1972.

Psilocarya robusta (Kunth) Nees = **Rhynchospora robusta** (Kunth) Boeck.
Referencias: Barros, M., 1945; Koyama, T. M., 1972.

Psilocarya rufa Nees = **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.
Referencias: Koyama, T. M., 1972.

Psilocarya sellowiana (Kunth) Nees = **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947; Koyama, T. M., 1972.

Psilocarya velutina (Kunth) Nees = **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.
Referencias: Koyama, T. M., 1972.

Pycreus P. Beauv.

Número de especies: 12, 2 endémicas

Pycreus albomarginatus Mart. & Schrad. ex Nees = **Pycreus flavicomus** (Michx.) C.D. Adams
Referencias: Adams, C. D., 1991; Tucker, G. C., 1985b.

Pycreus angulatus (Nees) Nees = **Pycreus unioloides** (R. Br.) C.B. Clarke

[Pycreus bipartitus (Torr.) C.B. Clarke]
Sin.: *Cyperus bipartitus* Torr.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Pycreus cimicinus (J. Presl & C. Presl) H. Pfeiff. = **Pycreus niger** (Ruiz & Pav.) Cufod.
Referencias: Brako, L., 1993e.

Pycreus decumbens T. Koyama
Referencias: Koyama, T. M., 1976.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: PRY[*Koyama, T.M. 13748* (NY, SP)].

[Pycreus elegantulus (Steud.) C.B. Clarke]
Sin.: *Cyperus elegantulus* Steud.
Referencias: Clarke, C. B., 1902.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Pycreus flavescens (L.) Rchb. var. **piceus** (Liebm.) Fernald
Sin.: *Cyperus flavescens* L. var. *paraensis* (Nees) Boeck., *Cyperus piceus* Liebm., *Cyperus tristachyus* Boeck., *Pycreus paraensis* Nees
Referencias: Adams, C. D., 1994i; Barros, M., 1938; Kükenthal, G., 1935–1936; Marchesi, E., 1984; Osten, C., 1931; Reitz, R., 1956.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(COS); BRA(SCA); PRY(COA); URY(MON, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Stuckert, T. J. V. 11724* (*)]; BRA[*Herter, G. 3022* (*)]; PRY[*Mereles, F. 778* (MO)].

Pycreus flavicomus (Michx.) C.D. Adams
Sin.: *Cyperus albomarginatus* (Mart. & Schrad. ex Nees) Steud., *Cyperus albomarginatus* (Mart. & Schrad. ex Nees) Steud. var. *pachyanthemos* Kük., *Cyperus albomarginatus* (Mart. & Schrad. ex Nees) Steud. var. *sabulosus* (Mart. & Schrad. ex Nees) Kük., *Cyperus flavicomus* Michx., *Cyperus sabulosus* (Mart. & Schrad. ex Nees) Steud., *Pycreus albomarginatus* Mart. & Schrad. ex Nees, *Pycreus sabulosus* Mart. & Schrad. ex Nees
Referencias: Adams, C. D., 1991; Tucker, G. C., 1985b, 1994.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(ERI, SAL); PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tur, N. M. 1878* (CTES, LP, NY, SI)]; PRY[*Rojas, T. 2286a* (B)].

Pycreus grammicus (Kunze ex Kunth) C.B. Clarke
Sin.: *Cyperus grammicus* Kunze ex Kunth, *Cyperus parvulus* Steud.
Referencias: Clarke, C. B., 1902; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 9733* (SI)].

Pycreus helvus (Liebm.) C.B. Clarke = **Pycreus lanceolatus** (Poir.) C.B. Clarke
Referencias: Adams, C. D., 1994f.

Pycreus laevigatus (L.) Nees = **Cyperus laevigatus** L.
Referencias: Barros, M., 1947.

Pycreus lagunetto (Steud.) C.B. Clarke = **Pycreus rivularis** (Kunth) Palla

Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B. Clarke
Sin.: *Cyperus helvus* Liebm., nom. superfl., *Cyperus lanceolatus* Poir., *Cyperus lepidus* Phil., *Cyperus olfersianus* Kunth, *Cyperus olfersianus* Kunth var. *maximilianii* Boeck., *Pycreus helvus* (Liebm.)

C.B. Clarke, *Pycreus olfersianus* (Kunth) Nees, *Pycreus propinquus* Nees
Referencias: Adams, C. D., 1994j; Barros, M., 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Kükenthal, G., 1935–1936; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Marchesi, E., 1984.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VII); PRY(CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI); URY(ART, CLA, COL, MON, RNO, RIV, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. s.n.* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 398* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4492c* (SI)]; URY[*Chebataroff, J. 3160* (SI)].

[Pycreus macrostachyos (Lam.) J. Raynal]
Sin.: *Cyperus macrostachyos* Lam.
Referencias: Tucker, G. C., 1994.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Pycreus megapotamicus (Kunth) Nees var. **jaeggii** (Boeck.) Guagl.
Sin.: *Cyperus jaeggii* Boeck., *Cyperus megapotamicus* Kunth var. *jaeggii* (Boeck.) Kük. ex Barros
Referencias: Barros, M., 1960; Guaglianone, E. R., 1995; Herter, W. G. F., 1949–1956; Marchesi, E., 1984.
Hierba acuática. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI); BRA(RGS); CHL(VIII); PRY(CEN); URY(CAS, CLA, FLA, MAL, MON, ROC, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 29146* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 54997* (SI)]; CHL[*Barros, E. 2920* (SI), *Gunckel, L. H. 14543* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 59* (SI)]; URY[*Osten, C. 5714b* (SI), *Rosengurtt, B. 4793* (SI)].

Pycreus megapotamicus (Kunth) Nees var. **megapotamicus**
Sin.: *Cyperus mauryi* Kuntze, *Cyperus megapotamicus* Kunth, *Cyperus nematodes* Cham. & Schrad. ex Nees, nom. nud., *Pycreus nematodes* C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAA, CEN, COA, MIE, PAI); URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 30708* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 12327* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 9500* (SI), *Rojas, T. 13150* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 1541* (SI), *Osten, C. 21839* (SI)].

Pycreus melanostachyus (Kunth) C.B. Clarke, nom. inval. = **Pycreus niger** (Ruiz & Pav.) Cufod.

Pycreus mucronatus (Roxb.) Nees = **Cyperus laevigatus** L.
Referencias: Barros, M., 1947.

Pycreus nematodes C.B. Clarke = **Pycreus megapotamicus** (Kunth) Nees var. **megapotamicus**

Pycreus niederleinianus (Boeck.) Lindm.
Sin.: *Cyperus niederleinianus* Boeck.
Referencias: Lindman, C. A. M., 1900.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(SCA); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 18063* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 11981* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 3025* (BM)].

Pycreus niger (Ruiz & Pav.) T. Koyama, comb. superfl. = **Pycreus niger** (Ruiz & Pav.) Cufod.

Pycreus niger (Ruiz & Pav.) Cufod.
Sin.: *Cyperus biradiatus* Boeck., *Cyperus cimicinus* J. Presl & C. Presl, *Cyperus longicruris* Boeck., *Cyperus lorentzianus* Boeck., *Cyperus lorentzianus* Boeck. var. *compressus* Boeck., *Cyperus lorentzianus* Boeck. var. *elatus* Boeck., *Cyperus melanostachyus* Kunth, *Cyperus melanostachyus* Kunth f. *variegata* (Kunth) Kurtz, nom. inval., *Cyperus niger* Ruiz & Pav., *Cyperus niger* Ruiz & Pav. var. *lorentzianus* (Boeck.) Kük., *Cyperus pergracilis* Boeck., *Cyperus variegatus* Kunth, *Pycreus cimicinus* (J. Presl & C. Presl) H. Pfeiff., *Pycreus melanostachyus* (Kunth) C.B. Clarke, nom. inval., *Pycreus niger* (Ruiz & Pav.) T. Koyama, comb. superfl.
Referencias: Adams, C. D., 1994i; Barros, M., 1947, 1960; Tucker, G. C., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giardelli, M. L. 1187* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 3259* (HBR)].

Pycreus olfersianus (Kunth) Nees = **Pycreus lanceolatus** (Poir.) C.B. Clarke
Referencias: Adams, C. D., 1994i.

Pycreus paraensis Nees = **Pycreus flavescens** (L.) Rchb. var. **piceus** (Liebm.) Fernald

Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv. subsp. **polystachyos**
Sin.: *Cyperus elongatus* Steud., *Cyperus paniculatus* Rottb., *Cyperus polystachyos* Rottb., *Cyperus polystachyos* Rottb. var. *paniculatus* (Rottb.) C.B. Clarke, *Cyperus teretifructus* Steud.
Referencias: Adams, C. D., 1994i; Herter, W. G. F., 1949–1956; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Marchesi, E., 1984; Tucker, G. C., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, COA); URY(CAS, CLA, FLA, MAL, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cordini, R. I. 124* (SI), *Guaglianone, E. R. 2211* (SI), *Pedersen, T. M. 9665* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 6972* (SI), *Klein, R. M. 982* (SI)]; PRY[*Osten, C. 5509* (SI), *Rojas, T. 3092* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 906b* (SI), *Legrand, C. M. D. H. 1069* (SI)].

Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv. subsp. **riograndensis** D.A. Simpson
Referencias: Simpson, D. A., 1989.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Clayton, W. D. 4394* (K)].

Pycreus propinquus Nees = **Pycreus lanceolatus** (Poir.) C.B. Clarke
Referencias: Adams, C. D., 1994i.

Pycreus rivularis (Kunth) Palla
Sin.: *Cyperus argentinus* C.B. Clarke, hom. illeg., *Cyperus diandrus* auct. non Torr., *Cyperus lagunetto* Steud., *Cyperus megapotamicus* auct. non Kunth, *Cyperus pauper* Phil., hom. illeg., *Cyperus rivularis* Kunth, *Cyperus rivularis* Kunth f. *subacaulis* Kük., *Cyperus rivularis* Kunth subsp. *lagunetto* (Steud.) Kük., *Pycreus lagunetto* (Steud.) C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1947.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–2300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MEN, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 111* (SI)].

Pycreus sabulosus Mart. & Schrad. ex Nees = **Pycreus flavicomus** (Michx.) C.D. Adams
Referencias: Adams, C. D., 1991; Tucker, G. C., 1985b.

Pycreus tener C.B. Clarke ex Chodat & Hassl.
Sin.: *Cyperus barrosianus* Herter, *Cyperus lanceolatus* Poir. var. *tener* (C.B. Clarke ex Chodat & Hassl.) Kük., *Cyperus tener* (Chodat & Hassl.) Osten ex Herter, hom. illeg.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA); URY(CLA, COL, MON, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 13369* (SI), *Tur, N. M. 1904* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 1951* (SI), *Reitz, P. R. 111* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 1558* (SI)]; URY[*Chebataroff, J. 3653* (SI), *Osten, C. 5350* (SI)].

Pycreus unioloides (R. Br.) C.B. Clarke
Sin.: *Cyperus angulatus* Nees, *Cyperus bromoides* Willd. ex Link, *Cyperus taubertii* Boeck., *Cyperus unioloides* R. Br., *Cyperus unioloides* R. Br. var. *bromoides* (Link) C.B. Clarke, *Pycreus angulatus* (Nees) Nees
Referencias: Adams, C. D., 1994i; Barros, M., 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Tucker, G. C., 1994.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA, CEN, COA); URY(PAY, RNO, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 30709* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 3254* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 8571* (SI)]; URY[*Chebataroff, J. 9883* (SI)].

Remirea Aubl.
Número de especies: 1

Remirea maritima Aubl.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Barros, M., 1960; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1458* (SI), *Reitz, P. R. 4490* (SI)].

Rhynchospora Vahl
Número de especies: 63, 10 endémicas

Rhynchospora albiceps Kunth
Sin.: *Dichromena canescens* Maury, *Haplostylis albiceps* (Kunth) Nees
Referencias: Angely, J. A., 1965; Barros, M., 1945, 1947; Kükenthal, G., 1949; Molfino, J. F., 1925a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CAN, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Irwin, J. B. 27290* (LIL)]; BRA[*Araújo, A. C. 621* (ICN, SPF)]; PRY[*Zardini, E. M. 52599* (SI)].

Rhynchospora alpina (R. Br.) Spreng. = **Carpha alpina** R. Br.

Rhynchospora alta Boeck. = **Rhynchospora globosa** (Kunth) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1960; Kükenthal, G., 1949, 1950–1952.

Rhynchospora arechavaletae Boeck. = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
Referencias: Guaglianone, E. R., 1981; Koyama, T. M., 1972.

Rhynchospora arechavaletae Boeck. var. *ostenii* (Kük.) Kük. = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
Referencias: Guaglianone, E. R., 1981.

Rhynchospora arundinacea Boeck. = **Cladium jamaicense** Crantz
Referencias: Guaglianone, E. R., 1996a.

Rhynchospora asperula (Nees) Steud.
Sin.: *Calyptrostylis asperula* Nees, *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *asperula* (Nees) Kük.
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2793* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2235* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 24963* (SI)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 1109* (MVFA)].

Rhynchospora aurea Vahl = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **corymbosa**
Referencias: Barros, M., 1947.

[Rhynchospora aurea Vahl f. florida (Rudge) Lindm.]
Notas: Nombre dudoso. Posible sinónimo de *Rhynchospora corymbosa* var. *corymbosa*.

Rhynchospora aurea Vahl f. *florida* auct. non (Rudge) Lindm. = **Rhynchospora organensis** C.B. Clarke
Referencias: Guaglianone, E. R. & Moore, G., 2001.

Rhynchospora barrosiana Guagl.
Sin.: *Rhynchospora cymosa* auct. non Nutt. ex Exell, *Rhynchospora glauca* auct. non Vahl
Referencias: Guaglianone, E. R., 1979.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE); URY(CAS, CLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 29738* (CTES, K, LIL, LP, MVM, NY, P, SI), *Guaglianone, E. R. 2932* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 4923* (SI)]; PRY[*Hahn, W. J. 2071* (SI)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 26* (SI)].

[Rhynchospora berteroi (Spreng.) C.B. Clarke]
Referencias: Thomas, W. W., 1984.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Rhynchospora beyrichi (Nees) Steud. = **Rhynchospora exaltata** Kunth
Referencias: Thomas, W. W., 1992, 1998.

Rhynchospora biflora Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960; Koyama, T. M., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 728* (HBR), *Pereira, E. 5493* (SI), *Reitz, P. R. 7749* (SI)].

Rhynchospora borinquensis Britton = **Rhynchospora marisculus** Nees
Referencias: Guaglianone, E. R., 1979; Koyama, T. M., 1972; Kükenthal, G., 1950–1952; Thomas, W. W., 1992.

Rhynchospora brasiliensis Boeck.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Guaglianone, E. R., 1979; Kükenthal, G., 1950–1952.
Hierba. Perenne. Nativa. 900–1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 53831* (SI), *Reitz, P. R. 14212* (SI), *Smith, L. B. 10329* (SI)].

Rhynchospora brasiliensis auct. non Boeck. = **Rhynchospora marisculus** Nees
Referencias: Guaglianone, E. R., 1979.

Rhynchospora breviuscula H. Pfeiff.
Referencias: Thomas, W. W., 1984.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 25739* (MICH, US)].

Rhynchospora brittonii Gale
Sin.: *Rhynchospora microcarpa* auct. non Baldwin ex A. Gray
Referencias: Guaglianone, E. R., 1980.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS); BRA(RGS, SCA); URY(CAS, DUR, MON, PAY, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 30756* (SI), *Ibarrola, T. 1550* (NY, SI)]; BRA[*Rambo, B. 39454* (SI), *Reitz, P. R. 5538* (HBR, SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 1532* (SI), *Legrand, C. M. D. H. 3603* (SI)].

Rhynchospora brownii Roem. & Schult. subsp. **americana** Guagl.
Sin.: *Rhynchospora rugosa* auct. non (Vahl) Gale
Referencias: Guaglianone, E. R., 1979; Marchesi, E., 1984; Thomas, W. W., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2700 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IX); PRY(AMA, CEN, MIE); URY(CLA, FLA, LAV, MON, RNO, SJO, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1037* (SI)]; BRA[*Pedersen, T. M. 11491* (SI)]; CHL[*Barros, E. 9493* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 452* (BAF)]; URY[*Rosengurtt, B. 4615* (SI)].

Rhynchospora catharinensis Barros
Referencias: Barros, M., 1967.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–1100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 14194* (HBR, SI)].

Rhynchospora cephalanta A. Rich., hom. illeg. = **Rhynchospora globosa** (Kunth) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1960; Kükenthal, G., 1949, 1950–1952.

Rhynchospora ciliata (G. Mey.) Kük.
Sin.: *Dichromena ciliata* Vahl, hom. illeg., *Rhynchospora nervosa* (Vahl) Boeck. subsp. *ciliata* (Vahl) T. Koyama, *Rhynchospora nervosa* (Vahl) Boeck. var. *ciliata* (Vahl) Kük., *Schoenus ciliatus* G. Mey.
Referencias: Luceño, M., Vanzela, A. L. L. & Guerra, M., 1998; McVaugh, R., 1993; Strong, M. T., 2006; Thomas, W. W., 1984, 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 7724* (HBR)].
Notas: Probablemente crezca en Argentina y Paraguay.

[Rhynchospora colorata (L.) H. Pfeiff.]
Sin.: *Dichromena leucocephala* Michx., *Rhynchospora stellata* (Lam.) Griseb., *Schoenus coloratus* L.
Referencias: Thomas, W. W., 1984, 1992.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Rhynchospora conferta (Nees) Boeck. = **Rhynchospora robusta** (Kunth) Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947.

Rhynchospora confinis (Nees) C.B. Clarke
Sin.: *Rhynchospora lundii* Boeck., *Spermodon confinis* Nees
Referencias: Guaglianone, E. R., 1980; Kükenthal, G., 1950–1952.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(COS, LRI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 8540* (CTES)]; BRA[*Reitz, P. R. 5349* (LIL, NY, SI, UC, US)]; PRY[*Pedersen, T. M. 3268* (NY, SI, UC, US)].

Rhynchospora consanguinea (Kunth) Boeck.
Sin.: *Dichromena consanguinea* Kunth, *Rhynchospora consanguinea* (Kunth) Boeck. f. *subrigida* Kük., *Rhynchospora consanguinea* (Kunth) Boeck. f. *subspeciosa* Kük.
Referencias: Kükenthal, G., 1949.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(CAU, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10139* (S)]; PRY[*Zardini, E. M. 51210* (SI)].

Rhynchospora consanguinea (Kunth) Boeck. f. *subrigida* Kük. = **Rhynchospora consanguinea** (Kunth) Boeck.

Rhynchospora consanguinea (Kunth) Boeck. f. *subspeciosa* Kük. = **Rhynchospora consanguinea** (Kunth) Boeck.

Rhynchospora consanguinea (Kunth) Boeck. var. *rigida* (Kunth) Kük. = **Rhynchospora rigida** (Kunth) Boeck.

Rhynchospora contracta (Nees) J. Raynal
Sin.: *Dichromena micrantha* (Vahl) Kunth, nom. illeg., *Haloschoenus contractus* Nees, *Haloschoenus sparsus* (Sieber ex C. Presl) Nees, nom. illeg., *Juncus parviflorus* Poir., nom. illeg., *Rhynchospora micrantha* auct. non Vahl, *Rhynchospora micrantha* Vahl var. *contracta* (Nees) Kük., *Rhynchospora minutiflora* (Rich. ex Spreng.) C.D. Adams, nom. illeg., *Rhynchospora parviflora* Vahl ex Nees, nom. inval., *Rhynchospora sparsa* Sieber ex C. Presl, nom. inval., *Scleria minutiflora* Rich. ex Spreng., nom. inval.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Rocha, E. A. & Luceño, M., 2002.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Ramella, L. 2794* (G, SI)].
Notas: Cita dudosa para la Argentina (Rocha & Luceño, 2002).

Rhynchospora coriifolia Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Chebataroff, J. 6142* (*)].

Rhynchospora corniculata (Lam.) A. Gray var. *macrostachya* auct. non (Torr.) Britton = **Rhynchospora pseudomacrostachya** G. Moore, Guagl. & Zartman
Referencias: Moore, G., Guaglianone, E. R. & Zartman, C., 2002.

Rhynchospora corymbifera Nees = **Rhynchospora longiflora** C. Presl
Referencias: Kükenthal, G., 1949.

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton f. *angustirostris* Barros = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **angustirostris** (Barros) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001.

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton f. *chacoensis* Barros = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **chacoensis** (Barros) Svenson
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001.

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. **angustirostris** (Barros) Guagl.
Sin.: *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton f. *angustirostris* Barros
Referencias: Barros, M., 1947; Guaglianone, E. R., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–1200 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1598* (SI), *Schwarz, G. J. 2669* (LIL)]; BRA[*Klein, R. M. 3358* (SI), *Smith, L. B. 9112* (HBR, P, R, SI)]; PRY[*Soria, N. 4858* (FCQ)].

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. *asperula* (Nees) Kük. = **Rhynchospora asperula** (Nees) Steud.
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001.

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. **bonariensis** Barros ex Cabrera & G. Dawson
Referencias: Barros, M., 1947; Guaglianone, E. R., 2001; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS); URY(CAS, LAV, MON, RNO, RIV, ROC, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 11357* (SI)]; BRA[*Bertels, A. 1425* (SI)]; URY[*Chebataroff, J. 1156* (SI)].

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. **chacoensis** (Barros) Svenson
Sin.: *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton f. *chacoensis* Barros, *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *singularis* Kük.
Referencias: Barros, M., 1947; Guaglianone, E. R., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); PRY(CEN, CON, GUA, PHA); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 12485* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 8777* (BM, G, P), *Rojas, T. 3086* (SI)]; URY[*Marchesi, E. 28658* (MVFA)].

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. **corymbosa**
Sin.: *Calyptrostylis fascicularis* Nees, *Calyptrostylis florida* (Rudge) Nees, *Dichromena corymbosa* (L.) J.F. Macbr., *Rhynchospora aurea* Vahl, *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *florida* (Rudge) Kük., *Rhynchospora florida* (Rudge) Schult., *Rhynchospora surinamensis* (Rottb.) Nees, *Schoenus floridus* Rudge, *Schoenus surinamensis* Rottb., *Scirpus corymbosus* L.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Guaglianone, E. R., 2001; Kükenthal, G., 1949, 1950–1952.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE); URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 29776* (SI), *Guaglianone, E. R. 2165* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 34826* (SI), *Sobral, M. 4791* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 13147* (SI), *Zardini, E. M. 51797* (SI)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (SI), *Osten, C. 4518* (G)].

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. *florida* (Rudge) Kük. = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **corymbosa**
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001.

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. *grandispiculosa* auct. non Kük. = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **legrandii** (Kük. ex Barros) Guagl.
Referencias: Barros, M., 1960; Guaglianone, E. R., 2001.

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. **legrandii** (Kük. ex Barros) Guagl.
Sin.: *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton subsp. *legrandii* (Kük. ex Barros) Luceño & Vanzela, *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *grandispiculosa* auct. non Kük., *Rhynchospora legrandii* Kük. ex Barros
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Guaglianone, E. R., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); BRA(PAR, SCA); URY(MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 8934* (MVFA, NY, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15189* (MBM)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 1371* (B, SI)].

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. *minor* Kük. = **Rhynchospora scutellata** Griseb.
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001.

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. *organensis* (C.B. Clarke) Kük. = **Rhynchospora organensis** C.B. Clarke
Referencias: Guaglianone, E. R. & Moore, G., 2001; Guaglianone, E. R., 2001.

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. *puncticulata* (Kük. ex Osten) Kük. = **Rhynchospora scutellata** Griseb.
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001.

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. *singularis* Kük. = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **chacoensis** (Barros) Svenson
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001.

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton subsp. *legrandii* (Kük. ex Barros) Luceño & Vanzela = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **legrandii** (Kük. ex Barros) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001.

Rhynchospora crassipes Boeck. = **Rhynchospora terminalis** (Nees) Steud. var. **crassipes** (Boeck.) Kük.
Referencias: Kükenthal, G., 1949.

Rhynchospora crinigera Boeck.
Referencias: Herter, W. G. F., 1949–1956; Kükenthal, G., 1950–1952; Marchesi, E., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: BRA(PAR, RGS); URY(MON, SJO).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 8510* (SI)]; URY[*Arechavaleta, J. 2522* (MVM), *Chebataroff, J. 9629* (SI)].

Rhynchospora curvula (Nees) Boeck., hom. illeg. = **Rhynchospora tenuis** Link subsp. **tenuis**
Referencias: Koyama, T. M., 1972.

[Rhynchospora cymosa Nutt. ex Elliott]
Referencias: Guaglianone, E. R., 1979.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Rhynchospora cymosa auct. non Nutt. ex Exell = **Rhynchospora barrosiana** Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1979.

Rhynchospora cyperoides (Sw.) Mart. = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
Referencias: Koyama, T. M., 1972.

Rhynchospora cyperoides (Sw.) Mart. var. *triceps* (Vahl) Boeck. = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
Referencias: Guaglianone, E. R., 1981.

Rhynchospora diamantina Kük., nom. illeg. = **Rhynchospora elatior** Kunth var. **brevispiculosa** (Kük.) A.C. Araújo
Referencias: Araújo, A. C., Thomas, W. W. & Longhi-Wagner, H. M., 2004.

Rhynchospora diamantina Kük. var. *brevispiculosa* Kük. = **Rhynchospora elatior** Kunth var. **brevispiculosa** (Kük.) A.C. Araújo
Referencias: Araújo, A. C., Thomas, W. W. & Longhi-Wagner, H. M., 2004.

Rhynchospora elatior Kunth var. **brevispiculosa** (Kük.) A.C. Araújo
Sin.: *Haplostylis minor* Nees, *Rhynchospora diamantina* Kük. var. *brevispiculosa* Kük., *Rhynchospora diamantina* Kük., nom. illeg., *Rhynchospora leucostachys* Boeck., *Rhynchospora minor* (Nees) Steud., nom. illeg.
Referencias: Araújo, A. C., Thomas, W. W. & Longhi-Wagner, H. M., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–600 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 7698* (K, MO, NY, P)].

Rhynchospora elatior Kunth var. **elatior**
Referencias: Kükenthal, G., 1949.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16217* (*)].

Rhynchospora emaciata (Nees) Boeck.
Sin.: *Haloschoenus emaciatus* Nees, *Rhynchospora tenuis* Link var. *emaciata* (Nees) Lindm.
Referencias: Kükenthal, G., 1950–1952; Osten, C., 1931; Rocha, E. A. & Luceño, M., 2002; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, COA, GUA, MIE, PAI, SPE); URY(CAS, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 865* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 6044* (SI), *Smith, L. B. 10532* (P, RB, SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 12296* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 3902* (SI)].

Rhynchospora exaltata Kunth
Sin.: *Dichromena exaltata* (Kunth) J.F. Macbr., *Echinoschoenus beyrichi* Nees, *Rhynchospora beyrichi* (Nees) Steud., *Rhynchospora exaltata* Kunth var. *beyrichi* (Nees) Kük.
Referencias: Barros, M., 1960; Kükenthal, G., 1949; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Thomas, W. W., 1992, 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2763* (HBR)]; PRY[*Zuloaga, F. O. 7304* (SI)].

Rhynchospora exaltata Kunth var. *beyrichi* (Nees) Kük. = **Rhynchospora exaltata** Kunth
Referencias: Thomas, W. W., 1992, 1998.

Rhynchospora exigua Boeck. = **Rhynchospora nervosa** (Vahl) Boeck.
Referencias: Thomas, W. W., 1984.

[Rhynchospora filiformis Vahl]
Referencias: Guaglianone, E. R., 1980.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Rhynchospora flexuosa C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1960; Koyama, T. M., 1972; Kükenthal, G., 1950–1952.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–1300 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5222* (HBR), *Ule, E. H. G. 1935* (B, US)].

Rhynchospora floribunda Boeck.
Sin.: *Rhynchospora hieronymi* Boeck. var. *floribunda* (Boeck.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1960; Guaglianone, E. R., 1981.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–1300 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 13752* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 9080* (HBR, US)].

Rhynchospora florida (Rudge) Schult. = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **corymbosa**
Referencias: Barros, M., 1947.

Rhynchospora foliosa (Kunth) L.B. Sm. = **Pleurostachys foliosa** Kunth

Rhynchospora gigantea Link
Sin.: *Calyptrostylis gigantea* (Link) Nees, *Dichromena gigantea* (Link) J.F. Macbr., *Rhynchospora gigantea* Link var. *scaberrima* (Boeck.) Kük., *Rhynchospora scaberrima* Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960; Guaglianone, E. R., 2001; Kükenthal, G., 1949, 1950–1952; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1030* (HBR, NY, UC)].

Rhynchospora gigantea Link var. *latifolia* H. Pfeiff. = **Rhynchospora pedersenii** Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001.

Rhynchospora gigantea Link var. *scaberrima* (Boeck.) Kük. = **Rhynchospora gigantea** Link
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001.

Rhynchospora glauca auct. non Vahl = **Rhynchospora barrosiana** Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1979.

Rhynchospora glauca Vahl = **Rhynchospora rugosa** (Vahl) Gale
Referencias: Gale, S., 1944; Guaglianone, E. R., 1979.

Rhynchospora glauca Vahl var. *altior* Kük. = **Rhynchospora rugosa** (Vahl) Gale
Referencias: Guaglianone, E. R., 1979.

Rhynchospora glaziovii Boeck.
Sin.: *Rhynchospora longirostris* auct. non Steud.
Referencias: Barros, M., 1960; Guaglianone, E. R., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 9872* (HBR)].

Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult.
Sin.: *Cephaloschoenus globosus* (Kunth) Nees, *Cephaloschoenus pohlianus* Nees, *Chaetospora globosa* Kunth, *Rhynchospora alta* Boeck., *Rhynchospora cephalanta* A. Rich., hom. illeg., *Rhynchospora perrigida* Boeck., *Rhynchospora pohliana* (Nees) Steud., *Rhynchospora presleana* Steud.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Kükenthal, G., 1949, 1950–1952; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Thomas, W. W., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAN, COA, SPE); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vanni, R. O. 1507* (CTES)]; BRA[*Reitz, P. R. 5321* (HBR)]; PRY[*Zardini, E. M. 44332* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 5696* (MVFA)].

Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult. var. *loefgrenii* (Boeck.) Kük. = **Rhynchospora loefgrenii** Boeck.
Referencias: Araújo, A. C., 2001.

[Rhynchospora globularis (Chapm.) Small ex Gale var. recognita Gale]
Sin.: *Rhynchospora pfeifferi* Herter, nom. superfl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1979.
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Rhynchospora gollmeri Boeck.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Barros, M., 1960.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 10332* (HBR)].

Rhynchospora gracilis (Spreng.) Kuntze, hom. illeg. = **Rhynchospora tenuis** Link subsp. **tenuis**
Referencias: Koyama, T. M., 1972.

Rhynchospora hassleri C.B. Clarke
Referencias: Koyama, T. M., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8255* (G, K, NY)].

Rhynchospora hatschbachii T. Koyama
Referencias: Koyama, T. M., 1976.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Koyama, T.M. 15007* (NY, SI)].

Rhynchospora hieronymi Boeck. f. *compacta* Kük. = **Rhynchospora hieronymi** Boeck. subsp. **montevidensis** (Barros) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1981.

Rhynchospora hieronymi Boeck. var. *floribunda* (Boeck.) Kük. = **Rhynchospora floribunda** Boeck.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1981.

Rhynchospora hieronymi Boeck. var. *montevidensis* Barros = **Rhynchospora hieronymi** Boeck. subsp. **montevidensis** (Barros) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1981.

Rhynchospora hieronymi Boeck. subsp. **hieronymi**
Referencias: Barros, M., 1947; Guaglianone, E. R., 1981; Thomas, W. W., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3701* (SI), *Zuloaga, F. O. 7735* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 14550* (SI)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Thomas, 1992).

Rhynchospora hieronymi Boeck. subsp. **montevidensis** (Barros) Guagl.
Sin.: *Rhynchospora hieronymi* Boeck. f. *compacta* Kük., *Rhynchospora hieronymi* Boeck. var. *montevidensis* Barros, *Rhynchospora montevidensis* (Barros) Herter
Referencias: Guaglianone, E. R., 1981; Marchesi, E., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(SCA); URY(CAS, MAL, MON, RNO, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2946* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 14355* (SI)]; URY[*Chebataroff, J. 8220* (SI)].

[Rhynchospora hirsuta Boeck.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter
Sin.: *Cephaloschoenus polycephalus* (Pers.) Nees, *Ephippiorhynchium polycephalum* (Pers.) Nees, *Ephippiorhynchium tenuirostre* Nees, *Rhynchospora arechavaletae* Boeck., *Rhynchospora arechavaletae* Boeck. var. *ostenii* (Kük.) Kük., *Rhynchospora cyperoides* (Sw.) Mart., *Rhynchospora cyperoides* (Sw.) Mart. var. *triceps* (Vahl) Boeck., *Rhynchospora ostenii* Kük., *Rhynchospora polycephala* (Pers.) Wydler ex Kunth, *Schoenus cyperoides* Sw., hom. illeg., *Schoenus holoschoenoides* Rich., *Schoenus polycephala* Pers., nom. superfl., *Schoenus triceps* Vahl
Referencias: Guaglianone, E. R., 1981; Koyama, T. M., 1972; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAN, ITA); URY(CAS, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 10268* (SI)]; BRA[*Araújo, A. C. 186* (HBR)]; PRY[*Rojas, T. 6822* (SI)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 372* (SI)].

Rhynchospora hyalinolepis Boeck. = **Rhynchospora praecincta** Maury
Referencias: Barros, M., 1947.

Rhynchospora iberae Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 29726* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 8517* (C, CTES)].

Rhynchospora indianolensis Small = **Rhynchospora scutellata** Griseb.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1981, 2001.

Rhynchospora junciformis (Kunth) Boeck.
Sin.: *Dichromena junciformis* Kunth
Referencias: Barros, M., 1960; Rocha, E. A. & Luceño, M., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 11219* (R)].

Rhynchospora kuekenthalii Herter, hom. illeg. = **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.
Referencias: Koyama, T. M., 1972.

Rhynchospora kunthii Nees var. *composita* Nees, nom. nud. = **Rhynchospora megapotamica** (A. Spreng.) H. Pfeiff. var. **megapotamica**

Rhynchospora latibracteata Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rosengurtt, B. 8787* (MVFA, SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 3005 b* (MVFA)].

Rhynchospora legrandii Kük. ex Barros = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **legrandii** (Kük. ex Barros) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001.

Rhynchospora leucostachys Boeck. = **Rhynchospora elatior** Kunth var. **brevispiculosa** (Kük.) A.C. Araújo
Referencias: Araújo, A. C., Thomas, W. W. & Longhi-Wagner, H. M., 2004.

Rhynchospora loefgrenii Boeck.
Sin.: *Rhynchospora globosa* (Kunth) Roem. & Schult. var. *loefgrenii* (Boeck.) Kük.
Referencias: Araújo, A. C., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, GUA, SPE); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 842* (NY)]; BRA[*Smith, L. B. 13650* (HBR, US)]; PRY[*Hassler, E. 8623* (NY)]; URY[*Herter, W. G. F. 27146* (*)].

[Rhynchospora longiflora C. Presl]
Sin.: *Rhynchospora corymbifera* Nees
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Rhynchospora longirostris auct. non Steud. = **Rhynchospora glaziovii** Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960.

Rhynchospora lundii Boeck. = **Rhynchospora confinis** (Nees) C.B. Clarke
Referencias: Guaglianone, E. R., 1980; Kükenthal, G., 1950–1952.

Rhynchospora luzuliformis Boeck. = **Rhynchospora megapotamica** (A. Spreng.) H. Pfeiff. var. **megapotamica**
Referencias: Herter, W. G. F., 1949–1956; Pfeiffer, H. H., 1942–1943.

Rhynchospora luzuliformis Boeck. var. *spicata* (Boeck.) Kük. = **Rhynchospora megapotamica** (A. Spreng.) H. Pfeiff. var. **spicata** (Boeck.) Kük.

Rhynchospora maculata Maury = **Rhynchospora megapotamica** (A. Spreng.) H. Pfeiff. var. **megapotamica**
Referencias: Kükenthal, G., 1950–1952.

Rhynchospora marisculus Nees
Sin.: *Dichromena marisculus* (Nees) J.F. Macbr., *Rhynchospora borinquensis* Britton, *Rhynchospora brasiliensis* auct. non Boeck., *Rhynchospora marisculus* Nees var. *elatior* Boeck., *Rhynchospora rigida* Schrad. ex Nees, nom. nud., *Rhynchospora tenuiseta* C. Wright ex Sauvalle, *Rhynchospora uleana* Boeck., *Schoenus marisculus* Lindl. ex Nees, nom. nud., *Schoenus marisculus* Salzm., nom. nud.
Referencias: Barros, M., 1960; Guaglianone, E. R., 1979; Koyama, T. M., 1972; Kükenthal, G., 1950–1952; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2300 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA, GUA, MIE, PAI); URY(CAS, CLA, MAL, MON, RNO, RIV, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 30757* (SI), *Guaglianone, E. R. 2948* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 13978* (NY, SI, US)]; PRY[*Pedersen, T. M. 7637* (NY, SI, UC), *Zardini, E. M. 34934* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 2534* (LIL, NY, SI)].

Rhynchospora marisculus Nees var. *elatior* Boeck. = **Rhynchospora marisculus** Nees
Referencias: Guaglianone, E. R., 1979; Koyama, T. M., 1972.

Rhynchospora megapotamica (A. Spreng.) Hauman & Vanderveken, nom. illeg. = **Rhynchospora megapotamica** (A. Spreng.) H. Pfeiff. var. **megapotamica**
Referencias: Guaglianone, E. R., 1996a.

Rhynchospora megapotamica (A. Spreng.) H. Pfeiff. var. **megapotamica**
Sin.: *Hygrocharis luzulaeformis* Nees ex Osten, nom. nud., *Rhynchospora kunthii* Nees var. *composita* Nees, nom. nud., *Rhynchospora luzuliformis* Boeck., *Rhynchospora maculata* Maury, *Rhynchospora megapotamica* (A. Spreng.) Hauman & Vanderveken, nom. illeg., *Scirpus megapotamicus* A. Spreng.
Referencias: Herter, W. G. F., 1943a, 1949–1956; Kükenthal, G., 1950–1952.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(CEN); URY(ART, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2851* (SI), *Múlgura de Romero, M. E. 545* (SI)]; BRA[*Gaudichaud-Beaupré, C. 134* (*)]; PRY[*Balansa, B. 457* (*)]; URY[*Herter, W. G. F. 1141* (MVM)].

Rhynchospora megapotamica (A. Spreng.) H. Pfeiff. var. **spicata** (Boeck.) Kük.
Sin.: *Rhynchospora luzuliformis* Boeck. var. *spicata* (Boeck.) Kük., *Rhynchospora spicata* Boeck.
Referencias: Pfeiffer, H. H., 1942–1943.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–1700 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 13675* (NY, SI)].

Rhynchospora micrantha auct. non Vahl = **Rhynchospora contracta** (Nees) J. Raynal

Rhynchospora micrantha Vahl var. *contracta* (Nees) Kük. = **Rhynchospora contracta** (Nees) J. Raynal

Rhynchospora microcarpa auct. non Baldwin ex A. Gray = **Rhynchospora brittonii** Gale
Referencias: Guaglianone, E. R., 1980.

Rhynchospora microcephala (Bertero ex Spreng.) Kük.
= **Rhynchospora radicans** (Schltdl. & Cham.) H. Pfeiff. subsp. **microcephala** (Bertero ex Spreng.) W.W. Thomas
Referencias: Thomas, W. W., 1984.

Rhynchospora minor (Nees) Steud., nom. illeg.
= **Rhynchospora elatior** Kunth var. **brevispiculosa** (Kük.) A.C. Araújo
Referencias: Araújo, A. C., Thomas, W. W. & Longhi-Wagner, H. M., 2004.

Rhynchospora minutiflora (Rich. ex Spreng.) C.D. Adams, nom. illeg. = **Rhynchospora contracta** (Nees) J. Raynal

Rhynchospora montevidensis (Barros) Herter
= **Rhynchospora hieronymi** Boeck. subsp. **montevidensis** (Barros) Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1981.

Rhynchospora nardifolia (Kunth) Boeck.
Sin.: *Dichromena nardifolia* Kunth
Referencias: Rocha, E. A. & Luceño, M., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22432* (K)].

Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeck.
Sin.: *Dichromena ciliata* Vahl var. *vahliana* Griseb., *Dichromena nervosa* Vahl, *Dichromena persooniana* Nees, *Rhynchospora exigua* Boeck., *Rhynchospora persooniana* (Nees) Griseb.
Referencias: Kükenthal, G., 1950–1952; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Thomas, W. W., 1984, 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 3170* (GH, MO, NY, SI, US)]; BRA[*Hatschbach, G. 23352* (US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 475* (F, GH, NY, US)].

Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeck. var. *ciliata* (Vahl) Kük. = **Rhynchospora ciliata** (G. Mey.) Kük.

Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeck. subsp. *ciliata* (Vahl) T. Koyama = **Rhynchospora ciliata** (G. Mey.) Kük.

[Rhynchospora niederleiniana Boeck.]
Notas: Nombre dudoso. Posible sinónimo de *Rhynchospora velutina*.

Rhynchospora orbigniana (Brongn.) L.B. Sm.
= **Pleurostachys millegrana** (Nees) Steud.

Rhynchospora organensis C.B. Clarke
Sin.: *Rhynchospora aurea* Vahl f. *florida* auct. non (Rudge) Lindm., *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *organensis* (C.B. Clarke) Kük., *Rhynchospora rostrata* auct. non Lindm.
Referencias: Guaglianone, E. R. & Moore, G., 2001; Guaglianone, E. R., 2001; Kükenthal, G., 1949, 1950–1952.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(CAA, SPE); URY(DUR, FLA, RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1297* (SI)]; BRA[*Sobral, M. 2133* (SI)]; PRY[*Krapovickas, A. 32580* (MO, SI)]; URY[*Osten, C. 3818* (B, G)].

Rhynchospora ostenii Kük. = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter

Rhynchospora paranaënsis A.C. Araújo & W.W. Thomas
Referencias: Araújo, A. C., Thomas, W. W. & Longhi-Wagner, H. M., 2004.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22332* (HB, HBR, MBM, MO, RB, UEC, US)].

Rhynchospora parviflora Vahl ex Nees, nom. inval.
= **Rhynchospora contracta** (Nees) J. Raynal

Rhynchospora pedersenii Guagl.
Sin.: *Rhynchospora gigantea* Link var. *latifolia* H. Pfeiff.
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 13427* (B, SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 3280* (FCQ, MO)].

Rhynchospora perrigida Boeck. = **Rhynchospora globosa** (Kunth) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1960; Kükenthal, G., 1949, 1950–1952.

Rhynchospora persooniana (Nees) Griseb.
= **Rhynchospora nervosa** (Vahl) Boeck.
Referencias: Thomas, W. W., 1984.

Rhynchospora pfeifferi Herter, nom. superfl.
= **Rhynchospora globularis** (Chapm.) Small ex Gale var. **recognita** Gale

Rhynchospora pilosa (Kunth) Boeck.
Sin.: *Dichromena pilosa* Kunth
Referencias: Angely, J. A., 1965; Kükenthal, G., 1949.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10639* (*)].

Rhynchospora pohliana (Nees) Steud. = **Rhynchospora globosa** (Kunth) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1960; Kükenthal, G., 1949, 1950–1952.

Rhynchospora polyantha Steud.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Barros, M., 1960.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6091* (HBR)].

Rhynchospora polycephala (Pers.) Wydler ex Kunth = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
Referencias: Guaglianone, E. R., 1981; Koyama, T. M., 1972.

Rhynchospora praecincta Maury
Sin.: *Rhynchospora hyalinolepis* Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947; Kükenthal, G., 1950–1952.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE); PRY(PAI); URY(ART, FLA, PAY, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 2548* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 453* (*)]; URY[*Del Puerto, O. 11349* (MVFA)].

Rhynchospora presleana Steud. = **Rhynchospora globosa** (Kunth) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1960; Kükenthal, G., 1949, 1950–1952.

Rhynchospora pringlei Greenm., hom. illeg. = **Rhynchospora scutellata** Griseb.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1981, 2001.

Rhynchospora pseudomacrostachya G. Moore, Guagl. & Zartman
Sin.: *Rhynchospora corniculata* (Lam.) A. Gray var. *macrostachya* auct. non (Torr.) Britton
Referencias: Moore, G., Guaglianone, E. R. & Zartman, C., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 8140* (HBR, SI, US)].

Rhynchospora puncticulata Kük. ex Osten = **Rhynchospora scutellata** Griseb.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1981, 2001.

Rhynchospora puncticulata Kük. ex Osten var. *pleiocephala* Osten = **Rhynchospora scutellata** Griseb.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1981, 2001.

Rhynchospora pungens Liebm.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1979.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, TUC); BRA(SCA); PRY(CAU); URY(PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 2674* (BA, LIL, SI, US)]; BRA[*Reitz, P. R. 13958* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 8430* (C, CTES)]; URY[*Marchesi, E. 20540* (MVFA)].

Rhynchospora radicans (Schltdl. & Cham.) H. Pfeiff. subsp. **microcephala** (Bertero ex Spreng.) W.W. Thomas
Sin.: *Dichromena microcephala* Bertero ex Spreng., *Rhynchospora microcephala* (Bertero ex Spreng.) Kük.
Referencias: Kükenthal, G., 1950–1952; Thomas, W. W., 1984.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 964* (*)].

Rhynchospora radicans (Schltdl. & Cham.) H. Pfeiff. subsp. **radicans**
Sin.: *Dichromena radicans* Schltdl. & Cham.
Referencias: Kükenthal, G., 1950–1952; Thomas, W. W., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5744* (*)].

Rhynchospora rigida Schrad. ex Nees, nom. nud. = **Rhynchospora marisculus** Nees
Referencias: Guaglianone, E. R., 1979; Koyama, T. M., 1972.

Rhynchospora rigida (Kunth) Boeck.
Sin.: *Dichromena rigida* Kunth, *Rhynchospora consanguinea* (Kunth) Boeck. var. *rigida* (Kunth) Kük.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. M. 1502* (NY)].

Rhynchospora riparia (Nees) Boeck.
Sin.: *Haloschoenus riparius* Nees
Referencias: Rocha, E. A. & Luceño, M., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Brunner, D. R. 1460* (MO, PY)].

Rhynchospora robusta (Kunth) Boeck.
Sin.: *Dichromena robusta* Kunth, *Psilocarya conferta* (Maury) Nees, *Psilocarya robusta* (Kunth) Nees, *Rhynchospora conferta* (Nees) Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947; Koyama, T. M., 1972; Kükenthal, G., 1950–1952.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, COA); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 129b* (NY, S)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 8931* (P)]; PRY[*Schinini, A. 27088* (CTES)]; URY[*Marchesi, E. 27156* (MVFA)].

[Rhynchospora rostrata Lindm.]
Referencias: Guaglianone, E. R. & Moore, G., 2001; Guaglianone, E. R., 2001.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Rhynchospora rostrata auct. non Lindm. = **Rhynchospora organensis** C.B. Clarke
Referencias: Guaglianone, E. R. & Moore, G., 2001; Guaglianone, E. R., 2001.

Rhynchospora rufa (Nees) Boeck. = **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.
Referencias: Koyama, T. M., 1972.

Rhynchospora rugosa auct. non (Vahl) Gale = **Rhynchospora brownii** Roem. & Schult. subsp. **americana** Guagl.
Referencias: Guaglianone, E. R., 1979.

Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale
Sin.: *Dichromena glauca* (Vahl) J.F. Macbr., *Rhynchospora glauca* Vahl, *Rhynchospora glauca* Vahl var. *altior* Kük., *Schoenus rugosus* Vahl
Referencias: Barros, M., 1960; Gale, S., 1944; Guaglianone, E. R., 1979; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA); URY(TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 4160* (CTES)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 14405* (GH, MO, NY, SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 52622* (SI), *Zuloaga, F. O. 7292* (SI)]; URY[*Rosengurtt 10212* (MVFA)].

Rhynchospora ruppioides Benth. = **Websteria confervoides** (Poir.) Hooper
Referencias: Adams, C. D., 1992.

Rhynchospora scaberrima Boeck. = **Rhynchospora gigantea** Link
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001.

Rhynchospora scutellata Griseb.
Sin.: *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *minor* Kük., *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *puncticulata* (Kük. ex Osten) Kük., *Rhynchospora indianolensis* Small, *Rhynchospora pringlei* Greenm., hom. illeg., *Rhynchospora puncticulata* Kük. ex Osten, *Rhynchospora puncticulata* Kük. ex Osten var. *pleiocephala* Osten
Referencias: Guaglianone, E. R., 1981, 2001; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Thomas, W. W., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, CEN, ITA, PAI, PHA, SPE); URY(ART, CLA, DUR, PAY, RIV, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2845* (SI)]; BRA[*Sobral, M. 4922* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 51819* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 990* (SI)].

Rhynchospora selloiana Boeck. = **Rhynchospora subsetosa** C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1960; Kükenthal, G., 1949.

[Rhynchospora semihirsuta Boeck.]
Notas: Nombre dudoso. Posible sinónimo de *Rhynchospora velutina*.

Rhynchospora setigera (Kunth) Boeck.
Sin.: *Dichromena setigera* Kunth, *Rhynchospora stelligera* Herter
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Kükenthal, G., 1950–1952.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, GUA, SPE); URY(CLA, RIV, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 447* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 7486* (US)]; PRY[*Schinini, A. 30039* (CTES)]; URY[*Herter, W. G. F. 2075* (MVM)].

Rhynchospora smithii W.W. Thomas
Referencias: Thomas, W. W., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 1200–1300 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 8379* (SI, US)].

Rhynchospora sparsa Sieber ex C. Presl, nom. inval. = **Rhynchospora contracta** (Nees) J. Raynal

Rhynchospora spicata Boeck. = **Rhynchospora megapotamica** (A. Spreng.) H. Pfeiff. var. **spicata** (Boeck.) Kük.

Rhynchospora splendens Lindm. f. **composita** Kük.
Referencias: Barros, M., 1960; Kükenthal, G., 1949.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4085* (HBR)].

Rhynchospora stellata (Lam.) Griseb. = **Rhynchospora colorata** (L.) H. Pfeiff.
Referencias: Thomas, W. W., 1984, 1992.

Rhynchospora stelligera Herter = **Rhynchospora setigera** (Kunth) Boeck.
Referencias: Herter, W. G. F., 1949–1956.

[Rhynchospora stenocarpa Kunth]
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Rhynchospora subsetosa C.B. Clarke
Sin.: *Rhynchospora selloiana* Boeck.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Barros, M., 1960; Kükenthal, G., 1949.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3545* (HBR)].

Rhynchospora subtilis Boeck.
Referencias: Rocha, E. A. & Luceño, M., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–2200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 13654* (R)].

Rhynchospora surinamensis (Rottb.) Nees = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **corymbosa**
Referencias: Kükenthal, G., 1949.

Rhynchospora tenella (Nees) Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960; Rocha, E. A. & Luceño, M., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 14493* (R)].

Rhynchospora tenuiflora (Brongn.) L.B. Sm. = **Pleurostachys tenuiflora** Brongn.

Rhynchospora tenuis Link var. *emaciata* (Nees) Lindm. = **Rhynchospora emaciata** (Nees) Boeck.
Referencias: Kükenthal, G., 1950–1952.

Rhynchospora tenuis Link subsp. **austro-brasiliensis** T. Koyama
Sin.: *Haloschoenus capillaris* Nees var. *minor* Nees, nom. inval.
Referencias: Koyama, T. M., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 1300* (NY, S)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 3965* (NY, P)]; PRY[*Hassler, E. 8214* (G, NY)].

Rhynchospora tenuis Link subsp. **tenuis**
Sin.: *Dichromena linkii* J.F. Macbr., nom. superfl., *Fuirena gracilis* Spreng., *Haloschoenus capillaris* Nees var. *congestus* Nees, nom. inval., *Haloschoenus capillaris* Nees, nom. illeg., *Rhynchospora curvula* (Nees) Boeck., hom. illeg., *Rhynchospora gracilis* (Spreng.) Kuntze, hom. illeg., *Spermodon curvulus* Nees
Referencias: Herter, W. G. F., 1949–1956; Koyama, T. M., 1972; Kükenthal, G., 1950–1952; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Rocha, E. A. & Luceño, M., 2002; Thomas, W. W., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, JUJ, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, COA, GUA, ITA, PAI, SPE); URY(CAS, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 862* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13537* (C, NY, P)]; PRY[*Zuloaga, F. O. 7284* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 10830* (MVFA)].

Rhynchospora tenuiseta C. Wright ex Sauvalle = **Rhynchospora marisculus** Nees
Referencias: Guaglianone, E. R., 1979; Koyama, T. M., 1972; Kükenthal, G., 1950–1952.

Rhynchospora terminalis (Nees) Steud. var. **crassipes** (Boeck.) Kük.
Sin.: *Rhynchospora crassipes* Boeck.
Referencias: Kükenthal, G., 1949.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CON, GUA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10414* (*)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4676* (SI)].

Rhynchospora triflora Vahl
Sin.: *Dichromena triflora* (Vahl) J.F. Macbr., *Ephippiorhynchium triflorum* (Vahl) Nees, *Schoenus triflorus* (Vahl) Poir.
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001; Koyama, T. M., 1972; Kükenthal, G., 1949.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN, CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10082* (K, P)]; PRY[*Rojas, T. 10030* (BAF, BM, G, K, LIL, SI)].

Rhynchospora trispicata (Nees) Schrad. ex Steud.
Sin.: *Ephippiorhynchium trispicatum* Nees
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001; Koyama, T. M., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAN, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Krapovickas, A. 32675* (CTES, MO, SI)].

Rhynchospora uleana Boeck. = **Rhynchospora marisculus** Nees
Referencias: Koyama, T. M., 1972; Kükenthal, G., 1950–1952.

Rhynchospora uniflora Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5404* (HBR)].

Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck.
Sin.: *Dichromena sellowiana* Kunth, *Dichromena velutina* Kunth, *Psilocarya pohlii* Nees, *Psilocarya rufa* Nees, *Psilocarya sellowiana* (Kunth) Nees, *Psilocarya velutina* (Kunth) Nees, *Rhynchospora kuekenthalii* Herter, hom. illeg., *Rhynchospora rufa* (Nees) Boeck., *Rhynchospora velutina* (Kunth) Boeck. var. *pohlii* (Nees) Boeck. ex Kük., *Rhynchospora velutina* (Kunth) Boeck. var. *sellowiana* (Kunth) Boeck., *Schoenus velutinus* Schrad. ex Kunth, nom. nud.
Referencias: Koyama, T. M., 1972; Kükenthal, G., 1950–1952; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–400 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR); PRY(CAN, COA, ITA); URY(CLA, RNO, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 3051* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 2455* (NY, P)]; PRY[*Zardini, E. M. 52094* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 8076* (MVFA)].

Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck. var. *pohlii* (Nees) Boeck. ex Kük. = **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.
Referencias: Koyama, T. M., 1972.

Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck. var. *sellowiana* (Kunth) Boeck. = **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.
Referencias: Koyama, T. M., 1972.

[Rhynchospora warmingii Boeck.]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Schizolepis foliosa Nees = **Scleria plusiophylla** Steud.
Referencias: Ahumada, O., 1995; Barros, M., 1960.

Schizolepis latifolia (Sw.) Nees = **Scleria latifolia** Sw.
Referencias: Barros, M., 1947.

Schizolepis myricocarpa (Kunth) Nees = **Scleria myricocarpa** Kunth
Referencias: Barros, M., 1960.

Schizolepis panicoides (Kunth) Nees = **Scleria panicoides** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Core, E. L., 1952.

[Schizolepis paranensis Palla]
Notas: Nombre dudoso.

Schizolepis trigonocarpa Nees = **Scleria latifolia** Sw.
Referencias: Koyama, T. M., 1984.

Schoenoplectus (Rchb.) Palla, nom. cons.

Número de especies: 6, 1 introducida

Schoenoplectus americanus (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller
Sin.: *Scirpus americanus* Pers., *Scirpus americanus* Pers. var. *longispicatus* Britton, *Scirpus americanus* Pers. subsp. *monophyllus* (J. Presl & C. Presl) T. Koyama, *Scirpus chilensis* auct. non Nees & Meyen, *Scirpus chilensis* Nees & Meyen var. *longisetis* (Kük.) Beetle, *Scirpus monophyllus* J. Presl & C. Presl, *Scirpus olneyi* A. Gray ex Engelm. & A. Gray, *Scirpus olneyi* A. Gray ex Engelm. & A. Gray var. *longisetis* Kük.
Referencias: Barros, M., 1947; Marchesi, E., 1984; Strong, M. T., 1994; Smith, S. G., 2002b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, RNE, SFE, SJU, TUC); CHL(I, II, V, VII, VIII, X); URY(CAS, DUR, MON, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 291* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 5010* (CONC)]; URY[*Berro, M. B. 8084* (MVFA)].

Schoenoplectus americanus (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller subsp. *longispicatus* (Britton) Soják = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **longispicatus** (Britton) S.G. Sm.

Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) Soják var. **californicus**
Sin.: *Elytrospermum californicus* C.A. Mey., *Malacochaete assimilis* Ces., *Malacochaete chilense* Nees & Meyen ex Boeck., *Malacochaete oligostachya* Phil. ex Boeck., *Malacochaete riparia* Nees & Meyen, *Malacochaete sanguinolenta* Nees & Meyen ex Boeck., *Malacochaete tatora* Nees & Meyen, nom. nud., *Schoenoplectus riparius* (J. Presl & C. Presl) Palla, *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Britton, comb. superfl., *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Steud., *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Steud. subsp. *tatora* (Kunth) T. Koyama, *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Steud. var. *tatora* (Kunth) Barros, *Scirpus chamissonis* Schrad. ex Boeck., *Scirpus decipiens* A. St.-Hil. ex Nees, *Scirpus rigidus* Schrad. ex Nees, *Scirpus riparius* J. Presl & C. Presl
Referencias: Adams, C. D., 1994k; Barros, M., 1947, 1960, 1969a; Herter, W. G. F., 1949–1956.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, RME); PRY(APY, CEN, COA, PHA); URY(CAS, CLA, COL, FLO, LAV, MON, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 34741* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2515* (SI), *Klein, R. M. 3767* (SI)]; CHL[*Barros, E. 9327* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 15375* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 2135* (SI)].

Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) Soják var. **spoliatus** (Barros) Vegetti
Sin.: *Dichromena atrosanguinea* E. Desv., *Malacochaete riparia* Nees & Meyen var. *chamissoi* Nees, *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Steud. var. *spoliatus* Barros, *Scirpus riparius* J. Presl & C. Presl var. *chamissoi* (Nees) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a; Vegetti, A. C., 1995.
Hierba acuática. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6329* (SI), *Rúgolo de Agrasar, Z. E. 1221* (SI)]; CHL[*Barros, E. 6007* (SI), *Hollermayer, A. 14328* (SI)].

Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) Soják var. **tereticulmis** (Steud.) Vegetti
Sin.: *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Steud. var. *tereticulmis* (Steud.) Beetle, *Scirpus pseudotriqueter* Steud., *Scirpus riparius* J. Presl & C. Presl var. *tereticulmis* (Steud.) C.B. Clarke, *Scirpus tereticulmis* Steud.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a; Vegetti, A. C., 1995.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 3228* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 1866* (SI)].

Schoenoplectus cernuus (Vahl) Hayek = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.

[Schoenoplectus erectus (Poir.) Palla ex J. Raynal]
Sin.: *Scirpus erectus* Poir.
Referencias: Adams, C. D., 1994k.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Schoenoplectus maritimus (L.) Lye = **Bolboschoenus maritimus** (L.) Palla subsp. **maritimus**

Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla
Sin.: *Scirpus mucronatus* L.
Referencias: Smith, S. G., 2002b.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–200 m.
Países: CHL(VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Rodríguez Ríos, R. 2374* (CONC)].

Schoenoplectus nevadensis (S. Watson) Soják = **Amphiscirpus nevadensis** (S. Watson) Oteng-Yeb.

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla var. **badius** (J. Presl & C. Presl) S.G. Sm.
Sin.: *Scirpus americanus* Pers. var. *polyphyllus* (Boeck.) Beetle, p.p., *Scirpus badius* J. Presl & C. Presl, *Scirpus*

olneyi A. Gray ex Engelm. & A. Gray f. *australis* Barros & Osten ex Osten, *Scirpus olneyi* A. Gray ex Engelm. & A. Gray f. *minor* Barros, *Scirpus pungens* Vahl var. *longisetis* Benth. & F. Muell., *Scirpus pungens* Vahl var. *nanus* Benth. & F. Muell.
Referencias: Koyama, T. M., 1963; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Smith, S. G., 1995, 2002b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, JUJ, MEN, SAL, SFE, TUC); CHL(III, VII, X); URY(COL, FLA, MON, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 7528* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 428* (SI)]; URY[*Osten, C. 22029* (SI)].
Nota: S. G. Smith (2002b) considera que sólo la variedad *badius* se extiende hasta Sudamérica templada. Sin embargo, hasta no delimitar correctamente este complejo en Sudamérica se citan aquí las tres entidades.

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla var. **longispicatus** (Britton) S.G. Sm.
Sin.: *Schoenoplectus americanus* (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller subsp. *longispicatus* (Britton) Soják, *Scirpus americanus* Pers. var. *longibracteatus* Barros & Osten, *Scirpus americanus* Pers. var. *polyphyllus* (Boeck.) Beetle, p.p., *Scirpus longispicatus* (Britton) Smyth, nom. illeg., *Scirpus pungens* Vahl var. *longibracteatus* Osten & Barros, *Scirpus pungens* Vahl var. *polyphyllus* Boeck.
Referencias: Pedersen, T. M., 1969[1968]; Smith, S. G., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, RNE, SFE, SLU); CHL(IV); URY(FLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 3811* (SI)]; CHL[*Barros, E. 2915* (SI)]; URY[*Herb. Parcela Experimental 2807* (SI)].

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla var. **pungens**
Sin.: *Schoenoplectus pungens* (Vahl) Palla subsp. *longispicatus* (Britton) A. Löve & D. Löve, *Scirpus americanus* Pers. f. *cordilleranus* (Kük. & Barros) Barros, *Scirpus americanus* Pers. var. *conglomeratus* (Kunth) T. Koyama, *Scirpus americanus* Pers. var. *pungens* (Vahl) Barros & Osten, *Scirpus conglomeratus* Kunth, *Scirpus pungens* Vahl
Referencias: Smith, S. G., 1995; Strong, M. T., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II, III, IV, V, VII, VIII, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4511* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 738* (SI)].

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla subsp. *longispicatus* (Britton) A. Löve & D. Löve = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **pungens**

Schoenoplectus riparius (J. Presl & C. Presl) Palla = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **californicus**

Schoenoplectus robustus (Pursh) M.T. Strong = **Bolboschoenus robustus** (Pursh) Soják
Referencias: Smith, S. G., 2002b.

Schoenoplectus supinus (L.) Palla
Sin.: *Isolepis supina* (L.) R. Br., *Scirpus guaraniticus* Pedersen, *Scirpus supinus* L.
Referencias: Barros, M., 1960; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(SCA); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 1037* (CTES)]; BRA[*Reitz, P. R. 4454* (HBR, SI)]; PRY[*Mereles, F. 4731* (CTES, FCQ, MO)].

Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla
Sin.: *Schoenoplectus validus* (Vahl) A. Löve & D. Löve, *Schoenoplectus validus* (Vahl) T. Koyama, comb. superfl., *Scirpus lacustris* auct. non L., *Scirpus lacustris* L. subsp. *validus* (Vahl) Osten, *Scirpus lacustris* L. subsp. *validus* (Vahl) T. Koyama, comb. superfl., *Scirpus lacustris* L. var. *validus* (Vahl) Kük., *Scirpus tabernaemontani* C.C. Gmel., *Scirpus validus* Vahl
Referencias: Barros, M., 1960; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Smith, S. G., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(SCA); PRY(APY); URY(COL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2297* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 122* (HBR)]; PRY[*Rojas, T. 3106* (SI)]; URY[*Osten, C. 21774* (SI)].

Schoenoplectus validus (Vahl) A. Löve & D. Löve = **Schoenoplectus tabernaemontani** (C.C. Gmel.) Palla
Referencias: Smith, S. G., 1995.

Schoenoplectus validus (Vahl) T. Koyama, comb. superfl. = **Schoenoplectus tabernaemontani** (C.C. Gmel.) Palla
Referencias: Smith, S. G., 1995.

Schoenus L.

Número de especies: 6, 4 endémicas, 1 introducida

Schoenus andinus (Phil.) H. Pfeiff.
Sin.: *Carpha andina* Phil., *Elynanthus sodalium* Franch., *Schoenus sodalium* (Franch.) Phil., *Schoenus sodalium* Har., nom. nud.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Barros, M., 1969a; Gunckel, L. H., 1971; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–1900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 9685* (SI)]; CHL[*Barros, E. 3103* (SI)].

Schoenus antarcticus (Hook. f.) Dusén
Sin.: *Carpha antarctica* (Hook. f.) C.B. Clarke, *Chaetospora antarctica* Hook. f., *Elynanthus antarcticus* (Hook. f.) Franch.
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a; Gunckel, L. H., 1971; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goodall, N. 2264* (SI)]; CHL[*Godley, E. J. 1049* (SGO)].

Schoenus ciliatus G. Mey. = **Rhynchospora ciliata** (G. Mey.) Kük.

Schoenus coloratus L. = **Rhynchospora colorata** (L.) H. Pfeiff.

Schoenus compressus L. = **Scirpus compressus** (L.) Pers.
Referencias: Barros, M., 1929, 1935.

Schoenus cyperoides Sw., hom. illeg. = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
Referencias: Guaglianone, E. R., 1981.

Schoenus floridus Rudge = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **corymbosa**
Referencias: Kükenthal, G., 1949.

Schoenus holoschoenoides Rich. = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
Referencias: Koyama, T. M., 1972.

Schoenus juncoides Vahl = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **juncoides**

Schoenus krausei (Phil.) Gunckel = **Schoenus nitens** (R. Br.) Poir. subsp. **krausei** (Phil.) Kük.

Schoenus longifolius Rudge = **Calyptrocarya longifolia** (Rudge) Kunth
Referencias: Barros, M., 1960.

Schoenus lymansmithii M.T. Strong
Referencias: Strong, M. T., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 1600–1700 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 14230* (US)].

Schoenus marisculus Lindl. ex Nees, nom. nud. = **Rhynchospora marisculus** Nees
Referencias: Guaglianone, E. R., 1979; Koyama, T. M., 1972.

Schoenus marisculus Salzm., nom. nud. = **Rhynchospora marisculus** Nees
Referencias: Guaglianone, E. R., 1979.

Schoenus nigricans L.
Referencias: Adams, C. D., 1994l.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–400 m.
Países: URY(MON).
Ejemplares de referencia: URY[*Schroeder, J. s.n.* (MVM)].

Schoenus nitens (R. Br.) Poir. subsp. **krausei** (Phil.) Kük.
Sin.: *Isolepis krausei* Phil., *Schoenus krausei* (Phil.) Gunckel, *Scirpus spadiceus* Phil., hom. illeg.
Referencias: Gunckel, L. H., 1971; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(CHU); CHL(VIII, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 4516* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 13448* (SI)].

Schoenus paradoxus Spreng. = **Bulbostylis paradoxa** (Spreng.) Lindm.

Schoenus polycephala Pers., nom. superfl. = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
Referencias: Guaglianone, E. R., 1981; Koyama, T. M., 1972.

Schoenus rhynchosporoides (Steud.) Kük.
Sin.: *Carpha laxa* (Hook. f.) Macloskie, *Carpha paniculata* Phil., *Chaetosperma rhynchospermoides* F. Phil., *Chaetospora laxa* Hook. f., *Chaetospora rhynchosporoides* Steud., *Elynanthus laxus* (Hook. f.) Macloskie
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a; Gunckel, L. H., 1971.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–1000 m.
Países: ARG(RNE, TDF); CHL(VII, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 392* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 15884* (SI)].

Schoenus rugosus Vahl = **Rhynchospora rugosa** (Vahl) Gale
Referencias: Gale, S., 1944; Guaglianone, E. R., 1979.

Schoenus secans L. = **Scleria secans** (L.) Urb.
Referencias: Adams, C. D., 1994j; Core, E. L., 1952.

Schoenus sodalium (Franch.) Phil. = **Schoenus andinus** (Phil.) H. Pfeiff.
Referencias: Gunckel, L. H., 1971.

Schoenus sodalium Har., nom. nud. = **Schoenus andinus** (Phil.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1947.

Schoenus surinamensis Rottb. = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **corymbosa**
Referencias: Kükenthal, G., 1949.

Schoenus triceps Vahl = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
Referencias: Guaglianone, E. R., 1981.

Schoenus triflorus (Vahl) Poir. = **Rhynchospora triflora** Vahl
Referencias: Guaglianone, E. R., 2001.

Schoenus velutinus Schrad. ex Kunth, nom. nud. = **Rhynchospora velutina** (Kunth) Boeck.
Referencias: Koyama, T. M., 1972.

Scirpidium grande Nees = **Eleocharis nudipes** (Kunth) Palla
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpidium nigrescens Nees = **Eleocharis nigrescens** (Nees) Steud.

Scirpidium sulcatum Nees = **Eleocharis filiculmis** Kunth
Referencias: González Elizondo, M. S., 1994.

Scirpus L., nom. cons.

Número de especies: 7, 6 endémicas

Scirpus ablepharus Griseb. = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Palla f. **cubense**

Scirpus acaulis Phil. = **Phylloscirpus acaulis** (Phil.) Goetgh. & D.A. Simpson
Referencias: Goetghebeur, P. & Simpson, D. A., 1991.

Scirpus acicularis L. = **Eleocharis acicularis** (L.) Roem. & Schult.

Scirpus acutangulus Roxb. = **Eleocharis acutangula** (Roxb.) Schult.
Referencias: Koyama, T. M., 1978b.

Scirpus albescens (E. Desv.) F. Phil. = **Isolepis nigricans** Kunth
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Scirpus americanus Pers. = **Schoenoplectus americanus** (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller
Referencias: Strong, M. T., 1994.

Scirpus americanus Pers. f. *cordilleranus* (Kük. & Barros) Barros = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **pungens**

Scirpus americanus Pers. var. *conglomeratus* (Kunth) T. Koyama = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **pungens**

Scirpus americanus Pers. var. *longibracteatus* Barros & Osten = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **longispicatus** (Britton) S.G. Sm.

Scirpus americanus Pers. var. *longispicatus* Britton = **Schoenoplectus americanus** (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller
Referencias: Smith, S. G., 1995.

Scirpus americanus Pers. var. *polyphyllus* (Boeck.) Beetle, p.p. = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **badius** (J. Presl & C. Presl) S.G. Sm.

Scirpus americanus Pers. var. *polyphyllus* (Boeck.) Beetle, p.p. = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **longispicatus** (Britton) S.G. Sm.

Scirpus americanus Pers. var. *pungens* (Vahl) Barros & Osten = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **pungens**

Scirpus americanus Pers. subsp. *monophyllus* (J. Presl & C. Presl) T. Koyama = **Schoenoplectus americanus** (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller
Referencias: Smith, S. G., 2002b.

Scirpus andinus Phil. = **Eleocharis quinqueflora** (Hartmann) O. Schwarz

Scirpus angachilensis (Steud.) Boeck. = **Isolepis nigricans** Kunth
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Scirpus angustisquamis Beetle
Referencias: Beetle, A. A., 1946; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marillan, R. 180* (UC)].

Scirpus annuus All. = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
Referencias: Adams, C. D., 1994f.

Scirpus aphyllus Boeck. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Scirpus arechavaletae Boeck. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Herter, W. G. F., 1949–1956; Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Scirpus asper J. Presl & C. Presl var. **asper**
Sin.: *Scirpus brachycaulos* Phil., *Scirpus glaucus* Nees, *Scirpus subasper* Beetle
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Barros, M., 1947.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–3100 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 6140* (SI)]; CHL[*Barros, E. 9336* (SI)].

Scirpus asper J. Presl & C. Presl var. **diffusus** (Beetle) Beetle
Sin.: *Scirpus subasper* Beetle var. *diffusus* Beetle
Referencias: Beetle, A. A., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Worth, C. R. 1649* (*)].

Scirpus atacamensis Phil. = **Zameioscirpus atacamensis** (Phil.) Dhooge & Goetgh.
Referencias: Dhooge, S., Goetghebeur, P. & Muasya, A. M., 2003.

Scirpus atacamensis auct. non Phil. = **Phylloscirpus acaulis** (Phil.) Goetgh. & D.A. Simpson

Scirpus atacamensis Phil. var. *exscapus* Kurtz = **Phylloscirpus acaulis** (Phil.) Goetgh. & D.A. Simpson

Scirpus atropurpureus Retz. = **Eleocharis atropurpurea** (Retz.) J. Presl & C. Presl
Referencias: Kern, J. H., 1974.

Scirpus aucklandicus (Hook. f.) Boeck. = **Isolepis aucklandica** Hook. f.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Scirpus autumnalis L. = **Fimbristylis autumnalis** (L.) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus autumnalis Rottb., hom. illeg. = **Cyperus haspan** L. var. **haspan**

Scirpus badius J. Presl & C. Presl = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **badius** (J. Presl & C. Presl) S.G. Sm.
Referencias: Smith, S. G., 1995.

Scirpus baeothryon Ehrh. ex L. f. = **Eleocharis quinqueflora** (Hartmann) O. Schwarz
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus boliviensis Barros = **Phylloscirpus boliviensis** (Barros) Dhooge & Goetgh.

[Scirpus bonariensis Poir.]
Sin.: *Fimbristylis ferruginea* auct. non (L.) Vahl
Referencias: Barros, M., 1935.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Scirpus brachycaulos Phil. = **Scirpus asper** J. Presl & C. Presl var. **asper**
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus brevis d'Urv. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Scirpus brevis Griseb., hom. illeg. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.

Scirpus bridgesii Boeck. = **Isolepis nigricans** Kunth
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Scirpus brownii Spreng. = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus brunneo-vaginatus Boeck. = **Bulbostylis sphaerocephala** (Boeck.) Lindm.
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus caducus Delile = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus californicus (C.A. Mey.) Britton, comb. superfl. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **californicus**

Scirpus californicus (C.A. Mey.) Steud. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **californicus**
Referencias: Adams, C. D., 1994k.

Scirpus californicus (C.A. Mey.) Steud. var. *spoliatus* Barros = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **spoliatus** (Barros) Vegetti
Referencias: Vegetti, A. C., 1995.

Scirpus californicus (C.A. Mey.) Steud. var. *tatora* (Kunth) Barros = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **californicus**

Scirpus californicus (C.A. Mey.) Steud. var. *tereticulmis* (Steud.) Beetle = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **tereticulmis** (Steud.) Vegetti
Referencias: Vegetti, A. C., 1995.

Scirpus californicus (C.A. Mey.) Steud. subsp. *tatora* (Kunth) T. Koyama = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **californicus**

Scirpus capillaris L. = **Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clarke var. **capillaris**

Scirpus capillaris L. var. *elatior* Griseb. = **Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clarke var. **elatior** (Griseb.) Osten

Scirpus capitatus auct. non L. = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Referencias: Kern, J. H., 1974.

Scirpus capitatus Willd. = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Referencias: Kern, J. H., 1974.

Scirpus caribaeus Rottb. = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Referencias: González Elizondo, M. S., 1994.

Scirpus castaneus Michx. = **Fimbristylis castanea** (Michx.) Vahl

Scirpus cernuus Vahl = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Scirpus cernuus Vahl f. *aphyllus* (Boeck.) Barros = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.

Scirpus chamissonis Schrad. ex Boeck. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **californicus**

Scirpus chilensis auct. non Nees & Meyen = **Schoenoplectus americanus** (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller

Scirpus chilensis Nees & Meyen var. *longisetis* (Kük.) Beetle = **Schoenoplectus americanus** (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller

Scirpus chloroticus F. Phil. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Scirpus chubutensis C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1947, 1969a.
Hierba. Perenne. Endémica. 400–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Koslowsky, J. 73* (SI)].
Nota: Esta especie no pertenece al género *Scirpus* tal como ahora es delimitado, sin embargo su nuevo estatus es aún desconocido.

Scirpus complanatus Retz. = **Fimbristylis complanata** (Retz.) Link
Referencias: Barros, M., 1947.

[Scirpus compressus (L.) Pers.]
Sin.: *Schoenus compressus* L.
Referencias: Barros, M., 1929, 1935.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Scirpus confervoides Poir. = **Websteria confervoides** (Poir.) Hooper

Scirpus conglomeratus Kunth = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **pungens**

Scirpus consanguineus (Kunth) Boeck. = **Bulbostylis consanguinea** (Kunth) C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus constitutionis F. Phil. = **Isolepis nigricans** Kunth
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Scirpus corymbosus L. = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton var. **corymbosa**
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus crassiculmis Griseb. = **Eleocharis elegans** (Kunth) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus crinalis Griseb. = **Eleocharis crinalis** (Griseb.) C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus cubensis Poepp. & Kunth = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Palla f. **cubense**

Scirpus cubensis Poepp. & Kunth var. *gracilis* (Boeck.) Beetle = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Palla f. **cubense**

Scirpus cubensis Poepp. & Kunth var. *paraguayensis* (Maury) Kük. ex Barros = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Palla f. **paraguayense** (Maury) Pedersen

Scirpus decipiens A. St.-Hil. ex Nees = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **californicus**

Scirpus deserticola Phil. = **Phylloscirpus deserticola** (Phil.) Dhooge & Goetgh.

Scirpus deserticola Phil. var. *semisubterrraneus* (Boeck.) Barros = **Phylloscirpus deserticola** (Phil.) Dhooge & Goetgh.
Referencias: Dhooge, S. & Goetghebeur, P., 2004.

Scirpus desvauxii Phil. = **Eleocharis fuscopurpurea** (Steud.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1947; Gunckel, L.H., 1944.

Scirpus dichotomus L. = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
Referencias: Kral, R., 1971.

Scirpus didymostachyus F. Phil. = **Isolepis nigricans** Kunth
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Scirpus diphyllus Retz. = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
Referencias: Kral, R., 1971.

Scirpus distichophyllus Boeck. = **Phylloscirpus deserticola** (Phil.) Dhooge & Goetgh.
Referencias: Dhooge, S. & Goetghebeur, P., 2004.

Scirpus elegans Kunth = **Eleocharis elegans** (Kunth) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus erectus Poir. = **Schoenoplectus erectus** (Poir.) Palla ex J. Raynal
Referencias: Adams, C. D., 1994k.

Scirpus erraticus Rota ex De Not. = **Eleocharis atropurpurea** (Retz.) J. Presl & C. Presl

Scirpus exiguus Griseb., hom. illeg. = **Eleocharis bicolor** Chapm.

Scirpus exiguus Kunth = **Eleocharis radicans** (Poir.) Kunth
Referencias: Barros, M., 1947, 1960.

Scirpus ferrugineus L. = **Fimbristylis ferruginea** (L.) Vahl
Referencias: Kral, R., 1971.

Scirpus filamentosus Vahl = **Bulbostylis filamentosa** (Vahl) C.B. Clarke

Scirpus filiculmis Schrad., nom. nud. = **Eleocharis filiculmis** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus fistulosus Poir., hom. illeg. = **Eleocharis acutangula** (Roxb.) Schult.
Referencias: Koyama, T. M., 1978b.

Scirpus flaccidus Rchb. ex Spreng. = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus flavescens Poir. = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus gaudichaudianus Kunth = **Eleocharis flavescens** (Poir.) Urb.
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus gaudichaudii (Kunth) Boeck. = **Isolepis gaudichaudiana** Kunth

Scirpus gaudichaudii Boeck. var. *tenuis* Boeck. = **Isolepis nigricans** Kunth
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Scirpus geniculatus L., p.p. = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Referencias: Kern, J. H., 1974; Koyama, T. M., 1961.

Scirpus geniculatus L. var. *minor* Vahl = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus giganteus Kunth
Sin.: *Androcoma speciosa* Nees, *Androtrichum giganteum* (Kunth) H. Pfeiff., *Androtrichum speciosum* (Nees) Herter
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Marchesi, E., 1984; Pedersen, T. M., 1969[1968].
Hierba palustre. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR); BRA(RGS, SCA); PRY(COA, PAI); URY(CAS, COL, FLO, FLA, MON, RNO, ROC, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 13408* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 2902* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 478* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 528a* (SI)].

Scirpus glaucophyllus Boeck. = **Bulbostylis jacobinae** (Steud.) Lindm.

Scirpus glaucus Nees = **Scirpus asper** J. Presl & C. Presl var. **asper**
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus glaziovii Boeck. = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **juncoides**
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus guaraniticus Pedersen = **Schoenoplectus supinus** (L.) Palla

Scirpus hieronymi auct. non Boeck. = **Phylloscirpus deserticola** (Phil.) Dhooge & Goetgh.

Scirpus hieronymi Boeck. = **Zameioscirpus atacamensis** (Phil.) Dhooge & Goetgh.
Referencias: Dhooge, S., Goetghebeur, P. & Muasya, A. M., 2003.

Scirpus hirtellus (Schrad. ex Nees) Boeck. = **Bulbostylis hirtella** (Schrad. ex Schult.) Urb.
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus hookeri Desv., hom. illeg. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.

Scirpus hookeri Kunth = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.

Scirpus humboldtii Spreng. = **Bulbostylis junciformis** (Kunth) C.B. Clarke

Scirpus humilis Willd. ex J. Presl & C. Presl, nom. nud. = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **juncoides**

Scirpus incompletus (Nees) T. Koyama = **Fuirena incompleta** Nees f. **incompleta**
Referencias: Kral, R., 1978.

Scirpus interstinctus Vahl = **Eleocharis interstincta** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1960; Pedersen, T. M., 1961b.

Scirpus intricatus L. = **Cyperus squarrosus** L.

Scirpus inundatus (R. Br.) Poir. = **Isolepis inundata** R. Br.

Scirpus inundatus (R. Br.) Spreng., comb. superfl. = **Isolepis inundata** R. Br.

Scirpus junciformis (Kunth) Kuntze, nom. illeg. = **Bulbostylis junciformis** (Kunth) C.B. Clarke

Scirpus junciformis (Kunth) Poir., nom. illeg. = **Bulbostylis junciformis** (Kunth) C.B. Clarke

Scirpus juncoides Willd. ex Kunth, nom. nud. = **Bulbostylis junciformis** (Kunth) C.B. Clarke

Scirpus juncoides Willd. ex Kunth var. *nanus* Griseb. = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **nana** (Griseb.) Barros
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus lacustris auct. non L. = **Schoenoplectus tabernaemontani** (C.C. Gmel.) Palla

Scirpus lacustris L. var. *validus* (Vahl) Kük. = **Schoenoplectus tabernaemontani** (C.C. Gmel.) Palla
Referencias: Smith, S. G., 1995.

Scirpus lacustris L. subsp. *validus* (Vahl) Osten = **Schoenoplectus tabernaemontani** (C.C. Gmel.) Palla

Scirpus lacustris L. subsp. *validus* (Vahl) T. Koyama, comb. superfl. = **Schoenoplectus tabernaemontani** (C.C. Gmel.) Palla
Referencias: Smith, S. G., 1995.

Scirpus laxiflorus Thwaites = **Eleocharis ochrostachys** Steud.
Referencias: Koyama, T. M., 1961.

Scirpus leptaleus Koch = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Scirpus loefgrenii Boeck. = **Bulbostylis loefgrenii** (Boeck.) Prata & M.G. López

Scirpus longispicatus (Britton) Smyth, nom. illeg. = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **longispicatus** (Britton) S.G. Sm.

Scirpus lorentzii Boeck. = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **lorentzii** (Boeck.) Kük. ex Osten

Scirpus luzulae L. = **Cyperus luzulae** (L.) Rottb. ex Retz.
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus macrolepis Phil. = **Phylloscirpus acaulis** (Phil.) Goetgh. & D.A. Simpson

Scirpus maculosus Vahl = **Eleocharis maculosa** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus maritimus L. = **Bolboschoenus maritimus** (L.) Palla subsp. **maritimus**

Scirpus maritimus L. f. *cymosus* (Rchb.) T. Koyama = **Bolboschoenus maritimus** (L.) Palla subsp. **maritimus**

Scirpus maritimus L. var. *cymosus* Rchb. = **Bolboschoenus maritimus** (L.) Palla subsp. **maritimus**

Scirpus maritimus L. var. *digynus* Godr. = **Bolboschoenus maritimus** (L.) Palla subsp. **paludosus** (A. Nelson) T. Koyama

Scirpus maritimus L. var. *macrostachyus* (Lam.) Michx. = **Bolboschoenus robustus** (Pursh) Soják
Referencias: Adams, C. D., 1994c.

Scirpus maritimus L. var. *paludosus* (A. Nelson) Kük. = **Bolboschoenus maritimus** (L.) Palla subsp. **paludosus** (A. Nelson) T. Koyama
Referencias: Oteng-Yeboah, A. A., 1974.

Scirpus maritimus L. var. *robustus* (Pursh) Kük. = **Bolboschoenus robustus** (Pursh) Soják
Referencias: Adams, C. D., 1994c.

Scirpus megapotamicus A. Spreng. = **Rhynchospora megapotamica** (A. Spreng.) H. Pfeiff. var. **megapotamica**
Referencias: Herter, W. G. F., 1949–1956.

Scirpus melanocaulos Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(VI, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 2745* (CONC)].
Nota: Esta especie no pertenece al género *Scirpus* tal como ahora es delimitado, sin embargo su nuevo estatus es aún desconocido.

Scirpus melanocephalus (E. Desv.) Griseb. = **Eleocharis melanocephala** E. Desv.

Scirpus melanostachys d'Urv. = **Eleocharis melanostachys** (d'Urv.) C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus micranthus Vahl = **Lipocarpha micrantha** (Vahl) G.C. Tucker
Referencias: Goetghebeur, P. & Van den Borre, A., 1989.

Scirpus microstachys Boeck. = **Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clark var. **microstachys** (Boeck.) Barros

Scirpus microstachyus F. Phil. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.

Scirpus miliaceus L. = **Fimbristylis miliacea** (L.) Vahl

Scirpus minimum Hook. & Arn., hom. illeg. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.

Scirpus modestus (F. Phil.) F. Phil. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Scirpus molinianus Beetle = **Ficinia nodosa** (Rottb.) Goetgh., Muasya & D.A. Simpson

Scirpus monophyllus J. Presl & C. Presl = **Schoenoplectus americanus** (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller

Scirpus montanus Kunth = **Eleocharis montana** (Kunth) Roem. & Schult.
Referencias: McVaugh, R., 1993.

Scirpus montevidensis (Link) C.B. Clarke = **Androtrichum trigynum** (Spreng.) H. Pfeiff.
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus mucronatus L. = **Schoenoplectus mucronatus** (L.) Palla

Referencias: Smith, S. G., 2002b.

Scirpus mucronulatus Michx. = **Fimbristylis autumnalis** (L.) Roem. & Schult.
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus mutatus L. = **Eleocharis mutata** (L.) Roem. & Schult.

Scirpus nevadensis S. Watson = **Amphiscirpus nevadensis** (S. Watson) Oteng-Yeb.
Referencias: Goetghebeur, P. & Simpson, D. A., 1991; Oteng-Yeboah, A. A., 1974.

Scirpus nevadensis S. Watson var. *remireoides* (Griseb.) Beetle = **Amphiscirpus nevadensis** (S. Watson) Oteng-Yeb.
Referencias: Dhooge, 2005.

Scirpus niederleinianus Boeck. = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **juncoides**

Scirpus nigricans (Kunth) Poir. = **Isolepis nigricans** Kunth
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Scirpus nodosus Rottb. = **Ficinia nodosa** (Rottb.) Goetgh., Muasya & D.A. Simpson
Referencias: Muasya, A. M., Simpson, D. A. & Goetghebeur, P., 2000.

Scirpus nodulosus Roth = **Eleocharis montana** (Kunth) Roem. & Schult.
Referencias: McVaugh, R., 1993.

Scirpus nubigenus Phil. = **Phylloscirpus acaulis** (Phil.) Goetgh. & D.A. Simpson

Scirpus nudipes Griseb. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.

Scirpus obtusus Willd. = **Eleocharis obtusa** (Willd.) Schult.
Referencias: Pedersen, T. M., 1969[1968].

Scirpus olneyi A. Gray ex Engelm. & A. Gray = **Schoenoplectus americanus** (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller
Referencias: Strong, M. T., 1994.

Scirpus olneyi A. Gray ex Engelm. & A. Gray f. *australis* Barros & Osten ex Osten = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **badius** (J. Presl & C. Presl) S.G. Sm.

Scirpus olneyi A. Gray ex Engelm. & A. Gray f. *minor* Barros = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **badius** (J. Presl & C. Presl) S.G. Sm.

Scirpus olneyi A. Gray ex Engelm. & A. Gray var. *longisetis* Kük. = **Schoenoplectus americanus** (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller

Scirpus paludosus A. Nelson = **Bolboschoenus maritimus** (L.) Palla subsp. **paludosus** (A. Nelson) T. Koyama
Referencias: Oteng-Yeboah, A. A., 1974.

Scirpus palustris auct. non L. = **Eleocharis macrostachya** Britton
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus paraguayensis (Maury) Herter = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Palla f. **paraguayense** (Maury) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1995.

Scirpus pauciflorus Lightf. = **Eleocharis quinqueflora** (Hartmann) O. Schwarz
Referencias: Walters, S. M., 1980.

Scirpus perpusillus Boeck., nom. illeg. = **Isolepis ranko** (Steud.) Vegetti
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002; Vegetti, A. C., 1995.

Scirpus phaeocharpus F. Phil. = **Isolepis nigricans** Kunth

Scirpus philippii C.B. Clarke = **Isolepis nigricans** Kunth
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Scirpus philippii auct. non C.B. Clarke = **Isolepis ranko** (Steud.) Vegetti
Referencias: Vegetti, A. C., 1995.

Scirpus plicarhachis Griseb. = **Eleocharis plicarhachis** (Griseb.) Svenson
Referencias: Barros, M., 1939.

Scirpus pseudotriqueter Steud. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **tereticulmis** (Steud.) Vegetti

Scirpus pungens Vahl = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **pungens**

Scirpus pungens Vahl var. *longibracteatus* Osten & Barros = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **longispicatus** (Britton) S.G. Sm.

Scirpus pungens Vahl var. *longisetis* Benth. & F. Muell. = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **badius** (J. Presl & C. Presl) S.G. Sm.

Scirpus pungens Vahl var. *nanus* Benth. & F. Muell. = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **badius** (J. Presl & C. Presl) S.G. Sm.

Scirpus pungens Vahl var. *polyphyllus* Boeck. = **Schoenoplectus pungens** (Vahl) Palla var. **longispicatus** (Britton) S.G. Sm.

Scirpus pygmaeus (Vahl) A. Gray = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.

Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Scirpus quinqueflorus Hartmann = **Eleocharis quinqueflora** (Hartmann) O. Schwarz
Referencias: Walters, S. M., 1980.

Scirpus radicans Poir. = **Eleocharis radicans** (Poir.) Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus ranko (Steud.) Beetle, comb. superfl. = **Isolepis ranko** (Steud.) Vegetti
Referencias: Vegetti, A. C., 1995.

Scirpus ranko (Steud.) Gunckel = **Isolepis ranko** (Steud.) Vegetti
Referencias: Vegetti, A. C., 1995.

Scirpus remireoides Griseb. = **Amphiscirpus nevadensis** (S. Watson) Oteng-Yeb.
Referencias: Dhooge, 2005.

Scirpus retroflexus Poir. = **Eleocharis retroflexa** (Poir.) Urb.

Scirpus rigidus (Steud. ex Lechl.) Boeck., nom. illeg. = **Trichophorum rigidum** (Steud. Ex Lechler) Goetgh., Muasya & D.A. Simpson
Referencias: Muasya, A. M., Simpson, D. A. & Goetghebeur, P., 2000.

Scirpus rigidus Schrad. ex Nees = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **californicus**

Scirpus riparius J. Presl & C. Presl = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **californicus**
Referencias: Soják, J., 1972.

Scirpus riparius Poir., hom. illeg. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.

Scirpus riparius J. Presl & C. Presl var. *chamissoi* (Nees) H. Pfeiff. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **spoliatus** (Barros) Vegetti

Scirpus riparius J. Presl & C. Presl var. *tereticulmis* (Steud.) C.B. Clarke = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **tereticulmis** (Steud.) Vegetti

Scirpus robustus Pursh = **Bolboschoenus robustus** (Pursh) Soják

Scirpus robustus Pursh var. *paludosus* (A. Nelson) Fernald = **Bolboschoenus maritimus** (L.) Palla subsp. **paludosus** (A. Nelson) T. Koyama

Scirpus rostellatus Torr. = **Eleocharis rostellata** (Torr.) Torr.

Scirpus savii Sebast. & Mauri = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.

Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Scirpus sellowianus (Kunth) Griseb. = **Eleocharis sellowiana** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus semisubterraneus Boeck. = **Phylloscirpus deserticola** (Phil.) Dhooge & Goetgh.
Referencias: Dhooge, S. & Goetghebeur, P., 2004.

Scirpus sessiliflorus Phil. = **Phylloscirpus acaulis** (Phil.) Goetgh. & D.A. Simpson

Scirpus setifolius Boeck. = **Bulbostylis sphaerocephala** (Boeck.) Lindm.
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus spadiceus L. = **Fimbristylis spadicea** (L.) Vahl
Referencias: Barros, M., 1947; Kral, R., 1971.

Scirpus spadiceus Phil., hom. illeg. = **Schoenus nitens** (R. Br.) Poir. subsp. **krausei** (Phil.) Kük.

Scirpus spegazzinianus Barros
Referencias: Barros, M., 1969a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, R. A. 565* (BAB)]; CHL[*Pisano, E. 3633* (CONC)].
Nota: Esta especie no pertenece al género *Scirpus* tal como ahora es delimitado, sin embargo su nuevo estatus es aún desconocido.

Scirpus sphaerocephalus Boeck. = **Bulbostylis sphaerocephala** (Boeck.) Lindm.
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus sphaerocephalus Boeck. var. *macrocephalus* Maury = **Bulbostylis sphaerocephala** (Boeck.) Lindm.

Scirpus sphaerolepis Boeck. = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **juncoides**

Scirpus striatulus (E. Desv.) Griseb. = **Eleocharis bonariensis** Nees
Referencias: Walters, S. M., 1980.

Scirpus subasper Beetle = **Scirpus asper** J. Presl & C. Presl var. **asper**

Scirpus subasper Beetle var. *diffusus* Beetle = **Scirpus asper** J. Presl & C. Presl var. **diffusus** (Beetle) Beetle
Referencias: Beetle, A. A., 1953.

Scirpus submersus C.H. Wright ex Sauvalle = **Websteria confervoides** (Poir.) Hooper

Scirpus sulcatus Roth, hom. illeg. = **Eleocharis filiculmis** Kunth
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus supinus L. = **Schoenoplects supinus** (L.) Palla

[Scirpus sylvaticus L.]
Referencias: Barros, M., 1929.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel. = **Schoenoplectus tabernaemontani** (C.C. Gmel.) Palla
Referencias: Smith, S. G., 1995.

Scirpus tenuifolius Rudge = **Bulbostylis tenuifolia** (Rudge) J.F. Macbr.
Referencias: Barros, M., 1947; Kral, R., 1971.

Scirpus tenuispicatus Boeck. = **Bulbostylis funckii** (Steud.) C.B. Clarke
Referencias: Svenson, H. K., 1957.

Scirpus tereticulmis Steud. = **Schoenoplectus californicus** (C.A. Mey.) Soják var. **tereticulmis** (Steud.) Vegetti
Referencias: Vegetti, A. C., 1995.

Scirpus terminalis F. Phil. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Scirpus thermalis Spruce, nom. inval. = **Phylloscirpus deserticola** (Phil.) Dhooge & Goetgh.
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus trachycaulos Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO)].
Nota: Esta especie no pertenece al género *Scirpus* tal como ahora es delimitado, sin embargo su nuevo estatus es aún desconocido.

Scirpus trichocaulos F. Phil. = **Isolepis nigricans** Kunth
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Scirpus umbellatus (Rottb.) Kuntze = **Fuirena umbellata** Rottb.
Referencias: Kuntze, C. E. O., 1898.

Scirpus uniglumis Link = **Eleocharis uniglumis** (Link) Schult.

Scirpus vahlii Lam. = **Fimbristylis vahlii** (Lam.) Link
Referencias: Barros, M., 1947.

Scirpus validus Vahl = **Schoenoplectus tabernaemontani** (C.C. Gmel.) Palla
Referencias: Smith, S. G., 1995.

Scirpus varians (Steud.) Boeck. = **Isolepis varians** Steud.
Referencias: Muasya, A. M. & Simpson, D. A., 2002.

Scleria Bergius

Número de especies: 23, 6 endémicas

Scleria arundinacea Kunth = **Scleria latifolia** Sw.
Referencias: Adams, C. D., 1994j; Koyama, T. M., 1984.

Scleria balansae Maury
Sin.: *Scleria sellowiana* Kunth f. *glabriuscula* Osten, *Scleria sellowiana* Kunth var. *balansae* (Maury) C.B. Clarke
Referencias: Barros, M., 1960; Charpin, A., Alves, M. V. & Luceño, M., 1993; Core, E. L., 1942; Herter, W. G. F., 1949–1956; Marchesi, E., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, GUA); URY(CAS, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 6656* (JUA)]; BRA[*Araújo, A. C. 602* (ICN)]; PRY[*Balansa, B. 459* (G)]; URY[*Osten, C. 21820* (MVM)].

Scleria bracteata Cav.
Referencias: Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11294* (BM)].

Scleria caricifolia Schrad., nom. nud. = **Scleria secans** (L.) Urb.
Referencias: Core, E. L., 1952.

Scleria catharinensis Boeck. = **Scleria leptostachya** Kunth

Scleria ciliata Michx.
Sin.: *Scleria pauciflora* H.L. Mühl. ex Willd., nom. inval., *Scleria sellowiana* Kunth f. *glabriuscula* Barros, hom. illeg.
Referencias: Adams, C. D., 1994j.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 3049* (SI)]; BRA[*Sobral, M. 2679* (ICN)].

Scleria colorata Core
Referencias: Core, E. L., 1952.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 3739* (S)].

Scleria composita (Nees) Boeck.
Sin.: *Hypoporum compositum* Nees, *Scleria scabrosa* Maury
Referencias: Barros, M., 1947; Charpin, A., Alves, M. V. & Luceño, M., 1993; Core, E. L., 1942, 1952.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(CAU, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 1297* (*)]; PRY[*Balansa, B. 450* (G)].

Scleria cyanocarpa Kunth = **Scleria latifolia** Sw.
Referencias: Adams, C. D., 1992; Koyama, T. M., 1984.

Scleria diffusa C.B. Clarke, hom. illeg. = **Scleria virgata** (Nees) Steud.
Referencias: Core, E. L., 1936, 1952.

Scleria distans Poir.
Sin.: *Hypoporum humile* Nees, nom. nud., *Hypoporum nutans* (Willd. ex Kunth) Nees, *Scleria hirtella* auct. non Sw., *Scleria nutans* Willd. ex Kunth
Referencias: Adams, C. D., 1992; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Raynal, J., 1976; Robinson, E. A., 1964.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, PAI); URY(CAS, MAL, MON, RNO, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 7110* (CTES)]; BRA[*Sobral, M. 8340* (ICN)]; PRY[*Marín, G. 518* (BM, PY)]; URY[*Berro, M. B. 3711* (MVFA)].

Scleria filiculmis Boeck.
Sin.: *Scleria georgiana* Core var. *filiculmis* (Boeck.) H. Pfeiff.
Referencias: Core, E. L., 1942, 1952.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 6180* (HBR, ICN)].

Scleria georgiana Core var. *filiculmis* (Boeck.) H. Pfeiff. = **Scleria filiculmis** Boeck.

[Scleria hirtella Sw.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Scleria hirtella auct. non Sw. = **Scleria distans** Poir.
Referencias: Raynal, J., 1976.

[Scleria hirtella Sw. var. nutans Nees]
Referencias: Barros, M., 1945, 1960.
Notas: Nombre dudoso. Posible sinónimo de *Scleria distans*.

[Scleria humilis Britton]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Scleria junciformis Kunth = **Lagenocarpus junciformis** (Kunth) Kuntze
Referencias: Koyama, T. M., 2004.

Scleria latifolia Sw.
Sin.: *Schizolepis latifolia* (Sw.) Nees, *Schizolepis trigonocarpa* Nees, *Scleria arundinacea* Kunth, *Scleria cyanocarpa* Kunth, *Scleria latifolia* Sw. var. *arundinacea* (Kunth) H. Pfeiff., *Scleria olyroides* Kunth, *Scleria sylvestris* Poepp. & Kunth
Referencias: Adams, C. D., 1992, 1994j; Barros, M., 1945, 1947; Koyama, T. M., 1984; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2911* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 40511* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 15998* (MO, PY)].

Scleria latifolia Sw. var. *arundinacea* (Kunth) H. Pfeiff. = **Scleria latifolia** Sw.
Referencias: Adams, C. D., 1994j; Koyama, T. M., 1984.

Scleria latifolia Sw. subsp. *foliosa* (Nees) T. Koyama = **Scleria plusiophylla** Steud.
Referencias: Ahumada, O., 1995.

Scleria leptostachya Kunth
Sin.: *Hypoporum leptostachyum* (Kunth) Nees, *Scleria catharinensis* Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Core, E. L., 1942, 1952; Herter, W. G. F., 1949–1956; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; Osten, C., 1931.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA); URY(MON, PAY, RNO, ROC, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 1309* (*)]; BRA[*Smith, L. B. 10991* (HBR, US)]; PRY[*Hassler, E. 8210* (BM)]; URY[*Berro, M. B. 2574* (MVFA, MVM)].

Scleria longigluma Kük.
Referencias: Barros, M., 1947; Core, E. L., 1952.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 843* (SI)]; PRY[*Ferrucci, M. S. 1509* (CTES)].

Scleria melaleuca C. Rchb. ex Schltdl. & Cham.
Sin.: *Scleria pratensis* Lindl. ex Nees, *Scleria pterota* C. Presl, nom. nud.
Referencias: Adams, C. D., 1994j; Barros, M., 1947; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1087* (SI)]; BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 3278* (ICN)]; PRY[*Jiménez, B. 65* (BM, CTES, MO, PY, SI)].

Scleria microcarpa Nees
Referencias: Barros, M., 1960; Core, E. L., 1952; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 1287* (HBR)]; PRY[*Rojas, T. 1017* (AS, MO)].

Scleria minutiflora Rich. ex Spreng., nom. inval. = **Rhynchospora contracta** (Nees) J. Raynal

Scleria mitis Bergius
Referencias: Core, E. L., 1952; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Ferrucci, M. S. 1426* (CTES), *Jiménez, B. 1955* (BM, G, GB, MO, PY)].

Scleria muricata (Nees) Boeck. = **Becquerelia muricata** Nees

Scleria myricocarpa Kunth
Sin.: *Schizolepis myricocarpa* (Kunth) Nees

Referencias: Barros, M., 1960.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2120* (MBM)].

Scleria nutans Willd. ex Kunth = **Scleria distans** Poir.
Referencias: Raynal, J., 1976; Robinson, E. A., 1964.

Scleria olyroides Kunth = **Scleria latifolia** Sw.
Referencias: Koyama, T. M., 1984.

Scleria panicoides Kunth
Sin.: *Schizolepis panicoides* (Kunth) Nees
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Core, E. L., 1952; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1268* (SI), *Morrone, O. 1633* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 1793* (HBR)]; PRY[*Zardini, E. M. 55068* (FCQ, MO)].

Scleria pauciflora H.L. Mühl. ex Willd., nom. inval. = **Scleria ciliata** Michx.
Referencias: Adams, C. D., 1994j; McVaugh, R., 1993.

Scleria plusiophylla Steud.
Sin.: *Schizolepis foliosa* Nees, *Scleria latifolia* Sw. subsp. *foliosa* (Nees) T. Koyama
Referencias: Ahumada, O., 1995; Barros, M., 1960; Koyama, T. M., 1984.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 28753* (CTES, NY, SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 8912* (HBR)]; PRY[*Zardini, E. M. 3667* (FCQ, MO)].

Scleria pratensis Lindl. ex Nees = **Scleria melaleuca** C. Rchb. ex Schltdl. & Cham.
Referencias: Adams, C. D., 1994j.

Scleria pterota C. Presl, nom. nud. = **Scleria melaleuca** C. Rchb. ex Schltdl. & Cham.
Referencias: Adams, C. D., 1994j.

Scleria reflexa Kunth = **Scleria secans** (L.) Urb.
Referencias: Adams, C. D., 1994j; Barros, M., 1960; Core, E. L., 1952.

Scleria renggeriana Steud. = **Scleria secans** (L.) Urb.
Referencias: Core, E. L., 1952.

Scleria reticularis Michx.
Sin.: *Scleria setacea* auct. non Poir.
Referencias: Ahumada, O., 1995; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997; McVaugh, R., 1993.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Quarín, C. L. 471* (CTES)].

Scleria rigida Kunth = **Lagenocarpus rigidus** (Kunth) Nees subsp. **rigidus**
Referencias: Angely, J. A., 1965.

Scleria scabrosa Maury = **Scleria composita** (Nees) Boeck.
Referencias: Barros, M., 1947.

Scleria schulzii Barros
Referencias: Barros, M., 1945, 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 24273* (CTES)].

Scleria secans (L.) Urb.
Sin.: *Mastigoscleria reflexa* (Kunth) Nees, *Schoenus secans* L., *Scleria caricifolia* Schrad., nom. nud., *Scleria reflexa* Kunth, *Scleria renggeriana* Steud.
Referencias: Adams, C. D., 1994j; Ahumada, O., 1995; Barros, M., 1960; Core, E. L., 1952; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAN, CEN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1628* (SI), *Zuloaga, F. O. 5717* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 2269* (HBR)]; PRY[*Marín, G. 293* (CTES, MO, PY)].

Scleria sellowiana Kunth
Sin.: *Chondrolomia sellowiana* (Kunth) Nees
Referencias: Barros, M., 1947, 1960; Herter, W. G. F., 1949–1956; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, MON, PAY, RNO, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 7932* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 5139* (HBR)]; URY[*Herter, W. G. F. 611* (MVM)].

Scleria sellowiana Kunth f. *glabriuscula* Barros, hom. illeg. = **Scleria ciliata** Michx.

Scleria sellowiana Kunth f. *glabriuscula* Osten = **Scleria balansae** Maury
Referencias: Barros, M., 1945, 1947.

Scleria sellowiana Kunth var. *balansae* (Maury) C.B. Clarke = **Scleria balansae** Maury
Referencias: Barros, M., 1960; Core, E. L., 1942.

Scleria setacea auct. non Poir. = **Scleria reticularis** Michx.
Referencias: Ahumada, O., 1995; McVaugh, R., 1993.

Scleria sylvestris Poepp. & Kunth = **Scleria latifolia** Sw.
Referencias: Koyama, T. M., 1984.

[Scleria torreyana Walp.]
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Niederlein, G., 1890.
Notas: Nombre dudoso. Posible sinónimo de *Scleria reticularis*.

Scleria trigonocarpa Boeck., hom. illeg. = **Scleria virgata** (Nees) Steud.
Referencias: Core, E. L., 1936, 1952.

Scleria tuberculata Boeck. = **Becquerelia tuberculata** (Boeck.) H. Pfeiff.

Scleria uleana Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 45933* (PACA)].

Scleria variegata (Nees) Steud.
Sin.: *Hypoporum variegatum* Nees
Referencias: Core, E. L., 1952.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 219a* (G, M, S)].

Scleria virgata (Nees) Steud.
Sin.: *Hypoporum virgatum* Nees, *Scleria diffusa* C.B. Clarke, hom. illeg., *Scleria trigonocarpa* Boeck., hom. illeg.
Referencias: Ahumada, O., 1995; Core, E. L., 1936, 1942.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2504* (SI)].
Notas: Su presencia es probable en Paraná y Santa Catarina, Brasil.

Spermodon confinis Nees = **Rhynchospora confinis** (Nees) C.B. Clarke
Referencias: Guaglianone, E. R., 1980; Kükenthal, G., 1950–1952.

Spermodon curvulus Nees = **Rhynchospora tenuis** Link subsp. **tenuis**
Referencias: Koyama, T. M., 1972.

Stenophyllus argentinus (Palla) Killip = **Bulbostylis juncoides** (Vahl) Kük. ex Herter var. **lorentzii** (Boeck.) Kük. ex Osten

Stenophyllus capillaris (L.) Britton = **Bulbostylis capillaris** (L.) C.B. Clarke var. **capillaris**

Stenophyllus hirtellus (Schrad. ex Schult.) H. Pfeiff. = **Bulbostylis hirtella** (Schrad. ex Schult.) Urb.
Referencias: Barros, M., 1947.

Stenophyllus scabrus (J. Presl & C. Presl) H. Pfeiff. f. *evolutior* (Lindm.) H. Pfeiff. = **Bulbostylis major** Palla

Terobera scirpoidea Steud. = **Machaerina scirpoidea** (Steud.) T. Koyama
Referencias: Strong, M. T., 1997.

Torulinium confertum Desv. = **Cyperus odoratus** L.
Referencias: Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.

Torulinium ferax (Rich.) Urb. = **Cyperus odoratus** L.
Referencias: Tucker, G. C., 1984b.

Torulinium odoratum (L.) Hooper = **Cyperus odoratus** L.
Referencias: Tucker, G. C., 1984b.

Torulinium poeppigii (Kunth) C.B. Clarke = **Cyperus poeppigii** Kunth
Referencias: Kükenthal, G., 1935–1936.

Trichophorum Pers.

Número de especies: 1

Trichophorum rigidum (Steud. Ex Lechler) Goetgh., Muasya & D.A. Simpson
Sin.: *Isolepis rigida* Steud. ex Lechl., *Scirpus rigidus* (Steud. ex Lechl.) Boeck., nom. illeg.
Referencias: Barros, M., 1947; Muasya, A. M., Simpson, D. A. & Goetghebeur, P., 2000; Dhooge, 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 3600–4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 785* (SI), *Lorentz, P. G. 66* (SI)].

Uncinia Pers.

Número de especies: 19, 14 endémicas

Uncinia andina G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 1512-18* (CTESN, G)]; CHL[*Zöllner, O. 15364* (MIN)].

Uncinia araucana G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 1997b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1400–1700 m.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 13899* (SI)].

Uncinia austroamericana G.A. Wheeler
Sin.: *Uncinia lechleriana* auct. non Steud., *Uncinia macrolepis* auct. non Decne.
Referencias: Moore, D. M., 1983; Wheeler, G. A., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 739* (MIN, SI)]; CHL[*Pisano, E. 5381* (GH, HIP, RNG)].

Uncinia bella Phil. = **Uncinia macrophylla** Steud.
Referencias: Kükenthal, G., 1909.

Uncinia bracteosa Phil. = **Uncinia macrophylla** Steud.
Referencias: Kükenthal, G., 1909.

Uncinia brevicaulis auct. non (Thouars) Kunth = **Uncinia lechleriana** Steud.
Referencias: Moore, D. M., 1983.

[Uncinia brevicaulis (Thouars) Kunth]
Sin.: *Carex brevicaulis* Thouars
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Uncinia brevicaulis (Thouars) Kunth f. *montana* (Phil.) Kük. = **Uncinia macloviana** Gaudich.
Referencias: Wheeler, G. A., 1994.

Uncinia brevicaulis (Thouars) Kunth var. *laticarpa* Kük. = **Uncinia scabriuscula** G.A. Wheeler

Uncinia brevicaulis (Thouars) Kunth var. *macloviana* (Gaudich.) C.B. Clarke = **Uncinia macloviana** Gaudich.
Referencias: Wheeler, G. A., 1994.

Uncinia chilensis G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 1997b, 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 9569* (MIN, SI)]; CHL[*Zöllner, O. 15203* (MIN)].

Uncinia chlorostachya Phil. = **Uncinia trichocarpa** C.A. Mey.

Uncinia costata Kük.
Referencias: Kükenthal, G., 1920; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Skottsberg, C. J. F., 1921.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, C. J. F. 488* (B, BM, C, GB)].

Uncinia cylindrica Franch. = **Uncinia macloviana** Gaudich.

Uncinia delacosta Steud., nom. nud. = **Uncinia macloviana** Gaudich.

Uncinia douglasii Boott
Referencias: Kükenthal, G., 1909; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Skottsberg, C. J. F., 1921.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–600 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Solbrig, O. T. 3647* (BISH, GH, K, MICH)].

Uncinia erinacea (Cav.) Pers.
Sin.: *Carex erinacea* Cav., *Uncinia erinacea* (Cav.) Pers. var. *angustata* Kük., *Uncinia erinacea* (Cav.) Pers. var. *longifolia* (Kük.) C.B. Clarke, *Uncinia longearistata* Steud., *Uncinia longifolia* Kunth, *Uncinia macrotricha* Franch., *Uncinia philippii* Steud.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Barros, M., 1969a; Kükenthal, G., 1909; Wheeler, G. A., 1997b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Smith, C. P. 24* (CONC, MIN)].

Uncinia erinacea (Cav.) Pers. var. *angustata* Kük. = **Uncinia erinacea** (Cav.) Pers.
Referencias: Wheeler, G. A., 1997a.

Uncinia erinacea (Cav.) Pers. var. *longifolia* (Kük.) C.B. Clarke = **Uncinia erinacea** (Cav.) Pers.
Referencias: Wheeler, G. A., 1997b.

Uncinia gracillis d'Urv., hom. illeg. = **Uncinia tenuis** Poepp. ex Kunth
Referencias: Barros, M., 1969a; Kükenthal, G., 1909.

Uncinia hamata (Sw.) Urb.
Sin.: *Carex hamata* Sw., *Uncinia jamaicensis* Pers.
Referencias: Barros, M., 1947; Kükenthal, G., 1909.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–2000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 34314* (MIN, SI)].

Uncinia jamaicensis Pers. = **Uncinia hamata** (Sw.) Urb.
Referencias: Barros, M., 1947; Kükenthal, G., 1909.

Uncinia kingii Boott = **Carex kingii** (Boott) Reznicek
Referencias: Reznicek, A. A., 1990; Wheeler, G. A., 1994.

Uncinia lasiocarpa Steud. ex Boeck. = **Uncinia phleoides** (Cav.) Pers.
Referencias: Barros, M., 1947; Gunckel, L. H., 1948.

Uncinia lechleriana auct. non Steud. = **Uncinia austroamericana** G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 2005.

Uncinia lechleriana Steud.
Sin.: *Uncinia brevicaulis* auct. non (Thouars) Kunth, *Uncinia macloviana* auct. non Gaudich.
Referencias: Barros, M., 1969a; Moore, D. M., 1983; Wheeler, G. A., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–800 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goodall, L. N. P. 721* (NA, RNG)]; CHL[*Lechler, W. 1285* (G, P)].

Uncinia lechleriana Steud. var. *triquetra* (Kük.) Kük. = **Uncinia triquetra** Kük.
Referencias: Wheeler, G. A., 1994.

Uncinia leptostachya Phil., hom. illeg. = **Uncinia phleoides** (Cav.) Pers.

Uncinia loliacea Phil. = **Uncinia trichocarpa** C.A. Mey.

Uncinia longearistata Steud. = **Uncinia erinacea** (Cav.) Pers.
Referencias: Barros, M., 1969a.

Uncinia longifolia E. Desv., hom. illeg. = **Uncinia phleoides** (Cav.) Pers.
Referencias: Barros, M., 1969a.

Uncinia longifolia Kunth = **Uncinia erinacea** (Cav.) Pers.

Uncinia longispica Boeck. = **Uncinia trichocarpa** C.A. Mey.

Uncinia macloviana auct. non Gaudich. = **Uncinia lechleriana** Steud.
Referencias: Moore, D. M., 1983.

Uncinia macloviana Gaudich.
Sin.: *Carex delacosta* Kuntze, *Uncinia brevicaulis* (Thouars) Kunth f. *montana* (Phil.) Kük., *Uncinia brevicaulis* (Thouars) Kunth var. *macloviana* (Gaudich.) C.B. Clarke, *Uncinia cylindrica* Franch., *Uncinia delacosta* Steud., nom. nud., *Uncinia macloviana* Gaudich. var. *cylindrica* (Franch.) Kük., *Uncinia montana* Phil.
Referencias: Barros, M., 1969a; Hooper, S., 1968; Kükenthal, G., 1909; Wheeler, G. A., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII, X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 1762-12* (CTESN, MIN)]; CHL[*Gunckel, L. H. 12611* (SI)].

Uncinia macloviana Gaudich. var. *cylindrica* (Franch.) Kük. = **Uncinia macloviana** Gaudich.

Uncinia macrolepis auct. non Decne. = **Uncinia austroamericana** G.A. Wheeler
Referencias: Wheeler, G. A., 2005.

Uncinia macrolepis Decne.
Sin.: *Carex macrolepis* Decne., nom. nud., *Uncinia meridensis* Steyerm., *Uncinia sinclairii* auct. non Boott, *Uncinia smithii* Philcox
Referencias: Barros, M., 1969a; Boelcke, O., Correa, M. N., Moore, D. M. & Roig, F. A., 1985; Kükenthal, G., 1909; Moore, D. M., 1983; Wheeler, G. A., 1994, 1995, 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*James, P. 112* (BM, SI)]; CHL[*Barros, E. 6018* (SI)].

Uncinia macrophylla Steud.
Sin.: *Uncinia bella* Phil., *Uncinia bracteosa* Phil., *Uncinia phalaroides* auct. non (Kunth) Nees
Referencias: Kükenthal, G., 1909.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–1100 m.
Países: CHL(VIII, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Smith, C. P. 14* (CONC, MIN)].

Uncinia macrotricha Franch. = **Uncinia erinacea** (Cav.) Pers.
Referencias: Barros, M., 1969a; Wheeler, G. A., 1997b.

Uncinia meridensis Steyerm. = **Uncinia macrolepis** Decne.
Referencias: Wheeler, G. A., 1994, 1995, 2005.

Uncinia microglochin (Wahlenb.) Spreng. var. *fuegina* (Kük.) Macloskie = **Carex camptoglochin** V.I. Krecz.
Referencias: Barros, M., 1969a; Wheeler, G. A. & Guaglianone, E. R., 2003b.

Uncinia montana Phil. = **Uncinia macloviana** Gaudich.

Uncinia montteana Phil. = **Uncinia phleoides** (Cav.) Pers.
Referencias: Barros, M., 1947; Kükenthal, G., 1909.

Uncinia multifaria Nees ex Boott
Sin.: *Uncinia multifaria* Nees ex Boott var. *macrostachya* (E. Desv.) C.B. Clarke
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Kükenthal, G., 1909.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 16631* (MIN)].

Uncinia multifaria Nees ex Boott var. *macrostachya* (E. Desv.) C.B. Clarke = **Uncinia multifaria** Nees ex Boott

Uncinia negeri Kük.
Referencias: Kükenthal, G., 1909; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Wheeler, G. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 771-17* (CTESN, G)]; CHL[*Zöllner, O. 20461* (MIN)].

Uncinia phalaroides (Kunth) Nees = **Carex phalaroides** Kunth subsp. **phalaroides**
Referencias: Kükenthal, G., 1909.

Uncinia phalaroides auct. non (Kunth) Nees = **Uncinia macrophylla** Steud.
Referencias: Kükenthal, G., 1909.

Uncinia philippii Steud. = **Uncinia erinacea** (Cav.) Pers.
Referencias: Wheeler, G. A., 1997b.

Uncinia phleoides (Cav.) Pers.
Sin.: *Carex phleoides* Cav., *Uncinia lasiocarpa* Steud. ex Boeck., *Uncinia leptostachya* Phil., hom. illeg., *Uncinia longifolia* E. Desv., hom. illeg., *Uncinia montteana* Phil., *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *brachytricha* Speg., *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *krausei* Kük., *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *nux-nigra* C.B. Clarke
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Barros, M., 1947; Kükenthal, G., 1909; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Pedersen, T. M., 1969[1968]; Wheeler, G. A. & Goetghebeur, P., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, NEU, RNE, SAL, TUC); CHL(IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7640* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20148* (CONC, SGO)].

Uncinia phleoides (Cav.) Pers. var. *brachytricha* Speg. = **Uncinia phleoides** (Cav.) Pers.
Referencias: Kükenthal, G., 1909.

Uncinia phleoides (Cav.) Pers. var. *krausei* Kük. = **Uncinia phleoides** (Cav.) Pers.

Uncinia phleoides (Cav.) Pers. var. *longispica* (Boeck.) C.B. Clarke = **Uncinia trichocarpa** C.A. Mey.

Uncinia phleoides (Cav.) Pers. var. *nux-nigra* C.B. Clarke = **Uncinia phleoides** (Cav.) Pers.
Referencias: Wheeler, G. A. & Goetghebeur, P., 1997.

Uncinia phleoides (Cav.) Pers. var. *trichocarpa* (C.A. Mey.) C.B. Clarke = **Uncinia trichocarpa** C.A. Mey.

Uncinia phyllostachya Nees = **Carex seticulmis** Boeck.
Referencias: Barros, M., 1960; Kükenthal, G., 1909.

Uncinia scabriuscula G.A. Wheeler
Sin.: *Uncinia brevicaulis* (Thouars) Kunth var. *laticarpa* Kük.
Referencias: Kükenthal, G., 1909; Wheeler, G. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(IX, X, XI, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barros, M. 2351* (SI, US)]; CHL[*Looser, G. 2721* (SI)].

Uncinia sellowiana (Schltdl.) Nees = **Carex sellowiana** Schltdl.
Referencias: Kükenthal, G., 1909.

Uncinia sinclairii auct. non Boott = **Uncinia macrolepis** Decne.
Referencias: Moore, D. M., 1983.

Uncinia smithii Philcox = **Uncinia macrolepis** Decne.
Referencias: Wheeler, G. A., 1994, 1995, 2005.

Uncinia tenuis Poepp. ex Kunth
Sin.: *Uncinia gracillis* d'Urv., hom. illeg., *Uncinia tenuis* Poepp. ex Kunth f. *firmula* Kük.
Referencias: Barros, M., 1969a; Gómez Laurito, J., 1980; Kükenthal, G., 1909; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Skottsberg, C. J. F., 1921; Wheeler, G. A. & Goetghebeur, P., 1997; Wheeler, G. A., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IX, X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 394* (SI)]; CHL[*Poeppig, E. F. 243* (BM)].

Uncinia tenuis Poepp. ex Kunth f. *firmula* Kük. = **Uncinia tenuis** Poepp. ex Kunth

Uncinia trichocarpa C.A. Mey.
Sin.: *Uncinia chlorostachya* Phil., *Uncinia loliacea* Phil., *Uncinia longispica* Boeck., *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *longispica* (Boeck.) C.B. Clarke, *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *trichocarpa* (C.A. Mey.) C.B. Clarke, *Uncinia urvillei* Steud.
Referencias: Kükenthal, G., 1909.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. 1374* (BM, G, GH, K, M)].

Uncinia triquetra Kük.
Sin.: *Uncinia lechleriana* Steud. var. *triquetra* (Kük.) Kük.
Referencias: Barros, M., 1969a; Kükenthal, G., 1900, 1909; Wheeler, G. A., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–1300 m.
Países: ARG(CHU, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grondona, E. M. 4298* (MIN)]; CHL[*Moore, D. M. 1111* (GH, K, RNG, SGO, US)].

Uncinia urvillei Steud. = **Uncinia trichocarpa** C.A. Mey.

Vincentia scirpoidea (Steud.) Boeck. = **Machaerina scirpoidea** (Steud.) T. Koyama
Referencias: Strong, M. T., 1997.

Websteria S.H. Wright

Número de especies: 1

Websteria confervoides (Poir.) Hooper
Sin.: *Eleocharis confervoides* (Poir.) T. Koyama, *Rhynchospora ruppioides* Benth., *Scirpus confervoides* Poir., *Scirpus submersus* C.H. Wright ex Sauvalle, *Websteria limnophila* C.H. Wright, *Websteria submersa* (C.H. Wright ex Sauvalle) Britton
Referencias: Adams, C. D., 1992, 1994l; Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P., 1997.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Molfino, J. F. 3692* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 353* (SI)]; PRY[*Mizobuchi, K. 475* (MO)].

Websteria limnophila C.H. Wright = **Websteria confervoides** (Poir.) Hooper

Websteria submersa (C.H. Wright ex Sauvalle) Britton = **Websteria confervoides** (Poir.) Hooper

Zameioscirpus Dhooge & Goetgh.

Número de especies: 3

Zameioscirpus atacamensis (Phil.) Dhooge & Goetgh.
Sin.: *Isolepis atacamensis* Phil., *Scirpus atacamensis* Phil., *Scirpus hieronymi* Boeck.
Referencias: Dhooge, S., Goetghebeur, P. & Muasya, A. M., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 3200–4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU); CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8666* (SI)]; CHL[*Barros, E. 2888* (SI)].

Zameioscirpus gaimardiodes (E. Desv.) Dhooge & Goetgh.
Sin.: *Carex gaimardioides* E. Desv.

Referencias: Dhooge, S., Goetghebeur, P. & Muasya, A. M., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 3100–4000 m.
Países: ARG(NEU, SJU); CHL(IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruthsatz, B. 9676* (US)]; CHL[*Ruthsatz, B. 8930* (GENT)].

Zameioscirpus muticus Dhooge & Goetgh., nom. nud. = **Zameioscirpus muticus** Dhooge & Goetgh.
Referencias: Dhooge, S., Goetghebeur, P. & Muasya, A. M., 2004.

Zameioscirpus muticus Dhooge & Goetgh.
Sin.: *Zameioscirpus muticus* Dhooge & Goetgh., nom. nud.
Referencias: Dhooge, S., Goetghebeur, P. & Muasya, A. M., 2003, 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 4100–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hawkes, J. G. 3903* (C, K)]; CHL[*Ruthsatz, B. 8501* (GENT)].

DIOSCOREACEAE

2 géneros, 86 especies, 54 especies endémicas.

Dioscorea L.

Número de especies: 83, 51 endémicas

Dioscorea acanthogene Rusby
Sin.: *Dioscorea paraguayensis* R. Knuth
Referencias: Brako, L., 1993a; Knuth, R. G. P., 1924.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4572* (B), *Hahn, W. J. 1594* (MO)].

Dioscorea acerifolia Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (*)].

Dioscorea acuminata Steud. = **Dioscorea variifolia** Bertero ex Colla
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea acutata R. Knuth = **Dioscorea monadelpha** (Kunth) Griseb.
Referencias: Pedralli, G. A., 2004.

Dioscorea acutifolia Phil. = **Dioscorea auriculata** Poepp.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].

Dioscorea adenocarpa Mart. ex Griseb. = **Dioscorea ovata** Vell.
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea adenocarpa Mart. ex Griseb. var. *balansae* Uline = **Dioscorea ovata** Vell.
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea adenocarpa Mart. ex Griseb. var. *chartacea* Uline ex R. Knuth = **Dioscorea ovata** Vell.
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea albinervia R. Knuth = **Dioscorea spicata** (Vell.) Pedralli
Referencias: Pedralli, G. A., 2004.

Dioscorea altissima Lam.
Sin.: *Dioscorea chondrocarpa* Griseb.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Pedralli, G. A., 2004; Téllez Valdéz, O., 1999.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 908* (HBR)].

Dioscorea amaranthoides C. Presl
Sin.: *Dioscorea amaranthoides* C. Presl var. *crumenigera* (Mart. ex Griseb.) Uline ex R. Knuth, *Dioscorea amaranthoides* C. Presl var. *elegantula* R. Knuth, *Dioscorea apäensis* Chodat & Hassl., *Dioscorea silvestris* Vell.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Xifreda, C. C., 1996a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(APA, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 5903* (A, LIL)]; PRY [*Brunner, D. R. 1900* (MO), *Jörgensen, P. 4668* (SI)].

Dioscorea amaranthoides C. Presl var. *crumenigera* (Mart. ex Griseb.) Uline ex R. Knuth = **Dioscorea amaranthoides** C. Presl
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea amaranthoides C. Presl var. *elegantula* R. Knuth = **Dioscorea amaranthoides** C. Presl
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea andina Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 20070* (CONC)].

Dioscorea antucoana Uline ex R. Knuth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Poeppig, E. F. s.n.* (B)].

Dioscorea apäensis Chodat & Hassl. = **Dioscorea amaranthoides** C. Presl
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea araucana Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].
Enredadera. Perenne. Endémica. 1500 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 5117* (CONC)].

Dioscorea arenaria auct. non Kunth = **Dioscorea gayi** Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea arenaria Kunth = **Dioscorea saxatilis** Poepp.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea aristolochiifolia Poepp.
Sin.: *Dioscorea trichoneura* Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Poeppig, E. F. 254 p.p.* (B, MO)].

Dioscorea aristolochiifolia Poepp. var. *parvifolia* (Phil.) L.E. Navas & Erba = **Dioscorea modesta** Phil.

Dioscorea aspera Humb. & Bonpl.
Sin.: *Dioscorea scabra* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *aspera* (Humb. & Bonpl.) R. Knuth, *Helmia aspera* Kunth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Téllez Valdéz, O., 1999.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Schwacke, C. A. W. 7074* (*)].

Dioscorea auriculata Poepp.
Sin.: *Dioscorea acutifolia* Phil., *Dioscorea helicifolia* Kunth
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(V, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hollermayer, A. 10* (*), *Philippi, F. s.n.* (SI)].

Dioscorea axilliflora Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Geisse, G. s.n.* (SGO)].

Dioscorea bangii R. Knuth = **Dioscorea dodecaneura** Vell.
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea beecheyi R. Knuth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Beechey, F. W. s.n.* (K)].

Dioscorea bermejensis R. Knuth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Xifreda, C. C., 1996a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fiebrig, K. A. G. 3249* (B)].

Dioscorea besseriana Kunth var. **berteroi** Uline ex R. Knuth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (*)].

Dioscorea besseriana Kunth var. **besseriana**
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(II, IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Besser, W. S. J. G. s.n.* (B)].

Dioscorea boliviensis R. Knuth = **Dioscorea glomerulata** Hauman
Referencias: Xifreda, C. C., 1982b.

Dioscorea bonariensis Ten. = **Dioscorea sinuata** Vell.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea brachybotrya Poepp. var. **brachybotrya**
Sin.: *Dioscorea buchtienii* R. Knuth, *Dioscorea novemloba* Steud. ex F. Phil., *Dioscorea scandens* Kunze ex Kunth
Referencias: Correa, M. N., 1969f; Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].
Enredadera. Perenne. Endémica. 1500–1600 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 103* (SI), *Xifreda, C. C. 2032* (SI)]; CHL[*Poeppig, E. F. 258* (B), *Solomon, J. C. 4475* (MO)].

Dioscorea brachybotrya Poepp. var. **germainii** Uline ex R. Knuth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: CHL(VI, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Germain, P. s.n.* (*)].

Dioscorea brachybotrya Poepp. var. *reticulata* (Gay) Uline ex R. Knuth = **Dioscorea reticulata** Gay
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea brachystachya Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (*)].

Dioscorea bridgesii Griseb. ex Kunth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].

Enredadera. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. 224 p.p.* (*)].

Dioscorea bryoniifolia Poepp.
Sin.: *Dioscorea hederacea* Miers ex Bertero
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Behn, F. s.n.* (SI), *Philippi, R. A. 963* (*)].

Dioscorea buchtienii R. Knuth = **Dioscorea brachybotrya** Poepp. var. **brachybotrya**

Dioscorea bulbifera auct. non L. = **Dioscorea dodecaneura** Vell.
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea burroyacensis R. Knuth = **Dioscorea glomerulata** Hauman
Referencias: Xifreda, C. C., 1982b.

[Dioscorea calcarea R. Knuth]
Notas: Nombre dudoso.

Dioscorea calystegioides Kunth = **Dioscorea laxiflora** Mart. ex Griseb.
Referencias: Pedralli, G. A., 2004.

Dioscorea campestris Griseb.
Sin.: *Dioscorea campestris* Griseb. f. *longispicata* (Hauman) R. Knuth, *Dioscorea campestris* Griseb. var. *longispicata* Hauman, *Dioscorea violacea* R. Knuth, nom. illeg., *Helmia campestris* (Griseb.) Knuth
Referencias: Angely, J. A., 1965; Hauman, L. L., 1916; Pedralli, G. A., 2004; Xifreda, C. C., 1990b; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CEN, COA, PAI); URY(ART, PAY, RNO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1698* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 44839* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 3869* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 3386* (MVFA)].

Dioscorea campestris Griseb. f. *longispicata* (Hauman) R. Knuth = **Dioscorea campestris** Griseb.
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea campestris Griseb. var. *longispicata* Hauman = **Dioscorea campestris** Griseb.
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea castilloniana Hauman ex Castillón
Referencias: Castillón, L., 1927; Xifreda, C. C., 1996a.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 118* (SI)].

Dioscorea catharinensis R. Knuth = **Dioscorea olfersiana** Klotzsch ex Griseb.
Referencias: Pedralli, G. A., 2004.

Dioscorea ceratandra R. Knuth
Sin.: *Dioscorea congestiflora* R. Knuth, *Dioscorea martiana* Griseb. var. *caudata* R. Knuth, *Dioscorea polygonoides* auct. non Willd., *Dioscorea quirogae* R. Knuth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Xifreda, C. C., 1982a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 937* (SI), *Quiroga, H. 263* (BA)]; BRA[*Klein, R. M. 7265* (FLOR, HBR)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4691* (B)].

Dioscorea chiquiacensis R. Knuth = **Dioscorea hieronymi** R. Knuth
Referencias: Xifreda, C. C., 1982b.

Dioscorea chondrocarpa Griseb. = **Dioscorea altissima** Lam.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Téllez Valdéz, O., 1999.

Dioscorea cienegensis R. Knuth
Sin.: *Dioscorea monadelpha* (Kunth) Pax var. *opaca* Hicken
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Xifreda, C. C., 1989, 1990b.
Enredadera. Perenne. Endémica. 1500–1600 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 10680* (SI), *Vattuone, I. C. 19* (SI)].

Dioscorea cinnamomifolia Hook.
Referencias: Pedralli, G. A., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. 20711* (B)]; BRA[*Klein, R. M. 6106* (HBR)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o material de referencia (Pedralli, 2004).

Dioscorea cissophylla Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1584* (CONC)].

Dioscorea commutata R. Knuth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 8400* (B)].

Dioscorea concepcionis Chodat & Hassl. = **Dioscorea multiflora** Mart. ex Griseb.
Referencias: Xifreda, C. C., 1982b.

Dioscorea congestiflora R. Knuth = **Dioscorea ceratandra** R. Knuth
Referencias: Xifreda, C. C., 1982a.

Dioscorea coronata Hauman
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Hauman, L. L., 1916; Knuth, R. G. P., 1924.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR); PRY(APY, PHA); URY(CLA, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 5538* (CTES, SI)]; BRA[*Hunziker, A. T. 2615* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 4873* (FCQ, MO)]; URY[*Berro, M. B. 5569* (MVFA)].

Dioscorea coronata auct. non Hauman = **Dioscorea demourae** R. Knuth
Referencias: Xifreda, C. C., 1984c.

Dioscorea crenata Kunth, nom. nud. = **Dioscorea sinuata** Vell.
Referencias: Pedralli, G. A., 2004.

Dioscorea crenata Vell. = **Dioscorea sinuata** Vell.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea curitybensis R. Knuth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.
Enredadera. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 1364a* (B)].

Dioscorea cylindrostachya I.M. Johnst. = **Dioscorea fastigiata** Gay
Referencias: Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].

Dioscorea demourae R. Knuth
Sin.: *Dioscorea coronata* auct. non Hauman
Referencias: Pedralli, G. A., 2004; Xifreda, C. C., 1984c.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19719* (SI), *Tressens, S. G. 6443* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 49567* (SI)].

Dioscorea discolor Kunth = **Dioscorea dodecaneura** Vell.
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea dodecaneura Vell.
Sin.: *Dioscorea bangii* R. Knuth, *Dioscorea bulbifera* auct. non L., *Dioscorea discolor* Kunth, *Dioscorea huallagensis* R. Knuth, *Dioscorea illustrata* Linden & André, *Dioscorea racemosa* Rusby
Referencias: Angely, J. A., 1965; Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Basualdo, I. Z., Soria Rey, N., Keel, S. & Rivarola, N., 1997b; Knuth, R. G. P., 1924; Pedralli, G. A., 2004; Xifreda, C. C., 1990b, 1996a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAU, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5037* (SI)]; BRA[*Marchiori, P. 10* (HBR)]; PRY[*Woolston, A. L. 833* (SI)].

Dioscorea entomophila Hauman
Sin.: *Dioscorea entomophila* Hauman var. *tomentosa* Hauman
Referencias: Hauman, L. L., 1916; Knuth, R. G. P., 1924.
Enredadera. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 16094* (LIL)].

Dioscorea entomophila Hauman var. *tomentosa* Hauman = **Dioscorea entomophila** Hauman
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea fastigiata Gay
Sin.: *Dioscorea cylindrostachya* I.M. Johnst., *Dioscorea thinophila* Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1881* (CONC)].

Dioscorea fracta Griseb. = **Dioscorea furcata** Griseb.
Referencias: Xifreda, C. C., 1982a, b.

Dioscorea fractiflexa R. Knuth
Referencias: Angely, J. A., 1965; Knuth, R. G. P., 1924.
Enredadera. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 14339* (B)].

Dioscorea friesii R. Knuth = **Dioscorea subhastata** Vell.
Referencias: Xifreda, C. C. & Kirizawa, M., 2003.

Dioscorea furcata Griseb.
Sin.: *Dioscorea fracta* Griseb., *Helmia fracta* (Griseb.) Knuth, *Helmia furcata* (Griseb.) Kunth
Referencias: Angely, J. A., 1965; Knuth, R. G. P., 1924; Xifreda, C. C., 1982a, b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(sin localidad); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 31389* (BAB), *Xifreda, C. C. 1194* (SI)]; BRA[*Sellow, F. s.n.* (B)]; PRY[*Balansa, B. 626* (G)]; URY[*Osten, C. 3355* (MVM)].

Dioscorea gayi Phil.
Sin.: *Dioscorea arenaria* auct. non Kunth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. 480* (SGO)].

Dioscorea geissei Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Geisse, G. s.n.* (SGO)].

Dioscorea gibertii R. Knuth = **Dioscorea microbotrya** Griseb.
Referencias: Xifreda, C. C., 1982b.

Dioscorea glandulosa auct. non Griseb. = **Dioscorea glomerulata** Hauman
Referencias: Hauman, L. L., 1916.

Dioscorea glandulosa Klotzsch ex Kunth
Sin.: *Dioscorea paranensis* R. Knuth, *Dioscorea piperifolia* Humb. & Bonpl. var. *glandulosa* (Klotzsch ex Kunth) Griseb.
Referencias: Hauman, L. L., 1916; Knuth, R. G. P., 1924.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(CAA, CON, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5683* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 42707* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 12002* (G)].

Dioscorea glomerulata Hauman
Sin.: *Dioscorea boliviensis* R. Knuth, *Dioscorea burroyacensis* R. Knuth, *Dioscorea glandulosa* auct. non Griseb., *Dioscorea lorentzii* R. Knuth, *Dioscorea lusnachtiana* auct. non Kunth, *Dioscorea nodosa* R. Knuth
Referencias: Hauman, L. L., 1916; Knuth, R. G. P., 1924; Xifreda, C. C., 1982b, 1990b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 1200–2600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 20172* (LP), *Nicora, E. G. 9057* (SI)].

Dioscorea gouanioides (Chodat & Hassl.) R. Knuth
Sin.: *Dioscorea multiflora* Mart. ex Griseb. var. *gouanioides* Chodat & Hassl.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8298* (B, MO)].

Dioscorea gracilis Hook. ex Poepp.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (SI)].

Dioscorea grandiflora Mart. ex Griseb.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6185* (*)].
Notas: Pedralli (2004: 47) considera a esta especie como sinónimo de *Dioscorea piperifolia* Humb. & Bonpl.

[Dioscorea grisebachii Kunth]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Dioscorea guaranitica Chodat & Hassl. = **Dioscorea subhastata** Vell.
Referencias: Xifreda, C. C. & Kirizawa, M., 2003.

Dioscorea guaranitica Chodat & Hassl. f. *membranacea* Chodat & Hassl. = **Dioscorea monadelpha** (Kunth) Griseb.
Referencias: Pedralli, G. A., 2004.

Dioscorea guaranitica Chodat & Hassl. f. *subcoriacea* Chodat & Hassl. = **Dioscorea subhastata** Vell.
Referencias: Xifreda, C. C. & Kirizawa, M., 2003.

Dioscorea guaranitica Chodat & Hassl. var. *balansae* Pellegr. = **Dioscorea subhastata** Vell.
Referencias: Xifreda, C. C. & Kirizawa, M., 2003; Xifreda, C. C., 1989.

Dioscorea hassleriana Chodat & Hassl.
Sin.: *Dioscorea hassleriana* Chodat & Hassl. var. *triloba* Chodat & Hassl., *Dioscorea hastata* Vell. var. *hassleriana* (Chodat) R. Knuth, *Dioscorea platystemon* Hauman var. *hassleriana* (Chodat) R. Knuth
Referencias: Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Xifreda, C. C., 1983, 1990b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bartlett, H. H. 20363* (SI), *Cabrera, A. L. 19063* (LP)]; PRY[*Arenas, P. 1646* (BACP), *Soria, N. 2079* (FCQ)].

Dioscorea hassleriana Chodat & Hassl. var. *triloba* Chodat & Hassl. = **Dioscorea hassleriana** Chodat & Hassl.
Referencias: Xifreda, C. C., 1983.

[Dioscorea hastata Vell. var. balansae Uline ex R. Knuth]
Notas: Nombre dudoso.

Dioscorea hastata Vell. var. *hassleriana* (Chodat) R. Knuth = **Dioscorea hassleriana** Chodat & Hassl.
Referencias: Xifreda, C. C., 1983.

[Dioscorea hastata Vell. var. hastata]
Notas: Nombre dudoso.

Dioscorea haumanii Xifreda
Referencias: Xifreda, C. C., 1982a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 13781* (SI), *Hunziker, A. T. 2023* (CORD, LIL)]; PRY[*Hahn, W. J. 1545* (MO)].

Dioscorea hederacea Miers ex Bertero = **Dioscorea bryoniifolia** Poepp.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea helicifolia auct. non Kunth = **Dioscorea reticulata** Gay
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea helicifolia Kunth = **Dioscorea auriculata** Poepp.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea heterophylla Poepp. = **Dioscorea saxatilis** Poepp.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea heterophylla Poepp. var. *longifolia* (Phil.) L.E. Navas & Erba = **Dioscorea saxatilis** Poepp.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea hieronymi R. Knuth
Sin.: *Dioscorea chiquiacensis* R. Knuth, *Dioscorea megalantha* Griseb. var. *subsessilis* Hauman, *Dioscorea tafiensis* R. Knuth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Xifreda, C. C., 1982b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 500–2400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada 4670* (SI), *Schreiter, R. 2766* (LIL, MVM)].

Dioscorea huallagensis R. Knuth = **Dioscorea dodecaneura** Vell.
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea humifusa Poepp. var. **gracilis** (Hook. & Arn.) L.E. Navas
Referencias: Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(V, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Rodríguez Ríos, R. 704* (CONC)].

Dioscorea humifusa Poepp. var. **humifusa**
Sin.: *Dioscorea nigrescens* Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(IV, V, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Poeppig, E. F. 78* (G), *Werdermann, E. 19* (SI)].

Dioscorea humilis Bertero ex Colla = **Epipetrum humile** (Bertero ex Colla) Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea illustrata Linden & André = **Dioscorea dodecaneura** Vell.
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

[Dioscorea ionophylla Uline ex R. Knuth]
Notas: Nombre dudoso.

Dioscorea lagoasanta Uline ex R. Knuth = **Dioscorea subhastata** Vell.
Referencias: Xifreda, C. C. & Kirizawa, M., 2003; Xifreda, C. C., 1989.

Dioscorea lagoasanta Uline ex R. Knuth var. *rotiflora* Uline = **Dioscorea subhastata** Vell.
Referencias: Xifreda, C. C., 1989.

Dioscorea laxiflora Mart. ex Griseb.
Sin.: *Dioscorea calystegioides* Kunth, *Dioscorea laxiflora* Mart. ex Griseb. var. *calystegioides* (Kunth) Uline ex R. Knuth, *Dioscorea laxiflora* Mart. ex Griseb. var. *cincinnata* Uline ex R. Knuth
Referencias: Pedralli, G. A., 2004.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 7356* (FLOR, HBR)].

Dioscorea laxiflora Mart. ex Griseb. var. *calystegioides* (Kunth) Uline ex R. Knuth = **Dioscorea laxiflora** Mart. ex Griseb.
Referencias: Pedralli, G. A., 2004.

Dioscorea laxiflora Mart. ex Griseb. var. *cincinnata* Uline ex R. Knuth = **Dioscorea laxiflora** Mart. ex Griseb.
Referencias: Pedralli, G. A., 2004.

Dioscorea lilloi (Hauman) Hauman = **Dioscorea megalantha** Griseb.
Referencias: Xifreda, C. C., 1982b.

Dioscorea linearis Bertero ex Colla = **Dioscorea saxatilis** Poepp.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea litoralis Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: CHL(V, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Junge, C. 1048* (CONC)].

Dioscorea longifolia Phil. = **Dioscorea saxatilis** Poepp.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea longipes Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].
Enredadera. Perenne. Endémica. 100–200 m.
Países: CHL(VII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bliss 533* (CONC)].

Dioscorea lorentzii R. Knuth = **Dioscorea glomerulata** Hauman
Referencias: Xifreda, C. C., 1982b.

[Dioscorea lundii Uline ex R. Knuth]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Dioscorea lusnachtiana auct. non Kunth = **Dioscorea glomerulata** Hauman
Referencias: Hauman, L. L., 1916.

Dioscorea macrantha Uline ex R. Knuth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 1303* (B)].

Dioscorea macrocapsa R. Knuth = **Dioscorea multiflora** Mart. ex Griseb.
Referencias: Xifreda, C. C., 1982b.

Dioscorea martiana Griseb. var. *caudata* R. Knuth = **Dioscorea ceratandra** R. Knuth
Referencias: Xifreda, C. C., 1982a.

[Dioscorea martiana Griseb. var. pedicellata R. Knuth]
Notas: Nombre dudoso.

Dioscorea megalantha Griseb.
Sin.: *Dioscorea lilloi* (Hauman) Hauman, *Dioscorea megalantha* Griseb. var. *lilloi* Hauman, *Dioscorea megalantha* Griseb. var. *typica* emend. Hauman, nom. inval.
Referencias: Hauman, L. L., 1916; Knuth, R. G. P., 1924; Xifreda, C. C., 1982b.
Enredadera. Perenne. Endémica. 500–2500 m.
Países: ARG(CAT, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Calderón 1464* (SI), *Hunziker, A. T. 21963* (CORD)].

Dioscorea megalantha Griseb. var. *lilloi* Hauman = **Dioscorea megalantha** Griseb.
Referencias: Xifreda, C. C., 1982b.

Dioscorea megalantha Griseb. var. *subsessilis* Hauman = **Dioscorea hieronymi** R. Knuth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Xifreda, C. C., 1982b.

Dioscorea megalantha Griseb. var. *typica* emend. Hauman, nom. inval. = **Dioscorea megalantha** Griseb.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Xifreda, C. C., 1982b.

Dioscorea microbotrya Griseb.
Sin.: *Dioscorea gibertii* R. Knuth, *Dioscorea microbotrya* Griseb. var. *grandifolia* Hauman, *Dioscorea tweediei* R. Knuth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Xifreda, C. C., 1982b, 1990b.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR); URY(PAY, RNO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Toledo, J. F. 1328* (SI), *Xifreda, C. C. 625* (SI)]; BRA[*Gibert, J. E. 1* (K)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Dioscorea microbotrya Griseb. var. *grandifolia* Hauman = **Dioscorea microbotrya** Griseb.
Referencias: Xifreda, C. C., 1982b.

Dioscorea microcephala Uline
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(RGS). 0–600 m.
Ejemplares de referencia: BRA[*Lindman, C. A. M. 1289* (B)].

Dioscorea microphylla Steud. = **Dioscorea variifolia** Bertero ex Colla
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea modesta Phil.
Sin.: *Dioscorea aristolochiifolia* Poepp. var. *parvifolia* (Phil.) L.E. Navas & Erba, *Dioscorea parvifolia* Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: CHL(V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Volckmann, G. 63* (*)].

[Dioscorea mollis Kunth var. pachycarpa (Kunth) Uline ex R. Knuth]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Dioscorea monadelpha (Kunth) Pax, comb. superfl. = **Dioscorea monadelpha** (Kunth) Griseb.
Referencias: Xifreda, C. C., 1989.

Dioscorea monadelpha (Kunth) Griseb.
Sin.: *Dioscorea acutata* R. Knuth, *Dioscorea guaranitica* Chodat & Hassl. f. *membranacea* Chodat & Hassl., *Dioscorea monadelpha* (Kunth) Pax, comb. superfl., *Dioscorea praetervisa* R. Knuth, *Dioscorea similis* R. Knuth, *Helmia monadelpha* Kunth
Referencias: Angely, J. A., 1965; Pedralli, G. A., 2004; Xifreda, C. C. & Kirizawa, M., 2003; Xifreda, C. C., 1989.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 3256* (B, S), *Kuniyoshi, Y. S. 4757* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 1709* (MVFA)].
Notas: Cita dudosa para Argentina y Paraguay (Pedralli, 2004).

Dioscorea monadelpha (Kunth) Pax var. *opaca* Hicken = **Dioscorea cienegensis** R. Knuth
Referencias: Xifreda, C. C., 1989.

Dioscorea monandra Hauman
Referencias: Hauman, L. L., 1916; Knuth, R. G. P., 1924; Xifreda, C. C., 1996a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 2000–2200 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 584* (LIL), *Hunziker, A. T. 10307* (SI)].

Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb.
Sin.: *Dioscorea concepcionis* Chodat & Hassl., *Dioscorea macrocapsa* R. Knuth, *Dioscorea multiflora* Mart. ex Griseb. var. *asuncionensis* R. Knuth, *Dioscorea multiflora* Mart. ex Griseb. var. *concepcionis* (Chodat & Hassl.) Pellegr., *Dioscorea multiflora* Mart. ex Griseb. var. *loefgrenii* R. Knuth, *Dioscorea niederleinii* R. Knuth, *Helmia multiflora* (Mart. ex Griseb.) Kunth
Referencias: Angely, J. A., 1965; Hauman, L. L., 1916; Knuth, R. G. P., 1924; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Xifreda, C. C., 1982b, 1990a, b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI); URY(ART, SAO).

Ejemplares de referencia: ARG[*Xifreda, C. C. 362* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 4146* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4667* (BAF, SI), *Soria, N. 3979* (FCQ)]; URY[*Del Puerto, O. 15336* (MVFA)].

Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb. var. *asuncionensis* R. Knuth = **Dioscorea multiflora** Mart. ex Griseb.
Referencias: Xifreda, C. C., 1982b.

Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb. var. *concepcionis* (Chodat & Hassl.) Pellegr. = **Dioscorea multiflora** Mart. ex Griseb.
Referencias: Xifreda, C. C., 1982b.

Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb. var. *gouanioides* Chodat & Hassl. = **Dioscorea gouanioides** (Chodat & Hassl.) R. Knuth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb. var. *loefgrenii* R. Knuth = **Dioscorea multiflora** Mart. ex Griseb.
Referencias: Xifreda, C. C., 1982b.

Dioscorea multispicata R. Knuth
Referencias: Castillón, L., 1927; Xifreda, C. C., 1990b, 1996a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Maldonado, X. X. 696* (SI), *Xifreda, C. C. 705* (SI)]; PRY[*Bacigalupo, N. M. 1144* (SI)].

Dioscorea nana Poepp.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].
Enredadera. Perenne. Endémica. 100–1300 m.
Países: CHL(V, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 2128* (SI)].

Dioscorea nervosa Phil. = **Dioscorea reticulata** Gay
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea niederleinii R. Knuth = **Dioscorea multiflora** Mart. ex Griseb.
Referencias: Xifreda, C. C., 1982b.

Dioscorea nigrescens Phil. = **Dioscorea humifusa** Poepp. var. **humifusa**
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea nitida R. Knuth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Téllez Valdéz, O., 1998.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5149* (B)].

Dioscorea nodosa R. Knuth = **Dioscorea glomerulata** Hauman
Referencias: Xifreda, C. C., 1982b.

Dioscorea novemloba Steud. ex F. Phil. = **Dioscorea brachybotrya** Poepp. var. **brachybotrya**
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea obtusifolia Hook. & Arn. var. **obtusifolia**
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. 615* (*)].

Dioscorea obtusifolia Hook. & Arn. var. **philippii** Uline ex R. Knuth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (*)].

Dioscorea olfersiana Klotzsch ex Griseb.
Sin.: *Dioscorea catharinensis* R. Knuth
Referencias: Brako, L., 1993a; Knuth, R. G. P., 1924.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 12305* (HBR)].

Dioscorea oligophylla Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Dioscorea ovata Vell.
Sin.: *Dioscorea adenocarpa* Mart. ex Griseb., *Dioscorea adenocarpa* Mart. ex Griseb. var. *balansae* Uline, *Dioscorea adenocarpa* Mart. ex Griseb. var. *chartacea* Uline ex R. Knuth, *Dioscorea puncticulata* R. Knuth, *Dioscorea trachyandra* Griseb., *Helmia adenocarpa* (Mart. ex Griseb.) Kunth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Pedralli, G. A., 2004; Xifreda, C. C., 1996a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS); PRY(APA, CEN, CON, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 7744* (HBR)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 702* (P)].
Notas: Cita dudosa para Argentina (Xifreda, 1996a; Pedralli, 2004).

Dioscorea pallidinervia R. Knuth = **Dioscorea spicata** (Vell.) Pedralli
Referencias: Pedralli, G. A., 2004.

Dioscorea paraguayensis R. Knuth = **Dioscorea acanthogene** Rusby
Referencias: Brako, L., 1993a.

Dioscorea paranensis auct. non R. Knuth = **Dioscorea pilcomayensis** Hauman
Referencias: Xifreda, C. C., 1983.

Dioscorea paranensis R. Knuth = **Dioscorea glandulosa** Klotzsch ex Kunth
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea parviflora Phil. = **Dioscorea saxatilis** Poepp.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea parvifolia Phil. = **Dioscorea modesta** Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea paupera Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (*)].

Dioscorea pedatifida Phil. = **Dioscorea reticulata** Gay
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea pedicellata Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: CHL(IV, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (SI), *Philippi, R. A. s.n.* (G)].

Dioscorea pedicellata Morong, nom. illeg. = **Dioscorea pilcomayensis** Hauman
Referencias: Xifreda, C. C., 1983.

Dioscorea pellegrinii Hassl. ex R. Knuth, nom. superfl. = **Dioscorea pilcomayensis** Hauman
Referencias: Xifreda, C. C., 1983.

Dioscorea pencana Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica. 200–300 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Junge, C. 896* (CONC)].

[Dioscorea philippiana Uline ex R. Knuth]
Notas: Nombre dudoso.

Dioscorea pilcomayensis Hauman
Sin.: *Dioscorea paranensis* auct. non R. Knuth, *Dioscorea pedicellata* Morong, nom. illeg., *Dioscorea pellegrinii* Hassl. ex R. Knuth, nom. superfl., *Dioscorea tamifolia* Chodat & Hassl., nom. illeg.
Referencias: Hauman, L. L., 1916; Xifreda, C. C., 1983, 1996a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL); PRY(APY, AMA, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hauman, L. L. 3* (BA)]; PRY[*Krapovickas, A. 14128* (SI)].

Dioscorea piperifolia Humb. & Bonpl.
Referencias: Pedralli, G. A., 2004.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 16575* (HBR)].

Dioscorea piperifolia Humb. & Bonpl. var. *glandulosa* (Klotzsch ex Kunth) Griseb. = **Dioscorea glandulosa** Klotzsch ex Kunth
Referencias: Hauman, L. L., 1916.

Dioscorea piratinyensis R. Knuth = **Dioscorea subhastata** Vell.
Referencias: Xifreda, C. C. & Kirizawa, M., 2003.

Dioscorea platystemon Hauman var. *hassleriana* (Chodat) R. Knuth = **Dioscorea hassleriana** Chodat & Hassl.
Referencias: Xifreda, C. C., 1983.

Dioscorea polygonoides auct. non Willd. = **Dioscorea ceratandra** R. Knuth
Referencias: Xifreda, C. C., 1982a.

Dioscorea praetervisa R. Knuth = **Dioscorea monadelpha** (Kunth) Griseb.
Referencias: Pedralli, G. A., 2004.

Dioscorea puncticulata R. Knuth = **Dioscorea ovata** Vell.
Referencias: Pedralli, G. A., 2004.

Dioscorea pusilla Hook. = **Epipetrum humile** (Bertero ex Colla) Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea quirogae R. Knuth = **Dioscorea ceratandra** R. Knuth
Referencias: Xifreda, C. C., 1982a.

Dioscorea racemosa Rusby = **Dioscorea dodecaneura** Vell.
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea reticulata Gay
Sin.: *Dioscorea brachybotrya* Poepp. var. *reticulata* (Gay) Uline ex R. Knuth, *Dioscorea helicifolia* auct. non Kunth, *Dioscorea nervosa* Phil., *Dioscorea pedatifida* Phil., *Dioscorea reticulata* Gay var. *nervosa* (Phil.) L.E. Navas & Erba, *Dioscorea reticulata* Gay var. *scabriuscula* Speg., *Dioscorea thermarum* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Xifreda, C. C., 1996a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 200–2300 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sanso, A. M. 34* (SI), *Xifreda, C. C. 2013* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 994867* (CONC, SGO), *Werdermann, E. 356* (SI)].

Dioscorea reticulata Gay var. *nervosa* (Phil.) L.E. Navas & Erba = **Dioscorea reticulata** Gay
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea reticulata Gay var. *scabriuscula* Speg. = **Dioscorea reticulata** Gay
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea saxatilis Poepp.
Sin.: *Dioscorea arenaria* Kunth, *Dioscorea heterophylla* Poepp., *Dioscorea heterophylla* Poepp. var. *longifolia* (Phil.) L.E. Navas & Erba, *Dioscorea linearis* Bertero ex Colla, *Dioscorea longifolia* Phil., *Dioscorea parviflora* Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–1400 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Poeppig, E. F. 253* (B)].

[Dioscorea scabra Humb. & Bonpl.]
Referencias: Téllez Valdéz, O., 1998.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Dioscorea scabra Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *aspera* (Humb. & Bonpl.) R. Knuth = **Dioscorea aspera** Humb. & Bonpl.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea scandens Kunze ex Kunth = **Dioscorea brachybotrya** Poepp. var. **brachybotrya**
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea silvestris Vell. = **Dioscorea amaranthoides** C. Presl
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea similis R. Knuth = **Dioscorea monadelpha** (Kunth) Griseb.
Referencias: Xifreda, C. C. & Kirizawa, M., 2003.

Dioscorea sinuata Vell.
Sin.: *Dioscorea bonariensis* Ten., *Dioscorea crenata* Kunth, nom. nud., *Dioscorea crenata* Vell., *Dioscorea sinuata* Vell. var. *bonariensis* (Ten.) Hauman, *Dioscorea variifolia* Kunze, nom. nud.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Añón, D. S. C., 1969[1968]; Knuth, R. G. P., 1924; Pedralli, G. A., 2004; Xifreda, C. C., 1990b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CEN, COA, GUA, PHA); URY(ART, CLA, COL, FLA, RIV, RNO, SAO, SJO, SOR.).
Ejemplares de referencia: ARG[*Xifreda, C. C. 339* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 35815* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4253* (SI)]; URY[*Felippone, F. 50* (SI)].

Dioscorea sinuata Vell. var. *bonariensis* (Ten.) Hauman = **Dioscorea sinuata** Vell.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

[Dioscorea skottsbergii R. Knuth]
Notas: Nombre dudoso.

Dioscorea spectabilis R. Knuth
Referencias: Xifreda, C. C., 1984c, 1996a.
Enredadera. Perenne. Nativa.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Legname, P. R. 4490* (LIL)].

Dioscorea spicata (Vell.) Pedralli
Sin.: *Dioscorea albinervia* R. Knuth, *Dioscorea pallidinervia* R. Knuth, *Smilax spicata* Vell.
Referencias: Pedralli, G. A., 2004.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Negrelle, R. 13-a* (UPCB)].

Dioscorea stenocolpus Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Landbeck s.n.* (*)].

Dioscorea stenopetala Hauman
Sin.: *Dioscorea tucumanensis* R. Knuth
Referencias: Hauman, L. L., 1916; Knuth, R. G. P., 1924; Xifreda, C. C., 1982b, 1990b.
Enredadera. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 3136* (BA, LIL), *Xifreda, C. C. 636* (SI)].

Dioscorea subhastata Vell.
Sin.: *Dioscorea friesii* R. Knuth, *Dioscorea guaranitica* Chodat & Hassl., *Dioscorea guaranitica* Chodat & Hassl. f. *subcoriacea* Chodat & Hassl., *Dioscorea guaranitica* Chodat & Hassl. var. *balansae* Pellegr., *Dioscorea lagoasanta* Uline ex R. Knuth, *Dioscorea lagoasanta* Uline ex R. Knuth var. *rotiflora* Uline, *Dioscorea piratinyensis* R. Knuth
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Pedralli, G. A., 2004; Xifreda, C. C. & Kirizawa, M., 2003; Xifreda, C. C., 1989.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 54* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 42704* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 231* (SI)].

Dioscorea tafiensis R. Knuth = **Dioscorea hieronymi** R. Knuth
Referencias: Xifreda, C. C., 1982b.

Dioscorea tamifolia Chodat & Hassl., nom. illeg. = **Dioscorea pilcomayensis** Hauman
Referencias: Xifreda, C. C., 1983.

Dioscorea tenella Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].
Enredadera. Perenne. Endémica. 400–700 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 3582* (CONC)].

Dioscorea tenuis R. Knuth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Buchtien, O. s.n.* (*)].

Dioscorea thermarum Phil. = **Dioscorea reticulata** Gay
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Dioscorea thinophila Phil. = **Dioscorea fastigiata** Gay
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea toldosensis R. Knuth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Xifreda, C. C., 1996a.
Enredadera. Perenne. Nativa.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fiebrig, K. A. G. 2255* (B)].

Dioscorea trachyandra Griseb. = **Dioscorea ovata** Vell.
Referencias: Pedralli, G. A., 2004.

Dioscorea trichoneura Phil. = **Dioscorea aristolochiifolia** Poepp.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].

Dioscorea trifurcata Hauman
Referencias: Hauman, L. L., 1916; Knuth, R. G. P., 1924.
Enredadera. Perenne. Endémica. 1200 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 1912* (LIL)].

Dioscorea tucumanensis R. Knuth = **Dioscorea stenopetala** Hauman
Referencias: Xifreda, C. C., 1982b.

Dioscorea tweediei R. Knuth = **Dioscorea microbotrya** Griseb.
Referencias: Xifreda, C. C., 1982b.

Dioscorea uliginosa Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Dioscorea valdiviensis R. Knuth
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Buchtien, O. s.n.* (B)].

Dioscorea variifolia Kunze, nom. nud. = **Dioscorea sinuata** Vell.
Referencias: Pedralli, G. A., 2004.

Dioscorea variifolia Bertero ex Colla
Sin.: *Dioscorea acuminata* Steud., *Dioscorea microphylla* Steud.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 44* (CONC)].

Dioscorea violacea R. Knuth, nom. illeg. = **Dioscorea campestris** Griseb.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Dioscorea volckmannii Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Navas Bustamante, L. E. & Erba, G., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Endémica. 2300–3000 m.
Países: CHL(VI, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1047* (CONC)].

Epipetrum Phil.

Número de especies: 3 endémicas

Epipetrum bilobum Phil.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 400–500 m.
Países: CHL(II, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 866* (SI), *Worth, C. R. 16116* (MO)].

Epipetrum humile (Bertero ex Colla) Phil.
Sin.: *Dioscorea humilis* Bertero ex Colla, *Dioscorea pusilla* Hook.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(V, VI, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bridges, T. C. 166* (*), *Philippi, F. s.n.* (SI)].

Epipetrum polyanthes Reiche
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Reiche, C. F. s.n.* (*)].

Helmia adenocarpa (Mart. ex Griseb.) Kunth = **Dioscorea ovata** Vell.
Referencias: Xifreda, C. C., 1996a.

Helmia aspera Kunth = **Dioscorea aspera** Humb. & Bonpl.

Helmia campestris (Griseb.) Knuth = **Dioscorea campestris** Griseb.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924.

Helmia fracta (Griseb.) Knuth = **Dioscorea furcata** Griseb.
Referencias: Xifreda, C. C., 1982a, b.

Helmia furcata (Griseb.) Kunth = **Dioscorea furcata** Griseb.
Referencias: Knuth, R. G. P., 1924; Xifreda, C. C., 1982a, b.

Helmia monadelpha Kunth = **Dioscorea monadelpha** (Kunth) Griseb.

Referencias: Xifreda, C. C., 1989.

Helmia multiflora (Mart. ex Griseb.) Kunth = **Dioscorea multiflora** Mart. ex Griseb.
Referencias: Xifreda, C. C., 1982b.

Smilax spicata Vell. = **Dioscorea spicata** (Vell.) Pedralli
Referencias: Pedralli, G. A., 2004.

ERIOCAULACEAE

Autor: Giulietti, A. M.

5 géneros, 40 especies, 19 especies endémicas.

Actinocephalus (Körn.) Sano

Número de especies: 1

Actinocephalus polyanthus (Bong.) Sano
Sin.: *Dupatya polyanthus* (Bong.) Kuntze, *Eriocaulon polyanthum* Bong., *Paepalanthus polyanthus* (Bong.) Kunth, *Paepalanthus polyanthus* (Bong.) Kunth f. *villosus* (Beauverd) Moldenke & L.B. Sm., *Paepalanthus polyanthus* (Bong.) Kunth var. *villosus* Beauverd
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976; Reitz, R., 1956; Sano, P. T., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 900–2300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 5454* (SI)].

Dupatya bryoides (Riedel ex Bong.) Kuntze = **Paepalanthus bryoides** (Riedel ex Bong.) Kunth
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Dupatya caulescens (Poir.) Kuntze = **Syngonanthus caulescens** (Poir.) Ruhland var. **caulescens**
Referencias: Abbiatti, D., 1946a; Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Dupatya chrysantha (Bong.) Kuntze = **Syngonanthus chrysanthus** (Bong.) Ruhland var. **chrysanthus**
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Dupatya fischeriana (Bong.) Kuntze = **Syngonanthus fischerianus** (Bong.) Ruhland
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Dupatya flavescens (Bong.) Kuntze = **Leiothrix flavescens** (Bong.) Ruhland var. **flavescens**
Referencias: Giulietti, A. M. & Hensold, N., 1991.

Dupatya gracilis (Bong.) Kuntze = **Syngonanthus gracilis** (Bong.) Ruhland
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Dupatya helminthorrhiza (Mart. ex Körn.) Kuntze = **Syngonanthus helminthorrhizus** (Mart. ex Körn.) Ruhland
Referencias: Ruhland, W. O. E., 1903.

Dupatya ligulata Vell. = **Eriocaulon ligulatum** (Vell.) L.B. Sm.
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Dupatya nitens (Bong.) Kuntze = **Syngonanthus nitens** (Bong.) Ruhland
Referencias: Ruhland, W. O. E., 1903.

Dupatya planifolia (Bong.) Kuntze = **Paepalanthus planifolius** (Bong.) Körn.
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976; Tissot-Squalli H., M. L., 1997a.

Dupatya polyanthus (Bong.) Kuntze = **Actinocephalus polyanthus** (Bong.) Sano
Referencias: Sano, P. T., 2004.

Eriocaulon L.

Número de especies: 17, 11 endémicas

Eriocaulon anthemidiflorum Bong. = **Syngonanthus anthemidiflorus** (Bong.) Ruhland
Referencias: Castellanos, A., 1945c.

Eriocaulon arechavaletae Herter
Sin.: *Eriocaulon latifolium* Arechav., hom. illeg.
Referencias: Castellanos, A., 1945c; Moldenke, H. N., 1946, 1949b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS); URY(CAS, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fiorito, M. s.n.* (SI)]; URY[*Arechavaleta, J. 19* (MVM)].

Eriocaulon argentinum A. Cast. = **Eriocaulon leptophyllum** Kunth
Referencias: Abbiatti, D., 1946b.

Eriocaulon bryoides Riedel ex Bong. = **Paepalanthus bryoides** (Riedel ex Bong.) Kunth
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Eriocaulon caaguazuensis Ruhland
Referencias: Moldenke, H. N., 1970b; Ruhland, W. O. E., 1906.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAU, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8885* (B, K, NY)].

Eriocaulon candidum Moldenke
Referencias: Moldenke, H. N., 1950b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Schulz, A. G. 700* (NY)].

Eriocaulon caulescens Poir. = **Syngonanthus caulescens** (Poir.) Ruhland var. **caulescens**
Referencias: Castellanos, A., 1945c; Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Eriocaulon chrysanthum Bong. = **Syngonanthus chrysanthus** (Bong.) Ruhland var. **chrysanthus**
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Eriocaulon crassiscapum Bong.
Referencias: Abbiatti, D., 1946a; Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976; Moldenke, H. N., 1973a; Molfino, J. F., 1922c; Ruhland, W. O. E., 1903.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Muniez, A. A. s.n.* (BA)]; BRA[*Rambo, B. 3000* (LIL)].

Eriocaulon deslandesii Silveira = **Eriocaulon magnificum** Ruhland
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Eriocaulon dictyophyllum Körn.
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976; Reitz, R., 1956.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1191* (SI)].

Eriocaulon elichrysoides Bong.
Referencias: Moldenke, H. N., 1969a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11348* (BM, G, K, N)].

Eriocaulon elichrysoides auct. non Bong. = **Eriocaulon ligulatum** (Vell.) L.B. Sm.
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Eriocaulon fischerianum Bong. = **Syngonanthus fischerianus** (Bong.) Ruhland
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Eriocaulon flavescens Bong. = **Leiothrix flavescens** (Bong.) Ruhland var. **flavescens**
Referencias: Giulietti, A. M. & Hensold, N., 1991.

Eriocaulon gomphrenoides Kunth
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 7683* (HBR, R, US)].

Eriocaulon gracile Bong. = **Syngonanthus gracilis** (Bong.) Ruhland
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Eriocaulon kunthii Körn. = **Eriocaulon ligulatum** (Vell.) L.B. Sm.
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Eriocaulon latifolium Arechav., hom. illeg. = **Eriocaulon arechavaletae** Herter
Referencias: Castellanos, A., 1945c.

Eriocaulon leptophyllum Kunth
Sin.: *Eriocaulon argentinum* A. Cast., *Syngonanthus gracilis* auct. non (Bong.) Ruhland
Referencias: Abbiatti, D., 1946b; Castellanos, A., 1945c; Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976; Moldenke, H. N., 1946, 1973a; Ruhland, W. O. E., 1903.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1100 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(GUA); URY(CAS, MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 905* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 5605* (HBR, US)]; PRY[*Balansa, B. 567* (G, P)]; URY[*Pedersen, T. M. 3653* (K)].

Eriocaulon ligulatum (Vell.) L.B. Sm.
Sin.: *Dupatya ligulata* Vell., *Eriocaulon elichrysoides* auct. non Bong., *Eriocaulon kunthii* Körn., *Eriocaulon vaginatum* Körn.
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2985* (HBR)].

Eriocaulon magnificum auct. non Ruhland = **Eriocaulon magnum** Abbiatti
Referencias: Abbiatti, D., 1946b.

Eriocaulon magnificum Ruhland
Sin.: *Eriocaulon deslandesii* Silveira
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976; Reitz, R., 1956; Ruhland, W. O. E., 1903.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2868* (SI), *Klein, R. M. 6086* (FLOR, HBR)]; URY[*Alonso Paz, E. 2357* (MVFQ)].

Eriocaulon magnum Abbiatti
Sin.: *Eriocaulon magnificum* auct. non Ruhland
Referencias: Abbiatti, D., 1946a, b; Moldenke, H. N., 1973c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(RGS); PRY(APA, AMA, CAU, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2955* (K, SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 37007* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 9428* (BM, G, K, P)].

Eriocaulon megapotamicum Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1935; Moldenke, H. N., 1969b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Malme, G. O. A. 406* (S)].

Eriocaulon missionum A. Cast.
Referencias: Castellanos, A., 1945c; Moldenke, H. N., 1969c.
Hierba. Perenne. Endémica. 200 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 1225* (S), *Spegazzini, C. L. s.n.* (BAF)].

Eriocaulon modestum Kunth
Sin.: *Eriocaulon modestum* Kunth f. *viviparum* Herzog ex Moldenke & L.B. Sm., *Eriocaulon moldenkei* Herter, *Eriocaulon proximum* Steud.

Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976; Moldenke, H. N., 1969c; Reitz, R., 1956.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(SPE); URY(CAS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 6277* (FLOR, HBR, US)]; PRY[*Rojas, T. 2034* (AS, MO)]; URY[*Herter, W. G. F. 2110* (NY), *Pedersen, T. M. 3653* (N, S, W)].

Eriocaulon modestum Kunth f. *viviparum* Herzog ex Moldenke & L.B. Sm. = **Eriocaulon modestum** Kunth

Eriocaulon moldenkei Herter = **Eriocaulon modestum** Kunth
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Eriocaulon morulum (Kunth) Steud. = **Syngonanthus chrysanthus** (Bong.) Ruhland var. **chrysanthus**
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Eriocaulon nardifolium (Kunth) Steud. = **Syngonanthus fischerianus** (Bong.) Ruhland
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Eriocaulon nitens Bong. = **Syngonanthus nitens** (Bong.) Ruhland
Referencias: Ruhland, W. O. E., 1903.

Eriocaulon paranense Moldenke = **Eriocaulon sellowianum** Kunth var. **paranense** (Moldenke) Moldenke & L.B. Sm.
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976; Moldenke, H. N., 1973a.

Eriocaulon planifolium Bong. = **Paepalanthus planifolius** (Bong.) Körn.
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Eriocaulon polyanthum Bong. = **Actinocephalus polyanthus** (Bong.) Sano
Referencias: Sano, P. T., 2004.

Eriocaulon proximum Steud. = **Eriocaulon modestum** Kunth
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Eriocaulon reitzii Moldenke & L.B. Sm.
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.
Hierba. Perenne. Endémica. 1200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5428* (HBR, US)].

Eriocaulon sellowianum Kunth var. **longifolium** Moldenke
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.
Hierba. Perenne. Nativa. 900–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pabst, G. F. J. 10145* (HB, RB)].

Eriocaulon sellowianum Kunth var. **paranense** (Moldenke) Moldenke & L.B. Sm.
Sin.: *Eriocaulon paranense* Moldenke
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976; Moldenke, H. N., 1949a, 1973a.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(APA, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Tessmann, G. 2751* (NY)]; PRY[*Hassler, E. 4270* (G, K, NY)].

Eriocaulon sellowianum Kunth var. **sellowianum**
Referencias: Castellanos, A., 1945c; Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976; Moldenke, H. N., 1973c; Ruhland, W. O. E., 1903.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CAU, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 6380* (LIL)]; BRA[*Smith, L. B. 13632* (HBR, R, US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5696* (G, LIL, SI)].

Eriocaulon splendens Bong. = **Syngonanthus caulescens** (Poir.) Ruhland var. **caulescens**
Referencias: Castellanos, A., 1945c; Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Eriocaulon ulaei Ruhland var. **radiosum** Ruhland
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976; Ruhland, W. O. E., 1903.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10251* (HBR), *Ule, E. H. G. 639* (B)].

Eriocaulon ulaei Ruhland var. **ulaei**
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 1315* (B)].

Eriocaulon umbellatum Bong. = **Syngonanthus helminthorrhizus** (Mart. ex Körn.) Ruhland

Eriocaulon vaginatum Körn. = **Eriocaulon ligulatum** (Vell.) L.B. Sm.
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Leiothrix Ruhland

Número de especies: 2, 1 endémica

Leiothrix affinis Silveira = **Leiothrix flavescens** (Bong.) Ruhland var. **flavescens**
Referencias: Giulietti, A. M. & Hensold, N., 1991.

Leiothrix arechavaletae Ruhland
Referencias: Moldenke, H. N., 1946, 1970a; Ruhland, W. O. E., 1903.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(MON, RIV).
Ejemplares de referencia: URY[*Arechavaleta, J. 2561* (B), *Osten, C. 6409* (SI)].

Leiothrix edwallii Silveira = **Leiothrix flavescens** (Bong.) Ruhland var. **flavescens**
Referencias: Giulietti, A. M. & Hensold, N., 1991.

Leiothrix flavescens (Bong.) Ruhland var. **flavescens**
Sin.: *Dupatya flavescens* (Bong.) Kuntze, *Eriocaulon flavescens* Bong., *Leiothrix affinis* Silveira, *Leiothrix edwallii* Silveira, *Leiothrix flavescens* (Bong.) Ruhland var. *glabra* Silveira, *Leiothrix flavescens* (Bong.) Ruhland var. *parvifolia* Moldenke, *Leiothrix tenuifolia* Silveira, *Paepalanthus flavescens* (Bong.) Körn.
Referencias: Giulietti, A. M. & Hensold, N., 1991; Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976; Reitz, R., 1956.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 17467* (HBR, NY, US)].

Leiothrix flavescens (Bong.) Ruhland var. *glabra* Silveira = **Leiothrix flavescens** (Bong.) Ruhland var. **flavescens**
Referencias: Giulietti, A. M. & Hensold, N., 1991.

Leiothrix flavescens (Bong.) Ruhland var. *parvifolia* Moldenke = **Leiothrix flavescens** (Bong.) Ruhland var. **flavescens**
Referencias: Giulietti, A. M. & Hensold, N., 1991.

Leiothrix flavescens (Bong.) Ruhland var. **polystemma** (Silveira) Giul. & Hensold
Sin.: *Leiothrix polystemma* Silveira, *Leiothrix polystemma* Silveira var. *robusta* Silveira
Referencias: Giulietti, A. M. & Hensold, N., 1991.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–1800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gomes Michaeli, J. s.n.* (R)].

Leiothrix polystemma Silveira = **Leiothrix flavescens** (Bong.) Ruhland var. **polystemma** (Silveira) Giul. & Hensold
Referencias: Giulietti, A. M. & Hensold, N., 1991.

Leiothrix polystemma Silveira var. *robusta* Silveira = **Leiothrix flavescens** (Bong.) Ruhland var. **polystemma** (Silveira) Giul. & Hensold
Referencias: Giulietti, A. M. & Hensold, N., 1991.

Leiothrix tenuifolia Silveira = **Leiothrix flavescens** (Bong.) Ruhland var. **flavescens**
Referencias: Giulietti, A. M. & Hensold, N., 1991.

Paepalanthus Mart.

Número de especies: 12, 5 endémicas

Paepalanthus albo-vaginatus Silveira var. **albo-vaginatus**
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976; Tissot-Squalli H., M. L., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 17461* (HBR, US)].

Paepalanthus albo-vaginatus Silveira var. **albobracteatus** Tissot-Squalli
Referencias: Tissot-Squalli H., M. L., 1997a, b.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 7400* (B, R)].

Paepalanthus albo-vaginatus Silveira var. **fuscobracteatus** Tissot-Squalli
Referencias: Tissot-Squalli H., M. L., 1997a, b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1100–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22800* (F, K)].

Paepalanthus anthemidiflorus (Bong.) Kunth = **Syngonanthus anthemidiflorus** (Bong.) Ruhland
Referencias: Castellanos, A., 1945c.

Paepalanthus arechavaletae Körn. ex Arechav. = **Syngonanthus gracilis** (Bong.) Ruhland

Paepalanthus balansae Ruhland var. **balansae**
Referencias: Moldenke, H. N., 1970b, 1973c; Ruhland, W. O. E., 1903.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, GUA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 568* (B, G, K, NY)].

Paepalanthus balansae Ruhland var. **densiflorus** Moldenke
Referencias: Moldenke, H. N., 1962a, 1970b; Ruhland, W. O. E., 1903.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Braga, R. 92* (NY)].

Paepalanthus bellus Moldenke
Referencias: Moldenke, H. N., 1962f.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 7391* (NY)].

Paepalanthus brevipedunculatus Moldenke = **Paepalanthus catharinae** Ruhland var. **catharinae**
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Paepalanthus bryoides (Riedel ex Bong.) Kunth
Sin.: *Dupatya bryoides* (Riedel ex Bong.) Kuntze, *Eriocaulon bryoides* Riedel ex Bong.
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 13760* (HBR, R, US)].

Paepalanthus caldensis Malme
Sin.: *Paepalanthus decipiens* Ruhland, *Paepalanthus dusenii* Ruhland ex Moldenke, nom. nud., *Paepalanthus ruhlandii* Silveira ex Ruhland
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976; Reitz, R., 1956.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 2519* (SI), *Smith, L. B. 13573* (HBR, R, US)].

Paepalanthus catharinae Ruhland var. **catharinae**
Sin.: *Paepalanthus brevipedunculatus* Moldenke
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976; Reitz, R., 1956.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–2200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 45408* (SI), *Reitz, P. R. 4131* (HBR)].

Paepalanthus catharinae Ruhland var. **hatschbachii** (Moldenke) Moldenke & L.B. Sm.
Sin.: *Paepalanthus hatschbachii* Moldenke
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 14227* (HBR, R, US)].

Paepalanthus caulescens (Poir.) Kunth = **Syngonanthus caulescens** (Poir.) Ruhland var. **caulescens**
Referencias: Castellanos, A., 1945c; Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Paepalanthus chrysanthus (Bong.) Körn. = **Syngonanthus chrysanthus** (Bong.) Ruhland var. **chrysanthus**
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Paepalanthus decipiens Ruhland = **Paepalanthus caldensis** Malme
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Paepalanthus decorus Abbiatti
Referencias: Abbiatti, D., 1948; Moldenke, H. N., 1973b.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–300 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LPS)].

Paepalanthus dusenii Ruhland ex Moldenke, nom. nud. = **Paepalanthus caldensis** Malme
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Paepalanthus fischerianus (Bong.) Körn. = **Syngonanthus fischerianus** (Bong.) Ruhland
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Paepalanthus flavescens (Bong.) Körn. = **Leiothrix flavescens** (Bong.) Ruhland var. **flavescens**
Referencias: Giulietti, A. M. & Hensold, N., 1991.

[Paepalanthus globulifer Silveira]
Sin.: *Paepalanthus planifolius* (Bong.) Körn. var. *globulifer* (Silveira) Moldenke & L.B. Sm.
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976; Tissot-Squalli H., M. L., 1997a.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Paepalanthus gracilis (Bong.) Körn. = **Syngonanthus gracilis** (Bong.) Ruhland
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Paepalanthus hatschbachii Moldenke = **Paepalanthus catharinae** Ruhland var. **hatschbachii** (Moldenke) Moldenke & L.B. Sm.
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Paepalanthus helminthorrhizus Mart. ex Körn. = **Syngonanthus helminthorrhizus** (Mart. ex Körn.) Ruhland
Referencias: Ruhland, W. O. E., 1903.

Paepalanthus henriquei Silveira & Ruhland
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 49606* (NY)].

Paepalanthus iridifolius Kunth = **Paepalanthus planifolius** (Bong.) Körn.
Referencias: Tissot-Squalli H., M. L., 1997a.

Paepalanthus leiseringii Ruhland var. **kleinii** Moldenke & L.B. Sm.
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 8241* (HBR, NY, R, US)].

Paepalanthus monticola Mart. = **Paepalanthus planifolius** (Bong.) Körn.
Referencias: Tissot-Squalli H., M. L., 1997a.

Paepalanthus morulus Kunth = **Syngonanthus chrysanthus** (Bong.) Ruhland var. **chrysanthus**
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Paepalanthus nardifolius Kunth = **Syngonanthus fischerianus** (Bong.) Ruhland
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Paepalanthus nitens (Bong.) Körn. = **Syngonanthus nitens** (Bong.) Ruhland
Referencias: Ruhland, W. O. E., 1903.

Paepalanthus planifolius (Bong.) Körn.
Sin.: *Dupatya planifolia* (Bong.) Kuntze, *Eriocaulon planifolium* Bong., *Paepalanthus iridifolius* Kunth, *Paepalanthus monticola* Mart., *Paepalanthus planifolius* (Bong.) Körn. var. *major* Körn.
Referencias: Fernández Casas, F. J. & Molero Briones, J., 1982; Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976; Reitz, R., 1956; Tissot-Squalli H., M. L., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 1100–2100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1500* (SI)]; PRY[*Fernández Casas, F. J. 3827* (G)].

Paepalanthus planifolius (Bong.) Körn. var. *globulifer* (Silveira) Moldenke & L.B. Sm. = **Paepalanthus globulifer** Silveira

Paepalanthus planifolius (Bong.) Körn. var. *major* Körn. = **Paepalanthus planifolius** (Bong.) Körn.
Referencias: Tissot-Squalli H., M. L., 1997a.

Paepalanthus polyanthus (Bong.) Kunth = **Actinocephalus polyanthus** (Bong.) Sano
Referencias: Sano, P. T., 2004.

Paepalanthus polyanthus (Bong.) Kunth f. *villosus* (Beauverd) Moldenke & L.B. Sm. = **Actinocephalus polyanthus** (Bong.) Sano
Referencias: Sano, P. T., 2004.

Paepalanthus polyanthus (Bong.) Kunth var. *villosus* Beauverd = **Actinocephalus polyanthus** (Bong.) Sano
Referencias: Sano, P. T., 2004.

Paepalanthus pruinosus Ruhland
Referencias: Tissot-Squalli H., M. L., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 900–1600 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10060* (HBR, US)].

Paepalanthus ruhlandii Silveira ex Ruhland = **Paepalanthus caldensis** Malme
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

Paepalanthus tessmannii Moldenke
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976; Moldenke, H. N., 1949a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Tessmann, G. 3781* (NY)].

Syngonanthus Ruhland

Número de especies: 8, 2 endémicas

Syngonanthus anthemidiflorus (Bong.) Ruhland
Sin.: *Eriocaulon anthemidiflorum* Bong., *Paepalanthus anthemidiflorus* (Bong.) Kunth
Referencias: Castellanos, A., 1945c; Molfino, J. F., 1922c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*de Llamas, A. s.n.* (BAF)].

Syngonanthus breviracemosus Diogo = **Syngonanthus fischerianus** (Bong.) Ruhland
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.

[Syngonanthus caulescens (Poir.) Ruhland var. angustifolius Moldenke]
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Syngonanthus caulescens (Poir.) Ruhland var. **caulescens**
Sin.: *Dupatya caulescens* (Poir.) Kuntze, *Eriocaulon caulescens* Poir., *Eriocaulon splendens* Bong., *Paepalanthus caulescens* (Poir.) Kunth
Referencias: Abbiatti, D., 1946a; Castellanos, A., 1945c; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976; Reitz, R., 1956.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE); URY(MAL, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 1594* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 15619* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 1522* (G, SI)]; URY[*Tweedie, J. s.n.* (K)].

Syngonanthus caulescens (Poir.) Ruhland var. **proliferus** Moldenke
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 8681* (US)].

Syngonanthus chrysanthus (Bong.) Ruhland var. **castrensis** Moldenke & L.B. Sm.
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Vidal, J. s.n.* (R)].

Syngonanthus chrysanthus (Bong.) Ruhland var. **chrysanthus**
Sin.: *Dupatya chrysantha* (Bong.) Kuntze, *Eriocaulon chrysanthum* Bong., *Eriocaulon morulum* (Kunth) Steud., *Paepalanthus chrysanthus* (Bong.) Körn., *Paepalanthus morulus* Kunth
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976; Reitz, R., 1956.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 6279* (FLOR, HBR, US)]; URY[*Pedersen, T. M. 76* (K)].

Syngonanthus fischerianus (Bong.) Ruhland
Sin.: *Dupatya fischeriana* (Bong.) Kuntze, *Eriocaulon fischerianum* Bong., *Eriocaulon nardifolium* (Kunth) Steud., *Paepalanthus fischerianus* (Bong.) Körn., *Paepalanthus nardifolius* Kunth, *Syngonanthus breviracemosus* Diogo
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 13451* (HBR, R, US)].

Syngonanthus gracilis auct. non (Bong.) Ruhland = **Eriocaulon leptophyllum** Kunth

Syngonanthus gracilis (Bong.) Ruhland
Sin.: *Dupatya gracilis* (Bong.) Kuntze, *Eriocaulon gracile* Bong., *Paepalanthus arechavaletae* Körn. ex Arechav., *Paepalanthus gracilis* (Bong.) Körn.
Referencias: Moldenke, H. N. & Smith, L. B., 1976; Moldenke, H. N., 1946.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CON); URY(CAS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 10679* (HBR, R, US)]; PRY[*Hassler, E. 11181* (G)]; URY[*Rosengurtt, B. 1103* (W)].

Syngonanthus helminthorrhizus (Mart. ex Körn.) Ruhland
Sin.: *Dupatya helminthorrhiza* (Mart. ex Körn.) Kuntze, *Eriocaulon umbellatum* Bong., *Paepalanthus helminthorrhizus* Mart. ex Körn.
Referencias: Moldenke, H. N., 1971; Ruhland, W. O. E., 1903.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Riedel, J. s.n.* (LE)]; PRY[*Hassler, E. 11467* (BM, G, K)].

Syngonanthus nanus Moldenke
Referencias: Moldenke, H. N., 1949a.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ceccatto 118* (NY)].

Syngonanthus nitens (Bong.) Ruhland
Sin.: *Dupatya nitens* (Bong.) Kuntze, *Eriocaulon nitens* Bong., *Paepalanthus nitens* (Bong.) Körn.
Referencias: Moldenke, H. N., 1971; Ruhland, W. O. E., 1903.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 17497* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 24785a* (MO)].

GILLIESIACEAE

2 géneros, 8 especies endémicas.

Gilliesia Lindl.

Número de especies: 5 endémicas

Gilliesia curicana Ravenna = **Gilliesia graminea** Lindl.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Gilliesia dimera Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2005g.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 1820* (Herb. Ravenna)].

Gilliesia gaudichaudiana Kunth = **Gilliesia graminea** Lindl.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Gilliesia graminea Lindl.
Sin.: *Gilliesia curicana* Ravenna, *Gilliesia gaudichaudiana* Kunth
Referencias: Molfino, J. F., 1929a; Muñoz-Schick, M., 2000a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (BAF)]; CHL[*Grandjot, G. F. s.n.* (SI), *Muñoz-Schick, M. 3975* (SGO)].

Gilliesia isopetala Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2005g.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1700 m.
Países: CHL(VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 5425* (BA, CONC)].

Gilliesia monophylla Reiche = **Gilliesia montana** Poepp. & Endl.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a; Ravenna, P. F., 2000g.

Gilliesia montana Poepp. & Endl.
Sin.: *Gilliesia monophylla* Reiche, *Miersia scalae* Gunckel
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grandjot, G. F. s.n.* (SI), *Moreira, S. s.n.* (SGO)].

Gilliesia nahuelbutae Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000e.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 3204* (Herb. Ravenna)].

Solaria Phil.

Número de especies: 3 endémicas

Solaria attenuata Ravenna = **Solaria miersioides** Phil.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a; Ravenna, P. F., 1969f.

Solaria brevicoalita Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2005h.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Teillier A., S. s.n.* (CONC)].

Solaria curacavina Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2005h.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Castillo, G. s.n.* (SGO)].

Solaria miersioides Phil.
Sin.: *Solaria attenuata* Ravenna
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a; Ravenna, P. F., 1969f; Zöllner, O. & Arriagada, L., 1998b.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–2300 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10974* (BAB, SI)]; CHL[*Saavedra, F. 279* (SGO)].

HELICONIACEAE

1 género, 6 especies.

Heliconia L., nom. cons.

Número de especies: 6

Heliconia brasiliensis Hook. f.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(MIS, SAL); BRA(SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2717* (CTES)]; BRA[*Reitz, P. R. 3551a* (SI)]; PRY[*Brunner, D. R. 1502* (MO)].

Heliconia cannoidea Rich. var. *villosa* Petersen
= **Heliconia hirsuta** L. f.
Referencias: Andersson, B. L., 1985.

Heliconia farinosa Raddi
Referencias: Andersson, B. L., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Burkart, A. 25083* (SI)].

Heliconia hirsuta L. f.
Sin.: *Heliconia cannoidea* Rich. var. *villosa* Petersen
Referencias: Andersson, B. L., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 5141* (NY)]; BRA[*Hatschbach, G. 7897* (B, L, US)]; PRY[*Hassler, E. 5564* (G, NY), *Woolston, A. L. 767* (SI)].

Heliconia psittacorum L. f.
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Marín, G. 266* (BM, CTES, PY), *Múlgura de Romero, M. E. 3613* (CTES, FCQ, SI)].

Heliconia psittacorum L. f. var. *gracilis* Petersen
= **Heliconia subulata** Ruiz & Pav. subsp. **gracilis** (Petersen) L. Andersson
Referencias: Andersson, B. L., 1985.

Heliconia subulata Ruiz & Pav. subsp. **gracilis** (Petersen) L. Andersson
Sin.: *Heliconia psittacorum* L. f. var. *gracilis* Petersen
Referencias: Andersson, B. L., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(MIS, SAL); BRA(PAR); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pingitore, E. s.n.* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 9424* (B, U, US)]; PRY[*Jörgensen, P. 4726* (F, MO, NY, S, US)].

[Heliconia subulata Ruiz & Pav. subsp. subulata]
Referencias: Andersson, B. L., 1985.
Notas: Subespecie excluida del área del proyecto.

Heliconia velloziana Emygdio
Referencias: Emygdio de Mello Filho, L. & Santos, E. A. A., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 9466* (HBR, R)].

HEMEROCALLIDACEAE

1 género, 1 especie.

Pasithea D. Don

Número de especies: 1

Pasithea caerulea (Ruiz & Pav.) D. Don var. **caerulea**
Sin.: *Anthericum caeruleum* Ruiz & Pav.
Referencias: Johnston, I. M., 1929a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Taylor, C. M. 10226* (MO), *Werdermann, E. 47* (SI)].

Pasithea caerulea (Ruiz & Pav.) D. Don var. **grandiflora** I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1929a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 3608* (GH)].

HERRERIACEAE

Autor: Lopes, R. C.

2 géneros, 6 especies, 5 especies endémicas.

Clara Kunth

Número de especies: 3 endémicas

Clara gracilis R.C. Lopes & Andreata
Referencias: Lopes, R. C. & Andreata, R. H. P., 2003, 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 38639* (LIL)].

Clara ophiopogonoides Kunth
Sin.: *Herreria ophiopogonoides* (Kunth) Niederl.
Referencias: Lopes, R. C. & Andreata, R. H. P., 2003, 2005, 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS); PRY(MIE); URY(CAS, FLA, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fontana, J. L. 5761* (Z)]; BRA[*Abruzzi Aragão de Oliveira, M. L. 2017* (HAS)]; PRY[*Pedersen, T. M. 9575* (C, MBM, SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 1353* (SI, Z)].

Clara stricta (L.B. Sm.) R.C. Lopes & Andreata
Sin.: *Herreria stricta* L.B. Sm.
Referencias: Lopes, R. C. & Andreata, R. H. P., 2003, 2005, 2006; Smith, L. B., 1958.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15456* (SI)]; BRA[*Matzenbacher, N. I. s.n.* (ICN)].

Dioscorea tuberosa Rojas Acosta, nom. illeg. = **Herreria bonplandii** Lecomte
Referencias: Krapovickas, A., 1970d.

Herreria Ruiz & Pav.

Número de especies: 3, 2 endémicas

[Herreria aculeata Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d; Lopes, R. C. & Andreata, R. H. P., 2003; Rojas Acosta, N., 1897.
Notas: Nombre dudoso.

Herreria bonplandii Lecomte
Sin.: *Dioscorea tuberosa* Rojas Acosta, nom. illeg., *Herreria linearifolia* Dammer, nom. nud., *Herreria montevidensis* Klotzsch ex Griseb. var. *bonplandii* (Lecomte) L.B. Sm., *Herreria tuberosa* (Rojas Acosta) Rojas Acosta, nom. superfl.
Referencias: Lopes, R. C. & Andreata, R. H. P., 2003.
Hierba o enredadera. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 126* (SI)]; BRA[*Ritter, M. R. 685* (SMDB)]; PRY[*Schinini, A. 2996* (SI)].

Herreria linearifolia Dammer, nom. nud. = **Herreria bonplandii** Lecomte
Referencias: Lopes, R. C. & Andreata, R. H. P., 2003.

Herreria montevidensis Klotzsch ex Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1969[1968]b; Lopes, R. C. & Andreata, R. H. P., 2003.
Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0–400 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, APA, SPE); URY(COL, MON, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwarz, G. J. 1496* (LIL)]; BRA[*Hatschbach, G. 15775* (MBM)]; PRY[*Woolston, A. L. 1043* (SI, SP, U)]; URY[*Fruchard, M. s.n.* (SI)].

Herreria montevidensis Klotzsch ex Griseb. var. *bonplandii* (Lecomte) L.B. Sm. = **Herreria bonplandii** Lecomte
Referencias: Lopes, R. C. & Andreata, R. H. P., 2003.

Herreria ophiopogonoides (Kunth) Niederl. = **Clara ophiopogonoides** Kunth
Referencias: Lopes, R. C. & Andreata, R. H. P., 2003, 2005, 2006.

Herreria stellata Ruiz & Pav.
Sin.: *Herreria verticillata* Molina
Referencias: Lopes, R. C. & Andreata, R. H. P., 2003.
Hierba o enredadera. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(VII, VIII, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Solervicens, J. s.n.* (SGO)];

Herreria stricta L.B. Sm. = **Clara stricta** (L.B. Sm.) R.C. Lopes & Andreata
Referencias: Lopes, R. C. & Andreata, R. H. P., 2003, 2005, 2006.

Herreria tuberosa (Rojas Acosta) Rojas Acosta, nom. superfl. = **Herreria bonplandii** Lecomte
Referencias: Hauman, L. L., 1917a; Rojas Acosta, N., 1918.

Herreria verticillata Molina = **Herreria stellata** Ruiz & Pav.
Referencias: Smith, L. B., 1958.

HYACINTHACEAE

Autores: Guaglianone, E. R. & Arroyo-Leuenberger, S.

1 género, 5 especies, 1 especie endémica.

Allium sessile R.E. Fr. = **Oziroë acaulis** (Baker) Speta
Referencias: Speta, F., 1998.

Camassia biflora (Ruiz & Pav.) Cocucci = **Oziroë biflora** (Ruiz & Pav.) Speta
Referencias: Speta, F., 1998.

Fortunatia acaulis (Baker) Guagl. & S.C. Arroyo = **Oziroë acaulis** (Baker) Speta
Referencias: Speta, F., 1998.

Fortunatia argentinensis (Lillo & Hauman) Ravenna = **Oziroë argentinensis** (Lillo & Hauman) Speta
Referencias: Speta, F., 1998.

Fortunatia arida (Poepp.) Ravenna = **Oziroë arida** (Poepp.) Speta
Referencias: Speta, F., 1998.

Fortunatia biflora (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. = **Oziroë biflora** (Ruiz & Pav.) Speta
Referencias: Speta, F., 1998.

Fortunatia sessilis (R.E. Fr.) Ravenna = **Oziroë acaulis** (Baker) Speta
Referencias: Guaglianone, E. R. & Arroyo-Leuenberger, S. C., 2002.

Ornithogalum aridum Poepp. = **Oziroë arida** (Poepp.) Speta
Referencias: Speta, F., 1998.

Ornithogalum biflorum (Ruiz & Pav.) D. Don = **Oziroë biflora** (Ruiz & Pav.) Speta
Referencias: Speta, F., 1998.

Ornithogalum biflorum (Ruiz & Pav.) D. Don var. *chloroleucum* (Lindl.) Baker = **Oziroë arida** (Poepp.) Speta
Referencias: Guaglianone, E. R. & Arroyo-Leuenberger, S. C., 2002.

Ornithogalum chilense Phil. = **Oziroë arida** (Poepp.) Speta
Referencias: Guaglianone, E. R. & Arroyo-Leuenberger, S. C., 2002.

Ornithogalum chloroleucum Lindl. = **Oziroë arida** (Poepp.) Speta
Referencias: Guaglianone, E. R. & Arroyo-Leuenberger, S. C., 2002.

Ornithogalum geminiflorum Herb. ex Lindl. = **Oziroë biflora** (Ruiz & Pav.) Speta
Referencias: Guaglianone, E. R. & Arroyo-Leuenberger, S. C., 2002.

Oziroë Raf.

Número de especies: 5, 1 endémica

Oziroë acaulis (Baker) Ravenna, comb. superfl. = **Oziroë acaulis** (Baker) Speta
Referencias: Guaglianone, E. R. & Arroyo-Leuenberger, S. C., 2002.

Oziroë acaulis (Baker) Speta
Sin.: *Allium sessile* R.E. Fr., *Fortunatia acaulis* (Baker) Guagl. & S.C. Arroyo, *Fortunatia sessilis* (R.E. Fr.) Ravenna, *Nothoscordum sessile* (R.E. Fr.) Beauverd, *Oziroë acaulis* (Baker) Ravenna, comb. superfl., *Scilla acualis* Baker
Referencias: Guaglianone, E. R. & Arroyo-Leuenberger, S. C., 1995, 2002; Ravenna, P. F., 1982b; Speta, F., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3605* (LIL, S, SI)]; CHL[*Rosello, 763 02* (CONC, SI)].

Oziroë argentinensis (Lillo & Hauman) Ravenna, comb. superfl. = **Oziroë argentinensis** (Lillo & Hauman) Speta
Referencias: Guaglianone, E. R. & Arroyo-Leuenberger, S. C., 2002.

Oziroë argentinensis (Lillo & Hauman) Speta
Sin.: *Fortunatia argentinensis* (Lillo & Hauman) Ravenna, *Oziroë argentinensis* (Lillo & Hauman) Ravenna, comb. superfl., *Oziroë correntina* Ravenna, *Scilla argentinensis* Lillo & Hauman
Referencias: Guaglianone, E. R. & Arroyo-Leuenberger, S. C., 2002; Hauman, L. L., 1917a; Ravenna, P. F., 1982b, 1999c; Speta, F., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3200 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, JUJ, SAL, TUC); PRY(CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 4547* (CTES, SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4153* (K)].

Oziroë arida (Poepp.) Ravenna, comb. superfl. = **Oziroë arida** (Poepp.) Speta
Referencias: Guaglianone, E. R. & Arroyo-Leuenberger, S. C., 2002.

Oziroë arida (Poepp.) Speta
Sin.: *Fortunatia arida* (Poepp.) Ravenna, *Ornithogalum aridum* Poepp., *Ornithogalum biflorum* (Ruiz & Pav.) D. Don var. *chloroleucum* (Lindl.) Baker, *Ornithogalum chilense* Phil., *Ornithogalum chloroleucum* Lindl., *Oziroë arida* (Poepp.) Ravenna, comb. superfl., *Oziroë chloroleuca* (Poepp.) Speta, *Scilla chloroleuca* (Lindl.) Kunth
Referencias: Guaglianone, E. R. & Arroyo-Leuenberger, S. C., 2002; Ravenna, P. F., 1982b; Speta, F., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 3127* (B, CONC, SI)].

Oziroë biflora (Ruiz & Pav.) Ravenna, comb. superfl. = **Oziroë biflora** (Ruiz & Pav.) Speta
Referencias: Guaglianone, E. R. & Arroyo-Leuenberger, S. C., 2002.

Oziroë biflora (Ruiz & Pav.) Speta
Sin.: *Camassia biflora* (Ruiz & Pav.) Cocucci, *Fortunatia biflora* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr., *Ornithogalum biflorum* (Ruiz & Pav.) D. Don, *Ornithogalum geminiflorum* Herb. ex Lindl., *Oziroë biflora* (Ruiz & Pav.) Ravenna, comb. superfl., *Scilla biflora* Ruiz & Pav., *Scilla geminiflora* (Herb.) Kunth, *Scilla triflora* Phil.
Referencias: Cocucci, A. E., 1969; Guaglianone, E. R. & Arroyo-Leuenberger, S. C., 2002; Macbride, J. F., 1931; Speta, F., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: CHL(I, II, III, IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 457* (A, LIL, S, SI, Z)].

Oziroë chloroleuca (Poepp.) Speta = **Oziroë arida** (Poepp.) Speta
Referencias: Guaglianone, E. R. & Arroyo, L. S., 2002.

Oziroë correntina Ravenna = **Oziroë argentinensis** (Lillo & Hauman) Speta

Oziroë pomensis Ravenna
Sin.: *Oziroë totorensis* Ravenna
Referencias: Guaglianone, E. R. & Arroyo-Leuenberger, S. C., 2002; Ravenna, P. F., 1998b, 1999c.
Hierba. Perenne. Nativa. 1800–3600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 9171* (SI)]; CHL[*Eggli, U. 2764* (B, CONC, SI)].

Oziroë totorensis Ravenna = **Oziroë pomensis** Ravenna

Scilla acualis Baker = **Oziroë acaulis** (Baker) Speta
Referencias: Speta, F., 1998.

Scilla argentinensis Lillo & Hauman = **Oziroë argentinensis** (Lillo & Hauman) Speta
Referencias: Speta, F., 1998.

Scilla biflora Ruiz & Pav. = **Oziroë biflora** (Ruiz & Pav.) Speta
Referencias: Speta, F., 1998.

Scilla chloroleuca (Lindl.) Kunth = **Oziroë arida** (Poepp.) Speta
Referencias: Guaglianone, E. R. & Arroyo-Leuenberger, S. C., 2002.

Scilla geminiflora (Herb.) Kunth = **Oziroë biflora** (Ruiz & Pav.) Speta
Referencias: Guaglianone, E. R. & Arroyo-Leuenberger, S. C., 2002.

Scilla triflora Phil. = **Oziroë biflora** (Ruiz & Pav.) Speta
Referencias: Guaglianone, E. R. & Arroyo-Leuenberger, S. C., 2002.

[Urginea flaviflora Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d; Rojas Acosta, N., 1897.
Notas: Nombre dudoso.

HYDROCHARITACEAE

Revisores: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B.

5 géneros, 7 especies.

Anacharis callitrichoides Rich. = **Elodea callitrichoides** (Rich.) Casp.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1985a.

Anacharis chilensis Planch. = **Elodea potamogeton** (Bertero) Espinosa
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1985a.

Anacharis densa (Planch.) Vict. = **Egeria densa** Planch.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1984a.

Anacharis najas (Planch.) Vict. = **Egeria najas** Planch.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1984a.

Anacharis potamogeton (Bertero) Vict. = **Elodea potamogeton** (Bertero) Espinosa
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1985a.

Apalanthe Planch.

Número de especies: 1

Apalanthe granatensis (Humb. & Bonpl.) Planch.
Sin.: *Elodea granatensis* Humb. & Bonpl.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1985b; St. John, H., 1963.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(COS, MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 8114* (SI), *Morrone, O. 878* (SI)].

Beneditaea brasiliensis (Planch.) Toledo = **Ottelia brasiliensis** (Planch.) Walp.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1984b.

Damasonium brasiliensis Planch. = **Ottelia brasiliensis** (Planch.) Walp.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1984b.

Diplandra potamogeton Bertero = **Elodea potamogeton** (Bertero) Espinosa
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1985a.

Egeria Planch.

Número de especies: 2

Egeria chilensis (Planch.) Benth. & Hook. = **Elodea potamogeton** (Bertero) Espinosa
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1985a.

Egeria densa Planch.
Sin.: *Anacharis densa* (Planch.) Vict., *Elodea densa* (Planch.) Casp., *Philotria densa* (Planch.) Small
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1984a; St. John, H., 1961.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, SCA); CHL(V, VIII, X, RME); URY(CAS, FLO, FLA, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lanfranchi, A. E. 1195* (SI), *Schinini, A. 13920* (CTES, F)]; BRA[*Hatschbach, G. 26551* (MBM)]; CHL[*Gunckel, L. H. 45070* (GH)]; URY[*Osten, C. 4312* (G)].

Egeria najas Planch.
Sin.: *Anacharis najas* (Planch.) Vict., *Elodea guianensis* Rich. f. *longifolia* Chodat & Hassl., *Elodea kochii* Herter, *Elodea najas* (Planch.) Casp., *Elodea paraguayensis* Herter, nom. illeg.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1984a; St. John, H., 1961.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI); BRA(PAR); PRY(COA, ÑEE, SPE); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cristóbal, C. L. 1855* (G), *Múlgura de Romero, M. E. 1577* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 43992* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 6241* (BM, G, NY), *Hassler, E. 9* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 96705* (F, G, GH, MO, Z, ZT)].

Elodea Michx.

Número de especies: 2

Elodea callitrichoides (Rich.) Casp.
Sin.: *Anacharis callitrichoides* Rich., *Elodea ernstae* H. St. John, *Elodea richardii* H. St. John
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1985a; St. John, H., 1963.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, RNE, SFE); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2535* (GH, MO, SI, US)]; URY[*Commerson, P. s.n.* (G, P)].

[Elodea canadense Michx.]
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1985a.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Elodea chilensis (Planch.) Casp. = **Elodea potamogeton** (Bertero) Espinosa
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1985a; St. John, H., 1961.

Elodea densa (Planch.) Casp. = **Egeria densa** Planch.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1984a.

Elodea ernstae H. St. John = **Elodea callitrichoides** (Rich.) Casp.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1985a.

Elodea granatensis Humb. & Bonpl. = **Apalanthe granatensis** (Humb. & Bonpl.) Planch.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1985b.

Elodea guianensis Rich. f. *longifolia* Chodat & Hassl. = **Egeria najas** Planch.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1984a.

Elodea kochii Herter = **Egeria najas** Planch.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1984a.

Elodea najas (Planch.) Casp. = **Egeria najas** Planch.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1984a.

Elodea paraguayensis Herter, nom. illeg. = **Egeria najas** Planch.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1984a.

Elodea potamogeton (Bertero) Espinosa
Sin.: *Anacharis chilensis* Planch., *Anacharis potamogeton* (Bertero) Vict., *Diplandra potamogeton* Bertero, *Egeria chilensis* (Planch.) Benth. & Hook., *Elodea chilensis* (Planch.) Casp.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1985a.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 200–1000 m.
Países: CHL(I, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cuming, H. 636* (BM, K)].

Elodea richardii H. St. John = **Elodea callitrichoides** (Rich.) Casp.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1985a.

Hydrocharis spongia Bosc = **Limnobium spongia** (Bosc) Steud.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1983.

Hydrocharis stolonifera (G. Mey.) Kuntze = **Limnobium laevigatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine
Referencias: Heine, H., 1968.

Hydromystria laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Hunz. = **Limnobium laevigatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1983.

Hydromystria laevigata (Willd.) Díaz-Mir. & Philcox, comb. superfl. = **Limnobium laevigatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1983.

Hydromystria sinclairi (Benth.) Hauman = **Limnobium laevigatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1983.

Hydromystria stolonifera G. Mey. = **Limnobium laevigatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine
Referencias: Heine, H., 1968.

Limnobium Rich.

Número de especies: 1

Limnobium bosci Rich. = **Limnobium spongia** (Bosc) Steud.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1983.

Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine
Sin.: *Hydrocharis stolonifera* (G. Mey.) Kuntze, *Hydromystria laevigata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Hunz., *Hydromystria laevigata* (Willd.) Díaz-Mir. & Philcox, comb. superfl., *Hydromystria sinclairi* (Benth.) Hauman, *Hydromystria stolonifera* G. Mey., *Limnobium sinclairi* Benth., *Limnobium spongia* (Bosc) Steud. subsp. *laevigatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Lowden, *Limnobium stoloniferum* (G. Mey.) Griseb., *Salvinia laevigata* Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1983; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Hunziker, A. T., 1981, 1982a; Lowden, R. M., 1992; Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SFE, TUC); CHL(V, VIII, RME); PRY(PHA); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19534* (SI), *Tur, N. M. 1856* (SI)]; CHL[*Schlegel, F. 1751* (CONC)]; PRY[*Mereles, F. 6092* (CTES, FCQ, MO)]; URY[*Felippone, F. 2506* (SI)].

Limnobium sinclairi Benth. = **Limnobium laevigatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1983.

[Limnobium spongia (Bosc) Steud.]
Sin.: *Hydrocharis spongia* Bosc, *Limnobium bosci* Rich.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1983.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Limnobium spongia (Bosc) Steud. subsp. *laevigatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Lowden = **Limnobium laevigatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine
Referencias: Lowden, R. M., 1992.

Limnobium stoloniferum (G. Mey.) Griseb. = **Limnobium laevigatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine
Referencias: Heine, H., 1968.

Ottelia Pers.

Número de especies: 1

Ottelia brasiliensis (Planch.) Walp.
Sin.: *Beneditaea brasiliensis* (Planch.) Toledo, *Damasonium brasiliensis* Planch.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1984b.
Hierba. Anual. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 21280* (CTES, G)]; BRA[*Hatschbach, G. 26625* (MBM, NY)]; PRY[*Hassler, E. 4472* (BM, G, NY)].

Philotria densa (Planch.) Small = **Egeria densa** Planch.
Referencias: Cook, C. D. K. & Urmi-König, K., 1984a.

Salvinia laevigata Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Limnobium laevigatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine
Referencias: Heine, H., 1968.

HYPOXIDACEAE

3 géneros, 5 especies, 1 especie endémica, 1 especie introducida.

Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze = **Molineria capitulata** (Lour.) Herb.

Curculigo recurvata Dryand. = **Molineria capitulata** (Lour.) Herb.

Curculigo scorzonerifolia (Lam.) Baker = **Heliacme scorzonerifolia** (Lam.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003f.

Heliacme Ravenna
Número de especies: 1

Heliacme scorzonerifolia (Lam.) Ravenna
Sin.: *Curculigo scorzonerifolia* (Lam.) Baker, *Hypoxis scorzonerifolia* Lam.
Referencias: Ravenna, P. F., 2003f, g, n.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APY, AMA, CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 40901* (CTES)]; PRY[*Schinini, A. 20463* (CTES)].

Hypoxis L.
Número de especies: 3, 1 endémica

Hypoxis catamarcensis Brackett
Referencias: Brackett, A. E., 1923.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1551* (BA, G, MO, NY)].

Hypoxis decumbens L.
Sin.: *Hypoxis decumbens* L. var. *major* Seub.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Brackett, A. E., 1923; Burkart, A., 1957c; Fabris, H. A., 1969[1968]b; Huft, M. J., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE); URY(RNO, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 326* (SI), *Burkart, A. 1525* (SI), *Hurrell, J. A. 5470* (MU, SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 13376* (SI), *Rambo, B. 37401* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 5562* (G), *Quarín, C. L. 1584* (SI), *Zardini, E. M. 7725* (FCQ, MO)]; URY[*Fruchard, M. s.n.* (SI)].

Hypoxis decumbens L. var. *major* Seub. = **Hypoxis decumbens** L.
Referencias: Fabris, H. A., 1969[1968]b.

Hypoxis humilis Kunth
Referencias: Brackett, A. E., 1923; Huft, M. J., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. 8386* (NY)].

Hypoxis scorzonerifolia Lam. = **Heliacme scorzonerifolia** (Lam.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003f.

Leucojum capitulatum Lour. = **Molineria capitulata** (Lour.) Herb.

Molineria Colla
Número de especies: 1 introducida

Molineria capitulata (Lour.) Herb.
Sin.: *Curculigo capitulata* (Lour.) Kuntze, *Curculigo recurvata* Dryand., *Leucojum capitulatum* Lour.
Referencias: Ulibarri, E. A., 1995.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–100 m.
Países: ARG(DFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1816* (SI)].

IRIDACEAE

Autores: Roitman, G., Castillo, A. & Maza, I.
Revisor: Goldblatt, P.

26 géneros, 195 especies, 124 especies endémicas, 12 especies introducidas.

Alophia amoena (Griseb.) Kuntze = **Herbertia lahue** (Molina) Goldblatt subsp. **amoena** (Griseb.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., 1977.

Alophia brasiliensis (Baker) Kuntze = **Cypella brasiliensis** (Baker) Roitman & A. Castillo

Alophia euryandra (Griseb.) Lillo = **Ennealophus euryandrus** (Griseb.) Ravenna subsp. **euryandrus**
Referencias: Ravenna, P. F., 1973a.

Alophia geniculata Klatt = **Cypella geniculata** (Klatt) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1962.

Alophia hauthalii Kuntze = **Cypella hauthalii** (Kuntze) R.C. Foster subsp. **hauthalii**
Referencias: Foster, R. C., 1950.

Alophia lahue (Molina) Espinosa = **Herbertia lahue** (Molina) Goldblatt subsp. **lahue**
Referencias: Goldblatt, P., 1977.

Alophia lahue (Molina) Espinosa subsp. *amoena* (Griseb.) Ravenna = **Herbertia lahue** (Molina) Goldblatt subsp. **amoena** (Griseb.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., 1977.

Alophia pulchella (Sweet) Kuntze = **Herbertia pulchella** Sweet

Alophia sellowiana Klatt = **Gelasine caerulea** (Vell.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.

Alophia stricta (Griseb.) Kuntze = **Gelasine elongata** (Graham) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1988f.

Alophia tigridioides Hicken = **Herbertia tigridioides** (Hicken) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., 1977.

Anomalostylus coriifolius (Baker ex Chodat & Hassl.) R.C. Foster = **Trimezia spathata** (Klatt) Baker subsp. **martii** (Baker) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.

Anomalostylus crateriformis R.C. Foster = **Trimezia spathata** (Klatt) Baker subsp. **martii** (Baker) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.

Anomalostylus grandis (Kraenzl.) R.C. Foster = **Trimezia spathata** (Klatt) Baker subsp. **grandis** (Kraenzl.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.

Antholyza floribunda Salisb. = **Chasmanthe floribunda** (Salisb.) N.E. Br.
Referencias: Delucchi, G., 1996.

Belamcanda Adans.

Número de especies: 1 introducida

Belamcanda chinensis (L.) A. DC.
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 12067* (PY)].

Bermudiana striata (Sm.) Moench = **Sisyrinchium striatum** Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Calydorea Herb.

Número de especies: 14, 11 endémicas

Calydorea alba Roitman & A. Castillo
Referencias: Roitman, G. & Castillo, A., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(ART).
Ejemplares de referencia: URY[*Roitman, G. s.n.* (BAA)].

Calydorea amabilis (Ravenna) Goldblatt & Henrich
Sin.: *Catila amabilis* Ravenna
Referencias: Goldblatt, P. & Henrich, J. E., 1991; Goldblatt, P. & Takei, M., 1997; Ravenna, P. F., 1983b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); BRA(RGS); URY(PAY, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20586* (SI)]; BRA[*Ravenna, P. F. 390* (Herb. Ravenna, RB)]; URY[*Felippone, F. 3391* (SI)].

Calydorea approximata R.C. Foster
Referencias: Foster, R. C., 1946; Ravenna, P. F., 2003j.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL, SFE); PRY(APY, APA, CAU, CAA, GUA, ITA, MIE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 325* (SI)]; PRY[*Woolston, A. L. 347* (SI)].
Notas: Citada para Paraná y Rio Grande do Sul, Brasil, sin indicar material de referencia (Ravenna, 2003j).

Calydorea azurea Klatt
Referencias: Goldblatt, P. & Takei, M., 1997; Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); URY(TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 6502* (SI)]; URY[*Lorentz, P. G. s.n.* (B)].

Calydorea basaltica Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2005m.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 3201* (MBM)].

Calydorea bifida Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 2750* (Herb. Ravenna)].

Calydorea campestris (Klatt) Baker
Sin.: *Roterbe campestris* Klatt
Referencias: Baker, J. G., 1876a; Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903; Vieira, E. R., Santos, E. P. & Tardivo, R. C., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, GUA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 12844* (NY)]; PRY[*Hassler, E. 4625* (NY)].

[Calydorea chilensis M. Muñoz]
Notas: Nombre dudoso.

Calydorea crocoides Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1965.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Andrade, A. 162* (Herb. Ravenna, R)].

Calydorea furcata (Klatt) Baker = **Herbertia lahue** (Molina) Goldblatt subsp. **amoena** (Griseb.) Goldblatt
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.

Calydorea gardneri Baker
Referencias: Baker, J. G., 1876a, 1892; Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903; Goldblatt, P. & Henrich, J. E., 1991.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 6103* (G)].

Calydorea longipes Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2005m.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 53691* (MBM)].

[Calydorea luteola Baker]
Referencias: Baker, J. G., 1876a.
Notas: Nombre dudoso.

Calydorea nuda (Herb.) Baker
Sin.: *Gelasine nuda* Herb., *Roterbe nuda* (Herb.) Klatt
Referencias: Baker, J. G., 1876a, 1892.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(CAS, MON, RNO).
Ejemplares de referencia: URY[*Osten, C. 3686* (SI)].
Notas: Probablemente habite en el Sur de Brasil.

Calydorea pallens Griseb.
Sin.: *Tamia pallens* (Griseb.) Ravenna
Referencias: Goldblatt, P. & Takei, M., 1997; Grisebach, A. H. R., 1879; Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Ravenna, P. F., 2001j.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–2800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 675* (SI)].

Calydorea speciosa (Hook.) Herb. = **Calydorea xiphioides** (Poepp.) Espinosa
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Calydorea undulata Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001j.
Hierba. Anual. Endémica. 800–1000 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Maldonado-Bruzzone, R. 1037* (LP)].

Calydorea xiphioides (Poepp.) Espinosa
Sin.: *Calydorea speciosa* (Hook.) Herb., *Sisyrinchium grandiflorum* Poepp., *Sisyrinchium speciosum* Hook., *Sisyrinchium xiphioides* Poepp.
Referencias: Goldblatt, P. & Takei, M., 1997; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 29* (CONC)].

Cardenanthus R.C. Foster
Número de especies: 1 endémica

Cardenanthus venturi R.C. Foster
Referencias: Foster, R. C., 1945, 1962.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–4600 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 9025* (GH, US)].

Catila amabilis Ravenna = **Calydorea amabilis** (Ravenna) Goldblatt & Henrich
Referencias: Goldblatt, P. & Henrich, J. E., 1991.

Chamelum andinum (Phil.) Benth. & Hook. = **Olsynium frigidum** (Poepp.) Goldblatt
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Chamelum bodenbenderi Kurtz = **Olsynium bodenbenderi** (Kurtz) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

Chamelum frigidum (Poepp.) Ravenna = **Olsynium frigidum** (Poepp.) Goldblatt
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Chamelum luteum Phil., hom. illeg. = **Olsynium chrysochromum** J.M. Watson & A.R. Flores
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Watson, J. & Flores, A., 1994.

Chamelum rubellum Ravenna = **Olsynium bodenbenderi** (Kurtz) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

Chasmanthe N.E. Br.
Número de especies: 1 introducida

Chasmanthe floribunda (Salisb.) N.E. Br.
Sin.: *Antholyza floribunda* Salisb.
Referencias: Delucchi, G., 1996; Hurrell, J. A. & Delucchi, G., 2005.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–200 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Delucchi, G. 360* (BAA, LP)].

Chlamydostylus spathaceus (Griseb.) Griseb. = **Mastigostyla spathacea** (Griseb.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1965.

Choeradodia chilensis Herb. = **Libertia chilensis** (Molina) Gunckel
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Cipura Aubl.

Número de especies: 1

[Cipura amarilla Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d.
Notas: Nombre dudoso.

Cipura paludosa Aubl. subsp. **boliviensis** Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–400 m.
Países: PRY(APY, AMA, CAA, CON, COA, GUA, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 1566* (SI), *Woolston, A. L. 216* (SI), *Zardini, E. M. 37365* (FCQ, MO)].

[Cipura paludosa Aubl. subsp. paludosa]
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.
Notas: Subespecie excluida del área del proyecto.

Crocosmia Planch.

Número de especies: 1 introducida

Crocosmia crocosmiiflora (Lemoine ex Burbidge & Dean) N.E. Br.
Sin.: *Montbretia crocosmiiflora* Lemoine ex Burbidge & Dean
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Ravenna, P. F., 1969[1968]a; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1300 m.
Países: ARG(BAI, MIS, SAL); CHL(V, IX, X, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, M. 451* (MNES, SI), *Tolaba, J. A. 1314* (SI)]; CHL[*Matthei, O. R. 986* (CONC)].

Cypella Herb.

Número de especies: 23, 16 endémicas

[Cypella amambaica Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.
Notas: Nombre dudoso.

Cypella aquatilis Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1981g.
Hierba acuática. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 1037* (BR, Herb. Ravenna)].

Cypella armosa Ravenna
Sin.: *Cypella gracilis* (Herb.) Klatt f. *humilis* Baker ex Chodat & Hassl.
Referencias: Ravenna, P. F., 1981b, 2003j.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE); PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28556* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 27083* (CTES)].

Cypella bonariensis (Ten.) Niederl. = **Cypella herbertii** (Lindl.) Herb. subsp. **herbertii**
Referencias: Ravenna, P. F., 1969[1968]a.

Cypella brasiliensis (Baker) Roitman & A. Castillo
Sin.: *Alophia brasiliensis* (Baker) Kuntze, *Herbertia brasiliensis* Baker, *Kelissa brasiliensis* (Baker) Ravenna, *Trifurcia brasiliensis* (Baker) Goldblatt
Referencias: Ravenna, P. F., 1981h.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pabst, G. F. J. 6448* (HB), *Sellow, F. 2863* (B)].

Cypella catharinensis Ravenna = **Cypella herbertii** (Lindl.) Herb. subsp. **brevicristata** Ravenna

Cypella coelestis (Lehm.) Diels
Sin.: *Cypella plumbea* Lindl., *Marica coelestis* Lehm., *Phalocallis coelestis* (Lehm.) Ravenna, *Phalocallis plumbea* (Lindl.) Ravenna, *Tigridia coelestis* Lehm.
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903; Ravenna, P. F., 1977b, 2003j.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, GUA, PAI, SPE); URY(RIV, RNO, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 32038* (SI)]; BRA[*Stahl, L. 35745* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6219* (SI)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Cypella coriifolia Baker ex Chodat & Hassl. = **Trimezia spathata** (Klatt) Baker subsp. **martii** (Baker) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.

Cypella curuzupensis Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1981b, 2003j.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jörgensen, P. 3871* (BA, SI)].

Cypella cyrtoophylla (I.M. Johnst.) Diels = **Mastigostyla cyrtophylla** I.M. Johnst.
Referencias: Foster, R. C., 1962.

Cypella discolor Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1981b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 507* (Herb. Ravenna)].

Cypella elegans Speg.
Referencias: Spegazzini, C. L., 1917.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)].

Cypella exilis Ravenna
Sin.: *Cypella gracilis* (Klatt) Baker, nom. illeg., *Polia gracilis* Klatt
Referencias: Ravenna, P. F., 1981g.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(RGS); PRY(CAN, CEN, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Herb. Anchieta 38081* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 38081* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4212* (BM)].

Cypella fucata Ravenna
Referencias: Goldblatt, P. & Takei, M., 1997; Ravenna, P. F., 1981b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(CLA, MAL).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 500* (Herb. Ravenna), *Smith, L. B. 10003* (HBR)]; URY[*Castillo, J. s.n.* (MO)].

Cypella geniculata (Klatt) Ravenna
Sin.: *Alophia geniculata* Klatt, *Sisyrinchium coeruleum* Vell.
Referencias: Ravenna, P. F., 1962; Vieira, E. R., Santos, E. P. & Tardivo, R. C., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 1100–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Santos, E. P. 357* (MBM, UPCB)].

Cypella glauca Seub. ex Klatt = **Neomarica glauca** (Seub. ex Klatt) Sprague
Referencias: Sprague, T. A., 1928.

Cypella gracilis (Klatt) Baker, nom. illeg. = **Cypella exilis** Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1981g.

Cypella gracilis (Herb.) Klatt
Sin.: *Marica gracilis* Herb.
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Klatt, F. W., 1871.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jiménez, B. 1732* (PY)].
Notas: Cita dudosa para Argentina (Hauman & Vanderveken, 1917). Citada para Brasil sin mencionar localidad o material de referencia.

Cypella gracilis (Herb.) Klatt f. *humilis* Baker ex Chodat & Hassl. = **Cypella armosa** Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.

Cypella grandis Kraenzl. = **Trimezia spathata** (Klatt) Baker subsp. **grandis** (Kraenzl.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.

Cypella hauthalii (Kuntze) R.C. Foster subsp. **hauthalii**
Sin.: *Alophia hauthalii* Kuntze, *Herbertia hauthalii* (Kuntze) K. Schum.
Referencias: Foster, R. C., 1950; Ravenna, P. F., 1981b, 2003j.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(ITA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 474* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 1397* (SI)].

Cypella hauthalii (Kuntze) R.C. Foster subsp. **opalina** Ravenna
Referencias: Goldblatt, P. & Takei, M., 1997; Ravenna, P. F., 1981b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 25807* (CTES), *Múlgura de Romero, M. E. 2016* (SI)].

[Cypella herbertii (Lindl.) Herb. f. palmeti Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 1981b.
Notas: Nombre dudoso.

[Cypella herbertii (Lindl.) Herb. var. angustifolia Kuntze]
Notas: Nombre dudoso.

[Cypella herbertii (Lindl.) Herb. var. latifolia Kuntze]
Notas: Nombre dudoso.

Cypella herbertii (Lindl.) Herb. subsp. **brevicristata** Ravenna
Sin.: *Cypella catharinensis* Ravenna
Referencias: Goldblatt, P. & Takei, M., 1997; Ravenna, P. F., 1965, 2005m.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(SCA); URY(ART).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lourteig, A. 2180* (BAB)]; URY[*Ravenna, P. F. s.n.* (Herb. Ravenna)].

Cypella herbertii (Lindl.) Herb. subsp. **herbertii**
Sin.: *Cypella bonariensis* (Ten.) Niederl., *Moraea hebertii* Lindl., *Polia bonariensis* Ten., *Tigridia herbertii* (Lindl.) Herb.
Referencias: Baker, J. G., 1892; Ravenna, P. F., 1969[1968]a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, SCA); PRY(PHA); URY(ART, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 2821* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 23192* (NY)]; PRY[*Brunner, D. R. 1353* (MO)]; URY[*Felippone, F. 2153* (SI)].

[Cypella herbertii (Lindl.) Herb. subsp. reflexa Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 1981b.
Notas: Nombre dudoso.

Cypella herbertii (Lindl.) Herb. subsp. **wolffhuegeli** (Hauman) Ravenna
Sin.: *Cypella wolffhuegeli* Hauman
Referencias: Goldblatt, P. & Takei, M., 1997; Ravenna, P. F., 1965, 1969[1968]a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 4674* (SI)].

Cypella laeta Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1981b; Roitman, G. & Castillo, A., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(ERI, MIS); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 784* (SI)]; URY[*Roitman, G. s.n.* (BAA)].

Cypella lapidosa Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1981b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 25815* (CTES, Herb. Ravenna)].

Cypella laxa Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1981b, 2000b; Roitman, G. & Castillo, A., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–1200 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roitman, G. s.n.* (BAA)]; BRA[*Ravenna, P. F. 1008* (RB)]; PRY[*Soria, N. 4720* (FCQ)].

Cypella lilacea Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Basualdo, I. 3903* (FCQ)].

Cypella linearis (Kunth) Baker
Sin.: *Larentia linearis* (Kunth) Klatt, *Moraea linearis* Kunth
Referencias: Goldblatt, P. & Henrich, J. E., 1999; Ravenna, P. F., 2003j.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 1492* (G)].

Cypella oreophila Speg.
Sin.: *Phalocallis oreophila* (Speg.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1977b, 2003j.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–2800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); PRY(APY, CAA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1597* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4536* (SI)].

Cypella osteniana Beauverd subsp. **aurantiaca** Roitman & A. Castillo
Referencias: Roitman, G. & Castillo, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); URY(ART, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cusato, L. 1274* (BAA)]; URY[*Roitman, G. s.n.* (BAA)].

Cypella osteniana Beauverd subsp. **osteniana**
Referencias: Ravenna, P. F., 1977c; Roitman, G. & Castillo, A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(CAS, CLA, LAV).
Ejemplares de referencia: URY[*Rosengurtt, B. 2569* (MVFA)].

Cypella pabstiana Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1981b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22552* (MBM)].

Cypella plumbea Lindl. = **Cypella coelestis** (Lehm.) Diels

Cypella pusilla (Link, Klotzsch & Baker) Benth. & Hook. f.
Sin.: *Ferraria pusilla* Link, Klotzsch & Otto
Referencias: Baker, J. G., 1892; Ravenna, P. F., 1977c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).

Cypella unguiculata (Baker ex Ravenna) Roitman & A. Castillo
Sin.: *Herbertia unguiculata* Baker, nom. nud., *Onira unguiculata* Baker ex Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1983b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(CLA, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 55877* (B, ICN, U)]; URY[*Rosengurtt, B. 6649-b* (MVFA)].

Cypella wolffhuegeli Hauman = **Cypella herbertii** (Lindl.) Herb. subsp. **wolffhuegeli** (Hauman) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1965.

Echthronema graminifolium (Lindl.) Herb. = **Sisyrinchium graminifolium** Lindl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Echthronema maculatum (Hook.) Herb. = **Sisyrinchium graminifolium** Lindl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Echthronema pumilum (Lindl.) Herb. = **Sisyrinchium graminifolium** Lindl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Eleutherine Herb., nom. cons.

Número de especies: 2

[Eleutherine angusta Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 2003e.
Notas: Nombre dudoso.

Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb.
Sin.: *Eleutherine plicata* (Sw.) Herb., *Galatea americana* (Aubl.) Kuntze, *Galatea bulbosa* (Mill.) Britton, *Ixia americana* Aubl., *Marica plicata* (Sw.) Ker Gawl., *Moraea plicata* Sw., *Sisyrinchium bulbosum* Mill.
Referencias: Foster, R. C., 1946; Ravenna, P. F., 1977c.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 6098* (SI)].

Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. subsp. *citriodora* Ravenna = **Eleutherine latifolia** (Standl. & L.O. Williams) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1984a.

Eleutherine citriodora (Ravenna) Ravenna = **Eleutherine latifolia** (Standl. & L.O. Williams) Ravenna

Eleutherine latifolia (Standl. & L.O. Williams) Ravenna
Sin.: *Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb. subsp. *citriodora* Ravenna, *Eleutherine citriodora* (Ravenna) Ravenna

Referencias: Goldblatt, P. & Snow, N., 1991; Ravenna, P. F., 1965, 1984a.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3612* (SI)].

Eleutherine plicata (Sw.) Herb. = **Eleutherine bulbosa** (Mill.) Urb.
Referencias: Foster, R. C., 1946.

Ennealophus N.E. Br.

Número de especies: 3, 2 endémicas

Ennealophus euryandrus (Griseb.) Ravenna subsp. **euryandrus**
Sin.: *Alophia euryandra* (Griseb.) Lillo, *Herbertia euryandra* Griseb., *Sphenostigma euryandra* (Griseb.) Baker
Referencias: Ravenna, P. F., 1973a.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 3148* (SI)].

Ennealophus euryandrus (Griseb.) Ravenna subsp. **oxydandrus** Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2005c.
Hierba. Perenne. Endémica. 3700 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ravenna, P. F. 3700* (BA)].

Ennealophus fimbriatus Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1983a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1600–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4959* (BA, LIL, LP, NY, SI)].

Ennealophus simplex (Ravenna) Roitman & A. Castillo
Sin.: *Tucma simplex* Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1973a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4690* (LIL, SI)].

Ferraria elongata Graham = **Gelasine elongata** (Graham) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1988f.

Ferraria lahue Molina = **Herbertia lahue** (Molina) Goldblatt subsp. **lahue**
Referencias: Goldblatt, P., 1977; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Ferraria pusilla Link, Klotzsch & Otto = **Cypella pusilla** (Link, Klotzsch & Baker) Benth. & Hook. f.
Referencias: Baker, J. G., 1892.

Freesia Klatt

Número de especies: 2 introducidas

Freesia alba (G.L. Mey.) Gumbl.
Sin.: *Freesia refracta* (Jacq.) Klatt var. *alba* G.L. Mey.
Referencias: Hurrell, J. A. & Delucchi, G., 2005.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–200 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hurrell, J. A. 4064* (LP)].

Freesia laxa (Thunb.) Goldblatt & J.C. Manning
Sin.: *Gladiolus laxus* Thunb.
Referencias: Hurrell, J. A. & Delucchi, G., 2005.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roitman, G. s.n.* (BAA)].

Freesia refracta (Jacq.) Klatt var. *alba* G.L. Mey. = **Freesia alba** (G.L. Mey.) Gumbl.
Referencias: Hurrell, J. A. & Delucchi, G., 2005.

Galatea americana (Aubl.) Kuntze = **Eleutherine bulbosa** (Mill.) Urb.
Referencias: Foster, R. C., 1946.

Galatea bulbosa (Mill.) Britton = **Eleutherine bulbosa** (Mill.) Urb.
Referencias: Foster, R. C., 1946.

Galaxia narcissoides (Cav.) Willd. = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

Galaxia obscura Cav. = **Olsynium obscurum** (Cav.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Gelasine Herb.

Número de especies: 4, 2 endémicas

Gelasine azurea Herb. = **Gelasine elongata** (Graham) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1988f.

Gelasine caerulea (Vell.) Ravenna
Sin.: *Alophia sellowiana* Klatt, *Sisyrinchium caeruleum* Vell., *Sphenostigma sellowiana* (Klatt) Baker
Referencias: Ravenna, P. F., 1977b, 2003j.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2600 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CAU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 285* (SI)]; BRA[*Santos, E. P. 423* (CTES)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5698* (SI)].

Gelasine elongata (Graham) Ravenna
Sin.: *Alophia stricta* (Griseb.) Kuntze, *Ferraria elongata* Graham, *Gelasine azurea* Herb., *Herbertia stricta* Griseb.
Referencias: Baker, J. G., 1876a; Ravenna, P. F., 1988f.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI); URY(PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. s.n.* (SI)]; URY[*Bartlett, H. H. 21129* (SI)].

Gelasine nuda Herb. = **Calydorea nuda** (Herb.) Baker
Referencias: Baker, J. G., 1876a.

Gelasine paranaënsis Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2005m.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 40442* (MBM)].

Gelasine uruguaiensis Ravenna subsp. **orientalis** Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1984b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(CLA).
Ejemplares de referencia: URY[*Ravenna, P. F. 6* (Herb. Ravenna, MVM)].

Gelasine uruguaiensis Ravenna subsp. **uruguaiensis**
Referencias: Ravenna, P. F., 1984b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(DUR).
Ejemplares de referencia: URY[*Osten, C. 4304* (MVM, NY, SI)].

Gladiolus L.

Número de especies: 2 introducidas

Gladiolus biflorus Thunb. = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Gladiolus byzantinus Mill. = **Gladiolus communis** L.

Gladiolus communis L.
Sin.: *Gladiolus byzantinus* Mill.
Referencias: Hurrell, J. A. & Delucchi, G., 2005.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–200 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Delucchi, G. 49* (LP)].

Gladiolus laxus Thunb. = **Freesia laxa** (Thunb.) Goldblatt & J.C. Manning
Referencias: Hurrell, J. A. & Delucchi, G., 2005.

Gladiolus merianus L. = **Watsonia meriana** (L.) Mill.

Gladiolus tristis L.
Referencias: Hurrell, J. A. & Delucchi, G., 2005.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–200 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. s.n.* (SI)].

Herbertia Sweet

Número de especies: 5, 4 endémicas

Herbertia amatorum C.H. Wright = **Herbertia pulchella** Sweet

Herbertia amoena Griseb. = **Herbertia lahue** (Molina) Goldblatt subsp. **amoena** (Griseb.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., 1977.

Herbertia brasiliensis Baker = **Cypella brasiliensis** (Baker) Roitman & A. Castillo
Referencias: Ravenna, P. F., 1981h.

Herbertia crosae Roitman & A. Castillo
Referencias: Roitman, G. & Castillo, A., 2004.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: URY(ART).
Ejemplares de referencia: URY[*Roitman, G. s.n.* (BAA)].

Herbertia euryandra Griseb. = **Ennealophus euryandrus** (Griseb.) Ravenna subsp. **euryandrus**
Referencias: Ravenna, P. F., 1973a.

Herbertia hauthalii (Kuntze) K. Schum. = **Cypella hauthalii** (Kuntze) R.C. Foster subsp. **hauthalii**
Referencias: Ravenna, P. F., 1981b.

Herbertia lahue (Molina) Goldblatt subsp. **amoena** (Griseb.) Goldblatt
Sin.: *Alophia amoena* (Griseb.) Kuntze, *Alophia lahue* (Molina) Espinosa subsp. *amoena* (Griseb.) Ravenna, *Calydorea furcata* (Klatt) Baker, *Herbertia amoena* Griseb., *Nemastylis furcata* Klatt, *Trifurcia lahue* (Molina) Goldblatt subsp. *amoena* (Griseb.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., 1977; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Ravenna, P. F., 2003j.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(ITA, MIE, ÑEE); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 7790* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 1457* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 5185* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 148* (SI)].

Herbertia lahue (Molina) Goldblatt subsp. **lahue**
Sin.: *Alophia lahue* (Molina) Espinosa, *Ferraria lahue* Molina, *Trifurcia lahue* (Molina) Goldblatt subsp. *lahue*
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Goldblatt, P., 1975, 1977; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: ARG(RNE); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. s.n.* (BA)]; CHL[*Werdermann, E. 1215* (SI)].

[Herbertia platensis L.H. Bailey]
Referencias: Bailey, L. H., 1915.
Notas: Nombre dudoso.

Herbertia pulchella Sweet
Sin.: *Alophia pulchella* (Sweet) Kuntze, *Herbertia amatorum* C.H. Wright, *Trifurcia pulchella* (Sweet) Ravenna
Referencias: Goldblatt, P. & Takei, M., 1997; Goldblatt, P., 1977; Ravenna, P. F., 1984a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(CLA, LAV, MAL, MON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 29311* (NY)]; URY[*Herter, W. G. F. 537* (SI)].

Herbertia quareimana Ravenna
Referencias: Goldblatt, P. & Takei, M., 1997; Ravenna, P. F., 1989b, 2003d.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: ARG(COS); BRA(RGS); URY(ART).

Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 18530* (CTES)]; BRA[*Goldblatt, P. s.n.* (MO), *Ravenna, P. F. 999* (Herb. Ravenna, MVM, RB)]; URY[*Berro, M. B. s.n.* (MVM)].

Herbertia stricta Griseb. = **Gelasine elongata** (Graham) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1988f.

Herbertia tigridioides (Hicken) Goldblatt
Sin.: *Alophia tigridioides* Hicken, *Trifurcia tigridioides* (Hicken) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., 1975, 1977; Hicken, C. M., 1924b.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vattuone, I. C. 98* (SI), *Venturi, S. 4974* (SI)].

Herbertia unguiculata Baker, nom. nud. = **Cypella unguiculata** (Baker ex Ravenna) Roitman & A. Castillo
Referencias: Ravenna, P. F., 1983b.

Iris L.

Número de especies: 2 introducidas

Iris acoriformis Boreau = **Iris pseudacorus** L.
Referencias: Ravenna, P. F., 1969[1968]a.

Iris bastardii Boreau = **Iris pseudacorus** L.
Referencias: Ravenna, P. F., 1969[1968]a.

Iris curtopetala D. Delaroche ex Redouté = **Iris pseudacorus** L.
Referencias: Ravenna, P. F., 1969[1968]a.

Iris lutea Lam. = **Iris pseudacorus** L.
Referencias: Ravenna, P. F., 1969[1968]a.

Iris martinicensis Jacq. = **Trimezia martinicensis** (Jacq.) Herb.

Iris orientalis Mill.
Referencias: Delucchi, G., 1999; Steibel, P., Troiani, H. O. & Williamson, T., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Introducida. 0–300 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 16177* (SI)].

Iris paludosa Pers. = **Iris pseudacorus** L.
Referencias: Ravenna, P. F., 1969[1968]a.

Iris pseudacorus L.
Sin.: *Iris acoriformis* Boreau, *Iris bastardii* Boreau, *Iris curtopetala* D. Delaroche ex Redouté, *Iris lutea* Lam., *Iris paludosa* Pers.
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; Ravenna, P. F., 1969[1968]a; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].
Hierba palustre. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); CHL(X); URY(CAS, MON, ROC, SJO, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6960* (SI)]; CHL[*Rodríguez Ríos, R. 2803* (CONC)]; URY[*Alonso Paz, E. 2600* (MVFQ)].

Ixia americana Aubl. = **Eleutherine bulbosa** (Mill.) Urb.
Referencias: Foster, R. C., 1946.

Ixia bulbifera L. = **Sparaxis bulbifera** (L.) Ker Gawl.

Ixia magellanica Lam. = **Tapeinia pumila** (G. Forst.) Baill.
Referencias: Ravenna, P. F., 1969b.

Ixia pumila G. Forst. = **Tapeinia pumila** (G. Forst.) Baill.
Referencias: Moore, D. M., 1974; Ravenna, P. F., 1969b; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Kelissa brasiliensis (Baker) Ravenna = **Cypella brasiliensis** (Baker) Roitman & A. Castillo

Larentia linearis (Kunth) Klatt = **Cypella linearis** (Kunth) Baker

Lechera sisyrinchium Griseb. ex Lechl., nom. nud. = **Solenomelus segethii** (Phil.) Kuntze
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Libertia Spreng., nom. cons.

Número de especies: 6 endémicas

Libertia caerulescens Kunth & Bouché = **Libertia sessiliflora** (Poepp.) Skottsb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Libertia chilensis Klotzsch ex Baker, nom. nud. = **Libertia chilensis** (Molina) Gunckel
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Libertia chilensis (Molina) Gunckel
Sin.: *Choeradodia chilensis* Herb., *Libertia chilensis* Klotzsch ex Baker, nom. nud., *Libertia crassa* Graham, *Libertia elegans* Poepp., *Libertia formosa* Graham, *Libertia formosa* Graham var. *crassa* (Graham) Baker, *Libertia formosa* Graham var. *grandiflora* (Phil.) Johow, *Libertia grandiflora* Phil., *Libertia ixioides* auct. non (G. Forst.) Spreng., *Roterbe elegans* Steud. ex Baker, nom. nud., *Sisyrinchium fernandezianum* Steud. & Hochst., nom. nud., *Strumaria chilensis* Molina
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Goldblatt, P. & Celis, M., 2005; Ravenna, P. F., 1968, 1969b; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schajowskoy, S. s.n.* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 59* (SI)].

Libertia crassa Graham = **Libertia chilensis** (Molina) Gunckel

Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Libertia elegans Poepp. = **Libertia chilensis** (Molina) Gunckel
Referencias: Ravenna, P. F., 1969b; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Libertia falcata Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2005f.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. s.n.* (BA)].

Libertia formosa Graham = **Libertia chilensis** (Molina) Gunckel
Referencias: Ravenna, P. F., 1969b; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Libertia formosa Graham var. *crassa* (Graham) Baker = **Libertia chilensis** (Molina) Gunckel
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Libertia formosa Graham var. *grandiflora* (Phil.) Johow = **Libertia chilensis** (Molina) Gunckel
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Libertia grandiflora Phil. = **Libertia chilensis** (Molina) Gunckel
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Libertia insignis Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2005f.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(X, XI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 59* (SI)].

Libertia ixioides auct. non (G. Forst.) Spreng. = **Libertia chilensis** (Molina) Gunckel
Referencias: Ravenna, P. F., 1969b; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Libertia sessiliflora (Poepp.) Skottsb.
Sin.: *Libertia caerulescens* Kunth & Bouché, *Sisyrinchium coerulescens* F. Muell., *Sisyrinchium huismo* Dombey ex Baker, nom. nud., *Sisyrinchium sessiliflorum* Poepp.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Goldblatt, P. & Celis, M., 2005; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(V, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Aravena 25* (SI), *Arroyo, M. T. K. 994802* (CONC, SGO)].

Libertia tricocca Phil.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Goldblatt, P. & Celis, M., 2005; Ravenna, P. F., 1977c; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bridges, T. C. 728* (SI), *Germain, P. s.n.* (SGO)].

Libertia umbellata Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2005f.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–700 m.
Países: CHL(IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hollermayer, A. s.n.* (SI)].

Marica caerulea Ker Gawl. = **Neomarica caerulea** (Ker Gawl.) Sprague
Referencias: Henrich, J. E. & Goldblatt, P., 1994; Sprague, T. A., 1928.

Marica candida Hassl. = **Neomarica candida** (Hassl.) Sprague

Marica coelestis Lehm. = **Cypella coelestis** (Lehm.) Diels

Marica glauca (Seub. ex Klatt) Baker = **Neomarica glauca** (Seub. ex Klatt) Sprague
Referencias: Sprague, T. A., 1928.

Marica gracilis Herb. = **Cypella gracilis** (Herb.) Klatt
Referencias: Klatt, F. W., 1871.

Marica martii Baker = **Trimezia spathata** (Klatt) Baker subsp. **martii** (Baker) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.

Marica plicata (Sw.) Ker Gawl. = **Eleutherine bulbosa** (Mill.) Urb.
Referencias: Foster, R. C., 1946.

Marica striata (Sm.) Ker Gawl. = **Sisyrinchium striatum** Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Mastigostyla I.M. Johnst.

Número de especies: 7, 5 endémicas

Mastigostyla brachiandra Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1962.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ravenna, P. F. 72* (Herb. Ravenna)].

Mastigostyla cabrerae R.C. Foster
Referencias: Foster, R. C., 1950, 1962.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8255* (GH), *Vignati s.n.* (SI)].

Mastigostyla cyrtophylla I.M. Johnst.
Sin.: *Cypella cyrtoophylla* (I.M. Johnst.) Diels
Referencias: Foster, R. C., 1962; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 1992, 2001[2000].
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3800 m.
Países: CHL(I, II).

Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 84629* (CONC)].

Mastigostyla implicata Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1962.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–3600 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3602* (LIL)].

Mastigostyla joergensii R.C. Foster = **Mastigostyla spathacea** (Griseb.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1965.

Mastigostyla johnstoni R.C. Foster
Referencias: Foster, R. C., 1945, 1962.
Hierba. Perenne. Endémica. 3200–3600 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4636* (GH, SI, US)].

Mastigostyla mirabilis Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1962, 1977c.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ravenna, P. F. 69* (Herb. Ravenna)].

Mastigostyla spathacea (Griseb.) Ravenna
Sin.: *Chlamydostylus spathaceus* (Griseb.) Griseb., *Mastigostyla joergensii* R.C. Foster, *Nemastylis spathacea* Griseb.
Referencias: Foster, R. C., 1950, 1962; Ravenna, P. F., 1965.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Forzza, R. C. 1984* (SI), *Jörgensen, P. 1218* (BA, SI)].

Montbretia crocosmiiflora Lemoine ex Burbidge & Dean = **Crocosmia crocosmiiflora** (Lemoine ex Burbidge & Dean) N.E. Br.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Moraea hebertii Lindl. = **Cypella herbertii** (Lindl.) Herb. subsp. **herbertii**
Referencias: Ravenna, P. F., 1969[1968]a.

Moraea linearis Kunth = **Cypella linearis** (Kunth) Baker

Moraea magellanica (Lam.) Willd. = **Tapeinia pumila** (G. Forst.) Baill.
Referencias: Ravenna, P. F., 1969b.

Moraea northiana Schneev. = **Neomarica northiana** (Schneev.) Sprague
Referencias: Sprague, T. A., 1928.

Moraea plicata Sw. = **Eleutherine bulbosa** (Mill.) Urb.
Referencias: Foster, R. C., 1946.

Moraea sertata Jacq. = **Sisyrinchium striatum** Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Nemastylis furcata Klatt = **Herbertia lahue** (Molina) Goldblatt subsp. **amoena** (Griseb.) Goldblatt
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.

Nemastylis spathacea Griseb. = **Mastigostyla spathacea** (Griseb.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1965.

Neomarica Sprague

Número de especies: 5, 2 endémicas

Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague
Sin.: *Marica caerulea* Ker Gawl., *Trimezia caerulea* (Ker Gawl.) Ravenna
Referencias: Hassler, E., 1922; Henrich, J. E. & Goldblatt, P., 1994; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Ravenna, P. F., 1977c; Sprague, T. A., 1928.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAN, COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 13718* (NY)]; PRY[*Jiménez, B. 1477* (BM, CTES, PY)].

Neomarica candida (Hassl.) Sprague
Sin.: *Marica candida* Hassl., *Trimezia candida* (Hassl.) Ravenna
Referencias: Hassler, E., 1922; Ravenna, P. F., 1977c, 2003j.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(APY, APA, AMA, CAA, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gamerro, J. C. 79* (SI)]; BRA[*Silva, J. M. 1236* (CTES)]; PRY[*Jörgensen, P. 7531* (SI)].

Neomarica glauca (Seub. ex Klatt) Sprague
Sin.: *Cypella glauca* Seub. ex Klatt, *Marica glauca* (Seub. ex Klatt) Baker
Referencias: Baker, J. G., 1892; Sprague, T. A., 1928.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sellow, F. 1210* (B)].

Neomarica martii (Baker) Sprague = **Trimezia spathata** (Klatt) Baker subsp. **martii** (Baker) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.

Neomarica northiana (Schneev.) Sprague
Sin.: *Moraea northiana* Schneev.
Referencias: Goldblatt, P. & Takei, M., 1997; Sprague, T. A., 1928.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 6966* (NY)]; PRY[*Solomon, J. C. 6950* (MO)].

Neomarica rotundata (Ravenna) Chukr
Sin.: *Trimezia rotundata* Ravenna
Referencias: Chukr, N. S. & Giulietti, A. M., 2001; Ravenna, P. F., 1988c.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 760* (BR, Herb. Ravenna, K, MBM, RB)].

Olsynium Raf.

Número de especies: 12, 10 endémicas

Olsynium argentinense (Hauman) Ravenna = **Olsynium junceum** (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. **junceum**
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

Olsynium biflorum (Thunb.) Goldblatt
Sin.: *Galaxia narcissoides* (Cav.) Willd., *Gladiolus biflorus* Thunb., *Phaiophleps biflora* (Thunb.) R.C. Foster, *Phaiophleps odoratissimum* (Lindl.) Raf., *Phaiophleps patagonica* (Speg.) R.C. Foster, *Sisyrinchium narcissoides* Cav., *Sisyrinchium odoratissimum* Lindl., *Solenomelus biflorus* (Thunb.) Baker, *Symphyostemon biflorus* (Thunb.) Dusén, *Symphyostemon narcissoides* (Cav.) Miers ex Klatt, *Symphyostemon odoratissimum* (Lindl.) Miers, *Symphyostemon patagonicum* Speg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Ravenna, P. F., 1969b; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*James, P. 232* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92088* (CONC, SGO)].

Olsynium bodenbenderi (Kurtz) Goldblatt
Sin.: *Chamelum bodenbenderi* Kurtz, *Chamelum rubellum* Ravenna
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Ravenna, P. F., 1968, 1969b.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. 7180* (SI), *Ruíz Leal, R. A. 21909* (BAB, K, MERL)].

Olsynium chrysochromum J.M. Watson & A.R. Flores
Sin.: *Chamelum luteum* Phil., hom. illeg., *Olsynium luteum* (Phil.) Goldblatt, nom. illeg.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 1992, 2001[2000]; Watson, J. & Flores, A., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3500 m.
Países: CHL(IV, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ruthsatz, B. 6346* (CONC)].

Olsynium filifolium (Gaudich.) Goldblatt
Sin.: *Sisyrinchium filifolium* Gaudich., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex J. Presl subsp. *filifolium* (Gaudich.) Ravenna
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Ravenna, P. F., 1968, 1969b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dimitri, M. J. 11132* (SI), *Skottsberg, C. J. F. 12* (BA)].
Notas: Excluida de la flora de Chile (Rodríguez Ríos & Marticorena, 2001).

Olsynium frigidum (Poepp.) Goldblatt
Sin.: *Chamelum andinum* (Phil.) Benth. & Hook., *Chamelum frigidum* (Poepp.) Ravenna, *Sisyrinchium andinum* Phil., *Sisyrinchium frigidum* Poepp., *Solenomelus andinus* (Phil.) Baker, *Solenomelus frigidus* (Poepp.) Klatt, *Susarium andinum* (Phil.) Phil.
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Ravenna, P. F., 1969b; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 1100–2700 m.
Países: ARG(NEU); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 14284* (SI)]; CHL[*Marticorena, C. 101* (CONC)].

Olsynium junceum (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. **colchaguense** (Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores
Sin.: *Sisyrinchium colchaguense* Phil., *Sisyrinchium eleutherostemon* Phil., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl subsp. *colchaguense* (Phil.) R. Rodr., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl var. *colchaguense* (Phil.) Baker
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2600 m.
Países: CHL(VI, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (B)].

Olsynium junceum (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. **depauperatum** (Phil.) R. Rodr. & Martic.
Sin.: *Sisyrinchium depauperatum* Phil., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl subsp. *depauperatum* (Phil.) R. Rodr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: CHL(IV, VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barnier, A. 136* (CONC)].

Olsynium junceum (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. **junceum**
Sin.: *Olsynium argentinense* (Hauman) Ravenna, *Sisyrinchium argentinense* Hauman, *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex J. Presl, *Sisyrinchium junciforme* Poepp., *Sisyrinchium middletoni* Baker, *Sisyrinchium pauciflorum* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 1800–2600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 15921* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20176* (CONC)].

Olsynium luteum (Phil.) Goldblatt, nom. illeg. = **Olsynium chrysochromum** J.M. Watson & A.R. Flores
Referencias: Watson, J. & Flores, A., 1994.

Olsynium lyckholmi (Dusén) Goldblatt
Sin.: *Phaiophleps biflora* (Thunb.) R.C. Foster subsp. *lyckholmi* (Dusén) Goldblatt, *Symphyostemon lyckholmi* Dusén
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Goldblatt, P., Rudall, P. &

Henrich, J. E., 1990; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1100 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*T.B.P.A. 2291* (BAA)]; CHL[*Pisano, E. 3657* (CONC)].

Olsynium nigricans (Phil.) R. Rodr. & Martic.
Sin.: *Phaiophleps nigricans* (Phil.) R.C. Foster, *Sisyrinchium maulense* Ravenna, *Solenomelus nigricans* (Phil.) Baker, *Susarium nigricans* Phil., *Symphyostemon nigricans* (Phil.) Benth. ex Baker
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 1992, 2001[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: CHL(IV, VI, VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1561* (CONC)].

Olsynium obscurum (Cav.) Goldblatt
Sin.: *Galaxia obscura* Cav., *Ona obscura* (Cav.) Ravenna, *Tapeinia obscura* (Cav.) D.M. Moore
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 900 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Moore, D. M. 1625* (*)]; CHL[*García, N. 40* (CONC)].

Olsynium philippii (Klatt) Goldblatt subsp. **illapelinum** (Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores
Sin.: *Sisyrinchium illapelinum* Phil., *Sisyrinchium philippii* Klatt subsp. *illapelinum* (Phil.) Rodr., *Sisyrinchium roseum* Phil., hom. illeg.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3200 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 408* (CONC)].

Olsynium philippii (Klatt) Goldblatt subsp. **philippii**
Sin.: *Sisyrinchium philippii* Klatt, *Sisyrinchium scabrum* Phil., hom. illeg.
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles, C. 3550* (CONC)].

Olsynium scirpoideum (Poepp.) Goldblatt subsp. **leucanthum** (Colla) R. Rodr. & Martic.
Sin.: *Sisyrinchium bifolium* Phil., *Sisyrinchium filiforme* Steud., nom. inval., *Sisyrinchium leucanthum* Colla, *Sisyrinchium nuno* Colla var. *leucanthum* (Colla) Baker, *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp. subsp. *leucanthum* (Colla) R. Rodr., *Sisyrinchium stenophyllum* Phil.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: CHL(V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 429* (CONC)].

Olsynium scirpoideum (Poepp.) Goldblatt subsp. **luridum** (Ravenna) R. Rodr. & Martic.
Sin.: *Sisyrinchium luridum* Ravenna, *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp. subsp. *luridum* (Ravenna) R. Rodr.
Referencias: Ravenna, P. F., 1967b; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 5432* (BAB, SI)]; CHL[*Quezada, M. 210* (CONC)].

Olsynium scirpoideum (Poepp.) Goldblatt subsp. **scirpeum** (Phil.) R. Rodr. & Martic.
Sin.: *Sisyrinchium scirpeum* Phil., *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp. subsp. *scirpeum* (Phil.) R. Rodr., *Sisyrinchium stenopetalum* Phil.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Germain, P. s.n.* (SGO)].

Olsynium scirpoideum (Poepp.) Goldblatt subsp. **scirpoideum**
Sin.: *Sisyrinchium asperulum* Phil., *Sisyrinchium berteroanum* Phil., *Sisyrinchium floribundum* Phil., *Sisyrinchium gracile* Phil., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl var. *asperulum* (Phil.) Baker, *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl var. *gracile* (Phil.) Baker, *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl var. *scirpiforme* (Poepp.) Baker, *Sisyrinchium junciforme* Poepp. var. *nivale* Phil., *Sisyrinchium nivale* Phil., *Sisyrinchium nunna* Steud., *Sisyrinchium nuno* Colla, *Sisyrinchium scirpiforme* Poepp., *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp., *Sisyrinchium strictum* Phil., nom. nud.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2300 m.
Países: CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1592* (CONC)].
Notas: Citada para Argentina sin indicar localidad o material de referencia (Goldblatt et al., 1990).

Olsynium trinerve (Baker) R. Rodr. & Martic.
Sin.: *Sisyrinchium trinerve* Baker
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4100 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 158a* (CONC)].

Ona obscura (Cav.) Ravenna = **Olsynium obscurum** (Cav.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

Onira unguiculata Baker ex Ravenna = **Cypella unguiculata** (Baker ex Ravenna) Roitman & A. Castillo

Orthrosanthus Sweet

Número de especies: 1

Orthrosanthus chimboracensis (Kunth) Baker subsp. *tunariensis* (Kuntze) Ravenna = **Orthrosanthus occissapungus** (Ruiz ex Klatt) Diels, Engl. & Prantl
Referencias: Henrich, J. E. & Goldblatt, P., 1987.

Orthrosanthus nigrorhynchus Rusby = **Orthrosanthus occissapungus** (Ruiz ex Klatt) Diels, Engl. & Prantl
Referencias: Henrich, J. E. & Goldblatt, P., 1987.

Orthrosanthus occissapungus (Ruiz ex Klatt) Diels, Engl. & Prantl
Sin.: *Orthrosanthus chimboracensis* (Kunth) Baker subsp. *tunariensis* (Kuntze) Ravenna, *Orthrosanthus nigrorhynchus* Rusby, *Orthrosanthus tunariensis* Kuntze, *Sisyrinchium occissapungus* Ruiz ex Klatt
Referencias: Henrich, J. E. & Goldblatt, P., 1987; Ravenna, P. F., 1981a.
Hierba. Perenne. Nativa. 3200–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 5806* (LP)].

Orthrosanthus tunariensis Kuntze = **Orthrosanthus occissapungus** (Ruiz ex Klatt) Diels, Engl. & Prantl
Referencias: Henrich, J. E. & Goldblatt, P., 1987.

Paneguia striata (Sm.) Raf. = **Sisyrinchium striatum** Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Phaiophleps biflora (Thunb.) R.C. Foster = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

Phaiophleps biflora (Thunb.) R.C. Foster subsp. *lyckholmi* (Dusén) Goldblatt = **Olsynium lyckholmi** (Dusén) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

Phaiophleps brasiliensis Ravenna = **Sisyrinchium brasiliense** (Ravenna) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001a.

Phaiophleps lainezii (Hicken) R.C. Foster = **Sisyrinchium filifolium** Gaudich. subsp. **lainezii** (Hicken) Ravenna

Phaiophleps nigricans (Phil.) R.C. Foster = **Olsynium nigricans** (Phil.) R. Rodr. & Martic.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 1992.

Phaiophleps odoratissimum (Lindl.) Raf. = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

Phaiophleps patagonica (Speg.) R.C. Foster = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

Phalocallis coelestis (Lehm.) Ravenna = **Cypella coelestis** (Lehm.) Diels

Phalocallis oreophila (Speg.) Ravenna = **Cypella oreophila** Speg.

Phalocallis plumbea (Lindl.) Ravenna = **Cypella coelestis** (Lehm.) Diels

Polia bonariensis Ten. = **Cypella herbertii** (Lindl.) Herb. subsp. **herbertii**
Referencias: Ravenna, P. F., 1969[1968]a.

Polia gracilis Klatt = **Cypella exilis** Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1981g.

Roterbe campestris Klatt = **Calydorea campestris** (Klatt) Baker
Referencias: Baker, J. G., 1892.

Roterbe elegans Steud. ex Baker, nom. nud. = **Libertia chilensis** (Molina) Gunckel
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Roterbe nuda (Herb.) Klatt = **Calydorea nuda** (Herb.) Baker
Referencias: Baker, J. G., 1876a.

Sisyrinchium L.

Número de especies: 91, 61 endémicas

Sisyrinchium acaule Klatt
Referencias: Ravenna, P. F., 2002d.
Hierba. Perenne. Endémica. 3600–4400 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 17549* (LP)].

Sisyrinchium adenocarpum Steud. = **Sisyrinchium cuspidatum** Poepp.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium adenostemon Phil. = **Sisyrinchium arenarium** Poepp. subsp. **adenostemon** (Phil.) Ravenna
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium adenostemon Phil. subsp. *microspathum* (Phil.) Ravenna = **Sisyrinchium arenarium** Poepp. subsp. **arenarium**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium alatum Hook.
Referencias: Beauverd, G., 1905; Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903; Grisebach, A. H. R., 1879; Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, MIS, TUC); PRY(CAN, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1914* (SI), *Rodríguez, F. M. 630* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 15465* (MO, PY)].

Sisyrinchium altissimum Ten. = **Sisyrinchium palmifolium** L. subsp. **palmifolium**

Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Sisyrinchium andinum Phil. = **Olsynium frigidum** (Poepp.) Goldblatt
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium angustifolium Phil. = **Sisyrinchium arenarium** Poepp. subsp. **arenarium**
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium annuum Ravenna, nom. inval. = **Sisyrinchium annuum** Ravenna

Sisyrinchium annuum Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium annuum* Ravenna, nom. inval.
Referencias: Ravenna, P. F., 2002d.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 1780* (Herb. Ravenna, MBM)].

Sisyrinchium arenarium Poepp. subsp. **adenostemon** (Phil.) Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium adenostemon* Phil., *Sisyrinchium pauperculum* Phil.
Referencias: Ravenna, P. F., 1967b, 1969b; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3200 m.
Países: ARG(MEN, SCR); CHL(V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 5386* (MERL)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Sisyrinchium arenarium Poepp. subsp. **arenarium**
Sin.: *Sisyrinchium adenostemon* Phil. subsp. *microspathum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrinchium angustifolium* Phil., *Sisyrinchium arenarium* Poepp. subsp. *microspathum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrinchium flexuosum* Lindl., *Sisyrinchium microspathum* Phil., *Sisyrinchium multiflorum* Phil., *Sisyrinchium nervosum* Phil., *Sisyrinchium oligostachyum* Phil., *Sisyrinchium striatum* Sm. var. *microspathum* (Phil.) Speg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Ravenna, P. F., 1969b; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986; Sancho, M. L., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(CHA, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 18002* (SI), *Schajowskoy, S. 130* (M)]; CHL[*Burkart, A. 27461* (SI)].

Sisyrinchium arenarium Poepp. subsp. *microspathum* (Phil.) Ravenna = **Sisyrinchium arenarium** Poepp. subsp. **arenarium**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium argentinense Hauman = **Olsynium junceum** (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. **junceum**
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

Sisyrinchium arrayanicum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002d.
Hierba. Perenne. Endémica. 2700 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 3252* (BA)].

Sisyrinchium ascendens Poepp. = **Sisyrinchium graminifolium** Lindl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium asperulum Phil. = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **scirpoideum**
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium aurantiacum Griseb. = **Sisyrinchium unguiculatum** Griseb.
Referencias: Ravenna, P. F., 2001j.

Sisyrinchium avenaceum Klatt
Referencias: Grisebach, A. H. R., 1879; Johnston, I. M., 1938a; Sancho, M. L., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SAL, TUC); BRA(RGS); URY(FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. s.n.* (GH, SI)]; BRA[*Rambo, B. 33889* (SI), *Rambo, B. 37800* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 823* (SI), *Rosengurtt, B. 2193-b* (GH)].

Sisyrinchium azureum Phil. = **Sisyrinchium chilense** Hook. subsp. **chilense**
Referencias: Ravenna, P. F., 2001j.

Sisyrinchium balansae Baker
Sin.: *Sisyrinchium deflexum* R.C. Foster
Referencias: Baker, J. G., 1892; Ravenna, P. F., 2003j.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAA, GUA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 547* (K)].
Notas: Citada para Misiones, Argentina sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Ravenna, 2003j).

[Sisyrinchium bermudianum L. var. exaltatum Kuntze]
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.
Notas: Nombre dudoso.

Sisyrinchium berteroanum Phil. = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **scirpoideum**
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium biflorum Griseb.
Referencias: Grisebach, A. H. R., 1879; Sancho, M. L., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 730* (B, CORD)].

Sisyrinchium bifolium Phil. = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **leucanthum** (Colla) R. Rodr. & Martic.

Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

[Sisyrinchium bogotense Kunth]
Sin.: *Sisyrinchium pumilum* auct. non (G. Forst.) Hook.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Sisyrinchium bracteosum Phil. = **Sisyrinchium striatum** Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium brasiliense (Ravenna) Ravenna
Sin.: *Phaiophleps brasiliensis* Ravenna, *Sisyrinchium spicatum* Seub. ex Klatt, hom. illeg.
Referencias: Ravenna, P. F., 1968, 2000l, 2002g.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 9241* (CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 9822* (HB, MBM)].

Sisyrinchium breviarmium Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002d.
Hierba. Perenne. Endémica. 1800–1900 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 3882* (BA, BM, Herb. Ravenna)].

Sisyrinchium brevipes Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b; Foster, R. C., 1948; Ravenna, P. F., 2002d.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000–4500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30566* (SI), *Cabrera, A. L. 7846* (LP)].

Sisyrinchium bromelioides R.C. Foster subsp. **angustius** Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002g.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 2689* (CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 22645* (MBM)].

Sisyrinchium bromelioides R.C. Foster subsp. **bromelioides**
Referencias: Foster, R. C., 1962; Ravenna, P. F., 2002g.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Leite, J. E. 2032* (SI)].

Sisyrinchium bulbosum Mill. = **Eleutherine bulbosa** (Mill.) Urb.
Referencias: Foster, R. C., 1946.

Sisyrinchium caeruleum Vell. = **Gelasine caerulea** (Vell.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1977b.

Sisyrinchium calathinum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002g, 2003j.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAU, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4784* (G)].

Sisyrinchium chilense Hook. var. *exaltatum* (Kuntze) Hicken = **Sisyrinchium pachyrhizum** Baker subsp. **pachyrhizum**
Referencias: Ravenna, P. F., 2001j.

[Sisyrinchium chilense Hook. var. geniculatum (Herb.) Hicken]
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.
Notas: Nombre dudoso.

Sisyrinchium chilense Hook. var. *scabrum* (Cham. & Schltdl.) Baker = **Sisyrinchium scabrum** Cham. & Schltdl.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Sisyrinchium chilense Hook. subsp. **chilense**
Sin.: *Sisyrinchium azureum* Phil., *Sisyrinchium graminifolium* auct. non Lindl., *Sisyrinchium iridifolium* auct. non Kunth, *Sisyrinchium iridifolium* Kunth subsp. *valdivianum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrinchium ramosum* Herb. var. *chilense* (Hook.) Herb., *Sisyrinchium scabrum* Cham. & Schltdl. var. *exaltatum* Klatt, *Sisyrinchium uniflorum* Gay ex Phil.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Broughton, D. A., Adam, J. H. M. & Brännström, R., 2000; Ravenna, P. F., 1968, 1969b, 2001j; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1984, 1986; Sancho, M. L., 1982.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC); BRA(PAR); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME); URY(CAS, CLA, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. 613* (SI)]; BRA [*Dombrowski, L. T. 6663* (MBM)]; CHL[*Gay, C. 408* (SGO)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 2400* (MVFA)].

Sisyrinchium chilense Hook. subsp. **macranthum** (Griseb.) Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium macranthum* Griseb.
Referencias: Grisebach, A. H. R., 1879; Ravenna, P. F., 2001j; Sancho, M. L., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–3500 m.
Países: ARG(CAT, COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 420* (CORD, SI)].

Sisyrinchium ciliolatum (Ravenna) Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium vaginatum* Spreng. subsp. *ciliolatum* Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1981c, 2002g.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(COS, ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 16625* (CTES)].

Sisyrinchium clarazii Baker = **Sisyrinchium unguiculatum** Griseb.
Referencias: Ravenna, P. F., 2001j.

Sisyrinchium claritae Herter
Referencias: Herter, W. G. F., 1937; Johnston, I. M., 1938a; Ravenna, P. F., 2002g.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(RGS); URY(LAV, ROC, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Charpin, A. 20090* (SI)]; BRA[*Lindman, C. A. M. 819* (GH, US)]; URY[*Herter, W. G. F. 1525* (G, US)].

Sisyrinchium coalitum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000l.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 13900* (HBR, Herb. Ravenna)].

Sisyrinchium coerulescens F. Muell. = **Libertia sessiliflora** (Poepp.) Skottsb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium coeruleum Vell. = **Cypella geniculata** (Klatt) Ravenna
Referencias: Vieira, E. R., Santos, E. P. & Tardivo, R. C., 2003.

Sisyrinchium colchaguense Phil. = **Olsynium junceum** (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. **colchaguense** (Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium commutatum Klatt
Sin.: *Sisyrinchium secundiflorum* Klatt
Referencias: Johnston, I. M., 1938a; Ravenna, P. F., 2003j; Sancho, M. L., 1982; Vieira, E. R., Santos, E. P. & Tardivo, R. C., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(CEN, COA, ITA, MIE, PAI); URY(CLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 292a* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13266* (SI, US)]; PRY[*Schinini, A. 3258* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 2371* (MVFA)].

Sisyrinchium congestum Klatt
Sin.: *Sisyrinchium eserrulatum* I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1938a; Ravenna, P. F., 1981c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bornmüller, J. F. N. 236 p.p.* (GH)].

Sisyrinchium convallium Ravenna = **Sisyrinchium cuspidatum** Poepp.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium cuspidatum Poepp.
Sin.: *Sisyrinchium adenocarpum* Steud., *Sisyrinchium convallium* Ravenna, *Sisyrinchium longifolium* Phil.
Referencias: Kenton, A. Y., Rundall, P. J. & Johnson, A. R., 1986; Ravenna, P. F., 1981c; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 2663* (BAB)]; CHL[*Marticorena, C. 292* (CONC), *Ravenna, P. F. 3040* (C, Herb. Ravenna, K, SGO)].

Sisyrinchium cylindrocarpium Herter
Referencias: Herter, W. G. F., 1943c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: URY[*Osten, C. 3034* (MVM)].

Sisyrinchium dasycarpum Phil. = **Sisyrinchium graminifolium** Lindl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium dasypathum (Ravenna) Ravenna subsp. **dasyspathum**
Sin.: *Sisyrinchium hirsutum* Baker ex Hassl. & Chodat subsp. *dasypathum* Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002g, 2003j.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA); PRY(ITA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Mroginsky, L. 778* (CTES, Herb. Ravenna), *Ravenna, P. F. 1097* (Herb. Ravenna, K)]; BRA[*Reitz, P. R. 8414* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 1374* (G, SI)].

Sisyrinchium dasypathum (Ravenna) Ravenna subsp. **glabrium** Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002g.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 26243* (CTES)].

Sisyrinchium decumbens Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002d.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 1800* (Herb. Ravenna)].

Sisyrinchium deflexum R.C. Foster = **Sisyrinchium balansae** Baker
Referencias: Ravenna, P. F., 2002g.

Sisyrinchium densiflorum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1991f.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Cordeiro, J. 65* (SI), *Lindeman, J. C. 2446* (Herb. Ravenna, U)].

Sisyrinchium depauperatum Phil. = **Olsynium junceum** (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. **depauperatum** (Phil.) R. Rodr. & Martic.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium distantiflorum Kraenzl. = **Sisyrinchium vaginatum** Spreng. subsp. **vaginatum**
Referencias: Ravenna, P. F., 1969[1968]a.

Sisyrinchium eleutherostemon Phil. = **Olsynium junceum** (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. **colchaguense** (Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium eserrulatum I.M. Johnst. = **Sisyrinchium congestum** Klatt
Referencias: Ravenna, P. F., 1981c.

Sisyrinchium exaltatum (Klatt) Herter = **Sisyrinchium pachyrhizum** Baker subsp. **pachyrhizum**
Referencias: Ravenna, P. F., 2001j.

Sisyrinchium fasciculatum Klatt subsp. **fasciculatum**
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Johnston, I. M., 1938a; Ravenna, P. F., 2003j.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(CAU, CAA, CAN, COA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 8510* (CTES)]; BRA[*Ziller, S. R. 1481* (MBM)]; PRY[*Burkart, A. 18865* (SI)].

Sisyrinchium fasciculatum Klatt subsp. **hoehneii** (I.M. Johnst.) Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium hoehnei* I.M. Johnst.
Referencias: Fontana, J. L., 1993; Johnston, I. M., 1938a; Ravenna, P. F., 2002g, 2003j.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, CAU, MIE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 554* (SI)]; BRA[*Hoehne, F. C. 23057* (GH)]; PRY[*Montes, J. E. 9830* (CTES)].

Sisyrinchium fernandezianum Steud. & Hochst., nom. nud. = **Libertia chilensis** (Molina) Gunckel
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium fiebrigii I.M. Johnst.
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); PRY(CAA, CAN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 61328* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 220* (GH)].
Notas: Citada para Misiones, Argentina, sin indicar ejemplar de referencia (Ravenna, 2003j).

Sisyrinchium filifolium Gaudich. = **Olsynium filifolium** (Gaudich.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

[Sisyrinchium filifolium Gaudich. subsp. lainezii (Hicken) Ravenna]
Sin.: *Phaiophleps lainezii* (Hicken) R.C. Foster, *Symphyostemon lainezii* Hicken
Referencias: Ravenna, P. F., 1981c.
Notas: Nombre dudoso.

Sisyrinchium filiforme Steud., nom. inval. = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **leucanthum** (Colla) R. Rodr. & Martic.
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

Sisyrinchium flexuosum Lindl. = **Sisyrinchium arenarium** Poepp. subsp. **arenarium**
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium floribundum Phil. = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **scirpoideum**
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium foliosum I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1938a; Ravenna, P. F., 1968; Sancho, M. L., 1982.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, TUC); PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2299* (GH, SI), *Venturi, S. 1901* (GH, SI, US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 253a* (F)].

Sisyrinchium frigidum Poepp. = **Olsynium frigidum** (Poepp.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

[Sisyrinchium geniculatum Herb.]
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Johnston, I. M., 1938a.
Notas: Nombre dudoso.

Sisyrinchium gilberti Kraenzl. = **Sisyrinchium hirsutum** Baker ex Hassl. & Chodat
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.

Sisyrinchium glandulosum Kraenzl. = **Sisyrinchium pachyrhizum** Baker subsp. **pachyrhizum**
Referencias: Johnston, I. M., 1938a; Ravenna, P. F., 1968.

Sisyrinchium glaziovii Baker
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 35198* (SI)].

Sisyrinchium gracile Klotzsch ex Baker, hom. illeg. = **Sisyrinchium megapotamicum** Malme
Referencias: Johnston, I. M., 1938a; Ravenna, P. F., 1969[1968]a.

Sisyrinchium gracile Phil. = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **scirpoideum**
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium graminifolium auct. non Lindl. = **Sisyrinchium chilense** Hook. subsp. **chilense**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1984, 1986.

Sisyrinchium graminifolium Lindl.
Sin.: *Echthronema graminifolium* (Lindl.) Herb., *Echthronema maculatum* (Hook.) Herb., *Echthronema pumilum* (Lindl.) Herb., *Sisyrinchium ascendens* Poepp., *Sisyrinchium dasycarpum* Phil., *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. subsp. *luteum* (Bertero ex Steud.) R. Rodr., nom. illeg., *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. var. *ascendens* (Poepp.) Baker, *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. var. *maculatum* (Hook.) Klatt, *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. var. *pumilum* Lindl., *Sisyrinchium guttatum* Moris, *Sisyrinchium luteum* Bertero ex Steud., nom. nud., *Sisyrinchium maculatum* Hook., *Sisyrinchium majale* Link, *Sisyrinchium piligerum* Phil., *Sisyrinchium pymaeum* Klotzsch ex Klatt, nom. nud., *Sisyrinchium tenuifolium* Willd., *Sisyrinchium tingens* Steud., *Sisyrinchium volckmanni* Phil.
Referencias: Kenton, A. Y., Rundall, P. J. & Johnson, A. R., 1986; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986; Sancho, M. L., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(RNE, TDF); CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 5808* (SI)]; CHL[*Barnier, A. 444* (CONC), *Werdermann, E. 33* (SI)].

Sisyrinchium graminifolium Lindl. var. *ascendens* (Poepp.) Baker = **Sisyrinchium graminifolium** Lindl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium graminifolium Lindl. var. *maculatum* (Hook.) Klatt = **Sisyrinchium graminifolium** Lindl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium graminifolium Lindl. var. *pumilum* Lindl. = **Sisyrinchium graminifolium** Lindl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium graminifolium Lindl. subsp. *luteum* (Bertero ex Steud.) R. Rodr., nom. illeg. = **Sisyrinchium graminifolium** Lindl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium graminifolium Lindl. subsp. *nanum* (Phil.) Ravenna = **Sisyrinchium nanum** Phil.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium grande Baker ex Chodat & Hassl. = **Sisyrinchium palmifolium** L. subsp. **palmifolium**
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.

Sisyrinchium grandiflorum Poepp. = **Calydorea xiphioides** (Poepp.) Espinosa
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium guttatum Moris = **Sisyrinchium graminifolium** Lindl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium hasslerianum Baker
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Johnston, I. M., 1938a; Molfino, J. F., 1922a; Sancho, M. L., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR); PRY(CAN, CEN, CON, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1769* (SI)]; BRA[*Dziewa, A. 96* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 4657* (BM, NY), *Pedersen, T. M. 6576* (SI)].

Sisyrinchium hirsutum Baker ex Hassl. & Chodat
Sin.: *Sisyrinchium gilberti* Kraenzl.
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Ravenna, P. F., 1981c, 2003j.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA); PRY(AMA, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 610* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 4289* (BM)].

Sisyrinchium hirsutum Baker ex Hassl. & Chodat subsp. *dasypathum* Ravenna = **Sisyrinchium dasypathum** (Ravenna) Ravenna subsp. **dasyspathum**
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.

Sisyrinchium hoehnei I.M. Johnst. = **Sisyrinchium fasciculatum** Klatt subsp. **hoehneii** (I.M. Johnst.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002g.

Sisyrinchium huismo Dombey ex Baker, nom. nud. = **Libertia sessiliflora** (Poepp.) Skottsb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium humidum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002d.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 1904* (Herb. Ravenna)].

Sisyrinchium humile Phil.
Sin.: *Sisyrinchium macrocarpum* Hieron. subsp. *laetum* Ravenna, *Sisyrinchium papillosum* R.C. Foster
Referencias: Chiapella, J. & Ezcurra, C., 1999; Ravenna, P. F., 1969b.
Hierba. Perenne. Endémica. 400–1500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bartoli, A. 22/03* (BAA, SI), *Correa, M. N. 4175* (BAB, SI)].

Sisyrinchium hypsophilum I.M. Johnst. ex R.C. Foster
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b; Foster, R. C., 1948.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 271* (SI)].

Sisyrinchium igatimiense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002g, 2003j.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CON).

Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4711* (G)].

Sisyrinchium illapelinum Phil. = **Olsynium philippii** (Klatt) Goldblatt subsp. **illapelinum** (Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium illmu Molina = **Conanthera bifolia** Ruiz & Pav.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium incurvatum Gardner
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); URY(CLA, PAY, RIV, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Niederlein, G. s.n.* (*)]; BRA[*Pedersen, T. M. 15958* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 1818* (MVFA)].

Sisyrinchium iridifolium auct. non Kunth = **Sisyrinchium chilense** Hook. subsp. **chilense**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1984, 1986.

[Sisyrinchium iridifolium Kunth]
Sin.: *Sisyrinchium laxum* Otto ex Sims var. *minor* Hook.
Referencias: Johnston, I. M., 1938a; Ravenna, P. F., 2001j.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Sisyrinchium iridifolium Kunth subsp. *valdivianum* (Phil.) Ravenna = **Sisyrinchium chilense** Hook. subsp. **chilense**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1984, 1986.

Sisyrinchium jamesonii Baker
Referencias: Sancho, M. L., 1982.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1796* (SI)].

Sisyrinchium johnstonii Roseng. = **Sisyrinchium pachyrhizum** Baker subsp. **pachyrhizum**
Referencias: Ravenna, P. F., 1968.

Sisyrinchium junceum E. Mey. ex J. Presl = **Olsynium junceum** (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. **junceum**
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium junceum E. Mey. ex C. Presl var. *asperulum* (Phil.) Baker = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **scirpoideum**
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

[Sisyrinchium junceum E. Mey. ex C. Presl var. brevispathum Kuntze]
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.
Notas: Nombre dudoso.

Sisyrinchium junceum E. Mey. ex C. Presl var. *colchaguense* (Phil.) Baker = **Olsynium junceum** (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. **colchaguense** (Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium junceum E. Mey. ex C. Presl var. *gracile* (Phil.) Baker = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **scirpoideum**
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

[Sisyrinchium junceum E. Mey. ex C. Presl var. rudis Speg.]
Referencias: Spegazzini, C. L., 1902c.
Notas: Nombre dudoso.

Sisyrinchium junceum E. Mey. ex C. Presl var. *scirpiforme* (Poepp.) Baker = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **scirpoideum**
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium junceum E. Mey. ex C. Presl subsp. *colchaguense* (Phil.) R. Rodr. = **Olsynium junceum** (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. **colchaguense** (Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium junceum E. Mey. ex C. Presl subsp. *depauperatum* (Phil.) R. Rodr. = **Olsynium junceum** (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. **depauperatum** (Phil.) R. Rodr. & Martic.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium junceum E. Mey. ex J. Presl subsp. *filifolium* (Gaudich.) Ravenna = **Olsynium filifolium** (Gaudich.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

[Sisyrinchium junceum E. Mey. ex C. Presl subsp. lainezii (Hicken) Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 1981c.
Notas: Nombre dudoso.

Sisyrinchium junciforme Poepp. = **Olsynium junceum** (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. **junceum**
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium junciforme Poepp. var. *nivale* Phil. = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **scirpoideum**
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium laevigatum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002d.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2200 m.

Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4358* (BA, Herb. Ravenna)].

Sisyrinchium laterale Baker = **Sisyrinchium pictum** Kraenzl.
Referencias: Foster, R. C., 1958.

Sisyrinchium laxum Otto ex Sims
Referencias: Johnston, I. M., 1938a.
Hierba. Anual. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, JUJ, RNE, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(COA, PAI); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 2000* (GH)]; BRA[*Hoehne, F. C. 23138* (GH)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 253* (F)]; URY[*Cabrera, A. L. 3927* (F)].

Sisyrinchium laxum Otto ex Sims var. *minor* Hook. = **Sisyrinchium iridifolium** Kunth
Referencias: Johnston, I. M., 1938a.

Sisyrinchium lechleri Phil. = **Sisyrinchium patagonicum** Phil. ex Baker
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1984, 1986.

Sisyrinchium leucanthum Colla = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **leucanthum** (Colla) R. Rodr. & Martic.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium libertoides Steud. = **Sisyrinchium striatum** Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium limarinum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002d.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 2301* (Herb. Ravenna)].

Sisyrinchium longifolium Phil. = **Sisyrinchium cuspidatum** Poepp.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium longistylum Lem. = **Solenomelus pedunculatus** (Gillies ex Hook.) Hochr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium luridum Ravenna = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **luridum** (Ravenna) R. Rodr. & Martic.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium lutescens Lodd. = **Sisyrinchium striatum** Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium luteum Bertero ex Steud., nom. nud. = **Sisyrinchium graminifolium** Lindl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium luzula Klotzsch
Referencias: Johnston, I. M., 1938a; Molfino, J. F., 1922a; Sancho, M. L., 1982.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(CON, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 28591* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 2247* (GH, NY), *Hatschbach, G. 23051* (SI)]; PRY[*Burkart, A. 18609* (SI)].

Sisyrinchium macranthum Griseb. = **Sisyrinchium chilense** Hook. subsp. **macranthum** (Griseb.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001j.

Sisyrinchium macrocarpum Hieron. subsp. *laetum* Ravenna = **Sisyrinchium humile** Phil.
Referencias: Ravenna, P. F., 2003k.

Sisyrinchium macrocarpum Hieron.
Referencias: Kenton, A. Y., Rundall, P. J. & Johnson, A. R., 1986; Ravenna, P. F., 2001j; Sancho, M. L., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 1800–2700 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, RNE, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9372* (SI)].

Sisyrinchium macrocephalum Graham = **Sisyrinchium palmifolium** L. subsp. **palmifolium**
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Sisyrinchium macrocephalum Graham subsp. *fuscoviride* Ravenna = **Sisyrinchium palmifolium** L. subsp. **fuscoviride** (Ravenna) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1984a.

Sisyrinchium macrocephalum Graham subsp. *giganteum* Ravenna = **Sisyrinchium palmifolium** L. subsp. **palmifolium**

Sisyrinchium maculatum Hook. = **Sisyrinchium graminifolium** Lindl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium maipoanum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2005k.
Hierba. Perenne. Endémica. 1200–1500 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 5241* (Herb. Ravenna)].

Sisyrinchium majale Link = **Sisyrinchium graminifolium** Lindl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium marchio Vell. = **Sisyrinchium vaginatum** Spreng. subsp. **marchio** (Vell.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1981c.

Sisyrinchium marchioides Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002g, 2003j.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); PRY(APA, CAU, CAN, ITA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 28795* (CTES)]; PRY[*Bernardi, L. 18631* (G)].

Sisyrinchium maulense Ravenna = **Olsynium nigricans** (Phil.) R. Rodr. & Martic.

Sisyrinchium megapotamicum Malme
Sin.: *Sisyrinchium gracile* Klotzsch ex Baker, hom. illeg., *Sisyrinchium obconicum* Ravenna
Referencias: Johnston, I. M., 1938a; Ravenna, P. F., 1969[1968]a, 2001j; Sancho, M. L., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); URY(ART, RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Daviña, J. 260* (CTES, MNES)]; BRA[*Lindman, C. A. M. 333* (G)]; URY[*Berro, M. B. 2699* (MVFA)].

Sisyrinchium metae Herter = **Sisyrinchium micranthum** Cav. subsp. **valdivianum** (Phil.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001j.

Sisyrinchium micranthum Cav. subsp. **micranthum**
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903; Foster, R. C., 1948; Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Johnston, I. M., 1938a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Vieira, E. R., Santos, E. P. & Tardivo, R. C., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CAN, CEN, CON, GUA, ITA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Porta, R. E. 117* (SI), *Venturi, S. 407* (GH, US)]; BRA[*Ule, E. H. G. 982* (US)]; PRY[*Hassler, E. 336* (SI), *Jörgensen, P. 3873* (US)].

Sisyrinchium micranthum Cav. subsp. **valdivianum** (Phil.) Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium metae* Herter, *Sisyrinchium valdivianum* Phil., *Sisyrinchium vulgare* Herter
Referencias: Ravenna, P. F., 2001j.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COR, MEN, SJU, SLU); CHL(X); PRY(CAA, GUA, ITA, PAI); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 5985* (SI)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (B)]; PRY[*Zardini, E. M. 14935* (FCQ, MO)]; URY[*Herter, W. G. F. 448* (G)].

Sisyrinchium microspathum Phil. = **Sisyrinchium arenarium** Poepp. subsp. **arenarium**
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium middletoni Baker = **Olsynium junceum** (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. **junceum**

Sisyrinchium minus Engelm. & A. Gray subsp. **everrucosum** Ravenna
Referencias: Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Ravenna, P. F., 1968, 1969[1968]a.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 9309* (SI)].

Sisyrinchium minus Engelm. & A. Gray subsp. **minus**
Referencias: Johnston, I. M., 1938a; Ravenna, P. F., 1969[1968]a, 2003j; Sancho, M. L., 1982.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI); PRY(ITA); URY(DUR, FLA, FLO, MON, PAY, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 12385* (SI), *Scala, A. C. 41* (GH)]; PRY[*Schrottky, C. 26* (BAF)]; URY[*Rosengurtt, B. 2276-b* (GH)].

Sisyrinchium minutiflorum Klatt
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903; Johnston, I. M., 1938a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Ravenna, P. F., 1969[1968]a, 2001j; Sancho, M. L., 1982.
Hierba. Anual. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SFE, SLU); BRA(RGS); PRY(COA, PAI); URY(CAS, MAL, MON, PAY, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25620* (SI)]; BRA[*Malme, G. O. A. 146* (GH)]; PRY[*Hassler, E. 6445* (G)]; URY[*Herter, W. G. F. 145a* (GH)].

Sisyrinchium monostachyum Baker = **Sisyrinchium unguiculatum** Griseb.
Referencias: Ravenna, P. F., 2001j.

Sisyrinchium multiflorum Phil. = **Sisyrinchium arenarium** Poepp. subsp. **arenarium**
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium nanum Phil.
Sin.: *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. subsp. *nanum* (Phil.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1968; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–2300 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 5808* (BAA, BAB, SI), *Burkart, A. 26466* (SI)]; CHL[*Philippi, O. s.n.* (B, SGO)].

Sisyrinchium narcissoides Cav. = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

Sisyrinchium nembyense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002d, g.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS); PRY(CEN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 11631* (CTES)]; PRY[*Vavrek, M. 328* (PY)].

Sisyrinchium nervosum Phil. = **Sisyrinchium arenarium** Poepp. subsp. **arenarium**
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.

[Sisyrinchium nervosum Phil. subsp. atrichum Ravenna]
Notas: Nombre dudoso.

Sisyrinchium nidulare (Hand.-Mazz.) I.M. Johnst.
Sin.: *Sisyrinchium palmifolium* L. var. *nidulare* Hand.-Mazz.
Referencias: Johnston, I. M., 1938a.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 6815* (GH)].

Sisyrinchium nigricans Gay = **Sisyrinchium striatum** Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium nivale Phil. = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **scirpoideum**
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium nudicaule Phil. = **Sisyrinchium patagonicum** Phil. ex Baker
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1984, 1986.

Sisyrinchium nunna Steud. = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **scirpoideum**
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium nuno Colla = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **scirpoideum**
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium nuno Colla var. *leucanthum* (Colla) Baker = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **leucanthum** (Colla) R. Rodr. & Martic.
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

Sisyrinchium obconicum Ravenna = **Sisyrinchium megapotamicum** Malme
Referencias: Ravenna, P. F., 2001j.

Sisyrinchium occissapungus Ruiz ex Klatt = **Orthrosanthus occissapungus** (Ruiz ex Klatt) Diels, Engl. & Prantl
Referencias: Henrich, J. E. & Goldblatt, P., 1987.

Sisyrinchium odoratissimum Lindl. = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

Sisyrinchium oligostachyum Phil. = **Sisyrinchium arenarium** Poepp. subsp. **arenarium**
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium orbiculatum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2005k.
Hierba. Perenne. Endémica. 1400 m.
Países: CHL(VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 5225* (BA, CONC)].

Sisyrinchium ostenianum Beauverd = **Sisyrinchium sellowianum** Klatt
Referencias: Ravenna, P. F., 2002g.

Sisyrinchium oxyspathum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001a, 2003j.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–400 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 23025* (CTES)].

Sisyrinchium pachyrhizum Baker f. **cyaneum** Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001j, 2003j.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(COR, SLU); PRY(CAA, CON, COA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ravenna, P. F. 4032* (Herb. Ravenna)]; PRY[*Basualdo, I. 5214* (FCQ)].
Notas: Citada para Brasil austral sin indicar localidad o material de referencia (Ravenna, 2003j).

Sisyrinchium pachyrhizum Baker subsp. **columellosum** Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002g.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–3800 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 271* (LIL, SI)].

Sisyrinchium pachyrhizum Baker subsp. **pachyrhizum**
Sin.: *Sisyrinchium chilense* Hook. var. *exaltatum* (Kuntze) Hicken, *Sisyrinchium exaltatum* (Klatt) Herter, *Sisyrinchium glandulosum* Kraenzl., *Sisyrinchium johnstonii* Roseng.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Johnston, I. M., 1938a; Kenton, A. Y., Rundall, P. J. & Johnson, A. R., 1986; Ravenna, P. F., 1969[1968]a, 2001j, 2003j; Sancho, M. L., 1982.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA); URY(CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29371* (SI)]; BRA[*Sellow, F. 3862* (F, K)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 254* (F, GH)]; URY[*Berro, M. B. 2698* (MVFA)].

Sisyrinchium pachyrhizum Baker subsp. **pertenue** Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002g.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 4691* (CTES, MBM)].

Sisyrinchium pachyrhizum Baker subsp. **procerum** Ravenna

Referencias: Ravenna, P. F., 1968, 1969[1968]a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25621* (SI)].

Sisyrinchium palenae Phil. = **Sisyrinchium patagonicum** Phil. ex Baker
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1984, 1986.

Sisyrinchium palmifolium L. var. *nidulare* Hand.-Mazz. = **Sisyrinchium nidulare** (Hand.-Mazz.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1938a.

Sisyrinchium palmifolium L. subsp. **fuscoviride** (Ravenna) Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium macrocephalum* Graham subsp. *fuscoviride* Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1981c, 1984a, 2002g, 2003j.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ravenna, P. F. 1027* (Herb. Ravenna)]; PRY[*Hassler, E. 9554* (G)].

Sisyrinchium palmifolium L. subsp. **palmifolium**
Sin.: *Sisyrinchium altissimum* Ten., *Sisyrinchium grande* Baker ex Chodat & Hassl., *Sisyrinchium macrocephalum* Graham, *Sisyrinchium macrocephalum* Graham subsp. *giganteum* Ravenna
Referencias: Baker, J. G., 1892; Grisebach, A. H. R., 1879; Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Johnston, I. M., 1938a; Ravenna, P. F., 2002g, 2003j.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAN, COA, GUA, ITA, SPE); URY(ART, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lirussi, I. 493* (MNES, SI)]; BRA[*Rambo, B. 53408* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4533* (US)]; URY[*Osten, C. 21642* (F)].

Sisyrinchium papillosum R.C. Foster = **Sisyrinchium humile** Phil.
Referencias: Ravenna, P. F., 2003k.

Sisyrinchium parvifolium Baker ex Chodat & Hassl. = **Sisyrinchium vaginatum** Spreng. subsp. **vaginatum**
Referencias: Ravenna, P. F., 2002g.

Sisyrinchium patagonicum Phil. ex Baker
Sin.: *Sisyrinchium lechleri* Phil., *Sisyrinchium nudicaule* Phil., *Sisyrinchium palenae* Phil., *Sisyrinchium rahmeri* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Ravenna, P. F., 1969b; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1984, 1986; Sancho, M. L., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eyerdam, W. J. 24365* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92068* (CONC, SGO)].

Sisyrinchium pauciflorum Phil. = **Olsynium junceum** (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. **junceum**
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium pauperculum Phil. = **Sisyrinchium arenarium** Poepp. subsp. **adenostemon** (Phil.) Ravenna
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium pearcei Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: CHL(IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 92051* (CONC, SGO)].

Sisyrinchium pedunculatum Gillies ex Hook. = **Solenomelus pedunculatus** (Gillies ex Hook.) Hochr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium pendulum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002g.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1620* (MBM)].

Sisyrinchium philippii Klatt = **Olsynium philippii** (Klatt) Goldblatt subsp. **philippii**
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium philippii Klatt subsp. *illapelinum* (Phil.) Rodr. = **Olsynium philippii** (Klatt) Goldblatt subsp. **illapelinum** (Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium pictum Kraenzl.
Sin.: *Sisyrinchium laterale* Baker
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903; Foster, R. C., 1958.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAN, COA, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 6947* (G)].

Sisyrinchium piligerum Phil. = **Sisyrinchium graminifolium** Lindl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium platense I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1938a; Kenton, A. Y., Rundall, P. J. & Johnson, A. R., 1986; Pensiero, J. F. &

Gutiérrez, H. F., 2005; Ravenna, P. F., 1969[1968]a; Sancho, M. L., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, SFE, SLU); BRA(PAR, SCA); PRY(GUA, MIE); URY(ART, CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 4675* (SI), *Parodi, L. R. 8171* (GH)]; BRA[*Smith, L. B. 13575* (NY)]; PRY[*Burkart, A. 18866* (SI), *Jörgensen, P. 3872* (F, US)]; URY[*Felippone, F. 2449* (SI), *Rosengurtt, B. 1721-b* (GH)].

Sisyrinchium platycaule Baker
Referencias: Ravenna, P. F., 1981c, 2003j.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS); PRY(APA, CAU, CEN, GUA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)]; PRY[*Balansa, B. 555* (P), *Burkart, A. 18918* (SI), *Fiebrig, K. A. G. 5434* (SI)].

Sisyrinchium plicatulum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1981c, 2002g, 2003j.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(ITA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 12914* (HBR)]; PRY[*Bernardi, L. 18625* (G)].

Sisyrinchium pumilum (G. Forst.) Hook. = **Tapeinia pumila** (G. Forst.) Baill.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium pumilum auct. non (G. Forst.) Hook. = **Sisyrinchium bogotense** Kunth

Sisyrinchium purpurellum Ravenna subsp. **purpurellum**
Referencias: Ravenna, P. F., 2002g.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 53686* (MBM)].

Sisyrinchium purpurellum Ravenna subsp. **trichospathum** Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002g.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 12828* (MBM)].

Sisyrinchium pymaeum Klotzsch ex Klatt, nom. nud. = **Sisyrinchium graminifolium** Lindl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium rahmeri Phil. = **Sisyrinchium patagonicum** Phil. ex Baker
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1984, 1986.

Sisyrinchium rambonis R.C. Foster
Referencias: Foster, R. C., 1950.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 36606* (GH)].

Sisyrinchium ramosum Herb. var. *chilense* (Hook.) Herb. = **Sisyrinchium chilense** Hook. subsp. **chilense**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1984, 1986.

Sisyrinchium rectilineum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002d.
Hierba. Perenne. Nativa. 900–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 27581* (MBM)].

Sisyrinchium reitzii R.C. Foster
Referencias: Foster, R. C., 1962; Ravenna, P. F., 2003j.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–1500 m.
Países: BRA(SCA); PRY(APA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4872* (US)].

Sisyrinchium restioides Spreng.
Sin.: *Sisyrinchium vaginatum* Spreng. subsp. *restioides* Beauverd
Referencias: Beauverd, G., 1905; Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903; Vieira, E. R., Santos, E. P. & Tardivo, R. C., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, SCA); PRY(COA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 11976* (CTES)]; BRA[*Kummrow, R. 2284* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 4347* (G)].

Sisyrinchium rigidifolium Baker
Referencias: Ravenna, P. F., 2002d.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 17528* (LP)].

Sisyrinchium rosengurttii I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1938a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(CLA, FLA, MAL).
Ejemplares de referencia: URY[*Osten, C. 22692* (GH)].

Sisyrinchium roseum Phil., hom. illeg. = **Olsynium philippii** (Klatt) Goldblatt subsp. **illapelinum** (Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium scabriusculum Steud. = **Solenomelus pedunculatus** (Gillies ex Hook.) Hochr.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium scabrum Phil., hom. illeg. = **Olsynium philippii** (Klatt) Goldblatt subsp. **philippii**
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

[Sisyrinchium scabrum Cham. & Schltdl.]
Sin.: *Sisyrinchium chilense* Hook. var. *scabrum* (Cham. & Schltdl.) Baker
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Sisyrinchium scabrum Cham. & Schltdl. var. *exaltatum* Klatt = **Sisyrinchium chilense** Hook. subsp. **chilense**
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

[Sisyrinchium scabrum Cham. & Schltdl. var. humile Klotzsch]
Referencias: Parodi, L. R., 1943a.
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Sisyrinchium scalarium Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002g.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(CHA, COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 13645* (CTES)].

Sisyrinchium scariosum I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1938a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS); URY(CAS, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Malme, G. O. A. 96* (GH, US)]; URY[*Osten, C. 22693* (GH)].

Sisyrinchium schottii Herter
Referencias: Herter, W. G. F., 1943c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: URY[*Sellow, F. 556* (B)].

Sisyrinchium scirpeum Phil. = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **scirpeum** (Phil.) R. Rodr. & Martic.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium scirpiforme Poepp. = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **scirpoideum**
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium scirpoideum Poepp. = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **scirpoideum**
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium scirpoideum Poepp. subsp. *leucanthum* (Colla) R. Rodr. = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **leucanthum** (Colla) R. Rodr. & Martic.
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium scirpoideum Poepp. subsp. *luridum* (Ravenna) R. Rodr. = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **luridum** (Ravenna) R. Rodr. & Martic.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium scirpoideum Poepp. subsp. *scirpeum* (Phil.) R. Rodr. = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **scirpeum** (Phil.) R. Rodr. & Martic.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium secundiflorum Klatt = **Sisyrinchium commutatum** Klatt
Referencias: Johnston, I. M., 1938a.

Sisyrinchium segethi Phil. = **Solenomelus segethii** (Phil.) Kuntze
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium sellowianum Klatt
Sin.: *Sisyrinchium ostenianum* Beauverd
Referencias: Johnston, I. M., 1938a; Ravenna, P. F., 2002g; Sancho, M. L., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(ITA); URY(DUR, MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 448* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 5021* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 1374* (SI)]; URY[*Osten, C. 4306* (GH)].

Sisyrinchium sessiliflorum Poepp. = **Libertia sessiliflora** (Poepp.) Skottsb.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium setaceum Klatt
Referencias: Grisebach, A. H. R., 1879; Johnston, I. M., 1938a; Sancho, M. L., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, MIS, SDE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28751* (SI), *Gamerro, J. C. 56* (SI)]; BRA[*Malme, G. O. A. 60* (GH, US), *Smith, L. B. 13268* (NY, SI)].

Sisyrinchium sinuosum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j, l.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–500 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 36124* (CTES)].

Sisyrinchium soboliferum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1981c, 2002g, 2003j.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ravenna, P. F. 1045* (BA, C, G, Herb. Ravenna, K, NY, P, RB)]; BRA[*Ule, E. H. G. 983* (HBG)]; PRY[*Duré, R. 418* (CTES, PY)].

Sisyrinchium somuncurense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002g.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000 m.
Países: ARG(RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troiani, H. O. 15051* (CTES, SRFA)].

Sisyrinchium speciosum Hook. = **Calydorea xiphioides** (Poepp.) Espinosa
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium spicatum Cav. = **Sisyrinchium striatum** Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium spicatum Seub. ex Klatt, hom. illeg. = **Sisyrinchium brasiliense** (Ravenna) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002g.

Sisyrinchium stenopetalum Phil. = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **scirpeum** (Phil.) R. Rodr. & Martic.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium stenophyllum Phil. = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **leucanthum** (Colla) R. Rodr. & Martic.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium striatum Sm.
Sin.: *Bermudiana striata* (Sm.) Moench, *Marica striata* (Sm.) Ker Gawl., *Moraea sertata* Jacq., *Paneguia striata* (Sm.) Raf., *Sisyrinchium bracteosum* Phil., *Sisyrinchium libertoides* Steud., *Sisyrinchium lutescens* Lodd., *Sisyrinchium nigricans* Gay, *Sisyrinchium spicatum* Cav., *Spathirachis striata* (Sm.) Klotzsch ex Klatt
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Kenton, A. Y., Rundall, P. J. & Johnson, A. R., 1986; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986; Soriano, A., 1956.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Looser, G. 272* (SI)]; CHL[*Jiles, C. 5153* (CONC)].

Sisyrinchium striatum Sm. var. *microspathum* (Phil.) Speg. = **Sisyrinchium arenarium** Poepp. subsp. **arenarium**
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium strictum Phil., nom. nud. = **Olsynium scirpoideum** (Poepp.) Goldblatt subsp. **scirpoideum**
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium subnudum I.M. Johnst.
Referencias: Ravenna, P. F., 2002g, 2003j.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(APA, AMA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 12543* (C, CTES)]; PRY[*Krapovickas, A. 46107* (CTES)].

Sisyrinchium subtile Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 3172* (G)].

Sisyrinchium teleanthum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2000l.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 8509* (Herb. Ravenna, MBM)].

Sisyrinchium tenuifolium Willd. = **Sisyrinchium graminifolium** Lindl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium tinctorium Kunth
Referencias: Foster, R. C., 1948; Grisebach, A. H. R., 1879; Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 7847* (LP)].

Sisyrinchium tingens Steud. = **Sisyrinchium graminifolium** Lindl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium tofoense Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003k.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4995* (BA)].

Sisyrinchium trinerve Baker = **Olsynium trinerve** (Baker) R. Rodr. & Martic.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sisyrinchium tucumanum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1981c.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1300 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. s.n.* (SI), *Schreiter, R. 1868* (LIL)].

Sisyrinchium uliginosum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1981c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1600 m.
Países: ARG(ERI); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 5051* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 3365* (HBR)].

Sisyrinchium unguiculatum Griseb.
Sin.: *Sisyrinchium aurantiacum* Griseb., *Sisyrinchium clarazii* Baker, *Sisyrinchium monostachyum* Baker
Referencias: Grisebach, A. H. R., 1879; Ravenna, P. F., 2001j; Sancho, M. L., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20798* (SI)].

Sisyrinchium uniflorum Gay ex Phil. = **Sisyrinchium chilense** Hook. subsp. **chilense**
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1984, 1986.

Sisyrinchium vaginatum Spreng. subsp. *ciliolatum* Ravenna = **Sisyrinchium ciliolatum** (Ravenna) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2002g.

Sisyrinchium vaginatum Spreng. subsp. **marchio** (Vell.) Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium marchio* Vell.
Referencias: Ravenna, P. F., 1981c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(CHA, FOR); BRA(RGS); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 258* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 36864* (SI)]; PRY[*Jiménez, B. 49* (SI)].

Sisyrinchium vaginatum Spreng. subsp. *restioides* Beauverd = **Sisyrinchium restioides** Spreng.

Sisyrinchium vaginatum Spreng. subsp. **vaginatum**
Sin.: *Sisyrinchium distantiflorum* Kraenzl., *Sisyrinchium parvifolium* Baker ex Chodat & Hassl.
Referencias: Foster, R. C., 1948; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Ravenna, P. F., 1969[1968]a, 2002g, 2003j; Vieira, E. R., Santos, E. P. & Tardivo, R. C., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI, SPE); URY(CAS, COL, MAL, MON, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29403* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 34745* (SI)]; PRY[*Burkart, A. 18712* (SI)]; URY[*Osten, C. 5335* (SI)].

Sisyrinchium valdivianum Phil. = **Sisyrinchium micranthum** Cav. subsp. **valdivianum** (Phil.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001j.

Sisyrinchium valparadiseum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003l.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 1201* (BA, CONC, Herb. Ravenna)].

Sisyrinchium vestitum Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003k.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–1700 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4997* (BA)].

Sisyrinchium volckmanni Phil. = **Sisyrinchium graminifolium** Lindl.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sisyrinchium vulgare Herter = **Sisyrinchium micranthum** Cav. subsp. **valdivianum** (Phil.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001j, 2003j.

Sisyrinchium weirii Baker
Referencias: Ravenna, P. F., 2002g, 2003j.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jiménez, B. 1614* (BM, CTES, G, MO, PY)].

Sisyrinchium wettsteinii Hand.-Mazz.
Referencias: Johnston, I. M., 1938a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Jönsson, G. 1204a* (F), *Smith, L. B. 12481* (SI)]; PRY[*Woolston, A. L. 1030* (NY)].
Notas: Cita dudosa para la flora Argentina (Parodi, 1943).

Sisyrinchium xiphioides Poepp. = **Calydorea xiphioides** (Poepp.) Espinosa
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000]; Rodríguez Ríos, R., 1986.

Solenomelus Miers

Número de especies: 2 endémicas

Solenomelus andinus (Phil.) Baker = **Olsynium frigidum** (Poepp.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Solenomelus biflorus (Thunb.) Baker = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

Solenomelus chilensis Miers = **Solenomelus pedunculatus** (Gillies ex Hook.) Hochr.

Solenomelus frigidus (Poepp.) Klatt = **Olsynium frigidum** (Poepp.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

Solenomelus lechleri Baker = **Solenomelus segethii** (Phil.) Kuntze
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Solenomelus nigricans (Phil.) Baker = **Olsynium nigricans** (Phil.) R. Rodr. & Martic.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 1992.

Solenomelus pedunculatus (Gillies ex Hook.) Hochr.
Sin.: *Sisyrinchium longistylum* Lem., *Sisyrinchium pedunculatum* Gillies ex Hook., *Sisyrinchium scabriusculum* Steud., *Solenomelus chilensis* Miers
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1900 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cumming, W. A. s.n.* (SI)].

Solenomelus segethii (Phil.) Kuntze
Sin.: *Lechera sisyrinchium* Griseb. ex Lechl., nom. nud., *Sisyrinchium segethi* Phil., *Solenomelus lechleri* Baker, *Solenomelus sisyrinchium* (Griseb.) Pax ex Diels, nom. illeg., *Susarium segethii* (Phil.) Phil., *Symphyostemon segethii* (Phil.) Macloskie
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Ravenna, P. F., 1969b; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2700 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eyerdam, W. J. 24390* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996331* (CONC)].

Solenomelus sisyrinchium (Griseb.) Pax ex Diels, nom. illeg. = **Solenomelus segethii** (Phil.) Kuntze
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Sparaxis Ker Gawl.

Número de especies: 2 introducidas

Sparaxis bulbifera (L.) Ker Gawl.
Sin.: *Ixia bulbifera* L.
Referencias: Hurrell, J. A. & Delucchi, G., 2005.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–200 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hurrell, J. A. 3996* (LP)].

Sparaxis tricolor (Schneev.) Ker Gawl.
Referencias: Hurrell, J. A. & Delucchi, G., 2005.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–200 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Delucchi, G. 2433* (LP)].

Spathirachis striata (Sm.) Klotzsch ex Klatt = **Sisyrinchium striatum** Sm.
Referencias: Rodríguez Ríos, R., 1986.

Sphenostigma euryandra (Griseb.) Baker = **Ennealophus euryandrus** (Griseb.) Ravenna subsp. **euryandrus**
Referencias: Ravenna, P. F., 1973a.

Sphenostigma sellowiana (Klatt) Baker = **Gelasine caerulea** (Vell.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.

Strumaria chilensis Molina = **Libertia chilensis** (Molina) Gunckel
Referencias: Ravenna, P. F., 1969b; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Susarium andinum (Phil.) Phil. = **Olsynium frigidum** (Poepp.) Goldblatt
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Susarium nigricans Phil. = **Olsynium nigricans** (Phil.) R. Rodr. & Martic.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 1992, 2001[2000].

Susarium segethii (Phil.) Phil. = **Solenomelus segethii** (Phil.) Kuntze
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

[Sympa riograndensis Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 1981f.
Notas: Nombre dudoso.

Symphyostemon biflorus (Thunb.) Dusén = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

Symphyostemon lainezii Hicken = **Sisyrinchium filifolium** Gaudich. subsp. **lainezii** (Hicken) Ravenna

Symphyostemon lyckholmi Dusén = **Olsynium lyckholmi** (Dusén) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Symphyostemon narcissoides (Cav.) Miers ex Klatt = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

Symphyostemon nigricans (Phil.) Benth. ex Baker = **Olsynium nigricans** (Phil.) R. Rodr. & Martic.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 1992.

Symphyostemon odoratissimum (Lindl.) Miers = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

Symphyostemon patagonicum Speg. = **Olsynium biflorum** (Thunb.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

Symphyostemon segethii (Phil.) Macloskie = **Solenomelus segethii** (Phil.) Kuntze
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].

Tamia pallens (Griseb.) Ravenna = **Calydorea pallens** Griseb.

Tapeinia Comm. ex Juss.

Número de especies: 1 endémica

Tapeinia magellanica (Lam.) Ker Gawl. = **Tapeinia pumila** (G. Forst.) Baill.
Referencias: Moore, D. M., 1974; Ravenna, P. F., 1969b.

Tapeinia obscura (Cav.) D.M. Moore = **Olsynium obscurum** (Cav.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., Rudall, P. & Henrich, J. E., 1990.

Tapeinia pumila (G. Forst.) Baill.
Sin.: *Ixia magellanica* Lam., *Ixia pumila* G. Forst., *Moraea magellanica* (Lam.) Willd., *Sisyrinchium pumilum* (G. Forst.) Hook., *Tapeinia magellanica* (Lam.) Ker Gawl., *Witsenia magellanica* (Lam.) Pers., *Witsenia pumila* (G. Forst.) Vahl
Referencias: Moore, D. M., 1974; Ravenna, P. F., 1969b; Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1800 m.
Países: ARG(TDF); CHL(IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez 12051* (BA)]; CHL[*Werdermann, E. 278* (SI)].

Tigridia Juss.

Número de especies: 1

Tigridia coelestis Lehm. = **Cypella coelestis** (Lehm.) Diels

Tigridia herbertii (Lindl.) Herb. = **Cypella herbertii** (Lindl.) Herb. subsp. **herbertii**

Tigridia philippiana I.M. Johnst.
Referencias: Rodríguez Ríos, R. & Marticorena, C., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5757* (GH), *Werdermann, E. 854* (SI)].

Trifurcia brasiliensis (Baker) Goldblatt = **Cypella brasiliensis** (Baker) Roitman & A. Castillo
Referencias: Ravenna, P. F., 1981h.

Trifurcia lahue (Molina) Goldblatt subsp. *amoena* (Griseb.) Goldblatt = **Herbertia lahue** (Molina) Goldblatt subsp. **amoena** (Griseb.) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., 1977.

Trifurcia lahue (Molina) Goldblatt subsp. *lahue* = **Herbertia lahue** (Molina) Goldblatt subsp. **lahue**
Referencias: Goldblatt, P., 1977.

Trifurcia pulchella (Sweet) Ravenna = **Herbertia pulchella** Sweet

Trifurcia tigridioides (Hicken) Goldblatt = **Herbertia tigridioides** (Hicken) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., 1977.

Trimezia Salisb. ex Herb.

Número de especies: 4, 1 endémica

Trimezia bauensis Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1988c.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ravenna, P. F. 481* (Herb. Ravenna, RB)].

Trimezia caerulea (Ker Gawl.) Ravenna = **Neomarica caerulea** (Ker Gawl.) Sprague
Referencias: Henrich, J. E. & Goldblatt, P., 1994; Sprague, T. A., 1928.

Trimezia candida (Hassl.) Ravenna = **Neomarica candida** (Hassl.) Sprague

[Trimezia cathartica Klatt]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Trimezia juncifolia Benth. & Hook. f.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 27108* (MBM)].

Trimezia martii (Baker) R.C. Foster = **Trimezia spathata** (Klatt) Baker subsp. **martii** (Baker) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.

Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb.
Sin.: *Iris martinicensis* Jacq.
Referencias: Baker, J. G., 1892.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4556* (NY)].

Trimezia rotundata Ravenna = **Neomarica rotundata** (Ravenna) Chukr
Referencias: Chukr, N. S. & Giulietti, A. M., 2001.

Trimezia spathata (Klatt) Baker subsp. **grandis** (Kraenzl.) Ravenna
Sin.: *Anomalostylus grandis* (Kraenzl.) R.C. Foster, *Cypella grandis* Kraenzl.
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Basualdo, I. 4896* (FCQ)].

Trimezia spathata (Klatt) Baker subsp. **martii** (Baker) Ravenna
Sin.: *Anomalostylus coriifolius* (Baker ex Chodat & Hassl.) R.C. Foster, *Anomalostylus crateriformis* R.C. Foster, *Cypella coriifolia* Baker ex Chodat & Hassl., *Marica martii* Baker, *Neomarica martii* (Baker) Sprague, *Trimezia martii* (Baker) R.C. Foster
Referencias: Ravenna, P. F., 2003j.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, CON, GUA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 280* (SI), *Rodríguez, F. M. 702* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 8705* (NY, US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6273* (GH, SI, US), *Marín, G. 591* (BM, CTES, PY)].

Tucma simplex Ravenna = **Ennealophus simplex** (Ravenna) Roitman & A. Castillo

Watsonia Mill.

Número de especies: 1 introducida

Watsonia ardernei Sander = **Watsonia borbonica** (Pourr.) Goldblatt subsp. **ardernei** (Sander) Goldblatt
Referencias: Goldblatt, P., 1989.

Watsonia borbonica (Pourr.) Goldblatt subsp. **ardernei** (Sander) Goldblatt
Sin.: *Watsonia ardernei* Sander
Referencias: Delucchi, G., 1996; Goldblatt, P., 1989.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–200 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Delucchi, G. 386* (LP)].

[Watsonia meriana (L.) Mill.]
Sin.: *Gladiolus merianus* L.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Witsenia magellanica (Lam.) Pers. = **Tapeinia pumila** (G. Forst.) Baill.
Referencias: Ravenna, P. F., 1969b.

Witsenia pumila (G. Forst.) Vahl = **Tapeinia pumila** (G. Forst.) Baill.
Referencias: Moore, D. M., 1974; Ravenna, P. F., 1969b.

JUNCACEAE

7 géneros, 61 especies, 27 especies endémicas, 1 especie introducida.

Agapatea filamentosa Buchenau, nom. nud. = **Distichia filamentosa** Buchenau
Referencias: Balslev, H., 1996.

Andesia bisexualis (Kuntze) Hauman = **Oxychloë bisexualis** Kuntze
Referencias: Barros, M., 1953.

Andesia haumaniana Barros = **Oxychloë haumaniana** (Barros) Barros
Referencias: Barros, M., 1953.

Brodiaea luzula Macloskie = **Luzula patagonica** Speg.

Distichia Nees & Meyen

Número de especies: 2

Distichia andina (Phil.) Benth. & Hook. = **Oxychloë andina** Phil.
Referencias: Balslev, H., 1996.

Distichia filamentosa (Buchenau) Griseb., nom. inval. = **Distichia filamentosa** Buchenau
Referencias: Balslev, H., 1996.

Distichia filamentosa Buchenau
Sin.: *Agapatea filamentosa* Buchenau, nom. nud., *Distichia filamentosa* (Buchenau) Griseb., nom. inval.
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Núñez 581* (MCNS)]; CHL[*Ruthsatz, B. 8541* (AAU)].

Distichia muscoides Nees & Meyen
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 3600–4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31746* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 3388* (CONC)].

Juncodes alopecurus (Desv.) Kuntze = **Luzula alopecurus** Desv.
Referencias: Barros, M., 1953.

Juncodes antarcticus (Hook. f.) Kuntze = **Luzula alopecurus** Desv.

Juncodes boliviensis (Buchenau) Kuntze = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncodes campestre (L.) Kuntze = **Luzula campestris** (L.) DC. var. **campestris**
Referencias: Balslev, H., 1996; Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Juncodes excelsum (Buchenau) Kuntze = **Luzula excelsa** Buchenau
Referencias: Barros, M., 1953.

Juncodes hieronymi (Buchenau & Griseb.) Kuntze = **Luzula excelsa** Buchenau
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncodes leiboldii (Buchenau) Kuntze = **Luzula leiboldii** Buchenau
Referencias: Barros, M., 1953.

Juncodes macusaniensis (Buchenau) Kuntze = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncodes peruviana (Desv.) Kuntze = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncodes racemosum (Desv.) Kuntze = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncoides alopecurus (Desv.) Macloskie = **Luzula alopecurus** Desv.
Referencias: Barros, M., 1953.

Juncoides antarcticum (Hook. f.) Macloskie = **Luzula alopecurus** Desv.

Juncoides pumila (Hook. f.) Macloskie = **Luzula pumila** Hook. f.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Juncoides spicata (L.) Macloskie = **Luzula spicata** (L.) DC.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Juncus L.

Número de especies: 35, 11 endémicas, 1 introducida

Juncus achalensis Barros = **Juncus pallescens** Lam. var. **achalensis** (Barros) Novara
Referencias: Novara, L. J., 1996a.

[Juncus acuminatus Michx. var. acuminatus]
Referencias: Balslev, H., 1996.
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Juncus acuminatus Michx. var. **multiceps** (Kunze ex Kunth) Barros
Sin.: *Juncus multiceps* Kuntze ex Kunth
Referencias: Barros, M., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Boelcke, O. 325* (SI)].

Juncus acutus L. var. *conglomeratus* Buchenau = **Juncus acutus** L. subsp. **acutus**
Referencias: Snogerup, S. E., 1993.

Juncus acutus L. var. *effusus* Buchenau = **Juncus acutus** L. subsp. **acutus**
Referencias: Snogerup, S. E., 1993.

Juncus acutus L. var. *leopoldii* (Parl.) Buchenau = **Juncus acutus** L. subsp. **leopoldii** (Parl.) Snogerup
Referencias: Balslev, H., 1996; Snogerup, S. E., 1993.

[Juncus acutus L. subsp. acutus]
Sin.: *Juncus acutus* L. var. *conglomeratus* Buchenau, *Juncus acutus* L. var. *effusus* Buchenau
Referencias: Snogerup, S. E., 1993.
Notas: Subespecie excluida del área del proyecto.

Juncus acutus L. subsp. **leopoldii** (Parl.) Snogerup
Sin.: *Juncus acutus* L. var. *leopoldii* (Parl.) Buchenau, *Juncus leopoldii* Parl.
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953; Snogerup, S. E., 1993.
Hierba. Perenne. Nativa. 900–2400 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(SCA); CHL(II, III, IV, V, X, RME); URY(MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 389* (SI)]; BRA[*Hoehne, F. C. 24459* (NY)]; CHL[*Ricardi, M. 2711* (CONC)]; URY[*Felippone, F. 3400* (SI)].

Juncus andersonii Buchenau
Referencias: Buchenau, F. G. P., 1906.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: URY[*Anderson s.n.* (G)].

Juncus andicola Hook. = **Juncus balticus** Willd. subsp. **andicola** (Hook.) Snogerup
Referencias: Balslev, H., 1983, 1996.

Juncus arcticus Willd. var. *andicola* (Hook.) Balslev = **Juncus balticus** Willd. subsp. **andicola** (Hook.) Snogerup
Referencias: Snogerup, S. E., Zika, P. F. & Kirschner, J., 2002.

Juncus arcticus Willd. var. *mexicanus* (Willd. ex Roem. & Schult.) Balslev = **Juncus balticus** Willd. subsp. **mexicanus** (Willd. ex Roem. & Schult.) Kirschner
Referencias: Snogerup, S. E., Zika, P. F. & Kirschner, J., 2002.

[Juncus arcticus Willd. var. montanus (Engelm.) Welsh]
Sin.: *Juncus balticus* Willd. var. *montanus* Engelm.
Referencias: Balslev, H., 1996.
Notas: Subespecie excluida del área del proyecto.

Juncus arequipensis Balslev
Referencias: Balslev, H., 1983, 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(BAI, ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eyerdam, W. J. 23386* (K, UC)].

Juncus aristulatus Michx. = **Juncus marginatus** Rostk.
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953.

Juncus austerus Buchenau = **Juncus kraussii** Hochst. subsp. **austerus** (Buchenau) Snogerup
Referencias: Balslev, H., 1996; Snogerup, S. E., 1993.

[Juncus balticus Willd.]
Referencias: Balslev, H., 1996.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Juncus balticus Willd. var. *columnaris* Buchenau = **Juncus balticus** Willd. subsp. **mexicanus** (Willd. ex Roem. & Schult.) Kirschner
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus balticus Willd. var. *crassiculmis* Buchenau ex Griseb. = **Juncus balticus** Willd. subsp. **mexicanus** (Willd. ex Roem. & Schult.) Kirschner
Referencias: Balslev, H., 1996.

[Juncus balticus Willd. var. littoralis Engelm.]
Referencias: Novara, L. J., 1996a.
Notas: Nombre dudoso. Citado por para Argentina y Chile (M. Barros, 1953).

Juncus balticus Willd. var. *mexicanus* (Willd.) Kuntze = **Juncus balticus** Willd. subsp. **mexicanus** (Willd. ex Roem. & Schult.) Kirschner
Referencias: Balslev, H., 1983, 1996.

Juncus balticus Willd. var. *montanus* Engelm. = **Juncus arcticus** Willd. var. **montanus** (Engelm.) Welsh
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus balticus Willd. var. *pictus* (Phil.) Griseb. = **Juncus balticus** Willd. subsp. **andicola** (Hook.) Snogerup
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus balticus Willd. subsp. **andicola** (Hook.) Snogerup
Sin.: *Juncus andicola* Hook., *Juncus arcticus* Willd. var. *andicola* (Hook.) Balslev, *Juncus balticus* Willd. var. *pictus* (Phil.) Griseb., *Juncus conceptionis* Steud., *Juncus deserticola* Phil., *Juncus pictus* Phil.
Referencias: Balslev, H., 1983, 1996; Barros, M., 1953.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU); CHL(II, III, IV, VIII, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 24450* (SI)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Juncus balticus Willd. subsp. **mexicanus** (Willd. ex Roem. & Schult.) Kirschner
Sin.: *Juncus arcticus* Willd. var. *mexicanus* (Willd. ex Roem. & Schult.) Balslev, *Juncus balticus* Willd. var. *columnaris* Buchenau, *Juncus balticus* Willd. var. *crassiculmis* Buchenau ex Griseb., *Juncus balticus* Willd. var. *mexicanus* (Willd.) Kuntze, *Juncus crassiculmis* (Buchenau) Herter, *Juncus mexicanus* Willd. ex Schult. & Schult. f.
Referencias: Balslev, H., 1983, 1996; Novara, L. J., 1993b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Snogerup, S. E., Zika, P. F. & Kirschner, J., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COS, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, TDF, TUC); CHL(II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 20230* (SI)]; CHL[*Johnston, I. M. 4901* (F, S), *Werdermann, E. 972* (SI)].

Juncus bogotensis Kunth = **Juncus effusus** L. var. **effusus**
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953, 1962.

Juncus buchenaui Sved. = **Juncus marginatus** Rostk.
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953.

[Juncus bufonius L. f. virescens Buchenau]
Notas: Forma excluida del área del proyecto.

Juncus bufonius L. var. **bufonius**
Sin.: *Juncus bufonius* L. var. *genuinus* Cout., nom. inval., *Juncus bufonius* L. var. *pumilio* Griseb.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953, 1962, 1969b; Cantero, J. J. & Nuñez, C. O., 1998[1996]; Novara, L. J., 1993b; Pontiroli, A., 1969[1968]; Steibel, P., 1968.
Hierba. Anual. Nativa. 0–4100 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, TDF); BRA(RGS); CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF, RME); URY(CAS, CLA, COL, FLA, MON, RNO, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 826* (CORD, GOET, SI), *Novara, L. J. 2970* (MCNS)]; BRA[*Rambo, B. 56172* (HBR)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996066* (CONC)]; URY[*Felippone, F. 3501* (SI)].

Juncus bufonius L. var. **condensatus** Cout.
Sin.: *Juncus bufonius* L. var. *halophilus* Fernald & Buchenau
Referencias: Barros, M., 1953, 1969b; Pontiroli, A., 1969[1968].
Hierba. Anual. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, SCR, TUC); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. s.n.* (SI), *Venturi, S. 440* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 79469* (SI)].

Juncus bufonius L. var. *genuinus* Cout., nom. inval. = **Juncus bufonius** L. var. **bufonius**
Referencias: Barros, M., 1953.

Juncus bufonius L. var. *halophilus* Fernald & Buchenau = **Juncus bufonius** L. var. **condensatus** Cout.
Referencias: Pontiroli, A., 1969[1968].

Juncus bufonius L. var. *pumilio* Griseb. = **Juncus bufonius** L. var. **bufonius**
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus bulbosus L.
Sin.: *Juncus supinus* Moench
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Introducida. 100–300 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 9508* (SI)].

Juncus burkartii Barros
Referencias: Barros, M., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6515* (BA, SI)].

Juncus campestris L. = **Luzula campestris** (L.) DC. var. **campestris**
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Juncus canaliculatus Liebm. = **Juncus marginatus** Rostk.
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953.

Juncus capillaceus Hook., hom. illeg. = **Juncus scheuchzerioides** Gaudich.
Referencias: Lourteig, A., 1968.

Juncus capillaceus Lam.
Sin.: *Juncus capillaceus* Lam. var. *montevidensis* Buchenau, *Juncus tenuifolius* Steud.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953, 1962; Cantero, J. J. & Nuñez, C. O., 1998[1996]; Pontiroli, A., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LRI, SDE, SFE, TUC); BRA(RGS); CHL(V, VI, VIII, IX, X, IJF); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, FLO, MAL, MON, PAY, SAO, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 1382* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 526* (HBR)]; CHL[*Barros, E. 9391* (SI)]; URY[*Felippone, F. 2888* (SI)].

Juncus capillaceus Lam. var. *chilensis* Buchenau = **Juncus imbricatus** Laharpe
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus capillaceus Lam. var. *montevidensis* Buchenau = **Juncus capillaceus** Lam.
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus capitatus Weigel
Referencias: Barros, M., 1953, 1969b.
Hierba. Anual. Nativa. 200 m.
Países: ARG(sin localidad); CHL(VII, VIII, IX); URY(MAL, ROC, TYT).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 9381* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 6592* (MVFA)].

Juncus chamissonis Kunth = **Juncus imbricatus** Laharpe
Referencias: Balslev, H., 1979, 1996.

Juncus chilensis Gay = **Juncus stipulatus** Nees & Meyen var. **chilensis** (Gay) Kirschner
Referencias: Snogerup, S. E., Zika, P. F. & Kirschner, J., 2002.

Juncus cognatus Kunth = **Juncus tenuis** Willd. var. **dichotomus** (Elliott) Wood
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus collinus Steud. = **Juncus imbricatus** Laharpe
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus commixtus Steud. = **Juncus pallescens** Lam. var. **pallescens**
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus conceptionis Steud. = **Juncus balticus** Willd. subsp. **andicola** (Hook.) Snogerup
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus congestus Thuill. = **Luzula campestris** (L.) DC. var. **congesta** (Thuill.) Buchenau
Referencias: Barros, M., 1953.

[Juncus conglomeratus L.]
Sin.: *Juncus leersii* T. Marsson
Referencias: Balslev, H., 1996.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Juncus cordobensis Barros, nom. illeg. = **Juncus cordobensis** Barros
Referencias: Barros, M., 1953, 1957a.

Juncus cordobensis Barros
Sin.: *Juncus cordobensis* Barros, nom. illeg.
Referencias: Barros, M., 1953, 1957a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (LIL), *Schinini, A. 27446* (SI)].

Juncus corralensis Phil. = **Juncus stipulatus** Nees & Meyen var. **stipulatus**
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953.

Juncus crassiculmis (Buchenau) Herter = **Juncus balticus** Willd. subsp. **mexicanus** (Willd. ex Roem. & Schult.) Kirschner
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus cyperoides Laharpe
Sin.: *Juncus graminifolius* E. Mey.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Balslev, H., 1979, 1996; Barros, M., 1953, 1969b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TUC); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Illin, N. 163* (SI)]; CHL[*Boelcke, O. 262* (SI)].

Juncus demissus Steud. = **Juncus planifolius** R. Br.

Juncus densiflorus Kunth
Sin.: *Juncus densiflorus* Kunth var. *pohlii* (Steud.) Buchenau, *Juncus pohlii* Steud.
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1962; Cantero, J. J. & Nuñez, C. O., 1998[1996]; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–2700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE); URY(CLA, FLA, MAL, MON, RIV, RNO, ROC, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 590* (BA, SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 16429* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 3726* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 723-b* (SI)].

Juncus densiflorus Kunth var. *pohlii* (Steud.) Buchenau = **Juncus densiflorus** Kunth
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus depauperatus Phil. = **Juncus stipulatus** Nees & Meyen var. **chilensis** (Gay) Kirschner
Referencias: Snogerup, S. E., Zika, P. F. & Kirschner, J., 2002.

Juncus deserticola Phil. = **Juncus balticus** Willd. subsp. **andicola** (Hook.) Snogerup
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus dichotomus Elliot = **Juncus tenuis** Willd. var. **dichotomus** (Elliott) Wood
Referencias: Barros, M., 1953; Novara, L. J., 1996a.

Juncus diemii Barros
Referencias: Barros, M., 1952, 1953, 1969b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 5546* (SI), *Diem, J. 1001* (SI)]; CHL[*Barros, E. 3059* (SI)].

Juncus dombeyanus J. Gay ex Laharpe = **Juncus pallescens** Lam. var. **pallescens**
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus dombeyanus J. Gay ex Laharpe var. *achalensis* (Barros) Novara = **Juncus pallescens** Lam. var. **achalensis** (Barros) Novara
Referencias: Novara, L. J., 1996a.

Juncus dombeyanus J. Gay ex Laharpe var. *elatus* Buchenau = **Juncus pallescens** Lam. var. **pallescens**
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus dombeyanus J. Gay ex Laharpe var. *pycnanthus* Buchenau = **Juncus pallescens** Lam. var. **pallescens**
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus dombeyanus J. Gay ex Laharpe var. *typicus* Buchenau, nom. inval. = **Juncus pallescens** Lam. var. **pallescens**
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus effusus L. var. *compactus* Lej. & Courtois = **Juncus effusus** L. var. **subglomeratus** DC.

Juncus effusus L. var. **effusus**
Sin.: *Juncus bogotensis* Kunth, *Juncus leersii* auct. non T. Marsson
Referencias: Balslev, H., 1979, 1996; Barros, M., 1953, 1962; Moore, D. M., 1968.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3700 m.
Países: ARG(CAT, RNE, SAL, TDF, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VII, VIII, IX, X, XI); URY(CLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4584* (SI)]; BRA[*Bertels, A. 1434* (HBR), *Klein, R. M. 4109* (SI), *Pedersen, T. M. 12578* (CTES, SI)]; CHL[*Hicken, C. M. s.n.* (SI), *Pedersen, T. M. 14126* (CTES, SI)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 2522* (MVFA)].

Juncus effusus L. var. **subglomeratus** DC.
Sin.: *Juncus effusus* L. var. *compactus* Lej. & Courtois
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: CHL(X, XI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 9529* (SI)].

Juncus ernesti-barrosii Barros
Referencias: Barros, M., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 5109* (SI)].

Juncus exiguus Gaudich. ex Hook. f. = **Juncus scheuchzerioides** Gaudich.
Referencias: Lourteig, A., 1968.

Juncus fernandezianus Steud. = **Juncus pallescens** Lam. var. **pallescens**
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus filiformis L.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: CHL(V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 1119* (CONC)].

Juncus floribundus Kunth = **Juncus microcephalus** Kunth
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus gayanus Steud. = **Juncus stipulatus** Nees & Meyen var. **chilensis** (Gay) Kirschner
Referencias: Snogerup, S. E., Zika, P. F. & Kirschner, J., 2002.

Juncus graminifolius E. Mey. = **Juncus cyperoides** Laharpe
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953.

Juncus grandiflorus L. f. = **Marsippospermum grandiflorum** (L. f.) Hook. f.
Referencias: Barros, M., 1953.

Juncus imbricatus Laharpe
Sin.: *Juncus capillaceus* Lam. var. *chilensis* Buchenau, *Juncus chamissonis* Kunth, *Juncus collinus* Steud., *Juncus imbricatus* Laharpe var. *chamissonis* (Kunth) Buchenau, *Juncus imbricatus* Laharpe var. *lechleri* (Steud.) Buchenau, *Juncus lechleri* Steud., *Juncus multiflorus* Bertero ex Steud., *Juncus spanianthus* Steud., *Juncus urvillei* Steud.
Referencias: Balslev, H., 1979, 1996; Barros, M., 1953, 1962; Novara, L. J., 1993b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MON, PAY, RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2798* (SI), *Pierotti, A. 1380* (NY)]; BRA[*Rambo, B. 53097* (HBR)]; CHL[*Barros, E. 3083* (SI), *Bertero, C. L. G. 348* (G, MO, P)]; URY[*Hicken, C. M. 31* (SI)].

Juncus imbricatus Laharpe var. *chamissonis* (Kunth) Buchenau = **Juncus imbricatus** Laharpe
Referencias: Balslev, H., 1979, 1996.

Juncus imbricatus Laharpe var. *lechleri* (Steud.) Buchenau = **Juncus imbricatus** Laharpe
Referencias: Balslev, H., 1979, 1996.

Juncus inconspicuus d'Urv. = **Juncus scheuchzerioides** Gaudich.
Referencias: Lourteig, A., 1968.

Juncus involucratus Steud. ex Buchenau = **Juncus microcephalus** Kunth
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus kleinii Barros
Referencias: Barros, M., 1962.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 451* (HBR)].

Juncus kraussii Hochst. subsp. **austerus** (Buchenau) Snogerup
Sin.: *Juncus austerus* Buchenau
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953, 1962; Snogerup, S. E., 1993.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(sin localidad); BRA(SCA); CHL(X); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Darwin, C. R. s.n.* (K)]; BRA[*Reitz, P. R. 5148* (HBR)]; CHL[*Barros, E. 3079* (SI), *Lechler, W. 3089* (GOET, K)]; URY[*Osten, C. 21788 b* (S)].

Juncus lechleri Steud. = **Juncus imbricatus** Laharpe
Referencias: Balslev, H., 1979, 1996.

Juncus leersii auct. non T. Marsson = **Juncus effusus** L. var. **effusus**
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus leersii T. Marsson = **Juncus conglomeratus** L.
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus leopoldii Parl. = **Juncus acutus** L. subsp. **leopoldii** (Parl.) Snogerup
Referencias: Balslev, H., 1996; Snogerup, S. E., 1993.

[Juncus lesueurii Boland]
Referencias: Balslev, H., 1996.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Juncus lesueurii Boland var. stenocaulon Buchenau]
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Juncus llanquihuensis Barros
Referencias: Barros, M., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(CHU); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Martínez P., L. 13* (SI)]; CHL[*Barros, E. 9514* (SI)].

Juncus luzuloxyphium Griseb. = **Juncus microcephalus** Kunth
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus magellanicus Lam. = **Rostkovia magellanica** (Lam.) Hook. f.
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953.

Juncus mandonii Buchenau = **Juncus stipulatus** Nees & Meyen var. **stipulatus**
Referencias: Balslev, H., 1996; Lourteig, A., 1968.

Juncus marginatus Rostk.
Sin.: *Juncus aristulatus* Michx., *Juncus buchenaui* Sved., *Juncus canaliculatus* Liebm., *Juncus marginatus* Rostk. var. *aristulatus* (Michx.) Coville, *Luzula juncoides* Poir.
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953, 1962; Cantero, J. J. & Nuñez, C. O., 1998[1996].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, FOR, JUJ, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, PAI, SPE); URY(CLA, FLA, MAL, MON, RIV, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 7855* (SI), *Pozner, R. 346* (CTES, SI)]; BRA[*Lindman, C. A. M. 857a* (GH, S, W), *Reitz, P. R. 11351* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 1995* (SI), *Zardini, E. M. 23726* (AAU, MO)]; URY[*Herter, W. G. F. 88776* (SI)].

Juncus marginatus Rostk. var. *aristulatus* (Michx.) Coville = **Juncus marginatus** Rostk.
Referencias: Balslev, H., 1996.

[Juncus maritimus Lam.]
Referencias: Snogerup, S. E., 1993.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Juncus mendocinus Barros
Referencias: Barros, M., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 4177* (SI)]; CHL[*Hicken, C. M. 10* (SI)].

Juncus meridionalis (Buchenau) Herter = **Juncus micranthus** Schrad. ex E. Mey.
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus mexicanus Willd. ex Schult. & Schult. f. = **Juncus balticus** Willd. subsp. **mexicanus** (Willd. ex Roem. & Schult.) Kirschner
Referencias: Balslev, H., 1983, 1996.

Juncus micranthus Schrad. ex E. Mey.
Sin.: *Juncus meridionalis* (Buchenau) Herter, *Juncus scirpoides* Lam. var. *macrostemon* Gay, *Juncus scirpoides* Lam. var. *meridionalis* Buchenau
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953, 1962.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2100 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, MEN, SJU); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, MIE, PAI); URY(FLA, RIV, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 7658* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 25892* (MO)]; PRY[*Hahn, W. J. 1796* (AAU, MO)]; URY[*Rosengurtt, B. 2617b* (SI)].

Juncus microcephalus Kunth
Sin.: *Juncus floribundus* Kunth, *Juncus involucratus* Steud. ex Buchenau, *Juncus luzuloxyphium* Griseb., *Juncus microcephalus* Kunth f. *conglobatus* Barros, *Juncus microcephalus* Kunth var. *floribundus* (Kunth) Kunth, *Juncus microcephalus* Kunth var. *intermedius* Kunth, *Juncus microcephalus* Kunth var. *typicus* Buchenau, nom. inval., *Juncus microcephalus* Kunth var. *virens* Griseb., *Juncus sellowianus* Kunth, *Juncus timotensis* Barros
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953, 1962; Cantero, J. J. & Nuñez, C. O., 1998[1996]; Novara, L. J., 1993b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pontiroli, A., 1969[1968]; Steibel, P., 1968.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME); PRY(CAU, CEN, GUA, PAI, SPE); URY(ART, CAS, CLA, FLA, FLO, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gamerro, J. C. 57* (SI), *Jörgensen, P. 245* (BAB)]; BRA[*Rambo, B. 35255* (SI), *Reitz, P. R. 7916* (HBR)]; CHL[*Barros, E. 3085* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 24062* (MO)]; URY[*Rosengurtt, B. 2350b* (MVFA)].

Juncus microcephalus Kunth f. *conglobatus* Barros = **Juncus microcephalus** Kunth
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus microcephalus Kunth var. *floribundus* (Kunth) Kunth = **Juncus microcephalus** Kunth
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus microcephalus Kunth var. *intermedius* Kunth = **Juncus microcephalus** Kunth
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus microcephalus Kunth var. *pusillus* E. Mey. = **Juncus stipulatus** Nees & Meyen var. **stipulatus**
Referencias: Balslev, H., 1996; Lourteig, A., 1968.

Juncus microcephalus Kunth var. *typicus* Buchenau, nom. inval. = **Juncus microcephalus** Kunth
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953.

Juncus microcephalus Kunth var. *virens* Griseb. = **Juncus microcephalus** Kunth
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953.

Juncus multiceps Kuntze ex Kunth = **Juncus acuminatus** Michx. var. **multiceps** (Kunze ex Kunth) Barros
Referencias: Barros, M., 1953.

Juncus multiflorus Bertero ex Steud. = **Juncus imbricatus** Laharpe
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus occidentalis Wiegand = **Juncus tenuis** Willd. var. **congestus** Engelm. ex Buchenau
Referencias: Novara, L. J., 1996a.

Juncus oliganthus Phil. = **Juncus stipulatus** Nees & Meyen var. **stipulatus**
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953.

Juncus pallescens Lam. var. *achalensis* (Barros) Novara, comb. superfl. = **Juncus pallescens** Lam. var. **achalensis** (Barros) Novara
Referencias: Novara, L. J., 1996a.

Juncus pallescens Lam. var. **achalensis** (Barros) Novara
Sin.: *Juncus achalensis* Barros, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *achalensis* (Barros) Novara, *Juncus pallescens* Lam. var. *achalensis* (Barros) Novara, comb. superfl.
Referencias: Barros, M., 1953; Cantero, J. J. & Nuñez, C. O., 1998[1996]; Novara, L. J., 1993b, 1996a, 1999; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: ARG(CAT, COR, SAL, SFE, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 889* (SI), *Novara, L. J. 8483* (MCNS)].

Juncus pallescens Lam. var. **pallescens**
Sin.: *Juncus commixtus* Steud., *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *elatus* Buchenau, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *pycnanthus* Buchenau, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *typicus* Buchenau, nom. inval., *Juncus fernandezianus* Steud., *Juncus proximus* Steud.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Balslev, H., 1996; Barros, M., 1962; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, MEN, NEU, RNE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, IJF, RME); PRY(CEN); URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, FLO, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 10903* (SI), *Hurrell, J. A. 5473* (MU, SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 1317* (HBR)]; CHL[*Lechler, W. 292* (MO)]; PRY[*Zardini, E. M. 23132* (AAU, MO)]; URY[*Rosengurtt, B. 47p* (MVFA)].

[Juncus palustris Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d; Rojas Acosta, N., 1897.
Notas: Nombre dudoso.

Juncus parviflorus Poir., nom. illeg. = **Rhynchospora contracta** (Nees) J. Raynal

Juncus pictus Phil. = **Juncus balticus** Willd. subsp. **andicola** (Hook.) Snogerup
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus planifolius R. Br.
Sin.: *Juncus demissus* Steud., *Juncus planifolius* R. Br. var. *demissus* (Steud.) Buchenau
Referencias: Barros, M., 1953; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX, X, XI, IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hicken, C. M. 11* (SI), *Ricardi, M. 475* (CONC)].
Notas: Cita dudosa para la flora Argentina.

Juncus planifolius R. Br. var. *demissus* (Steud.) Buchenau = **Juncus planifolius** R. Br.

Juncus pohlii Steud. = **Juncus densiflorus** Kunth
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus procerus E. Mey.
Sin.: *Juncus valdiviae* Steud.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Balslev, H., 1979, 1996; Barros, M., 1953, 1969b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dawson, G. 2660* (BAB), *Illin, N. 87* (SI)]; CHL[*Burkart, A. 9440* (SI), *Philippi, R. A. 43* (G, GOET, K, MO, P, S)].

Juncus proximus Steud. = **Juncus pallescens** Lam. var. **pallescens**
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus pusillus Buchenau = **Juncus scheuchzerioides** Gaudich.
Referencias: Lourteig, A., 1968.

Juncus ramboi Barros f. **explicatus** Barros
Referencias: Barros, M., 1957b, 1962.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 54677* (HBR)].

Juncus ramboi Barros f. **ramboi**
Referencias: Balslev, H., 1983, Barros, M., 1957b, 1962.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 56439* (HBR), *Smith, L. B. 14324* (SI)].

[Juncus rubens Lam.]
Referencias: Balslev, H., 1996.
Notas: Nombre dudoso.

Juncus scheuchzerioides Gaudich.
Sin.: *Juncus capillaceus* Hook., hom. illeg., *Juncus exiguus* Gaudich. ex Hook. f., *Juncus inconspicuus* d'Urv., *Juncus pusillus* Buchenau, *Juncus scheuchzerioides* Gaudich. var. *inconspicuus* (d'Urv.) Hook.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Barros, M., 1953, 1969b; Lourteig, A., 1968.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2100 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR, TDF); CHL(III, IV, V, VI, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 742* (SI), *Nicora, E. G. 9258* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92157* (CONC)].

Juncus scheuchzerioides Gaudich. var. *inconspicuus* (d'Urv.) Hook. = **Juncus scheuchzerioides** Gaudich.
Referencias: Lourteig, A., 1968.

Juncus scirpoides Lam. var. *macrostemon* Gay = **Juncus micranthus** Schrad. ex E. Mey.
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus scirpoides Lam. var. *meridionalis* Buchenau = **Juncus micranthus** Schrad. ex E. Mey.
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus sellowianus Kunth = **Juncus microcephalus** Kunth
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus smithii Kunth = **Juncus tenuis** Willd. var. **tenuis**
Referencias: Barros, M., 1953, 1962.

Juncus spanianthus Steud. = **Juncus imbricatus** Laharpe
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus spicatus L. = **Luzula spicata** (L.) DC.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917.

Juncus stipulatus Nees & Meyen var. **chilensis** (Gay) Kirschner
Sin.: *Juncus chilensis* Gay, *Juncus depauperatus* Phil., *Juncus gayanus* Steud.
Referencias: Snogerup, S. E., Zika, P. F. & Kirschner, J., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 3400–3600 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fries, R. E. 949* (P, S)]; CHL[*Gay, C. s.n.* (UPS)].

Juncus stipulatus Nees & Meyen var. *corralensis* (Phil.) Buchenau = **Juncus stipulatus** Nees & Meyen var. **stipulatus**
Referencias: Balslev, H., 1979, 1996; Lourteig, A., 1968.

Juncus stipulatus Nees & Meyen var. **stipulatus**
Sin.: *Juncus corralensis* Phil., *Juncus mandonii* Buchenau, *Juncus microcephalus* Kunth var. *pusillus* E. Mey., *Juncus oliganthus* Phil., *Juncus stipulatus* Nees & Meyen var. *corralensis* (Phil.) Buchenau
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Balslev, H., 1979, 1996; Barros, M., 1953; Lourteig, A., 1968.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31868* (SI), *Ruthsatz, B. 88* (NY)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20118* (CONC, SGO), *Johnston, I. M. 4837* (GH, S)].

Juncus subtenuis Herter = **Juncus tenuis** Willd. var. **tenuis**
Referencias: Novara, L. J., 1996a.

Juncus supinus Moench = **Juncus bulbosus** L.

Juncus tenuifolius Steud. = **Juncus capillaceus** Lam.
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus tenuis A. Gray, hom. illeg. = **Juncus tenuis** Willd. var. **dichotomus** (Elliott) Wood
Referencias: Barros, M., 1953.

Juncus tenuis Willd. var. **congestus** Engelm. ex Buchenau
Sin.: *Juncus occidentalis* Wiegand, *Juncus tenuis* Willd. var. *occidentalis* (Wiegand) Coville
Referencias: Barros, M., 1953; Novara, L. J., 1993b.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: ARG(COR, SFE, SLU); CHL(VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 9545* (CORD)]; CHL[*Barros, E. 3086* (SI)].

Juncus tenuis Willd. var. **dichotomus** (Elliott) Wood
Sin.: *Juncus cognatus* Kunth, *Juncus dichotomus* Elliot, *Juncus tenuis* A. Gray, hom. illeg.
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953, 1962; Novara, L. J., 1993b, 1996a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, NEU, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VII, VIII, IX); PRY(GUA); URY(FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 34265* (SI), *Novara, L. J. 6763* (NY)]; BRA[*Clayton, W. D. 4217* (K)]; CHL[*Barros, E. 9710* (SI), *Laciglia, H. A. 3961* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 392* (P, S)]; URY[*Herter, W. G. F. 4380* (SI)].

Juncus tenuis Willd. var. *multicornis* E. Mey. = **Juncus tenuis** Willd. var. **tenuis**
Referencias: Novara, L. J., 1996a.

Juncus tenuis Willd. var. *occidentalis* (Wiegand) Coville = **Juncus tenuis** Willd. var. **congestus** Engelm. ex Buchenau
Referencias: Novara, L. J., 1996a.

Juncus tenuis Willd. var. **tenuis**
Sin.: *Juncus smithii* Kunth, *Juncus subtenuis* Herter, *Juncus tenuis* Willd. var. *multicornis* E. Mey., *Juncus tenuis* Willd. var. *williamsii* Fernald
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953, 1962; Novara, L. J., 1993b.

Hierba. Perenne. Nativa. 500–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, SAL, SDE, TUC); BRA(SCA); CHL(VII); PRY(CEN); URY(FLA, RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31014* (SI), *Novara, L. J. 544* (MCNS)]; BRA[*Reitz, P. R. 2501* (HBR)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996063* (CONC)]; PRY[*Hassler, E. 1632* (SI)]; URY[*Felippone, F. 4922* (SI)].

Juncus tenuis Willd. var. *williamsii* Fernald = **Juncus tenuis** Willd. var. **tenuis**
Referencias: Novara, L. J., 1996a.

Juncus timotensis Barros = **Juncus microcephalus** Kunth

Juncus uruguensis Griseb.
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953; Drábková, L. & Kirschner, J., 2002; Novara, L. J., 1999; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pontiroli, A., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SAL, SFE); URY(CAS, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 6659* (SI), *Lorentz, P. G. 1126* (CORD, GOET)]; URY[*Felippone, F. 4553* (SI)].

Juncus urvillei Steud. = **Juncus imbricatus** Laharpe
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus ustulatus Buchenau
Referencias: Balslev, H., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pedersen, T. M. 12586* (NY)].

Juncus valdiviae Steud. = **Juncus procerus** E. Mey.
Referencias: Balslev, H., 1996.

Juncus venturianus Castillón
Referencias: Barros, M., 1953; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pontiroli, A., 1969[1968].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SFE, SLU, TUC); PRY(CEN); URY(CAS, CLA, FLA, MON, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 4930* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 1636* (LIL)]; URY[*Felippone, F. 5675* (SI)].

Luzula DC.

Número de especies: 13, 8 endémicas

Luzula alopecurus Desv.
Sin.: *Juncodes alopecurus* (Desv.) Kuntze, *Juncodes antarcticus* (Hook. f.) Kuntze, *Juncoides alopecurus* (Desv.) Macloskie, *Juncoides antarcticum* (Hook. f.) Macloskie, *Luzula antarctica* Hook. f.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Barros, M., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1600 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(IX, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 655* (SI), *Giussani, L. M. 276* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92083* (CONC, SGO), *Eyerdam, W. J. 2442* (SI)].

Luzula antarctica Hook. f. = **Luzula alopecurus** Desv.
Referencias: Moore, D. M., 1983.

Luzula boliviensis Buchenau = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Referencias: Balslev, H., 1996.

[Luzula brachyphylla Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

Luzula campestris (L.) DC. var. **campestris**
Sin.: *Juncodes campestre* (L.) Kuntze, *Juncus campestris* L.
Referencias: Broughton, D. A., Adam, J. H. M. & Brännström, R., 2000; Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Marticorena, C., com. pers.; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–100 m.
Países: ARG(TDF); CHL(VII, VIII, XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Baeza, C. M. s.n.* (CONC)].
Notas: Citada para las Islas Malvinas, Argentina, sin indicar ejemplar de referencia (Broughton et al., 2000).

Luzula campestris (L.) DC. var. **congesta** (Thuill.) Buchenau
Sin.: *Juncus congestus* Thuill., *Luzula congesta* (Thuill.) Lej.
Referencias: Barros, M., 1953.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Marelli, C. 24* (LP, SI)].

Luzula campestris (L.) DC. var. **ostenii** Mattf.
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1962.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(FLA, LAV, MAL, TYT).
Ejemplares de referencia: URY[*Gallinal 5037* (SI), *Osten, C. 15256* (S)].

Luzula campestris (L.) DC. var. **tristachya** (Desv.) Buchenau
Sin.: *Luzula tristachya* Desv.
Referencias: Barros, M., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 3300–3500 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Morrison, J. L. 17003* (SI)].

Luzula campestris (L.) DC. var. **ulei** (Buchenau) Barros
Sin.: *Luzula ulei* Buchenau
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1962.
Hierba. Perenne. Nativa. 1200–2200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 4553* (SI)];

Luzula castellanosii Barros
Referencias: Barros, M., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. 4069* (SI)].

Luzula chilensis Nees & Meyen ex Kunth = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**

Referencias: Balslev, H., 1996.

Luzula chilensis Nees & Meyen ex Kunth f. *frequentior* Barros = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Referencias: Balslev, H., 1996; Novara, L. J., 1996a.

Luzula chilensis Nees & Meyen ex Kunth f. *longifolia* Barros = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Referencias: Balslev, H., 1996; Novara, L. J., 1996a.

Luzula congesta (Thuill.) Lej. = **Luzula campestris** (L.) DC. var. **congesta** (Thuill.) Buchenau
Referencias: Barros, M., 1953.

Luzula correae Barros
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Barros, M., 1969b.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1100 m.
Países: ARG(SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 2962* (BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92150* (CONC)].

Luzula excelsa Buchenau
Sin.: *Juncodes excelsum* (Buchenau) Kuntze, *Juncodes hieronymi* (Buchenau & Griseb.) Kuntze, *Luzula hieronymi* Buchenau & Griseb., *Luzula hieronymi* Buchenau & Griseb. f. *bonariensis* Barros, *Luzula hieronymi* Buchenau & Griseb. f. *pusilla* (Castillón) Novara, *Luzula hieronymi* Buchenau & Griseb. var. *pusilla* Castillón
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953; Marticorena, C., com. pers.; Novara, L. J., 1993b, 1995b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, JUJ, MEN, NEU, SAL, SLU, TUC); CHL(VII, IX, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. s.n.* (SI), *Lorentz, P. G. 735* (CORD, F, GOET, K, NY, S)]; CHL[*Pisano, E. 6368* (CONC)].

Luzula gigantea Desv.
Sin.: *Luzula paniculata* Desv.
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953.
Hierba. Perenne. Nativa. 2700–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Medinaceli, M. s.n.* (BAF)].

Luzula hieronymi Buchenau & Griseb. = **Luzula excelsa** Buchenau
Referencias: Balslev, H., 1996.

Luzula hieronymi Buchenau & Griseb. f. *bonariensis* Barros = **Luzula excelsa** Buchenau
Referencias: Balslev, H., 1996.

Luzula hieronymi Buchenau & Griseb. f. *pusilla* (Castillón) Novara = **Luzula excelsa** Buchenau
Referencias: Balslev, H., 1996.

Luzula hieronymi Buchenau & Griseb. var. *pusilla* Castillón = **Luzula excelsa** Buchenau
Referencias: Balslev, H., 1996.

Luzula humilis Buchenau = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Referencias: Balslev, H., 1996.

Luzula juncoides Poir. = **Juncus marginatus** Rostk.
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953, 1962.

Luzula leiboldii Buchenau
Sin.: *Juncodes leiboldii* (Buchenau) Kuntze
Referencias: Barros, M., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–1200 m.
Países: ARG(MEN); CHL(V, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. s.n.* (SI)]; CHL[*Biese, W. 937* (LIL), *Werdermann, E. 1232* (SI)].

Luzula macusaniensis Steud. ex Buchenau = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Referencias: Balslev, H., 1996.

Luzula masafuerana Skottsb.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(IJF).
Notas: No se ha podido localizar material de referencia.

Luzula mendocina Barros
Referencias: Barros, M., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(BAI, COR, MEN, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 10777* (SI), *Cabrera, A. L. 4722* (SI), *Covas, G. 18003* (SI), *Ruiz Leal, R. A. 3105* (LIL)].

Luzula paniculata Desv. = **Luzula gigantea** Desv.
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953.

Luzula parvula Barros
Referencias: Barros, M., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 3300 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 10879* (SI)].

[Luzula patagonica Speg.]
Sin.: *Brodiaea luzula* Macloskie
Referencias: Novara, L. J., 1996a.
Notas: Nombre dudoso.

Luzula peruviana Desv. = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Referencias: Balslev, H., 1996.

Luzula peruviana Desv. var. *longispica* Barros = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Referencias: Balslev, H., 1996.

Luzula pumila Hook. f.
Sin.: *Juncoides pumila* (Hook. f.) Macloskie
Referencias: Moore, D. M., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. 215* (LP)].

Luzula racemosa Cruchet, hom. illeg. = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Referencias: Novara, L. J., 1996a.

Luzula racemosa Desv. f. *humilis* (Buchenau) Buchenau = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Referencias: Balslev, H., 1996.

Luzula racemosa Desv. var. *humilis* (Buchenau) R.E. Fr. = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Referencias: Balslev, H., 1996.

Luzula racemosa Desv. var. **racemosa**
Sin.: *Juncodes boliviensis* (Buchenau) Kuntze, *Juncodes macusaniensis* (Buchenau) Kuntze, *Juncodes peruviana* (Desv.) Kuntze, *Juncodes racemosum* (Desv.) Kuntze, *Luzula boliviensis* Buchenau, *Luzula chilensis* Nees & Meyen ex Kunth, *Luzula chilensis* Nees & Meyen ex Kunth f. *frequentior* Barros, *Luzula chilensis* Nees & Meyen ex Kunth f. *longifolia* Barros, *Luzula humilis* Buchenau, *Luzula macusaniensis* Steud. ex Buchenau, *Luzula peruviana* Desv., *Luzula peruviana* Desv. var. *longispica* Barros, *Luzula racemosa* Cruchet, hom. illeg., *Luzula racemosa* Desv. f. *humilis* (Buchenau) Buchenau, *Luzula racemosa* Desv. var. *humilis* (Buchenau) R.E. Fr., *Luzula racemosa* Desv. var. *typica* Buchenau
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–4700 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SLU, TDF, TUC); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 777* (SI), *Kiesling, R. 57951/2* (SI), *Koslowsky, J. 230* (CORD), *Pedersen, T. M. 14526* (CTES, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20107* (CONC), *Rentzell, I. 6135* (SI)].

Luzula racemosa Desv. var. **traversii** Buchenau
Referencias: Barros, M., 1953.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 6070* (LIL), *Lillo, M. 5599* (LIL)].

Luzula racemosa Desv. var. *typica* Buchenau = **Luzula racemosa** Desv. var. **racemosa**
Referencias: Balslev, H., 1996.

Luzula ruiz-lealii Barros
Referencias: Barros, M., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3200 m.
Países: ARG(CHU, MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 10083* (SI), *Ruiz Leal, R. A. 14584* (SI)].

[Luzula spicata (L.) DC.]
Sin.: *Juncoides spicata* (L.) Macloskie, *Juncus spicatus* L.
Referencias: Novara, L. J., 1996a.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Luzula tristachya Desv. = **Luzula campestris** (L.) DC. var. **tristachya** (Desv.) Buchenau
Referencias: Barros, M., 1953.

Luzula ulei Buchenau = **Luzula campestris** (L.) DC. var. **ulei** (Buchenau) Barros
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1962.

[Luzula vulcanica Liebm.]
Referencias: Balslev, H., 1996.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Marsippospermum Desv.

Número de especies: 3 endémicas

Marsippospermum calyculatum Desv., hom. illeg. = **Marsippospermum grandiflorum** (L. f.) Hook. f.
Referencias: Barros, M., 1953.

Marsippospermum grandiflorum (L. f.) Hook. f.
Sin.: *Juncus grandiflorus* L. f., *Marsippospermum calyculatum* Desv., hom. illeg., *Rostkovia grandiflora* (L. f.) Hook. f., *Rostkovia grandiflora* (L. f.) Hook. f. var. *philippii* (Buchenau) Hosseus
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Barros, M., 1953, 1969b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 504* (SI), *James, P. 244* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92065* (CONC, SGO)].

Marsippospermum grandiflorum (L. f.) Hook. f. var. *philippii* Buchenau = **Marsippospermum philippii** (Buchenau) Hauman
Referencias: Barros, M., 1953.

Marsippospermum philippii (Buchenau) Hauman
Sin.: *Marsippospermum grandiflorum* (L. f.) Hook. f. var. *philippii* Buchenau, *Rostkovia gracilis* Phil., hom. illeg.
Referencias: Barros, M., 1953, 1969b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. s.n.* (SI)]; CHL[*Dawson, G. 2788* (BAB), *Werdermann, E. 1302* (SI)].

Marsippospermum reichei Buchenau
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Barros, M., 1953, 1969b.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1100 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dusén, P. K. H. 5905* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92182* (CONC)].

Oxychloë Phil.

Número de especies: 6, 5 endémicas

Oxychloë andina Phil.
Sin.: *Distichia andina* (Phil.) Benth. & Hook.

Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953.
Hierba. Perenne. Nativa. 3200–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II, III, IV, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11850* (SI)]; CHL[*Johnston, I. M. 4825* (F, GH, K, P, S, US), *Werdermann, E. 937* (SI)].

Oxychloë bisexualis Kuntze
Sin.: *Andesia bisexualis* (Kuntze) Hauman
Referencias: Barros, M., 1953, 1969b.
Hierba. Perenne. Endémica. 3300–3800 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU); CHL(IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. 6050* (BAF), *Ruíz Leal, R. A. 14561* (SI)]; CHL[*Goodspeed, T. H. 17198* (SI)].

Oxychloë brevifolia (Phil.) Buchenau = **Patosia clandestina** (Phil.) Buchenau
Referencias: Balslev, H., 1996.

Oxychloë castellanosii Barros
Referencias: Barros, M., 1950, 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9045* (SI)].

Oxychloë clandestina (Phil.) Hauman = **Patosia clandestina** (Phil.) Buchenau
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953.

Oxychloë haumaniana (Barros) Barros
Sin.: *Andesia haumaniana* Barros
Referencias: Barros, M., 1950, 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–4000 m.
Países: ARG(LRI, SJU); CHL(IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 8519* (SI)]; CHL[*Goodspeed, T. H. 17198b* (SI)].

Oxychloë mendocina Barros, nom. illeg. = **Oxychloë mendocina** Barros
Referencias: Barros, M., 1957a.

Oxychloë mendocina Barros
Sin.: *Oxychloë mendocina* Barros, nom. illeg.
Referencias: Barros, M., 1957a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2800–3500 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 6673* (SI)].

Oxychloë simulans Barros
Referencias: Barros, M., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 5817* (BAB), *Pujalte, J. C. 103* (CTES)].

Patosia Buchenau
Número de especies: 1

Patosia clandestina (Phil.) Buchenau
Sin.: *Oxychloë brevifolia* (Phil.) Buchenau, *Oxychloë clandestina* (Phil.) Hauman, *Patosia clandestina* (Phil.) Buchenau var. *tucumanensis* (Castillón) Barros, *Patosia tucumanensis* Castillón, *Rostkovia brevifolia* Phil., *Rostkovia clandestina* Phil.
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953, 1969b; Buchenau, F. G. P., 1890.
Hierba. Perenne. Nativa. 2700–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, NEU, SAL, SJU, TUC); CHL(II, III, IV, V, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 5468* (SI), *Schreiter, R. 6123* (LIL)]; CHL[*Johnston, I. M. 4925* (F, GH, K, P, S, US)].

Patosia clandestina (Phil.) Buchenau var. *tucumanensis* (Castillón) Barros = **Patosia clandestina** (Phil.) Buchenau
Referencias: Balslev, H., 1996.

Patosia tucumanensis Castillón = **Patosia clandestina** (Phil.) Buchenau
Referencias: Balslev, H., 1996.

Rostkovia Desv.
Número de especies: 1

Rostkovia brevifolia Phil. = **Patosia clandestina** (Phil.) Buchenau
Referencias: Balslev, H., 1996.

Rostkovia clandestina Phil. = **Patosia clandestina** (Phil.) Buchenau
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953.

Rostkovia gracilis Phil., hom. illeg. = **Marsippospermum philippii** (Buchenau) Hauman
Referencias: Barros, M., 1953.

Rostkovia grandiflora (L. f.) Hook. f. = **Marsippospermum grandiflorum** (L. f.) Hook. f.
Referencias: Barros, M., 1953.

Rostkovia grandiflora (L. f.) Hook. f. var. *philippii* (Buchenau) Hosseus = **Marsippospermum grandiflorum** (L. f.) Hook. f.
Referencias: Barros, M., 1953.

Rostkovia magellanica (Lam.) Hook. f.
Sin.: *Juncus magellanicus* Lam., *Rostkovia magellanica* (Lam.) Hook. f. f. *pumila* Albov, *Rostkovia sphaerocarpa* Desv.
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953, 1969b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Albov, N. M. 808* (LP, SI), *Biganzoli, F. 695* (SI)]; CHL[*Alboff, N. s.n.* (SI), *Hicken, C. M. s.n.* (SI)].

Rostkovia magellanica (Lam.) Hook. f. f. *pumila* Albov = **Rostkovia magellanica** (Lam.) Hook. f.
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953.

Rostkovia sphaerocarpa Desv. = **Rostkovia magellanica** (Lam.) Hook. f.
Referencias: Balslev, H., 1996; Barros, M., 1953.

JUNCAGINACEAE

3 géneros, 5 especies, 1 especie endémica.

Lilaea Bonpl.

Número de especies: 1

Lilaea scilloides (Poir.) Hauman
Sin.: *Lilaea subulata* Humb. & Bonpl., *Phalangium scilloides* Poir.
Referencias: Cabrera, A. L., 1969[1968]a; Correa, M. N., 1969e; Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1986c; Lombardo, A., 1984.
Hierba. Anual. Nativa. 0–4100 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, RNE, SAL); CHL(VII, XII, RME); URY(CAS, FLA, MAL, MON, ROC, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 7248* (SI)]; CHL[*Eyerdam, W. J. 24225* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 80925* (SI)].

Lilaea subulata Humb. & Bonpl. = **Lilaea scilloides** (Poir.) Hauman
Referencias: Cabrera, A. L., 1969[1968]a; Correa, M. N., 1969e; Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1986c; Lombardo, A., 1984.

[Lilaea superba Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d.
Notas: Nombre dudoso.

Phalangium scilloides Poir. = **Lilaea scilloides** (Poir.) Hauman
Referencias: Cabrera, A. L., 1969[1968]a; Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1986c; Lombardo, A., 1984.

Tetroncium Willd.

Número de especies: 1 endémica

Tetroncium magellanicum Willd.
Referencias: Correa, M. N., 1969e; Thieret, J. W., 1988.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(NEU, SCR, TDF); CHL(IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goodall, N. 2424* (BAB, NA, SI), *Pichi Sermolli, R. E. G. 7539* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 5697* (CONC)].

Triglochin L.

Número de especies: 3

Triglochin andinum Phil. = **Triglochin palustris** L.
Referencias: Correa, M. N., 1969e.

Triglochin concinna Burtt Davy = **Triglochin maritima** L.
Referencias: Moore, D. M., 1974.

Triglochin fonticola Phil. = **Triglochin palustris** L.
Referencias: Correa, M. N., 1969e.

Triglochin maritima L.
Sin.: *Triglochin concinna* Burtt Davy, *Triglochin maritima* L. var. *altoandina* Cabrera, *Triglochin maritima* L. var. *deserticola* Buchenau, hom. illeg., *Triglochin maritima* L. var. *deserticola* Phil., *Triglochin monanthos* Speg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Correa, M. N., 1969e.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU, TDF); CHL(I, II, III, V, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 31811* (SI), *Donat, A. 91* (SI), *Guaglianone, E. R. 1534* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 94044* (CONC), *Hicken, C. M. 68* (SI)].

Triglochin maritima L. var. *altoandina* Cabrera = **Triglochin maritima** L.

Triglochin maritima L. var. *deserticola* Buchenau, hom. illeg. = **Triglochin maritima** L.

Triglochin maritima L. var. *deserticola* Phil. = **Triglochin maritima** L.

[Triglochin microphylla Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

Triglochin monanthos Speg. = **Triglochin maritima** L.

Triglochin montevidensis Spreng. = **Triglochin striata** Ruiz & Pav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1969[1968]a; Lombardo, A., 1984.

Triglochin palustris L.
Sin.: *Triglochin andinum* Phil., *Triglochin fonticola* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1969[1968]a; Correa, M. N., 1969e; Luebert B., F. & Gajardo M., R., 1999; Moore, D. M., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, MEN, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC); CHL(II, III, IV, VII, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12397* (BAA, BAB, SI), *Cabrera, A. L. 31814* (SI), *Kiesling, R. 6956* (SI)]; CHL[*Hicken, C. M. 69* (SI), *Luebert B., F. 256* (EIF), *Pedersen, T. M. 14441* (SI)].

Triglochin striata Ruiz & Pav.
Sin.: *Triglochin montevidensis* Spreng., *Triglochin striata* Ruiz & Pav. var. *filifolia* Buchenau, *Triglochin striata* Ruiz & Pav. var. *montevidensis* (Spreng.) Buchenau
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; Cabrera, A. L., 1969[1968]a; Correa, M. N., 1969e; Lombardo, A., 1984.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–3400 m.
Países: ARG(BAI, COR, MEN, RNE, SFE, TDF); BRA(PAR); CHL(I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, RME); URY(CAS, COL, FLA, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 10023* (SI), *Haber, A. F. 10c* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2141* (SI)]; CHL[*Barros, E. 1882* (SI), *Burkart, A. 9362* (SI), *Pedersen, T. M. 14354* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 335* (MVFA)].

Triglochin striata Ruiz & Pav. var. *filifolia* Buchenau = **Triglochin striata** Ruiz & Pav.
Referencias: Correa, M. N., 1969e.

Triglochin striata Ruiz & Pav. var. *montevidensis* (Spreng.) Buchenau = **Triglochin striata** Ruiz & Pav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1969[1968]a.

LAXMANNIACEAE

Autores: Guaglianone, E. R. & Belgrano, M. J.

1 género, 2 especies endémicas.

Anthericum plumosum Ruiz & Pav. = **Trichopetalum plumosum** (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.
Referencias: Marais, W. & Reilly, J., 1978.

Bottionea thysanotoides Colla = **Trichopetalum plumosum** (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.
Referencias: Macbride, J. F., 1918.

Endocoma parviflora Raf. = **Trichopetalum plumosum** (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.
Referencias: Marais, W. & Reilly, J., 1978.

Endocoma peruviana Raf. = **Trichopetalum plumosum** (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.
Referencias: Marais, W. & Reilly, J., 1978.

Trichopetalum Lindl.

Número de especies: 2 endémicas

Trichopetalum chosmalensis Guagl. & Belgrano
Referencias: Guaglianone, E. R. & Belgrano, M. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ancibor, E. s.n.* (BAA, BAB)].

Trichopetalum gracile Lindl. = **Trichopetalum plumosum** (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.
Referencias: Marais, W. & Reilly, J., 1978.

Trichopetalum plumosum (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.
Sin.: *Anthericum plumosum* Ruiz & Pav., *Bottionea thysanotoides* Colla, *Endocoma parviflora* Raf., *Endocoma peruviana* Raf., *Trichopetalum gracile* Lindl., *Trichopetalum stellatum* Lindl.
Referencias: Guaglianone, E. R. & Belgrano, M. J., 2003; Macbride, J. F., 1918; Marais, W. & Reilly, J., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz-Schick, M. 2056* (SGO), *Werdermann, E. 45* (SI)].

Trichopetalum stellatum Lindl. = **Trichopetalum plumosum** (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.
Referencias: Macbride, J. F., 1918.

LEMNACEAE

Autor: Landolt, E.

5 géneros, 11 especies, 2 especies introducidas.

Landoltia Les & D.J. Crawford

Número de especies: 1 introducida

Landoltia punctata (G. Mey.) Les & D.J. Crawford
Sin.: *Lemna punctata* G. Mey., *Spirodela punctata* (G. Mey.) C.H. Thomps.
Referencias: Landolt, E., 1986, 1996; Les, D. H. & Crawford, D. J., 1999; Mazzeo, N., 1993.
Hierba acuática. Perenne. Introducida. 0–200 m.
Países: CHL(XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Wilkes, C. s.n.* (DS, GH, LP, MO, US)].

Lemna L., nom. cons.

Número de especies: 5, 1 introducidas

Lemna aequinoctialis Welw.
Sin.: *Lemna angolensis* Hegelm., *Lemna paucicostata* Hegelm., *Lemna perpusilla* auct. non Torr., *Lemna trinervis* Small
Referencias: Giardelli, M. L., 1959; Landolt, E., 1986, 1996.
Hierba acuática. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(SCA); PRY(APY, CAU, ITA, ÑEE, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 13847* (SI), *Meyer, T. 3902* (GH, LIL, MO, SI)]; BRA[*Smith, L. B. 7907* (R, RB)]; PRY[*Krapovickas, A. 34272* (CTES)].

Lemna angolensis Hegelm. = **Lemna aequinoctialis** Welw.
Referencias: Landolt, E., 1996.

Lemna biperforata W. Koch = **Spirodela intermedia** W. Koch
Referencias: Landolt, E., 1996.

Lemna cyclostoma C.H. Thomps., hom. illeg. = **Lemna valdiviana** Phil.
Referencias: Landolt, E., 1986.

Lemna disperma Hegelm.
Referencias: Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba acuática. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pire, S. M. 577* (UNR)].

Lemna gibba L.
Sin.: *Lemna parodiana* Giardelli
Referencias: Giardelli, M. L., 1969[1968]b; Hartog, C. & Plas, F., 1970; Landolt, E. & Urbanska-Worytkiewicz, K., 1980; Landolt, E., 1986, 1996; Mazzeo, N., 1993; Urbanska-Worytkiewicz, K., 1980.
Hierba acuática. Anual. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(I, II, IV, V, VI, VIII, X, RME); PRY(APY, PHA); URY(CAS, MON, SJO, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giardelli, M. L. 1200* (SI)]; BRA[*Reineck, E. M. s.n.* (BA)]; CHL[*Hastings, 597* (UC, US)]; PRY[*Hassler, E. 2497a* (G)]; URY[*Herter, W. G. F. 85483* (F, G, GH, M, MO, MPU, NY, S, U, UC, US, Z, ZT)].

Lemna minima Kunth, nom. nud. = **Lemna minuta** Kunth
Referencias: Hartog, C. & Plas, F., 1970; Landolt, E., 1986.

Lemna minima Phil. ex Hegelm., hom. illeg. = **Lemna minuta** Kunth
Referencias: Hartog, C. & Plas, F., 1970; Landolt, E., 1996.

[Lemna minor L.]
Referencias: Landolt, E., 1986.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Lemna minuscula Herter, nom. superfl. = **Lemna minuta** Kunth
Referencias: Landolt, E., 1996; Reveal, J. L., 1990.

Lemna minuta Kunth
Sin.: *Lemna minima* Kunth, nom. nud., *Lemna minima* Phil. ex Hegelm., hom. illeg., *Lemna minuscula* Herter, nom. superfl., *Lemna valdiviana* Phil. var. *abbreviata* Hegelm., *Lemna valdiviana* Phil. var. *minima* Hegelm.
Referencias: Hartog, C. & Plas, F., 1970; Landolt, E., 1986, 1996; Mazzeo, N., 1993; Reveal, J. L., 1990; Urbanska-Worytkiewicz, K., 1980.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME); PRY(APY, CEN, COA, PAI); URY(CAS, FLA, MON, ROC, SJO, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giardelli, M. L. 1205* (SI), *Nicora, E. G. 7462* (SI)]; BRA[*Herter, W. G. F. 95843* (SI), *Smith, L. B. 10607* (US)]; CHL[*Johnston, I. M. 6012* (F, GH, S, US)]; PRY[*Hassler, E. 11805a* (G)]; URY[*Herter, W. G. F. 70512* (B, F, G, GH, K, MO, S, U, UC, Z, ZT)].

Lemna oblonga Phil. = **Wolffiella oblonga** (Phil.) Hegelm.
Referencias: Landolt, E., 1986; Mazzeo, N., 1993.

Lemna parodiana Giardelli = **Lemna gibba** L.
Referencias: Landolt, E., 1986.

Lemna paucicostata Hegelm. = **Lemna aequinoctialis** Welw.
Referencias: Landolt, E., 1996.

[Lemna perpusilla Torr.]
Referencias: Landolt, E., 1986.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Lemna perpusilla auct. non Torr. = **Lemna aequinoctialis** Welw.
Referencias: Landolt, E., 1996.

Lemna polyrrhiza L. = **Spirodela polyrrhiza** (L.) Schleid.
Referencias: Landolt, E., 1986.

Lemna polyrrhiza L. var. *maxima* Griseb. = **Spirodela intermedia** W. Koch
Referencias: Landolt, E., 1986.

Lemna punctata G. Mey. = **Landoltia punctata** (G. Mey.) Les & D.J. Crawford
Referencias: Les, D. H. & Crawford, D. J., 1999.

Lemna trinervis Small = **Lemna aequinoctialis** Welw.
Referencias: Landolt, E., 1996.

Lemna valdiviana Phil.
Sin.: *Lemna cyclostoma* C.H. Thomps., hom. illeg., *Lemna valdiviana* Phil. var. *pellucida* Hegelm., *Lemna valdiviana* Phil. var. *platyclados* Hegelm., *Lemna valdiviana* Phil. var. *robusta* Hegelm.
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; Giardelli, M. L., 1969[1968]b; Hartog, C. & Plas, F., 1970; Landolt, E., 1986, 1996; Mazzeo, N., 1993.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–2700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, SAL, SCR, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(I, V, VII, IX, X, RME); PRY(CEN); URY(CAS, MON, ROC, SJO, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 28921* (SI), *Giardelli, M. L. 502* (SI, UC, ZT)]; BRA[*Müller, F. J. F. T. s.n.* (SI), *Reitz, P. R. 7891* (SI), *Smith, L. B. 8987* (R, US)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (G, LIL, MO, S, SGO)]; PRY[*Bordas, E. s.n.* (ZT)]; URY[*Herter, W. G. F. 1302* (SI), *Herter, W. G. F. 88885* (B, F, G, GH, M, MO, NY, U, UC, US, Z, ZT)].

Lemna valdiviana Phil. var. *abbreviata* Hegelm. = **Lemna minuta** Kunth
Referencias: Mazzeo, N., 1993.

Lemna valdiviana Phil. var. *minima* Hegelm. = **Lemna minuta** Kunth
Referencias: Reveal, J. L., 1990.

Lemna valdiviana Phil. var. *pellucida* Hegelm. = **Lemna valdiviana** Phil.
Referencias: Mazzeo, N., 1993.

Lemna valdiviana Phil. var. *platyclados* Hegelm. = **Lemna valdiviana** Phil.
Referencias: Landolt, E., 1986.

Lemna valdiviana Phil. var. *robusta* Hegelm. = **Lemna valdiviana** Phil.
Referencias: Mazzeo, N., 1993.

Spirodela Schleid.

Número de especies: 1

Spirodela biperforata W. Koch = **Spirodela intermedia** W. Koch
Referencias: Landolt, E., 1986; Mazzeo, N., 1993.

Spirodela intermedia W. Koch
Sin.: *Lemna biperforata* W. Koch, *Lemna polyrrhiza* L. var. *maxima* Griseb., *Spirodela biperforata* W. Koch
Referencias: Landolt, E. & Urbanska-Worytkiewicz, K., 1980; Landolt, E., 1986; Mazzeo, N., 1993; Urbanska-Worytkiewicz, K., 1980.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, NEU, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(V); PRY(APY, CEN, COA, ÑEE); URY(CAS, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 8521* (SI, ZT)]; BRA[*Hatschbach, G. 30626* (C, NY, UC), *Ule, E. H. G. 1314* (SI)]; CHL[*Zuber, s.n.* (ZT)]; PRY[*Schinini, A. 7899* (CTES)]; URY[*Herter, W. G. F. 85071* (B, F, G, GH, M, MO, R, S, U, UC, US, Z, ZT), *Rosengurtt, B. 2636* (SI)].

[Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.]
Sin.: *Lemna polyrrhiza* L.
Referencias: Daubs, E. H., 1965; Hicken, C. M., 1910; Landolt, E., 1986.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Spirodela punctata (G. Mey.) C.H. Thomps. = **Landoltia punctata** (G. Mey.) Les & D.J. Crawford
Referencias: Les, D. H. & Crawford, D. J., 1999.

Wolffia Horkel ex Schleid., nom. cons.

Número de especies: 2

Wolffia brasiliensis Wedd.
Sin.: *Wolffia papulifera* C.H. Thomps., *Wolffia punctata* Griseb.
Referencias: Giardelli, M. L., 1972; Landolt, E. & Urbanska-Worytkiewicz, K., 1980; Landolt, E., 1986, 1996; Mazzeo, N., Rodríguez Ríos, R. & Rondanelli, M., 1993; Urbanska-Worytkiewicz, K., 1980.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VIII); PRY(APY, APA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20252* (SI), *Castellanos, A. 18043* (LIL, ZT)]; BRA[*Hatschbach, G. 31077* (BH, C, S, UC)]; CHL[*Mazzeo, N. 24* (CONC)]; PRY[*de Sloover, 75117* (BR)]; URY[*Herter, W. G. F. s.n.* (GOET, ZT)].

Wolffia columbiana H. Karst.
Referencias: Landolt, E. & Urbanska-Worytkiewicz, K., 1980; Landolt, E., 1986, 1996; Urbanska-Worytkiewicz, K., 1980.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LRI, SAL, SFE, TUC); BRA(RGS); PRY(APY); URY(CAS, MON, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 19088* (CTES), *Spegazzini, C. L. 10278* (SI)]; BRA[*Lindemann, 9519* (CTES, U)]; PRY[*de Sloover, 7581-82* (BR)]; URY[*Herter, W. G. F. 68131* (F, GOET, M, MO, U, WIS, ZT)].

Wolffia gladiata Hegelm. = **Wolffiella gladiata** (Hegelm.) Hegelm.

Wolffia lingulata Hegelm. = **Wolffiella lingulata** (Hegelm.) Hegelm.
Referencias: Landolt, E., 1986.

Wolffia lingulata Hegelm. var. *minor* Hegelm. = **Wolffiella oblonga** (Phil.) Hegelm.
Referencias: Landolt, E., 1986; Mazzeo, N., 1993.

Wolffia oblonga (Phil.) Hegelm. = **Wolffiella oblonga** (Phil.) Hegelm.
Referencias: Landolt, E., 1986.

Wolffia papulifera C.H. Thomps. = **Wolffia brasiliensis** Wedd.
Referencias: Landolt, E., 1996.

Wolffia punctata Griseb. = **Wolffia brasiliensis** Wedd.
Referencias: Landolt, E., 1996; Mazzeo, N., Rodríguez Ríos, R. & Rondanelli, M., 1993.

Wolffiella (Hegelm.) Hegelm.

Número de especies: 2

[Wolffiella gladiata (Hegelm.) Hegelm.]
Sin.: *Wolffia gladiata* Hegelm.
Notas: Especie excluida del área del proyecto, restringida al sur de los Estados Unidos y la región de la ciudad de México.

Wolffiella lingulata (Hegelm.) Hegelm.
Sin.: *Wolffia lingulata* Hegelm.
Referencias: Daubs, E. H., 1965; Landolt, E. & Urbanska-Worytkiewicz, K., 1980; Landolt, E., 1986, 1996.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SFE); PRY(APY, CEN, COA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 12923* (CTES, ZT), *Schreiter, R. 827* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 14843* (CTES)]; URY[*Herter, W. G. F. s.n.* (BH, G, GOET, M, MO, S, Z, ZT)].

Wolffiella oblonga (Phil.) Hegelm.
Sin.: *Lemna oblonga* Phil., *Wolffia lingulata* Hegelm. var. *minor* Hegelm., *Wolffia oblonga* (Phil.) Hegelm.
Referencias: Giardelli, M. L., 1969[1968]a; Landolt, E. & Urbanska-Worytkiewicz, K., 1980; Landolt, E., 1986, 1996; Mazzeo, N., 1993; Urbanska-Worytkiewicz, K., 1980.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COS, FOR, JUJ, LPA, MIS, RNE, SAL, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(V, VII, RME); PRY(APY, CEN, COA); URY(CAS, FLA, MON, ROC, SJO, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15671* (SI, ZT), *Giardelli, M. L. 1219* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 5929* (R, US, ZT)]; CHL[*Hastings, 598* (SI), *Philippi, R. A. s.n.* (BM, G, GOET, K, L, LE, MO, S, SGO, UPS, ZT)]; PRY[*Schinini, A. 14343* (CTES)]; URY[*Rosengurtt, B. 1682* (F, US)].

LIMNOCHARITACEAE

Revisor: Haynes, R. R.

géneros, 6 especies.

Alisma flava L. = **Limnocharis flava** (L.) Buchenau
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1992.

Hydrocleys Rich.

Número de especies: 4

Hydrocleys commersonii Rich. = **Hydrocleys nymphoides** (Willd.) Buchenau
Referencias: Crisci, J. V., 1969[1968]; Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1992.

Hydrocleys cryptopetala R.E. Fr. = **Hydrocleys mattogrossensis** (Kunze) Holm-Niels. & R.R. Haynes
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1992.

Hydrocleys humboldtii (Rich.) Endl., nom. illeg. = **Hydrocleys nymphoides** (Willd.) Buchenau
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1992.

Hydrocleys martii Seub.
Sin.: *Hydrocleys uruguayensis* (Buchenau) Pedersen, *Ostenia uruguayensis* Buchenau
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1992; Holm-Nielsen, L. B. & Haynes, R. R., 1985.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: ARG(COS); BRA(SCA); URY(DUR, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Renvoize, S. A. 3700* (CTES, U)]; BRA[*Michaux, A. s.n.* (BM)]; URY[*Osten, C. s.n.* (BREM)].

Hydrocleys mattogrossensis (Kunze) Holm-Niels. & R.R. Haynes
Sin.: *Hydrocleys cryptopetala* R.E. Fr., *Limnocharis mattogrossensis* Kuntze
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1998; Holm-Nielsen, L. B. & Haynes, R. R., 1985.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Mereles, F. 645* (MO)].

Hydrocleys modesta Pedersen
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1992, 1998; Holm-Nielsen, L. B. & Haynes, R. R., 1985; Pedersen, T. M., 1961a.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SJU); PRY(ÑEE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 3974* (C, S, UPS, US)]; PRY[*Walter, M. A. 130* (GH)].

Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau
Sin.: *Hydrocleys commersonii* Rich., *Hydrocleys humboldtii* (Rich.) Endl., nom. illeg., *Limnocharis commersonii* (Rich.) Spreng., *Limnocharis nymphoides* (Willd.) Michx., *Stratioides nymphoides* Willd.
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; Crisci, J. V., 1969[1968]; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1986b, 1992, 1998; Holm-Nielsen, L. B. & Haynes, R. R., 1985; Pedersen, T. M. & Klein, R. M., 1976.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SFE, TUC); BRA(PAR, SCA); PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PHA); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27734* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 502* (HBR)]; PRY[*Arenas, P. 1486* (SI), *Fiebrig, K. A. G. 4687* (BM, G, GH, GOET, M, Z), *Hassler, E. 132* (SI)]; URY[*Alonso Paz, E. 2063* (MVFQ)].

Hydrocleys uruguayensis (Buchenau) Pedersen = **Hydrocleys martii** Seub.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1992; Holm-Nielsen, L. B. & Haynes, R. R., 1985.

Limnocharis Humb. & Bonpl.

Número de especies: 2

Limnocharis commersonii (Rich.) Spreng. = **Hydrocleys nymphoides** (Willd.) Buchenau
Referencias: Crisci, J. V., 1969[1968]; Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1992.

Limnocharis flava (L.) Buchenau
Sin.: *Alisma flava* L.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Hauman, L. L., 1923a; Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1986b, 1992, 1998.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, SAL); PRY(APY, CEN, PHA).

Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 13496* (CTES, SI)]; PRY[*Arenas, P. 1266* (SI)].

Limnocharis laforestii Duchass.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1986b, 1992, 1998.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS); PRY(APY, AMA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 11683* (AAU, MO)]; PRY[*Bernardi, L. 19378* (G)].

Limnocharis mattogrossensis Kuntze = **Hydrocleys mattogrossensis** (Kunze) Holm-Niels. & R.R. Haynes
Referencias: Holm-Nielsen, L. B. & Haynes, R. R., 1985.

Limnocharis nymphoides (Willd.) Michx. = **Hydrocleys nymphoides** (Willd.) Buchenau
Referencias: Hicken, C. M., 1910.

Ostenia uruguayensis Buchenau = **Hydrocleys martii** Seub.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1992; Holm-Nielsen, L. B. & Haynes, R. R., 1985.

Stratioides nymphoides Willd. = **Hydrocleys nymphoides** (Willd.) Buchenau
Referencias: Crisci, J. V., 1969[1968]; Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1992.

MARANTACEAE

6 géneros, 10 especies, 2 especies endémicas.

Calathea G. Mey.

Número de especies: 2

Calathea communis Wand. & S. Vieira
Referencias: Wanderley, M. G. L. & Vieira, S., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2159* (HBR)].

Calathea eichleri Petersen
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Schumann, K. M., 1902.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2855* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 51986* (CTES)]; PRY[*Jiménez, B. 1690* (BM, CTES, MO, PY)].

Calathea macrostachya Griseb. = **Thalia multiflora** Horkel
Referencias: Hauman, L. L., 1917a.

Ctenanthe Eichler

Número de especies: 2, 1 endémica

Ctenanthe casupoides Petersen var. **subtropicalis** Hauman
Referencias: Hauman, L. L., 1917a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bertoni, M. M. s.n.* (BA)].

Ctenanthe muelleri Petersen
Referencias: Yoshida-Arns, K. N. & Mayo, S. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. s.n.* (PACA)].

Maranta L.

Número de especies: 2, 1 endémica

[Maranta arundinacea L.]
Referencias: Andersson, B. L., 2001a.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Maranta arundinacea L. var. *divaricata* (Roscoe) Hauman = **Maranta divaricata** Roscoe
Referencias: Andersson, B. L., 1986.

Maranta divaricata Roscoe
Sin.: *Maranta arundinacea* L. var. *divaricata* (Roscoe) Hauman, *Maranta divaricata* Roscoe var. *genuina* Körn., nom. inval., *Maranta divaricata* Roscoe var. *purpurascens* (Link ex A. Dietr.) Körn., *Maranta purpurascens* Link ex A. Dietr.
Referencias: Andersson, B. L., 1986; Stutz, L. C., 1983.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14114* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 1725* (US)]; PRY[*Woolston, A. L. 660* (SI)].

Maranta divaricata Roscoe var. *genuina* Körn., nom. inval. = **Maranta divaricata** Roscoe
Referencias: Andersson, B. L., 1986.

Maranta divaricata Roscoe var. *purpurascens* (Link ex A. Dietr.) Körn. = **Maranta divaricata** Roscoe
Referencias: Andersson, B. L., 1986.

Maranta geniculata (L.) Lam. = **Thalia geniculata** L.

Maranta purpurascens Link ex A. Dietr. = **Maranta divaricata** Roscoe
Referencias: Andersson, B. L., 1986.

Maranta sobolifera L. Andersson
Referencias: Andersson, B. L., 1986; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2126* (SI)]; BRA[*Hatschbach, A. 45991* (SI)]; PRY[*Múlgura de Romero, M. E. 3621* (CTES, FCQ, SI)].

Maranta tonckat Aubl. = **Stromanthe tonckat** (Aubl.) Eichler

Saranthe (Regel & Körn.) Eichler

Número de especies: 1

Saranthe eichleri Petersen
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5774* (AS, MO, SI)].

Stromanthe Sond.

Número de especies: 1

Stromanthe tonckat (Aubl.) Eichler
Sin.: *Maranta tonckat* Aubl.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 34288* (SI)].

Thalia L.

Número de especies: 2

Thalia geniculata L.
Sin.: *Maranta geniculata* (L.) Lam.
Referencias: Andersson, B. L., 1981, 2001b; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fabris, H. A., 1969[1968]d; Kennedy, H., Andersson, B. L. & Hagberg, M., 1988.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, CEN, CON, PAI, PHA); URY(ART, CLA, RIV, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2533* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 18045* (S)]; PRY[*Schinini, A. 14837* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 7582* (MVFA)].

Thalia multiflora Horkel
Sin.: *Calathea macrostachya* Griseb.
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fabris, H. A., 1969[1968]d; Hauman, L. L., 1917a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SFE); BRA(RGS); PRY(APY, PHA); URY(ART, CAS, CLA, ROC, SAO, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 2724* (SI)]; BRA[*Jarenkow, J. A. 1290* (MBM)]; PRY[*Woolston, A. L. 814* (SI)]; URY[*García Zorrón, N. 879* (MVFA)].

MAYACACEAE

1 género, 2 especies.

Mayaca Aubl.

Número de especies: 2

Mayaca aubletii Michx. = **Mayaca fluviatilis** Aubl. f. **fluviatilis**
Referencias: Lourteig, A., 1965; Mereles, F., 1989a.

Mayaca boliviana Rusby = **Mayaca sellowiana** Kunth
Referencias: Castellanos, A., 1945b; Mereles, F., 1989a.

Mayaca caroliniana Gand. = **Mayaca fluviatilis** Aubl. f. **fluviatilis**
Referencias: Mereles, F., 1989a.

Mayaca fluviatilis Aubl. f. **fluviatilis**
Sin.: *Mayaca aubletii* Michx., *Mayaca caroliniana* Gand., *Mayaca vandellii* Schott & Endl.
Referencias: Castellanos, A., 1945b; Klein, R. M., 1976; Lourteig, A., 1952, 1965; Mereles, F., 1989a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR); BRA(PAR, SCA); PRY(CAU, CAN, CON, GUA, MIE, PAI); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 3008* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 2982* (HBR)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4241* (G).
Notas: Citado para Uruguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Lourteig, 1965; Klein, 1976).

Mayaca fluviatilis Aubl. f. **kunthii** (Seub.) Lourteig
Sin.: *Mayaca kunthii* Seub.
Referencias: Lourteig, A., 1952.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: URY(RIV).
Ejemplares de referencia: URY[*Wright, D. 1933* (BM)].

Mayaca kunthii Seub. = **Mayaca fluviatilis** Aubl. f. **kunthii** (Seub.) Lourteig
Referencias: Lourteig, A., 1952.

Mayaca sellowiana Kunth
Sin.: *Mayaca boliviana* Rusby
Referencias: Castellanos, A., 1945b; Klein, R. M., 1976; Lourteig, A., 1952, 1965, 2001; Mereles, F., 1989a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 218* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 14201* (HBR, P)]; PRY[*Balansa, B. 4566* (G)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 2471* (MVM)].

Mayaca vandellii Schott & Endl. = **Mayaca fluviatilis** Aubl. f. **fluviatilis**
Referencias: Lourteig, A., 1965; Mereles, F., 1989a.

NAJADACEAE

Revisor: Haynes, R. R.

1 género, 3 especies.

Caulinia guadalupensis Spreng. = **Najas guadalupensis** (Spreng.) Magnus
Referencias: Lowden, R. M., 1986.

Najas L.

Número de especies: 3

Najas arcana Subils & Hunz. = **Najas guadalupensis** (Spreng.) Magnus
Referencias: Lowden, R. M., 1986.

Najas flexilis auct. non (Willd.) Rostk. & Schmidt = **Najas guadalupensis** (Spreng.) Magnus

Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus
Sin.: *Caulinia guadalupensis* Spreng., *Najas arcana* Subils & Hunz., *Najas flexilis* auct. non (Willd.) Rostk. & Schmidt, *Najas microdon* A. Braun
Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1973; Hunziker, A. T., 1984a; Lowden, R. M., 1986.
Hierba acuática. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COR, COS, SAL, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27765* (SI)].

Najas marina L.
Referencias: Hunziker, A. T., 1966a; Lowden, R. M., 1986.
Hierba acuática. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MEN, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 7393* (BAA)].

Najas microcarpa K. Schum.
Referencias: Lowden, R. M., 1986.
Hierba acuática. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: PRY[*Weddell, H. A. 3289* (P)].

Najas microdon A. Braun = **Najas guadalupensis** (Spreng.) Magnus
Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1973; Lowden, R. M., 1986.

[Najas minor All.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

ORCHIDACEAE

Autores: Schinini, A., Waechter, J., Izaguirre, P. (Uruguay) & Lehnebach, C. (Chile)
Revisor: Luer, C. A.

153 géneros, 1002 especies, 281 especies endémicas, 1 especie introducida.

Aa Juss.

Número de especies: 6, 2 endémicas

Aa achalensis Schltr.
Referencias: Cocucci, A. E., 1954, 1964; Hauman, L. L., 1921a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 24411* (CORD)].

Aa fiebrigii (Schltr.) Schltr.
Sin.: *Altensteinia fiebrigii* Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1972; Hashimoto, T., 1993.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 3018* (BAB)].

Aa hieronymi (Cogn.) Schltr.
Sin.: *Aa lorentzii* Schltr., *Aa schickendantzii* Schltr., *Altensteinia hieronymi* Cogn., *Altensteinia lorentzii* Schltr., *Altensteinia schikendantzii* Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945; Williams, L. O., 1939.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2700 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SLU, TUC); BRA(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 5906* (BAB)].

Aa lorentzii Schltr. = **Aa hieronymi** (Cogn.) Schltr.
Referencias: Williams, L. O., 1939.

Aa mandoni (Rchb. f.) Schltr. = **Cranichis ciliata** (Kunth) Kunth
Referencias: Hashimoto, T., 1993.

Aa nervosa (Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Altensteinia nervosa* Kraenzl.
Referencias: Lehnebach, C., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Villagrán, C. 1210* (CONC)].

[Aa paleacea Rchb. f.]
Sin.: *Myrosmodes paleacea* Rchb. f. ex Griseb., nom. nud.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Aa paludosa (Rchb. f.) Schltr.
Sin.: *Altensteinia paludosa* Rchb. f., *Myrosmodes paludosa* (Rchb. f.) C.A. Vargas
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b; Hunziker, J. H., 1952.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1598* (LIL, SI)].

Aa schickendantzii Schltr. = **Aa hieronymi** (Cogn.) Schltr.
Referencias: Williams, L. O., 1939.

Aa weddelliana (Rchb. f.) Schltr.
Sin.: *Altensteinia weddelliana* Rchb. f.
Referencias: Hauman, L. L., 1921a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 1700–3600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 792* (SI)].

Acianthera Scheidw.

Número de especies: 42, 15 endémicas

Acianthera acuminatipetala (A. Samp.) Luer
Sin.: *Pleurothallis acuminatipetala* A. Samp.
Referencias: Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. s.n.* (S)].

Acianthera adirii (Brade) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis adirii* Brade, *Specklinia adirii* (Brade) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 21024* (CTES, MBM)].

Acianthera albo-rosea (Kraenzl.) Luer
Sin.: *Octomeria albo-rosea* Kraenzl., *Pleurothallis albo-rosea* (Kraenzl.) Brade
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1921b; Luer, C. A., 2004; Pabst, G. F. J., 1952b.
Hierba epífita. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9031* (HB, S)].

Acianthera alligatorifera (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase = **Pabstiella alligatorifera** (Rchb. f.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Acianthera antennata (Garay) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis antennata* Garay
Referencias: Garay, L. A., 1952; Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 200–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 16727* (S)].

Acianthera aphthosa (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis aphthosa* Lindl., *Pleurothallis foetens* Lindl., *Pleurothallis macrophyta* Barb. Rodr., *Pleurothallis pelioxantha* Barb. Rodr., *Specklinia aphtosa* (Lindl.) F. Barros
Referencias: Johnson, A. E., 2001; Luer, C. A., 1976, 2004; Pridgeon, A. M. & Chase, M. N., 2001; Vásquez, R. & Ibisch, P. L., 2000.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 472* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, A. 19823* (C, CTES, MBM, MO)]; PRY[*Caballero Mármori, G. 2513* (CTES)].

Acianthera aurantio-lateritia (Speg.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis aurantio-lateritia* Speg.
Referencias: Luer, C. A., 2004; Pridgeon, A. M. & Chase, M. N., 2001; Vásquez, R. & Ibisch, P. L., 2000.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (BA)].

Acianthera auriculata (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase = **Arthrosia auriculata** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2006.

Acianthera barbacenensis (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase = **Arthrosia hygrophila** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Gonçalves, C. N. & Waechter, J. L., 2004.

Acianthera bicarinata (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Acianthera binotii* (Regel) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis bicarinata* Lindl., *Pleurothallis binotii* Regel
Referencias: Luer, C. A., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pridgeon, A. M. & Chase, M. N., 2001.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3046* (HBR)].

Acianthera bidentula (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase = **Acianthera saundersiana** (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Acianthera binotii (Regel) Pridgeon & M.W. Chase = **Acianthera bicarinata** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Acianthera boliviana (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Humboldtia boliviana* (Rchb. f.) Kuntze, *Pleurothallis boliviana* Rchb. f.
Referencias: Luer, C. A., 2002, 2004; Pridgeon, A. M. & Chase, M. N., 2001.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 1000–1200 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 762* (SI)].

Acianthera brachiloba (Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis brachiloba* Hoehne, *Specklinia brachiloba* (Hoehne) Luer
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Luer, C. A., 2004; Pridgeon, A. M. & Chase, M. N., 2001.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1890* (SP)].

Acianthera bragae (Ruschi) F. Barros = **Sarracenella pubescens** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Barros, F., 2003.

Acianthera capanemae (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis capanemae* Barb. Rodr.
Referencias: Luer, C. A., 2002.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Tessmann, G. 2768* (MBM, SP)].

Acianthera capillaris (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase = **Arthrosia floribunda** (Lindl.) Luer

Referencias: Luer, C. A., 2004.

Acianthera cearensis (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase = **Acianthera glanduligera** (Lindl.) Luer

Acianthera crinita (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Lepanthes crinita* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr., *Pleurothallis crinita* Barb. Rodr., *Specklinia crinita* (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Barros, F., 1983; Luer, C. A., 2004; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(JUJ); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 806* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 14885* (HB)].

Acianthera cryptantha (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase = **Cryptophoranthus cryptanthus** (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Acianthera cryptoceras (Rchb. f.) F. Barros = **Acianthera glanduligera** (Lindl.) Luer

Acianthera dutrai (Pabst) C.N. Gonçalves & J.L. Waechter
Sin.: *Pleurothallis dutrai* Pabst, *Specklinia dutrai* (Pabst) Luer
Referencias: Gonçalves, C. N. & Waechter, J. L., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–900 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1056* (ICN, RB)].

Acianthera exarticulata (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis exarticulata* Barb. Rodr.
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Luer, C. A., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952b.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gatti, G. 633* (SP)].

Acianthera farinosa (Pabst) Luer = **Acianthera nemorosa** (Barb. Rodr.) F. Barros
Referencias: Barros, F., 2003.

Acianthera fenestrata (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase = **Cryptophoranthus fenestratus** (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Acianthera glanduligera (Lindl.) Luer
Sin.: *Acianthera cearensis* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Acianthera cryptoceras* (Rchb. f.) F. Barros, *Acianthera iguapensis* (Schltr.) F. Barros, *Anathallis iguapensis* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis altoserrana* Hoehne, *Pleurothallis cearensis* Schltr., *Pleurothallis cryptoceras* Rchb. f., *Pleurothallis glanduligera* Lindl., *Pleurothallis iguapensis* Schltr.
Referencias: Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004; Waechter, J. L., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Waechter, J. L. 558* (ICN)].

Acianthera glumacea (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Humboldtia glumacea* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis crocea* Barb. Rodr., *Pleurothallis glaziovii* Cogn., *Pleurothallis glumacea* Lindl.
Referencias: Fraga Nunes, V., 1997; Luer, C. A., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 850* (SI)].

Acianthera gracilisepala (Brade) Luer
Sin.: *Pleurothallis gracilisepala* Brade
Referencias: Brade, A. C., 1951; Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19291* (HB, MBM)].

Acianthera guimaraensii (Brade) F. Barros = **Specklinia guimaraensii** (Brade) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Acianthera heterophylla Barb. Rodr. = **Anathallis liparanges** (Rchb. f.) Luer

Acianthera hoffmannseggiana (Rchb. f.) Luer
Sin.: *Acianthera ophiantha* (Cogn.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis hoffmannseggiana* Rchb. f., *Pleurothallis loefgrenii* Cogn., *Pleurothallis ophiantha* Cogn., *Pleurothallis ophicephala* Barb. Rodr.
Referencias: Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 200–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 8698* (HB)];

Acianthera hygrophila (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase = **Arthrosia hygrophila** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Acianthera iguapensis (Schltr.) F. Barros = **Acianthera glanduligera** (Lindl.) Luer

Acianthera juergensii (Schltr.) F. Barros = **Cryptophoranthus cryptanthus** (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.

Acianthera karlii (Pabst) C.N. Gonçalves & J.L. Waechter = **Apoda-prorepentia karlii** (Pabst) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Acianthera klotzcheana (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Humboldtia klotzschiana* (Rchb. f.) Kuntze, *Pleurothallis klotzcheana* Rchb. f.
Referencias: Johnson, A. E., 2001; Luer, C. A., 2002; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2715* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 3051* (SI)].

Acianthera langeana (Kraenzl.) Pridgeon & M.W. Chase = **Cryptophoranthus cryptanthus** (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.

Acianthera leptotifolia (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase = **Specklinia leptotifolia** (Barb. Rodr.) Luer

Acianthera longicaulis (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase = **Arthrosia floribunda** (Lindl.) Luer

Acianthera luteola (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Acianthera rodriguesii* (Cogn.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis caespitosa* Barb. Rodr., *Pleurothallis caespitosa* Barb. Rodr. var. *platycaulis* (Rchb. f. ex Cogn.) Pabst, *Pleurothallis luteola* Lindl., *Pleurothallis platycaulis* Rchb. f. ex Cogn., *Pleurothallis rodriguesii* Cogn., *Pleurothallis subcordifolia* Cogn., *Specklinia luteola* (Lindl.) F. Barros
Referencias: Hatschbach, G., 1974; Luer, C. A., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 148* (CTES)]; BRA[*Kummrow, R. 2231* (SP)].

Acianthera macropoda (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis macropoda* Barb. Rodr., *Pleurothallis macropoda* Barb. Rodr. var. *laevis* Barb. Rodr.
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Luer, C. A., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16013* (MBM)].

Acianthera macuconensis (Barb. Rodr.) F. Barros
Sin.: *Pleurothallis gonzalezii* Pabst, *Pleurothallis macuconensis* Barb. Rodr., *Specklinia gonzalezii* (Pabst) Luer
Referencias: Barros, F., 2003; Johnson, A. E., 2001; Luer, C. A., 2004; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 431* (BAB, CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 2529* (HB, MBM)].

Acianthera marumbyana (Garay) Luer
Sin.: *Pleurothallis marumbyana* Garay
Referencias: Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 200–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 14310* (S)].

Acianthera murexoidea (Pabst) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis murexoidea* Pabst, *Specklinia murexoidea* (Pabst) Luer
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3492* (HB), *Rohr, J. A. 2111* (HB)].

Acianthera muscosa (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase = **Arthrosia muscosa** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2006.

Acianthera nemorosa (Barb. Rodr.) Luer, comb. superfl. = **Acianthera nemorosa** (Barb. Rodr.) F. Barros

Acianthera nemorosa (Barb. Rodr.) F. Barros
Sin.: *Acianthera farinosa* (Pabst) Luer, *Acianthera nemorosa* (Barb. Rodr.) Luer, comb. superfl., *Pleurothallis farinosa* Pabst, *Pleurothallis nemorosa* Barb. Rodr.
Referencias: Barros, F., 2003; Luer, C. A., 2004; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 4329* (MBM, S)].

Acianthera neojuergensii (Luer) Pridgeon & M.W. Chase = **Cryptophoranthus cryptanthus** (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.

Acianthera oligantha (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Pleurothallis oligantha* Barb. Rodr.
Referencias: Hatschbach, G., 1974; Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19211* (MBM)].

Acianthera ophiantha (Cogn.) Pridgeon & M.W. Chase = **Acianthera hoffmannseggiana** (Rchb. f.) Luer

Acianthera panduripetala (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis panduripetala* Barb. Rodr.
Referencias: Luer, C. A., 2002; Pabst, G. F. J., 1952b; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3632* (HB, MBM)];
Notas: La posición genérica de esta especie es aún dudosa.

Acianthera papillosa (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis papillosa* Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1041* (ICN)].

Acianthera pardipes (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis pardipes* Rchb. f.
Referencias: Luer, C. A., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 8522* (MBM)].

Acianthera parvifolia (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
= **Pabstiella parvifolia** (Lindl.) Luer

Acianthera pectinata (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
= **Pleurothallis pectinata** Lindl.
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Acianthera pubescens (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis porphyrantha* Kraenzl., *Pleurothallis pubescens* Lindl., *Pleurothallis riograndensis* Barb. Rodr., *Pleurothallis riograndensis* Barb. Rodr. var. *longicaulis* Cogn., *Pleurothallis riograndensis* Barb. Rodr. var. *viridicata* Barb. Rodr., *Pleurothallis smithiana* Lindl.
Referencias: Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 3905* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 11573* (AMES, HBG, NY)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6050* (AMES, SI, SP)].

Acianthera raduliglossa (Pabst) Pridgeon & M.W. Chase
= **Apoda-prorepentia hystrix** (Kraenzl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2007.

Acianthera ramosa (Barb. Rodr.) Luer, comb. superfl.
= **Acianthera ramosa** (Barb. Rodr.) F. Barros

Acianthera ramosa (Barb. Rodr.) F. Barros
Sin.: *Acianthera ramosa* (Barb. Rodr.) Luer, comb. superfl., *Pleurothallis ramosa* Barb. Rodr.
Referencias: Barros, F., 2003.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Tessmann, G. 3832* (MBM)].

Acianthera recurva (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis bistuberculata* Barb. Rodr., *Pleurothallis curitybensis* Kraenzl., *Pleurothallis lamproglossa* Schltr., *Pleurothallis leucorhoda* Schltr., *Pleurothallis lilacina* Barb. Rodr. var. *microphylla* Barb. Rodr., *Pleurothallis recurva* Lindl., *Pleurothallis recurva* Lindl. var. *microphylla* (Barb. Rodr.) Garay, *Specklinia recurva* (Lindl.) F. Barros
Referencias: Johnson, A. E., 2001; Luer, C. A., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Vásquez, R. & Ibisch, P. L., 2000.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 442* (BAB, CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 18538* (NY)]; PRY[*Jörgensen, P. 4544* (SI)].

Acianthera renipetala (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Lepanthes renipetala* Barb. Rodr., *Pleurothallis per-dusenii* Hoehne
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952; Leinig, M., 1964; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 4016* (HB)].

Acianthera rodriguesii (Cogn.) Pridgeon & M.W. Chase
= **Acianthera luteola** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Acianthera sarracenia (Luer) Pridgeon & M.W. Chase
= **Sarracenella pubescens** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Barros, F., 2003.

Acianthera saundersiana (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Acianthera bidentula* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis bidentula* Barb. Rodr., *Pleurothallis butantanensis* Hoehne & Schltr., *Pleurothallis felislingua* Barb. Rodr., *Pleurothallis josephensis* Barb. Rodr., *Pleurothallis josephensis* Barb. Rodr. var. *pillifera* (Hoehne) Hoehne, *Pleurothallis juergensii* Schltr., *Pleurothallis saundersiana* Rchb. f., *Specklinia saundersiana* (Rchb. f.) F. Barros
Referencias: Fraga Nunes, V., 1997; Johnson, A. E., 2001; Luer, C. A., 2004; Pridgeon, A. M. & Chase, M. N., 2002; Schlechter, F. R. R., 1925; Sprunger, S., 1996; Vásquez, R. & Ibisch, P. L., 2000.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 372* (CTES)]; BRA[*Pabst, G. F. J. 505* (SP)]; PRY[*Caballero Mármori, G. 907* (CTES)].

Acianthera saurocephala (Lodd.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Humboldtia saurocephala* (Lodd.) Kuntze, *Pleurothallis saurocephala* Lodd.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16204* (MBM)].

Acianthera sonderana (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis sonderana* Rchb. f., *Pleurothallis sonderana* Rchb. f. var. *longicaulis* Barb. Rodr.
Referencias: Barros, F., 1983; Garay, L. A., 1954; Luer, C. A., 2002; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 533* (BAB, CTES)]; BRA[*Deslandes, J. 5* (SP)].

Acianthera spicata (Dutra) Pridgeon & M.W. Chase
= **Cryptophoranthus fenestratus** (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Acianthera spilantha (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Myoxanthus spilanthus* (Barb. Rodr.) Luer, *Pleurothallis spilantha* Barb. Rodr.
Referencias: Luer, C. A., 2007.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Schenk, H. 309* (HBR)].

Acianthera strupifolia (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis strupifolia* Lindl.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911; Luer, C. A., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 10097* (S)].

Acianthera translucida (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Pleurothallis translucida* Barb. Rodr.
Referencias: Barbosa Rodrigues, J., 1996; Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Acianthera tricarinata (Poepp. & Endl.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis platystachys* Regel, *Pleurothallis tricarinata* Poepp. & Endl.
Referencias: Luer, C. A., 2004; Pridgeon, A. M. & Chase, M. N., 2001.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 1000–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hoehne, F. C. s.n.* (SP)].

Acianthera tristis (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis tristis* Barb. Rodr.
Referencias: Luer, C. A., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gonçalves, J. O. N. 45* (ICN)].

Acianthera violaceomaculata (Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis violaceomaculata* Hoehne, *Specklinia violaceomaculata* (Hoehne) Luer
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2163* (SP)].

Acianthera wageneriana (Klotzsch) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis convexifolia* Barb. Rodr., *Pleurothallis wageneriana* Klotzsch, *Pleurothallis xylobiochila* Kraenzl.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1921b; Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 11583* (AMES, NY, S)].

Acoidium fuscum Lindl. = **Trichocentrum fuscum** Lindl.

Acraea multiflora Lindl. = **Pterichis multiflora** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1992.

Acraea widgreni Rchb. f. = **Brachystele widgreni** (Rchb. f.) Schltr.

Acronia C. Presl

Número de especies: 1

Acronia alopex Luer
Sin.: *Pleurothallis alopex* Luer
Referencias: Luer, C. A., 1976; Vásquez, R. & Ibisch, P. L., 2000.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: PRY(APA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fuchs, F. s.n.* (SEL)].

Adipe aureo-fulva (Hook.) M. Wolff = **Bifrenaria aureo-fulva** (Hook.) Lindl.
Referencias: Koehler, S. & Amaral, M. E., 2004.

Aeranthus filiformis Griseb. = **Campylocentrum grisebachii** Cogn.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Aeranthus neglectum Rchb. f. & Warm. = **Campylocentrum neglectum** (Rchb. f. & Warm.) Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Aeranthus organensis Rchb. f. = **Campylocentrum organensis** (Rchb. f.) Rolfe

Aeranthus parahybunensis Barb. Rodr. = **Campylocentrum parahybunense** (Barb. Rodr.) Rolfe
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Aganisia tricolor (Lindl.) Boiss. = **Warrea warreana** (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Altensteinia fiebrigii Schltr. = **Aa fiebrigii** (Schltr.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1972.

Altensteinia hieronymi Cogn. = **Aa hieronymi** (Cogn.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1996.

Altensteinia lorentzii Schltr. = **Aa hieronymi** (Cogn.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1996; Williams, L. O., 1939.

Altensteinia nervosa Kraenzl. = **Aa nervosa** (Kraenzl.) Schltr.

Altensteinia paludosa Rchb. f. = **Aa paludosa** (Rchb. f.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1996.

Altensteinia schikendantzii Schltr. = **Aa hieronymi** (Cogn.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1996; Williams, L. O., 1939.

Altensteinia weddelliana Rchb. f. = **Aa weddelliana** (Rchb. f.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1996.

Amblostoma Scheidw.

Número de especies: 1

Amblostoma armeniacum (Lindl.) Brieger ex Pabst = **Epidendrum armeniacum** Lindl.

Amblostoma cernuum Scheidw. = **Amblostoma tridactylum** (Lindl.) Rchb. f.

Amblostoma dusenii Kraenzl. = **Amblostoma tridactylum** (Lindl.) Rchb. f.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Amblostoma tridactylum (Lindl.) Rchb. f.
Sin.: *Amblostoma cernuum* Scheidw., *Amblostoma dusenii* Kraenzl., *Amblostoma tridactylum* (Lindl.) Rchb. f. var. *dusenii* (Kraenzl.) Garay, *Amblostoma tridactylum* (Lindl.) Rchb. f. var. *pallidum* (Knowles & Westc.) Garay, *Epidendrum amblostoma* Rchb. f., *Epidendrum tridactylum* Lindl.
Referencias: Dressler, R. L., 1967; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1962.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. 2187* (HB)].

Amblostoma tridactylum (Lindl.) Rchb. f. var. *dusenii* (Kraenzl.) Garay = **Amblostoma tridactylum** (Lindl.) Rchb. f.

Amblostoma tridactylum (Lindl.) Rchb. f. var. *pallidum* (Knowles & Westc.) Garay = **Amblostoma tridactylum** (Lindl.) Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1962.

Anacheilium faustum (Rchb. f. ex Cogn.) Pabst, Moutinho & A.V. Pinto = **Prosthechea fausta** (Rchb. f. ex Cogn.) W.E. Higgins

Anacheilium fragrans (Sw.) Acuña = **Prosthechea fragrans** (Sw.) W.E. Higgins

Anacheilium glumaceum (Lindl.) Pabst = **Prosthechea inversa** (Lindl.) W.E. Higgins

Anathallis Barb. Rodr.

Número de especies: 20, 11 endémicas

Anathallis aquinoi (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase = **Panmorphia adenochila** (Loefgr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Anathallis bertoniensis (Hauman) Luer
Sin.: *Pleurothallis bertoniensis* Hauman, *Specklinia bertoniensis* (Hauman) Luer, *Stelis bertoniensis* (Hauman) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Hauman, L. L., 1921a; Luer, C. A., 2002, 2004, 2008.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 300–500 m.
Países: PRY(APA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hauman, L. L. s.n.* (BRLU)].

Anathallis bleyensis (Pabst) F. Barros = **Panmorphia bleyensis** (Pabst) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Anathallis ciliolata (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase = **Panmorphia ciliolata** (Schltr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Anathallis citrina (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis citrina* Schltr., *Pleurothallis citrina* Schltr. var. *elliptica* C. Schweinf., *Specklinia citrina* (Schltr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2000a, 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 26546* (K, MBM)].

Anathallis corticicola (Schltr. ex Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase = **Panmorphia corticicola** (Schltr. ex Hoehne) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Anathallis crebrifolia (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Lepanthes crebifolia* Barb. Rodr., *Pleurothallis crebifolia* (Barb. Rodr.) Cogn.
Referencias: Barros, F., 2003; Luer, C. A., 2008; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18511* (HB, MBM)].

Anathallis densiflora Barb. Rodr. = **Anathallis obovata** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Anathallis fasciculata Barb. Rodr. = **Anathallis obovata** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Vásquez, R. & Ibisch, P. L., 2000.

Anathallis ferdinandiana (Barb. Rodr.) F. Barros
Sin.: *Lepanthes ferdinandiana* Barb. Rodr., *Pleurothallis ferdinandiana* (Barb. Rodr.) Cogn.
Referencias: Barros, F., 2003; Leinig, M., 1964; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 8526* (MBM, NY)].

Anathallis gert-hatschbachii (Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis gert-hatschbachii* Hoehne, *Specklinia gert-hatschbachii* (Hoehne) Luer
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Hoehne, F. C., 1950a; Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 970* (MBM, SP)].

Anathallis iguapensis (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase = **Acianthera glanduligera** (Lindl.) Luer

Anathallis imbricata (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Pleurothallis imbricata* Barb. Rodr., *Specklinia imbricata* (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004, 2007.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 10119* (HBR)].

Anathallis kleinii (Pabst) Luer
Sin.: *Pleurothallis kleinii* Pabst, *Specklinia kleinii* (Pabst) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004, 2008; Pabst, G. F. J., 1972b.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 100–200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 8795* (HB)].

Anathallis linearifolia (Cogn.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis convallium* Kraenzl., *Pleurothallis convergens* R.C.J. Gerard, *Pleurothallis depauperata* Cogn., *Pleurothallis eugenii* Pabst, *Pleurothallis glossochila* Kraenzl., *Pleurothallis linearifolia* Cogn., *Specklinia depauperata* (Cogn.) Luer, *Specklinia eugenii* (Pabst) Luer, *Specklinia linearifolia* (Cogn.) Luer
Referencias: Cogniaux, C. A., 1896; Hatschbach, G., 1963b; Johnson, A. E., 2001; Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1600 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 479* (BAB)]; BRA[*Dutra, J. 852* (SI)].

Anathallis liparanges (Rchb. f.) Luer
Sin.: *Acianthera heterophylla* Barb. Rodr., *Pleurothallis heterophylla* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis hoehnei* Schltr., *Pleurothallis liparanges* Rchb. f., *Specklinia heterophylla* (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Luer, C. A., 2004; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 42780* (CTES, NY, SP)].

Anathallis malmeana (Dutra ex Pabst) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis malmeana* Dutra ex Pabst, *Specklinia malmeana* (Dutra ex Pabst) Luer
Referencias: Fraga Nunes, V., 1997; Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 867* (ICN)].

Anathallis margaritifera (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis margaritifera* Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, A. 95* (B)].

Anathallis micrantha Barb. Rodr. = **Anathallis obovata** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Anathallis microblephara (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase = **Panmorphia microblephara** (Schltr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Anathallis microgemma (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase = **Panmorphia microgemma** (Schltr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Anathallis microphyta (Barb. Rodr.) C.O. Azevedo & C. Berg = **Pleurothallis microphyta** (Barb. Rodr.) Cogn. var. **microphyta**

Anathallis modesta (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase = **Panmorphia brevipes** (H. Focke) Luer

Anathallis obovata (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Anathallis densiflora* Barb. Rodr., *Anathallis fasciculata* Barb. Rodr., *Anathallis micrantha* Barb. Rodr., *Humboldtia obovata* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis albida* Lindl., *Pleurothallis densiflora* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis densiflora* (Barb. Rodr.) Cogn. var. *parvifolia* Garay, *Pleurothallis fasciculata* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis minutiflora* Cogn., *Pleurothallis modestiflora* Schltr., *Pleurothallis obovata* (Lindl.) Lindl., *Specklinia obovata* Lindl., *Stelis fasciculata* Regel
Referencias: Fraga Nunes, V., 1997; Garay, L. A., 1954; Johnson, A. E., 2001; Luer, C. A., 2000a, 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Vásquez, R. & Ibisch, P. L., 2000.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6996* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 24163* (C, CTES, K, MBM)]; PRY[*Caballero Mármori, G. 1343* (CTES)].

Anathallis pabstii (Garay) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis pabstii* Garay, *Specklinia pabstii* (Garay) Luer
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16108* (HB, MBM)].

Anathallis paranaensis (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase = **Panmorphia paranaensis** (Schltr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Anathallis petersiana (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis petersiana* Schltdl., *Specklinia petersiana* (Schltr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[*Tessmann, G. s.n.* (MBM, SP)].

Anathallis piratiningana (Hoehne) F. Barros
Sin.: *Pleurothallis piratiningana* Hoehne, *Specklinia piratiningana* (Hoehne) F. Barros, *Specklinia piratiningana* (Hoehne) Luer, comb. superfl.
Referencias: Barros, F., 2003; Pabst, G. F. J., 1956b.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2263* (HB, MBM)].

Anathallis racemosa Barb. Rodr. = **Anathallis sclerophylla** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2002, 2004.

Anathallis rigidula (Cogn.) Luer
Sin.: *Pleurothallis rigidula* Cogn., *Specklinia rigidula* (Cogn.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004, 2008.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1090* (ICN)].

Anathallis rubens (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis montserrati* Porsch, *Pleurothallis rubens* Lindl., *Specklinia rubens* (Lindl.) F. Barros, nom. illeg., *Specklinia rubens* (Lindl.) Luer
Referencias: Hoehne, F. C., 1929; Luer, C. A., 2000a, 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 844* (K, MBM, SP)].

Anathallis rudolfii (Pabst) Pridgeon & M.W. Chase = **Panmorphia rudolfii** (Pabst) Luer

Anathallis sclerophylla (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Anathallis racemosa* Barb. Rodr., *Anathallis secunda* Barb. Rodr., *Pleurothallis listrostachys* Rchb. f., *Pleurothallis ottonis* Schltr., *Pleurothallis racemosa* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis sclerophylla* Lindl., *Pleurothallis stenopetala* Lodd. ex Lindl., *Pleurothallis triura* Schltr., *Specklinia sclerophylla* (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2000a, 2004; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 700–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1818* (K, MBM, SP)].

Anathallis secunda Barb. Rodr. = **Anathallis sclerophylla** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Anathallis ypirangae (Kraenzl.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis ypirangae* Kraenzl., *Specklinia ypirangae* (Kraenzl.) Luer
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2705* (MBM)].

Angraecum lansbergii Rchb. f. = **Campylocentrum lansbergii** (Rchb. f.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1938.

Angraecum maculatum Lindl. = **Oeceoclades maculata** (Lindl.) Lindl.

Angraecum micranthum Lindl. = **Campylocentrum micranthum** (Lindl.) Rolfe

Angraecum ornithorrhynchus Lindl. = **Campylocentrum ornithorrhynchum** (Lindl.) Rolfe
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Angraecum poeppigii Rchb. f. = **Campylocentrum poeppigii** (Rchb. f.) Rolfe
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Angraecum sellowii Rchb. f. = **Campylocentrum sellowii** (Rchb. f.) Rolfe
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Anneliesia russeliana (Lindl.) Senghas & Lückel = **Miltonia russelliana** Lindl.

Anthereon mirabilis (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase = **Pabstiella mirabilis** (Schltr.) Brieger & Senghas
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Anthereon tripteranthus (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase = **Pabstiella tripterantha** (Rchb. f.) F. Barros
Referencias: Barros, F., 2002b.

Apoda-prorepentia (Luer) Luer

Número de especies: 2, 1 endémica

Apoda-prorepentia hystrix (Kraenzl.) Luer
Sin.: *Acianthera raduliglossa* (Pabst) Pridgeon & M.W. Chase, *Cryptophoranthus hystrix* (Kraenzl.) Garay, *Cryptophoranthus similis* Schltr., *Phloeophila hystrix* (Kraenzl.) Garay, *Phloeophila similis* (Schltr.) Garay, *Physosiphon hystrix* Kraenzl., *Pleurothallis raduliglossa* Pabst, *Specklinia hystrix* (Kraenzl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004, 2007.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Insaurralde, I. S. 17* (BAB)]; BRA[*Dombrowski, L. T. 3437* (MBM)].

Apoda-prorepentia karlii (Pabst) Luer
Sin.: *Acianthera karlii* (Pabst) C.N. Gonçalves & J.L. Waechter, *Pleurothallis karlii* Pabst
Referencias: Luer, C. A., 2004; Pabst, G. F. J., 1956a.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 800–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19533* (MBM)].

Arethusa biplumata L. f. = **Bipinnula biplumata** (L. f.) Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Arethusa lutea Gaudich. = **Chloraea gaudichaudii** Brongn.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Arthrosia Luer

Número de especies: 7, 1 endémica

Arthrosia auriculata (Lindl.) Luer
Sin.: *Acianthera auriculata* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis anthoxantha* Rchb. f., *Pleurothallis auriculata* Lindl., *Pleurothallis compressiflora* Barb. Rodr., *Specklinia auriculata* (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004, 2006; Vásquez, R. & Ibisch, P. L., 2000.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 38091* (MBM)].

Arthrosia caldensis (Hoehne & Schltr.) Luer
Sin.: *Pleurothallis caldensis* Hoehne & Schltr., *Specklinia caldensis* (Hoehne & Schltr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004, 2006.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hoehne, F. C. s.n.* (SP)].

Arthrosia floribunda (Lindl.) Luer
Sin.: *Acianthera capillaris* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, *Acianthera longicaulis* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, *Humboldtia capillaris* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis capillaris* Lindl., *Pleurothallis longicaulis* Lindl., *Pleurothallis montana* Barb. Rodr., *Specklinia capillaris* (Lindl.) Luer, *Specklinia floribunda* Lindl., *Specklinia longicaulis* (Lindl.) Luer, *Specklinia montana* (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9858* (NY)].

Arthrosia hygrophila (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Acianthera barbacenensis* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Acianthera hygrophila* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis barbacenensis* Barb. Rodr., *Pleurothallis barbacenensis* Barb. Rodr. var. *angustifolia* (Pabst) Pabst, *Pleurothallis hygrophila* Barb. Rodr., *Pleurothallis hygrophila* Barb. Rodr. var. *elongata* Hauman, *Pleurothallis hygrophila* Barb. Rodr. var. *longicaulis* Dutra ex Pabst, *Pleurothallis platysemos* Rchb. f. var. *angustifolia* Pabst, *Pleurothallis platysemos* Rchb. f. var. *platysemos*, *Specklinia barbacenensis* (Barb. Rodr.) Luer, *Specklinia hygrophyla* (Barb. Rodr.) Luer, *Stelis hygrophila* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Bornmüller, J. F. N., 1934; Hatschbach, G., 1963b; Hauman, L. L., 1917b; Luer, C. A., 2004, 2006; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 15808* (CTES)]; BRA[*Spannagel, C. 462* (SP)].

Arthrosia malachantha (Rchb. f.) Luer
Sin.: *Pleurothallis malachantha* Rchb. f., *Specklinia malachantha* (Rchb. f.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004, 2006.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18127* (HB, MBM)].

Arthrosia muscosa (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Acianthera muscosa* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis muscosa* Barb. Rodr., *Pleurothallis muscosa* Barb. Rodr. var. *parvifolia* Hoehne, *Specklinia muscosa* (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Garay, L. A., 1954; Johnson, A. E., 2001; Luer, C. A., 2004, 2006.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 139* (BAB)]; BRA[*Brade, A. C. s.n.* (RB)].

Arthrosia myrticola (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Pleurothallis myrticola* Barb. Rodr., *Specklinia myrticola* (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004, 2006.
Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS).

Asarca acutiflora Poepp. & Endl. = **Gavilea lutea** (Pers.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1956.

Asarca affinis (Lindl.) Kuntze = **Chloraea longipetala** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca alaris (Lindl.) Lindl. = **Chloraea galeata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca alpina (Poepp.) Kuntze = **Chloraea alpina** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca appendiculata Kraenzl. = **Gavilea glandulifera** (Poepp.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1956.

Asarca araucana Phil. = **Gavilea araucana** (Phil.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1956.

Asarca araucana Phil. var. *incisa* Hauman = **Gavilea araucana** (Phil.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1956.

Asarca arechavaletae (Kraenzl.) Kuntze = **Geoblasta pennicillata** (Rchb. f.) Hoehne ex M.N. Correa
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Asarca aurantiaca Lindl. = **Chloraea chrysantha** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca aurea (Phil.) Kuntze = **Chloraea barbata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca australis Skottsb. = **Gavilea australis** (Skottsb.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1956.

Asarca barbata (Lindl.) Kuntze = **Chloraea barbata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca besserii (Rchb. f.) Kuntze = **Chloraea galeata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca bidentata Poepp. & Endl. = **Chloraea bidentata** (Poepp. & Endl.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Asarca brachychila Phil. = **Gavilea lutea** (Pers.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1956.

Asarca calopogon (Phil.) Kuntze = **Chloraea prodigiosa** Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca campestris (Poepp.) Kuntze = **Chloraea multiflora** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca cardioglossa Reiche = **Gavilea cardioglossa** (Reiche) Martic.
Referencias: Marticorena, C., 2001[2000].

Asarca cardioglossa Reiche var. *patagonica* Gay = **Gavilea trullata** Ormd.
Referencias: Lehnebach, C. & Riveros, M., 2000; Ormerod, P., 2002a.

Asarca chlorosticta (Phil.) Kuntze = **Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca chrysantha (Poepp.) Kuntze = **Chloraea chrysantha** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

[Asarca chrysostachya Phil.]
Referencias: Muñoz-Pizarro, C., 1960.
Notas: Nombre dudoso.

Asarca commersonii (Brongn.) Hook. = **Gavilea lutea** (Pers.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1956.

Asarca crispa (Lindl.) Kuntze = **Chloraea crispa** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca crocata (Phil.) Kuntze = **Chloraea chrysantha** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca cuneata (Lindl.) Kuntze = **Chloraea cuneata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca cygnea (Phil.) Kuntze = **Chloraea crispa** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca cylindrostachya (Poepp.) Kuntze = **Chloraea cylindrostachya** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca dasypogon (Phil.) Kuntze = **Chloraea cristata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca densa (A. Rich.) Kuntze = **Chloraea multiflora** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca disoides (Lindl.) Kuntze = **Chloraea disoides** Lindl. var. **disoides**
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca enigmatica Hauman = **Gavilea australis** (Skottsb.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1969b.

Asarca feuilleana Kraenzl. = **Gavilea feuilleana** (Kraenzl.) Lehnebach
Referencias: Lehnebach, C., 2003.

Asarca fimbriata (Phil.) Kuntze = **Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca fonkii (Phil.) Kuntze = **Chloraea gaudichaudii** Brongn.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca gaudichaudii (Brongn.) Kuntze = **Chloraea gaudichaudii** Brongn.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca gayana (A. Rich.) Kuntze = **Chloraea speciosa** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca glandulifera Poepp. = **Gavilea glandulifera** (Poepp.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1956.

Asarca grandiflora (Poepp.) Kuntze = **Chloraea grandiflora** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca heteroglossa (Rchb. f.) Kuntze = **Chloraea heteroglossa** Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca homopetala (Phil.) Kuntze = **Chloraea nudilabia** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca incisa (Poepp.) Kuntze = **Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca inconspicua (Phil.) Kuntze = **Chloraea gaudichaudii** Brongn.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca kingii Hook. f. = **Gavilea kingii** (Hook. f.) M.N. Correa
Referencias: Lehnebach, C. & Riveros, M., 2000.

Asarca lamellata (Lindl.) Kuntze = **Chloraea lamellata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca lechleri (Lindl. ex Kraenzl.) Kuntze = **Chloraea chrysochloa** Phil.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca littoralis (Phil.) Reiche = **Gavilea littoralis** (Phil.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1969b.

Asarca longibracteata Lindl. = **Gavilea venosa** (Lam.) Garay & Ormd.

Asarca longipetala (Lindl.) Kuntze = **Chloraea longipetala** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca lutea (Pers.) Skottsb. = **Gavilea lutea** (Pers.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1956.

Asarca macroptera Kraenzl. = **Gavilea littoralis** (Phil.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1956; Moore, D. M., 1974.

Asarca maculosa Poepp. = **Chloraea galeata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca magellanica (Hook. f.) Kuntze = **Chloraea magellanica** Hook. f.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca multiflora (Lindl.) Kuntze = **Chloraea multiflora** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca nudilabia (Poepp.) Kuntze = **Chloraea nudilabia** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca obovata (Phil.) Kuntze = **Chloraea cuneata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca odontoglossa (A. Rich.) Kuntze = **Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca odoratissima Poepp. & Endl. = **Gavilea odoratissima** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1956.

Asarca parviflora Poepp. = **Chloraea galeata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca patagonica (Phil.) Kuntze = **Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca patagonica Skottsb., hom. illeg. = **Gavilea wittei** (Hicken) Ormd.
Referencias: Correa, M. N., 1956.

Asarca pearcei (Phil.) Kuntze = **Chloraea lamellata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca philippii (Rchb. f.) Kuntze = **Chloraea philippii** Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1969b.

Asarca platyantha auct. non Rchb. f. = **Gavilea odoratissima** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1956.

Asarca platyantha Rchb. f. = **Gavilea platyantha** (Rchb. f.) Ormd.

Asarca poeppigiana (A. Rich.) Kuntze = **Chloraea multiflora** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca pogonata (Phil.) Kuntze = **Chloraea cristata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca prodigiosa (Rchb. f.) Kuntze = **Chloraea prodigiosa** Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca rypaloglossa (A. Rich.) Kuntze = **Chloraea galeata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca sceptrum (Rchb. f.) Kuntze = **Chloraea gavilu** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca secunda (Phil.) Kuntze = **Chloraea galeata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca semibarbata (Lindl.) Kuntze = **Chloraea lamellata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca sinuata Lindl. = **Gavilea venosa** (Lam.) Garay & Ormd.

Asarca speciosa Lindl. = **Chloraea chrysantha** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca spectabilis Phil. = **Gavilea venosa** (Lam.) Garay & Ormd.

Asarca suaveolens (Phil.) Kuntze = **Chloraea galeata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

[Asarca sulphurea Phil.]
Referencias: Muñoz-Pizarro, C., 1960.
Notas: Nombre dudoso.

Asarca thermarun Phil. & Kraenzl. = **Gavilea lutea** (Pers.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1956.

Asarca unguis-cati (Rchb. f.) Kuntze = **Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca ventanai Hauman = **Gavilea odoratissima** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1956.

Asarca virescens (Lindl.) Kuntze = **Chloraea gavilu** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Asarca viridiflora (Poepp.) Kuntze = **Chloraea viridiflora** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Aspasia Lindl.

Número de especies: 1

Aspasia lunata Lindl.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1952b, 1953; Schlechter, F. R. R., 1926.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1033* (SI)].

Aspidogyne Garay

Número de especies: 10, 2 endémicas

Aspidogyne argentea (Vell.) Garay
Sin.: *Ophrys argentea* Vell., *Physurus callodictyus* Kraenzl., *Physurus pictus* Lindl.
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977, 1982[1980]; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1026* (MBM, SP)]; PRY[*Hassler, E. 6447* (G)].

Aspidogyne bicolor (Barb. Rodr.) Garay
Sin.: *Erythrodes bicolor* (Barb. Rodr.) Ames, *Physurus bicolor* Barb. Rodr.
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977, 1982[1980]; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3514* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 5374* (G)].

Aspidogyne bidentifera (Schltr.) Garay
Sin.: *Erythrodes bidentifera* (Schltr.) Garay, *Physurus bidentiferus* Schltr.
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1954, 1977, 1982[1980].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Keller, H. A. 97* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 32840* (MBM)].

Aspidogyne bruxellii (Pabst) Garay
Sin.: *Aspidogyne bruxellii* Pabst var. *acutiloba* Pabst, *Erythrodes bruxellii* Pabst
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Correa, M. N., 1995; Garay, L. A., 1977, 1982[1980]; Pabst, G. F. J., 1952b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 5962* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 23259* (MBM, SP)].

Aspidogyne bruxellii Pabst var. *acutiloba* Pabst = **Aspidogyne bruxellii** (Pabst) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Aspidogyne commelinoides (Barb. Rodr.) Garay = **Erythrodes commelinoides** (Barb. Rodr.) Ames

Aspidogyne fimbrillaris (Buyss.) Garay
Sin.: *Erythrodes nobilis* (Rchb. f.) Pabst, *Erythrodes picta* (Lindl.) Ames, *Physurus fimbrillaris* Buyss., *Physurus nobilis* Rchb. f., *Physurus nobilis* Rchb. f. var. *argyrocentrus* Hoehne
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977, 1982[1980]; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Rocha, F. S. & Waechter, J. L., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 27682* (HB, MBM, NY)].

Aspidogyne foliosa (Poepp. & Endl.) Garay
Sin.: *Erythrodes densiflora* (Lindl.) Ames, *Erythrodes foliosa* (Poepp. & Endl.) Ames, *Pelexia foliosa* Poepp. & Endl., *Physurus densiflorus* Lindl., *Physurus foliosus* (Poepp. & Endl.) Lindl.
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977, 1982[1980].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–400 m.
Países: PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Marín, G. 245* (CTES)].

Aspidogyne kuczynskii (Porsch) Garay
Sin.: *Erythrodes dichopetala* (Kraenzl.) L.O. Williams, *Erythrodes kuczynskii* (Porsch) Garay, *Physurus dichopetalus* Kraenzl., *Physurus kuczynskii* Porsch

Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977, 1982[1980]; Johnson, A. E., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA, GUA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 11040* (SI)]; BRA[*Lindeman, J. C. 4430* (NY)]; PRY[*Woolston, A. L. 631* (NY)].

Aspidogyne lindleyana (Cogn.) Garay
Sin.: *Erythrodes lindleyana* (Cogn.) Ames, *Physurus lindleyanus* Cogn., *Physurus lindmanii* Kraenzl.
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977, 1982[1980]; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2118* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 17465* (MBM)].

Aspidogyne longicornu (Cogn.) Garay
Sin.: *Erythrodes longicornu* (Cogn.) Ames, *Physurus longicalcaratus* Schltr., *Physurus longicornu* Cogn.
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977, 1982[1980].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24662* (MBM)].

Aspidogyne malmei (Kraenzl.) Garay
Sin.: *Erythrodes malmei* (Kraenzl.) Pabst, *Physurus malmei* Kraenzl.
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Correa, M. N., 1995; Garay, L. A., 1982[1980]; Kraenzlin, F. W. L., 1911.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6863* (SI)]; BRA[*Malme, G. O. A. 818* (C, S)].

Barbosella Schltr.

Número de especies: 7

Barbosella australis (Cogn.) Schltr.
Sin.: *Barbosella australis* (Cogn.) Schltr. var. *genuina* Hoehne, *Restrepia australis* Cogn.
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952; Fraga Nunes, V., 1997; Hatschbach, G., 1962b; Luer, C. A., 2000c; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 12634* (MBM, US)].

Barbosella australis (Cogn.) Schltr. var. *genuina* Hoehne = **Barbosella australis** (Cogn.) Schltr.
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952.

Barbosella cogniauxiana (Speg. & Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Barbosella handroi* Hoehne, *Barbosella porschiana* (Kraenzl.) Schltr., *Barbosella riograndensis* Dutra ex Pabst, nom. nud., *Pleurothallis hamburgensis* Kraenzl., *Pleurothallis spegazziana* L.O. Williams, *Restrepia cogniauxiana* Speg. & Kraenzl., *Restrepia porschiana* Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1984h; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Luer, C. A., 2000c; Pabst, G. F. J., 1955b; Waechter, J. L., 1998; Williams, L. O., 1941.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 11068* (BAB)]; BRA[*Leite, J. E. 378* (SP)].

Barbosella crassifolia (Edwall) Schltr.
Sin.: *Barbosella crassifolia* (Edwall) Schltr. var. *hamburgensis* (Kraenzl.) Garay, *Barbosella hamburgensis* (Kraenzl.) Hoehne, *Restrepia crassifolia* Edwall
Referencias: Luer, C. A., 2000c; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 800–1500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pivetta, P. s.n.* (RB)].

Barbosella crassifolia (Edwall) Schltr. var. *hamburgensis* (Kraenzl.) Garay = **Barbosella crassifolia** (Edwall) Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 2000c.

Barbosella dusenii (A. Samp.) Schltr.
Sin.: *Barbosella gardneri* (Lindl.) Schltr. var. *dusenii* (A. Samp.) Hoehne, *Restrepia dusenii* A. Samp.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911; Luer, C. A., 2000c; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Waechter, J. L., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 8070* (AMES, HBG, K, MO, NY, S), *Hatschbach, G. 21449* (SP)].

Barbosella gardneri (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Barbosella microphylla* (Barb. Rodr.) Schltr., *Pleurothallis gardneri* Lindl.
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952; Luer, C. A., 2000c; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 700–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 8202* (MBM)].

Barbosella gardneri (Lindl.) Schltr. var. *dusenii* (A. Samp.) Hoehne = **Barbosella dusenii** (A. Samp.) Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 2000c.

Barbosella hamburgensis (Kraenzl.) Hoehne = **Barbosella crassifolia** (Edwall) Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 2000c.

Barbosella handroi Hoehne = **Barbosella cogniauxiana** (Speg. & Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 2000c.

Barbosella microphylla (Barb. Rodr.) Schltr. = **Barbosella gardneri** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 2000c.

Barbosella miersii (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Barbrodia miersii* (Lindl.) Luer, *Pleurothallis miersii* Lindl.
Referencias: Klein, R. M., 1979; Luer, C. A., 2000c.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 900–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2910* (AMES, MBM)].

Barbosella porschiana (Kraenzl.) Schltr. = **Barbosella cogniauxiana** (Speg. & Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 2000c.

Barbosella riograndensis Dutra ex Pabst, nom. nud. = **Barbosella cogniauxiana** (Speg. & Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 2000c.

Barbosella trilobata Pabst
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Luer, C. A., 2000c; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 27578* (SP)].

Barbrodia miersii (Lindl.) Luer = **Barbosella miersii** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 2000c.

Baskervilla Lindl.

Número de especies: 1

Baskervilla paranaensis (Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Ponthieva paranaensis* Kraenzl.
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952; Hashimoto, T., 1993; Hoehne, F. C., 1945; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1919–1920.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 10084* (S)].

Beadlea aprica (Lindl.) Garay = **Cyclopogon apricus** (Lindl.) Schltr.

Beadlea argyrifolia (Barb. Rodr.) Garay = **Cyclopogon argyrifolius** Barb. Rodr.

Beadlea bicolor (Ker Gawl.) Garay = **Cyclopogon bicolor** (Ker Gawl.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Beadlea calophylla (Barb. Rodr.) Garay = **Cyclopogon calophyllus** (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Beadlea congesta (Vell.) Garay = **Cyclopogon congestus** (Vell.) Hoehne

Beadlea diversifolia (Cogn.) Garay = **Cyclopogon apricus** (Lindl.) Schltr.

Beadlea dusenii (Schltr.) Garay = **Cyclopogon dusenii** Schltr.

Beadlea dutraei (Schltr.) Garay = **Cyclopogon dutraei** Schltr.

Beadlea elata (Sw.) Small = **Cyclopogon elatus** (Sw.) Schltr.

Beadlea elegans (Hoehne) Garay = **Cyclopogon elegans** Hoehne

Beadlea graciliscapa (Schltr.) Garay = **Cyclopogon graciliscapus** Schltr.

Beadlea hatschbachii (Schltr.) Garay = **Cyclopogon hatschbachii** Schltr.

Beadlea iguapensis (Schltr.) Garay = **Cyclopogon iguapensis** Schltr.

Beadlea itatiaiensis (Kraenzl.) Garay = **Cyclopogon itatiaiensis** (Kraenzl.) Hoehne

Beadlea longibracteata Barb. Rodr. = **Cyclopogon longibracteatus** (Barb. Rodr.) Schltr.

Beadlea multiflora (Schltr.) Garay = **Cyclopogon multiflorus** Schltr.

Beadlea oligantha (Hoehne) Garay = **Cyclopogon oliganthus** (Hoehne) Hoehne & Schltr.

Beadlea subalpestris (Schltr.) Garay = **Cyclopogon subalpestris** Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Beadlea taquaremboensis (Barb. Rodr.) Garay = **Cyclodium taquaremboensis** (Barb. Rodr.) Schltr.

Beadlea trifasciata (Schltr.) Garay = **Cyclopogon trifasciatus** Schltr.

Beadlea variegata (Barb. Rodr.) Garay = **Cyclopogon variegatus** Barb. Rodr.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Beadlea vittata (Dutra ex Pabst) Garay = **Cyclopogon vittatus** Dutra ex Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J., 1959a.

Beadlea warmingii (Rchb. f.) Schltr. = **Cyclopogon warmingii** (Rchb. f.) Schltr.

Beloglottis Schltr.

Número de especies: 1

Beloglottis boliviensis Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500 m.

Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Palací, C. A. 757* (MCNS)].

Bieneria boliviana Rchb. f. = **Chloraea boliviana** (Rchb. f.) Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Bifrenaria Lindl.

Número de especies: 6

Bifrenaria aurea Barb. Rodr. = **Bifrenaria harrisoniae** (Hook.) Rchb. f. var. **harrisoniae**
Referencias: Koehler, S. & Amaral, M. E., 2004.

Bifrenaria aureo-fulva (Hook.) Lindl.
Sin.: *Adipe aureo-fulva* (Hook.) M. Wolff, *Bifrenaria secunda* (Vell.) Pabst, *Epidendrum secundum* auct. non Jacq., *Maxillaria aureo-fulva* Hook., *Maxillaria stenopetala* Knowles & Westc., *Stenocoryne aureo-fulva* (Hook.) Kraenzl., *Stenocoryne secunda* (Vell.) Hoehne
Referencias: Castro Neto, V. P., 2004; Koehler, S. & Amaral, M. E., 2004; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7678* (MBM, NY)].

Bifrenaria calcarata (Vell.) V.P. Castro, nom. illeg. = **Bifrenaria tetragona** (Lindl.) Schltr.

Bifrenaria hadwenii Lindl. = **Scuticaria hadwenii** (Lindl.) Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1953.

Bifrenaria harrisoniae (Hook.) Rchb. f. var. *alba* Kraenzl. = **Bifrenaria harrisoniae** (Hook.) Rchb. f. var. **harrisoniae**
Referencias: Castro Neto, V. P. & Campacci, M. A., 2004.

Bifrenaria harrisoniae (Hook.) Rchb. f. var. **grandiflora** Hort
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 9403* (HB)].

Bifrenaria harrisoniae (Hook.) Rchb. f. var. **harrisoniae**
Sin.: *Bifrenaria aurea* Barb. Rodr., *Bifrenaria harrisoniae* (Hook.) Rchb. f. var. *alba* Kraenzl., *Dendrobium harrisoniae* Hook.
Referencias: Castro Neto, V. P. & Campacci, M. A., 2004; Koehler, S. & Amaral, M. E., 2004; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20070* (MBM)].

Bifrenaria harrisoniae (Hook.) Rchb. f. var. **pubifera** Rchb. f.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2802* (HB, MBM)].

Bifrenaria inodora Lindl.
Sin.: *Bifrenaria inodora* Lindl. var. *violacea* Rchb. f., *Bifrenaria inodora* Lindl. var. *xanthina* Rchb. f.
Referencias: Koehler, S. & Amaral, M. E., 2004; Koehler, S., Williams, N. H., Whitten, W. M. & Amaral, M. E., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1163* (HB)].

Bifrenaria inodora Lindl. var. *violacea* Rchb. f. = **Bifrenaria inodora** Lindl.

Bifrenaria inodora Lindl. var. *xanthina* Rchb. f. = **Bifrenaria inodora** Lindl.

Bifrenaria lindmaniana Kraenzl. = **Rudolfiella lindmaniana** (Kraenzl.) Hoehne
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Bifrenaria racemosa (Hook.) Lindl.
Sin.: *Maxillaria racemosa* Hook., *Stenocoryne racemosa* (Hook.) Kraenzl.
Referencias: Castro Neto, V. P., 2004; Koehler, S. & Amaral, M. E., 2004; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 200–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Brade, A. C. 24925* (RB)].

Bifrenaria secunda (Vell.) Pabst = **Bifrenaria aureo-fulva** (Hook.) Lindl.
Referencias: Castro Neto, V. P., 2004.

Bifrenaria stefanae V.P. Castro
Referencias: Koehler, S. & Amaral, M. E., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 900–1400 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Guimarães s.n.* (RB)].

Bifrenaria tetragona (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Bifrenaria calcarata* (Vell.) V.P. Castro, nom. illeg., *Bifrenaria tetragona* (Lindl.) Schltr. var. *umbrophylla* Hoehne, *Epidendrum calcarata* Vell.
Referencias: Koehler, S. & Amaral, M. E., 2004; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953; Schlechter, F. R. R., 1926.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 61407* (MBM)].

Bifrenaria tetragona (Lindl.) Schltr. var. *umbrophylla* Hoehne = **Bifrenaria tetragona** (Lindl.) Schltr.

[Bifrenaria vitellina (Lindl.) Lindl.]
Sin.: *Maxillaria vitellina* Lindl., *Stenocoryne vitellina* (Lindl.) Kraenzl.
Referencias: Koehler, S. & Amaral, M. E., 2004.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Bipinnula Comm. ex Juss.

Número de especies: 9 endémicas

Bipinnula apinnula Gosewijn = **Chloraea apinnula** (Gosewijn) Szlach.

Bipinnula biplumata (L. f.) Rchb. f.
Sin.: *Arethusa biplumata* L. f., *Bipinnula bonariensis* Spreng., hom. illeg., *Bipinnula commersonii* Lindl.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Izaguirre, P., 1973; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); BRA(PAR, RGS); URY(MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. 5156* (CORD)]; BRA[*Hatschbach, G. 1030* (MBM)]; URY[*Arechavaleta, J. 2628* (MVFA)].

Bipinnula bonariensis Spreng., hom. illeg. = **Bipinnula biplumata** (L. f.) Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1996.

Bipinnula canisii Dutra ex Pabst = **Bipinnula montana** Arechav.

Bipinnula commersonii Lindl. = **Bipinnula biplumata** (L. f.) Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1996.

Bipinnula ctenopetala Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Wendt, H. s.n.* (B)].

Bipinnula fimbriata (Poepp.) I.M. Johnst.
Sin.: Bipinnula mystacina Lindl., Chloraea fimbriata Poepp., *Jouyella fimbriata* (Poepp.) Szlach. & Marg.
Referencias: Lehnebach, C., 2003.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1200 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Giles, C. 234* (SI)].

Bipinnula gibertii Rchb. f.
Referencias: Herter, W. G. F., 1935; Izaguirre, P., 1973; Pabst, G. F. J., 1952a.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(DUR, LAV, MAL, MON, RIV, SOR).
Ejemplares de referencia: URY[*Osten, C. 5289* (SI)].

Bipinnula montana Arechav.
Sin.: *Bipinnula canisii* Dutra ex Pabst
Referencias: Izaguirre, P., 1973.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(CLA, LAV, MAL, MON, RIV).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1180* (PACA, SP)]; URY[*Herter, W. G. F. 442c* (SI)].

Bipinnula mystacina Lindl. = **Bipinnula fimbriata** (Poepp.) I.M. Johnst.

Bipinnula plumosa Lindl.
Sin.: *Jouyella plumosa* (Lindl.) Szlach. & Marg.
Referencias: Lehnebach, C., 2003.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 4439* (CONC)].

Bipinnula polysyka Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1959; Pabst, G. F. J., 1952a.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8424* (LP)]; URY[*Osten, C. 4702b* (SI)].

Bipinnula taltalensis I.M. Johnst.
Sin.: *Jouyella taltalensis* (I.M. Johnst.) Szlach. & Marg.
Referencias: Johnston, I. M., 1929a; Lehnebach, C., 2003.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5372* (GH)].

Bipinnula volkmannii Kraenzl.
Referencias: Lehnebach, C., 2003.
Hierba epífita. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Rodríguez Ríos, R. 2259* (CONC)].

Bletia Ruiz & Pav.

Número de especies: 2

Bletia catenulata Ruiz & Pav.
Referencias: Dressler, R. L., 1968.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(SAL); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 1040* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 21475* (CTES)].

Bletia wagenerii Rchb. f.
Referencias: Hauman, L. L., 1921a; Williams, L. O., 1939.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–1200 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 2537* (LIL)].

Bonatea pratensis Lindl. = **Habenaria pratensis** (Lindl.) Rchb. f.

Brachionidium Lindl.

Número de especies: 1

Brachionidium dungsii Pabst = **Brachionidium restrepioides** (Hoehne) Pabst

Brachionidium restrepioides (Hoehne) Pabst
Sin.: *Brachionidium dungsii* Pabst, *Yolanda restrepioides* Hoehne
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 100–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. s.n.* (R)].

Brachystele Schltr.

Número de especies: 13, 6 endémicas

Brachystele arechavaletae (Kraenzl.) Schltr.
= **Diskyphogyne arechavaletae** (Kraenzl.) Szlach. & R. González
Referencias: Szlachetko, D. L. & González Tamayo, R., 1996.

Brachystele atramentaria (Kraenzl.) Schltr.
= **Brachystele widgreni** (Rchb. f.) Schltr.

Brachystele bicrinita Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 1906* (HBG)].

Brachystele bracteosa (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes bracteosa* Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(RGS, SCA); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 1909* (HB)]; PRY[*Lindman, N. A. 1799* (S)].

Brachystele burkartii M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1953, 1955.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14501* (SI)].

Brachystele camporum (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Brachystele delicatula* auct. non (Kraenzl.) Schltr., *Spiranthes camporum* Lindl., *Spiranthes delicatula* auct. non Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1955; Herter, W. G. F., 1935; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(CEN, COA, PAI); URY(CAS, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 17767* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 12238* (MBM, NY)]; PRY[*Nicora, E. G. 9940* (SI)]; URY[*Arechavaleta, J. 17327* (MBM)].

Brachystele chlorops (Rech. f.) Schltr.
Sin.: *Odontorrhynchus chlorops* (Rchb. f.) Garay, *Spiranthes chlorops* Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1975a.
Hierba. Perenne. Nativa. 2800–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 5965* (BAB)].

Brachystele cyclochila (Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Brachystele cycloglossa* (Kraenzl.) Schltr., *Spiranthes cyclochila* Kraenzl.
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952; Correa, M. N., 1975a; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(AMA); URY(LAV, MAL, RNO, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 27207* (SI)]; BRA[*Eskuche, U. G. 868* (CTES)]; PRY[*Schinini, A. 2910* (CTES)]; URY[*Berro, M. B. 3075* (*)].

Brachystele cycloglossa (Kraenzl.) Schltr. = **Brachystele cyclochila** (Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Schlechter, F. R. R., 1919–1920.

Brachystele delicatula auct. non (Kraenzl.) Schltr.
= **Brachystele camporum** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1996.

Brachystele dilatata (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Brachystele hoehnei* Pabst, *Brachystele ulaei* (Cogn.) Schltr., *Spiranthes dilatata* Lindl., *Spiranthes ulaei* Cogn.
Referencias: Correa, M. N., 1955; Hauman, L. L., 1921a; Herter, W. G. F., 1935; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PAI); URY(CAS, COL, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 360* (SI)]; BRA[*Hoehne, F. C. 1074* (SP)]; PRY[*Burkart, A. 18670* (SI)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 1694* (*)].

Brachystele hatschbachii Pabst = **Stigmatosema hatschbachii** (Pabst) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Brachystele hoehnei Pabst = **Brachystele dilatata** (Lindl.) Schltr.

Brachystele icmadophila (Barb. Rodr.) Schltr. ex Pabst
Sin.: *Cyclopogon icmadophilus* (Barb. Rodr.) Schltr., *Spiranthes icmadophila* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr., *Stenorrhynchos icmadophilus* Barb. Rodr.
Referencias: Barbosa Rodrigues, J., 1996; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 1908* (P)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Pabst & Dungs, 1975).

Brachystele pappulosa Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: URY(MON).
Ejemplares de referencia: URY[*Saint-Hilaire, A. F. C. P. 2406 c2* (P)].

Brachystele scabrilingua Szlach. = **Diskyphogyne scabrilingua** (Szlach.) Szlach. & R. González
Referencias: Szlachetko, D. L. & González Tamayo, R., 1996.

Brachystele subfiliformis (Cogn.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes subfiliformis* Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22572* (MBM)].

Brachystele ulaei (Cogn.) Schltr. = **Brachystele dilatata** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1955.

Brachystele unilateralis (Poir.) Schltr.
Sin.: *Ophrys unilateralis* Poir., *Spiranthes diuretica* Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1955, 1969b; Garay, L. A., 1954; Lehnebach, C., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(CHU, RNE); CHL(IV, V, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. s.n.* (BA)]; CHL[*Morrison, J. L. 17545* (SI)].

Brachystele waldemarii Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: URY(LAV).
Ejemplares de referencia: URY[*Arechavaleta, J. s.n.* (HBG)].

Brachystele widgreni (Rchb. f.) Schltr.
Sin.: *Acraea widgreni* Rchb. f., *Brachystele atramentaria* (Kraenzl.) Schltr., *Spiranthes atramentaria* Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(ERI); BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 811* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 28225* (MBM)].

Brassavola R. Br., nom. cons.

Número de especies: 1

Brassavola cebolleta Rchb. f. = **Brassavola tuberculata** Hook.
Referencias: Jones, H. G., 1975.

Brassavola chacoensis Kraenzl. = **Brassavola tuberculata** Hook.
Referencias: Jones, H. G., 1975.

Brassavola fragans Barb. Rodr. = **Brassavola tuberculata** Hook.

Brassavola perrinii Lindl. = **Brassavola tuberculata** Hook.
Referencias: Jones, H. G., 1975.

Brassavola perrinii Lindl. var. *pluriflora* Hauman = **Brassavola tuberculata** Hook.
Referencias: Jones, H. G., 1975.

Brassavola revoluta Barb. Rodr. = **Brassavola tuberculata** Hook.

Brassavola tuberculata Hook.
Sin.: *Brassavola cebolleta* Rchb. f., *Brassavola chacoensis* Kraenzl., *Brassavola fragans* Barb. Rodr., *Brassavola perrinii* Lindl., *Brassavola perrinii* Lindl. var. *pluriflora* Hauman, *Brassavola revoluta* Barb. Rodr.
Referencias: Fraga Nunes, V., 1997; Hauman, L. L., 1917b; Johnson, A. E., 2001; Jones, H. G., 1975; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN, GUA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1262* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 16001* (MBM, NY)]; PRY[*Jörgensen, P. 3952* (LP, SP)].

Buchtienia Schltr.

Número de especies: 1

Buchtienia boliviensis Schltr.
Referencias: Hashimoto, T., 1993.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 39175* (AS, MO)].

Bulbophyllum Thouars

Número de especies: 19, 1 endémica

Bulbophyllum chloroglossum Rchb. f. & Warm.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 200–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5371* (G)].

Bulbophyllum dusenii Kraenzl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10110 b* (S)].

Bulbophyllum glutinosum (Barb. Rodr.) Cogn.
Sin.: *Didactyle glutinosa* Barb. Rodr.
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16519* (MBM)].

Bulbophyllum granulosum Barb. Rodr.
Sin.: *Didactyle granulosa* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.
Referencias: Barbosa Rodrigues, J., 1996; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. 2060–a* (HBR)].

Bulbophyllum jaguariahyvae Kraenzl. = **Bulbophyllum tripetalum** Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Bulbophyllum laciniatum (Barb. Rodr.) Cogn. var. **janeirense** Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 3531* (MBM)].

Bulbophyllum laciniatum (Barb. Rodr.) Cogn. var. **laciniatum**
Sin.: *Didactyle laciniata* Barb. Rodr.
Referencias: Barbosa Rodrigues, J., 1996; Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3145* (MBM)].

Bulbophyllum luederwaldtii Hoehne & Schltr.
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2659* (MBM)].

Bulbophyllum mentosum Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. 2133* (HBR)].

Bulbophyllum micranthum Hook. f.
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20027* (MBM, NY)].

Bulbophyllum napellii Lindl.
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7017* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2113* (MBM, SI)].

Bulbophyllum napelloides Kraenzl. = **Bulbophyllum regnellii** Rchb. f.

Bulbophyllum paranaense Schltr.
Sin.: *Bulbophyllum paranaense* Schltr. var. *pauloense* Hoehne & Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Handro, O. 502* (SPF)].

Bulbophyllum paranaense Schltr. var. *pauloense* Hoehne & Schltr. = **Bulbophyllum paranaense** Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Bulbophyllum perii Schltr.
Sin.: *Bulbophyllum proencai* Leite
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 17007* (MBM, S)].

Bulbophyllum plumosum (Barb. Rodr.) Cogn.
Sin.: *Didactyle plumosum* Barb. Rodr.
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14206* (MBM)].

Bulbophyllum proencai Leite = **Bulbophyllum perii** Schltr.

Bulbophyllum punctatum Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 12324* (MBM)].

Bulbophyllum regnellii Rchb. f.
Sin.: *Bulbophyllum napelloides* Kraenzl., *Bulbophyllum sturmhoefelii* Hoehne
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 700–900 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 453* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 966* (SI)].

Bulbophyllum rojasii L.O. Williams = **Bulbophyllum tripetalum** Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Bulbophyllum rupicolum Barb. Rodr.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10284* (G)].

Bulbophyllum sturmhoefelii Hoehne = **Bulbophyllum regnellii** Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Bulbophyllum teresense Ruschi
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 200–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3267* (MBM)].

Bulbophyllum tessenianum Kraenzl.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 200–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10110 a* (MBM)].

Bulbophyllum tripetalum Lindl.
Sin.: *Bulbophyllum jaguariahyvae* Kraenzl., *Bulbophyllum rojasii* L.O. Williams

Referencias: Johnson, A. E., 2001; Kraenzlin, F. W. L., 1921b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 515* (MU, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 14009* (NY)]; PRY[*Rojas, T. 5198* (GH)].

Bulbophyllum warmingianum Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–1200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Arbo, M. M. 4320* (CTES, SPF)].

Burlingtonia amoena Planch. = **Rodriguezia decora** (Lem.) Rchb. f.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Burlingtonia decora Lem. = **Rodriguezia decora** (Lem.) Rchb. f.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Burlingtonia maculata Lindl. = **Rodriguezia maculata** (Lindl.) Rchb. f.

Burlingtonia pubescens Lindl. = **Rodriguezia pubescens** (Lindl.) Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Calopogon lessonii Brongn. = **Codonorchis lessonii** (Brongn.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969b.

Camaridium carinatum (Barb. Rodr.) Hoehne = **Maxillaria imbricata** Barb. Rodr.

Camaridium hoehnei Pabst = **Maxillaria imbricata** Barb. Rodr.

Camaridium hoehnei Pabst var. *carinatum* (Barb. Rodr.) Pabst = **Maxillaria imbricata** Barb. Rodr.
Referencias: Dodson, C. H. & Dodson, P. M., 1980.

Camaridium hoehnei Pabst var. *iguapense* (Hoehne & Schltr.) Pabst = **Maxillaria imbricata** Barb. Rodr.

Camaridium imbricatum (Barb. Rodr.) Hoehne = **Maxillaria imbricata** Barb. Rodr.

Camaridium imbricatum (Barb. Rodr.) Hoehne var. *carinatum* (Barb. Rodr.) Pabst = **Maxillaria imbricata** Barb. Rodr.
Referencias: Dodson, C. H. & Dodson, P. M., 1980.

Camaridium imbricatum (Barb. Rodr.) Hoehne var. *iguapense* (Hoehne & Schltr.) Hoehne = **Maxillaria imbricata** Barb. Rodr.

Camaridium purpureum Spreng. = **Maxillaria parviflora** (Poepp. & Endl.) Garay

Camaridium rigidum (Barb. Rodr.) Schltr. = **Maxillaria rigida** Barb. Rodr.

[Camaridium robustum Barb. Rodr.]
Notas: Nombre dudoso.

Campylocentrum Benth.

Número de especies: 19

Campylocentrum aromaticum Barb. Rodr.
Sin.: *Campylocentrum hatschbachii* Schltr., *Campylocentrum rhomboglossum* Hoehne & Schltr., *Campylocentrum trachycarpum* Kraenzl.
Referencias: Fraga Nunes, V., 1997; Johnson, A. E., 2001; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1959c; Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 217* (BAB, CTES)]; BRA[*Waechter, J. L. 1072* (ICN, SP)].

Campylocentrum brachycarpum Cogn.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lindman, N. A. 801* (S)].

Campylocentrum burchellii Cogn. = **Campylocentrum grisebachii** Cogn.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

[Campylocentrum crassirhizum Hoehne]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Campylocentrum densiflorum Cogn.
Sin.: *Campylocentrum dutrai* Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1954; Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2647* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 846* (ICN, SI)]; PRY[*Caballero Mármori, G. 750* (CTES)].

Campylocentrum dutrai Schltr. = **Campylocentrum densiflorum** Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Campylocentrum filiformis (Griseb.) Cogn. ex Griseb. = **Campylocentrum grisebachii** Cogn.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Campylocentrum gracile Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 800–1200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 397* (RB)].

Campylocentrum grisebachii Cogn.
Sin.: *Aeranthus filiformis* Griseb., *Campylocentrum burchellii* Cogn., *Campylocentrum filiformis* (Griseb.) Cogn. ex Griseb.
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Williams, L. O., 1939.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 1058* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 1527* (SP)]; PRY[*Rojas, T. 3871a* (AS, SP)].

Campylocentrum hasslerianum Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1938.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rodríguez, D. P. 13* (SP)]; PRY[*Jörgensen, P. 3950* (LP, SP)].

Campylocentrum hatschbachii Schltr.
= **Campylocentrum aromaticum** Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Campylocentrum hirtellum Cogn.
Referencias: Klein, R. M., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1152* (HB)].

Campylocentrum iglesiasii Brade
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Iglesias, A. s.n.* (RB)].

Campylocentrum lansbergii (Rchb. f.) Schltr.
Sin.: *Angraecum lansbergii* Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Brade, A. C. s.n.* (HB)].

Campylocentrum linearifolium Schltr. ex Mansf.
= **Campylocentrum micranthum** (Lindl.) Rolfe
Referencias: Toscano de Brito, A. L. V., Cribb, P. J. & Smidt, E. C., 2005.

Campylocentrum mattogrossense Hoehne
= **Campylocentrum robustum** Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe
Sin.: *Angraecum micranthum* Lindl., *Campylocentrum linearifolium* Schltr. ex Mansf.
Referencias: Hatschbach, G., 1966; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 200–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 21247* (MBM)].

Campylocentrum neglectum (Rchb. f. & Warm.) Cogn.
Sin.: *Aeranthus neglectum* Rchb. f. & Warm., *Campylocentrum neglectum* (Rchb. f. & Warm.) Cogn. var. *angustifolium* Cogn.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Dematteis, M. & Daviña, J. R., 1999; Hauman, L. L., 1917b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Stutz, L. C., 1983; Williams, L. O., 1939.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CEN, CON, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2236* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 981* (ICN)]; PRY[*Anisits, J. D. 2275* (S)].

Campylocentrum neglectum (Rchb. f. & Warm.) Cogn. var. *angustifolium* Cogn. = **Campylocentrum neglectum** (Rchb. f. & Warm.) Cogn.

Campylocentrum organensis (Rchb. f.) Rolfe
Sin.: *Aeranthus organensis* Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1962.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Abendroth, A. 135* (HB)].

Campylocentrum ornithorrhynchum (Lindl.) Rolfe
Sin.: *Angraecum ornithorrhynchus* Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 997* (ICN, SI)].

Campylocentrum parahybunense (Barb. Rodr.) Rolfe
Sin.: *Aeranthus parahybunensis* Barb. Rodr., *Campylocentrum parahybunense* (Barb. Rodr.) Rolfe var. *gracilis* Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20963* (MBM)].

Campylocentrum parahybunense (Barb. Rodr.) Rolfe var. *gracilis* Cogn. = **Campylocentrum parahybunense** (Barb. Rodr.) Rolfe

Campylocentrum pauloense Hoehne & Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 8416* (BAB)].

Campylocentrum poeppigii (Rchb. f.) Rolfe
Sin.: *Angraecum poeppigii* Rchb. f.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 700–900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Huber, J. E. s.n.* (SP)].

Campylocentrum rhomboglossum Hoehne & Schltr. = **Campylocentrum aromaticum** Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Campylocentrum robustum Cogn.
Sin.: *Campylocentrum mattogrossense* Hoehne
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pabst, G. F. J. 1223* (HB)].

Campylocentrum sellowii (Rchb. f.) Rolfe
Sin.: *Angraecum sellowii* Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. 47* (HBR)].

Campylocentrum trachycarpum Kraenzl. = **Campylocentrum aromaticum** Barb. Rodr.
Referencias: Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Campylocentrum ulaei Cogn.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1083* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 983* (ICN, SI)].
Notas: Johnson (2001) cita esta especie para Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia.

Capanemia Barb. Rodr.

Número de especies: 11, 3 endémicas

Capanemia adelaidae Brade
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1972d.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 4694* (MBM)].

Capanemia angustilabia Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1972d.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2317* (MBM, SP)].

Capanemia australis (Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Quekettia australis* Kraenzl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 3032* (NY)]; PRY[*Woolston, A. L. 1010* (NY)].

Capanemia brachycion (Griseb.) Schltr.
Sin.: *Sigmatostalyx brachycion* Griseb.
Referencias: Correa, M. N., 1996; Grisebach, A. H. R., 1879; Pabst, G. F. J., 1974b.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 300–1200 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. s.n.* (CORD)].

Capanemia duseniana (Kraenzl.) Brade = **Capanemia thereziae** Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Capanemia gehrtii Hoehne
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1966, 1972d.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3307* (MBM)].

Capanemia hatschbachii Schltr. = **Capanemia thereziae** Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Capanemia juergensiana (Kraenzl.) Schltr. = **Capanemia superflua** (Rchb. f.) Garay

Capanemia micromera Barb. Rodr.
Sin.: *Quekettia micromera* (Barb. Rodr.) Cogn., *Quekettia microscopica* Lindl. var. *naboulettiana* Hauman
Referencias: Correa, M. N., 1995; Fraga Nunes, V., 1997; Izaguirre, P., 1972; Johnson, A. E., 2001; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CAA, GUA, SPE); URY(TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2070* (SI)]; BRA[*Kuhlmann, J. G. s.n.* (LP, SP)]; PRY[*Rojas, T. 3835* (SP)]; URY[*San Martín, P. 2772* (MVFA)].

Capanemia paranaensis Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Schlechter, F. R. R., 1919.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. s.n.* (*)].

Capanemia riograndensis Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1972d, 1974b.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 100–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Grazziotini, G. 3547* (MBM)].

Capanemia spathuliglossa Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bento, I. 64* (ICN)].

Capanemia superflua (Rchb. f.) Garay
Sin.: *Capanemia juergensiana* (Kraenzl.) Schltr., *Capanemia uliginosa* Barb. Rodr., *Oncidium superfluum* Rchb. f., *Rodriguezia anomala* Rolfe, *Rodriguezia juergensiana* Kraenzl., *Rodriguezia uliginosa* (Barb. Rodr.) Cogn.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Hatschbach, G., 1962b; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1565* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 797* (SP)].

Capanemia thereziae Barb. Rodr.
Sin.: *Capanemia duseniana* (Kraenzl.) Brade, *Capanemia hatschbachii* Schltr., *Quekettia duseniana* Kraenzl., *Quekettia thereziae* (Barb. Rodr.) Cogn.
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Kraenzlin, F. W. L., 1921b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1972d.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1528* (SP)].

Capanemia uliginosa Barb. Rodr. = **Capanemia superflua** (Rchb. f.) Garay
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Catasetum Rich. ex Kunth

Número de especies: 7, 1 endémica

Catasetum atratum Lindl.
Sin.: *Catasetum mentosum* Lem.
Referencias: Klein, R. M., 1979; Mansfeld, R., 1933; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20978* (MBM)].

Catasetum cernuum (Lindl.) Rchb. f. var. **cernuun**
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, A. 1* (B)].

Catasetum cernuum (Lindl.) Rchb. f. var. **rodigasianum** (Rolfe) Mansf.
Sin.: *Catasetum rodigasianum* Rolfe
Referencias: Mansfeld, R., 1933.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hort Linden s.n.* (K)].

Catasetum fimbriatum (C. Morren) Lindl. & Paxton var. **micranthum** Mansf.
Referencias: Hoehne, F. C., 1942b; Mansfeld, R., 1933.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Leinig, M. s.n.* (HB)].

Catasetum fimbriatum (C. Morren) Lindl. & Paxton var. **morrenianum** Mansf.
Sin.: *Catasetum pflanzii* Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1942b; Mansfeld, R., 1932.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: PRY(APY, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jörgensen, P. 4543* (SI)].

Catasetum fimbriatum (C. Morren) Lindl. & Paxton var. **ornytorrhynchum** (Porsch) Mansf.
Sin.: *Catasetum ornytorrhynchum* Porsch
Referencias: Hoehne, F. C., 1942b; Mansfeld, R., 1932.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Leinig, M. s.n.* (HB)].

Catasetum fimbriatum (C. Morren) Lindl. & Paxton var. *subtropicale* Hauman = **Catasetum fimbriatum** (C. Morren) Lindl. & Paxton subsp. **fissum** Rchb. f.
Referencias: Mansfeld, R., 1932.

Catasetum fimbriatum (C. Morren) Lindl. & Paxton subsp. **fimbriatum**
Sin.: *Myanthus fimbriatum* C. Morren
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Dematteis, M. & Daviña, J. R., 1999; Dias Bicalho, H., 1965; Johnson, A. E., 2001; Mansfeld, R., 1932; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Williams, L. O., 1939.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CAN, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 426* (BAB)]; BRA[*Buthira, J. 778* (MBM)]; PRY[*Schinini, A. 15183* (CTES)].

Catasetum fimbriatum (C. Morren) Lindl. & Paxton subsp. **fissum** Rchb. f.
Sin.: *Catasetum fimbriatum* (C. Morren) Lindl. & Paxton var. *subtropicale* Hauman
Referencias: Dias Bicalho, H., 1965.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA); BRA(PAR); PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 572* (SP)]; BRA[*Leinig, M. 108* (HB)]; PRY[*Jörgensen, P. 4113-b* (HB)].

[Catasetum macrocarpum Rich.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Catasetum mentosum Lem. = **Catasetum atratum** Lindl.

Catasetum micranthum Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 39221* (MBM)].

Catasetum ornytorrhynchum Porsch = **Catasetum fimbriatum** (C. Morren) Lindl. & Paxton var. **ornytorrhynchum** (Porsch) Mansf.
Referencias: Mansfeld, R., 1932.

Catasetum pflanzii Schltr. = **Catasetum fimbriatum** (C. Morren) Lindl. & Paxton var. **morrenianum** Mansf.
Referencias: Johnson, A. E., 2001; Mansfeld, R., 1932.

Catasetum rodigasianum Rolfe = **Catasetum cernuum** (Lindl.) Rchb. f. var. **rodigasianum** (Rolfe) Mansf.
Referencias: Mansfeld, R., 1933.

Catasetum rohrii Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. 866* (MBM)].

Catasetum socco (Vell.) Hoehne = **Catasetum trulla** Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Catasetum triodon Rchb. f. var. **guttulatum** Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1942b.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hoehne, F. C. s.n.* (SP)].

Catasetum triodon Rchb. f. var. **triodon**
Referencias: Mansfeld, R., 1933; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 10841* (MBM)].

Catasetum trulla Lindl.
Sin.: *Catasetum socco* (Vell.) Hoehne
Referencias: Mansfeld, R., 1933; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20867* (MBM)].

Cattleya Lindl.

Número de especies: 6

Cattleya cernua (Lindl.) Beer = **Sophronitis cernua** Lindl.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

[Cattleya dormaniana Rchb. f.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cattleya forbesii Lindl.
Sin.: *Cattleya pauper* (Vell.) Stellfeld, *Epidendrum forbesii* Rchb. f., *Epidendrum pauper* Vell.
Referencias: Fowlie, J. A., 1977; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1966; Withner, C. L., 1988.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 25649* (MBM, NY)].

Cattleya guttata Lindl.
Referencias: Fowlie, J. A., 1977; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1962; Withner, C. L., 1988.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9864* (MBM, NY)].

Cattleya guttata Lindl. var. *leopardina* Linden = **Cattleya tigrina** A. Rich.
Referencias: Fowlie, J. A., 1977.

Cattleya guttata Lindl. var. *russelliana* Hook. = **Cattleya tigrina** A. Rich.
Referencias: Fowlie, J. A., 1977.

[Cattleya herbacea Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d; Rojas Acosta, N., 1897.
Notas: Nombre dudoso.

Cattleya intermedia Graham ex Hook.
Sin.: *Cattleya intermedia* Graham ex Hook. var. *macrochila* Barb. Rodr., *Epidendrum intermedium* Rchb. f.
Referencias: Fowlie, J. A., 1977; Fraga Nunes, V., 1997; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Withner, C. L., 1988.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3821* (MBM)].

Cattleya intermedia Graham ex Hook. var. *macrochila* Barb. Rodr. = **Cattleya intermedia** Graham ex Hook.
Referencias: Braem, G. J., 1983.

Cattleya leopoldii Verschzaff. ex Lem. = **Cattleya tigrina** A. Rich.
Referencias: Braem, G. J., 1983.

[Cattleya leopoldii Verschzaff. ex Lem. f. caerulea (L.C. Menezes) F. Barros & J.A.N. Bat.]
Sin.: *Cattleya tigrina* A. Rich. var. *caerulea* L.C. Menezes
Notas: Nombre dudoso.

Cattleya leopoldii Verschzaff. ex Lem. var. *leopardina* (L. Linden & Rodigas) Fowlie = **Cattleya tigrina** A. Rich.
Referencias: Fowlie, J. A., 1977.

Cattleya loddigesii Lindl.
Sin.: *Epidendrum loddgesii* Rchb. f., *Epidendrum violaceum* Lodd.
Referencias: Armstrong, M., 1997; Fowlie, J. A., 1977; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Withner, C. L., 1988.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lange, R. T. 8591* (SP)].

Cattleya pauper (Vell.) Stellfeld = **Cattleya forbesii** Lindl.

Cattleya porphyroglossa L. Linden & Rchb. f.
Sin.: *Epidendrum porphyroglossum* Rchb. f.

Referencias: Fowlie, J. A., 1977; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Withner, C. L., 1988.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3706b* (HBR)].

Cattleya tigrina A. Rich.
Sin.: *Cattleya guttata* Lindl. var. *leopardina* Linden, *Cattleya guttata* Lindl. var. *russelliana* Hook., *Cattleya leopoldii* Verschzaff. ex Lem., *Cattleya leopoldii* Verschzaff. ex Lem. var. *leopardina* (L. Linden & Rodigas) Fowlie
Referencias: Braem, G. J., 1983.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 962* (ICN)].

Cattleya tigrina A. Rich. var. *caerulea* L.C. Menezes = **Cattleya leopoldii** Verschzaff. ex Lem. f. **caerulea** (L.C. Menezes) F. Barros & J.A.N. Bat.

Centrogenium luridum M.N. Correa = **Eltroplectris lurida** (M.N. Correa) Pabst
Referencias: Correa, M. N., 1972.

Centrogenium roseo-album (Rchb. f.) Schltr. = **Eltroplectris roseoalba** (Rchb. f.) Hamer & Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Centrogenium schlechteranum Porto & Brade = **Eltroplectris schlechterana** (Porto & Brade) Pabst
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Centrogenium trilobum (Lindl.) Schltr. = **Eltroplectris triloba** (Lindl.) Pabst
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

[Centroglossa tripolinica Barb. Rodr.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Chaubardia gehrtiana (Hoehne) Garay = **Hoehneella gehrtiana** (Hoehne) Ruschi
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Cheiropterocephalus sertulifera Barb. Rodr. = **Malaxis excavata** (Lindl.) Kuntze
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Chloidia decumbens Lindl. = **Corymborkis flava** (Sw.) Kuntze
Referencias: Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J., 1959a.

Chloraea Lindl.

Número de especies: 44, 40 endémicas

Chloraea affinis Lindl. = **Chloraea longipetala** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea alaris Lindl. = **Chloraea galeata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea albo-rosea Speg. = **Gavilea glandulifera** (Poepp.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1956, 1969b.

Chloraea alpina Poepp.
Sin.: *Asarca alpina* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea cholilensis* Kraenzl., *Chloraea ferruginea* Kraenzl., *Chloraea hookeriana* Kraenzl., *Chloraea perez-moreaui* Garay, *Chloraea xerophila* Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a, b; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 400–1600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(VI, VII, VIII, IX, XI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32880* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 2338* (LIL)].

Chloraea apinnula (Gosewijn) Szlach.
Sin.: *Bipinnula apinnula* Gosewijn
Referencias: Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Van Nieuwenhuizen 218* (CONC)].

Chloraea arechavaletae Kraenzl. = **Geoblasta pennicillata** (Rchb. f.) Hoehne ex M.N. Correa
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Chloraea aurantiaca (Lindl.) Lindl. = **Chloraea chrysantha** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea aurea Phil. = **Chloraea barbata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea barbata Lindl.
Sin.: *Asarca aurea* (Phil.) Kuntze, *Asarca barbata* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea aurea* Phil.
Referencias: Correa, M. N., 1969a, 1995; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 800–2200 m.
Países: ARG(NEU); CHL(V, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 9333* (BAB)]; CHL[*Torres, F. s.n.* (CONC)].

Chloraea bella Hauman
Referencias: Correa, M. N., 1969a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Baéz s.n.* (BA)].

Chloraea bergii Hieron. = **Geoblasta pennicillata** (Rchb. f.) Hoehne ex M.N. Correa
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Chloraea berteroana Kraenzl. = **Chloraea galeata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea besserii Rchb. f. = **Chloraea galeata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea bicallosa Phil. = **Chloraea bidentata** (Poepp. & Endl.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea bidentata (Poepp. & Endl.) M.N. Correa
Sin.: *Asarca bidentata* Poepp. & Endl., *Chloraea bicallosa* Phil.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 800–2500 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 9919* (BAB)]; CHL[*Philippi, R. A. 355* (SGO)].

Chloraea biserialis Griseb.
Sin.: *Chloraea ignea* Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 800–1200 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 8829* (BA)].

Chloraea bletioides Lindl.
Sin.: *Chloraea grandis* Kraenzl., *Chloraea ulantha* Rolfe, *Chloraea ulanthoides* Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*San Martín, M. 504* (SI)].

Chloraea boliviana (Rchb. f.) Kraenzl.
Sin.: *Bieneria boliviana* Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 2100–2200 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 70* (SI)].

Chloraea bouganvilleana Franch. = **Chloraea magellanica** Hook. f.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea calopogon Phil. = **Chloraea prodigiosa** Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea campestris Poepp. = **Chloraea multiflora** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea castillonii Hauman
Referencias: Correa, M. N., 1969a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 2479* (LIL)].

Chloraea chica Speg. & Kraenzl.
Sin.: *Chloraea kruegeri* Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a, b; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IV, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 3222* (SI)]; CHL[*Wolffhügel, K. 219* (SI)].

Chloraea chlorosticta Phil. = **Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea cholilensis Kraenzl. = **Chloraea alpina** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea chrysantha Poepp.
Sin.: *Asarca aurantiaca* Lindl., *Asarca chrysantha* (Poepp.) Kuntze, *Asarca crocata* (Phil.) Kuntze, *Asarca speciosa* Lindl., *Chloraea aurantiaca* (Lindl.) Lindl., *Chloraea crocata* Phil., *Chloraea pavoni* Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 5694* (SI)].

Chloraea chrysochloa Phil.
Sin.: *Asarca lechleri* (Lindl. ex Kraenzl.) Kuntze, *Chloraea collicensis* Kraenzl., *Chloraea hemichloris* Kraenzl., *Chloraea lechleri* Lindl. ex Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a, b; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 800–2800 m.
Países: ARG(CHU, NEU); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 1038* (SI)]; CHL[*Junge, C. 1081* (SI)].

Chloraea cogniauxii Hauman
Referencias: Correa, M. N., 1969a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 6499* (LP)].

Chloraea collicensis Kraenzl. = **Chloraea chrysochloa** Phil.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

[Chloraea collina Phil.]
Referencias: Correa, M. N., 1969a.
Notas: Nombre dudoso.

Chloraea commersonii Brongn. = **Gavilea lutea** (Pers.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1956, 1969b.

Chloraea crispa Lindl.
Sin.: *Asarca crispa* (Lindl.) Kuntze, *Asarca cygnea* (Phil.) Kuntze, *Chloraea cygnea* Phil., *Chloraea spectabilis* Phil.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 800–2800 m.
Países: CHL(V, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. 364* (SGO, SI)].

Chloraea cristata Lindl.
Sin.: *Asarca dasypogon* (Phil.) Kuntze, *Asarca pogonata* (Phil.) Kuntze, *Chloraea dasypogon* Phil., *Chloraea pogonata* Phil.
Referencias: Correa, M. N., 1969a; Lehnebach, C., 2003; Muñoz-Pizarro, C., 1960.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 1200–2800 m.
Países: CHL(V, VI, VIII, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*San Martín, M. 503* (SI)].

Chloraea crocata Phil. = **Chloraea chrysantha** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea cuneata Lindl.
Sin.: *Asarca cuneata* (Lindl.) Kuntze, *Asarca obovata* (Phil.) Kuntze, *Chloraea nervosa* Kraenzl., *Chloraea obovata* Phil.
Referencias: Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 1200–2800 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Lechler, W. 735* (K)].

Chloraea cygnea Phil. = **Chloraea crispa** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea cylindrostachya Poepp.
Sin.: *Asarca cylindrostachya* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea densiflora* Rolfe, *Chloraea leptopetala* Reiche, *Chloraea papillosa* Phil.
Referencias: Correa, M. N., 1969a, b; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 300–1200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(V, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 6170* (SI)]; CHL[*Philippi, F. 332* (SGO)].

Chloraea dasypogon Phil. = **Chloraea cristata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea decipiens Poepp. = **Chloraea lamellata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea deflexa Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001e.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 1000–1200 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4109* (CONC)].

Chloraea densa A. Rich. = **Chloraea multiflora** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea densiflora Rolfe = **Chloraea cylindrostachya** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea disoides Lindl. var. **disoides**
Sin.: *Asarca disoides* (Lindl.) Kuntze
Referencias: Correa, M. N., 1969a; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 200–500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grandjot, G. F. 1580* (SI)].

Chloraea disoides Lindl. var. **picta** (Phil. ex Kraenzl.) M.N. Correa
Sin.: *Chloraea picta* Phil. ex Kraenzl.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Correa, M. N., 1969a; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 800–2000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, VI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 23056* (MERL)]; CHL[*Worth, C. R. 16574* (K)].

Chloraea elegans M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1969a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 800–1200 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 4682* (LIL)].

Chloraea falklandica Kraenzl. = **Chloraea gaudichaudii** Brongn.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea ferruginea Kraenzl. = **Chloraea alpina** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea fimbriata Phil., nom. illeg. = **Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea fimbriata Poepp. = **Bipinnula fimbriata** (Poepp.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1929a.

Chloraea fonckii Phil. = **Chloraea gaudichaudii** Brongn.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea galeata Lindl.
Sin.: *Asarca alaris* (Lindl.) Lindl., *Asarca besserii* (Rchb. f.) Kuntze, *Asarca maculosa* Poepp., *Asarca parviflora* Poepp., *Asarca rypaloglossa* (A. Rich.) Kuntze, *Asarca secunda* (Phil.) Kuntze, *Asarca suaveolens* (Phil.) Kuntze, *Chloraea alaris* Lindl., *Chloraea berteroana* Kraenzl., *Chloraea besserii* Rchb. f., *Chloraea reflexa* Phil., *Chloraea rypaloglossa* A. Rich., *Chloraea secunda* Phil., *Chloraea suaveolens* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Correa, M. N., 1969a; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 1000–1300 m.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 771* (SI)].

Chloraea gaudichaudii Brongn.
Sin.: *Arethusa lutea* Gaudich., *Asarca fonkii* (Phil.) Kuntze, *Asarca gaudichaudii* (Brongn.) Kuntze, *Asarca inconspicua* (Phil.) Kuntze, *Chloraea falklandica* Kraenzl., *Chloraea fonckii* Phil., *Chloraea inconspicua* Phil.
Referencias: Correa, M. N., 1969a; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 600–900 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 5494* (SI)]; CHL[*Rentzell, I. 6302* (SI)].

Chloraea gavilu Lindl.
Sin.: *Asarca sceptrum* (Rchb. f.) Kuntze, *Asarca virescens* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea lindleyii* Poepp., *Chloraea lotensis* Rolfe, *Chloraea sceptrum* Rchb. f., *Chloraea semitensis* Kraenzl., *Cymbidium luteum* Willd.
Referencias: Correa, M. N., 1969a; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 400–1200 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Junge, C. 1076* (SI)].

Chloraea gayana A. Rich. = **Chloraea speciosa** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea grandiflora Poepp.
Sin.: *Asarca grandiflora* (Poepp.) Kuntze
Referencias: Correa, M. N., 1969a; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 1500–1700 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 567* (BM, LIL, NY, SI, Z)].

Chloraea grandis Kraenzl. = **Chloraea bletioides** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

[Chloraea gymnoglossa Phil.]
Referencias: Muñoz-Pizarro, C., 1960.
Notas: Nombre dudoso.

Chloraea hemichloris Kraenzl. = **Chloraea chrysochloa** Phil.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea heteroglossa Rchb. f.
Sin.: *Asarca heteroglossa* (Rchb. f.) Kuntze
Referencias: Correa, M. N., 1969a; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 200–300 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Worth, C. R. 16707* (K, S, SI, US)].

Chloraea histryx Speg. = **Chloraea magellanica** Hook. f.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea homopetala Phil. = **Chloraea nudilabia** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea hookeriana Kraenzl. = **Chloraea alpina** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea ignea Kraenzl. = **Chloraea biserialis** Griseb.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea incisa Poepp. = **Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea inconspicua Phil. = **Chloraea gaudichaudii** Brongn.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea kraenzliniana Hoehne = **Chloraea magellanica** Hook. f.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea kruegeri Kraenzl. = **Chloraea chica** Speg. & Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea lagunae-pactis Kraenzl. = **Chloraea philippii** Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea lamellata Lindl.
Sin.: *Asarca lamellata* (Lindl.) Kuntze, *Asarca pearcei* (Phil.) Kuntze, *Asarca semibarbata* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea decipiens* Poepp., *Chloraea pearcei* Phil., *Chloraea semibarbata* Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(VI, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 1391* (LIL, NY, S, SI)].

Chloraea laxiflora Hauman
Referencias: Correa, M. N., 1969a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 1800–3200 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 5925* (LIL)].

Chloraea lechleri Lindl. ex Kraenzl. = **Chloraea chrysochloa** Phil.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea leontoglossa Kraenzl. & Speg. = **Chloraea magellanica** Hook. f.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea leontoglossa Kraenzl., hom. illeg. = **Chloraea viridiflora** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea leptopetala Reiche = **Chloraea cylindrostachya** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea leucojiflora Kraenzl. = **Chloraea nudilabia** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea liliacea Kraenzl. = **Chloraea longipetala** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea lindleyii Poepp. = **Chloraea gavilu** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea lineata Kraenzl. = **Chloraea philippii** Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea longipetala Lindl.
Sin.: *Asarca affinis* (Lindl.) Kuntze, *Asarca longipetala* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea affinis* Lindl., *Chloraea liliacea* Kraenzl., *Chloraea multilamellata* Kraenzl., *Chloraea panduriformis* Kraenzl., *Chloraea reicheana* Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 600–800 m.
Países: CHL(V, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Sparre, B. B. 10942* (CONC)].

Chloraea lotensis Rolfe = **Chloraea gavilu** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea magellanica Hook. f.
Sin.: *Asarca magellanica* (Hook. f.) Kuntze, *Chloraea bouganvilleana* Franch., *Chloraea histryx* Speg., *Chloraea kraenzliniana* Hoehne, *Chloraea leontoglossa* Kraenzl. & Speg., *Chloraea spegazziniana* Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 200–1300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 944* (SI)]; CHL[*Pedersen, T. M. 14225* (SI)].

Chloraea major Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001e.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 800–2800 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4149* (BA, CONC)].

Chloraea membranacea Lindl.
Sin.: *Chloraea membranacea* Lindl. var. *paranensis* Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1969a; Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, CLA, FLA, MAL, MON, RIV, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 2829* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 8900* (NY)]; URY[*Felippone, F. 3242* (SI)].

Chloraea membranacea Lindl. var. *paranensis* Schltr. = **Chloraea membranacea** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea modesta Kraenzl. = **Chloraea philippii** Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea multiflora Lindl.
Sin.: *Asarca campestris* (Poepp.) Kuntze, *Asarca densa* (A. Rich.) Kuntze, *Asarca multiflora* (Lindl.) Kuntze, *Asarca poeppigiana* (A. Rich.) Kuntze, *Chloraea campestris* Poepp., *Chloraea densa* A. Rich., *Chloraea poeppigiana* A. Rich., *Chloraea pseudocampestris* Kraenzl., *Chloraea stenantha* Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 800–1800 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grandjot, G. F. 1581* (SI)].

Chloraea multilamellata Kraenzl. = **Chloraea longipetala** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea nervosa Kraenzl. = **Chloraea cuneata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea nudilabia Poepp.
Sin.: *Asarca homopetala* (Phil.) Kuntze, *Asarca nudilabia* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea homopetala* Phil., *Chloraea leucojiflora* Kraenzl.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Correa, M. N., 1969a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 800–2800 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 20137* (CONC)].

Chloraea obovata Phil. = **Chloraea cuneata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea odontoglossa A. Rich. = **Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea panduriformis Kraenzl. = **Chloraea longipetala** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea papillosa Phil. = **Chloraea cylindrostachya** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea patagonica Phil. = **Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea pavoni Lindl. = **Chloraea chrysantha** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea pearcei Phil. = **Chloraea lamellata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea pennicillata Rchb. f. = **Geoblasta pennicillata** (Rchb. f.) Hoehne ex M.N. Correa
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Chloraea perez-moreaui Garay = **Chloraea alpina** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea philippii Rchb. f.
Sin.: *Asarca philippii* (Rchb. f.) Kuntze, *Chloraea lagunae-pactis* Kraenzl., *Chloraea lineata* Kraenzl., *Chloraea modesta* Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a, b; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 100–200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 1046* (SI)]; CHL[*Hollermayer, A. 38* (SI)].

Chloraea phoenicea Speg.
Referencias: Correa, M. N., 1969a; Williams, L. O., 1939.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 2500–3500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)].

Chloraea picta Phil. ex Kraenzl. = **Chloraea disoides** Lindl. var. **picta** (Phil. ex Kraenzl.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea pigichen Kuntze = **Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea piquichen Lindl. = **Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea pleistodactyla Kraenzl. & Speg. = **Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea poeppigiana A. Rich. = **Chloraea multiflora** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea pogonata Phil. = **Chloraea cristata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea praecincta Speg. & Kraenzl.
Sin.: *Chloraea praecincta* Speg. & Kraenzl. var. *intermedia* Hauman
Referencias: Correa, M. N., 1969a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 2837* (LIL)].

Chloraea praecincta Speg. & Kraenzl. var. *intermedia* Hauman = **Chloraea praecincta** Speg. & Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea prodigiosa Rchb. f.
Sin.: *Asarca calopogon* (Phil.) Kuntze, *Asarca prodigiosa* (Rchb. f.) Kuntze, *Chloraea calopogon* Phil.
Referencias: Correa, M. N., 1969a; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 1200–1500 m.
Países: CHL(VI, VII, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cuming, H. 658* (BM)].

Chloraea pseudocampestris Kraenzl. = **Chloraea multiflora** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea reflexa Phil. = **Chloraea galeata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea reicheana Kraenzl. = **Chloraea longipetala** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea reticulata Schltr.
Sin.: *Chloraea venosa* auct. non Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schickendantz, F. s.n.* (SI)].

Chloraea rypaloglossa A. Rich. = **Chloraea galeata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea sceptrum Rchb. f. = **Chloraea gavilu** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea secunda Phil. = **Chloraea galeata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea semibarbata Lindl. = **Chloraea lamellata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea semitensis Kraenzl. = **Chloraea gavilu** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea speciosa Poepp.
Sin.: *Asarca gayana* (A. Rich.) Kuntze, *Chloraea gayana* A. Rich.
Referencias: Correa, M. N., 1969a, b; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 500–800 m.
Países: ARG(CHU, NEU); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)]; CHL[*Poeppig, E. F. 654* (W)].

[Chloraea speciosa Poepp. f. sterilis Kraenzl.]
Notas: Nombre dudoso.

Chloraea spectabilis Phil. = **Chloraea crispa** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea spegazziniana Kraenzl. = **Chloraea magellanica** Hook. f.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea stenantha Kraenzl. = **Chloraea multiflora** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea suaveolens Phil. = **Chloraea galeata** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea subpandurata Hauman
Referencias: Correa, M. N., 1969a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 2000–2700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 955* (SI)].

Chloraea tectata Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2001e.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 1800–2000 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4108* (CONC)].

Chloraea teixeirana (Barb. Rodr.) Cogn. = **Geoblasta pennicillata** (Rchb. f.) Hoehne ex M.N. Correa
Referencias: Sprunger, S., 1996.

[Chloraea trachysepala Kraenzl.]
Referencias: Correa, M. N., 1969a.
Notas: Nombre dudoso.

Chloraea ulantha Rolfe = **Chloraea bletioides** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea ulanthoides Lindl. = **Chloraea bletioides** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea unguis-cati Rchb. f. = **Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea venosa auct. non Rchb. f. = **Chloraea reticulata** Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

[Chloraea verrucosa Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

Chloraea virescens (Willd.) Lindl.
Sin.: *Asarca chlorosticta* (Phil.) Kuntze, *Asarca fimbriata* (Phil.) Kuntze, *Asarca incisa* (Poepp.) Kuntze, *Asarca odontoglossa* (A. Rich.) Kuntze, *Asarca patagonica* (Phil.) Kuntze, *Asarca unguis-cati* (Rchb. f.) Kuntze, *Chloraea chlorosticta* Phil., *Chloraea fimbriata* Phil., nom. illeg., *Chloraea incisa* Poepp., *Chloraea odontoglossa* A. Rich., *Chloraea patagonica* Phil., *Chloraea pigichen* Kuntze, *Chloraea piquichen* Lindl., *Chloraea pleistodactyla* Kraenzl. & Speg., *Chloraea unguis-cati* Rchb. f., *Cymbidium virescens* Willd.
Referencias: Correa, M. N., 1969a; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 1200–1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(V, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 5209* (SI)]; CHL[*Looser, G. 5690* (SI)].

Chloraea viridiflora Poepp.
Sin.: *Asarca viridiflora* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea leontoglossa* Kraenzl., hom. illeg.
Referencias: Correa, M. N., 1969a, b; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 1200–1400 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10914* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Poeppig, E. F. 699* (M, W)].

Chloraea volkmannii Phil. ex Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a, 1995; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 2000–2800 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 9908* (BAB)]; CHL[*Volkman, L. s.n.* (SGO)].

Chloraea volucris Lindl. = **Gavilea glandulifera** (Poepp.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Chloraea wittei Hicken = **Gavilea wittei** (Hicken) Ormd.
Referencias: Correa, M. N., 1956.

Chloraea xerophila Kraenzl. = **Chloraea alpina** Poepp.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Cirrhaea Lindl.

Número de especies: 4

Cirrhaea dependens Rchb. f. var. **dependens**
Sin.: *Cirrhaea hoffmannseggii* Heynh., *Cirrhaea tristis* Lindl., *Cirrhaea violacea* Hoffm., *Cirrhaea viridi-purpurea* (Hook.) Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1942b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1959a; Schlechter, F. R. R., 1926.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1010* (ICN, SI)].

Cirrhaea dependens Rchb. var. **ornata** Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1942b; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. 2053* (HBR)].

Cirrhaea dependens Rchb. var. *trigina* Porsch = **Cirrhaea loddigesii** Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1942b.

Cirrhaea hoffmannseggii Heynh. = **Cirrhaea dependens** Rchb. f. var. **dependens**

Cirrhaea loddigesii Lindl.
Sin.: *Cirrhaea dependens* Rchb. var. *trigina* Porsch, *Cirrhaea loddigesii* Lindl. var. *trigina* Porsch
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 12285* (MBM)].

Cirrhaea loddigesii Lindl. var. *trigina* Porsch = **Cirrhaea loddigesii** Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1942b.

Cirrhaea longiracemosa Hoehne
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hoehne, F. C. s.n.* (SP)].

Cirrhaea saccata Lindl.
Sin.: *Cirrhaea seidelii* Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953, 1959a; Schlechter, F. R. R., 1926.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 886* (ICN, SI)].

Cirrhaea seidelii Pabst = **Cirrhaea saccata** Lindl.

Cirrhaea tristis Lindl. = **Cirrhaea dependens** Rchb. f. var. **dependens**

Cirrhaea violacea Hoffm. = **Cirrhaea dependens** Rchb. f. var. **dependens**

Cirrhaea viridi-purpurea (Hook.) Lindl. = **Cirrhaea dependens** Rchb. f. var. **dependens**

Cladobium ceracifolium (Barb. Rodr.) Schltr. = **Lankesterella ceracifolia** (Barb. Rodr.) Ames
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1959a.

Cladobium epiphytum (Barb. Rodr.) Schltr. = **Lankesterella caespitosa** (Lindl.) Hoehne

Cleistes Rich. ex Lindl.

Número de especies: 21, 6 endémicas

Cleistes aphylla (Barb. Rodr.) Hoehne
Sin.: *Pogonia aphylla* Barb. Rodr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1787* (MBM)].

Cleistes australis Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Burger, L. s.n.* (B)].

Cleistes brasiliensis (Barb. Rodr.) Schltr.
Sin.: *Pogonia brasiliensis* Barb. Rodr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18562* (MBM)].

Cleistes castanoides Hoehne
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 2876* (R)].

Cleistes catharinensis (Cogn.) Hoehne
Sin.: *Pogonia catharinensis* Cogn.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Grossmann, K. s.n.* (B)].

Cleistes cipoana Hoehne
Referencias: Hatschbach, G., 1966; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 12113* (MBM)].

Cleistes fragrans (Schltr.) Schltr.
Sin.: *Pogonia fragrans* Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1922.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 26448* (MBM)].

Cleistes gert-hatschbachiana Hoehne
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Hoehne, F. C., 1952a; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1788* (MBM, SP)].

Cleistes gracilis (Barb. Rodr.) Schltr.
Sin.: *Pogonia gracilis* Barb. Rodr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 21211* (MBM)].

Cleistes humidicola (Schltr.) Schltr.
Sin.: *Pogonia humidicola* Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1919–1920.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7895* (MBM, NY)].

Cleistes itatiaiae Pabst
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20748* (MBM)].

Cleistes libonii (Rchb. f.) Schltr.
Sin.: *Pogonia libonii* Rchb. f.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 38863* (MBM)].

Cleistes macrantha (Barb. Rodr.) Schltr.
Sin.: *Cleistes revoluta* (Barb. Rodr.) Schltr. var. *macrantha* (Barb. Rodr.) Schltr., *Pogonia macrantha* Barb. Rodr.
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pansarim, E. R., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Guinzburg, S. 681* (SP)].

Cleistes magnifica (Schltr.) Schltr.
Sin.: *Pogonia magnifica* Schltr.
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Hoehne, F. C., 1940; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1919–1920.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 34427* (MBM)].

Cleistes paranaensis (Barb. Rodr.) Schltr.
Sin.: *Pogonia paranaensis* Barb. Rodr., *Pogonia paranaensis* Barb. Rodr. var. *major* Schltr.
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1919–1920.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20661* (MBM)]; PRY[*Krapovickas, A. 46037* (CTES)].

Cleistes pluriflora (Barb. Rodr.) Schltr.
Sin.: *Pogonia pluriflora* Barb. Rodr.
Referencias: Hatschbach, G., 1974; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Spannagel, C. 321* (SP)].

Cleistes quadricallosa (Barb. Rodr.) Schltr.
Sin.: *Pogonia quadricallosa* Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 8693* (MBM)].

Cleistes ramboi Pabst
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Insaurralde, I. S., 2006; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lirussi, I. 596* (CTES, MNES)]; BRA[*Hatschbach, G. 1820* (MBM)].

Cleistes revoluta (Barb. Rodr.) Schltr.
Sin.: *Pogonia revoluta* Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 9619* (NY)].

Cleistes revoluta (Barb. Rodr.) Schltr. var. *macrantha* (Barb. Rodr.) Schltr. = **Cleistes macrantha** (Barb. Rodr.) Schltr.

Cleistes uliginosa Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 28181* (MBM)].

Cleistes vinosa (Barb. Rodr.) Schltr.
Sin.: *Pogonia vinosa* Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Spannagel, C. 128* (SP)].

Codonorchis Lindl.

Número de especies: 2 endémicas

Codonorchis canisoi Mansf.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 2035* (SP)].

Codonorchis lessonii (Brongn.) Lindl.
Sin.: *Calopogon lessonii* Brongn., *Codonorchis lessonii* (Brongn.) Lindl. var. *poeppigii* (Lindl.) Reiche, *Codonorchis lessonii* (Brongn.) Lindl. var. *skottsbergii* (Kraenzl.) Reiche, *Codonorchis poeppigii* Lindl., *Codonorchis skottsbergii* Kraenzl., *Codonorchis tetraphylla* (Poepp. & Endl.) L.O. Williams, *Pogonia tetraphylla* Poepp. & Endl.
Referencias: Correa, M. N., 1969b; Lehnebach, C., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 941* (SI)]; CHL[*Rentzell, I. 6288* (SI)].

Codonorchis lessonii (Brongn.) Lindl. var. *poeppigii* (Lindl.) Reiche = **Codonorchis lessonii** (Brongn.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969b; Lehnebach, C., 2003.

Codonorchis lessonii (Brongn.) Lindl. var. *skottsbergii* (Kraenzl.) Reiche = **Codonorchis lessonii** (Brongn.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969b; Lehnebach, C., 2003.

Codonorchis poeppigii Lindl. = **Codonorchis lessonii** (Brongn.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969b; Lehnebach, C., 2003.

Codonorchis skottsbergii Kraenzl. = **Codonorchis lessonii** (Brongn.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969b.

Codonorchis tetraphylla (Poepp. & Endl.) L.O. Williams = **Codonorchis lessonii** (Brongn.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969b.

Cogniauxiocharis glazioviana (Cogn.) Hoehne = **Pteroglossa glazioviana** (Cogn.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Colax jugosus (Lindl.) Lindl. = **Pabstia jugosa** (Lindl.) Garay
Referencias: Castro Neto, V. P. & Campacci, M. A., 2004.

Colax puydtii Lindl. & André = **Pabstia viridis** (Lindl.) Garay
Referencias: Castro Neto, V. P., 1993.

Colax viridis (Lindl.) Lindl. = **Pabstia viridis** (Lindl.) Garay
Referencias: Castro Neto, V. P., 1993.

Colax viridis (Lindl.) Lindl. var. *pluriflora* (Lindl.) Schltr. = **Pabstia viridis** (Lindl.) Garay
Referencias: Castro Neto, V. P., 1993.

Comparettia Poepp. & Endl.

Número de especies: 1

Comparettia coccinea Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10087* (MBM)].

Constantia Barb. Rodr.

Número de especies: 2 endémicas

Constantia australis (Cogn.) Porto & Brade
Sin.: *Sophronitis australis* Cogn.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. 2291* (HB)].

Constantia rupestris Barb. Rodr.
Referencias: Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. s.n.* (HBR)].

Corymbis decumbens (Lindl.) Cogn. = **Corymborkis flava** (Sw.) Kuntze
Referencias: Rasmussen, F. N., 1977.

Corymborkis Thouars

Número de especies: 1

Corymborkis decumbens (Lindl.) L.O. Williams = **Corymborkis flava** (Sw.) Kuntze
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Corymborkis flava (Sw.) Kuntze
Sin.: *Chloidia decumbens* Lindl., *Corymbis decumbens* (Lindl.) Cogn., *Corymborkis decumbens* (Lindl.) L.O. Williams, *Serapias flava* Sw.
Referencias: Correa, M. N., 1975b; Hoehne, F. C., 1945; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Rasmussen, F. N., 1977; Schlechter, F. R. R., 1919–1920, 1925.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 352* (MU, SI)]; BRA[*Rambo, B. 1000* (SP)]; PRY[*Zardini, E. M. 7893* (NY, SI)].

Cranichis Sw.

Número de especies: 5, 1 endémica

Cranichis aphylla Sw. = **Wullschlaegelia aphylla** (Sw.) Rchb. f.
Referencias: Born, M. G., Maas, P. J. M., Dressler, R. L. & Westra, L. Y. T., 1999.

Cranichis bradei Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1922.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 38844* (MBM)].

Cranichis candida (Barb. Rodr.) Cogn.
Sin.: *Cranichis micrantha* Griseb., hom. illeg., *Cranichis parviflora* L.O. Williams, *Cyrtochilum candidum* Barb. Rodr.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1895; Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1919–1920; Williams, L. O., 1938, 1939.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 459* (BAB, CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 26612* (NY)].

Cranichis castellanosii L.O. Williams
Referencias: Williams, L. O., 1938.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 1000–1700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 30244* (CTES)].

Cranichis ciliata (Kunth) Kunth
Sin.: *Aa mandoni* (Rchb. f.) Schltr., *Cranichis mandonii* Schltr., *Ophrys ciliata* Kunth
Referencias: Correa, M. N., 1972; Garay, L. A., 1978; Hashimoto, T., 1993.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 1700 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 5104* (LP)].

Cranichis hassleri Cogn.
Referencias: Hassler, E., 1909b.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10304* (G, NY)].

Cranichis mandonii Schltr. = **Cranichis ciliata** (Kunth) Kunth
Referencias: Correa, M. N., 1972.

Cranichis micrantha Griseb., hom. illeg. = **Cranichis candida** (Barb. Rodr.) Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Cranichis oligantha Sw. = **Prescottia oligantha** (Sw.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1992.

Cranichis parviflora L.O. Williams = **Cranichis candida** (Barb. Rodr.) Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Cranichis stachyodes Sw. = **Prescottia stachyodes** (Sw.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1992.

Cryptophoranthus Barb. Rodr.

Número de especies: 2, 1 endémica

Cryptophoranthus atropurpureus (Lindl.) Rolfe = **Zootrophion atropurpureum** (Lindl.) Luer

Cryptophoranthus cryptanthus (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.
Sin.: *Acianthera cryptantha* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Acianthera juergensii* (Schltr.) F. Barros, *Acianthera langeana* (Kraenzl.) Pridgeon & M.W. Chase, *Acianthera neojuergensii* (Luer) Pridgeon

& M.W. Chase, *Cryptophoranthus dusenii* Schltr., *Cryptophoranthus juergensii* Schltr., *Cryptophoranthus langeanus* (Kraenzl.) Garay, *Pleurothallis cryptantha* Barb. Rodr., *Pleurothallis langeana* Kraenzl., *Pleurothallis neojuergensii* Luer
Referencias: Gonçalves, C. N. & Waechter, J. L., 2004; Luer, C. A., 2002.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Barbosa Rodrigues, J. s.n.* (RB)].

Cryptophoranthus dusenii Schltr. = **Cryptophoranthus cryptanthus** (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.

Cryptophoranthus fenestratus (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.
Sin.: *Acianthera fenestrata* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Acianthera spicata* (Dutra) Pridgeon & M.W. Chase, *Cryptophoranthus spicatus* Dutra, *Pleurothallis fenestrata* Barb. Rodr., *Pleurothallis fenestrata* Barb. Rodr. var. *angustifolius* Cogn.
Referencias: Dutra, J., 1933; Luer, C. A., 2002.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 977* (ICN)].

Cryptophoranthus hystrix (Kraenzl.) Garay = **Apoda-prorepentia hystrix** (Kraenzl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2007.

Cryptophoranthus juergensii Schltr. = **Cryptophoranthus cryptanthus** (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.

Cryptophoranthus langeanus (Kraenzl.) Garay = **Cryptophoranthus cryptanthus** (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.

Cryptophoranthus schenckii Cogn. = **Zootrophion atropurpureum** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Cryptophoranthus similis Schltr. = **Apoda-prorepentia hystrix** (Kraenzl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2007.

Cryptophoranthus spicatus Dutra = **Cryptophoranthus fenestratus** (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Cyanaeorchis Barb. Rodr.

Número de especies: 2

Cyanaeorchis arundinae (Rchb. f.) Barb. Rodr.
Sin.: *Eulophia arundinae* Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1968a; Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAN, MIE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 1872* (BAB, CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 1773* (SP)]; PRY[*Pedersen, T. M. 5229* (SI)].

Cyanaeorchis minor Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ferni, M. G. s.n.* (SP)].

Cyclopogon C. Presl

Número de especies: 26, 8 endémicas

Cyclopogon albo-punctata Barb. Rodr. = **Mesadenella cuspidata** (Lindl.) Garay
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Cyclopogon alexandrae (Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes alexandrae* Kraenzl.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 10292* (S)].

Cyclopogon alpestris (Barb. Rodr.) Schltr. = **Cyclopogon congestus** (Vell.) Hoehne
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Cyclopogon aphyllus Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1919–1920.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 17166* (B)].

Cyclopogon apricus (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Beadlea aprica* (Lindl.) Garay, *Beadlea diversifolia* (Cogn.) Garay, *Cyclopogon diversifolius* (Cogn.) Schltr., *Cyclopogon paludosus* (Cogn.) Schltr., *Cyclopogon platyunguis* Schltr., *Spiranthes amblysepala* Kraenzl., *Spiranthes aprica* Lindl., *Spiranthes diversifolia* Cogn., *Spiranthes paludosa* Cogn.
Referencias: Correa, M. N., 1955; Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952a, 1959a; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 30423* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 838* (ICN, SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 633* (SP)].

Cyclopogon argyrifolius Barb. Rodr.
Sin.: *Beadlea argyrifolia* (Barb. Rodr.) Garay
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kuhlmann, M. 1051* (SPF)].

Cyclopogon atroviridis Barb. Rodr. = **Garaya atroviridis** (Barb. Rodr.) Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1993b.

Cyclopogon bicolor (Ker Gawl.) Schltr.
Sin.: *Beadlea bicolor* (Ker Gawl.) Garay, *Cyclopogon bicolor* (Ker Gawl.) Schltr. var. *minor* Hoehne, *Neottia bicolor* Ker Gawl.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Hatschbach, G., 1962b; Hoehne, F. C., 1945; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(GUA); URY(FLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 578* (SP)]; BRA[*Hatschbach, G. 19572* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 1018* (G)]; URY[*Rosengurtt, B. 5333* (SP)].

Cyclopogon bicolor (Ker Gawl.) Schltr. var. *minor* Hoehne = **Cyclopogon bicolor** (Ker Gawl.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Cyclopogon bradei Schltr. = **Cyclopogon variegatus** Barb. Rodr.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Cyclopogon calophyllus (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.
Sin.: *Beadlea calophylla* (Barb. Rodr.) Garay, *Spiranthes calophylla* Barb. Rodr.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Garay, L. A., 1982[1980]; Johnson, A. E., 2001; Sprunger, S., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS); BRA(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 474* (BAB)].

Cyclopogon candidus (Kraenzl.) Pabst = **Hapalorchis candidus** (Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1974a.

Cyclopogon chloroleucus (Barb. Rodr.) Schltr. = **Cyclopogon polyaden** (Vell.) F.S. Rocha & J.L. Waechter
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Szlachetko, D. L., 1995a.

Cyclopogon congestus (Vell.) Hoehne
Sin.: *Beadlea congesta* (Vell.) Garay, *Cyclopogon alpestris* (Barb. Rodr.) Schltr., *Cyclopogon langei* Schltr., *Serapias congesta* Vell., *Spiranthes alpestris* Barb. Rodr., *Spiranthes alpestris* Barb. Rodr. var. *bidentata* Barb. Rodr.
Referencias: Barros, F. & Pinheiro, F., 2004; Correa, M. N., 1955; Hatschbach, G., 1962b; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1959a; Sprunger, S., 1996.
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA); URY(LAV, MAL, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 776* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 1023* (ICN, SI)]; PRY[*Hassler, E. 1501* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 1808* (SP)].

Cyclopogon deminkiorum Burns-Bal. & M.S. Foster
Referencias: Burns-Balogh, P. & Foster, M. S., 1985.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: PRY(ITA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Foster, M. S. 950* (US)].

Cyclopogon diversifolius (Cogn.) Schltr. = **Cyclopogon apricus** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1955.

Cyclopogon dusenii Schltr.
Sin.: *Beadlea dusenii* (Schltr.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Rocha, F. S. & Waechter, J. L., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kuniyoshi, Y. S. 3911* (MBM)].

Cyclopogon dutraei auct. non Schltr. = **Cyclopogon elatus** (Sw.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1955; Schlechter, F. R. R., 1925.

Cyclopogon dutraei Schltr.
Sin.: *Beadlea dutraei* (Schltr.) Garay
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952a, 1959a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS); URY(COL, LAV, MAL, SJO).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 839* (ICN)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 831* (*)].

Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr.
Sin.: *Beadlea elata* (Sw.) Small, *Cyclopogon dutraei* auct. non Schltr., *Cyclopogon elatus* (Sw.) Schltr. var. *ovatus* (Cogn.) Hoehne, *Cyclopogon taquaremboensis* auct. non (Barb. Rodr.) Schltr., *Cyclopogon variegatus* auct. non Barb. Rodr., *Satyrium elatum* Sw., *Sauroglossum monophyllum* auct. non Griseb., *Spiranthes elata* (Sw.) Rich., *Spiranthes elata* (Sw.) Rich. var. *ovata* Cogn.
Referencias: Carnevali, G., Ramírez-Morillo, I. M., Romero-González, G. A., Vargas, C. A. & Foldats, E., 2003; Correa, M. N., 1955; Hoehne, F. C., 1945; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, GUA, SPE); URY(ART, CLA, COL, LAV, MAL, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 2254* (LIL)]; BRA[*Malme, G. O. A. 62* (B, S)]; PRY[*Woolston, A. L. 845* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 633a* (SI)].

Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr. var. *ovatus* (Cogn.) Hoehne = **Cyclopogon elatus** (Sw.) Schltr.
Referencias: Carnevali, G., Ramírez-Morillo, I. M., Romero-González, G. A., Vargas, C. A. & Foldats, E., 2003.

Cyclopogon elegans Hoehne
Sin.: *Beadlea elegans* (Hoehne) Garay

Referencias: Barros, F. & Pinheiro, F., 2004; Martínez, A. J., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 781* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 24719* (MBM)].

Cyclopogon graciliscapus Schltr.
Sin.: *Beadlea graciliscapa* (Schltr.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14627* (MBM)].

Cyclopogon hatschbachii Schltr.
Sin.: *Beadlea hatschbachii* (Schltr.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Leite, J. E. 1675* (SP)].

Cyclopogon icmadophilus (Barb. Rodr.) Schltr. = **Brachystele icmadophila** (Barb. Rodr.) Schltr. ex Pabst

Cyclopogon iguapensis Schltr.
Sin.: *Beadlea iguapensis* (Schltr.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Schlechter, F. R. R., 1922.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2109* (SP)].

Cyclopogon itatiaiensis (Kraenzl.) Hoehne
Sin.: *Beadlea itatiaiensis* (Kraenzl.) Garay, *Spiranthes itatiaiensis* Kraenzl.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1921b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19737* (MBM, NY)].

Cyclopogon langei Schltr. = **Cyclopogon congestus** (Vell.) Hoehne
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Cyclopogon lineatus (Lindl.) Pabst = **Hapalorchis lineatus** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Cyclopogon longibracteatus (Barb. Rodr.) Schltr.
Sin.: *Beadlea longibracteata* Barb. Rodr., *Spiranthes longibracteata* Barb. Rodr., *Stenorrhynchos rodriguesii* Cogn.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1920.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 243* (SI)].

Cyclopogon micrantthus (Barb. Rodr.) Schltr. = **Hapalorchis micrantha** (Barb. Rodr.) Hoehne
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Cyclopogon multiflorus Schltr.
Sin.: *Beadlea multiflora* (Schltr.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Schlechter, F. R. R., 1922.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14761* (MBM)].

Cyclopogon oliganthus (Hoehne) Hoehne & Schltr.
Sin.: *Beadlea oligantha* (Hoehne) Garay, *Spiranthes oligantha* Hoehne
Referencias: Correa, M. N., 1955; Hoehne, F. C., 1945.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL); URY(CAS, LAV, MAL, MON, RIV, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burmeister, H. C. C. 6836* (BAB)]; URY[*Fruchard, M. s.n.* (SI)].

Cyclopogon paludosus (Cogn.) Schltr. = **Cyclopogon apricus** (Lindl.) Schltr.

Cyclopogon pauciflorus (Porto & Brade) Pabst = **Hapalorchis pauciflorus** Porto & Brade
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Cyclopogon platyunguis Schltr. = **Cyclopogon apricus** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1955.

Cyclopogon polyaden (Vell.) F.S. Rocha & J.L. Waechter
Sin.: *Cyclopogon chloroleucus* (Barb. Rodr.) Schltr., *Serapias polyaden* Vell., *Spiranthes chloroleuca* Barb. Rodr., *Stigmatosema polyaden* (Vell.) Garay
Referencias: Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952a; Rocha, F. S. & Waechter, J. L., 2006; Sprunger, S., 1996; Szlachetko, D. L., 1995a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS); URY(ART, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 5960* (BAB, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2878* (MBM, SI)]; URY[*Arechavaleta, J. s.n.* (MVM)].

Cyclopogon subalpestris Schltr.
Sin.: *Beadlea subalpestris* (Schltr.) Garay
Referencias: Correa, M. N., 1955; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1959a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 1282* (CTES)]; BRA[*Dutra, J. 837* (ICN, SI)].

Cyclopogon taquaremboensis (Barb. Rodr.) Schltr.
Sin.: *Beadlea taquaremboensis* (Barb. Rodr.) Garay, *Stenorrhynchos taquaremboense* Barb. Rodr.
Referencias: Herter, W. G. F., 1935; Pabst, G. F. J., 1952a.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: URY(LAV).
Ejemplares de referencia: URY[*Legrand, C. M. D. H. 2285* (*)].

Cyclopogon taquaremboensis auct. non (Barb. Rodr.) Schltr. = **Cyclopogon elatus** (Sw.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1955.

Cyclopogon trifasciatus Schltr.
Sin.: *Beadlea trifasciata* (Schltr.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1959a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1062* (ICN, SI)].

Cyclopogon variegatus auct. non Barb. Rodr. = **Cyclopogon elatus** (Sw.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1955.

Cyclopogon variegatus Barb. Rodr.
Sin.: *Beadlea variegata* (Barb. Rodr.) Garay, *Cyclopogon bradei* Schltr., *Spiranthes variegata* (Barb. Rodr.) Cogn.
Referencias: Johnson, A. E., 2001; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Schlechter, F. R. R., 1922.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2242* (SI)]; BRA[*Dusén, N. P. 8596* (S)].

Cyclopogon vittatus Dutra ex Pabst
Sin.: *Beadlea vittata* (Dutra ex Pabst) Garay
Referencias: Pabst, G. F. J., 1959a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1129* (ICN)].

Cyclopogon warmingii (Rchb. f.) Schltr.
Sin.: *Beadlea warmingii* (Rchb. f.) Schltr., *Spiranthes warmingii* Rchb. f.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Hoehne, F. C., 1945.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Porto, P. C. 1550* (SP)].

Cymbidium andersonii Lam. ex Andrews = **Cyrtopodium andersonii** (Lam. ex Andrews) R. Br.
Referencias: Menezes, L. C., 2000.

Cymbidium luteum Willd. = **Chloraea gavilu** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Cymbidium vexilliferum La Llave & Lex. = **Liparis vexillifera** (La Llave ex Lex.) Cogn.

Cymbidium virescens Willd. = **Chloraea virescens** (Willd.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1969a.

Cyrtochilum candidum Barb. Rodr. = **Cranichis candida** (Barb. Rodr.) Cogn.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Cyrtochilum flavescens Lindl. = **Miltonia flavescens** Lindl.
Referencias: Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Cyrtochilum stellatum Lindl. = **Miltonia flavescens** Lindl.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

[Cyrtochilum tucumanense (Rchb. f.) Kraenzl.]
Notas: Nombre dudoso.

Cyrtoperia longiflora Rchb. f. = **Eulophia alta** (L.) Fawc. & Rendle
Referencias: Carnevali, G., Ramírez-Morillo, I. M., Romero-González, G. A., Vargas, C. A. & Foldats, E., 2003; Hoehne, F. C., 1945.

Cyrtoperia vellosiana Barb. Rodr. = **Eulophia alta** (L.) Fawc. & Rendle
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Cyrtopodium R. Br.

Número de especies: 17, 2 endémicas

[Cyrtopodium aliciae L. Linden & Rolfe]
Referencias: Sánchez, M. I., 1986.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cyrtopodium andersonii (Lam. ex Andrews) R. Br.
Sin.: *Cymbidium andersonii* Lam. ex Andrews
Referencias: Miethe, E., 1915; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Corradi, L. 5561* (MBM)].

Cyrtopodium brandonianum Barb. Rodr. subsp. **brandonianum**
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sánchez, M. I., 1986.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Quarín, C. L. 1961* (BAB, CTES)]; BRA[*Tessmann, G. 2847* (MBM)].

Cyrtopodium brandonianum Barb. Rodr. subsp. **lageanum** J.A.N. Bat. & Bianchetti
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2005.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 900–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Batista, J. A. N. 1444* (AMES, CEN, K, RB, SP)].

Cyrtopodium dusenii Schltr.
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Menezes, L. C., 2000; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1919–1920.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2656* (MBM, SI, SP)].

Cyrtopodium eugenii Rchb. f.
Referencias: Barros, F. & Pinheiro, F., 2004; Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 12257* (MBM)].

Cyrtopodium falcilobium Hoehne & Schltr. = **Cyrtopodium parviflorum** Lindl.
Referencias: Bianchetti, L. B. & Batista, J. A. N., 2004.

Cyrtopodium galeandroides Cogn.
Referencias: Hoehne, F. C., 1942b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 4488* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 9936* (G)].

Cyrtopodium gigas (Vell.) Hoehne
Sin.: *Epidendrum gigas* Vell.
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 100–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 59231* (MBM)].

Cyrtopodium hatschbachii Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1977; Sánchez, M. I., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7156* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 30075* (CTES)].

Cyrtopodium kleinii J.A.N. Bat. & Bianchetti
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2005.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 900–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Batista, J. A. N. 1443* (AMES, CEN, K, RB, SP)].

Cyrtopodium pallidum Rchb. f. & Warm.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 9621* (MBM)]; PRY[*Rojas, T. 3982* (SP)].

Cyrtopodium palmifrons Rchb. f. & Warm.
Sin.: *Cyrtopodium palmifrons* Rchb. f. var. *longifolia* Rchb. f.
Referencias: Hoehne, F. C., 1942b; Johnson, A. E., 2001; Martínez Crovetto, R., 1981; Sánchez, M. I., 1986.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CEN, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28887* (SI)]; BRA[*Dusén, N. P. 16155* (MBM)]; PRY[*Schinini, A. 31506* (CTES)].

Cyrtopodium palmifrons Rchb. f. var. *longifolia* Rchb. f. = **Cyrtopodium palmifrons** Rchb. f. & Warm.

Cyrtopodium paludicolum Hoehne
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR);
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14266* (MBM)].

Cyrtopodium paranaense Schltr. = **Cyrtopodium polyphyllum** (Vell.) Pabst ex F. Barros
Referencias: Barros, F., 1994.

Cyrtopodium parviflorum Lindl.
Sin.: *Cyrtopodium falcilobium* Hoehne & Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1942b; Pabst, G. F. J., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 25484* (MBM)].

Cyrtopodium pflanzii Schltr.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(TUC); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 1958* (SI, SP)]; PRY[*Arenas, P. 1261* (SI)].

Cyrtopodium polyphyllum (Vell.) Pabst ex F. Barros
Sin.: *Cyrtopodium paranaense* Schltr., *Epidendrum polyphyllum* Vell.
Referencias: Barros, F., 1994; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 43555* (CTES, SI)].

Cyrtopodium punctatum (L.) Lindl.
Sin.: *Epidendrum punctatum* L.
Referencias: Williams, L. O., 1939.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 800–1100 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR); PRY(APY, APA, CEN, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 7726* (BAB)]; BRA[*Dusén, N. P. 8890* (MBM)]; PRY[*Rojas, T. 7077* (SP)].

Cyrtopodium purpureum Rchb. f. & Warm.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9058* (MBM, NY)]; PRY[*Hassler, E. 5624* (G)].

Cyrtopodium virescens Rchb. f. & Warm.
Referencias: Chodat, R. H., 1901; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 3525* (G), *Jörgensen, P. 4765* (SI), *Schinini, A. 21492* (CTES)].

Cyrtopodium yauaperyense Barb. Rodr. = **Eriopsis sceptrum** Rchb. f. & Warsz.
Referencias: Menezes, L. C., 2000.

Dendrobium harrisoniae Hook. = **Bifrenaria harrisoniae** (Hook.) Rchb. f. var. **harrisoniae**
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Dendrobium longifolium Kunth = **Eulophia alta** (L.) Fawc. & Rendle
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Dendrobium maculatum Kunth = **Zygopetalum maculatum** (Kunth) Garay

Dendrobium squalens Lindl. = **Xylobium variegatum** (Ruiz & Pav.) Garay & Dunst.

Dendrorchis estrellensis (Jacq.) Kuntze = **Polystachya concreta** (Jacq.) Garay & Sweet
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Dichaea Lindl.

Número de especies: 8

Dichaea anchorifera Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1962, 1966.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18131* (MBM)].

Dichaea australis Cogn.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911, 1923; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 7401* (S)].

Dichaea brevicaulis Cogn.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 8112* (S)].

Dichaea bryophyla Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Motta, J. T. 557* (MBM)].

Dichaea cogniauxiana Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1011* (SI)].

Dichaea coriacea Barb. Rodr. = **Dichaea trulla** Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Dichaea graminioides (Sw.) Lindl.
Sin.: *Epidendrum graminoides* Sw.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 9091* (S)].

Dichaea pendula (Aubl.) Cogn.
Sin.: *Limodorum pendulum* Aubl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 7454* (S)].

Dichaea trulla Rchb. f.
Sin.: *Dichaea coriacea* Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Schwacke, C. A. W. 13275* (RB)].

Dicrypta discolor G. Lodd. ex Lindl. = **Maxillaria discolor** (G. Lodd. ex Lindl.) Rchb. f.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Dicrypta iridifolia Bateman ex Rchb. f. = **Maxillaria valenzuelana** (A. Rich.) Nash
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Dicrypta irisiphyta Barb. Rodr. = **Maxillaria valenzuelana** (A. Rich.) Nash
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Dicrypta villosa Barb. Rodr. = **Maxillaria villosa** (Barb. Rodr.) Cogn.

Dictyophyllaria Garay

Número de especies: 1 endémica

Dictyophyllaria dietschiana (Edwall) Garay
Sin.: *Vanilla dietschiana* Edwall
Referencias: Hoehne, F. C., 1945; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dietsch, A. s.n.* (SP)].

Didactyle glutinosa Barb. Rodr. = **Bulbophyllum glutinosum** (Barb. Rodr.) Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1953; Sprunger, S., 1996.

Didactyle granulosa (Barb. Rodr.) Barb. Rodr. = **Bulbophyllum granulosum** Barb. Rodr.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Didactyle laciniata Barb. Rodr. = **Bulbophyllum laciniatum** (Barb. Rodr.) Cogn. var. **laciniatum**
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Didactyle plumosum Barb. Rodr. = **Bulbophyllum plumosum** (Barb. Rodr.) Cogn.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Dipteranthus Barb. Rodr.

Número de especies: 2, 1 endémica

Dipteranthus bradei Schltr. = **Zygostates rotundiglossa** Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Dipteranthus lindmanii Kraenzl. = **Zygostates alleniana** Kraenzl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Dipteranthus pellucidus (Rchb. f.) Cogn.
Sin.: *Dipteranthus pseudobulbifer* Barb. Rodr., *Ornithocephalus pseudobulbifer* Barb. Rodr., *Zygostates pellucida* Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 100–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pabst, G. F. J. s.n.* (RB)].

Dipteranthus pseudobulbifer Barb. Rodr. = **Dipteranthus pellucidus** (Rchb. f.) Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1966.

Dipteranthus pustulatus (Kraenzl.) Pabst
Sin.: *Ornithocephalus dusenianus* Kraenzl., *Ornithocephalus pustulatus* Kraenzl., *Zygostates duseniana* (Kraenzl.) Pabst, *Zygostates pustulata* (Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Schlechter, F. R. R., 1926.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 1000–1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2212* (MBM, SI)].

Diskyphogyne Szlach. & R. González

Número de especies: 2, 1 endémica

Diskyphogyne arechavaletae (Kraenzl.) Szlach. & R. González
Sin.: *Brachystele arechavaletae* (Kraenzl.) Schltr., *Spiranthes arechavaletae* Kraenzl.
Referencias: Szlachetko, D. L. & González Tamayo, R., 1996.
Hierba parásita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(ART, MAL, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Orth, C. s.n.* (SP)]; URY[*Arechavaleta, J. s.n.* (HBG)].

Diskyphogyne scabrilingua (Szlach.) Szlach. & R. González
Sin.: *Brachystele scabrilingua* Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L. & González Tamayo, R., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 8616* (AMES)].

Dryadella Luer

Número de especies: 4

Dryadella aviceps (Rchb. f.) Luer
Sin.: *Dryadella obrieniana* (Rolfe) Luer, *Masdevallia aviceps* Rchb. f., *Masdevallia obrieniana* Rolfe, *Pleurothallis aviceps* (Rchb. f.) Rchb. f.
Referencias: Luer, C. A., 1978a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15821* (MBM)].

Dryadella edwallii (Cogn.) Luer
Sin.: *Masdevallia edwalii* Cogn.
Referencias: Luer, C. A., 1978a, 1986a; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 8987* (NY)].

Dryadella liliputiana (Cogn.) Luer
Sin.: *Dryadella paranaënsis* (Schltr.) Luer, *Masdevallia liliputana* Cogn., *Masdevallia paranaënsis* Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 1978a, 1986a; Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7279* (S)].

Dryadella obrieniana (Rolfe) Luer = **Dryadella aviceps** (Rchb. f.) Luer

Dryadella paranaënsis (Schltr.) Luer = **Dryadella liliputiana** (Cogn.) Luer

[Dryadella simula (Rchb. f.) Luer]
Sin.: *Masdevallia simula* Rchb. f.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Dryadella zebrina (Porsch) Luer
Sin.: *Masdevallia zebrina* Porsch
Referencias: Fraga Nunes, V., 1997; Luer, C. A., 1978a; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 947* (SI)].

Elleanthus C. Presl

Número de especies: 2

Elleanthus brasiliensis Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Waechter, J. L., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2144* (MBM, SI, SP)].

Elleanthus linifolius C. Presl
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Brade, A. C. 17302* (RB)].

[Elleanthus pusillus Schltr.]
Notas: Nombre dudoso.

Eltroplectris Raf.

Número de especies: 6, 1 endémica

Eltroplectris calcarata (Sw.) Garay & Sweet
Sin.: *Notylia calcarata* Sw., *Pelexia setacea* Lindl.
Referencias: Garay, L. A., 1978, 1982[1980].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 3100* (G)].

Eltroplectris lurida (M.N. Correa) Pabst
Sin.: *Centrogenium luridum* M.N. Correa, *Pteroglossa lurida* (M.N. Correa) Garay
Referencias: Correa, M. N., 1972; Pabst, G. F. J., 1974a.
Hierba saxícola. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, SAL); BRA(SCA); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 4681* (BAB)]; BRA[*Reitz, P. R. 415* (HBR)]; PRY[*Arenas, P. s.n.* (BAB)].

Eltroplectris roseoalba (Rchb. f.) Hamer & Garay
Sin.: *Centrogenium roseo-album* (Rchb. f.) Schltr., *Pelexia roseo-alba* Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1955; Garay, L. A., 1982[1980]; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 9421* (CTES)].

Eltroplectris schlechterana (Porto & Brade) Pabst
Sin.: *Centrogenium schlechteranum* Porto & Brade
Referencias: Correa, M. N., 1995; Garay, L. A., 1982[1980]; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1974a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 5965* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 19123* (MBM)]; PRY[*Caballero Mármori, G. 918* (CTES)].

Eltroplectris travassosii (Rolfe) Garay
Sin.: *Pelexia travassosii* Rolfe
Referencias: Correa, M. N., 1995; Garay, L. A., 1982[1980]; Szlachetko, D. L., 1995c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 170* (BAB)].

Eltroplectris triloba (Lindl.) Pabst
Sin.: *Centrogenium trilobum* (Lindl.) Schltr., *Pelexia triloba* Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1955; Dematteis, M. & Daviña, J. R., 1999; Garay, L. A., 1982[1980]; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1974a; Szlachetko, D. L., 1995c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, TUC); BRA(RGS); PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 211* (SI)]; BRA[*Gardner, G. 121* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 3231* (SP)].

Encyclia Hook.

Número de especies: 7, 2 endémicas

Encyclia almasii (Hoehne) Pabst
Sin.: *Epidendrum almasii* Hoehne
Referencias: Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3364* (HBR, SP)].

Encyclia amicta (L. Linden & Rchb. f.) Schltr.
= **Encyclia flava** (Lindl.) M.L. Porto & Brade

Encyclia argentinensis (R. Speg.) Hoehne
Sin.: *Encyclia burle-marxii* Pabst, *Encyclia piracanjubensis* L.C. Menezes, *Encyclia saltensis* Hoehne, *Epidendrum argentinense* R. Speg.
Referencias: Hoehne, F. C., 1952b.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Petersen, E. 787* (MO)].

Encyclia bulbosa (Vell.) Pabst = **Prosthechea bulbosa** (Vell.) W.E. Higgins
Referencias: Higgins, W. E., 1997.

Encyclia burle-marxii Pabst = **Encyclia argentinensis** (R. Speg.) Hoehne

Encyclia cardini Pabst = **Encyclia oncidioides** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Castro Neto, V. P. & Campacci, M. A., 2004.

Encyclia dutrae Pabst
Sin.: *Epidendrum dutrae* (Pabst) Hawkes
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1955b.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 300–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1164* (PACA)].

Encyclia fausta (Rchb. f. ex Cogn.) Pabst = **Prosthechea fausta** (Rchb. f. ex Cogn.) W.E. Higgins
Referencias: Higgins, W. E., 1997.

Encyclia flava (Lindl.) M.L. Porto & Brade
Sin.: *Encyclia amicta* (L. Linden & Rchb. f.) Schltr., *Encyclia linearifolioides* (Kraenzl.) Hoehne, *Epidendrum amictum* L. Linden & Rchb. f., *Epidendrum flavum* Lindl., *Epidendrum linearifolioides* (Kraenzl.) Pabst
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR); PRY(PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22176* (C)]; PRY[*Woolston, A. L. 757* (HB, SI)].

Encyclia fragrans (Sw.) Lemée = **Prosthechea fragrans** (Sw.) W.E. Higgins
Referencias: Higgins, W. E., 1997.

Encyclia glumacea (Lindl.) Pabst = **Prosthechea inversa** (Lindl.) W.E. Higgins

[Encyclia gravida (Lindl.) Schltr.]
Sin.: *Epidendrum gravidum* Lindl., *Epidendrum oncidioides* Lindl. var. *gravidum* (Lindl.) Ames
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Encyclia inversa (Lindl.) Pabst = **Prosthechea inversa** (Lindl.) W.E. Higgins
Referencias: Higgins, W. E., 1997.

Encyclia linearifolioides (Kraenzl.) Hoehne = **Encyclia flava** (Lindl.) M.L. Porto & Brade
Referencias: Higgins, W. E., 1997.

Encyclia megalantha (Barb. Rodr.) Porto & Brade
Sin.: *Epidendrum megalanthum* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Carneiro, J. 345* (MBM)].

Encyclia odoratissima (Lindl.) Schltr. = **Encyclia patens** Hook.

Encyclia oncidioides (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Encyclia cardini* Pabst, *Epidendrum longifolium* Barb. Rodr., *Epidendrum oncidioides* Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1938; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1962; Zimmermann, W. M., 1934.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 8073* (S)]; PRY[*Rojas, T. 520* (G)].

Encyclia papilio (Vell.) Pabst = **Prosthechea papilio** (Vell.) W.E. Higgins
Referencias: Higgins, W. E., 1997.

Encyclia patens Hook.
Sin.: *Encyclia odoratissima* (Lindl.) Schltr., *Encyclia serroniana* (Barb. Rodr.) Hoehne, *Epidendrum odoratissimum* Lindl., *Epidendrum serronianum* Barb. Rodr.
Referencias: Castro Neto, V. P. & Campacci, M. A., 2004; Klein, R. M., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gatti, G. 522* (MBM)].

Encyclia piracanjubensis L.C. Menezes = **Encyclia argentinensis** (R. Speg.) Hoehne
Referencias: Castro Neto, V. P. & Campacci, M. A., 2004.

Encyclia punctifera (Rchb. f.) Pabst = **Prosthechea punctifera** (Rchb. f.) W.E. Higgins
Referencias: Higgins, W. E., 1997.

Encyclia pygmaea (Hook.) Dressler = **Prosthechea pygmaea** (Hook.) W.E. Higgins
Referencias: Carnevali, G., Ramírez-Morillo, I. M., Romero-González, G. A., Vargas, C. A. & Foldats, E., 2003.

Encyclia saltensis Hoehne = **Encyclia argentinensis** (R. Speg.) Hoehne

Encyclia serroniana (Barb. Rodr.) Hoehne = **Encyclia patens** Hook.
Referencias: Higgins, W. E., 1997.

Encyclia tigrina (Linden ex Lindl.) Carnevali & I. Ramírez = **Prosthechea tigrina** (Linden ex Lindl.) W.E. Higgins
Referencias: Higgins, W. E., 1997.

[Encyclia tripartita (Vell.) Hoehne]
Sin.: *Epidendrum tripartitum* Vell.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Encyclia vespa (Vell.) Dressler = **Prosthechea vespa** (Vell.) W.E. Higgins
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Epidendrum L., nom. cons.

Número de especies: 40, 10 endémicas

Epidendrum alexandrii Schltr. = **Epidendrum cristatum** Ruiz & Pav.

Epidendrum almasii Hoehne = **Encyclia almasii** (Hoehne) Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J., 1953.

Epidendrum amblostoma Rchb. f. = **Amblostoma tridactylum** (Lindl.) Rchb. f.

Epidendrum amictum L. Linden & Rchb. f. = **Encyclia flava** (Lindl.) M.L. Porto & Brade

Epidendrum ansiferum Rchb. f. = **Epidendrum secundum** Jacq. f. **secundum**

Epidendrum aquaticum Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24348* (MBM)].

Epidendrum arachnoideum Barb. Rodr. = **Epidendrum latilabre** Lindl.

Epidendrum argentinense R. Speg. = **Encyclia argentinensis** (R. Speg.) Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1952b.

Epidendrum armeniacum Lindl.
Sin.: *Amblostoma armeniacum* (Lindl.) Brieger ex Pabst

Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1962.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3458* (MBM, SP)].

Epidendrum avicula Lindl.
Sin.: *Lanium avicula* (Lindl.) Benth.
Referencias: Dressler, R. L., 1967; Kraenzlin, F. W. L., 1911.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14076* (MBM)].

Epidendrum brachythyrsus Kraenzl. = **Epidendrum densiflorum** Hook.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Epidendrum bracteatum Vell. = **Rodriguezia bracteata** (Vell.) Hoehne
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Epidendrum brevicolle Kraenzl. = **Epidendrum henschenii** Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Epidendrum bulbosum Vell. = **Prosthechea bulbosa** (Vell.) W.E. Higgins
Referencias: Higgins, W. E., 1997.

Epidendrum burgeri Schltr. = **Epidendrum proligerum** Barb. Rodr.

Epidendrum calcarata Vell. = **Bifrenaria tetragona** (Lindl.) Schltr.

Epidendrum caldense Barb. Rodr.
Sin.: *Epidendrum hatschbachii* Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1018* (SI)].

Epidendrum calliferum Lem. = **Epidendrum cristatum** Ruiz & Pav.
Referencias: Dodson, C. H. & Dodson, P. M., 1980.

Epidendrum cebolleta Jacq. = **Trichocentrum cebolleta** (Jacq.) M.W. Chase & N.H. Williams
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Epidendrum cinnabarinum Salzm. ex Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 13597* (NY)].

Epidendrum concretum Jacq. = **Polystachya concreta** (Jacq.) Garay & Sweet
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Epidendrum coronatum Ruiz & Pav.
Referencias: Hashimoto, T., 1974.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 41568* (MBM)].

Epidendrum corymbosum Lindl., hom. illeg. = **Epidendrum ecostatum** Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Epidendrum crassifolium Lindl. var. *albescens* Pabst = **Epidendrum secundum** Jacq. f. **albescens** (Pabst) F. Barros
Referencias: Barros, F., 2002a.

Epidendrum cristatum Ruiz & Pav.
Sin.: *Epidendrum alexandrii* Schltr., *Epidendrum calliferum* Lem., *Epidendrum raniferum* Lindl., *Epidendrum raniferum* Lindl. var. *loefgrenii* Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15601* (MBM)].

Epidendrum dendrobioides Thunb.
Referencias: Barros, F. & Pinheiro, F., 2004.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 40227* (MBM)].

Epidendrum densiflorum Hook.
Sin.: *Epidendrum brachythyrsus* Kraenzl., *Epidendrum floribundum* Kunth, *Epidendrum noackii* Cogn., *Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pav.
Referencias: Garay, L. A., 1954; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1962, 1966; Waechter, J. L., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(JUJ, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5466* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 8072* (NY)]; PRY[*Marín, G. 298* (BM, CTES, PY)].

Epidendrum denticulatum Barb. Rodr. = **Epidendrum purpureum** Barb. Rodr.

[Epidendrum difforme Jacq.]
Sin.: *Epidendrum umbellatum* Sw., *Neolehmannia difformis* (Jacq.) Pabst
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Epidendrum dutrae (Pabst) Hawkes = **Encyclia dutrae** Pabst

Epidendrum ecostatum Pabst
Sin.: *Epidendrum corymbosum* Lindl., hom. illeg.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 10184* (S)].

Epidendrum ellipticum Graham ex Hook. = **Epidendrum secundum** Jacq. f. **secundum**
Referencias: Carnevali, G., Ramírez-Morillo, I. M., Romero-González, G. A., Vargas, C. A. & Foldats, E., 2003.

Epidendrum elongatum Jacq. = **Epidendrum secundum** Jacq. f. **secundum**
Referencias: Carnevali, G., Ramírez-Morillo, I. M., Romero-González, G. A., Vargas, C. A. & Foldats, E., 2003.

Epidendrum ensiferum Rchb. f.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Imaguire, N. 491* (MBM)].

Epidendrum faustum Rchb. f. ex Cogn. = **Prosthechea fausta** (Rchb. f. ex Cogn.) W.E. Higgins
Referencias: Higgins, W. E., 1997.

Epidendrum flavum Lindl. = **Encyclia flava** (Lindl.) M.L. Porto & Brade

Epidendrum floribundum Kunth = **Epidendrum densiflorum** Hook.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Epidendrum forbesii Rchb. f. = **Cattleya forbesii** Lindl.
Referencias: Fowlie, J. A., 1977.

Epidendrum fragrans Sw. = **Prosthechea fragrans** (Sw.) W.E. Higgins
Referencias: Higgins, W. E., 1997.

Epidendrum faustum Rchb. f. ex Cogn. = **Anacheilium faustum** (Rchb. f. ex Cogn.) Pabst, Moutinho & A.V. Pinto

Epidendrum fulgens Brongn.
Sin.: *Epidendrum moseni* Rchb. f., *Epidendrum planiceps* Kraenzl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Borba, E. L. 165* (SP)].

Epidendrum geniculatum Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19011* (MBM)].

Epidendrum gigas Vell. = **Cyrtopodium gigas** (Vell.) Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1942b.

Epidendrum globosum Jacq. = **Jacquiniella globosa** (Jacq.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1938.

Epidendrum glumaceum Lindl. = **Prosthechea inversa** (Lindl.) W.E. Higgins

Epidendrum graminoides Sw. = **Dichaea graminioides** (Sw.) Lindl.

Epidendrum gravidum Lindl. = **Encyclia gravida** (Lindl.) Schltr.

Epidendrum hassleri Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1903.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10339* (AS, G)].

Epidendrum hatschbachii Schltr. = **Epidendrum caldense** Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Epidendrum henschenii Barb. Rodr.
Sin.: *Epidendrum brevicolle* Kraenzl.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1921b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004; Waechter, J. L., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 1597* (MBM)].

Epidendrum humile Vell. = **Sophronitis cernua** Lindl.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

[Epidendrum ibaguense Kunth]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Epidendrum imbricatum Lindl.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4231* (HBR)].

Epidendrum intermedium Rchb. f. = **Cattleya intermedia** Graham ex Hook.
Referencias: Fowlie, J. A., 1977.

Epidendrum inversum Lindl. = **Prosthechea inversa** (Lindl.) W.E. Higgins
Referencias: Higgins, W. E., 1997.

Epidendrum latilabre Lindl.
Sin.: *Epidendrum arachnoideum* Barb. Rodr., *Epidendrum raddiatum* Hoffm., *Neolehmannia latilabris* (Lindl.) Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 8118* (MBM)].

Epidendrum ligulatum Vell. = **Trichocentrum pumilum** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams
Referencias: Pabst, G. F. J., 1952b.

Epidendrum lineare Jacq. = **Isochilus linearis** (Jacq.) R. Br.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Epidendrum linearifolioides (Kraenzl.) Pabst = **Encyclia flava** (Lindl.) M.L. Porto & Brade

Epidendrum loddgesii Rchb. f. = **Cattleya loddigesii** Lindl.

Epidendrum loefgrenii Cogn.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 10099* (S)].

Epidendrum longifolium Barb. Rodr. = **Encyclia oncidioides** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Castro Neto, V. P. & Campacci, M. A., 2004.

Epidendrum longovarium Barb. Rodr.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 10100* (S)].

Epidendrum megalanthum Barb. Rodr. = **Encyclia megalantha** (Barb. Rodr.) Porto & Brade

Epidendrum moseni Rchb. f. = **Epidendrum fulgens** Brongn.

Epidendrum nervosum Thunb. = **Liparis nervosa** (Thunb.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Epidendrum noackii Cogn. = **Epidendrum densiflorum** Hook.

Epidendrum nocturnum Jacq.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2630* (MBM, SP)].

Epidendrum nutans Sw.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 11614* (NY)].

Epidendrum obergii Hawkes
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 9417* (ICN)].

Epidendrum ochrochlorum Barb. Rodr. = **Epidendrum proligerum** Barb. Rodr.
Referencias: Toscano de Brito, A. L. V., Cribb, P. J. & Smidt, E. C., 2005.

Epidendrum odoratissimum Lindl. = **Encyclia patens** Hook.
Referencias: Hoehne, F. C., 1947.

Epidendrum oncidioides Lindl. = **Encyclia oncidioides** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1947; Williams, L. O., 1952.

Epidendrum oncidioides Lindl. var. *gravidum* (Lindl.) Ames = **Encyclia gravida** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1947.

Epidendrum palmarum Salzm. ex Lindl. = **Vanilla palmarum** (Salzm. ex Lindl.) Lindl.

Epidendrum paniculatum Ruiz & Pav. = **Epidendrum densiflorum** Hook.

Epidendrum papilio Vell. = **Prosthechea papilio** (Vell.) W.E. Higgins
Referencias: Higgins, W. E., 1997.

Epidendrum paranaense Barb. Rodr.
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13444* (MBM, SP)].

Epidendrum pauper Vell. = **Cattleya forbesii** Lindl.

Epidendrum pedale Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1926.
Hierba epífita. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, A. 36* (B)].

Epidendrum planiceps Kraenzl. = **Epidendrum fulgens** Brongn.

Epidendrum polyanthum Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Devos s.n.* (*)].

Epidendrum polyphyllum Vell. = **Cyrtopodium polyphyllum** (Vell.) Pabst ex F. Barros

Epidendrum porphyroglossum Rchb. f. = **Cattleya porphyroglossa** L. Linden & Rchb. f.
Referencias: Fowlie, J. A., 1977.

Epidendrum proligerum Barb. Rodr.
Sin.: *Epidendrum burgeri* Schltr., *Epidendrum ochrochlorum* Barb. Rodr.
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1962.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 100–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2667* (MBM)].

Epidendrum pseudavicula Kraenzl.
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Cervi, A. C. 6038* (MBM)].

Epidendrum pseudodifforme Hoehne & Schltr.
Referencias: Klein, R. M., 1979; Stancik, J. F., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 911* (SI)].

Epidendrum punctatum L. = **Cyrtopodium punctatum** (L.) Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1942b.

Epidendrum punctiferum Rchb. f. = **Prosthechea punctifera** (Rchb. f.) W.E. Higgins
Referencias: Higgins, W. E., 1997.

Epidendrum purpureum Barb. Rodr.
Sin.: *Epidendrum denticulatum* Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 8295* (MBM)].

Epidendrum pusillum L. = **Psygmorchis pusilla** (L.) Dodson & Dressler
Referencias: Dodson, C. H. & Dressler, R. L., 1972.

Epidendrum pygmaeum Hook. = **Prosthechea pygmaea** (Hook.) W.E. Higgins
Referencias: Higgins, W. E., 1997.

Epidendrum raddiatum Hoffm. = **Epidendrum latilabre** Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1953.

Epidendrum ramosum Jacq.
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2143* (SI)].

Epidendrum raniferum Lindl. = **Epidendrum cristatum** Ruiz & Pav.

Epidendrum raniferum Lindl. var. *loefgrenii* Cogn. = **Epidendrum cristatum** Ruiz & Pav.

Epidendrum rigidum Jacq.
Referencias: Fraga Nunes, V., 1997; Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1922.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 263* (BAB, CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 13654* (MBM)].

Epidendrum rodriguesii Cogn. = **Epidendrum strobiliferum** Rchb. f.

Epidendrum rojasii Cogn.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10503* (G)].

Epidendrum ruscifolium Jacq. = **Pleurothallis ruscifolia** (Jacq.) R. Br.

Epidendrum samaipatense Dodson & R. Vásquez
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 1000–1500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giorgis, P. 800* (SI)].

Epidendrum saximontanum Pabst
Referencias: Stancik, J. F., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Stancik, J. F. 32* (UPCB)].

Epidendrum secundum auct. non Jacq. = **Bifrenaria aureo-fulva** (Hook.) Lindl.
Referencias: Castro Neto, V. P., 2004.

Epidendrum secundum Jacq. f. **albescens** (Pabst) F. Barros
Sin.: *Epidendrum crassifolium* Lindl. var. *albescens* Pabst, *Epidendrum secundum* Jacq. var. *albescens* (Pabst) F. Barros
Referencias: Barros, F., 2002a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Handro, O. 227* (SP)].

Epidendrum secundum Jacq. f. **secundum**
Sin.: *Epidendrum ansiferum* Rchb. f., *Epidendrum ellipticum* Graham ex Hook., *Epidendrum elongatum* Jacq.
Referencias: Barros, F. & Pinheiro, F., 2004; Carnevali, G., Ramírez-Morillo, I. M., Romero-González, G. A., Vargas, C. A. & Foldats, E., 2003; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1820* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 10330* (G)].

Epidendrum secundum Jacq. var. *albescens* (Pabst) F. Barros = **Epidendrum secundum** Jacq. f. **albescens** (Pabst) F. Barros
Referencias: Barros, F., 2002a.

Epidendrum serronianum Barb. Rodr. = **Encyclia patens** Hook.
Referencias: Castro Neto, V. P. & Campacci, M. A., 2004.

[Epidendrum spicatum Rojas Acosta, hom. illeg.]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d; Rojas Acosta, N., 1897.
Notas: Nombre dudoso.

Epidendrum strobiliferum Rchb. f.
Sin.: *Epidendrum rodriguesii* Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1922; Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004; Waechter, J. L., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gatti, G. 453* (SP)].

Epidendrum tigrinum Lindl. ex Lindl. = **Prosthechea tigrina** (Linden ex Lindl.) W.E. Higgins
Referencias: Higgins, W. E., 1997.

Epidendrum tridactylum Lindl. = **Amblostoma tridactylum** (Lindl.) Rchb. f.

Epidendrum tripartitum Vell. = **Encyclia tripartita** (Vell.) Hoehne

Epidendrum umbellatum Sw. = **Epidendrum difforme** Jacq.

Epidendrum uniflorum Vell. = **Maxillaria picta** Hook.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Epidendrum utricularioides Sw. = **Ionopsis utricularioides** (Sw.) Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Epidendrum variegatum Hook., hom. illeg. = **Prosthechea vespa** (Vell.) W.E. Higgins
Referencias: Higgins, W. E., 1997.

Epidendrum versicolor Hoehne & Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Stancik, J. F., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Campos Artoy, P. s.n.* (SP)].

Epidendrum vesicatum Lindl.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 11068* (MBM)].

Epidendrum vespa Vell. = **Prosthechea vespa** (Vell.) W.E. Higgins
Referencias: Higgins, W. E., 1997.

Epidendrum violaceum Lodd. = **Cattleya loddigesii** Lindl.

Epidendrum viridipurpureum Hook.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15534* (NY)].

Epidendrum weddellii Lindl.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1903.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APA, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 29978* (CTES)].

Epidendrum widgrenii Lindl. = **Prosthechea papilio** (Vell.) W.E. Higgins
Referencias: Higgins, W. E., 1997.

Epistephium Kunth

Número de especies: 3

Epistephium clorophyllum Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jörgensen, P. 4641* (SI)].

Epistephium lucidum Cogn.
Referencias: Barros, F. & Pinheiro, F., 2004; Hoehne, F. C., 1945.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 36006* (CTES, PY)].

Epistephium sclerophyllum Lindl.
Referencias: Barros, F. & Pinheiro, F., 2004; Correa, M. N., 1984h; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(APA, AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pierotti, A. 6377* (LIL)]; BRA[*Ceccantini, G. 1440* (MBM)]; PRY[*Schinini, A. 28227* (CTES)].

Eriopsis Lindl.

Número de especies: 1 endémica

Eriopsis sceptrum Rchb. f. & Warsz.
Sin.: *Cyrtopodium yauaperyense* Barb. Rodr.
Referencias: Menezes, L. C., 2000.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7500* (NY)].

Erythrodes Blume

Número de especies: 1

Erythrodes arietina (Rchb. f. & Warm.) Ames = **Microchilus arietinus** (Rchb. f. & Warm.) Ormd.
Referencias: Ormerod, P., 2002b.

Erythrodes austrobrasiliensis (Porsch) Pabst = **Microchilus austrobrasiliensis** (Porsch) Ormd.
Referencias: Ormerod, P., 2002b.

Erythrodes bicolor (Barb. Rodr.) Ames = **Aspidogyne bicolor** (Barb. Rodr.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1977.

Erythrodes bidentifera (Schltr.) Garay = **Aspidogyne bidentifera** (Schltr.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1977.

Erythrodes bruxellii Pabst = **Aspidogyne bruxellii** (Pabst) Garay
Referencias: Correa, M. N., 1995; Garay, L. A., 1977.

[Erythrodes bruxellii Pabst var. acutiloba Pabst]
Notas: Nombre dudoso.

Erythrodes commelinoides (Barb. Rodr.) Ames
Sin.: *Aspidogyne commelinoides* (Barb. Rodr.) Garay, *Physurus commelinoides* Barb. Rodr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16115* (MBM)].

Erythrodes densiflora (Lindl.) Ames = **Aspidogyne foliosa** (Poepp. & Endl.) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a.

Erythrodes dichopetala (Kraenzl.) L.O. Williams = **Aspidogyne kuczynskii** (Porsch) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1982[1980].

Erythrodes foliosa (Poepp. & Endl.) Ames = **Aspidogyne foliosa** (Poepp. & Endl.) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977.

Erythrodes juruensis (Hoehne) Garay = **Ligeophila juruensis** (Hoehne) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1977.

Erythrodes kuczynskii (Porsch) Garay = **Aspidogyne kuczynskii** (Porsch) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1982[1980].

Erythrodes lindleyana (Cogn.) Ames = **Aspidogyne lindleyana** (Cogn.) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977.

Erythrodes longicornu (Cogn.) Ames = **Aspidogyne longicornu** (Cogn.) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977.

Erythrodes malmei (Kraenzl.) Pabst = **Aspidogyne malmei** (Kraenzl.) Garay
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Erythrodes nobilis (Rchb. f.) Pabst = **Aspidogyne fimbrillaris** (Buyss.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1977.

Erythrodes paranaensis (Kraenzl.) Pabst = **Platythelys paranaensis** (Kraenzl.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1977.

Erythrodes picta (Lindl.) Ames = **Aspidogyne fimbrillaris** (Buyss.) Garay

Erythrodes platensis (Hauman) L.O. Williams = **Platythelys platensis** (Hauman) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1977.

Erythrodes rosea (Lindl.) Ames = **Ligeophila rosea** (Lindl.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1977.

Erythrodes schlechteriana (Hoehne) Pabst = **Platythelys schlechteriana** (Hoehne) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1977.

Eulophia R. Br., nom. cons.

Número de especies: 1

Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle
Sin.: *Cyrtoperia longiflora* Rchb. f., *Cyrtoperia vellosiana* Barb. Rodr., *Dendrobium longifolium* Kunth, *Eulophia longifolia* Schltr., *Eulophia longifolia* Schltr. var. *flavescens* Schltr., *Eulophia woodfordii* Rolfe, *Limodorum altum* L.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Hatschbach, G., 1962b; Hoehne, F. C., 1942b; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Günther, E. 12* (BAB)]; BRA[*Cordeiro, J. 623* (SPF)].

Eulophia argentina Schltr. = **Pteroglossaspis argentina** Rolfe
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952; Hoehne, F. C., 1942b.

Eulophia arundinae Rchb. f. = **Cyanaeorchis arundinae** (Rchb. f.) Barb. Rodr.

Eulophia longifolia Schltr. = **Eulophia alta** (L.) Fawc. & Rendle
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Eulophia longifolia Schltr. var. *flavescens* Schltr. = **Eulophia alta** (L.) Fawc. & Rendle
Referencias: Pabst, G. F. J., 1953.

Eulophia maculata Lindl. = **Oeceoclades maculata** (Lindl.) Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1962.

Eulophia woodfordii Rolfe = **Eulophia alta** (L.) Fawc. & Rendle
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Eulophidium maculatum (Lindl.) Pfitzer = **Oeceoclades maculata** (Lindl.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Eulophidium maculatum (Lindl.) Pfitzer var. *pterocarpum* Hauman = **Oeceoclades maculata** (Lindl.) Lindl.

Eurystyles Wawra

Número de especies: 5

Eurystyles actinosophila (Barb. Rodr.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes actinosophila* Barb. Rodr., *Stenoptera actinosophila* (Barb. Rodr.) Cogn., *Trachelosiphon actinosophila* (Barb. Rodr.) Schltr.
Referencias: Burns-Balogh, P., Robinson, H. E. & Foster, M. S., 1985; Garay, L. A., 1982[1980]; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (BA)]; BRA[*Hatschbach, G. 19204* (MBM)].

Eurystyles cogniauxii (Kraenzl.) Pabst
Sin.: *Pseudoeurystyles cogniauxii* (Kraenzl.) Hoehne, *Pseudoeurystyles gardneri* (Lindl.) Hoehne, *Spiranthes gardneri* Lindl., *Stenorrhynchos cogniauxii* Kraenzl., *Trachelosiphon cogniauxii* (Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Pridgeon, A. M., Cribb, P. J., Chase, M. W. & Rasmussen, F. N., 2003.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 11909* (MBM)].

Eurystyles cotyledon Wawra
Sin.: *Stenoptera ananassocomos* Rchb. f.
Referencias: Burns-Balogh, P., Robinson, H. E. & Foster, M. S., 1985; Garay, L. A., 1982[1980]; Pabst, G. F. J., 1959a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 937* (ICN)].

Eurystyles lorenzii (Cogn.) Schltr.
Sin.: *Pseudoeurystyles lorenzii* (Cogn.) Hoehne, *Stenoptera lorenzii* Cogn., *Trachelosiphon lorenzii* (Cogn.) Hoehne
Referencias: Burns-Balogh, P., Robinson, H. E. & Foster, M. S., 1985; Hoehne, F. C., 1945; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 120* (HB, MBM, SP)].

Eurystyles paranaensis (Schltr.) Schltr.
Sin.: *Trachelosiphon paranense* Schltr.
Referencias: Burns-Balogh, P., Robinson, H. E. & Foster, M. S., 1985; Hoehne, F. C., 1945.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Aren, P. s.n.* (RB)].

Fernandezia lunifera Lindl. = **Lockhartia lunifera** (Lindl.) Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Galeandra Lindl.

Número de especies: 6

Galeandra beyrichii Rchb. f.
Referencias: Carnevali, G., Ramírez-Morillo, I. M., Romero-González, G. A., Vargas, C. A. & Foldats, E., 2003; Hatschbach, G., 1962b; Hauman, L. L., 1921a; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Williams, L. O., 1939.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 822* (MU, SI)]; BRA[*Malme, G. O. A. s.n.* (S)]; PRY[*Hassler, E. 1751* (G)].

Galeandra graminoides Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Williams, L. O., 1939.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(FOR, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 5756* (LIL)].

Galeandra hysterantha Barb. Rodr.
Referencias: Correa, M. N., 1996; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 17933* (CTES)]; BRA[*Schlechter, F. R. R. 16979* (B)]; PRY[*Hassler, E. 3071* (G)].

Galeandra juncea Lindl. = **Galeandra stylomisantha** (Vell.) Hoehne
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Galeandra junceoides Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hoehne, F. C. 2810* (SP)]; PRY[*Schulz, A. G. 8847* (CTES)].

Galeandra paraguayensis Cogn.
Sin.: *Galeandra paranaensis* Schltr.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1903; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15338* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 5356* (G)].

Galeandra paranaensis Schltr. = **Galeandra paraguayensis** Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Galeandra stylomisantha (Vell.) Hoehne
Sin.: *Galeandra juncea* Lindl., *Orchis stylomisantha* Vell.
Referencias: Carnevali, G., Ramírez-Morillo, I. M., Romero-González, G. A., Vargas, C. A. & Foldats, E., 2003; Cogniaux, C. A., 1903; Correa, M. N., 1995; Hashimoto, T., 1993; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 8533* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 15891* (MBM)]; PRY[*Ferrucci, M. S. 1706* (CTES)].

Garaya Szlach.

Número de especies: 1

Garaya atroviridis (Barb. Rodr.) Szlach.
Sin.: *Cyclopogon atroviridis* Barb. Rodr., *Mesadenella atroviridis* (Barb. Rodr.) Garay, *Spiranthes atroviridis* (Barb. Rodr.) Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996; Szlachetko, D. L., 1993b.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gehrt, A. s.n.* (SPF)].

Gavilea Poepp.

Número de especies: 15 endémicas

Gavilea araucana (Phil.) M.N. Correa
Sin.: *Asarca araucana* Phil., *Asarca araucana* Phil. var. *incisa* Hauman, *Gavilea araucana* (Phil.) M.N. Correa var. *incisa* Hauman
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Correa, M. N., 1956, 1969b.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(VII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 1034* (CTES, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 994945* (CONC, SGO)].

Gavilea araucana (Phil.) M.N. Correa var. *incisa* Hauman = **Gavilea araucana** (Phil.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1969b.

Gavilea australis (Skottsb.) M.N. Correa
Sin.: *Asarca australis* Skottsb., *Asarca enigmatica* Hauman
Referencias: Correa, M. N., 1956; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 1024* (CTES, SI)]; CHL[*Pisano, E. 7613* (CONC)].

Gavilea cardioglossa (Reiche) M.N. Correa, nom. illeg. = **Gavilea cardioglossa** (Reiche) Martic.
Referencias: Marticorena, C., 2001[2000].

Gavilea cardioglossa (Reiche) Martic.
Sin.: *Asarca cardioglossa* Reiche, *Gavilea cardioglossa* (Reiche) M.N. Correa, nom. illeg.
Referencias: Lehnebach, C., 2003; Marticorena, C., 2001[2000].
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 500–1200 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*sin colector s.n.* (SGO)].

Gavilea cardioglossa (Reiche) M.N. Correa var. *patagonica* (Garay) M.N. Correa = **Gavilea trullata** Ormd.

Gavilea feuilleana (Kraenzl.) Lehnebach
Sin.: *Asarca feuilleana* Kraenzl.
Referencias: Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Lehnebach, C. s.n.* (VALD)].

Gavilea glandulifera (Poepp.) M.N. Correa
Sin.: *Asarca appendiculata* Kraenzl., *Asarca glandulifera* Poepp., *Chloraea albo-rosea* Speg., *Chloraea volucris* Lindl.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Correa, M. N., 1956, 1969b.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 800–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(V, VI, VII, VIII, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 1053* (CTES, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20175* (CONC, SGO)].

Gavilea insularis M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1968b; Danton, P., 1998; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Kuschel, G. s.n.* (S)].

Gavilea kingii (Hook. f.) M.N. Correa
Sin.: *Asarca kingii* Hook. f.
Referencias: Domínguez, E., Elvebakk, A., Muñoz, C., Uribe, M., Ríos, C. & López, B., 2002; Lehnebach, C. & Riveros, M., 2000.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: CHL(X, XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Lehnebach, C. s.n.* (VALD)].

Gavilea littoralis (Phil.) M.N. Correa
Sin.: *Asarca littoralis* (Phil.) Reiche, *Asarca macroptera* Kraenzl., *Gavilea macroptera* (Kraenzl.) M.N. Correa
Referencias: Lehnebach, C., 2003; Moore, D. M., 1974.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 1023* (CTES, SI)]; CHL[*Krause 367* (SI)].

Gavilea longibracteata (Lindl.) Sparre ex L.E. Navas = **Gavilea venosa** (Lam.) Garay & Ormd.
Referencias: Ormerod, P., 2002a.

Gavilea lutea (Pers.) M.N. Correa
Sin.: *Asarca acutiflora* Poepp. & Endl., *Asarca brachychila* Phil., *Asarca commersonii* (Brongn.) Hook., *Asarca*

lutea (Pers.) Skottsb., *Asarca thermarun* Phil. & Kraenzl., *Chloraea commersonii* Brongn., *Serapias lutea* Pers.
Referencias: Correa, M. N., 1956, 1969b; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 500–1200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 947* (SI)]; CHL[*Rentzell, I. 6267* (SI)].

Gavilea macroptera (Kraenzl.) M.N. Correa = **Gavilea littoralis** (Phil.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1969b.

Gavilea odoratissima Poepp.
Sin.: *Asarca odoratissima* Poepp. & Endl., *Asarca platyantha* auct. non Rchb. f., *Asarca ventanai* Hauman
Referencias: Correa, M. N., 1956, 1969b; Lehnebach, C., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 100–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 4726* (SI)]; CHL[*Schlegel, F. 7200* (CONC)].

Gavilea platyantha (Rchb. f.) Ormd.
Sin.: *Asarca platyantha* Rchb. f.
Referencias: Ormerod, P., 2002a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 900–1300 m.
Países: CHL(IV, V, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 5675* (SI)].

Gavilea supralabellata M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1966b, 1969b; Marticorena, C., com. pers.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 949* (SI)].
Notas: Citada para Chile sin mencionar ejemplar de referencia (C. Marticorena, com. pers.).

Gavilea trullata Ormd.
Sin.: *Asarca cardioglossa* Reiche var. *patagonica* Gay, *Gavilea cardioglossa* (Reiche) M.N. Correa var. *patagonica* (Garay) M.N. Correa
Referencias: Ormerod, P., 2002a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12587* (BAB)].

Gavilea venosa (Lam.) Garay & Ormd.
Sin.: *Asarca longibracteata* Lindl., *Asarca sinuata* Lindl., *Asarca spectabilis* Phil., *Gavilea longibracteata* (Lindl.) Sparre ex L.E. Navas, *Limodorum venosum* Lam.
Referencias: Lehnebach, C., 2003; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Muñoz-Pizarro, C., 1960.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 1200–2500 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Tome, G. 120* (CONC)].

Gavilea wittei (Hicken) Ormd.
Sin.: *Asarca patagonica* Skottsb., hom. illeg., *Chloraea wittei* Hicken
Referencias: Correa, M. N., 1956; Ormerod, P., 2002a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 945* (SI)].

Geoblasta Barb. Rodr.

Número de especies: 1 endémica

Geoblasta pennicillata (Rchb. f.) Hoehne ex M.N. Correa
Sin.: *Asarca arechavaletae* (Kraenzl.) Kuntze, *Chloraea arechavaletae* Kraenzl., *Chloraea bergii* Hieron., *Chloraea pennicillata* Rchb. f., *Chloraea teixeirana* (Barb. Rodr.) Cogn., *Geoblasta teixeirana* Barb. Rodr.
Referencias: Correa, M. N., 1968a; Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J., 1952a; Sprunger, S., 1996.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(COL, MON, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 4838* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 166* (MBM)]; URY[*Osten, C. 5290* (SI)].

Geoblasta teixeirana Barb. Rodr. = **Geoblasta pennicillata** (Rchb. f.) Hoehne ex M.N. Correa

Gomesa R. Br.

Número de especies: 11, 2 endémicas

Gomesa barkeri (Hook.) Rolfe
Sin.: *Rodriguezia barkeri* Hook.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 26381* (MBM)].

Gomesa crispa (Lindl.) Klotzsch ex Rchb. f.
Sin.: *Rodriguezia crispa* Lindl.
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953; Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14542* (MBM, NY)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. s.n.* (AS, SP)].

Gomesa divaricata Hoffmanns.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Jürgens, C. 29* (B)].

Gomesa duseniana Kraenzl.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9029* (NY, S)].

Gomesa fischeri Regel
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15568* (MBM)].

Gomesa foliosa (Hook.) Klotzsch ex Rchb. f.
Sin.: *Pleurothallis foliosa* Hook.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1953, 1966.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16296* (MBM)].

Gomesa glaziovii Cogn.
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3014* (MBM)].

Gomesa gomezoides (Barb. Rodr.) Pabst = **Rodrigueziella gomezoides** (Barb. Rodr.) Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Gomesa handroi (Hoehne) Pabst = **Rodrigueziella handroi** (Hoehne) Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Gomesa laxiflora (Lindl.) Klotzsch ex Rchb. f.
Sin.: *Rodriguezia recurva* Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Schlechter, F. R. R., 1926.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 900–1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lindeman, J. C. 4054* (SP)].

Gomesa paranaensis Kraenzl.
Referencias: Barros, F., 1983; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16673* (MBM)].

Gomesa planifolia Klotzsch & Rchb. f.
Sin.: *Gomesa reclinata* Hoffmanns., *Rodriguezia planifolia* Lindl.
Referencias: Hatschbach, G., 1962b; Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Hauman, L. L., 1917b; Johnson, A. E., 2001; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guillén, R. 492* (MNES, SI)]; BRA[*Dutra, J. 982* (ICN, SI)]; PRY[*Schinini, A. 23185* (CTES)].

Gomesa reclinata Hoffmanns. = **Gomesa planifolia** Klotzsch & Rchb. f.
Referencias: Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Gomesa recurva R. Br.
Sin.: *Odontoglossum recurvum* Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1962.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–1200 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 10535* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 18686* (MBM, NY)].

Gomesa theodorea (Barb. Rodr.) Cogn. = **Rodrigueziella gomezoides** (Barb. Rodr.) Pabst

Gongora Ruiz & Pav.
Número de especies: 2

Gongora bufonia Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1942b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9050* (NY)].

Gongora quinquenervis Ruiz & Pav.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. s.n.* (MBM)].

Govenia Lindl.
Número de especies: 1

Govenia boliviensis Rolfe = **Govenia utriculata** (Sw.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Govenia gardneri Hook. = **Govenia utriculata** (Sw.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Govenia sulphurea Rchb. f. = **Govenia utriculata** (Sw.) Lindl.

Govenia tingens Poepp. & Endl. = **Govenia utriculata** (Sw.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Govenia utriculata (Sw.) Lindl.
Sin.: *Govenia boliviensis* Rolfe, *Govenia gardneri* Hook., *Govenia sulphurea* Rchb. f., *Govenia tingens* Poepp. & Endl., *Limodorum utriculatum* Sw.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Hatschbach, G., 1962b; Hoehne, F. C., 1942b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 1753* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 1202* (MBM)].

Notas: Citada para Paraguay sin indicar material de referencia (Hoehne, 1942b).

Grobya Lindl.

Número de especies: 4, 2 endémicas

Grobya amherstiae Lindl.
Referencias: Barros, F. & Lourenço, R. A., 2004; Hatschbach, G., 1962b.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Handro, O. 2165* (SPF)].

Grobya bibrachiata Hoehne = **Grobya fascifera** Rchb. f.
Referencias: Barros, F. & Lourenço, R. A., 2004.

Grobya bibrachiata Hoehne var. *riograndensis* Pabst = **Grobya fascifera** Rchb. f.
Referencias: Barros, F. & Lourenço, R. A., 2004.

Grobya fascifera Rchb. f.
Sin.: *Grobya bibrachiata* Hoehne, *Grobya bibrachiata* Hoehne var. *riograndensis* Pabst, *Grobya fascifera* Rchb. f. f. *bibrachiata* (Hoehne) Pabst
Referencias: Barros, F. & Lourenço, R. A., 2004; Hatschbach, G., 1966; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reineck, E. M. 404* (BA)].

Grobya fascifera Rchb. f. f. *bibrachiata* (Hoehne) Pabst = **Grobya fascifera** Rchb. f.

Grobya galeata Lindl.
Referencias: Barros, F. & Lourenço, R. A., 2004; Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1959a.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Leite, J. E. 397* (SP)].

Grobya guieselii F. Barros & R. Lourenço
Referencias: Barros, F. & Lourenço, R. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Guiesel, A. s.n.* (SP)].

Gyrostachys bonariensis (Lindl.) Kuntze = **Pachygenium bonariensis** (Lindl.) Szlach., R. González & Rutk.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Gyrostachys oestrifera (Rchb. f. & Warm.) Kuntze = **Pelexia oestrifera** (Rchb. f. & Warm.) Schltr.

Habenaria Willd.

Número de especies: 65, 16 endémicas

Habenaria achalensis Kraenzl. = **Habenaria paivaeana** Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1996.

Habenaria achalensis Kraenzl. var. *agustifolia* Kraenzl. = **Habenaria paivaeana** Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1996.

Habenaria adenosephala Kraenzl. = **Habenaria edwallii** Cogn.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

[Habenaria alpestris Cogn.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Habenaria amambayensis Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CEN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10969* (G)].

Habenaria amazonica Schltr. = **Habenaria schwackei** Barb. Rodr.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002.

Habenaria angustiloba Lillo & Hauman = **Habenaria paivaeana** Rchb. f.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Habenaria anisitsii Kraenzl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940; Kraenzlin, F. W. L., 1911.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hatschbach, G. 36083* (MBM)].

[Habenaria aphylla Barb. Rodr.]
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Habenaria araneifolia Barb. Rodr
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002.
Hierba rupícola. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 674* (ICN, SI)].

Habenaria aranifera Lindl. = **Habenaria repens** Nutt. var. **repens**
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Correa, M. N., 1995.

Habenaria arechavaletae Kraenzl. = **Habenaria montevidensis** Spreng.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Garay, L. A., 1976; Pabst, G. F. J., 1976b.

Habenaria arechavaletae Kraenzl. var. *elata* Cogn. = **Habenaria montevidensis** Spreng.
Referencias: Garay, L. A., 1976; Pabst, G. F. J., 1976b.

Habenaria arechavaletae Kraenzl. var. *obovatipetala* (Schltr.) Pabst = **Habenaria montevidensis** Spreng.
Referencias: Garay, L. A., 1976; Pabst, G. F. J., 1976b.

Habenaria armata Rchb. f.
Sin.: *Habenaria elegantula* Hoehne
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Hoehne, F. C., 1940.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7509* (NY)].

Habenaria balansae Cogn.
Sin.: *Habenaria buttantanensis* Hoehne & Schltr., *Habenaria nigripes* Kraenzl., *Habenaria retusa* Barb. Rodr.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Hoehne, F. C., 1940; Pabst, G. F. J., 1959b.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2966* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 724* (G, P)].

Habenaria berroana Barb. Rodr. = **Habenaria leucosantha** Barb. Rodr. var. **berroana** (Barb. Rodr.) Pabst

Habenaria brachyphyton Schltr. ex Mansf. = **Habenaria parviflora** Lindl.

Habenaria bractescens Lindl.
Sin.: *Habenaria hauman-merckii* Hicken, *Habenaria kleyi* Schltr., *Habenaria pontagrossensis* Kraenzl., *Habenaria sartor* Lindl. f. *minor* Cogn., *Kusibabella bractescens* (Lindl.) Szlach.
Referencias: Batista, J. A. N., Bianchetti, L. B. & Miranda, Z. J. G., 2006; Cocucci, A. E., 1954; Correa, M. N., 1950; Hashimoto, T., 1993; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952a; Toscano de Brito, A. L. V., 1994; Williams, L. O., 1939.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN); URY(ART, CLA, COL, LAV, MAL, MON, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 1623* (SP)]; BRA[*Hatschbach, G. 43974* (SPF)]; PRY[*Rojas, T. 3961* (SP)]; URY[*Osten, C. 10370* (SP)].

Habenaria bradeana Kraenzl. = **Habenaria pleiophylla** Hoehne & Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

[Habenaria brevidens Lindl.]
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Habenaria burkartiana Hoehne = **Habenaria gourlieana** Gillies ex Lindl.
Referencias: Batista, J. A. N., Bianchetti, L. B. & Miranda, Z. J. G., 2006; Correa, M. N., 1950.

Habenaria buttantanensis Hoehne & Schltr. = **Habenaria balansae** Cogn.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Habenaria caaguazuensis Cogn. = **Habenaria parviflora** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1950; Hoehne, F. C., 1940.

[Habenaria caldensis Kraenzl.]
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Habenaria campos-portoi Schltr. = **Habenaria paranaensis** Barb. Rodr.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002.

Habenaria castellanosii Garay
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: URY(SJO).
Ejemplares de referencia: URY[*Castellanos, A. s.n.* (HB)].

Habenaria corcovadensis Kraenzl. = **Habenaria rodeiensis** Barb. Rodr.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Habenaria crassipes Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1959b.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1074* (SI)].

Habenaria distans Griseb.
Sin.: *Habenaria glaucophylla* Barb. Rodr.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Correa, M. N., 1995; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 1500–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 7023* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 630* (MBM, SP)].

Habenaria dusenii Schltr.
Sin.: *Habenaria sylvicutrix* Lindl.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13048* (MBM)].

Habenaria dutraei Schltr.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1959a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 675* (ICN, SI)].

Habenaria edwallii Cogn.
Sin.: *Habenaria adenosephala* Kraenzl., *Habenaria oligophylla* Schltr., *Habenaria physophora* Kraenzl.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 10923* (MBM)].

Habenaria ekmaniana Kraenzl.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Correa, M. N., 1950; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(SPE).

Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 432* (S)]; PRY[*Pedersen, T. M. 9487* (C)].

Habenaria elegantula Hoehne = **Habenaria armata** Rchb. f.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002.

[Habenaria entomantha Lindl.]
Referencias: Correa, M. N., 1950.
Notas: Nombre dudoso.

Habenaria exaltata Barb. Rodr.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3105* (SI)].

Habenaria fastor Warm. ex Hoehne = **Habenaria gourlieana** Gillies ex Lindl.
Referencias: Batista, J. A. N., Bianchetti, L. B. & Miranda, Z. J. G., 2006.

Habenaria fiebrigii Schltr. = **Habenaria hassleriana** Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1903; Correa, M. N., 1995; Hoehne, F. C., 1940.

Habenaria flaccida Kraenzl. = **Habenaria regnellii** Cogn.
Referencias: Correa, M. N., 1996.

[Habenaria flaccifolia Schltr.]
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Habenaria flexa Rchb. f. ex Kraenzl. = **Habenaria trifida** Kunth
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Habenaria foliosissima Kraenzl. = **Habenaria josephensis** Barb. Rodr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Habenaria glaucophylla Barb. Rodr. = **Habenaria distans** Griseb.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Habenaria gourlieana Gillies ex Lindl.
Sin.: *Habenaria burkartiana* Hoehne, *Habenaria fastor* Warm. ex Hoehne, *Habenaria spegazziniana* Kraenzl., *Kusibabella burkartiana* (Hoehne) Szlach., *Kusibabella gourlieana* (Gillies ex Lindl.) Szlach., *Macrocentrum mendocinum* Phil.
Referencias: Batista, J. A. N., Bianchetti, L. B. & Miranda, Z. J. G., 2006; Cocucci, A. E., 1954; Correa, M. N., 1950; Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952a.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); PRY(CAU, SPE); URY(CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1017* (SI)]; BRA[*Falkenberg, D. 6390* (BHCB)]; PRY[*Woolston, A. L. 788* (SI)]; URY[*Arechavaleta, J. 2625* (HB)].

Habenaria graciliscapa Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 100–2000 m.
Países: URY(CAS, SAO).

Habenaria guentheriana Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1995.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Türpe, A. M. 4820* (LIL)].

Habenaria guilleminii Rchb. f.
Sin.: *Habenaria ourobranquensis* Hoehne
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1959b.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hertel, R. 292* (RB)]; PRY[*Rojas, T. 6692* (SPF)].

Habenaria gustavi-edwallii Hoehne
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1959b.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 36580* (PACA)].

Habenaria habenarioides (Hoehne) R.E. Nogueira & R.J.V. Alves
Sin.: *Itaculumia habenarioides* Hoehne
Referencias: Nogueira, R. E. & Alves, R. J. V., 2003.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lange, R. T. s.n.* (SP)].

Habenaria hassleriana Cogn.
Sin.: *Habenaria fiebrigii* Schltr.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1903; Correa, M. N., 1995.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, D. 62* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6058* (SI)].

[Habenaria hatschbachii Pabst]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Habenaria hauman-merckii Hicken = **Habenaria bractescens** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1950.

Habenaria heleogena Schltr.
Sin.: *Habenaria trapezoidea* Hoehne & Schltr.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 500–1000 m.

Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 17065* (B)].

Habenaria henscheniana Barb. Rodr.
Sin.: *Habenaria henscheniana* Barb. Rodr. var. *densiflora* Cogn.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Hoehne, F. C., 1940; Sprunger, S., 1996.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 35770* (MBM)].

Habenaria henscheniana Barb. Rodr. var. *densiflora* Cogn. = **Habenaria henscheniana** Barb. Rodr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Habenaria heterophylla Schltr. = **Habenaria josephensis** Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Habenaria hexaptera Lindl.
Sin.: *Habenaria hieronymi* Kraenzl., *Habenaria hieronymi* Kraenzl. var. *saltensis* Hauman
Referencias: Correa, M. N., 1995; Del Vitto, L. A., Petenatti, E. M. & Petenatti, M. E., 1999.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 200–2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 8250* (SI)].

Habenaria hieronymi Kraenzl. = **Habenaria hexaptera** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Habenaria hieronymi Kraenzl. var. *saltensis* Hauman = **Habenaria hexaptera** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Habenaria humilis Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 500–1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Von Linsigen 30* (MBM, SP)].

[Habenaria hygrophilla Barb. Rodr.]
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Habenaria inconspicua Cogn.
Referencias: Barros, F. & Pinheiro, F., 2004; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1959b, 1966.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 827* (MBM, SP)]; URY[*Herter, W. G. F. 86651* (MVM, SP)].

Habenaria integripetala Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1903.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9678* (G, SP)].

Habenaria jaguariahyvae Kraenzl.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Hoehne, F. C., 1940; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 9532* (S)].

Habenaria janeirensis Kraenzl. = **Habenaria paranaensis** Barb. Rodr.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002.

Habenaria johannensis Barb. Rodr.
Sin.: *Habenaria vaupelli* Rchb. f. & Warm.
Referencias: Batista, J. A. N., Bianchetti, L. B. & Miranda, Z. J. G., 2006.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA, GUA, ÑEE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bresolin, A. 1119* (HB)]; PRY[*Hassler, E. 8703* (BM)].

Habenaria josephensis Barb. Rodr.
Sin.: *Habenaria foliosissima* Kraenzl., *Habenaria heterophylla* Schltr.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Hoehne, F. C., 1940; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1959b; Schlechter, F. R. R., 1922.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 300–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13808* (MBM)]; PRY[*Rojas, T. 9334* (SPF)].

Habenaria juergensii Schltr. = **Habenaria macronectar** (Vell.) Hoehne
Referencias: Batista, J. A. N., Bianchetti, L. B. & Miranda, Z. J. G., 2006.

Habenaria kleyi Schltr. = **Habenaria bractescens** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1996.

[Habenaria leptoceras Hook.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Habenaria leucosantha Barb. Rodr. var. **berroana** (Barb. Rodr.) Pabst
Sin.: *Habenaria berroana* Barb. Rodr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J., 1954.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lange, N. 9048* (B, S)]; URY[*Berro, M. B. 1890* (MVM)].

Habenaria leucosantha Barb. Rodr. var. **leucosantha**
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1959b.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 34843* (PACA)]; PRY[*Rojas, T. 10885* (G)].

Habenaria leucosantha Barb. Rodr. var. **riograndensis** Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J., 1959b.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 30932* (PACA)].

Habenaria lindmaniana Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1950; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 2926* (LIL)].

Habenaria macrodactyla Kraenzl.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Kraenzlin, F. W. L., 1921b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10404* (S)].

Habenaria macronectar (Vell.) Hoehne
Sin.: *Habenaria juergensii* Schltr., *Habenaria sartor* Lindl., *Habenaria sartoroides* Schltr., *Kusibabella macronectar* (Vell.) Szlach., *Kusibabella sartor* (Lindl.) Szlach., *Orchis macronectar* Vell.
Referencias: Batista, J. A. N., Bianchetti, L. B. & Miranda, Z. J. G., 2006; Hatschbach, G., 1962b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952a, 1959a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(GUA); URY(RNO, SJO).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1087* (ICN, SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 3946* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 3793* (HB)].

Habenaria megaceras Barb. Rodr. = **Habenaria obtusa** Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940; Sprunger, S., 1996.

Habenaria megapotamensis Hoehne
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1959b.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 873* (ICN, SP)].

Habenaria melanopoda Hoehne & Schltr.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Hoehne, F. C., 1940; Schlechter, F. R. R. & Hoehne, F. C., 1922.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 500–1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Cordeiro, J. 1689* (SP, SPF)].

Habenaria minarum Hoehne & Schltr. = **Habenaria rupicola** Barb. Rodr.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002.

Habenaria miniatus D. Don ex Sweet = **Rhodophiala advena** (Ker Gawl.) Traub

Habenaria mitomorpha Kraenzl.
Sin.: *Habenaria rudolfi-schlechteri* Hoehne
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Kraenzlin, F. W. L., 1893.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18785* (MBM)].

Habenaria montevidensis Lindl., hom. illeg. = **Habenaria uruguayensis** Garay
Referencias: Garay, L. A., 1976.

Habenaria montevidensis Spreng.
Sin.: *Habenaria arechavaletae* Kraenzl., *Habenaria arechavaletae* Kraenzl. var. *elata* Cogn., *Habenaria arechavaletae* Kraenzl. var. *obovatipetala* (Schltr.) Pabst, *Habenaria obovatipetala* Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952a, 1959b.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(CLA, LAV, MON, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pirani, J. R. 400* (SPF)]; URY[*Herter, W. G. F. 3586* (SP)].

Habenaria montevidensis Spreng. f. *nana* (Schltr.) Pabst = **Habenaria parviflora** Lindl.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002.

Habenaria montevidensis Spreng. f. *parviflora* (Lindl.) Pabst = **Habenaria parviflora** Lindl.

Habenaria montevidensis Spreng. f. *reichenbachiana* (Barb. Rodr.) Pabst = **Habenaria parviflora** Lindl.

Habenaria montevidensis Spreng. var. *tucumanensis* Griseb. = **Habenaria parviflora** Lindl.

Habenaria nana Schltr. = **Habenaria parviflora** Lindl.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002.

Habenaria nemorosa Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 10887* (MBM)].

Habenaria nigripes Kraenzl. = **Habenaria balansae** Cogn.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Habenaria nuda Lindl.
Sin.: *Habenaria nuda* Lindl. var. *pygmaea* Hoehne, *Habenaria trichoceras* Barb. Rodr.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1893; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24127* (MBM)].

Habenaria nuda Lindl. var. *pygmaea* Hoehne = **Habenaria nuda** Lindl.

Habenaria obovatipetala Schltr. = **Habenaria montevidensis** Spreng.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940; Pabst, G. F. J., 1954.

Habenaria obtusa Lindl.
Sin.: *Habenaria megaceras* Barb. Rodr., *Habenaria ornithoides* Barb. Rodr.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Carnevali, G., Ramírez-Morillo, I. M., Romero-González, G. A., Vargas, C. A. & Foldats, E., 2003; Correa, M. N., 1995; Hoehne, F. C., 1940; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(JUJ); BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6178* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 9028* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 10156* (BM)].

Habenaria oligophylla Schltr. = **Habenaria edwallii** Cogn.

Habenaria ornithoides Barb. Rodr. = **Habenaria obtusa** Lindl.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002.

Habenaria ourobranquensis Hoehne = **Habenaria guilleminii** Rchb. f.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002.

Habenaria paivaeana Rchb. f.
Sin.: *Habenaria achalensis* Kraenzl., *Habenaria achalensis* Kraenzl. var. *agustifolia* Kraenzl., *Habenaria angustiloba* Lillo & Hauman
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952a; Williams, L. O., 1938, 1939.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(COR, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(RGS, SCA); URY(CLA, LAV, MAL, MON, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 5330* (SI, SP)]; BRA[*Rambo, B. 8709* (PACA)]; URY[*Osten, C. 6496* (*)].

Habenaria paranaensis Barb. Rodr.
Sin.: *Habenaria campos-portoi* Schltr., *Habenaria janeirensis* Kraenzl.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR); PRY(PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 34046* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 576* (BM)].

Habenaria paranaguaensis Hoehne = **Habenaria pleiophylla** Hoehne & Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Habenaria parviflora Lindl.
Sin.: *Habenaria brachyphyton* Schltr. ex Mansf., *Habenaria caaguazuensis* Cogn., *Habenaria montevidensis* Spreng. f. *nana* (Schltr.) Pabst, *Habenaria montevidensis* Spreng. f. *parviflora* (Lindl.) Pabst, *Habenaria montevidensis* Spreng. f. *reichenbachiana* (Barb. Rodr.) Pabst, *Habenaria montevidensis* Spreng. var. *tucumanensis* Griseb., *Habenaria nana* Schltr., *Habenaria paulensis* Porsch, *Habenaria reichenbachiana* Barb. Rodr.
Referencias: Carnevali, G., Ramírez-Morillo, I. M., Romero-González, G. A., Vargas, C. A. & Foldats, E., 2003; Correa, M. N., 1950; Garay, L. A., 1976; Pabst, G. F. J., 1952a, 1959a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–3400 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA, MIE); URY(CAS, CLA, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 30659* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 3038* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 28* (SI)]; URY[*Seijo, G. J. 2396* (SI)].

[Habenaria pauciflora (Lindl.) Rchb. f.]
Referencias: Correa, M. N., 1950.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Habenaria pauciflora (Lindl.) Rchb. f. var. pluriflora Cogn.]
Referencias: Correa, M. N., 1950.
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Habenaria paucifolia Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1950, 1969b.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU); CHL(III, IV, VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1286* (SI)]; CHL[*Wolffhügel, K. 49* (BA)].

Habenaria paucifolia Lindl. var. *stolonifera* M.N. Correa = **Habenaria repens** Nutt. var. **repens**
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Habenaria paulensis Porsch = **Habenaria parviflora** Lindl.

Habenaria pentadactyla Lindl. = **Habenaria repens** Nutt. var. **repens**

Habenaria petalodes Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Hoehne, F. C., 1940; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 728* (SI)].

Habenaria physophora Kraenzl. = **Habenaria edwallii** Cogn.

Habenaria piraquarensis Hoehne
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Hoehne, F. C., 1952a; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2246* (MBM, SP)].

Habenaria platanthera Rchb. f.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba palustre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(CLA, MAL).
Ejemplares de referencia: URY[*Gibert, J. E. 888* (HB, K)].

Habenaria platydactyla Kraenzl. = **Habenaria schwackei** Barb. Rodr.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002.

Habenaria pleiophylla Hoehne & Schltr.
Sin.: *Habenaria bradeana* Kraenzl., *Habenaria paranaguaensis* Hoehne
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Rocha, F. S. & Waechter, J. L., 2006.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 976* (MBM, SI)].

Habenaria poissoniana Cogn. = **Habenaria regnellii** Cogn.

Habenaria polygonoides Schltr. = **Habenaria repens** Nutt. var. **repens**
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Habenaria pontagrossensis Kraenzl. = **Habenaria bractescens** Lindl.
Referencias: Batista, J. A. N., Bianchetti, L. B. & Miranda, Z. J. G., 2006; Hoehne, F. C., 1940.

[Habenaria pratensis (Lindl.) Rchb. f.]
Sin.: *Bonatea pratensis* Lindl.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Habenaria regnellii Cogn.
Sin.: *Habenaria flaccida* Kraenzl., *Habenaria poissoniana* Cogn.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Correa, M. N., 1995; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 6655* (SI)]; BRA[*Pabst, G. F. J. 1318-a* (RB)].

Habenaria reichenbachiana Barb. Rodr. = **Habenaria parviflora** Lindl.

Habenaria repens Nutt. var. **gracilis** Lüderw. & Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Brade, A. C. 6848* (HB)].

Habenaria repens Nutt. var. **repens**
Sin.: *Habenaria aranifera* Lindl., *Habenaria paucifolia* Lindl. var. *stolonifera* M.N. Correa, *Habenaria pentadactyla* Lindl., *Habenaria polygonoides* Schltr., *Habenaria taubertiana* Cogn.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Hashimoto, T., 1993; Insaurralde, I. S., 1999; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952a, 1959b; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CEN, GUA); URY(CAS, MAL, MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 5284* (BAB, SI)]; BRA[*Dutra, J. 1075* (ICN, SI)]; PRY[*Caballero Mármori, G. 1016* (CTES)]; URY[*Osten, C. 3578* (MVM)].

Habenaria retusa Barb. Rodr. = **Habenaria balansae** Cogn.

Habenaria rodeiensis Barb. Rodr.
Sin.: *Habenaria corcovadensis* Kraenzl., *Habenaria tamanduensis* Schltr.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Hoehne, F. C., 1940; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1930.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13451* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 8015* (G)].

Habenaria rolfeana Schltr.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Hoehne, F. C., 1940; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1930.
Hierba rupícola. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 884* (MBM)].

Habenaria rudolfi-schlechteri Hoehne = **Habenaria mitomorpha** Kraenzl.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002.

Habenaria rupicola Barb. Rodr.
Sin.: *Habenaria minarum* Hoehne & Schltr.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Correa, M. N., 1950; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1959b; Sprunger, S., 1996.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 300–1000 m.
Países: ARG(COR, COS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sayago, M. 1040* (CORD)]; BRA[*Dutra, J. 1016* (ICN)].

[Habenaria santensis Barb. Rodr.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Habenaria sartor Lindl. = **Habenaria macronectar** (Vell.) Hoehne
Referencias: Batista, J. A. N., Bianchetti, L. B. & Miranda, Z. J. G., 2006; Pabst, G. F. J., 1959a.

Habenaria sartor Lindl. f. *minor* Cogn. = **Habenaria bractescens** Lindl.
Referencias: Batista, J. A. N., Bianchetti, L. B. & Miranda, Z. J. G., 2006.

Habenaria sartoroides Schltr. = **Habenaria macronectar** (Vell.) Hoehne
Referencias: Batista, J. A. N., Bianchetti, L. B. & Miranda, Z. J. G., 2006.

Habenaria sceptrum Schltr.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1074* (SI, SP)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 2032* (*)].

Habenaria schnittmeyeri Schltr.
Referencias: Dutra, J., 1940[1938]; Hoehne, F. C., 1940; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1959a, b; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 995* (ICN)].

Habenaria schwackei Barb. Rodr.
Sin.: *Habenaria amazonica* Schltr., *Habenaria platydactyla* Kraenzl.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2964* (MBM, SI)]; PRY[*Hassler, E. 5262* (G)].

Habenaria secunda Lindl.
Sin.: *Habenaria secunda* Lindl. f. *brevioribus* Cogn., *Habenaria secunda* Lindl. var. *estrellensis* Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1950; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1959a.
Hierba rupícola. Perenne. Nativa. 0–1600 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); PRY(AMA, CAU, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 434* (S)]; PRY[*Hassler, E. 3857* (G)].

Habenaria secunda Lindl. f. *brevioribus* Cogn. = **Habenaria secunda** Lindl.

Habenaria secunda Lindl. var. *estrellensis* Rchb. f. = **Habenaria secunda** Lindl.

Habenaria secundiflora Barb. Rodr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 300–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ribas, O. S. 18044* (MBM)].

[Habenaria setifera Lindl.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Habenaria spegazziniana Kraenzl. = **Habenaria gourlieana** Gillies ex Lindl.
Referencias: Batista, J. A. N., Bianchetti, L. B. & Miranda, Z. J. G., 2006; Correa, M. N., 1996.

Habenaria subfiliformis Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1903; Hoehne, F. C., 1940; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9681a* (B, G)].

Habenaria subviridis Hoehne & Schltr. = **Habenaria trimeropetala** Schltr.

Habenaria sylvicutrix Lindl. = **Habenaria dusenii** Schltr.

Habenaria tamanduensis Schltr. = **Habenaria rodeiensis** Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1954.

Habenaria taubertiana Cogn. = **Habenaria repens** Nutt. var. **repens**

Habenaria trapezoidea Hoehne & Schltr. = **Habenaria heleogena** Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Habenaria trichoceras Barb. Rodr. = **Habenaria nuda** Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940; Sprunger, S., 1996.

Habenaria trifida Kunth
Sin.: *Habenaria flexa* Rchb. f. ex Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Hashimoto, T., 1993; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, SJU, TUC); PRY(APY, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Albov, N. M. s.n.* (BA)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5303a* (G)].

[Habenaria trimeropetala Schltr.]
Sin.: *Habenaria subviridis* Hoehne & Schltr.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Habenaria ulaei Cogn.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 1902* (G)].

Habenaria umbraticola Barb. Rodr.
Referencias: Batista, J. A. N. & Bianchetti, L. B., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20703* (MBM)].

Habenaria uruguayensis Garay
Sin.: *Habenaria montevidensis* Lindl., hom. illeg.
Referencias: Garay, L. A., 1976.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SDE, TUC); URY(LAV, MON, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 6902* (LIL)]; URY[*Tweedie, J. s.n.* (K)].

Habenaria vaupelli Rchb. f. & Warm. = **Habenaria johannensis** Barb. Rodr.
Referencias: Batista, J. A. N., Bianchetti, L. B. & Miranda, Z. J. G., 2006.

Habenaria warmingii Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 2000–2200 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3913* (LIL, SI)].

Hadrolaelia coccinea (Lindl.) Chiron & V.P. Castro = **Sophronitis coccinea** (Lindl.) Rchb. f.

Hadrolaelia mantiqueirae (Fowlie) Chiron & V.P. Castro = **Sophronitis mantiqueirae** (Fowlie) Fowlie

Hadrolaelia purpurata (Lindl. & Paxton) Chiron & V.P. Castro = **Sophronitis purpurata** (Lindl.) C. Berg & M.W. Chase

Hapalorchis Schltr.

Número de especies: 5, 1 endémica

Hapalorchis candidus (Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Cyclopogon candidus* (Kraenzl.) Pabst, *Sauroglossum candidum* Kraenzl.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1974a; Rocha, F. S. & Waechter, J. L., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24724* (HB, MBM)].

Hapalorchis lineatus (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Cyclopogon lineatus* (Lindl.) Pabst, *Spiranthes lineata* Lindl.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Hauman, L. L., 1921a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 286* (CORD)]; BRA[*Klein, R. M. 815* (HB, HBR)].

Hapalorchis micrantha (Barb. Rodr.) Hoehne
Sin.: *Cyclopogon micrantthus* (Barb. Rodr.) Schltr., *Spiranthes micrantha* Barb. Rodr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J., 1974a; Schlechter, F. R. R., 1919–1920.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14663* (HB, MBM)].

Hapalorchis pauciflorus Porto & Brade
Sin.: *Cyclopogon pauciflorus* (Porto & Brade) Pabst
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Pabst, G. F. J., 1974a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16892* (MBM)].

Hapalorchis stellaris Szlach.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 100–300 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Orth, C. 118* (B, PACA)].

Heterotaxis brasiliensis (Brieger & Illg) F. Barros = **Maxillaria brasiliensis** Brieger & Illg
Referencias: Barros, F., 2002a.

Heterotaxis crassifolia Lindl. = **Maxillaria crassifolia** (Lindl.) Rchb. f.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953.

Hoehneella Ruschi

Número de especies: 1 endémica

Hoehneella gehrtiana (Hoehne) Ruschi
Sin.: *Chaubardia gehrtiana* (Hoehne) Garay, *Warscewiczella gehrtiana* Hoehne
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gerth, A. s.n.* (SP)].

Hormidium tripterum (Brongn.) Cogn. = **Prosthechea pygmaea** (Hook.) W.E. Higgins
Referencias: Higgins, W. E., 1997.

Houlletia Brongn.

Número de especies: 1

Houlletia brocklehurstiana Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1942b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba terrestre o rupícola. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 8027* (NY)].

[Houlletia luteoflora Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d; Rojas Acosta, N., 1897.
Notas: Nombre dudoso.

Humboldtia arcuata (Lindl.) Kuntze = **Pabstiella arcuata** (Lindl.) Luer

Humboldtia boliviana (Rchb. f.) Kuntze = **Acianthera boliviana** (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase

Humboldtia capillaris (Lindl.) Kuntze = **Arthrosia floribunda** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Humboldtia glumacea (Lindl.) Kuntze = **Acianthera glumacea** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Humboldtia grobyi (Bateman ex Lindl.) Kuntze = **Specklinia grobyi** (Bateman ex Lindl.) F. Barros
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Humboldtia hypnicola (Lindl.) Kuntze = **Pabstiella hypnicola** (Lindl.) Luer

Humboldtia klotzschiana (Rchb. f.) Kuntze = **Acianthera klotzcheana** (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Humboldtia marginalis (Rchb. f.) Kuntze = **Specklinia grobyi** (Bateman ex Lindl.) F. Barros

Humboldtia obovata (Lindl.) Kuntze = **Anathallis obovata** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Vásquez, R. & Ibisch, P. L., 2000.

Humboldtia parvifolia (Lindl.) Kuntze = **Pabstiella parvifolia** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2002; Sprunger, S., 1996.

Humboldtia picta (Lindl.) Kuntze = **Specklinia picta** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Humboldtia pruinosa (Lindl.) Kuntze = **Pleurothallis pruinosa** Lindl.

Humboldtia saurocephala (Lodd.) Kuntze = **Acianthera saurocephala** (Lodd.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Huntleya Bateman ex Lindl.

Número de especies: 1

Huntleya meleagris Lindl.
Referencias: Dematteis, M. & Daviña, J. R., 1999; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 46556* (CTES)].

Ionopsis Kunth

Número de especies: 1

Ionopsis burchellii Rchb. f. = **Ionopsis utricularioides** (Sw.) Lindl.

Ionopsis gardneri Lindl. = **Ionopsis utricularioides** (Sw.) Lindl.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1903; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Ionopsis paniculata Lindl. = **Ionopsis utricularioides** (Sw.) Lindl.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1903; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl.
Sin.: *Epidendrum utricularioides* Sw., *Ionopsis burchellii* Rchb. f., *Ionopsis gardneri* Lindl., *Ionopsis paniculata* Lindl.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1903; Garay, L. A., 1978; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 54445* (MBM)]; PRY[*Schinini, A. 20315* (CTES)].

Isabelia Barb. Rodr.

Número de especies: 3, 1 endémica

Isabelia pulchella (Kraenzl.) Senghas & Teusch.
Sin.: *Neolauchea pulchella* Kraenzl.
Referencias: Fraga Nunes, V., 1997; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1953; Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 26834* (MBM, NY)].

Isabelia violacea (Lindl.) C. Berg & M.W. Chase
Sin.: *Sophronitella violacea* (Lindl.) Schltr., *Sophronitis violacea* Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1925; Tibbs, M., 1990; van den Berg, C. & Chase, M. W., 2001.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22083* (MBM)].

Isabelia virginalis Barb. Rodr.
Referencias: Correa, M. N., 1975b; Johnson, A. E., 2001; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1406* (SI)]; BRA[*Krieger, L. 8778* (RB)].

Isanitella Leinig

Número de especies: 1 endémica

Isanitella pabstii Leinig
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Leinig, M. s.n.* (HB)].

Isochilus R. Br.

Número de especies: 1

Isochilus brasiliensis Schltr. = **Isochilus linearis** (Jacq.) R. Br.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Isochilus linearis (Jacq.) R. Br.
Sin.: *Epidendrum lineare* Jacq., *Isochilus brasiliensis* Schltr.
Referencias: Correll, D. S., 1941; Fraga Nunes, V., 1997; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Williams, L. O., 1939.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, GUA);
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 292* (SI)]; BRA[*Dusén, N. P. 10076* (S)]; PRY[*Jörgensen, P. 4643* (SI)].

Itaculumia habenarioides Hoehne = **Habenaria habenarioides** (Hoehne) R.E. Nogueira & R.J.V. Alves
Referencias: Nogueira, R. E. & Alves, R. J. V., 2003.

Jouyella fimbriata (Poepp.) Szlach. & Marg. = **Bipinnula fimbriata** (Poepp.) I.M. Johnst.

Jouyella plumosa (Lindl.) Szlach. & Marg. = **Bipinnula plumosa** Lindl.

Jouyella taltalensis (I.M. Johnst.) Szlach. & Marg. = **Bipinnula taltalensis** I.M. Johnst.

Jacquiniella Schltr.

Número de especies: 1

Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr.
Sin.: *Epidendrum globosum* Jacq.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 9197* (MBM)].

Koellensteinia tricolor (Lindl.) Rchb. f. = **Warrea warreana** (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf.

Kusibabella bractescens (Lindl.) Szlach. = **Habenaria bractescens** Lindl.
Referencias: Batista, J. A. N., Bianchetti, L. B. & Miranda, Z. J. G., 2006.

Kusibabella burkartiana (Hoehne) Szlach. = **Habenaria gourlieana** Gillies ex Lindl.
Referencias: Batista, J. A. N., Bianchetti, L. B. & Miranda, Z. J. G., 2006.

Kusibabella gourlieana (Gillies ex Lindl.) Szlach. = **Habenaria gourlieana** Gillies ex Lindl.
Referencias: Batista, J. A. N., Bianchetti, L. B. & Miranda, Z. J. G., 2006.

Kusibabella macronectar (Vell.) Szlach. = **Habenaria macronectar** (Vell.) Hoehne
Referencias: Batista, J. A. N., Bianchetti, L. B. & Miranda, Z. J. G., 2006.

Kusibabella sartor (Lindl.) Szlach. = **Habenaria macronectar** (Vell.) Hoehne
Referencias: Batista, J. A. N., Bianchetti, L. B. & Miranda, Z. J. G., 2006.

Laelia lundii Rchb. f. & Warm. ex Rchb. f. = **Microlaelia lundii** (Rchb. f. & Warm. ex Rchb. f.) Chiron & V.P. Castro

Laelia purpurata Lindl. = **Sophronitis purpurata** (Lindl.) C. Berg & M.W. Chase
Referencias: van den Berg, C. & Chase, M. W., 2000.

Laelia regnelli Barb. Rodr. = **Microlaelia lundii** (Rchb. f. & Warm. ex Rchb. f.) Chiron & V.P. Castro

Laelia reichenbachiana H. Wendl. & Kraenzl. = **Microlaelia lundii** (Rchb. f. & Warm. ex Rchb. f.) Chiron & V.P. Castro

Lanium Lindl. ex Hook.

Número de especies: 1

Lanium avicula (Lindl.) Benth. = **Epidendrum avicula** Lindl.

Lanium berkeleyi Rolfe
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3518a* (SP)].

Lankesterella Ames

Número de especies: 3

Lankesterella caespitosa (Lindl.) Hoehne
Sin.: *Cladobium epiphytum* (Barb. Rodr.) Schltr., *Lankesterella epiphyta* (Barb. Rodr.) Brade ex Hoehne, comb. superfl., *Lankesterella epiphyta* (Barb. Rodr.) Mansf., *Spiranthes epiphyta* Barb. Rodr.
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952; Pabst, G. F. J., 1966; Waechter, J. L., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 33630* (MBM)].

Lankesterella ceracifolia (Barb. Rodr.) Ames
Sin.: *Cladobium ceracifolium* (Barb. Rodr.) Schltr., *Lankesterella majus* (Hoehne & Schltr.) Hoehne, *Lankesterella mentiens* Hoehne, *Lankesterella oligantha* (Hoehne & Schltr.) Hoehne, *Stenorrhynchos ceracifolium* Barb. Rodr.
Referencias: Correa, M. N., 1975b; Fraga Nunes, V., 1997; Garay, L. A., 1982[1980]; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1959a; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 9093* (BAB)]; BRA[*Dutra, J. 936* (ICN, SI)].

Lankesterella epiphyta (Barb. Rodr.) Brade ex Hoehne, comb. superfl. = **Lankesterella caespitosa** (Lindl.) Hoehne

Lankesterella epiphyta (Barb. Rodr.) Mansf. = **Lankesterella caespitosa** (Lindl.) Hoehne

Lankesterella majus (Hoehne & Schltr.) Hoehne = **Lankesterella ceracifolia** (Barb. Rodr.) Ames
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Lankesterella mentiens Hoehne = **Lankesterella ceracifolia** (Barb. Rodr.) Ames
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Lankesterella oligantha (Hoehne & Schltr.) Hoehne = **Lankesterella ceracifolia** (Barb. Rodr.) Ames
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Lankesterella salehi Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15335* (MBM)].

Leiochilus spegazzinianus Kraenzl. = **Oncidium riograndense** Cogn.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Leochilus spegazzinianus Kraenzl. = **Oncidium spegazzianum** (Kraenzl.) Schltr.

Lepanthes armeniaca Barb. Rodr. = **Pabstiella trifida** (Lindl.) Luer

Lepanthes bicolor Barb. Rodr. = **Pabstiella quadridentata** (Barb. Rodr.) Luer

Lepanthes blumenavii Barb. Rodr. = **Pabstiella alligatorifera** (Rchb. f.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Lepanthes carinifera Barb. Rodr. = **Pabstiella carinifera** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2007.

Lepanthes crebifolia Barb. Rodr. = **Anathallis crebrifolia** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2008.

Lepanthes crinita (Barb. Rodr.) Barb. Rodr. = **Acianthera crinita** (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase

Lepanthes cryptophyta (Lindl.) Kuntze = **Pabstiella parvifolia** (Lindl.) Luer
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Lepanthes ferdinandiana Barb. Rodr. = **Anathallis ferdinandiana** (Barb. Rodr.) F. Barros
Referencias: Barros, F., 2003.

Lepanthes laciniata (Barb. Rodr.) Barb. Rodr. = **Panmorphia laciniata** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Lepanthes marmorata Barb. Rodr. = **Specklinia grobyi** (Bateman ex Lindl.) F. Barros
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Lepanthes microphyta Barb. Rodr. = **Pleurothallis microphyta** (Barb. Rodr.) Cogn. var. **microphyta**
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Lepanthes modesta Barb. Rodr. = **Panmorphia brevipes** (H. Focke) Luer

Lepanthes montana Barb. Rodr. = **Trichosalpinx montana** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 1997.

Lepanthes pellifeloides Barb. Rodr. = **Pabstiella pellifeloides** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Lepanthes pluriflora Barb. Rodr. = **Specklinia grobyi** (Bateman ex Lindl.) F. Barros
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Lepanthes punctatifolia Barb. Rodr. = **Pabstiella punctatifolia** (Barb. Rodr.) Luer

Lepanthes quadridentata Barb. Rodr. = **Pabstiella quadridentata** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2007.

Lepanthes ramphastorhyncha Barb. Rodr. = **Pabstiella uniflora** (Lindl.) Luer

Lepanthes renipetala Barb. Rodr. = **Acianthera renipetala** (Barb. Rodr.) Luer

Lepanthes tenera Barb. Rodr. = **Pabstiella tenera** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Lepanthes tricolor Barb. Rodr. = **Pabstiella tricolor** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Lepanthes trilineata (Barb. Rodr.) Barb. Rodr. = **Specklinia grobyi** (Bateman ex Lindl.) F. Barros
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Lepanthes umbrosa Barb. Rodr. = **Pleurothallis umbrosa** (Barb. Rodr.) Cogn.

Lepanthopsis (Cogn.) Ames
Número de especies: 1

Lepanthopsis floripecten (Rchb. f.) Ames
Sin.: *Pleurothallis floripecten* Rchb. f.
Referencias: Luer, C. A., 1991; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Waechter, J. L., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 9198* (HB)].

Leptotes Lindl.
Número de especies: 3

Leptotes bicolor Lindl.
Sin.: *Leptotes bicolor* Lindl. var. *glaucophylla* Hook., *Leptotes glaucophylla* Hoffmanns., *Leptotes serrulata* Lindl., *Tetramicra bicolor* (Lindl.) Rolfe, *Tetramicra serrulata* (Lindl.) G. Nicholson
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(ITA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1024* (ICN)].

Leptotes bicolor Lindl. var. *glaucophylla* Hook. = **Leptotes bicolor** Lindl.
Referencias: Campacci, M. A., 2004.

Leptotes blanche-amesii Loefgr. = **Loefgrenianthus blanche-amesii** (Loefgr.) Hoehne
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Leptotes glaucophylla Hoffmanns. = **Leptotes bicolor** Lindl.
Referencias: Campacci, M. A., 2004.

Leptotes minuta (Rolfe) Rolfe = **Leptotes tenuis** Rchb. f.
Referencias: Campacci, M. A., 2004.

Leptotes paranaensis Barb. Rodr. = **Leptotes unicolor** Barb. Rodr.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Leptotes serrulata Lindl. = **Leptotes bicolor** Lindl.
Referencias: Campacci, M. A., 2004.

Leptotes tenuis Rchb. f.
Sin.: *Leptotes minuta* (Rolfe) Rolfe, *Tetramicra minuta* Rolfe
Referencias: Campacci, M. A., 2004; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Schwacke, C. A. W. 4957* (R, W)].

Leptotes unicolor Barb. Rodr.
Sin.: *Leptotes paranaensis* Barb. Rodr.
Referencias: Campacci, M. A., 2004; Cogniaux, C. A., 1903; Garay, L. A., 1954; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1926.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(APA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2072* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2315* (SP)]; PRY[*Hassler, E. 4122* (G)].

Ligeophila Garay
Número de especies: 2

Ligeophila austrobrasiliensis (Porsch) Garay = **Microchilus austrobrasiliensis** (Porsch) Ormd.

Ligeophila juruensis (Hoehne) Garay
Sin.: *Erythrodes juruensis* (Hoehne) Garay, *Physurus juruensis* Hoehne
Referencias: Correa, M. N., 1995; Garay, L. A., 1977; Johnson, A. E., 2001.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 349* (BAB, MU, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 70549* (MBM)].

Ligeophila rosea (Lindl.) Garay
Sin.: *Erythrodes rosea* (Lindl.) Ames, *Physurus roseus* Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Garay, L. A., 1977; Johnson, A. E., 2001.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 516* (SI)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o material de referencia (Johnson, 2001).

Limodorum altum L. = **Eulophia alta** (L.) Fawc. & Rendle
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Limodorum lanceolatum Aubl. = **Sacoila lanceolata** (Aubl.) Garay
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Limodorum pendulum Aubl. = **Dichaea pendula** (Aubl.) Cogn.

Limodorum utriculatum Sw. = **Govenia utriculata** (Sw.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Limodorum venosum Lam. = **Gavilea venosa** (Lam.) Garay & Ormd.

Liparis Rich., nom. cons.
Número de especies: 2

Liparis elata Lindl. = **Liparis nervosa** (Thunb.) Lindl.
Referencias: Dodson, C. H. & Dodson, P. M., 1980.

Liparis elata Lindl. var. *longifolia* Cogn. = **Liparis nervosa** (Thunb.) Lindl.
Referencias: Dodson, C. H. & Dodson, P. M., 1980; Kraenzlin, F. W. L., 1911.

[Liparis jamaicensis Lindl.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.
Sin.: *Epidendrum nervosum* Thunb., *Liparis elata* Lindl., *Liparis elata* Lindl. var. *longifolia* Cogn., *Ophrys nervosa* Thunb.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1903; Correa, M. N., 1995; Dodson, C. H. & Dodson, P. M., 1980; Johnson, A. E., 2001; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 336* (MU, SI)]; BRA[*Silva, J. M. 1620* (MBM, SPF)]; PRY[*Marín, G. 292* (BM, CTES, PY)].

Liparis vexillifera (La Llave ex Lex.) Cogn.
Sin.: *Cymbidium vexilliferum* La Llave & Lex., *Liparis vexillifera* (La Llave ex Lex.) Cogn. var. *galeottiana* (A. Rich.) Ames & Correll, *Liparis vexillifera* (La Llave ex Lex.) Cogn. var. *latifolia* Cogn., *Malaxis elliptica* A. Rich. & Galeotti, *Malaxis galeottiana* A. Rich.
Referencias: Cocucci, A. E., 1954; Hashimoto, T., 1993; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Williams, L. O., 1939.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 2000–2700 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 341b* (CORD)]; BRA[*Hatschbach, G. 29191* (MBM)].

Liparis vexillifera (La Llave ex Lex.) Cogn. var. *galeottiana* (A. Rich.) Ames & Correll = **Liparis vexillifera** (La Llave ex Lex.) Cogn.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Liparis vexillifera (La Llave ex Lex.) Cogn. var. *latifolia* Cogn. = **Liparis vexillifera** (La Llave ex Lex.) Cogn.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Lockhartia Hook.
Número de especies: 2

Lockhartia ludibunda Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20898* (MBM)].

Lockhartia lunifera (Lindl.) Rchb. f.
Sin.: *Fernandezia lunifera* Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 10115* (MBM)].

Loefgrenianthus Hoehne
Número de especies: 1

Loefgrenianthus blanche-amesii (Loefgr.) Hoehne
Sin.: *Leptotes blanche-amesii* Loefgr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15549* (MBM)].

Lophiaris pumila (Lindl.) Braem = **Trichocentrum pumilum** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Lycaste jugosa (Lindl.) Nichols = **Pabstia jugosa** (Lindl.) Garay
Referencias: Castro Neto, V. P. & Campacci, M. A., 2004.

Lycaste puydtii (Lindl. & André) Nichols = **Pabstia viridis** (Lindl.) Garay
Referencias: Castro Neto, V. P., 1993.

Lycaste viridis (Lindl.) Benth. = **Pabstia viridis** (Lindl.) Garay
Referencias: Castro Neto, V. P., 1993.

Lyroglossa Schltr.
Número de especies: 2

Lyroglossa euglossa (Kraenzl.) Hoehne & Schltr.
Sin.: *Spiranthes euglossa* Kraenzl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945; Schlechter, F. R. R., 1922.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3037* (MBM)].

Lyroglossa grisebachii (Cogn.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes grisebachii* Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dombrowski, L. T. 10125* (MBM)].

Macradenia R. Br.
Número de especies: 1

Macradenia multiflora (Kraenzl.) Cogn. = **Macradenia paraensis** Barb. Rodr.

Macradenia paraensis Barb. Rodr.
Sin.: *Macradenia multiflora* (Kraenzl.) Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1903.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8521* (G)].

Macrocentrum mendocinum Phil. = **Habenaria gourlieana** Gillies ex Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Malaxis Sol. ex Sw.

Número de especies: 10, 2 endémicas

Malaxis argentinensis L.O. Williams = **Malaxis parthoni** C. Morren
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Malaxis cogniauxiana (Schltr.) Pabst
Sin.: *Microstylis cogniauxiana* Schltr., *Microstylis gracilis* Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1973a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 23396* (MBM)].

Malaxis elliptica A. Rich. & Galeotti = **Liparis vexillifera** (La Llave ex Lex.) Cogn.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Malaxis excavata (Lindl.) Kuntze
Sin.: *Cheiropterocephalus sertulifera* Barb. Rodr., *Malaxis hastilabia* (Rchb. f.) Kuntze, *Malaxis sertulifera* (Barb. Rodr.) Pabst, *Microstylis excavata* Lindl., *Microstylis hastilabia* Rchb. f., *Microstylis muelleri* Schltr., *Microstylis paranaensis* Schltr., *Microstylis sertulifera* (Barb. Rodr.) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1959a; Sprunger, S., 1996; Williams, L. O., 1938, 1939.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 600–1900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 4567* (BAB)]; BRA[*Dutra, J. 1025* (ICN)].

Malaxis galeottiana A. Rich. = **Liparis vexillifera** (La Llave ex Lex.) Cogn.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Malaxis hastilabia (Rchb. f.) Kuntze = **Malaxis excavata** (Lindl.) Kuntze
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Malaxis hieronymi (Cogn.) L.O. Williams
Sin.: *Malaxis rupestris* auct. non (Poepp. & Endl.) Kuntze, *Microstylis hieronymi* Cogn.
Referencias: Brako, L., Dodson, C. H. & Pedroni-González, A., 1993; Hashimoto, T., 1993; Williams, L. O., 1939.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 1500–3300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 567* (LIL)]; BRA[*Hatschbach, G. 817* (SP)].

Malaxis histionantha (Link, Klotzsch & Otto) Garay & Dunst.
Sin.: *Malaxis ovatifolia* Schltr., *Microstylis histionantha* Link, Klotzsch & Otto
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Orth, C. s.n.* (SP)].

Malaxis jaraguae (Hoehne & Schltr.) Pabst
Sin.: *Microstylis jaraguae* Hoehne & Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gehrt, A. 5517* (SP)].

Malaxis ovatifolia Schltr. = **Malaxis histionantha** (Link, Klotzsch & Otto) Garay & Dunst.

Malaxis pabstii (Schltr.) Pabst
Sin.: *Microstylis pabstii* Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1973b.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 500–1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Fertsch, D. 81* (HB)].

Malaxis padillana L.O. Williams
Referencias: Cocucci, A. E., 1954, 1984; Williams, L. O., 1939.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 1200–1800 m.
Países: ARG(COR, JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Solís Neffa, V. 890* (SI)].

Malaxis parthoni C. Morren
Sin.: *Malaxis argentinensis* L.O. Williams, *Microstylis ovatilabia* Schltr., *Microstylis parthoni* (C. Morren) Klotzsch
Referencias: Correa, M. N., 1995; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 1004* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 19131* (MBM)].

Malaxis pubescens (Lindl.) Kuntze
Sin.: *Microstylis pubescens* Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1962.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Yarenkow, J. A. 2346* (MBM)].

Malaxis rupestris auct. non (Poepp. & Endl.) Kuntze = **Malaxis hieronymi** (Cogn.) L.O. Williams
Referencias: Williams, L. O., 1941.

Malaxis sertulifera (Barb. Rodr.) Pabst = **Malaxis excavata** (Lindl.) Kuntze
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Malaxis warmingii (Rchb. f.) Kuntze
Sin.: *Microstylis warmingii* Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 808* (SP)].

Marsupiaria valenzuelana (A. Rich.) Garay = **Maxillaria valenzuelana** (A. Rich.) Nash
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Masdevallia Ruiz & Pav.

Número de especies: 1

Masdevallia aviceps Rchb. f. = **Dryadella aviceps** (Rchb. f.) Luer

Masdevallia edwalii Cogn. = **Dryadella edwallii** (Cogn.) Luer

Masdevallia infracta Lindl.
Sin.: *Masdevallia infracta* Lindl. var. *purpurea* (Rchb. f.) Cogn.
Referencias: Luer, C. A., 2000b; Vásquez, R. & Ibisch, P. L., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3233* (MBM)].

Masdevallia infracta Lindl. var. *purpurea* (Rchb. f.) Cogn. = **Masdevallia infracta** Lindl.

Masdevallia liliputana Cogn. = **Dryadella liliputiana** (Cogn.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 1986a.

Masdevallia obrieniana Rolfe = **Dryadella aviceps** (Rchb. f.) Luer

Masdevallia paranaënsis Schltr. = **Dryadella liliputiana** (Cogn.) Luer

Masdevallia simula Rchb. f. = **Dryadella simula** (Rchb. f.) Luer

Masdevallia zebrina Porsch = **Dryadella zebrina** (Porsch) Luer
Referencias: Luer, C. A., 1978a.

Maxillaria Ruiz & Pav.

Número de especies: 45, 2 endémicas

Maxillaria abelei Schltr. = **Maxillaria rufescens** Lindl.

Maxillaria acicularis Herb.
Sin.: *Maxillaria acicularis* Herb. ex Lindl. var. *brevifolia* Cogn., *Maxillaria heterophylla* Hoehne var. *acicularifolia* Hoehne, *Maxillaria heterophylla* Hoehne var. *intermedia* Hoehne, *Maxillaria heterophylla* Hoehne var. *longifolia* Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 69* (MBM, SP)].

Maxillaria acicularis Herb. ex Lindl. var. *brevifolia* Cogn. = **Maxillaria acicularis** Herb.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Maxillaria articulata Klotzsch = **Maxillaria rufescens** Lindl.

Maxillaria aureo-fulva Hook. = **Bifrenaria aureo-fulva** (Hook.) Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Maxillaria bradei Schltr. ex Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Brade, A. C. 8076* (HB, SP)].

Maxillaria brasiliensis Brieger & Illg
Sin.: *Heterotaxis brasiliensis* (Brieger & Illg) F. Barros
Referencias: Barros, F., 2002a; Hoehne, F. C., 1953; Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004.
Hierba saxícola. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gatti, A. L. S. 332* (SP)].

Maxillaria carinata Barb. Rodr. = **Maxillaria imbricata** Barb. Rodr.
Referencias: Dodson, C. H. & Dodson, P. M., 1980.

Maxillaria cepula Rchb. f. = **Maxillaria madida** Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Maxillaria cerifera Barb. Rodr.
Sin.: *Maxillaria divaricata* (Barb. Rodr.) Cogn., *Maxillaria nervosa* Rolfe, *Ornithidium ceriferum* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr., *Ornithidium divaricatum* Barb. Rodr., *Ornithidium flavoviridum* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2026* (SP)].

Maxillaria chlorantha Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2016* (SP)].

Maxillaria chloroleuca (Barb. Rodr.) Hoehne = **Maxillaria parviflora** (Poepp. & Endl.) Garay

Maxillaria chrysantha Barb. Rodr.
Sin.: *Maxillaria chrysantha* Barb. Rodr. var. *curtifolia* Regnell & Barb. Rodr., *Maxillaria chrysantha* Barb. Rodr. var. *pallidiflora* Hoehne, *Maxillaria chrysantha* Barb. Rodr. var. *typica* Hoehne
Referencias: Correa, M. N., 1995; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 5067* (BAB)]; BRA[*Regnell, A. F. 1-426* (SP)].

Maxillaria chrysantha Barb. Rodr. var. *curtifolia* Regnell & Barb. Rodr. = **Maxillaria chrysantha** Barb. Rodr.

Maxillaria chrysantha Barb. Rodr. var. *pallidiflora* Hoehne = **Maxillaria chrysantha** Barb. Rodr.

Maxillaria chrysantha Barb. Rodr. var. *typica* Hoehne = **Maxillaria chrysantha** Barb. Rodr.

Maxillaria cleistogama Brieger & Illg
Referencias: Waechter, J. L., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 8661* (MBM)].

Maxillaria cogniauxiana Hoehne = **Maxillaria spegazziniana** Kraenzl.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Maxillaria cogniauxiana Hoehne var. *intermedia* Hoehne = **Maxillaria spegazziniana** Kraenzl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953.

Maxillaria cogniauxiana Hoehne var. *longifolia* = **Maxillaria spegazziniana** Kraenzl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953.

Maxillaria colleyi Bateman ex Lindl. = **Xylobium colleyi** (Bateman ex Lindl.) Rolfe
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Maxillaria conferta (Griseb.) C. Schweinf. ex León = **Maxillaria parviflora** (Poepp. & Endl.) Garay

Maxillaria consanguinea Hoehne var. **pallida** Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16000* (MBM)].

Maxillaria coriacea Barb. Rodr. = **Maxillaria desvauxiana** Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Maxillaria crassifolia (Lindl.) Rchb. f.
Sin.: *Heterotaxis crassifolia* Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13180* (MBM)].

Maxillaria crassipes Kraenzl. = **Maxillaria marginata** Fenzl
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Maxillaria crocea Lindl. = **Maxillaria lindleyana** Schltr.

Maxillaria desvauxiana Rchb. f.
Sin.: *Maxillaria coriacea* Barb. Rodr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14170* (MBM)].

Maxillaria discolor (G. Lodd. ex Lindl.) Rchb. f.
Sin.: *Dicrypta discolor* G. Lodd. ex Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dziewa, A. 14* (MBM)].

Maxillaria divaricata (Barb. Rodr.) Cogn. = **Maxillaria cerifera** Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Maxillaria echinochila Kraenzl. = **Maxillaria madida** Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Maxillaria echinophyta Barb. Rodr.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 168* (MBM, SP)].

Maxillaria ferdinandiana Barb. Rodr.
Sin.: *Maxillaria ferdinandiana* Barb. Rodr. var. *virescens* Cogn., *Maxillaria plebeja* auct. non Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Leite, J. E. 4356* (SP)].

Maxillaria ferdinandiana Barb. Rodr. var. *virescens* Cogn. = **Maxillaria ferdinandiana** Barb. Rodr.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Maxillaria gracilis Lodd.
Sin.: *Maxillaria gracilis* Lodd. var. *angustifolia* Hoehne, *Maxillaria gracilis* Lodd. var. *intermedia* Hoehne, *Maxillaria gracilis* Lodd. var. *macrantha* Hoehne, *Maxillaria gracilis* Lodd. var. *minor* Hoehne, *Maxillaria gracilis* Lodd. var. *queirogana* (Barb. Rodr.) Hoehne, *Maxillaria pallidiflora* Rchb. f., *Maxillaria penduliflora* Fenzl ex Van Houtte, *Maxillaria queirogana* Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Brade, A. C. 20654* (RB)].

Maxillaria gracilis Lodd. var. *angustifolia* Hoehne = **Maxillaria gracilis** Lodd.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Maxillaria gracilis Lodd. var. *intermedia* Hoehne = **Maxillaria gracilis** Lodd.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Maxillaria gracilis Lodd. var. *macrantha* Hoehne = **Maxillaria gracilis** Lodd.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Maxillaria gracilis Lodd. var. *minor* Hoehne = **Maxillaria gracilis** Lodd.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Maxillaria gracilis Lodd. var. *queirogana* (Barb. Rodr.) Hoehne = **Maxillaria gracilis** Lodd.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Maxillaria guareimensis Rchb. f.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Leinig, M. 195* (HB)].

Maxillaria hatschbachii Schltr. = **Maxillaria madida** Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Maxillaria heterophylla Hoehne var. *acicularifolia* Hoehne = **Maxillaria acicularis** Herb.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953.

Maxillaria heterophylla Hoehne var. *intermedia* Hoehne = **Maxillaria acicularis** Herb.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953.

Maxillaria heterophylla Hoehne var. *longifolia* Hoehne = **Maxillaria acicularis** Herb.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953.

Maxillaria iguapensis Hoehne & Schltr. = **Maxillaria imbricata** Barb. Rodr.

Maxillaria imbricata Barb. Rodr.
Sin.: *Camaridium carinatum* (Barb. Rodr.) Hoehne, *Camaridium hoehnei* Pabst, *Camaridium hoehnei* Pabst var. *carinatum* (Barb. Rodr.) Pabst, *Camaridium hoehnei* Pabst var. *iguapense* (Hoehne & Schltr.) Pabst, *Camaridium imbricatum* (Barb. Rodr.) Hoehne, *Camaridium imbricatum* (Barb. Rodr.) Hoehne var. *carinatum* (Barb. Rodr.) Pabst, *Camaridium imbricatum* (Barb. Rodr.) Hoehne var. *iguapense* (Hoehne & Schltr.) Hoehne, *Maxillaria carinata* Barb. Rodr., *Maxillaria iguapensis* Hoehne & Schltr., *Maxillaria imbricata* Barb. Rodr. var. *carinata* (Barb. Rodr.) Pabst, *Maxillaria jenischiana* (Rchb. f.) C. Schweinf. var. *iguapensis* (Hoehne & Schltr.) Pabst
Referencias: Dodson, C. H. & Dodson, P. M., 1980; Klein, R. M., 1979; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 100–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 10113* (HB, MBM)].

Maxillaria imbricata Barb. Rodr. var. *carinata* (Barb. Rodr.) Pabst = **Maxillaria imbricata** Barb. Rodr.

Maxillaria iridifolia (Bateman ex Rchb. f.) Rchb. f. = **Maxillaria valenzuelana** (A. Rich.) Nash
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Maxillaria jenischiana (Rchb. f.) C. Schweinf. var. *iguapensis* (Hoehne & Schltr.) Pabst = **Maxillaria imbricata** Barb. Rodr.

Maxillaria johannis Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1959c.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. 2305* (RB)].

Maxillaria juergensii Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1026* (SI)].

Maxillaria jugosa Lindl. = **Pabstia jugosa** (Lindl.) Garay
Referencias: Castro Neto, V. P. & Campacci, M. A., 2004.

Maxillaria kautskyi Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J., 1972a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Leinig, M. 472a* (HB)].

Maxillaria kreysigii Kuntze ex Rchb. f. = **Maxillaria picta** Hook.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Maxillaria leucaimata Barb. Rodr. var. **leucaimata**
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gatti, A. L. S. 364* (SP)].

Maxillaria leucaimata Barb. Rodr. var. **longifolia** Barb. Rodr.
Referencias: Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1719* (MBM, SP)].

Maxillaria leucocheila Hoffm. = **Maxillaria picta** Hook.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Maxillaria lindleyana Schltr.
Sin.: *Maxillaria crocea* Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1040* (SP)].

Maxillaria madida Lindl.
Sin.: *Maxillaria cepula* Rchb. f., *Maxillaria echinochila* Kraenzl., *Maxillaria hatschbachii* Schltr., *Maxillaria madida* Lindl. var. *cepula* (Rchb. f.) Hoehne, *Maxillaria*

mosenii Kraenzl., *Maxillaria mosenii* Kraenzl. var. *echinochila* (Kraenzl.) Hoehne, *Maxillaria mosenii* Kraenzl. var. *hatschbachii* (Schltr.) Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1036* (SI)].

Maxillaria madida Lindl. var. *cepula* (Rchb. f.) Hoehne = **Maxillaria madida** Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953.

Maxillaria marginata Fenzl
Sin.: *Maxillaria crassipes* Kraenzl., *Maxillaria murilliana* Hoehne
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1959a; Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1019* (ICN, SI)].

Maxillaria minuta Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3254* (MBM)].

Maxillaria monoceros Rchb. f. = **Maxillaria picta** Hook.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Maxillaria mosenii Kraenzl. = **Maxillaria madida** Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Sprunger, S., 1996.

Maxillaria mosenii Kraenzl. var. *echinochila* (Kraenzl.) Hoehne = **Maxillaria madida** Lindl.

Maxillaria mosenii Kraenzl. var. *hatschbachii* (Schltr.) Hoehne = **Maxillaria madida** Lindl.

Maxillaria murilliana Hoehne = **Maxillaria marginata** Fenzl

Maxillaria nervosa Rolfe = **Maxillaria cerifera** Barb. Rodr.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Maxillaria neuwiedii Rchb. f.
Sin.: *Maxillaria neuwiedii* Rchb. f. var. *longifolia* Cogn.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24797* (MBM)].

Maxillaria neuwiedii Rchb. f. var. *longifolia* Cogn. = **Maxillaria neuwiedii** Rchb. f.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953.

Maxillaria notylioglossa Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13178* (MBM)].

Maxillaria ochroleuca Lodd. ex Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Schlechter, F. R. R., 1922.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1070a* (MBM)].

Maxillaria pachyphylla Schltr. ex Hoehne
Sin.: *Maxillaria pachyphylla* Schltr. ex Hoehne var. *bruneo-fusca* Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3241* (HB, MBM)].

Maxillaria pachyphylla Schltr. ex Hoehne var. *bruneo-fusca* Hoehne = **Maxillaria pachyphylla** Schltr. ex Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1953.

Maxillaria pallidiflora Rchb. f. = **Maxillaria gracilis** Lodd.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Maxillaria parahybunensis Barb. Rodr.
Referencias: Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. s.n.* (MBM)].

Maxillaria paranaensis Barb. Rodr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lange, R. T. 1611* (MBM, SP)].

Maxillaria parviflora (Poepp. & Endl.) Garay
Sin.: *Camaridium purpureum* Spreng., *Maxillaria chloroleuca* (Barb. Rodr.) Hoehne, *Maxillaria conferta* (Griseb.) C. Schweinf. ex León, *Maxillaria purpurea* (Spreng.) Ames & Correll, *Ornithidium chloroleucum* Barb. Rodr., *Ornithidium confertum* Griseb., *Ornithidium parviflorum* (Poepp. & Endl.) Rchb. f., *Pseudomaxillaria chloroleuca* (Rchb. f.) Hoehne, *Scaphyglottis parviflora* Poepp. & Endl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2214* (MBM, SP)].

Maxillaria paulistana Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1070* (MBM)].

Maxillaria penduliflora Fenzl ex Van Houtte = **Maxillaria gracilis** Lodd.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Maxillaria phoenicanthera Barb. Rodr.
Sin.: *Maxillaria punctata* Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Brade, A. C. 8163* (HB)].

Maxillaria picta Hook.
Sin.: *Epidendrum uniflorum* Vell., *Maxillaria kreysigii* Kuntze ex Rchb. f., *Maxillaria leucocheila* Hoffm., *Maxillaria monoceros* Rchb. f., *Maxillaria picta* Hook. var. *brunnea* Rchb. f., *Maxillaria picta* Hook. var. *rupestris* (Barb. Rodr.) Cogn., *Maxillaria rupestris* Barb. Rodr., *Maxillaria rupestris* Barb. Rodr. var. *brevis* Hoehne & Schltr., *Maxillaria rupestris* Barb. Rodr. var. *minor* Hoehne
Referencias: Correa, M. N., 1995; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 545* (MU, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2942* (SI)].

Maxillaria picta Hook. var. *brunnea* Rchb. f. = **Maxillaria picta** Hook.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Maxillaria picta Hook. var. *rupestris* (Barb. Rodr.) Cogn. = **Maxillaria picta** Hook.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Maxillaria placanthera Hook. = **Pabstia viridis** (Lindl.) Garay
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Maxillaria plebeja Rchb. f.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1959a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 845* (ICN)].

Maxillaria plebeja auct. non Rchb. f. = **Maxillaria ferdinandiana** Barb. Rodr.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Maxillaria porphyrostele Rchb. f.
Sin.: *Maxillaria porphyrostele* Rchb. f. var. *chrysanthoides* Hoehne, *Maxillaria porphyrostele* Rchb. f. var. *minutipunctulata* Hoehne, *Maxillaria porphyrostele* Rchb. f. var. *submarginata* Hoehne
Referencias: Fraga Nunes, V., 1997; Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 948* (ICN, SI)].

Maxillaria porphyrostele Rchb. f. var. *chrysanthoides* Hoehne = **Maxillaria porphyrostele** Rchb. f.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953.

Maxillaria porphyrostele Rchb. f. var. *minutipunctulata* Hoehne = **Maxillaria porphyrostele** Rchb. f.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953.

Maxillaria porphyrostele Rchb. f. var. *submarginata* Hoehne = **Maxillaria porphyrostele** Rchb. f.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953.

Maxillaria porrecta Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13583* (HB)].

Maxillaria pumila Hook.
Referencias: Hatschbach, G., 1963a; Hoehne, F. C., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 841* (MBM, SP)].

Maxillaria punctata Schltr. = **Maxillaria phoenicanthera** Barb. Rodr.

Maxillaria purpurea (Spreng.) Ames & Correll = **Maxillaria parviflora** (Poepp. & Endl.) Garay

Maxillaria queirogana Barb. Rodr. = **Maxillaria gracilis** Lodd.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Maxillaria racemosa Hook. = **Bifrenaria racemosa** (Hook.) Lindl.
Referencias: Castro Neto, V. P., 2004.

Maxillaria rigida Barb. Rodr.
Sin.: *Camaridium rigidum* (Barb. Rodr.) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14513* (MBM)].

[Maxillaria rufescens Lindl.]
Sin.: *Maxillaria abelei* Schltr., *Maxillaria articulata* Klotzsch, *Maxillaria rufescens* Lindl. var. *flavida* Rchb. f., *Maxillaria rugosa* Scheidw.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Maxillaria rufescens Lindl. var. *flavida* Rchb. f. = **Maxillaria rufescens** Lindl.

Maxillaria rugosa Scheidw. = **Maxillaria rufescens** Lindl.

Maxillaria rupestris Barb. Rodr. = **Maxillaria picta** Hook.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Maxillaria rupestris Barb. Rodr. var. *brevis* Hoehne & Schltr. = **Maxillaria picta** Hook.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Maxillaria rupestris Barb. Rodr. var. *minor* Hoehne = **Maxillaria picta** Hook.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Maxillaria serotina Hoehne, hom. illeg. = **Maxillaria serotina** Regnell & Barb. Rodr.

Maxillaria serotina Regnell & Barb. Rodr.
Sin.: *Maxillaria serotina* Hoehne, hom. illeg.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lange, R. T. 7438* (MBM, SP)].

Maxillaria spegazziniana Kraenzl.
Sin.: *Maxillaria cogniauxiana* Hoehne, *Maxillaria cogniauxiana* Hoehne var. *intermedia* Hoehne, *Maxillaria cogniauxiana* Hoehne var. *longifolia*
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Johnson, A. E., 2001; Kraenzlin, F. W. L., 1908a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 544* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2731* (SI)].

Maxillaria stenopetala Knowles & Westc. = **Bifrenaria aureo-fulva** (Hook.) Lindl.
Referencias: Castro Neto, V. P., 2004.

Maxillaria ubatubana Hoehne var. **mantiqueirana** Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Seidel, A. 1007* (HB)].

Maxillaria ubatubana Hoehne var. **ubatubana**
Referencias: Hoehne, F. C., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bicalho, H. D. 68* (SP)].

Maxillaria valenzuelana (A. Rich.) Nash
Sin.: *Dicrypta iridifolia* Bateman ex Rchb. f., *Dicrypta irisiphyta* Barb. Rodr., *Marsupiaria valenzuelana* (A. Rich.) Garay, *Maxillaria iridifolia* (Bateman ex Rchb. f.) Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lange, R. T. 1610* (MBM)].

Maxillaria variegata Ruiz & Pav. = **Xylobium variegatum** (Ruiz & Pav.) Garay & Dunst.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Maxillaria vernicosa Barb. Rodr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 948* (ICN, SI)].

[Maxillaria villosa (Barb. Rodr.) Cogn.]
Sin.: *Dicrypta villosa* Barb. Rodr.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Maxillaria viridis Lindl. = **Pabstia viridis** (Lindl.) Garay
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Maxillaria vitellina Lindl. = **Bifrenaria vitellina** (Lindl.) Lindl.
Referencias: Koehler, S. & Amaral, M. E., 2004.

Maxillaria vitelliniflora Barb. Rodr.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Fraga Nunes, V., 1997; Hoehne, F. C., 1953; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2927* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 23131* (MBM)].

Maxillaria warreana Lodd. ex Lindl. = **Warrea warreana** (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf.
Referencias: Hashimoto, T., 1993.

Mesadenella Pabst & Garay

Número de especies: 1

Mesadenella atroviridis (Barb. Rodr.) Garay = **Garaya atroviridis** (Barb. Rodr.) Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1993b.

Mesadenella cuspidata (Lindl.) Garay
Sin.: *Cyclopogon albo-punctata* Barb. Rodr., *Mesadenella esmeralda* (Lindl. & Rchb. f.) Pabst & Garay, *Spiranthes cuspidata* Lindl., *Spiranthes esmeralda* Lindl. & Rchb. f., *Spiranthes margaritifera* Lindl. & Rchb. f., *Stenorrhynchos esmeraldae* (Lindl. & Rchb. f.) Cogn.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Garay, L. A., 1952; Pabst, G. F. J., 1959a; Sprunger, S., 1996.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, COA); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5012* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 856* (ICN, SI)]; PRY[*Hassler, E. 4060* (G)]; URY[*Tweedie, J. s.n.* (K)].

Mesadenella esmeralda (Lindl. & Rchb. f.) Pabst & Garay = **Mesadenella cuspidata** (Lindl.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Microchilus C. Presl

Número de especies: 2

Microchilus arietinus (Rchb. f. & Warm.) Ormd.
Sin.: *Erythrodes arietina* (Rchb. f. & Warm.) Ames, *Physurus arietinus* Rchb. f. & Warm., *Physurus micranthus* Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Hatschbach, G., 1962b; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 952* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15308* (MBM, NY)].

Microchilus austrobrasiliensis (Porsch) Ormd.
Sin.: *Erythrodes austrobrasiliensis* (Porsch) Pabst, *Ligeophila austrobrasiliensis* (Porsch) Garay, *Physurus austrobrasiliensis* Porsch
Referencias: Klein, R. M., 1979; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Spannagel, C. 237* (SPF)].

Microlaelia (Schltr.) Chiron & Castro

Número de especies: 1

Microlaelia lundii (Rchb. f. & Warm. ex Rchb. f.) Chiron & V.P. Castro
Sin.: *Laelia lundii* Rchb. f. & Warm. ex Rchb. f., *Laelia regnelli* Barb. Rodr., *Laelia reichenbachiana* H. Wendl. & Kraenzl., *Sophronitis lundii* (Rchb. f. & Warm. ex Rchb. f.) C. Berg & M.W. Chase
Referencias: Campacci, M. A., 2002; Correa, M. N. & Johnson, A., 1993; Dematteis, M. & Daviña, J. R., 1999; Johnson, A. E., 2001; Moreno, L. A. & Vásquez, R., 1999.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL); PRY(APA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 214* (BAB, MU, SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. s.n.* (SP)].

Microstylis cogniauxiana Schltr. = **Malaxis cogniauxiana** (Schltr.) Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J., 1973a.

Microstylis excavata Lindl. = **Malaxis excavata** (Lindl.) Kuntze
Referencias: Correa, M. N., 1996.

Microstylis gracilis Cogn. = **Malaxis cogniauxiana** (Schltr.) Pabst

Microstylis hastilabia Rchb. f. = **Malaxis excavata** (Lindl.) Kuntze
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Microstylis hieronymi Cogn. = **Malaxis hieronymi** (Cogn.) L.O. Williams
Referencias: Correa, M. N., 1996.

Microstylis histionantha Link, Klotzsch & Otto = **Malaxis histionantha** (Link, Klotzsch & Otto) Garay & Dunst.

Microstylis jaraguae Hoehne & Schltr. = **Malaxis jaraguae** (Hoehne & Schltr.) Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Microstylis muelleri Schltr. = **Malaxis excavata** (Lindl.) Kuntze

Microstylis ovatilabia Schltr. = **Malaxis parthoni** C. Morren

Microstylis pabstii Schltr. = **Malaxis pabstii** (Schltr.) Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Microstylis paranaensis Schltr. = **Malaxis excavata** (Lindl.) Kuntze
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Microstylis parthoni (C. Morren) Klotzsch = **Malaxis parthoni** C. Morren
Referencias: Correa, M. N., 1996.

Microstylis pubescens Lindl. = **Malaxis pubescens** (Lindl.) Kuntze
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Microstylis sertulifera (Barb. Rodr.) Schltr. = **Malaxis excavata** (Lindl.) Kuntze
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Microstylis warmingii Rchb. f. = **Malaxis warmingii** (Rchb. f.) Kuntze
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Miltonia Lindl., nom. cons.

Número de especies: 4

Miltonia cereola Lem. = **Miltonia regnellii** Rchb. f. var. **regnellii**
Referencias: Campacci, M. A., 2003b.

Miltonia flavescens Lindl.
Sin.: *Cyrtochilum flavescens* Lindl., *Cyrtochilum stellatum* Lindl., *Miltonia flavescens* Lindl. var. *stellata* Regel, *Miltonia loddigesii* Regel, *Miltonia stellata* (Lindl.) Lindl., *Oncidium flavescens* (Lindl.) Rchb. f., *Oncidium stellatum* (Lindl.) Beer
Referencias: Campacci, M. A., 2003b; Hauman, L. L., 1917b; Johnson, A. E., 2001; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–600 m.

Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28816* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 1003* (ICN)]; PRY[*Hassler, E. 6056* (G)].

Miltonia flavescens Lindl. var. *stellata* Regel = **Miltonia flavescens** Lindl.

Miltonia loddigesii Regel = **Miltonia flavescens** Lindl.
Referencias: Campacci, M. A., 2003b.

Miltonia phymatochila (Lindl.) N.H. Williams & M.W. Chase
Sin.: *Oncidium phymatochilum* Lindl.
Referencias: Schlechter, F. R. R., 1926.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, A. 12* (B)].

Miltonia quadrijuga Dusén & Kraenzl. = **Miltonia russelliana** Lindl.

Miltonia regnellii Rchb. f. var. **citrina** Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4178* (HBR)].

Miltonia regnellii Rchb. f. var. **regnellii**
Sin.: *Miltonia cereola* Lem.
Referencias: Campacci, M. A., 2003b; Hatschbach, G., 1963a; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 7896* (S)].

Miltonia russelliana Lindl.
Sin.: *Anneliesia russeliana* (Lindl.) Senghas & Lückel, *Miltonia quadrijuga* Dusén & Kraenzl., *Oncidium russellianum* Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1959c.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 100–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. 2293* (RB)].

Miltonia stellata (Lindl.) Lindl. = **Miltonia flavescens** Lindl.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Myanthus fimbriatum C. Morren = **Catasetum fimbriatum** (C. Morren) Lindl. & Paxton subsp. **fimbriatum**
Referencias: Hoehne, F. C., 1942b.

Myoxanthus Poepp. & Endl.

Número de especies: 1

Myoxanthus exasperatus (Lindl.) Luer
Sin.: *Myoxanthus parahybunensis* (Barb. Rodr.) Luer, *Pleurothallis exasperata* Lindl., *Pleurothallis macropus* Schltr., *Pleurothallis peduncularis* Lindl., hom. illeg.
Referencias: Luer, C. A., 1992.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 11729* (K)].

Myoxanthus parahybunensis (Barb. Rodr.) Luer = **Myoxanthus exasperatus** (Lindl.) Luer
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Myoxanthus spilanthus (Barb. Rodr.) Luer = **Acianthera spilantha** (Barb. Rodr.) Luer

Myrosmodes paleacea Rchb. f. ex Griseb., nom. nud. = **Aa paleacea** Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1996.

Myrosmodes paludosa (Rchb. f.) C.A. Vargas = **Aa paludosa** (Rchb. f.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1996.

Neolauchea pulchella Kraenzl. = **Isabelia pulchella** (Kraenzl.) Senghas & Teusch.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Neolehmannia difformis (Jacq.) Pabst = **Epidendrum difforme** Jacq.

Neolehmannia latilabris (Lindl.) Pabst = **Epidendrum latilabre** Lindl.

Neottia acaulis Sm. = **Sarcoglottis acaulis** (Sm.) Schltr.

Neottia bicolor Ker Gawl. = **Cyclopogon bicolor** (Ker Gawl.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Neottia grandiflora Hook. = **Sarcoglottis grandiflora** (Hook.) Klotzsch
Referencias: Correa, M. N., 1996.

Notylia Lindl.

Número de especies: 5

Notylia calcarata Sw. = **Eltroplectris calcarata** (Sw.) Garay & Sweet
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Notylia cardioglossa Rchb. f.
Referencias: Fraga Nunes, V., 1997; Nunes, V. F. & Waechter, J. L., 1998; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Burle-Marx, R. s.n.* (RB), *Fraga Nunes, V. 1381* (ICN)].

Notylia hemitricha Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953; Waechter, J. L., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lange, F. 9853* (MBM)];

[Notylia longispicata Hoehne & Schltr.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Notylia lyrata S. Moore var. **lyrata**
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 1395* (CTES)].

Notylia lyrata S. Moore var. **major** Cogn.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CON, GUA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 633* (P)].

Notylia pubescens Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Carneiro, J. 421* (MBM)].

Notylia sagittifera (Kunth) Link, Klotzsch & Otto
Sin.: *Pleurothallis sagittifera* Kunth
Referencias: Pabst, G. F. J., 1953; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 9853* (S)].

Octomeria R. Br.

Número de especies: 51, 11 endémicas

Octomeria albina Barb. Rodr. = **Octomeria tricolor** Rchb. f.

Octomeria albo-rosea Kraenzl. = **Acianthera albo-rosea** (Kraenzl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Octomeria albopurpurea Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19573* (MBM)].

Octomeria alexandri Schltr.
Referencias: Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004; Waechter, J. L., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Waechter, J. L. 1030* (ICN)].

Octomeria alpina Barb. Rodr.
Referencias: Klein, R. M., 1979; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1926; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Tessmann, G. 3007* (MBM)].

Octomeria bradei Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1922.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13113* (MBM)].

Octomeria caetensis Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J., 1979.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 40697* (MBM)].

Octomeria chamaeleptotes Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Fraga Nunes, V., 1997; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 400–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 5053* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 967* (MBM)].

Octomeria chloidophylla (Rchb. f.) Garay
Sin.: *Octomeria dusenii* Schltr., *Pleurothallis chloidophylla* Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1919–1920.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–1200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. s.n.* (S)].

Octomeria concolor Barb. Rodr.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 6973* (S)].

Octomeria crassifolia Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Brade, A. C. 763* (SP)]; PRY[*Schinini, A. 23176* (CTES)].
Notas: Citada para Uruguay sin mencionar localidad o material de referencia (Pabst & Dungs, 1975).

[Octomeria crassifolia Lindl. var. triarticulata (Barb. Rodr.) Cogn.]
Sin.: *Octomeria densiflora* Barb. Rodr. var. *triarticulata* Barb. Rodr.
Notas: Nombre dudoso.

Octomeria crassilabia Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 800–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2249* (SI)].

Octomeria cucullata Porto & Brade
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 1900–2000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Campos Porto, P. 2656* (RB)].

Octomeria decumbens Cogn.
Referencias: Hoehne, F. C., 1929; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1926; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2611* (MBM)].

Octomeria densiflora Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952b.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 300–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Leinig, M. 132* (HB)].

Octomeria densiflora Barb. Rodr. var. *triarticulata* Barb. Rodr. = **Octomeria crassifolia** Lindl. var. **triarticulata** (Barb. Rodr.) Cogn.

Octomeria diaphana Lindl.
Referencias: Hatschbach, G., 1963a; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1922.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 700–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 23398* (MBM)].

Octomeria dusenii Schltr. = **Octomeria chloidophylla** (Rchb. f.) Garay
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Octomeria elobata Pabst = **Octomeria octomeriantha** (Hoehne) Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J., 1972b.

Octomeria ementosa Barb. Rodr.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 7892a* (MBM, S)].

Octomeria fialhoensis Dutra ex Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1959c.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 200–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 872* (ICN)].

Octomeria fibrifera Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 923* (ICN, SI)].

Octomeria flabellifera Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, P. S. J. s.n.* (HB)].

Octomeria gehrtii Hoehne & Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 10003* (MBM)].

Octomeria glazioviana Regel
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Loefgren, J. A. C. 6027* (SP)].

Octomeria gracilicaulis Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952b; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20215* (MBM)].

Octomeria gracilis auct. non Lindl. = **Octomeria rodriguezii** Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1962.

Octomeria gracilis Lodd. ex Lindl. var. **gracilis**
Referencias: Hatschbach, G., 1963a; Klein, R. M., 1979; Schlechter, F. R. R., 1922.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 12763* (MBM)].

Octomeria gracilis Lodd. ex Lindl. var. **pauloensis** Schltr.
Referencias: Hatschbach, G., 1963a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1537* (MBM, SP)].

Octomeria grandiflora Lindl.
Sin.: *Octomeria grandiflora* Lindl. var. *robusta* (Barb. Rodr.) Cogn., *Octomeria robusta* auct. non Rchb. f. & Warm., *Octomeria ruthiana* Hoehne, *Octomeria seegeriana* Kraenzl.
Referencias: Cribb, P. J., 1977; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14382* (MBM)].

Octomeria grandiflora Lindl. var. *robusta* (Barb. Rodr.) Cogn. = **Octomeria grandiflora** Lindl.
Referencias: Cribb, P. J., 1977.

Octomeria hatschbachii Schltr.
Referencias: Hatschbach, G., 1974; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1926.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22305* (HB, MBM)];

Octomeria iguapensis Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1922.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gatti, G. 201* (MBM)].

Octomeria irroarata Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1929; Schlechter, F. R. R., 1919.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hoehne, F. C. s.n.* (SP)].

[Octomeria juergensii Schltr.]
Notas: Nombre dudoso. No pudo localizarse material de esta especie; el ejemplar tipo fue destruido.

Octomeria juncifolia Barb. Rodr. var. **juncifolia**
Referencias: Hatschbach, G., 1963a; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1027* (SI)].

Octomeria juncifolia Barb. Rodr. var. **revoluta** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 21255* (MBM)].

Octomeria lacerata Hoehne & Schltr. = **Octomeria stellaris** Barb. Rodr.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Octomeria lichenicola Barb. Rodr.
Referencias: Hatschbach, G., 1963a; Hoehne, F. C., 1929; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996; Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3284* (MBM)].

Octomeria linearifolia Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 7880* (MBM)].

Octomeria lithophila Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Deslandes, J. 4* (SP)].

Octomeria micrantha Barb. Rodr.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 374* (BAB)]; BRA[*Waechter, J. L. 1238* (ICN)].

Octomeria multiflora Barb. Rodr. = **Octomeria tridentata** Lindl.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Octomeria ochroleuca Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Spannagel, C. 403* (HB)].

Octomeria octomeriantha (Hoehne) Pabst
Sin.: *Octomeria elobata* Pabst, *Pleurothallis octomeriantha* Hoehne
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1972b.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14823* (MBM)].

Octomeria oxychela Barb. Rodr. var. **gracilis** Cogn.
Referencias: Hatschbach, G., 1963a.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14634* (HB, MBM)].

Octomeria oxychela Barb. Rodr. var. **oxychela**
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952b; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2441* (MBM)].

Octomeria palmyrabellae Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24111* (HB, MBM)].

Octomeria paulensis Barb. Rodr. = **Octomeria praestans** Barb. Rodr.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Octomeria pinicola Barb. Rodr.
Referencias: Hauman, L. L., 1921a; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 119* (MU, SI)]; BRA[*Hoehne, F. C. s.n.* (SP)].

Octomeria praestans Barb. Rodr.
Sin.: *Octomeria paulensis* Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pabst, G. F. J. 123* (HB)].

Octomeria pusilla Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Tweedie, J. s.n.* (K)].

Octomeria reitzii Pabst
Referencias: Klein, R. M., 1979; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18571* (MBM)].

[Octomeria rhodoglossa Schltr.]
Notas: Nombre dudoso. El ejemplar tipo en Berlín fue destruido, no se pudo localizar otro material de referencia.

Octomeria rigida Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lange, N. 6897* (MBM)].

Octomeria riograndensis Schltr.
Referencias: Fraga Nunes, V., 1997; Hoehne, F. C., 1950b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1536* (MBM, SP)].

Octomeria robusta Rchb. f. & Warm.
Referencias: Fraga Nunes, V., 1997; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 21289* (MBM)].

Octomeria robusta auct. non Rchb. f. & Warm. = **Octomeria grandiflora** Lindl.
Referencias: Cribb, P. J., 1977.

Octomeria rodriguezii Cogn.
Sin.: *Octomeria gracilis* auct. non Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1962.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Glaziou, A. F. M. 5504* (P, R)].

Octomeria rohrii Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952b.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. s.n.* (HB)].

Octomeria rotundiglossa Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1938; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 11724* (HB, MBM)].

Octomeria ruthiana Hoehne = **Octomeria grandiflora** Lindl.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Octomeria sancti-angeli Kraenzl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1113* (SI)].

Octomeria seegeriana Kraenzl. = **Octomeria grandiflora** Lindl.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Octomeria serrana Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1929; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gehrt, A. 8147* (SP)].

Octomeria stellaris Barb. Rodr.
Sin.: *Octomeria lacerata* Hoehne & Schltr.
Referencias: Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15122* (MBM)].

Octomeria tricolor Rchb. f.
Sin.: *Octomeria albina* Barb. Rodr.
Referencias: Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004; Waechter, J. L., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Waechter, J. L. 1207* (ICN)].

[Octomeria tridentata Lindl.]
Sin.: *Octomeria multiflora* Barb. Rodr.
Referencias: Sprunger, S., 1996.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Octomeria umbonulata Schltr.
Referencias: Fraga Nunes, V., 1997; Hatschbach, G., 1974; Klein, R. M., 1979; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952b.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16281* (MBM)].

Octomeria unguiculata Schltr.
Referencias: Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Burger, L. 29* (B)].

Odontoglossum recurvum Rchb. f. = **Gomesa recurva** R. Br.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1962.

Odontorrhynchus M.N. Correa
Número de especies: 5, 4 endémicas

Odontorrhynchus castillonii (Hauman) M.N. Correa
Sin.: *Spiranthes castillonii* (Hauman) L.O. Williams, *Stenorrhynchos castillonii* Hauman
Referencias: Singer, R. B. & Cocucci, A. A., 1999; Williams, L. O., 1938.
Hierba. Perenne. Nativa. 1200–2700 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 21728* (CORD)].

Odontorrhynchus chilensis (A. Rich.) Garay
Sin.: *Spiranthes chilensis* A. Rich.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*J. Bartulín s.n.* (CONC 12447)].

Odontorrhynchus chlorops (Rchb. f.) Garay = **Brachystele chlorops** (Rech. f.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1975a.

Odontorrhynchus domeykoanus Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1996.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Scheding s.n.* (HBG)].

Odontorrhynchus erosus Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1996.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Neger, F. W. 18* (HBG)].

Odontorrhynchus variabilis Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 303* (AMES)].
Notas: Posible sinónimo de *Oeceoclades chilensis*.

Oeceoclades Lindl.
Número de especies: 1

Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.
Sin.: *Angraecum maculatum* Lindl., *Eulophia maculata* Lindl., *Eulophidium maculatum* (Lindl.) Pfitzer, *Eulophidium maculatum* (Lindl.) Pfitzer var. *pterocarpum* Hauman, *Oeceoclades maculata* (Lindl.) Lindl. var. *pterocarpa* (Hauman) Garay & P. Taylor
Referencias: Carnevali, G., Ramírez-Morillo, I. M., Romero-González, G. A., Vargas, C. A. & Foldats, E., 2003; Correa, M. N., 1995; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Dematteis, M. & Daviña, J. R., 1999; Garay, L. A. & Taylor, P. G., 1976; Johnson, A. E., 2001; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Summerhayes, V. S., 1957.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6589* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 19124* (NY)]; PRY[*Schinini, A. 20317* (CTES)].

Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. var. *pterocarpa* (Hauman) Garay & P. Taylor = **Oeceoclades maculata** (Lindl.) Lindl.

Oncidium Sw., nom. cons.
Número de especies: 50, 6 endémicas

[Oncidium aberrans Schltr.]
Notas: Nombre dudoso. El ejemplar tipo en Berlín fue destruido, no se pudo localizar otro material de referencia.

Oncidium albini Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hoehne, F. C. s.n.* (SP)].

Oncidium amictum Lindl. = **Oncidium pubes** Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Oncidium barbaceniae Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1642* (SP)].

[Oncidium barbatum Lindl.]
Sin.: *Oncidium microglossum* Klotzsch, *Oncidium uliginosum* Barb. Rodr.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Oncidium batemannianum auct. non Parm. ex Knowles & Westc. = **Oncidium bifolium** Sims var. **bifolium**
Referencias: Correa, M. N., 1996.

Oncidium batemannianum Parm. ex Knowles & Westc. = **Oncidium blancheti** Rchb. f. var. **blancheti**

[Oncidium baueri Lindl.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Oncidium biflorum Barb. Rodr. = **Oncidium longipes** Lindl. var. **longipes**
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Oncidium bifolium Sims var. **bifolium**
Sin.: *Oncidium batemannianum* auct. non Parm. ex Knowles & Westc.
Referencias: Burkart, A., 1957c; Dematteis, M. & Daviña, J. R., 1999; Fraga Nunes, V., 1997; Johnson, A. E., 2001; Lecoufle, M., 1996; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1952a; Williams, L. O., 1939.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU); URY(ART, CLA, COL, DUR, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 560* (SI, SP)]; BRA[*Reitz, P. R. 14323* (HB)]; PRY[*Jörgensen, P. 4646* (SI)]; URY[*Gibert, J. E. 794* (K)].

Oncidium bifolium Sims var. **majus** Hort
Referencias: Borges, N., 1965; Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Hauman, L. L., 1917b.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 800–1200 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, TUC); BRA(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kermes, E. 649* (BAB)]; BRA[*Pabst, G. F. J. 2611* (HB)].

Oncidium blancheti Rchb. f. var. **blancheti**
Sin.: *Oncidium batemannianum* Parm. ex Knowles & Westc.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Poliquesi, C. B. 242* (MBM)].

Oncidium blancheti Rchb. f. var. **mixtum** Schltr.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24670* (MBM)].

Oncidium brienianum Rchb. f. = **Oncidium widgrenii** Lindl.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Oncidium brienianum Rchb. f. var. *rufida* Rchb. f. = **Oncidium widgrenii** Lindl.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

[Oncidium brunnipetalum Barb. Rodr.]
Notas: Nombre dudoso.

Oncidium cebolleta (Jacq.) Sw. = **Trichocentrum cebolleta** (Jacq.) M.W. Chase & N.H. Williams
Referencias: Carnevali, G., Ramírez-Morillo, I. M., Romero-González, G. A., Vargas, C. A. & Foldats, E., 2003; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Oncidium chrysorapis Rchb. f. = **Oncidium fimbriatum** Lindl.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Oncidium ciliatum Lindl.
Sin.: *Oncidium reisii* Hoehne & Schltr.
Referencias: Fraga Nunes, V., 1997; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Waechter, J. L. 1073* (ICN, SP)].

Oncidium cogniauxianum Schltr.
Referencias: Leinig, M., 1973; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Leinig, M. 367* (HB)].

Oncidium concolor Hook.
Sin.: *Oncidium concolor* Hook. var. *ottonis* (Schltr.) Pabst, *Oncidium ottonis* Schltr.
Referencias: Borges, N., 1965; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Williams, L. O., 1939.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 7015* (BAB)]; BRA[*Bicalho, H. D. s.n.* (SP)].

Oncidium concolor Hook. var. *ottonis* (Schltr.) Pabst = **Oncidium concolor** Hook.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Oncidium cornigerum Lindl.
Sin.: *Oncidium pubes* Lindl. var. *flavescens* Hook.
Referencias: Borges, N., 1965; Kraenzlin, F. W. L., 1911, 1922; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1972c.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pabst, G. F. J. 733* (R)]; PRY[*Woolston, A. L. 622a* (SI)].

Oncidium crispum Lodd.
Sin.: *Oncidium crispum* Lodd. var. *rodriguesii* Cogn.
Referencias: Borges, N., 1965; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1962; Teuscher, H., 1978.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bicalho, H. D. 44* (SP)].

Oncidium crispum Lodd. var. *rodriguesii* Cogn. = **Oncidium crispum** Lodd.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Oncidium cruciatum Rchb. f. = **Oncidium fimbriatum** Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Johnson, A. E., 2001.

Oncidium curtum Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13126* (HB, MBM)].

Oncidium dimorphum Regel = **Oncidium trulliferum** Lindl.

Oncidium divaricatum Lindl.
Sin.: *Oncidium divaricatum* Lindl. var. *cupreum* Lindl.
Referencias: Borges, N., 1965; Pabst, G. F. J., 1962; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 847* (B)].

Oncidium divaricatum Lindl. var. *cupreum* Lindl. = **Oncidium divaricatum** Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1962.

Oncidium donianum Bateman ex Baxter
Sin.: *Oncidium mixtum* Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 28103* (HB, MBM)].

Oncidium edwallii Cogn.
Referencias: Borges, N., 1965; Correa, M. N., 1995; Kraenzlin, F. W. L., 1922; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 173* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 19385* (HB, MBM)]; PRY[*Jörgensen, P. 4407* (SI)].

Oncidium elegantissimum Rchb. f. = **Oncidium gardneri** Lindl.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Oncidium euxanthium Rchb. f. = **Oncidium varicosum** Lindl. & Paxton var. **varicosum**
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Oncidium fimbriatum Lindl.
Sin.: *Oncidium chrysorapis* Rchb. f., *Oncidium cruciatum* Rchb. f., *Oncidium godseffianum* Kraenzl., *Oncidium hecatanthum* Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Fraga Nunes, V., 1997; Johnson, A. E., 2001; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1972c; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CEN, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 5514* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 18540* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 7767* (FCQ, MO)].

Oncidium flavescens (Lindl.) Rchb. f. = **Miltonia flavescens** Lindl.
Referencias: Johnson, A. E., 2001; Kraenzlin, F. W. L., 1922.

Oncidium flexuosum Sims var. **flexuosum**
Sin.: *Oncidium haematochrysum* Rchb. f., *Oncidium haematoxanthum* Rchb. f.
Referencias: Borges, N., 1965; Bornmüller, J. F. N., 1934; Cogniaux, C. A., 1903; Fraga Nunes, V., 1997; Garay, L. A., 1954; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1972c; Schlechter, F. R. R., 1925; Stutz, L. C., 1983.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 8513* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 2011* (SP)]; PRY[*Stutz, L. C. 1843* (G)].

Oncidium flexuosum Sims var. **radiatum** Rchb. f.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1922.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Müller, F. J. F. T. s.n.* (B)]; PRY[*Hassler, E. 3417* (G)].

Oncidium fuscans Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 17799* (HB, MBM)].

Oncidium gardneri Lindl.
Sin.: *Oncidium elegantissimum* Rchb. f., *Oncidium gardnerianum* Hort, *Oncidium praetextum* auct. non Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20773* (MBM)].

Oncidium gardnerianum Hort = **Oncidium gardneri** Lindl.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Oncidium gautieri Regel = **Oncidium longicornu** Mutel
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Oncidium geraense Barb. Rodr. = **Oncidium varicosum** Lindl. & Paxton var. **varicosum**
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Oncidium godseffianum Kraenzl. = **Oncidium fimbriatum** Lindl.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Oncidium gravesianum Rolfe
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sakane, M. s.n.* (SP)].

Oncidium haematochrysum Rchb. f. = **Oncidium flexuosum** Sims var. **flexuosum**
Referencias: Pabst, G. F. J., 1972c.

Oncidium haematoxanthum Rchb. f. = **Oncidium flexuosum** Sims var. **flexuosum**
Referencias: Pabst, G. F. J., 1972c.

[Oncidium harrisonianum Lindl.]
Referencias: Borges, N., 1965.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Oncidium hassleri Cogn. = **Oncidium longipes** Lindl. var. **longipes**
Referencias: Pabst, G. F. J., 1953.

Oncidium hatschbachii Schltr. = **Oncidium paranaense** Kraenzl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Oncidium hecatanthum Kraenzl. = **Oncidium fimbriatum** Lindl.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Oncidium herzogii Schltr.
Referencias: Williams, L. O., 1939.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21156* (LP, SI)].

Oncidium hians Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Waechter, J. L., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2988* (HB, MBM)].

Oncidium hookeri Rolfe f. **albescens** (Pabst) F. Barros & J.A.N. Bat.
Sin.: *Oncidium hookeri* Rolfe var. *albescens* Pabst
Referencias: Barros, F. & Batista, J. A. N., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Eipper, E. s.n.* (HB)].

Oncidium hookeri Rolfe f. **hookeri**
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kummrow, R. 2302* (MBM, SP)].

Oncidium hookeri Rolfe var. *albescens* Pabst = **Oncidium hookeri** Rolfe f. **albescens** (Pabst) F. Barros & J.A.N. Bat.
Referencias: Barros, F. & Batista, J. A. N., 2004.

Oncidium hydrophilum Barb. Rodr.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1903; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Menezes, L. C., 1991; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 25440* (MBM, NY)]; PRY[*Hassler, E. 5368* (G)].

Oncidium iridifolium Kunth = **Psygmorchis pusilla** (L.) Dodson & Dressler
Referencias: Dodson, C. H. & Dressler, R. L., 1972.

Oncidium janeirense Rchb. f. = **Oncidium longipes** Lindl. var. **longipes**
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Oncidium jonesianum Rchb. f. = **Trichocentrum jonesianum** (Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams

Oncidium leinigii Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1972c.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Leinig, M. 472* (HB)].

Oncidium lietzei Regel
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 27191* (MBM)].

Oncidium loefgrenii Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Schlechter, F. R. R., 1926.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 42188* (HB, MBM)].

Oncidium longicornu Mutel
Sin.: *Oncidium gautieri* Regel, *Oncidium monoceras* Hook., *Oncidium unicorne* Lindl., *Oncidium unicornutum* Knowles & Westc.
Referencias: Borges, N., 1965; Dematteis, M. & Daviña, J. R., 1999; Hauman, L. L., 1917b; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gamerro, J. C. 86* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 41879* (MBM, SP)].

Oncidium longipes Lindl. var. **longipes**
Sin.: *Oncidium biflorum* Barb. Rodr., *Oncidium hassleri* Cogn., *Oncidium janeirense* Rchb. f., *Oncidium oxyacanthosum* Lem., *Oncidium uniflorum* Booth ex Lindl. var. *longipes* (Lindl.) Teusch., *Oncidium uniflorum* Booth ex Lindl. var. *robustum* Regel

Referencias: Borges, N., 1965; Dematteis, M. & Daviña, J. R., 1999; Fraga Nunes, V., 1997; Garay, L. A., 1954; Johnson, A. E., 2001; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Schlechter, F. R. R., 1925; Williams, L. O., 1939.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(CHA, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU); URY(CLA, MON, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 134* (MU, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 45736* (MBM, SP)]; PRY[*Jörgensen, P. 4766* (NY)]; URY[*Hernández, P. 32156* (MVFA)].

Oncidium longipes Lindl. var. **monophyllum** Regel
Referencias: Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7627* (S)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6052* (AS, B)]; URY[*Sellow, F. 2934* (P)].

Oncidium macronyx Rchb.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 23271* (MBM)].

Oncidium macropetalum Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(SCA); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 13284* (NY)]; PRY[*Rojas, T. 2046* (SI, SP)].

Oncidium maculosum Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1996.; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Balboa, O. 230* (SI)].
Notas: Citada para Paraguay sin mencionar material de referencia.

Oncidium martianum Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 6528* (S)].

Oncidium mazzari Hoehne = **Oncidium nitidum** Schltr.

Oncidium microglossum Klotzsch = **Oncidium barbatum** Lindl.

Oncidium micropogon Rchb. f. var. **chrysopterum** Rchb. f.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hoehne, F. C. s.n.* (SP)].

Oncidium micropogon Rchb. f. var. **micropogon**
Sin.: *Oncidium psyche* Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Schlechter, F. R. R., 1925; Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 958* (ICN)].

Oncidium mixtum Schltr. = **Oncidium donianum** Bateman ex Baxter
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.

Oncidium monoceras Hook. = **Oncidium longicornu** Mutel
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Oncidium montanum Barb. Rodr. = **Oncidium pirarense** Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Oncidium morenoi Dodson & Luer = **Trichocentrum morenoi** (Dodson & Luer) M.W. Chase & N.H. Williams

Oncidium nitidum Schltr.
Sin.: *Oncidium mazzari* Hoehne
Referencias: Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 200–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lindman, N. A. 1355a* (S)].

Oncidium odontochilum Barb. Rodr. = **Oncidium widgrenii** Lindl.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Oncidium ottonis Schltr. = **Oncidium concolor** Hook.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Oncidium oxyacanthosum Lem. = **Oncidium longipes** Lindl. var. **longipes**
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1922.

Oncidium paranaense Kraenzl.
Sin.: *Oncidium hatschbachii* Schltr., *Oncidium schadei* L.O. Williams
Referencias: Borges, N., 1965; Correa, M. N., 1995; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2926* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15* (SP)]; PRY[*Schade, F. s.n.* (AMES)].

Oncidium pectorale Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Seidel, A. s.n.* (HB)].

Oncidium phymatochilum Lindl. = **Miltonia phymatochila** (Lindl.) N.H. Williams & M.W. Chase

Oncidium pirarense Rchb. f.
Sin.: *Oncidium montanum* Barb. Rodr.
Referencias: Borges, N., 1965; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1117* (MBM)].

Oncidium pontagrossense Campacci
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Barbosa Rodrigues, J. s.n.* (SP)].

Oncidium praetextum Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Schlechter, F. R. R., 1926.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15115* (HB)].

Oncidium praetextum auct. non Rchb. f. = **Oncidium gardneri** Lindl.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Oncidium psyche Schltr. = **Oncidium micropogon** Rchb. f. var. **micropogon**

Oncidium pubes Lindl.
Sin.: *Oncidium amictum* Lindl.
Referencias: Hauman, L. L., 1917b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 4931* (SI)]; BRA[*Carneiro, J. 368* (MBM)]; PRY[*Pedersen, T. M. 15027* (SI)].

Oncidium pubes Lindl. var. *flavescens* Hook. = **Oncidium cornigerum** Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1972c.

Oncidium pulvinatum Lindl.
Referencias: Borges, N., 1965; Hauman, L. L., 1917b; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 1492* (SI)]; BRA[*Waechter, J. L. 1074* (ICN, SP)]; PRY[*Woolston, A. L. 611* (SI)].

Oncidium pumilum Lindl. = **Trichocentrum pumilum** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Oncidium pumilum Lindl. var. *angustifolium* Cogn. = **Trichocentrum pumilum** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1922.

Oncidium pumilum Lindl. var. *robustum* Cogn. = **Trichocentrum pumilum** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1922.

Oncidium pusillum (L.) Rchb. f. = **Psygmorchis pusilla** (L.) Dodson & Dressler
Referencias: Dodson, C. H. & Dressler, R. L., 1972.

Oncidium raniferum Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13478* (MBM)].

Oncidium reisii Hoehne & Schltr. = **Oncidium ciliatum** Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Oncidium riograndense Cogn.
Sin.: *Leiochilus spegazzinianus* Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1808* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 16122* (HB, MBM)].

Oncidium rogersii Bateman = **Oncidium varicosum** Lindl. & Paxton var. **varicosum**

Oncidium rojersii Hort ex Bateman = **Oncidium varicosum** Lindl. & Paxton var. **varicosum**

Oncidium russellianum Lindl. = **Miltonia russelliana** Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1966.

Oncidium sarcodes Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Teuscher, H., 1978.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bicalho, H. D. s.n.* (SP)].

Oncidium schadei L.O. Williams = **Oncidium paranaense** Kraenzl.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Oncidium sodiroi Schltr.
Referencias: Garay, L. A. & Stacy, J. E., 1974.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Guimarães, A. s.n.* (RB)].

[Oncidium spegazzianum (Kraenzl.) Schltr.]
Sin.: *Leochilus spegazzinianus* Kraenzl.
Notas: Nombre dudoso.

Oncidium sphegiferum Lindl.
Referencias: Borges, N., 1965; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Schlechter, F. R. R., 1926.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 200–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Leite, J. E. 3073* (NY)].

[Oncidium spilopterum Lindl.]
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Oncidium stellatum (Lindl.) Beer = **Miltonia flavescens** Lindl.
Referencias: Campacci, M. A., 2003b.

Oncidium superfluum Rchb. f. = **Capanemia superflua** (Rchb. f.) Garay
Referencias: Correa, M. N., 1995.

[Oncidium trichodes Lindl.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Oncidium trulliferum Lindl.
Sin.: *Oncidium dimorphum* Regel, *Oncidium venustum* Drap.
Referencias: Borges, N., 1965; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 25755* (NY)].

[Oncidium truncatum Pabst]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Oncidium tucumanense Rchb. f.]
Notas: Nombre dudoso.

Oncidium uliginosum Barb. Rodr. = **Oncidium barbatum** Lindl.

Oncidium unicorne Lindl. = **Oncidium longicornu** Mutel
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Oncidium unicornutum Knowles & Westc. = **Oncidium longicornu** Mutel
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Oncidium uniflorum Booth ex Lindl. var. *longipes* (Lindl.) Teusch. = **Oncidium longipes** Lindl. var. **longipes**

Oncidium uniflorum Booth ex Lindl. var. *robustum* Regel = **Oncidium longipes** Lindl. var. **longipes**
Referencias: Pabst, G. F. J., 1972c.

Oncidium varicosum Lindl. & Paxton var. *rogersii* (Bateman) Rchb. f. = **Oncidium varicosum** Lindl. & Paxton var. **varicosum**

Oncidium varicosum Lindl. & Paxton var. **varicosum**
Sin.: *Oncidium euxanthium* Rchb. f., *Oncidium geraense* Barb. Rodr., *Oncidium rogersii* Bateman, *Oncidium rojersii* Hort ex Bateman, *Oncidium varicosum* Lindl. & Paxton var. *rogersii* (Bateman) Rchb. f.
Referencias: Blowers, J., 1991; Cogniaux, C. A., 1903; Correa, M. N., 1995; Kraenzlin, F. W. L., 1922; Pabst, G. F. J., 1972c; Schlechter, F. R. R., 1926.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(CAT, COS, JUJ, SAL); BRA(PAR); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 30419* (CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 3185* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 2606* (G)].

Oncidium varicosum Lindl. & Paxton var. **vexillarium** (Rchb. f.) Kraenzl.
Sin.: *Oncidium vexillarium* Rchb. f.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1922.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 7637b* (MBM, S)]; PRY[*Hassler, E. 3690* (G)].

Oncidium venustum Drap. = **Oncidium trulliferum** Lindl.

Oncidium verrucosissimum Cogn.
Referencias: Hauman, L. L., 1921a; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR); PRY(APA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1714* (SI)]; BRA[*Hoehne, F. C. s.n.* (SP)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6469* (SI)].

Oncidium vexillarium Rchb. f. = **Oncidium varicosum** Lindl. & Paxton var. **vexillarium** (Rchb. f.) Kraenzl.

Oncidium viperinum Lindl.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1903; Meyer, T., 1963; Williams, L. O., 1939.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 7445* (BAB)]; PRY[*Hassler, E. 3418* (G)].

Oncidium widgrenii Lindl.
Sin.: *Oncidium brienianum* Rchb. f., *Oncidium brienianum* Rchb. f. var. *rufida* Rchb. f., *Oncidium odontochilum* Barb. Rodr.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1955a, 1972c.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1102* (ICN, SI)].

Ophrys argentea Vell. = **Aspidogyne argentea** (Vell.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1977.

Ophrys ciliata Kunth = **Cranichis ciliata** (Kunth) Kunth
Referencias: Garay, L. A., 1978.

Ophrys nervosa Thunb. = **Liparis nervosa** (Thunb.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Ophrys unilateralis Poir. = **Brachystele unilateralis** (Poir.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1955.

Orchis macronectar Vell. = **Habenaria macronectar** (Vell.) Hoehne

Orchis stylomisantha Vell. = **Galeandra stylomisantha** (Vell.) Hoehne
Referencias: Correa, M. N., 1955.

Ornithidium ceriferum (Barb. Rodr.) Barb. Rodr. = **Maxillaria cerifera** Barb. Rodr.
Referencias: Schlechter, F. R. R., 1926.

Ornithidium chloroleucum Barb. Rodr. = **Maxillaria parviflora** (Poepp. & Endl.) Garay
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Ornithidium confertum Griseb. = **Maxillaria parviflora** (Poepp. & Endl.) Garay

Ornithidium divaricatum Barb. Rodr. = **Maxillaria cerifera** Barb. Rodr.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Ornithidium flavoviridum (Barb. Rodr.) Barb. Rodr. = **Maxillaria cerifera** Barb. Rodr.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Ornithidium parviflorum (Poepp. & Endl.) Rchb. f. = **Maxillaria parviflora** (Poepp. & Endl.) Garay

Ornithocephalus Hook.

Número de especies: 2, 1 endémica

Ornithocephalus brachystachyus Schltr.
Referencias: Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Burger, L. 16* (B)].

Ornithocephalus dasyrhyzus Kraenzl. = **Zygostates dasyrhiza** (Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Ornithocephalus dusenianus Kraenzl. = **Dipteranthus pustulatus** (Kraenzl.) Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Ornithocephalus microphyllus Barb. Rodr. = **Phymatidium delicatulum** Lindl. var. **delicatulum**
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Ornithocephalus multiflorus Rolfe = **Zygostates multiflora** (Rolfe) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Ornithocephalus myrticola Lindl.
Sin.: *Ornithocephalus pygmaeus* Rchb. f. & Warm., *Ornithocephalus reitzii* Pabst
Referencias: Klein, R. M., 1979; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953, 1966; Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1618* (NY), *Reitz, P. R. 4419* (HB)].

Ornithocephalus pseudobulbifer Barb. Rodr. = **Dipteranthus pellucidus** (Rchb. f.) Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1901.

Ornithocephalus pustulatus Kraenzl. = **Dipteranthus pustulatus** (Kraenzl.) Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J., 1962.

Ornithocephalus pygmaeus Rchb. f. & Warm. = **Ornithocephalus myrticola** Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1953.

Ornithocephalus reitzii Pabst = **Ornithocephalus myrticola** Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Ornithophora Barb. Rodr.

Número de especies: 1

Ornithophora quadricolor Barb. Rodr. = **Ornithophora radicans** (Rchb. f.) Garay & Pabst
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Ornithophora radicans (Rchb. f.) Garay & Pabst
Sin.: *Ornithophora quadricolor* Barb. Rodr., *Sigmatostalyx radicans* Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1962; Schlechter, F. R. R., 1925; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18636* (MBM, NY)].

Pabstia Garay

Número de especies: 2

Pabstia jugosa (Lindl.) Garay
Sin.: *Colax jugosus* (Lindl.) Lindl., *Lycaste jugosa* (Lindl.) Nichols, *Maxillaria jugosa* Lindl., *Zygopetalum jugosum* (Lindl.) Schltr.
Referencias: Castro Neto, V. P. & Campacci, M. A., 2004; Castro Neto, V. P., 1993.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hoehne, F. C. 1128* (SP)].

[Pabstia modestior (Rchb. f.) Garay]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Pabstia viridis (Lindl.) Garay
Sin.: *Colax puydtii* Lindl. & André, *Colax viridis* (Lindl.) Lindl., *Colax viridis* (Lindl.) Lindl. var. *pluriflora* (Lindl.) Schltr., *Lycaste puydtii* (Lindl. & André) Nichols, *Lycaste viridis* (Lindl.) Benth., *Maxillaria placanthera* Hook., *Maxillaria viridis* Lindl., *Zygopetalum viridis* (Lindl.) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Pabstiella Brieger & Senghas

Número de especies: 38, 9 endémicas

Pabstiella alligatorifera (Rchb. f.) Luer
Sin.: *Acianthera alligatorifera* (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase, *Lepanthes blumenavii* Barb. Rodr., *Pleurobotryum blumenavii* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis alligatorifera* Rchb. f., *Pleurothallis blumenavii* Cogn., *Specklinia alligatorifera* (Rchb. f.) Luer
Referencias: Hoehne, F. C., 1929; Luer, C. A., 2004; Schlechter, F. R. R., 1925; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1069* (SI)].

Pabstiella arcuata (Lindl.) Luer
Sin.: *Humboldtia arcuata* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis arcuata* Lindl., *Pleurothallis ocellata* Porsch, *Specklinia arcuata* (Lindl.) Luer, *Stelis arcuata* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Hatschbach, G., 1974; Luer, C. A., 2007; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16218* (MBM)].

Pabstiella aveniformis (Hoehne) Luer
Sin.: *Pleurothallis aveniformis* Hoehne, *Specklinia aveniformis* (Hoehne) Luer, nom. illeg.
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952; Hoehne, F. C., 1950a; Leinig, M., 1964; Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 1019* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2683* (SI)].

Pabstiella bacillaris (Pabst) Luer
Sin.: *Pleurothallis bacillaris* Pabst, *Specklinia bacillaris* (Pabst) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2332* (HB, MBM)].

Pabstiella bradei (Schltr.) Luer
Sin.: *Pleurothallis bradei* Schltr., *Specklinia bradei* (Schltr.) Luer
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Luer, C. A., 2007; Schlechter, F. R. R., 1922.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 1000–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Brade, A. C. 6874* (HB)].

Pabstiella calcarata (Cogn.) Luer
Sin.: *Pleurothallis calcarata* Cogn., *Pleurothallis mentigera* Kraenzl.
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Luer, C. A., 2007; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16023* (HB, MBM)].

Pabstiella campestris (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Pleurothallis campestris* Barb. Rodr., *Specklinia campestris* (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004, 2007.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 1035* (G)].

Pabstiella carinifera (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Lepanthes carinifera* Barb. Rodr., *Pleurothallis carinifera* (Barb. Rodr.) Cogn., *Trichosalpinx carinifera* (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2007; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2800* (HB, MBM)].

Pabstiella curtii-bradei (Pabst) Luer
Sin.: *Pleurothallis curtii-bradei* Pabst, *Pleurothallis curtii-bradei* Pabst var. *minor* (Schltr. & Hoehne) Pabst, *Pleurothallis microcharis* Schltr. ex Hoehne, *Specklinia curtii-bradei* (Pabst) Luer, *Trichosalpinx curtii-bradei* (Pabst) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004, 2007; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Tessmann, G. 3750* (MBM)].

Pabstiella dryadum (Schltr.) Luer
Sin.: *Pleurothallis dryadum* Schltr., *Pleurothallis maculosa* Garay, *Specklinia dryadum* (Schltr.) Luer
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Luer, C. A., 2004, 2008; Schlechter, F. R. R., 1922.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1999* (SP)].

Pabstiella hians (Lindl.) Luer
Sin.: *Pleurothallis hians* Lindl., *Specklinia hians* (Lindl.) Luer, *Stelis hians* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004, 2007.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2963* (SI)].

Pabstiella hypnicola (Lindl.) Luer
Sin.: *Humboldtia hypnicola* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis cuneifolia* Cogn., *Pleurothallis hypnicola* Lindl., *Specklinia hypnicola* (Lindl.) F. Barros, nom. illeg., *Specklinia hypnicola* (Lindl.) Luer, *Stelis hypnicola* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Barros, F., 1983; Luer, C. A., 2007; Sprunger, S., 1996; Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 29660* (MBM)].

Pabstiella mirabilis (Schltr.) Brieger & Senghas
Sin.: *Anthereon mirabilis* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis longicornu* Kraenzl., *Pleurothallis mirabilis* Schltr., *Specklinia mirabilis* (Schltr.) Luer
Referencias: Barros, F., 2002b; Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 17264* (NY)].

Pabstiella mouraeoides (Hoehne) Luer var. **mouraeoides**
Sin.: *Pleurothallis mouraeoides* Hoehne, *Trichosalpinx mouraeoides* (Hoehne) Luer
Referencias: Barros, F., 1983; Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952; Hoehne, F. C., 1938; Luer, C. A., 2007; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3308* (HB, MBM)].

Pabstiella mouraeoides Hoehne var. **riograndensis** Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 800–1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 30983* (PACA)].

Pabstiella parvifolia (Lindl.) Luer
Sin.: *Acianthera parvifolia* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, *Humboldtia parvifolia* (Lindl.) Kuntze, *Lepanthes cryptophyta* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis parvifolia* Lindl., *Pleurothallis succedanea* Hoehne & Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 2002; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 8122* (HBR)].

Pabstiella pellifeloides (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Lepanthes pellifeloides* Barb. Rodr., *Pleurothallis pellifeloides* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia pellifeloides* (Barb. Rodr.) Luer, *Stelis pellifeloides* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Luer, C. A., 2004, 2007; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 8738* (MBM)].

Pabstiella pleurothalloides (Cogn.) Luer
Sin.: *Pleurothallis edwallii* Dusén & Schltr., *Pleurothallis pleurothalloides* (Cogn.) Handro, *Restrepia pleurothalloides* Cogn., *Specklinia pleurothalloides* (Cogn.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004, 2007.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Brade, A. C. 7868* (HB)].

Pabstiella podoglossa (Hoehne) Luer
Sin.: *Pleurothallis podoglossa* Hoehne, *Specklinia podoglossa* (Hoehne) Luer, *Trichosalpinx podoglossa* (Hoehne) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004, 2007; Waechter, J. L., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Waechter, J. L. 1609* (ICN)].

Pabstiella pristeoglossa (Rchb. f. & Warm.) Luer
Sin.: *Pleurothallis pristeoglossa* Rchb. f. & Warm., *Specklinia pristeoglossa* (Rchb. f. & Warm.) Luer
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Luer, C. A., 2004, 2007.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Feigl, F. 256* (HB)].

Pabstiella punctatifolia (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Lepanthes punctatifolia* Barb. Rodr., *Pleurothallis punctata* Lindl., *Pleurothallis punctatifolia* (Barb. Rodr.) Pabst
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Luer, C. A., 2002.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2444* (MBM)].

Pabstiella quadridentata (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Lepanthes bicolor* Barb. Rodr., *Lepanthes quadridentata* Barb. Rodr., *Pleurothallis bicolor* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis mouraei* Cogn., *Pleurothallis palmeirensis* Pabst, *Pleurothallis quadridentata* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia quadridentata* (Barb. Rodr.) Luer, *Trichosalpinx bicolor* (Barb. Rodr.) Luer, *Trichosalpinx quadridentata* (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004, 2007; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10873* (HB)].

Pabstiella sordida (Kraenzl.) Luer
Sin.: *Pleurothallis sordida* Kraenzl., *Specklinia sordida* (Kraenzl.) Luer, *Trichosalpinx sordida* (Kraenzl.) Luer
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Leinig, M., 1964; Luer, C. A., 1997, 2007.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lange, R. T. 8531* (MBM, NY, S)].

Pabstiella sparsiflora (Schltr.) Luer
Sin.: *Pleurothallis sparsiflora* Schltr., *Specklinia sparsiflora* (Schltr.) Luer

Referencias: Luer, C. A., 2007.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 895* (ICN, SI)].

Pabstiella tenera (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Lepanthes tenera* Barb. Rodr., *Pleurothallis tenera* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia tenera* (Barb. Rodr.) Luer, *Trichosalpinx tenera* (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lindman, C. A. M. 451* (ICN)].

Pabstiella tricolor (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Lepanthes tricolor* Barb. Rodr., *Pleurothallis tricolor* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia tricolor* (Barb. Rodr.) Luer, *Stelis tricolor* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Pabstiella trifida (Lindl.) Luer
Sin.: *Lepanthes armeniaca* Barb. Rodr., *Pleurothallis armeniaca* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis bicristata* Cogn., *Pleurothallis curtii* Schltr., *Pleurothallis trifida* Lindl., *Specklinia trifida* (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kummrow, R. 2083* (MBM, SP)].

Pabstiella tripterantha (Rchb. f.) F. Barros
Sin.: *Anthereon tripteranthus* (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis procumbens* Lindl., *Pleurothallis trialata* Cogn., *Pleurothallis tripterantha* Rchb. f., *Specklinia tripterantha* (Rchb. f.) Luer
Referencias: Barros, F., 2002b; Johnson, A. E., 2001; Luer, C. A., 2000c, 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 440* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 16880* (C)].

Pabstiella uniflora (Lindl.) Luer
Sin.: *Lepanthes ramphastorhyncha* Barb. Rodr., *Pleurothallis colorata* Pabst, *Pleurothallis guttulata* Barb. Rodr., *Pleurothallis leontoglossa* Rchb. f., *Pleurothallis ramphastorhyncha* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis uniflora* Lindl., *Specklinia leontoglossa* (Rchb. f.) Luer, *Specklinia uniflora* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2002, 2007.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Seidel, A. 1154* (HB)].

Pabstiella vellozoana (Schltr.) Luer
Sin.: *Pleurothallis vellozoana* Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 2007; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 100–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1446* (SP)].

Pabstiella wackettii (Handro & Pabst) Luer
Sin.: *Pleurothallis wackettii* Handro & Pabst, *Specklinia wacketii* (Handro & Pabst) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004, 2007.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13121* (MBM)].

Pachygenium (Schltr.) Szlach., R. González & Rutkowski

Número de especies: 8, 4 endémicas

Pachygenium bonariensis (Lindl.) Szlach., R. González & Rutk.
Sin.: *Gyrostachys bonariensis* (Lindl.) Kuntze, *Pelexia bonariensis* (Lindl.) Schltr., *Pelexia bonariensis* (Lindl.) Schltr. var. *bombylifera* Rchb. f. & Warm., *Pelexia bonariensis* (Lindl.) Schltr. var. *robusta* Cogn., *Pelexia callosa* M.N. Correa, *Pelexia saltensis* (Griseb.) Schltr., *Spiranthes bonariensis* Lindl., *Spiranthes saltensis* Griseb., *Stenorrhynchos bonariense* (Lindl.) Cogn., *Stenorrhynchos saltensis* (Griseb.) Cogn.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Szlachetko, D. L., González Tamayo, R. & Rutkowski, P., 2001.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(CEN, GUA, PAI); URY(MAL, MON, ROC, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 8330* (SI)]; BRA[*Leite, J. E. 427* (NY)]; PRY[*Burkart, A. 20095* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 2628* (RB)].

Pachygenium burgeri (Schltr.) Szlach., R. González & Rutkowski
Sin.: *Pelexia burgeri* Schltr.
Referencias: Schlechter, F. R. R., 1925; Szlachetko, D. L., González Tamayo, R. & Rutkowski, P., 2001.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Burger, L. 30* (B)].

Pachygenium hysteranthum (Barb. Rodr.) Szlach., R. González & Rutkowski
Sin.: *Pelexia hysterantha* (Barb. Rodr.) Schltr., *Spiranthes hysterantha* Barb. Rodr., *Stenorrhynchos hysteranthum* Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1925; Sprunger, S., 1996; Szlachetko, D. L., González Tamayo, R. & Rutkowski, P., 2001.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lange, N. 8339a* (B)]; PRY[*Hassler, E. 16660b* (*)].

Pachygenium itatiaiae (Schltr.) Szlach., R. González & Rutkowski
Sin.: *Pelexia itatiaiae* Schltr.
Referencias: Schlechter, F. R. R., 1930; Szlachetko, D. L., González Tamayo, R. & Rutkowski, P., 2001.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Campos Porto, P. 1005* (RB)].

Pachygenium laminatum (Schltr.) Szlach., R. González & Rutkowski
Sin.: *Pelexia laminata* Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Hoehne, F. C., 1945; Schlechter, F. R. R., 1922; Szlachetko, D. L., González Tamayo, R. & Rutkowski, P., 2001.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dombrowski, L. T. 6969* (MBM)].

Pachygenium paraguayensis (Garay) Szlach., R. González & Rutk.
Sin.: *Pelexia paraguayensis* Garay, *Pelexia vaginata* (Cogn.) Schltr., *Pelexia vaginata* (Cogn.) Schltr. var. *pauciflorus* Cogn., *Stenorrhynchos vaginatum* Cogn.
Referencias: Szlachetko, D. L., González Tamayo, R. & Rutkowski, P., 2001.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: PRY(CAU, CEN, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9590b* (G)].

Pachygenium sceptrum (Schltr.) Szlach., R. González & Rutkowski
Sin.: *Pelexia sceptrum* Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Szlachetko, D. L., González Tamayo, R. & Rutkowski, P., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 75160* (MBM)].

Pachygenium tenuior (Schltr.) Szlach., R. González & Rutkowski
Sin.: *Pelexia tenuior* Schltr.
Referencias: Szlachetko, D. L., González Tamayo, R. & Rutkowski, P., 2001.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pabst, G. F. J. 12856* (MBM)].

Panmorphia Luer

Número de especies: 13, 2 endémicas

Panmorphia adenochila (Loefgr.) Luer
Sin.: *Anathallis aquinoi* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis adenochila* Loefgr., *Pleurothallis aquinoi* Schltr., *Pleurothallis globifera* Pabst, *Specklinia adenochila* (Loefgr.) Luer
Referencias: Barros, F., 2003; Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 865* (ICN, SI)].

Panmorphia bleyensis (Pabst) Luer
Sin.: *Anathallis bleyensis* (Pabst) F. Barros, *Pleurothallis bleyensis* Pabst, *Specklinia bleyensis* (Pabst) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 12485* (HB, MBM)].

Panmorphia brevipes (H. Focke) Luer
Sin.: *Anathallis modesta* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Lepanthes modesta* Barb. Rodr., *Panmorphia modesta* (Barb. Rodr.) Luer, *Pleurothallis brevipes* H. Focke, *Pleurothallis modesta* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia modesta* (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2814* (HB)].

Panmorphia ciliolata (Schltr.) Luer
Sin.: *Anathallis ciliolata* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis ciliolata* Schltr., *Specklinia ciliolata* (Schltr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, A. 83* (B)].

Panmorphia corticicola (Schltr. ex Hoehne) Luer
Sin.: *Anathallis corticicola* (Schltr. ex Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis corticicola* Schltr. ex Hoehne, *Specklinia corticicola* (Schltr. ex Hoehne) Luer
Referencias: Fraga Nunes, V., 1997; Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2330* (SI)].

Panmorphia laciniata (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Lepanthes laciniata* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr., *Pleurothallis laciniata* Barb. Rodr., *Specklinia laciniata* (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–900 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Fertsch, D. 89* (HB)].

Panmorphia limbata (Cogn.) Luer
Sin.: *Pleurothallis limbata* Cogn., *Specklinia limbata* (Cogn.) Luer
Referencias: Johnson, A. E., 2001; Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 254* (CTES)].

Panmorphia microblephara (Schltr.) Luer
Sin.: *Anathallis microblephara* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis microblephara* Schltr., *Specklinia microblephara* (Schltr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica.

Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. s.n.* (*)].

Panmorphia microgemma (Schltr.) Luer
Sin.: *Anathallis microgemma* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis microgemma* Schltr.
Referencias: Hatschbach, G., 1974; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13117* (HB, MBM)].

Panmorphia modesta (Barb. Rodr.) Luer = **Panmorphia brevipes** (H. Focke) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2006.

Panmorphia paranaensis (Schltr.) Luer
Sin.: *Anathallis paranaensis* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis paranaensis* Schltr., *Specklinia paranaensis* (Schltr.) Luer
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952; Hoehne, F. C., 1929; Luer, C. A., 2004; Schlechter, F. R. R., 1918.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 21332* (HB)].

Panmorphia rubrolimbata (Hoehne) Luer
Sin.: *Pleurothallis rubrolimbata* Hoehne, *Specklinia rubrolimbata* (Hoehne) Luer
Referencias: Klein, R. M., 1979; Luer, C. A., 2004, 2006; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6104* (HB)].

Panmorphia rudolfii (Pabst) Luer
Sin.: *Anathallis rudolfii* (Pabst) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis rudolfii* Pabst, *Specklinia rudolfii* (Pabst) Luer
Referencias: Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004; Waechter, J. L., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Waechter, J. L. 636* (ICN)].

Panmorphia seriata (Lindl.) Luer
Sin.: *Pleurothallis seriata* Lindl., *Pleurothallis sphaeroglossa* Hoehne, *Specklinia seriata* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2002, 2006.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gatti, G. 331* (SP)].

Paradisanthus Rchb. f.
Número de especies: 2

Paradisanthus bahiensis Rchb. f.
Sin.: *Paradisanthus micranthus* (Barb. Rodr.) Schltr., *Paradisanthus paranaensis* Barb. Rodr., *Zygopetalum micranthum* Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Toscano de Brito, A. L. V., Cribb, P. J. & Smidt, E. C., 2005.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, S. M. 31282* (NY)].

Paradisanthus micranthus (Barb. Rodr.) Schltr. = **Paradisanthus bahiensis** Rchb. f.
Referencias: Toscano de Brito, A. L. V., Cribb, P. J. & Smidt, E. C., 2005.

Paradisanthus mosenii Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 43588* (MBM, NY, SPF)].

Paradisanthus paranaensis Barb. Rodr. = **Paradisanthus bahiensis** Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Parlatorea discolor Barb. Rodr. = **Sanderella discolor** (Barb. Rodr.) Cogn.
Referencias: Correa, M. N., 1984h.

Pelexia Poit. ex Lindl., nom. cons.
Número de especies: 22, 12 endémicas

[Pelexia adnata (Sw.) Spreng.]
Sin.: *Satyrium adantum* Sw.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Pelexia albicans (Cogn.) Schltr.
Sin.: *Stenorrhynchos albicans* Cogn.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Hoehne, F. C., 1945.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9489* (G)].

Pelexia berroana (Kraenzl.) Schltr. = **Skeptrostachys berroana** (Kraenzl.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Pelexia bonariensis (Lindl.) Schltr. = **Pachygenium bonariensis** (Lindl.) Szlach., R. González & Rutk.

Pelexia bonariensis (Lindl.) Schltr. var. *bombylifera* Rchb. f. & Warm. = **Pachygenium bonariensis** (Lindl.) Szlach., R. González & Rutk.

Pelexia bonariensis (Lindl.) Schltr. var. *robusta* Cogn. = **Pachygenium bonariensis** (Lindl.) Szlach., R. González & Rutk.

Pelexia burgeri Schltr. = **Pachygenium burgeri** (Schltr.) Szlach., R. González & Rutkowski
Referencias: Szlachetko, D. L., González Tamayo, R. & Rutkowski, P., 2001.

Pelexia callosa M.N. Correa = **Pachygenium bonariensis** (Lindl.) Szlach., R. González & Rutk.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Pelexia collocaliae Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1995c.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4472* (BM)].

Pelexia dolichorhiza Schltr. = **Pelexia pterygantha** (Rchb. f. & Warm.) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Pelexia ekmanii (Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes ekmanii* (Kraenzl.) Hauman, *Stenorrhynchos ekmanii* Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1955; Hoehne, F. C., 1945; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1920.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(RGS); PRY(AMA, CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 41* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 44676* (CTES)]; PRY[*Burkart, A. 18727* (SI)].

Pelexia foliosa Poepp. & Endl. = **Aspidogyne foliosa** (Poepp. & Endl.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1977.

Pelexia glazioviana Cogn. = **Pteroglossa glazioviana** (Cogn.) Garay

Pelexia glazioviana Cogn. var. *paraguayensis* Cogn. = **Pteroglossa glazioviana** (Cogn.) Garay

Pelexia gracilis Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Hoehne, F. C., 1945; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Burger, L. 14* (B)].

Pelexia hypnophila (Barb. Rodr.) Schltr. = **Pelexia novofriburgensis** (Rchb. f.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Pelexia hysterantha (Barb. Rodr.) Schltr. = **Pachygenium hysteranthum** (Barb. Rodr.) Szlach., R. González & Rutkowski
Referencias: Szlachetko, D. L., González Tamayo, R. & Rutkowski, P., 2001.

Pelexia incurvidens Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Jürgens, C. 51* (B)].

Pelexia itatiaiae Schltr. = **Pachygenium itatiaiae** (Schltr.) Szlach., R. González & Rutkowski
Referencias: Szlachetko, D. L., González Tamayo, R. & Rutkowski, P., 2001.

Pelexia laminata Schltr. = **Pachygenium laminatum** (Schltr.) Szlach., R. González & Rutkowski
Referencias: Szlachetko, D. L., González Tamayo, R. & Rutkowski, P., 2001.

Pelexia laxa (Poepp. & Endl.) Lindl.
Sin.: *Stenorrhynchos laxum* Poepp. & Endl.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Johnson, A. E., 2001.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2921* (SI)].

Pelexia lindmaniana (Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Stenorrhynchos lindmanianum* Kraenzl.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 300–800 m.
Países: ARG(CHA); BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 587* (CTES, SP)]; BRA[*Hatschbach, G. 31831* (HBR, MBM)].

Pelexia lindmanii Kraenzl.
Sin.: *Pelexia stictophylla* Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1955; Garay, L. A., 1982[1980]; Johnson, A. E., 2001; Schlechter, F. R. R., 1920, 1925.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 1886* (CTES, SI)]; BRA[*Lindman, N. A. 1041* (S)]; PRY[*Woolston, A. L. 756* (SI)].

Pelexia loefgrenii (Porsch) Schltr.
Sin.: *Stenorrhynchos loefgrenii* Porsch
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10907* (HB)].

Pelexia macropoda (Barb. Rodr.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes macropoda* Barb. Rodr., *Stenorrhynchos macropodum* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15186* (MBM)].

Pelexia magdalenensis Brade & Pabst = **Sarcoglottis magdalenensis** (Brade & Pabst) Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J., 1973a.

Pelexia novofriburgensis (Rchb. f.) Garay
Sin.: *Pelexia hypnophila* (Barb. Rodr.) Schltr., *Spiranthes hypnophila* Barb. Rodr., *Stenorrhynchos hypnophilum* Barb. Rodr., *Stenorrhynchos novofriburgense* Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1955; Garay, L. A., 1982[1980]; Sprunger, S., 1996.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 100–1200 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 759* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13399* (NY)].

Pelexia oestrifera (Rchb. f. & Warm.) Schltr.
Sin.: *Gyrostachys oestrifera* (Rchb. f. & Warm.) Kuntze, *Spiranthes oestrifera* Rchb. f. & Warm., *Stenorrhynchos oestriferum* (Rchb. f. & Warm.) Cogn., *Stenorrhynchos oestriferum* (Rchb. f. & Warm.) Cogn. var. *minor* Kraenzl.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 10727* (MBM, NY)].

[Pelexia olivacea Rolfe]
Referencias: Correa, M. N., 1955.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Pelexia orobanchoides (Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes orobanchoides* Kraenzl., *Stenorrhynchos orobanchoides* Kraenzl.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1919.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2900* (SI), *Hatschbach, G. 9559* (HB, MBM)].

Pelexia orthosepala (Rchb. f. & Warm.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes orthosepala* Rchb. f. & Warm.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 500–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15998* (NY)].

Pelexia ovatifolia M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1953, 1955.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 500–600 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 4686* (LIL)].

Pelexia paludosa M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1953, 1955.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 1714* (SI)].

Pelexia paraguayensis Garay = **Pachygenium paraguayensis** (Garay) Szlach., R. González & Rutk.

Pelexia polyantha Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1951.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Brade, A. C. 8060* (HB)].

Pelexia pterygantha (Rchb. f. & Warm.) Schltr.
Sin.: *Pelexia dolichorhiza* Schltr., *Spiranthes pterygantha* Rchb. f. & Warm., *Stenorrhynchos pteryganthum* (Rchb. f. & Warm.) Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Brade, A. C. 19679* (RB), *Dusén, P. K. H. 18150* (NY)].

Pelexia robusta (Kraenzl.) Hoehne
Sin.: *Stenorrhynchos robustum* Kraenzl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1920.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 7218* (S)].

Pelexia roseo-alba Rchb. f. = **Eltroplectris roseoalba** (Rchb. f.) Hamer & Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Pelexia saltensis (Griseb.) Schltr. = **Pachygenium bonariensis** (Lindl.) Szlach., R. González & Rutk.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Pelexia sceptrum Schltr. = **Pachygenium sceptrum** (Schltr.) Szlach., R. González & Rutkowski
Referencias: Szlachetko, D. L., González Tamayo, R. & Rutkowski, P., 2001.

Pelexia setacea Lindl. = **Eltroplectris calcarata** (Sw.) Garay & Sweet
Referencias: Garay, L. A., 1978, 1982[1980].

Pelexia stictophylla Schltr. = **Pelexia lindmanii** Kraenzl.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Pelexia tamanduensis (Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Stenorrhynchos holosericeum* Kraenzl., *Stenorrhynchos tamanduense* Kraenzl.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Schlechter, F. R. R., 1920.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 2765* (R, SI)].

Pelexia tenuior Schltr. = **Pachygenium tenuior** (Schltr.) Szlach., R. González & Rutkowski
Referencias: Szlachetko, D. L., González Tamayo, R. & Rutkowski, P., 2001.

Pelexia travassosii Rolfe = **Eltroplectris travassosii** (Rolfe) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Pelexia triloba Lindl. = **Eltroplectris triloba** (Lindl.) Pabst
Referencias: Szlachetko, D. L., 1995b.

Pelexia vaginata (Cogn.) Schltr. = **Pachygenium paraguayensis** (Garay) Szlach., R. González & Rutk.

Pelexia vaginata (Cogn.) Schltr. var. *pauciflorus* Cogn. = **Pachygenium paraguayensis** (Garay) Szlach., R. González & Rutk.

Pelexia ventricosa (Cogn.) Schltr.
Sin.: *Stenorrhynchos ventricosum* Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1903; Garay, L. A., 1982[1980]; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAU, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4639* (BM, G)].

Pelexia viridis (Cogn.) Schltr.
Sin.: *Stenorrhynchos viride* Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 28753* (MBM)].

Phloeophila Hoehne & Schltr.

Número de especies: 1 endémica

Phloeophila echinantha (Barb. Rodr.) Garay = **Phloeophila nummularia** (Rchb. f.) Garay
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Phloeophila echinantha (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase, comb. superfl. = **Phloeophila nummularia** (Rchb. f.) Garay
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Phloeophila hystrix (Kraenzl.) Garay = **Apoda-prorepentia hystrix** (Kraenzl.) Luer

Phloeophila nummularia (Rchb. f.) Garay
Sin.: *Phloeophila echinantha* (Barb. Rodr.) Garay, *Phloeophila echinantha* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase, comb. superfl., *Phloeophila paulensis* Hoehne & Schltr., *Physosiphon echinanthus* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis echinantha* Barb. Rodr., *Pleurothallis nummularia* Rchb. f., *Pleurothallis paulensis* (Hoehne & Schltr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2002; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 100–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. 21* (HBR)].

Phloeophila paulensis Hoehne & Schltr. = **Phloeophila nummularia** (Rchb. f.) Garay
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Phloeophila pubescens (Barb. Rodr.) Garay = **Sarracenella pubescens** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Barros, F., 2003.

Phloeophila similis (Schltr.) Garay = **Apoda-prorepentia hystrix** (Kraenzl.) Luer

Phymatidium Lindl.

Número de especies: 6, 2 endémicas

Phymatidium aquinoi Schltdl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Burkart, A. 25085* (SI)].

Phymatidium delicatulum Lindl. var. **curvicepalum** Toscano
Referencias: Toscano de Brito, A. L. V., 1994.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kummrow, R. 1582* (SP)].

Phymatidium delicatulum Lindl. var. **delicatulum**
Sin.: *Ornithocephalus microphyllus* Barb. Rodr., *Phymatidium denti-culatum* Steud., *Phymatidium microphyllum* (Barb. Rodr.) Toscano
Referencias: Johnson, A. E., 2001; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 405* (BAB)]; BRA[*Krapovickas, A. 40369* (CTES)]; PRY[*Schinini, A. 31355* (CTES)].

Phymatidium denti-culatum Steud. = **Phymatidium delicatulum** Lindl. var. **delicatulum**
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Phymatidium falcifolium Lindl.
Sin.: *Phymatidium tillandsioides* Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 8185* (HB)].

Phymatidium herteri Schltr. = **Phymatidium paranaense** A. Samp.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Phymatidium hysteranthum Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kuniyoshi, Y. S. 4079* (MBM, SP)].

Phymatidium microphyllum (Barb. Rodr.) Toscano = **Phymatidium delicatulum** Lindl. var. **delicatulum**

Phymatidium microphyllum Barb. Rodr. var. *herteri* (Schltr.) Toscano = **Phymatidium paranaense** A. Samp.
Referencias: Toscano de Brito, A. L. V., 1994.

Phymatidium myrtophilum Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1953; Schlechter, F. R. R., 1926.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1130* (ICN, SI)].

Phymatidium paranaense A. Samp.
Sin.: *Phymatidium herteri* Schltr., *Phymatidium microphyllum* Barb. Rodr. var. *herteri* (Schltr.) Toscano
Referencias: Klein, R. M., 1979; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1052* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 26245* (B, MVM)].

Phymatidium tillandsioides Barb. Rodr. = **Phymatidium falcifolium** Lindl.

Physosiphon bragae Ruschi = **Sarracenella pubescens** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Barros, F., 2003.

Physosiphon deregularis (Barb. Rodr.) Cogn. = **Pseudostelis spiralis** (Lindl.) Schltr.

Physosiphon echinanthus (Barb. Rodr.) Cogn. = **Phloeophila nummularia** (Rchb. f.) Garay
Referencias: Luer, C. A., 2002; Sprunger, S., 1996.

Physosiphon hystrix Kraenzl. = **Apoda-prorepentia hystrix** (Kraenzl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Physosiphon minutiflorus Ames & Schweinf. = **Pseudostelis spiralis** (Lindl.) Schltr.

Physosiphon pubescens Barb. Rodr. = **Sarracenella pubescens** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Barros, F., 2003.

Physosiphon spiralis Lindl. = **Pseudostelis spiralis** (Lindl.) Schltr.

Physurus arietinus Rchb. f. & Warm. = **Microchilus arietinus** (Rchb. f. & Warm.) Ormd.
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Physurus austrobrasiliensis Porsch = **Microchilus austrobrasiliensis** (Porsch) Ormd.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Physurus bicolor Barb. Rodr. = **Aspidogyne bicolor** (Barb. Rodr.) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977.

Physurus bidentiferus Schltr. = **Aspidogyne bidentifera** (Schltr.) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977.

Physurus callodictyus Kraenzl. = **Aspidogyne argentea** (Vell.) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a.

Physurus commelinoides Barb. Rodr. = **Erythrodes commelinoides** (Barb. Rodr.) Ames
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977.

Physurus densiflorus Lindl. = **Aspidogyne foliosa** (Poepp. & Endl.) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a.

Physurus dichopetalus Kraenzl. = **Aspidogyne kuczynskii** (Porsch) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Correa, M. N., 1995.

Physurus fimbrillaris Buyss. = **Aspidogyne fimbrillaris** (Buyss.) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977.

Physurus foliosus (Poepp. & Endl.) Lindl. = **Aspidogyne foliosa** (Poepp. & Endl.) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977.

Physurus juruensis Hoehne = **Ligeophila juruensis** (Hoehne) Garay
Referencias: Correa, M. N., 1995; Garay, L. A., 1977.

Physurus kuczynskii Porsch = **Aspidogyne kuczynskii** (Porsch) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977.

Physurus lindleyanus Cogn. = **Aspidogyne lindleyana** (Cogn.) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977.

Physurus lindmanii Kraenzl. = **Aspidogyne lindleyana** (Cogn.) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977.

Physurus longicalcaratus Schltr. = **Aspidogyne longicornu** (Cogn.) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a.

Physurus longicornu Cogn. = **Aspidogyne longicornu** (Cogn.) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977.

Physurus malmei Kraenzl. = **Aspidogyne malmei** (Kraenzl.) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977.

Physurus micranthus Kraenzl. = **Microchilus arietinus** (Rchb. f. & Warm.) Ormd.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Physurus nobilis Rchb. f. = **Aspidogyne fimbrillaris** (Buyss.) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977.

Physurus nobilis Rchb. f. var. *argyrocentrus* Hoehne = **Aspidogyne fimbrillaris** (Buyss.) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a.

Physurus paranaensis (Kraenzl.) Schltr. = **Platythelys paranaensis** (Kraenzl.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1977.

Physurus pictus Lindl. = **Aspidogyne argentea** (Vell.) Garay
Referencias: Campacci, M. A., 2003a; Garay, L. A., 1977.

Physurus platensis Hauman = **Platythelys platensis** (Hauman) Garay
Referencias: Correa, M. N., 1996.

Physurus roseus Lindl. = **Ligeophila rosea** (Lindl.) Garay
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Physurus schlechterianus Hoehne = **Platythelys schlechteriana** (Hoehne) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1977.

Platyrhiza Barb. Rodr.

Número de especies: 1

Platyrhiza juergensii Schltr. = **Platyrhiza quadricolor** Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Platyrhiza quadricolor Barb. Rodr.
Sin.: *Platyrhiza juergensii* Schltr.
Referencias: Fraga Nunes, V., 1997; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 887* (ICN, SI)].

Platystele Schltr.

Número de especies: 1 endémica

Platystele brasiliensis Brade = **Platystele oxyglossa** (Schltr.) Garay
Referencias: Waechter, J. L., 1986.

Platystele oxyglossa (Schltr.) Garay
Sin.: *Platystele brasiliensis* Brade, *Platystele pygmaea* (Hoehne) Pabst, *Pleurothallis oxyglossa* Schltr., *Pleurothallis pygmaea* Hoehne
Referencias: Luer, C. A., 1990; Vásquez, R. & Ibisch, P. L., 2000; Waechter, J. L., 1998.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 800–1500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. 2099* (SP)].

Platystele pygmaea (Hoehne) Pabst = **Platystele oxyglossa** (Schltr.) Garay
Referencias: Luer, C. A., 1990.

Platythelys Garay

Número de especies: 3, 1 endémica

Platythelys paranaensis (Kraenzl.) Garay
Sin.: *Erythrodes paranaensis* (Kraenzl.) Pabst, *Physurus paranaensis* (Kraenzl.) Schltr., *Wullschlaegelia paranaensis* Kraenzl.
Referencias: Garay, L. A., 1977; Kraenzlin, F. W. L., 1911.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2770* (SI)].

Platythelys platensis (Hauman) Garay
Sin.: *Erythrodes platensis* (Hauman) L.O. Williams, *Physurus platensis* Hauman
Referencias: Burkart, A., 1957c; Garay, L. A., 1977.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hurrell, J. A. 5325* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 3266* (SP)].

Platythelys schlechteriana (Hoehne) Garay
Sin.: *Erythrodes schlechteriana* (Hoehne) Pabst, *Physurus schlechterianus* Hoehne
Referencias: Garay, L. A., 1977; Hoehne, F. C., 1945.
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 300–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20122* (HB, MBM, NY)].

Pleurobotryum Barb. Rodr.

Número de especies: 6, 3 endémicas

Pleurobotryum albopurpurea (Kraenzl.) Garay
Sin.: *Pleurothallis albopurpurea* Kraenzl.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1921b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 8516* (MBM, NY, S)].

Pleurobotryum atropurpureum Barb. Rodr.
Sin.: *Pleurothallis teretifolia* Rolfe
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1921b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 12817* (NY)].
Notas: Citado erróneamente para Misiones, Argentina, sobre la base de material no perteneciente a esta especie (Correa, 1975b, 1976).

Pleurobotryum blumenavii (Barb. Rodr.) Cogn. = **Pabstiella alligatorifera** (Rchb. f.) Luer

Pleurobotryum crepinianum (Cogn.) Hoehne
Sin.: *Pleurothallis crepiniana* Cogn.
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952b.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 40252* (HB, MBM)].

Pleurobotryum hatschbachii (Schltr.) Hoehne
Sin.: *Pleurothallis hatschbachii* Schltr.
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952; Correa, M. N., 1976; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 300–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 549* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15470* (MBM)].

Pleurobotryum mantiquyranum (Barb. Rodr.) Hoehne
Sin.: *Pleurothallis mantiquyrana* Barb. Rodr.
Referencias: Luer, C. A., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kuhlmann, M. s.n.* (SP)].

Pleurobotryum rhabdosepalum (Schltr.) Hoehne
Sin.: *Pleurothallis rhabdosepala* Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1996; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1918.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS, SAL); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14343* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 14548* (HB, MBM)].

Pleurothallis R. Br.

Número de especies: 5, 2 endémicas

Pleurothallis acuminatipetala A. Samp. = **Acianthera acuminatipetala** (A. Samp.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis adenochila Loefgr. = **Panmorphia adenochila** (Loefgr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis adirii Brade = **Acianthera adirii** (Brade) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis albida Lindl. = **Anathallis obovata** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Vásquez, R. & Ibisch, P. L., 2000.

Pleurothallis albo-rosea (Kraenzl.) Brade = **Acianthera albo-rosea** (Kraenzl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis albopurpurea Kraenzl. = **Pleurobotryum albopurpurea** (Kraenzl.) Garay
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Pleurothallis alligatorifera Rchb. f. = **Pabstiella alligatorifera** (Rchb. f.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis alopex Luer = **Acronia alopex** Luer

Pleurothallis altoserrana Hoehne = **Acianthera glanduligera** (Lindl.) Luer

Pleurothallis angustilabia Schltr. = **Pleurothallis microphyta** (Barb. Rodr.) Cogn. var. **microphyta**
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Pleurothallis antennata Garay = **Acianthera antennata** (Garay) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis anthoxantha Rchb. f. = **Arthrosia auriculata** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis aphthosa Lindl. = **Acianthera aphthosa** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis aquinoi Schltr. = **Panmorphia adenochila** (Loefgr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis arcuata Lindl. = **Pabstiella arcuata** (Lindl.) Luer

Pleurothallis armeniaca (Barb. Rodr.) Cogn. = **Pabstiella trifida** (Lindl.) Luer

Pleurothallis atropurpurea (Lindl.) Lindl. = **Zootrophion atropurpureum** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis aurantio-lateritia Speg. = **Acianthera aurantio-lateritia** (Speg.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis auriculata Lindl. = **Arthrosia auriculata** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis aveniformis Hoehne = **Pabstiella aveniformis** (Hoehne) Luer

Pleurothallis aviceps (Rchb. f.) Rchb. f. = **Dryadella aviceps** (Rchb. f.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 1978a.

Pleurothallis bacillaris Pabst = **Pabstiella bacillaris** (Pabst) Luer

Pleurothallis barbacenensis Barb. Rodr. = **Arthrosia hygrophila** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Gonçalves, C. N. & Waechter, J. L., 2004.

Pleurothallis barbacenensis Barb. Rodr. var. *angustifolia* (Pabst) Pabst = **Arthrosia hygrophila** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Gonçalves, C. N. & Waechter, J. L., 2004.

Pleurothallis bertoniensis Hauman = **Anathallis bertoniensis** (Hauman) Luer

Pleurothallis bicarinata Lindl. = **Acianthera bicarinata** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis bicolor (Barb. Rodr.) Cogn. = **Pabstiella quadridentata** (Barb. Rodr.) Luer

Pleurothallis bicristata Cogn. = **Pabstiella trifida** (Lindl.) Luer

Pleurothallis bidentula Barb. Rodr. = **Acianthera saundersiana** (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911; Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis biglandulosa Schltr. = **Specklinia grobyi** (Bateman ex Lindl.) F. Barros

Pleurothallis binotii Regel = **Acianthera bicarinata** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis bistuberculata Barb. Rodr. = **Acianthera recurva** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis bleyensis Pabst = **Panmorphia bleyensis** (Pabst) Luer

Pleurothallis blumenavii Cogn. = **Pabstiella alligatorifera** (Rchb. f.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis boliviana Rchb. f. = **Acianthera boliviana** (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Pleurothallis brachiloba Hoehne = **Acianthera brachiloba** (Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis bradei Schltr. = **Pabstiella bradei** (Schltr.) Luer

Pleurothallis brevipes H. Focke = **Panmorphia brevipes** (H. Focke) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2006.

Pleurothallis butantanensis Hoehne & Schltr. = **Acianthera saundersiana** (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis caespitosa Barb. Rodr. = **Acianthera luteola** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis caespitosa Barb. Rodr. var. *platycaulis* (Rchb. f. ex Cogn.) Pabst = **Acianthera luteola** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Pleurothallis calcarata Cogn. = **Pabstiella calcarata** (Cogn.) Luer

Pleurothallis caldensis Hoehne & Schltr. = **Arthrosia caldensis** (Hoehne & Schltr.) Luer

Pleurothallis campestris Barb. Rodr. = **Pabstiella campestris** (Barb. Rodr.) Luer

Pleurothallis capanemae Barb. Rodr. = **Acianthera capanemae** (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis capillaris Lindl. = **Arthrosia floribunda** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis carinifera (Barb. Rodr.) Cogn. = **Pabstiella carinifera** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Cogniaux, C. A., 1896; Luer, C. A., 2007.

Pleurothallis carolii Schltr.
Referencias: Fraga Nunes, V., 1997; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1200 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Yuncker, T. G. 5733* (GH, HB)].

Pleurothallis catharinensis Cogn.
Sin.: , *Specklinia violacea* Lem., *Trichosalpinx violacea* (Lem.) Luer
Referencias: Cogniaux, C. A., 1896; Luer, C. A., 1983.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(SCA).
Notas: Citada para el sur de Brasil por Cogniaux (1896) basándose en la ilustración de Lemaire (Jard. de Fleurs III, Mis. 14, Icon. 1852).

Pleurothallis cearensis Schltr. = **Acianthera glanduligera** (Lindl.) Luer

Pleurothallis chloidophylla Rchb. f. = **Octomeria chloidophylla** (Rchb. f.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1967.

Pleurothallis ciliolata Schltr. = **Panmorphia ciliolata** (Schltr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis citrina Schltr. = **Anathallis citrina** (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis citrina Schltr. var. *elliptica* C. Schweinf. = **Anathallis citrina** (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis colorata Pabst = **Pabstiella uniflora** (Lindl.) Luer

Pleurothallis compressiflora Barb. Rodr. = **Arthrosia auriculata** (Lindl.) Luer

Pleurothallis convallium Kraenzl. = **Anathallis linearifolia** (Cogn.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis convergens R.C.J. Gerard = **Anathallis linearifolia** (Cogn.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 1999.

Pleurothallis convexifolia Barb. Rodr. = **Acianthera wageneriana** (Klotzsch) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis corticicola Schltr. ex Hoehne = **Panmorphia corticicola** (Schltr. ex Hoehne) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis crebifolia (Barb. Rodr.) Cogn. = **Anathallis crebrifolia** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2008.

Pleurothallis crepiniana Cogn. = **Pleurobotryum crepinianum** (Cogn.) Hoehne
Referencias: Pabst, G. F. J., 1952b.

Pleurothallis crinita Barb. Rodr. = **Acianthera crinita** (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis crocea Barb. Rodr. = **Acianthera glumacea** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Pleurothallis cryptantha Barb. Rodr. = **Cryptophoranthus cryptanthus** (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.
Referencias: Luer, C. A., 2002; Sprunger, S., 1996.

Pleurothallis cryptoceras Rchb. f. = **Acianthera glanduligera** (Lindl.) Luer

Pleurothallis cuneifolia Cogn. = **Pabstiella hypnicola** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2000a.

Pleurothallis curitybensis Kraenzl. = **Acianthera recurva** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Vásquez, R. & Ibisch, P. L., 2000.

Pleurothallis curtii-bradei Pabst = **Pabstiella curtii-bradei** (Pabst) Luer

Pleurothallis curtii-bradei Pabst var. *minor* (Schltr. & Hoehne) Pabst = **Pabstiella curtii-bradei** (Pabst) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis curtii Schltr. = **Pabstiella trifida** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004, 2007.

Pleurothallis delicatula Lindl. = **Specklinia delicatula** (Lindl.) Luer

Pleurothallis densiflora (Barb. Rodr.) Cogn. = **Anathallis obovata** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis densiflora (Barb. Rodr.) Cogn. var. *parvifolia* Garay = **Anathallis obovata** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis depauperata Cogn. = **Anathallis linearifolia** (Cogn.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis deregularis (Barb. Rodr.) Luer = **Pseudostelis spiralis** (Lindl.) Schltr.

Pleurothallis dryadum Schltr. = **Pabstiella dryadum** (Schltr.) Luer

Pleurothallis dura Lindl. = **Trichosalpinx dura** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 1997.

Pleurothallis dutrai Pabst = **Acianthera dutrai** (Pabst) C.N. Gonçalves & J.L. Waechter
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis echinantha Barb. Rodr. = **Phloeophila nummularia** (Rchb. f.) Garay

Pleurothallis edwallii Dusén & Schltr. = **Pabstiella pleurothalloides** (Cogn.) Luer

Pleurothallis eugenii Pabst = **Anathallis linearifolia** (Cogn.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis exarticulata Barb. Rodr. = **Acianthera exarticulata** (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Pleurothallis exasperata Lindl. = **Myoxanthus exasperatus** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 1992.

Pleurothallis farinosa Pabst = **Acianthera nemorosa** (Barb. Rodr.) F. Barros
Referencias: Barros, F., 2003.

Pleurothallis fasciculata (Barb. Rodr.) Cogn. = **Anathallis obovata** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Vásquez, R. & Ibisch, P. L., 2000.

Pleurothallis felislingua Barb. Rodr. = **Acianthera saundersiana** (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004; Vásquez, R. & Ibisch, P. L., 2000.

Pleurothallis fenestrata Barb. Rodr. = **Cryptophoranthus fenestratus** (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Pleurothallis fenestrata Barb. Rodr. var. *angustifolius* Cogn. = **Cryptophoranthus fenestratus** (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.

Pleurothallis ferdinandiana (Barb. Rodr.) Cogn. = **Anathallis ferdinandiana** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Barros, F., 2003.

Pleurothallis fernandiana Hoehne = **Specklinia fernandiana** (Hoehne) F. Barros

Pleurothallis floripecten Rchb. f. = **Lepanthopsis floripecten** (Rchb. f.) Ames
Referencias: Luer, C. A., 1991.

Pleurothallis foetens Lindl. = **Acianthera aphthosa** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 1976, 2004.

Pleurothallis foliata Griseb. = **Trichosalpinx dura** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 1997.

Pleurothallis foliosa Hook. = **Gomesa foliosa** (Hook.) Klotzsch ex Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1966.

Pleurothallis gardneri Lindl. = **Barbosella gardneri** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 2000c.

Pleurothallis gert-hatschbachii Hoehne = **Anathallis gert-hatschbachii** (Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis glanduligera Lindl. = **Acianthera glanduligera** (Lindl.) Luer

Pleurothallis glaziovii Cogn. = **Acianthera glumacea** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis globifera Pabst = **Panmorphia adenochila** (Loefgr.) Luer

Pleurothallis glossochila Kraenzl. = **Anathallis linearifolia** (Cogn.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 1999.

Pleurothallis glumacea Lindl. = **Acianthera glumacea** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Pleurothallis gonzalezii Pabst = **Acianthera macuconensis** (Barb. Rodr.) F. Barros
Referencias: Barros, F., 2003.

Pleurothallis gouveiae A. Samp.
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Leinig, M., 1964; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3538* (HB, MBM)].

Pleurothallis gracilisepala Brade = **Acianthera gracilisepala** (Brade) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis grobyi Bateman ex Lindl. = **Specklinia grobyi** (Bateman ex Lindl.) F. Barros
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Pleurothallis grobyi Bateman ex Lindl. var. *marginalis* (Rchb. f.) Pabst = **Specklinia grobyi** (Bateman ex Lindl.) F. Barros
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Pleurothallis grobyi Bateman ex Lindl. var. *marmorata* (Barb. Rodr.) Garay = **Specklinia grobyi** (Bateman ex Lindl.) F. Barros
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Pleurothallis grobyi Bateman ex Lindl. var. *trilineata* (Barb. Rodr.) Cogn. = **Specklinia grobyi** (Bateman ex Lindl.) F. Barros
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Pleurothallis guimaraensii Brade = **Specklinia guimaraensii** (Brade) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis guttulata Barb. Rodr. = **Pabstiella uniflora** (Lindl.) Luer

Pleurothallis hamburgensis Kraenzl. = **Barbosella cogniauxiana** (Speg. & Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 2000c.

Pleurothallis hatschbachii Schltr. = **Pleurobotryum hatschbachii** (Schltr.) Hoehne
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952.

Pleurothallis heterophylla (Barb. Rodr.) Cogn. = **Anathallis liparanges** (Rchb. f.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis hians Lindl. = **Pabstiella hians** (Lindl.) Luer

Pleurothallis hoehnei Schltr. = **Anathallis liparanges** (Rchb. f.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004; Sprunger, S., 1996.

Pleurothallis hoffmannseggiana Rchb. f. = **Acianthera hoffmannseggiana** (Rchb. f.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis hygrophila Barb. Rodr. = **Arthrosia hygrophila** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2006.

Pleurothallis hygrophila Barb. Rodr. var. *elongata* Hauman = **Arthrosia hygrophila** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis hygrophila Barb. Rodr. var. *longicaulis* Dutra ex Pabst = **Arthrosia hygrophila** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis hypnicola Lindl. = **Pabstiella hypnicola** (Lindl.) Luer

Pleurothallis iguapensis Schltr. = **Acianthera glanduligera** (Lindl.) Luer

Pleurothallis imbricata Barb. Rodr. = **Anathallis imbricata** (Barb. Rodr.) Luer

Pleurothallis ipyrangana Schltr.
Referencias: Leinig, M., 1964; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3052* (HB, MBM)].

Pleurothallis josephensis Barb. Rodr. = **Acianthera saundersiana** (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004; Vásquez, R. & Ibisch, P. L., 2000.

Pleurothallis josephensis Barb. Rodr. var. *pillifera* (Hoehne) Hoehne = **Acianthera saundersiana** (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis juergensii Schltr. = **Acianthera saundersiana** (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis karlii Pabst = **Apoda-prorepentia karlii** (Pabst) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis kleinii Pabst = **Anathallis kleinii** (Pabst) Luer

Pleurothallis klotzcheana Rchb. f. = **Acianthera klotzcheana** (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Pleurothallis laciniata Barb. Rodr. = **Panmorphia laciniata** (Barb. Rodr.) Luer

Pleurothallis lamproglossa Schltr. = **Acianthera recurva** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Pleurothallis langeana Kraenzl. = **Cryptophoranthus cryptanthus** (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.

Pleurothallis leontoglossa Rchb. f. = **Pabstiella uniflora** (Lindl.) Luer

Pleurothallis lepanthipoda Hoehne & Schltr. = **Trichosalpinx montana** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 1997.

Pleurothallis leptotifolia Barb. Rodr. = **Specklinia leptotifolia** (Barb. Rodr.) Luer

Pleurothallis leucopyramis Rchb. f. = **Specklinia leucopyramis** (Rchb. f.) Luer

Pleurothallis leucorhoda Schltr. = **Acianthera recurva** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis lilacina Barb. Rodr. var. *microphylla* Barb. Rodr. = **Acianthera recurva** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Vásquez, R. & Ibisch, P. L., 2000.

Pleurothallis limbata Cogn. = **Panmorphia limbata** (Cogn.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis lindleyana Cogn. = **Specklinia grobyi** (Bateman ex Lindl.) F. Barros
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Pleurothallis linearifolia Cogn. = **Anathallis linearifolia** (Cogn.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis liparanges Rchb. f. = **Anathallis liparanges** (Rchb. f.) Luer

Pleurothallis listrostachys Rchb. f. = **Anathallis sclerophylla** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis loefgrenii Cogn. = **Acianthera hoffmannseggiana** (Rchb. f.) Luer

Pleurothallis longicaulis Lindl. = **Arthrosia floribunda** (Lindl.) Luer

Pleurothallis longicornu Kraenzl. = **Pabstiella mirabilis** (Schltr.) Brieger & Senghas

Pleurothallis luteola Lindl. = **Acianthera luteola** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Pleurothallis macrophyta Barb. Rodr. = **Acianthera aphthosa** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Pleurothallis macropoda Barb. Rodr. = **Acianthera macropoda** (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Pleurothallis macropoda Barb. Rodr. var. *laevis* Barb. Rodr. = **Acianthera macropoda** (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Pleurothallis macropus Schltr. = **Myoxanthus exasperatus** (Lindl.) Luer

Pleurothallis macuconensis Barb. Rodr. = **Acianthera macuconensis** (Barb. Rodr.) F. Barros
Referencias: Barros, F., 2003.

Pleurothallis maculosa Garay = **Pabstiella dryadum** (Schltr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis malachantha Rchb. f. = **Arthrosia malachantha** (Rchb. f.) Luer

Pleurothallis malmeana Dutra ex Pabst = **Anathallis malmeana** (Dutra ex Pabst) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis mantiquyrana Barb. Rodr. = **Pleurobotryum mantiquyranum** (Barb. Rodr.) Hoehne
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Pleurothallis margaritifera Schltr. = **Anathallis margaritifera** (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Pleurothallis marginalis Rchb. f. = **Specklinia grobyi** (Bateman ex Lindl.) F. Barros

Pleurothallis marmorata (Barb. Rodr.) Cogn. = **Specklinia grobyi** (Bateman ex Lindl.) F. Barros
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Pleurothallis marumbyana Garay = **Acianthera marumbyana** (Garay) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis matinhensis Hoehne = **Specklinia matinhensis** (Hoehne) Luer

Pleurothallis mentigera Kraenzl. = **Pabstiella calcarata** (Cogn.) Luer

Pleurothallis microblephara Schltr. = **Panmorphia microblephara** (Schltr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis microcharis Schltr. ex Hoehne = **Pabstiella curtii-bradei** (Pabst) Luer

Pleurothallis microgemma Schltr. = **Panmorphia microgemma** (Schltr.) Luer

Pleurothallis microphyta (Barb. Rodr.) Cogn. var. **microphyta**
Sin.: *Anathallis microphyta* (Barb. Rodr.) C.O. Azevedo & C. Berg, *Lepanthes microphyta* Barb. Rodr., *Pleurothallis angustilabia* Schltr., *Specklinia microphyta* (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2002, 2004; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 13443* (HB)].

Pleurothallis microphyta (Barb. Rodr.) Cogn. var. **missionum** Hauman
Referencias: Hauman, L. L., 1921a; Johnson, A. E., 2001.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 200–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 438* (BAB)].

Pleurothallis microtis Schltr. = **Specklinia microtis** (Schltr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis miersii Lindl. = **Barbosella miersii** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 2000c.

Pleurothallis minutiflora Cogn. = **Anathallis obovata** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Pleurothallis mirabilis Schltr. = **Pabstiella mirabilis** (Schltr.) Brieger & Senghas
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis miragliae Leite = **Specklinia miragliae** (Leite) Luer

Pleurothallis modesta (Barb. Rodr.) Cogn. = **Panmorphia brevipes** (H. Focke) Luer

Pleurothallis modestiflora Schltr. = **Anathallis obovata** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Garay, L. A., 1954; Vásquez, R. & Ibisch, P. L., 2000.

Pleurothallis montana Barb. Rodr. = **Arthrosia floribunda** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis montserrati Porsch = **Anathallis rubens** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis mouraei Cogn. = **Pabstiella quadridentata** (Barb. Rodr.) Luer

Pleurothallis mouraeoides Hoehne = **Pabstiella mouraeoides** (Hoehne) Luer var. **mouraeoides**

Pleurothallis murexoidea Pabst = **Acianthera murexoidea** (Pabst) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis muscoidea Lindl.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1896; Lindley, J., 1838.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 100–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. s.n.* (*)].

Pleurothallis muscosa Barb. Rodr. = **Arthrosia muscosa** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2006.

Pleurothallis muscosa Barb. Rodr. var. *parvifolia* Hoehne = **Arthrosia muscosa** (Barb. Rodr.) Luer

Pleurothallis myrticola Barb. Rodr. = **Arthrosia myrticola** (Barb. Rodr.) Luer

Pleurothallis nemorosa Barb. Rodr. = **Acianthera nemorosa** (Barb. Rodr.) F. Barros

Pleurothallis neojuergensii Luer = **Cryptophoranthus cryptanthus** (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.

Pleurothallis nummularia Rchb. f. = **Phloeophila nummularia** (Rchb. f.) Garay

Pleurothallis obovata (Lindl.) Lindl. = **Anathallis obovata** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Pleurothallis ocellata Porsch = **Pabstiella arcuata** (Lindl.) Luer
Referencias: Sprunger, S., 1996.

[Pleurothallis ochracea Porsch]
Notas: Nombre dudoso.

Pleurothallis octomeriantha Hoehne = **Octomeria octomeriantha** (Hoehne) Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J., 1972b.

Pleurothallis oligantha Barb. Rodr. = **Acianthera oligantha** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis ophiantha Cogn. = **Acianthera hoffmannseggiana** (Rchb. f.) Luer

Pleurothallis ophicephala Barb. Rodr. = **Acianthera hoffmannseggiana** (Rchb. f.) Luer

Pleurothallis ottonis Schltr. = **Anathallis sclerophylla** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis oxyglossa Schltr. = **Platystele oxyglossa** (Schltr.) Garay
Referencias: Luer, C. A., 1990.

Pleurothallis pabstii Garay = **Anathallis pabstii** (Garay) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis palmeirensis Pabst = **Pabstiella quadridentata** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis panduripetala Barb. Rodr. = **Acianthera panduripetala** (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Pleurothallis papillosa Lindl. = **Acianthera papillosa** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis paranaensis Schltr. = **Panmorphia paranaensis** (Schltr.) Luer

Pleurothallis pardipes Rchb. f. = **Acianthera pardipes** (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase

[Pleurothallis parva Rolfe]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Pleurothallis parvifolia Lindl. = **Pabstiella parvifolia** (Lindl.) Luer

Pleurothallis paulensis (Hoehne & Schltr.) Luer = **Phloeophila nummularia** (Rchb. f.) Garay
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Pleurothallis pectinata Lindl.
Sin.: *Acianthera pectinata* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(SAL); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 802* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 19020* (HB, MBM)].

Pleurothallis peduncularis Lindl., hom. illeg. = **Myoxanthus exasperatus** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis pelioxantha Barb. Rodr. = **Acianthera aphthosa** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 1976.

Pleurothallis pellifeloides (Barb. Rodr.) Cogn. = **Pabstiella pellifeloides** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2008.

[Pleurothallis peperomioides Ames]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Pleurothallis per-dusenii Hoehne = **Acianthera renipetala** (Barb. Rodr.) Luer

Pleurothallis perplexa Rchb. f. = **Specklinia grobyi** (Bateman ex Lindl.) F. Barros
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Pleurothallis petersiana Schltdl. = **Anathallis petersiana** (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis picta Lindl. = **Specklinia picta** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis piraquarensis Hoehne = **Specklinia piraquarensis** (Hoehne) Luer

Pleurothallis piratiningana Hoehne = **Anathallis piratiningana** (Hoehne) F. Barros
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis platycaulis Rchb. f. ex Cogn. = **Acianthera luteola** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis platysemos Rchb. f. var. *angustifolia* Pabst = **Arthrosia hygrophila** (Barb. Rodr.) Luer

Pleurothallis platysemos Rchb. f. var. *platysemos* = **Arthrosia hygrophila** (Barb. Rodr.) Luer

Pleurothallis platystachys Regel = **Acianthera tricarinata** (Poepp. & Endl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Pridgeon, A. M. & Chase, M. N., 2001.

Pleurothallis pleurothalloides (Cogn.) Handro = **Pabstiella pleurothalloides** (Cogn.) Luer

[Pleurothallis pleurothalloides (Cogn.) Handro var. major (Hoehne & Schltr.) Handro]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Pleurothallis pluriflora (Barb. Rodr.) Cogn. = **Specklinia grobyi** (Bateman ex Lindl.) F. Barros
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Pleurothallis podoglossa Hoehne = **Pabstiella podoglossa** (Hoehne) Luer

Pleurothallis porphyrantha Kraenzl. = **Acianthera pubescens** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis pristeoglossa Rchb. f. & Warm. = **Pabstiella pristeoglossa** (Rchb. f. & Warm.) Luer

Pleurothallis procumbens Lindl. = **Pabstiella tripterantha** (Rchb. f.) F. Barros
Referencias: Barros, F., 2002b.

Pleurothallis pruinosa Lindl.
Sin.: *Humboldtia pruinosa* (Lindl.) Kuntze
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14604* (MBM)].

Pleurothallis pterophora Cogn. = **Specklinia leucopyramis** (Rchb. f.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis pubescens Lindl. = **Acianthera pubescens** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis punctata Lindl. = **Pabstiella punctatifolia** (Barb. Rodr.) Luer

Pleurothallis punctatifolia (Barb. Rodr.) Pabst = **Pabstiella punctatifolia** (Barb. Rodr.) Luer

Pleurothallis pygmaea Hoehne = **Platystele oxyglossa** (Schltr.) Garay
Referencias: Luer, C. A., 1990.

Pleurothallis quadridentata (Barb. Rodr.) Cogn. = **Pabstiella quadridentata** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis quartzicola Cogn. = **Trichosalpinx montana** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 1997.

Pleurothallis racemosa (Barb. Rodr.) Cogn. = **Anathallis sclerophylla** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis raduliglossa Pabst = **Apoda-prorepentia hystrix** (Kraenzl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2007.

Pleurothallis ramosa Barb. Rodr. = **Acianthera ramosa** (Barb. Rodr.) F. Barros
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis ramphastorhyncha (Barb. Rodr.) Cogn. = **Pabstiella uniflora** (Lindl.) Luer

Pleurothallis recurva Lindl. = **Acianthera recurva** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis recurva Lindl. var. *microphylla* (Barb. Rodr.) Garay = **Acianthera recurva** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Vásquez, R. & Ibisch, P. L., 2000.

Pleurothallis rhabdosepala Schltr. = **Pleurobotryum rhabdosepalum** (Schltr.) Hoehne
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Pleurothallis rigidula Cogn. = **Anathallis rigidula** (Cogn.) Luer

Pleurothallis riograndensis Barb. Rodr. = **Acianthera pubescens** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis riograndensis Barb. Rodr. var. *longicaulis* Cogn. = **Acianthera pubescens** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis riograndensis Barb. Rodr. var. *viridicata* Barb. Rodr. = **Acianthera pubescens** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis rodriguesii Cogn. = **Acianthera luteola** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis rubens Lindl. = **Anathallis rubens** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis rubrolimbata Hoehne = **Panmorphia rubrolimbata** (Hoehne) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2006.

Pleurothallis rudolfii Pabst = **Panmorphia rudolfii** (Pabst) Luer

[Pleurothallis ruscifolia (Jacq.) R. Br.]
Sin.: *Epidendrum ruscifolium* Jacq.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Pleurothallis sagittifera Kunth = **Notylia sagittifera** (Kunth) Link, Klotzsch & Otto

Pleurothallis sarracenia Luer = **Sarracenella pubescens** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Barros, F., 2003.

Pleurothallis saundersiana Rchb. f. = **Acianthera saundersiana** (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Pleurothallis saurocephala Lodd. = **Acianthera saurocephala** (Lodd.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2002.

[Pleurothallis saurocephala Lodd. var. armeniaca Barb. Rodr.]
Notas: Nombre dudoso.

Pleurothallis sclerophylla Lindl. = **Anathallis sclerophylla** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis seriata Lindl. = **Panmorphia seriata** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2006.

Pleurothallis serpentula Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1959a; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1108* (ICN)].

Pleurothallis smithiana Lindl. = **Acianthera pubescens** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis sonderana Rchb. f. = **Acianthera sonderana** (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis sonderana Rchb. f. var. *longicaulis* Barb. Rodr. = **Acianthera sonderana** (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis sordida Kraenzl. = **Pabstiella sordida** (Kraenzl.) Luer

Pleurothallis sororcula Schltr. = **Specklinia sororcula** (Schltr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis sparsiflora Schltr. = **Pabstiella sparsiflora** (Schltr.) Luer

Pleurothallis spegazziana L.O. Williams = **Barbosella cogniauxiana** (Speg. & Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 2000c.

Pleurothallis sphaeroglossa Hoehne = **Panmorphia seriata** (Lindl.) Luer

Pleurothallis spilantha Barb. Rodr. = **Acianthera spilantha** (Barb. Rodr.) Luer

Pleurothallis stenopetala Lodd. ex Lindl. = **Anathallis sclerophylla** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis stictophylla Schltr. = **Specklinia stictophylla** (Schltr.) Luer

Pleurothallis strupifolia Lindl. = **Acianthera strupifolia** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Pleurothallis subcordifolia Cogn. = **Acianthera luteola** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis subpicta Schltr. = **Specklinia subpicta** (Schltr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis succedanea Hoehne & Schltr. = **Pabstiella parvifolia** (Lindl.) Luer
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Pleurothallis tenera (Barb. Rodr.) Cogn. = **Pabstiella tenera** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis teretifolia Rolfe = **Pleurobotryum atropurpureum** Barb. Rodr.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Pleurothallis translucida Barb. Rodr. = **Acianthera translucida** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis trialata Cogn. = **Pabstiella tripterantha** (Rchb. f.) F. Barros

Pleurothallis tricarinata Poepp. & Endl. = **Acianthera tricarinata** (Poepp. & Endl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Pridgeon, A. M. & Chase, M. N., 2001.

Pleurothallis tricolor (Barb. Rodr.) Cogn. = **Pabstiella tricolor** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis trifida Lindl. = **Pabstiella trifida** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis trilineata Barb. Rodr. = **Specklinia grobyi** (Bateman ex Lindl.) F. Barros
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Pleurothallis tripterantha Rchb. f. = **Pabstiella tripterantha** (Rchb. f.) F. Barros
Referencias: Barros, F., 2002b.

Pleurothallis tristis Barb. Rodr. = **Acianthera tristis** (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Pleurothallis triura Schltr. = **Anathallis sclerophylla** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

[Pleurothallis umbrosa (Barb. Rodr.) Cogn.]
Sin.: *Lepanthes umbrosa* Barb. Rodr.
Notas: Nombre dudoso.

Pleurothallis uniflora Lindl. = **Pabstiella uniflora** (Lindl.) Luer

Pleurothallis vellozoana Schltr. = **Pabstiella vellozoana** (Schltr.) Luer

Pleurothallis violaceomaculata Hoehne = **Acianthera violaceomaculata** (Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis wackettii Handro & Pabst = **Pabstiella wackettii** (Handro & Pabst) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis wageneriana Klotzsch = **Acianthera wageneriana** (Klotzsch) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pleurothallis xylobiochila Kraenzl. = **Acianthera wageneriana** (Klotzsch) Pridgeon & M.W. Chase

Pleurothallis ypirangae Kraenzl. = **Anathallis ypirangae** (Kraenzl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Pogonia aphylla Barb. Rodr. = **Cleistes aphylla** (Barb. Rodr.) Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Pogonia brasiliensis Barb. Rodr. = **Cleistes brasiliensis** (Barb. Rodr.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Pogonia catharinensis Cogn. = **Cleistes catharinensis** (Cogn.) Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Pogonia fragrans Schltr. = **Cleistes fragrans** (Schltr.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Pogonia gracilis Barb. Rodr. = **Cleistes gracilis** (Barb. Rodr.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Pogonia hassleriana Cogn. = **Triphora hassleriana** (Cogn.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1984h.

Pogonia humidicola Schltr. = **Cleistes humidicola** (Schltr.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Pogonia libonii Rchb. f. = **Cleistes libonii** (Rchb. f.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Pogonia macrantha Barb. Rodr. = **Cleistes macrantha** (Barb. Rodr.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Pogonia magnifica Schltr. = **Cleistes magnifica** (Schltr.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Pogonia modesta (Barb. Rodr.) Cogn. = **Psilochilus modestus** Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1919.

Pogonia paranaensis Barb. Rodr. = **Cleistes paranaensis** (Barb. Rodr.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Pogonia paranaensis Barb. Rodr. var. *major* Schltr. = **Cleistes paranaensis** (Barb. Rodr.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Pogonia physurifolia Rchb. f. = **Psilochilus modestus** Barb. Rodr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Pogonia pluriflora Barb. Rodr. = **Cleistes pluriflora** (Barb. Rodr.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Pogonia quadricallosa Barb. Rodr. = **Cleistes quadricallosa** (Barb. Rodr.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Pogonia revoluta Barb. Rodr. = **Cleistes revoluta** (Barb. Rodr.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Pogonia tetraphylla Poepp. & Endl. = **Codonorchis lessonii** (Brongn.) Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Pogonia vinosa Barb. Rodr. = **Cleistes vinosa** (Barb. Rodr.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1940.

Pogoniopsis Rchb. f.

Número de especies: 1

Pogoniopsis schenckii Cogn.
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 8711* (MBM)].

Polystachya Hook., nom. cons.

Número de especies: 8

Polystachya bradei Schltr. ex Mansf.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 23337* (MBM)].

Polystachya caespitosa Barb. Rodr.
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1953; Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2162* (MBM)].

Polystachya concreta (Jacq.) Garay & Sweet
Sin.: *Dendrorchis estrellensis* (Jacq.) Kuntze, *Epidendrum concretum* Jacq., *Polystachya estrellensis* Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Johnson, A. E., 2001; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, GUA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 132* (BAB)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 7886* (NY)]; PRY[*Schinini, A. 20395* (CTES)].

Polystachya edwallii Hoehne & Schltr.
Referencias: Schlechter, F. R. R. & Hoehne, F. C., 1922.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20716* (HB, MBM)].

Polystachya estrellensis Rchb. f. = **Polystachya concreta** (Jacq.) Garay & Sweet
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Polystachya foliosa (Hook.) Rchb. f.
Sin.: *Polystachya juergensii* Schltr., *Stelis foliosa* Hook.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 7019* (BAB)]; BRA[*Dutra, J. 974* (ICN, SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 5831* (SI)].

Polystachya juergensii Schltr. = **Polystachya foliosa** (Hook.) Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Polystachya micrantha Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Aquino, F. 22* (B)].

Polystachya nana Rchb. f.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 1000–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 9854* (MBM, S)].

Polystachya pinicola Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–1200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pabst, G. F. J. 514* (HB)].

Ponera Lindl.

Número de especies: 1

Ponera australis Cogn. = **Ponera striata** Lindl.
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952.

Ponera striata Lindl.
Sin.: *Ponera australis* Cogn.
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 11568* (NY)].

Ponthieva R. Br.

Número de especies: 2, 1 endémica

Ponthieva hassleri Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11239* (MO, NY)].

Ponthieva mandonii Rchb. f. var. **bilobipetala** Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 300–500 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. s.n.* (LIL, LP, SP)].

Ponthieva mandonii Rchb. f. var. **mandonii**
Sin.: *Ponthieva parvilabris* Griseb.
Referencias: Hauman, L. L., 1921a; Williams, L. O., 1939.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 735* (SI)].

Ponthieva paranaensis Kraenzl. = **Baskervilla paranaensis** (Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Ponthieva parvilabris Griseb. = **Ponthieva mandonii** Rchb. f. var. **mandonii**
Referencias: Williams, L. O., 1939.

Prescottia Lindl.

Número de especies: 10, 1 endémica

Prescottia colorans Lindl. = **Prescottia stachyodes** (Sw.) Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Prescottia corcovadensis Rchb. f. = **Prescottia plantaginea** Lindl.

Prescottia densiflora Lindl. = **Prescottia oligantha** (Sw.) Lindl.
Referencias: Rocha, F. S. & Waechter, J. L., 2006.

Prescottia epiphyta Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Zikan, F. J. 5376* (RB)].

Prescottia filiformis Schltr. = **Prescottia oligantha** (Sw.) Lindl.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Prescottia gracilis Schltr. = **Prescottia oligantha** (Sw.) Lindl.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Prescottia lancifolia Lindl.
Sin.: *Prescottia truncicola* Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 100–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 18154* (MBM)].

Prescottia longipetiolata Barb. Rodr. = **Prescottia stachyodes** (Sw.) Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Prescottia micrantha Lindl. = **Prescottia oligantha** (Sw.) Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Prescottia microrhiza Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19869* (MBM)]; PRY[*Rojas, T. 1753* (SP)].

Prescottia montana Barb. Rodr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15090* (HB, MBM)].

Prescottia myosurus Rchb. f. = **Prescottia stachyodes** (Sw.) Lindl.

Prescottia nivalis Barb. Rodr.
Referencias: Hatschbach, G., 1966; Hoehne, F. C., 1945; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 970* (SI)].

Prescottia oligantha (Sw.) Lindl.
Sin.: *Cranichis oligantha* Sw., *Prescottia densiflora* Lindl., *Prescottia filiformis* Schltr., *Prescottia gracilis* Schltr., *Prescottia micrantha* Lindl., *Prescottia polysphaera* Schltr., *Prescottia pubescens* Barb. Rodr., *Prescottia tenuis* Lindl., *Prescottia viacola* Barb. Rodr.
Referencias: Carnevali, G., Ramírez-Morillo, I. M., Romero-González, G. A., Vargas, C. A. & Foldats, E., 2003; Correa, M. N., 1992; Hoehne, F. C., 1945; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996; Williams, L. O., 1939.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN); URY(CAS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 298* (CTES)]; BRA[*Klein, R. M. 2509* (NY)]; PRY[*Jiménez, B. 1888bj* (BM, CTES, PY)]; URY[*Osten, C. 16918* (*)].

Prescottia paulensis Cogn. = **Prescottia stachyodes** (Sw.) Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Prescottia petiolaris Lindl. = **Prescottia stachyodes** (Sw.) Lindl.

Prescottia phleoides Lindl.
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Hoehne, F. C., 1945.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19943* (HB, MBM)].

Prescottia plantaginea Lindl.
Sin.: *Prescottia corcovadensis* Rchb. f., *Prescottia spirantophylla* Barb. Rodr., *Prescottia striata* Schltr.
Referencias: Sprunger, S., 1996.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9838a* (NY)].

Prescottia polysphaera Schltr. = **Prescottia oligantha** (Sw.) Lindl.
Referencias: Rocha, F. S. & Waechter, J. L., 2006.

Prescottia pubescens Barb. Rodr. = **Prescottia oligantha** (Sw.) Lindl.

Prescottia serrana M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1992.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 800–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 24954* (LP)].

Prescottia spirantophylla Barb. Rodr. = **Prescottia plantaginea** Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl.
Sin.: *Cranichis stachyodes* Sw., *Prescottia colorans* Lindl., *Prescottia longipetiolata* Barb. Rodr., *Prescottia myosurus* Rchb. f., *Prescottia paulensis* Cogn., *Prescottia petiolaris* Lindl.
Referencias: Hashimoto, T., 1993; Johnson, A. E., 2001; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 220* (BAB, CTES)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 8537* (NY)].

Prescottia striata Schltr. = **Prescottia plantaginea** Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Prescottia tenuis Lindl. = **Prescottia oligantha** (Sw.) Lindl.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Prescottia truncicola Schltr. = **Prescottia lancifolia** Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Prescottia viacola Barb. Rodr. = **Prescottia oligantha** (Sw.) Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1992; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Promenaea Lindl.

Número de especies: 9, 5 endémicas

Promenaea acuminata Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Schlechter, F. R. R., 1921.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Grossmann, K. s.n.* (B)].

Promenaea albescens Schltr.
Sin.: *Promenaea paranaensis* Schltr. var. *albescens* (Schltr.) Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Schlechter, F. R. R., 1921.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 880* (MBM, SP)].

Promenaea catharinensis Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Schlechter, F. R. R., 1921.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Fuerstenberg, B. s.n.* (B)].

Promenaea dusenii Schltr.
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Schlechter, F. R. R., 1921.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15090* (MBM)].

Promenaea fuerstenbergiana Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Schlechter, F. R. R., 1921.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Fuerstenberg, B. s.n.* (B)].

Promenaea paranaensis Schltr. var. *albescens* (Schltr.) Hoehne = **Promenaea albescens** Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Promenaea riograndensis Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4551* (HBR)].

Promenaea rollisonii (Rchb. f.) Lindl.
Sin.: *Zygopetalum rollisonii* Rchb. f.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1959c; Schlechter, F. R. R., 1921.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. s.n.* (ICN)].

Promenaea stapelioides (Klotzsch ex Rchb. f.) Lindl.
Sin.: *Zygopetalum stapelioides* Klotzsch ex Rchb. f.
Referencias: Hatschbach, G., 1966; Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 28605* (HB, MBM)].

Promenaea xanthina Lindl.
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1962.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 25937* (HB, MBM)].

Prosthechea Knowles & Westc.

Número de especies: 9

Prosthechea bulbosa (Vell.) W.E. Higgins
Sin.: *Encyclia bulbosa* (Vell.) Pabst, *Epidendrum bulbosum* Vell.
Referencias: Higgins, W. E., 1997.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lindeman, J. C. 4631* (ICN, NY)].

Prosthechea fausta (Rchb. f. ex Cogn.) W.E. Higgins
Sin.: *Anacheilium faustum* (Rchb. f. ex Cogn.) Pabst, Moutinho & A.V. Pinto, *Encyclia fausta* (Rchb. f. ex Cogn.) Pabst, *Epidendrum faustum* Rchb. f. ex Cogn.
Referencias: Higgins, W. E., 1997.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pabst, G. F. J. 82* (MBM)].

Prosthechea fragrans (Sw.) W.E. Higgins
Sin.: *Anacheilium fragrans* (Sw.) Acuña, *Encyclia fragrans* (Sw.) Lemée, *Epidendrum fragrans* Sw.
Referencias: Higgins, W. E., 1997; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16768* (MBM)].

Prosthechea glumacea (Lindl.) W.E. Higgins
= **Prosthechea inversa** (Lindl.) W.E. Higgins

Prosthechea inversa (Lindl.) W.E. Higgins
Sin.: *Anacheilium glumaceum* (Lindl.) Pabst, *Encyclia glumacea* (Lindl.) Pabst, *Encyclia inversa* (Lindl.) Pabst, *Epidendrum glumaceum* Lindl., *Epidendrum inversum* Lindl., *Prosthechea glumacea* (Lindl.) W.E. Higgins
Referencias: Dressler, R. L., 1961; Higgins, W. E., 1997.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7872* (NY)].

Prosthechea papilio (Vell.) W.E. Higgins
Sin.: *Encyclia papilio* (Vell.) Pabst, *Epidendrum papilio* Vell., *Epidendrum widgrenii* Lindl.
Referencias: Dressler, R. L., 1961; Higgins, W. E., 1997.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 889* (SI)].

Prosthechea punctifera (Rchb. f.) W.E. Higgins
Sin.: *Encyclia punctifera* (Rchb. f.) Pabst, *Epidendrum punctiferum* Rchb. f.
Referencias: Higgins, W. E., 1997.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pabst, G. F. J. 1131* (HB)].

Prosthechea pygmaea (Hook.) W.E. Higgins
Sin.: *Encyclia pygmaea* (Hook.) Dressler, *Epidendrum pygmaeum* Hook., *Hormidium tripterum* (Brongn.) Cogn.
Referencias: Carnevali, G., Ramírez-Morillo, I. M., Romero-González, G. A., Vargas, C. A. & Foldats, E., 2003; Dressler, R. L., 1961.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Schwacke, C. A. W. 6805* (RB)].

Prosthechea tigrina (Linden ex Lindl.) W.E. Higgins
Sin.: *Encyclia tigrina* (Linden ex Lindl.) Carnevali & I. Ramírez, *Epidendrum tigrinum* Lindl. ex Lindl.
Referencias: Higgins, W. E., 1997; Kraenzlin, F. W. L., 1911.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lange, N. 7484* (MBM, S)].

Prosthechea vespa (Vell.) W.E. Higgins
Sin.: *Encyclia vespa* (Vell.) Dressler, *Epidendrum variegatum* Hook., hom. illeg., *Epidendrum vespa* Vell.
Referencias: Carnevali, G., Ramírez-Morillo, I. M., Romero-González, G. A., Vargas, C. A. & Foldats, E., 2003; Dressler, R. L., 1961; Kraenzlin, F. W. L., 1911.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 944* (ICN, SI)].

Pseudoeurystyles cogniauxii (Kraenzl.) Hoehne
= **Eurystyles cogniauxii** (Kraenzl.) Pabst
Referencias: Burns-Balogh, P., Robinson, H. E. & Foster, M. S., 1985.

Pseudoeurystyles gardneri (Lindl.) Hoehne = **Eurystyles cogniauxii** (Kraenzl.) Pabst
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Pseudoeurystyles lorenzii (Cogn.) Hoehne = **Eurystyles lorenzii** (Cogn.) Schltr.
Referencias: Burns-Balogh, P., Robinson, H. E. & Foster, M. S., 1985; Pridgeon, A. M., Cribb, P. J., Chase, M. W. & Rasmussen, F. N., 2003.

Pseudomaxillaria chloroleuca (Rchb. f.) Hoehne
= **Maxillaria parviflora** (Poepp. & Endl.) Garay

Pseudostelis Schltr.

Número de especies: 1

Pseudostelis bradei Schltr. = **Pseudostelis spiralis** (Lindl.) Schltr.

Pseudostelis deregularis (Barb. Rodr.) Schltr.
= **Pseudostelis spiralis** (Lindl.) Schltr.

Pseudostelis spiralis (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Physosiphon deregularis* (Barb. Rodr.) Cogn., *Physosiphon minutiflorus* Ames & Schweinf., *Physosiphon spiralis* Lindl., *Pleurothallis deregularis* (Barb. Rodr.) Luer, *Pseudostelis bradei* Schltr., *Pseudostelis deregularis* (Barb. Rodr.) Schltr., *Stelis deregularis* Barb. Rodr.
Referencias: Klein, R. M., 1979; Pabst, G. F. J., 1952b; Schlechter, F. R. R., 1922.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2248* (MBM)].

Psilochilus Barb. Rodr.

Número de especies: 2

Psilochilus dusenianus Kraenzl. ex Garay & Dunst.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lindeman, J. C. 4082* (SP)].

Psilochilus modestus Barb. Rodr.
Sin.: *Pogonia modesta* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pogonia physurifolia* Rchb. f.
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 21692* (HB, MBM)].

Psygmorchis Dodson & Dressler

Número de especies: 1

Psygmorchis pusilla (L.) Dodson & Dressler
Sin.: *Epidendrum pusillum* L., *Oncidium iridifolium* Kunth, *Oncidium pusillum* (L.) Rchb. f., *Tolumnia pusilla* (L.) Hoehne
Referencias: Dodson, C. H. & Dressler, R. L., 1972; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 23297* (MBM)].

Pterichis Lindl.

Número de especies: 2

Pterichis boliviana Schltr.
Sin.: *Stenoptera aspidistrifolia* Hauman
Referencias: Correa, M. N., 1992; Hashimoto, T., 1993.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 1200–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Názara, M. 4* (SI)].

Pterichis multiflora (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Acraea multiflora* Lindl.
Referencias: Correa, M. N., 1992.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 2000–3400 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3812* (LIL)].

Pteroglossa Schltr.

Número de especies: 5, 4 endémicas

Pteroglossa glazioviana (Cogn.) Garay
Sin.: *Cogniauxiocharis glazioviana* (Cogn.) Hoehne, *Pelexia glazioviana* Cogn., *Pelexia glazioviana* Cogn. var. *paraguayensis* Cogn.
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952; Garay, L. A., 1982[1980].
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lindeman, J. C. 1998* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 9290* (G)].

Pteroglossa lurida (M.N. Correa) Garay = **Eltroplectris lurida** (M.N. Correa) Pabst
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Pteroglossa luteola Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 8336* (AMES)].

[Pteroglossa macrantha (Rchb. f.) Schltr.]
Sin.: *Spiranthes macrantha* Rchb. f., *Stenorrhynchos macranthum* (Rchb. f.) Cogn.
Referencias: Correa, M. N., 1955.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Pteroglossa magnifica Szlach. ex Szlach.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10661* (BM)].

Pteroglossa regia (Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Stenorrhynchos regium* Kraenzl.
Referencias: Correa, M. N., 1955; Garay, L. A., 1982[1980]; Schlechter, F. R. R., 1920.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 425* (S)].

Pteroglossa rhombipetala Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SFE); PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 2624* (AMES)]; PRY[*Schade, F. s.n.* (AMES)].

Pteroglossaspis Rchb. f.

Número de especies: 1

Pteroglossaspis argentina Rolfe
Sin.: *Eulophia argentina* Schltr.
Referencias: Cocucci, A. E., 1954, 1965a; Hoehne, F. C., 1942b.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COR, COS, SFE); BRA(PAR); URY(MAL, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 3021* (CORD)]; BRA[*Black, S. A. 51-11107* (IAN)]; URY[*Osten, C. 15746c* (SI, SP)].

Quekettia australis Kraenzl. = **Capanemia australis** (Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Quekettia duseniana Kraenzl. = **Capanemia thereziae** Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Quekettia micromera (Barb. Rodr.) Cogn. = **Capanemia micromera** Barb. Rodr.
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Quekettia microscopìca Lindl. var. *naboulettiana* Hauman = **Capanemia micromera** Barb. Rodr.
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Quekettia thereziae (Barb. Rodr.) Cogn. = **Capanemia thereziae** Barb. Rodr.

Reichenbachanthus emarginatus Garay = **Scaphyglottis emarginata** (Garay) Dressler
Referencias: Dressler, R. L., Whitten, W. M. & Williams, N. H., 2004.

Reichenbachanthus modestus Barb. Rodr. = **Scaphyglottis reflexa** Lindl.
Referencias: Carnevali, G., Ramírez-Morillo, I. M., Romero-González, G. A., Vargas, C. A. & Foldats, E., 2003.

Reichenbachanthus reflexus (Lindl.) Brade = **Scaphyglottis reflexa** Lindl.
Referencias: Dressler, R. L., Whitten, W. M. & Williams, N. H., 2004.

Restrepia australis Cogn. = **Barbosella australis** (Cogn.) Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 2000c.

Restrepia cogniauxiana Speg. & Kraenzl. = **Barbosella cogniauxiana** (Speg. & Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 2000c.

Restrepia crassifolia Edwall = **Barbosella crassifolia** (Edwall) Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 2000c.

Restrepia dusenii A. Samp. = **Barbosella dusenii** (A. Samp.) Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 2000c.

Restrepia pleurothalloides Cogn. = **Pabstiella pleurothalloides** (Cogn.) Luer

Restrepia porschiana Kraenzl. = **Barbosella cogniauxiana** (Speg. & Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911; Luer, C. A., 2000c.

Rodriguezia Ruiz & Pav.

Número de especies: 3, 1 endémica

Rodriguezia anomala Rolfe = **Capanemia superflua** (Rchb. f.) Garay

Rodriguezia barkeri Hook. = **Gomesa barkeri** (Hook.) Rolfe

Rodriguezia bracteata (Vell.) Hoehne
Sin.: *Epidendrum bracteatum* Vell., *Rodriguezia venusta* (Lindl.) Rchb. f.
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2774* (SI)].

[Rodriguezia candida Bateman]
Notas: Nombre dudoso.

Rodriguezia crispa Lindl. = **Gomesa crispa** (Lindl.) Klotzsch ex Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1953.

Rodriguezia decora (Lem.) Rchb. f.
Sin.: *Burlingtonia amoena* Planch., *Burlingtonia decora* Lem.
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Johnson, A. E., 2001; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 465* (BAB, SI)]; BRA[*Dusén, N. P. 8407* (S)]; PRY[*Schinini, A. 35134* (CTES)].

Rodriguezia eleutherosepala Barb. Rodr. = **Rodrigueziopsis eleutherosepala** (Barb. Rodr.) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Rodriguezia juergensiana Kraenzl. = **Capanemia superflua** (Rchb. f.) Garay

[Rodriguezia maculata (Lindl.) Rchb. f.]
Sin.: *Burlingtonia maculata* Lindl.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Rodriguezia planifolia Lindl. = **Gomesa planifolia** Klotzsch & Rchb. f.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Rodriguezia pubescens (Lindl.) Rchb. f.
Sin.: *Burlingtonia pubescens* Lindl.

Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15121* (HB, MBM)].

Rodriguezia recurva Lindl. = **Gomesa laxiflora** (Lindl.) Klotzsch ex Rchb. f.

Rodriguezia uliginosa (Barb. Rodr.) Cogn. = **Capanemia superflua** (Rchb. f.) Garay
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Rodriguezia venusta (Lindl.) Rchb. f. = **Rodriguezia bracteata** (Vell.) Hoehne
Referencias: Pabst, G. F. J., 1953.

Rodrigueziella Kuntze

Número de especies: 2

Rodrigueziella gomezoides (Barb. Rodr.) Pabst
Sin.: *Gomesa gomezoides* (Barb. Rodr.) Pabst, *Gomesa theodorea* (Barb. Rodr.) Cogn., *Theodorea gomezoides* Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Giongo, C. 96* (MBM, SP)].

Rodrigueziella handroi (Hoehne) Pabst
Sin.: *Gomesa handroi* (Hoehne) Pabst, *Theodorea handroi* Hoehne
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Guimarães, A. s.n.* (RB)].

Rodrigueziopsis Schltr.

Número de especies: 1 endémica

Rodrigueziopsis eleutherosepala (Barb. Rodr.) Schltr.
Sin.: *Rodriguezia eleutherosepala* Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Petean, M. P. 112* (SP)].

Rudolfiella Hoehne

Número de especies: 1 endémica

Rudolfiella lindmaniana (Kraenzl.) Hoehne
Sin.: *Bifrenaria lindmaniana* Kraenzl.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1921b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lindman, C. A. M. s.n.* (S)].

Sacoila Raf.

Número de especies: 7, 3 endémicas

Sacoila apetala (Kraenzl.) Garay = **Sacoila lanceolata** (Aubl.) Garay
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Sacoila argentina (Griseb.) Garay
Sin.: *Stenorrhynchos argentinum* Griseb., *Stenorrhynchos argentinum* Griseb. var. *minor* Cogn.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 100–4000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, MIS); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 5243* (CORD, IZAC)]; PRY[*Mereles, F. 5074* (FCQ)].

Sacoila duseniana (Kraenzl.) Garay
Sin.: *Stenorrhynchos bradei* Schltr., *Stenorrhynchos dusenianum* Cogn.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. 1022* (HB)].

Sacoila hassleri (Cogn.) Garay
Sin.: *Stenorrhynchos hassleri* Cogn., *Stenorrhynchos longifolium* Cogn.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Kraenzlin, F. W. L., 1911.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16054* (NY)]; PRY[*Schinini, A. 15048* (CTES)].

Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay
Sin.: *Limodorum lanceolatum* Aubl., *Sacoila apetala* (Kraenzl.) Garay, *Satyrium orchidioides* Sw., *Skeptrostachys sancti-jacobi* (Kraenzl.) Garay, *Stenorrhynchos apetalum* Kraenzl., *Stenorrhynchos australe* Lindl., *Stenorrhynchos lanceolatum* (Aubl.) Rich. ex Spreng., *Stenorrhynchos orchidioides* (Sw.) Rich., *Stenorrhynchos orchidioides* (Sw.) Rich. var. *australis* Cogn., *Stenorrhynchos sancti-jacobi* Kraenzl., *Stenorrhynchos speciosus* Rchb. f.
Referencias: Catling, P. M., 1987; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Garay, L. A., 1982[1980]; Hashimoto, T., 1993; Pabst, G. F. J., 1959a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, GUA, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1270* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 842* (ICN, SI)]; PRY[*Schinini, A. 27220* (CTES)].

Sacoila pedicellata (Cogn.) Garay
Sin.: *Stenorrhynchos pedicellatum* Cogn., *Stenorrhynchos pedicellatum* Cogn. var. *major* Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1906; Garay, L. A., 1982[1980]; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, SAL); BRA(PAR); PRY(AMA, SPE).

Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 9898* (CORD)]; BRA[*Dombrowski, L. T. 6480* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 4323* (G)].

Sacoila riograndensis (Kraenzl.) Garay
Sin.: *Stenorrhynchos riograndense* Kraenzl.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Pabst, G. F. J., 1959a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1170* (ICN)].

Sacoila secundiflora (Lillo & Hauman) Garay
Sin.: *Stenorrhynchos secundiflorum* Lillo & Hauman
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Hauman, L. L., 1921a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 18010* (LIL)].

Sanderella Kuntze

Número de especies: 3, 1 endémica

Sanderella discolor (Barb. Rodr.) Cogn.
Sin.: *Parlatorea discolor* Barb. Rodr.
Referencias: Correa, M. N., 1984h; Gerlach, G. & Vásquez, R., 1999; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Waechter, J. L., 1986.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4062* (SI)]; BRA[*Ribas, O. S. 3415* (MBM)].

Sanderella radicans (Rchb. f.) Garay & Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. M. 1642* (SPF)].

Sanderella riograndensis Dutra ex Pabst
Referencias: Correa, M. N., 1995; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1959a.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 188* (BAB)]; BRA[*Dutra, J. 1001* (ICN)].

Sarcoglottis C. Presl

Número de especies: 10, 1 endémica

Sarcoglottis acaulis (Sm.) Schltr.
Sin.: *Neottia acaulis* Sm.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22195* (MBM)].

Sarcoglottis alexandri Schltr. ex Mansf.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Hatschbach, G., 1974; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15685* (HB, MBM)].

Sarcoglottis biflora (Vell.) Schltr.
Sin.: *Serapias biflora* Vell., *Spiranthes biflora* (Vell.) Cogn.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Hoehne, F. C., 1945; Schlechter, F. R. R., 1919–1920.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 34839* (NY, SI)].

Sarcoglottis butantanensis (Hoehne) Hoehne & Schltr. = **Veyretia neuroptera** (Rchb. f. & Warm.) Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1995b.

Sarcoglottis fasciculata (Vell.) Schltr.
Sin.: *Serapias fasciculata* Vell.
Referencias: Correa, M. N., 1955; Garay, L. A., 1982[1980]; Hoehne, F. C., 1945; Schlechter, F. R. R., 1920.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14620* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 23371* (HB, MBM)]; PRY[*Jörgensen, P. 4409* (SI)].

[Sarcoglottis glaucescens Schltr.]
Notas: Nombre dudoso.

Sarcoglottis grandiflora (Hook.) Klotzsch
Sin.: *Neottia grandiflora* Hook., *Spiranthes acaulis* (Sm.) Cogn. var. *grandiflora* (Hook.) Lindl., *Spiranthes grandiflora* (Hook.) Lindl., *Spiranthes picta* (Anders) Lindl. var. *grandiflora* (Hook.) L.O. Williams
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952; Correa, M. N., 1955; Hatschbach, G., 1974; Hoehne, F. C., 1945; Insaurralde, I. S., 1999; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1920.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(CAA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Quiroga, H. s.n.* (BA)]; BRA[*Hatschbach, G. 13372* (MBM)]; PRY[*Schinini, A. 27797* (CTES)].

Sarcoglottis hassleri (Cogn.) Schltr. = **Veyretia hassleri** (Cogn.) Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1995b.

Sarcoglottis homalogastra (Rchb. f. & Warm.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes homologastra* Rchb. f. & Warm.
Referencias: Correa, M. N., 1955; Hoehne, F. C., 1945; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1920.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. 1968* (BA, LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 15094* (MBM, NY)].

[Sarcoglottis juergensii Schltr.]
Notas: Nombre dudoso.

Sarcoglottis magdalenensis (Brade & Pabst) Pabst
Sin.: *Pelexia magdalenensis* Brade & Pabst
Referencias: Correa, M. N., 1995; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1973a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 27247* (BAB, CTES)].

Sarcoglottis neuroptera (Rchb. f. & Warm.) Schltr. = **Veyretia neuroptera** (Rchb. f. & Warm.) Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1995b.

Sarcoglottis rufescens Klotzsch = **Sarcoglottis ventricosa** (Vell.) Hoehne ex Pabst
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Sarcoglottis sagittata (Rchb. f. & Warm.) Schltr. = **Veyretia sagittata** (Rchb. f. & Warm.) Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1995b.

Sarcoglottis tirolensis Burns-Bal. & M.S. Foster
Referencias: Burns-Balogh, P., 1994.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: PRY(ITA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Foster, M. S. 82-1* (US)].

Sarcoglottis uliginosa Barb. Rodr.
Sin.: *Spiranthes uliginosa* Barb. Rodr.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Garay, L. A., 1982[1980]; Hoehne, F. C., 1945; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 10315* (BAB, CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 1662* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 10695* (NY)].

Sarcoglottis ventricosa (Vell.) Hoehne ex Pabst
Sin.: *Sarcoglottis rufescens* Klotzsch, *Serapias ventricosa* Vell.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Garay, L. A., 1982[1980]; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 45* (SI)].

Sarracenella Luer
Número de especies: 1 endémica

Sarracenella pubescens (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Acianthera bragae* (Ruschi) F. Barros, *Acianthera sarracenia* (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, *Phloeophila pubescens* (Barb. Rodr.) Garay, *Physosiphon bragae* Ruschi, *Physosiphon pubescens* Barb. Rodr., *Pleurothallis sarracenia* Luer
Referencias: Barros, F., 2003.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 23386* (HB, MBM)].

Satyrium adantum Sw. = **Pelexia adnata** (Sw.) Spreng.

Satyrium elatum Sw. = **Cyclopogon elatus** (Sw.) Schltr.
Referencias: Schlechter, F. R. R., 1920.

Satyrium orchidioides Sw. = **Sacoila lanceolata** (Aubl.) Garay
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Sauroglossum Lindl.
Número de especies: 2, 1 endémica

Sauroglossum andinum (Hauman) Garay = **Schidorrhynchos andinum** (Hauman) Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1993a.

Sauroglossum candidum Kraenzl. = **Hapalorchis candidus** (Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1974a.

Sauroglossum elatum Lindl. = **Sauroglossum nitidum** (Vell.) Schltr.

Sauroglossum monophyllum auct. non Griseb. = **Cyclopogon elatus** (Sw.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Sauroglossum nitidum (Vell.) Schltr.
Sin.: *Sauroglossum elatum* Lindl., *Serapias nitida* Vell.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Rocha, F. S. & Waechter, J. L., 2006.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 1200–1800 m.
Países: ARG(CAT, SDE); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 1886* (BA)]; BRA[*Rambo, B. 52958* (HB)].

Sauroglossum nitidum (Vell.) Schltr. var. *andinum* Hauman = **Schidorrhynchos andinum** (Hauman) Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1993a.

Sauroglossum sellilabre (Griseb.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes sellilabris* Griseb.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1903; Correa, M. N., 1955; Schlechter, F. R. R., 1920.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. s.n.* (BA)]; PRY[*Hassler, E. 3221* (G)].

Scaphyglottis Poepp. & Endl.
Número de especies: 3

Scaphyglottis emarginata (Garay) Dressler
Sin.: *Reichenbachanthus emarginatus* Garay
Referencias: Dressler, R. L., Whitten, W. M. & Williams, N. H., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 14285* (MO)].

Scaphyglottis modesta (Rchb. f.) Schltr.
Sin.: *Tetragamestus modestus* Rchb. f.
Referencias: Dressler, R. L., Whitten, W. M. & Williams, N. H., 2004; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1953; Schlechter, F. R. R., 1926.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bresolin, A. 468* (HB)].

Scaphyglottis parviflora Poepp. & Endl. = **Maxillaria parviflora** (Poepp. & Endl.) Garay

Scaphyglottis reflexa Lindl.
Sin.: *Reichenbachanthus modestus* Barb. Rodr., *Reichenbachanthus reflexus* (Lindl.) Brade
Referencias: Dressler, R. L., Whitten, W. M. & Williams, N. H., 2004; Pridgeon, A. M., Cribb, P. J., Chase, M. W. & Rasmussen, F. N., 2005.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 42137* (CTES)].

Schidorrhynchos Szlach.

Número de especies: 1

Schidorrhynchos andinum (Hauman) Szlach.
Sin.: *Sauroglossum andinum* (Hauman) Garay, *Sauroglossum nitidum* (Vell.) Schltr. var. *andinum* Hauman, *Spiranthes excelsa* Kraenzl., *Spiranthes nitida* (Vell.) Cogn. var. *andina* Hauman, *Spiranthes pachychila* Kraenzl., *Spiranthes sauroglossum* G. Nicholson
Referencias: Hoehne, F. C., 1945; Klein, R. M., 1979; Szlachetko, D. L., 1993a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 2042* (BA)]; BRA[*Hagelund, K. 13289* (CTES, ICN, MBM)].

Scuticaria Lindl.

Número de especies: 1 endémica

Scuticaria hadwenii (Lindl.) Hoehne
Sin.: *Bifrenaria hadwenii* Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Koehler, S., Williams, N. H., Whitten, W. M. & Amaral, M. E., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Endémica. 800–1800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hoehne, F. C. 1129* (SP)].

Serapias biflora Vell. = **Sarcoglottis biflora** (Vell.) Schltr.
Referencias: Schlechter, F. R. R., 1919–1920.

Serapias congesta Vell. = **Cyclopogon congestus** (Vell.) Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Serapias fasciculata Vell. = **Sarcoglottis fasciculata** (Vell.) Schltr.
Referencias: Schlechter, F. R. R., 1920.

Serapias flava Sw. = **Corymborkis flava** (Sw.) Kuntze
Referencias: Correa, M. N., 1975b.

Serapias lutea Pers. = **Gavilea lutea** (Pers.) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1956.

Serapias nitida Vell. = **Sauroglossum nitidum** (Vell.) Schltr.

Serapias polyaden Vell. = **Cyclopogon polyaden** (Vell.) F.S. Rocha & J.L. Waechter
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Serapias ventricosa Vell. = **Sarcoglottis ventricosa** (Vell.) Hoehne ex Pabst
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Sigmatostalyx brachycion Griseb. = **Capanemia brachycion** (Griseb.) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1974b.

Sigmatostalyx radicans Rchb. f. = **Ornithophora radicans** (Rchb. f.) Garay & Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Skeptrostachys Garay

Número de especies: 10, 2 endémicas

Skeptrostachys arechavaletanii (Barb. Rodr.) Garay
Sin.: *Stenorrhynchos arechavaletanii* Barb. Rodr., *Stenorrhynchos exaltatum* Kraenzl., *Stenorrhynchos lateritium* Kraenzl.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952a; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(MAL, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18342* (MBM)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 3562* (SP)].

Skeptrostachys balanophorastachya (Rchb. f. & Warm.) Garay
Sin.: *Spiranthes balanophorostachya* Rchb. f. & Warm., *Stenorrhynchos balanophorostachyum* (Rchb. f. & Warm.) Cogn., *Stenorrhynchos stenophyllum* Cogn.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Hoehne, F. C., 1945; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Pabst, G. F. J., 1952a.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(CHA); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(GUA); URY(SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 579* (SP)]; BRA[*Oliveira, P. I. 899* (MBM)]; PRY[*Jörgensen, P. 4549* (SP)]; URY[*Montoro Guarch, A. 2480* (HB, MVFA)].

Skeptrostachys berroana (Kraenzl.) Garay
Sin.: *Pelexia berroana* (Kraenzl.) Schltr., *Stenorrhynchos berroanum* Kraenzl.

Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Pabst, G. F. J., 1952a; Schlechter, F. R. R., 1920.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 200–400 m.
Países: URY(LAV).
Ejemplares de referencia: URY[*Berro, M. B. 1408* (S)].
Notas: Posible sinónimo de *Skeptrostachys arechavaletanii*.

Skeptrostachys congestiflora (Cogn.) Garay
Sin.: *Stenorrhynchos congestiflorum* Cogn.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 300–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Cordeiro, J. 506* (MBM)].

Skeptrostachys correana Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1996.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. 102612* (HBG)].

Skeptrostachys disoides (Kraenzl.) Garay
Sin.: *Spiranthes disoides* Kraenzl., *Stenorrhynchos densum* Hauman
Referencias: Correa, M. N., 1955; Garay, L. A., 1982[1980].
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 671* (BAB)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 9480* (MBM)].

Skeptrostachys gigantea (Cogn.) Garay
Sin.: *Stenorrhynchos giganteum* Cogn.
Referencias: Arbo, M. M. & Tressens, S. G., 2002; Correa, M. N., 1955; Garay, L. A., 1982[1980].
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS); PRY(APA); URY(MAL, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 842* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 38487* (CTES)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6413* (SI)]; URY[*Pedersen, T. M. 11631* (CTES, SI)].

Skeptrostachys montevidensis (Barb. Rodr.) Garay
Sin.: *Stenorrhynchos montevidense* Barb. Rodr., *Stenorrhynchos polyanthum* Kraenzl.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Kraenzlin, F. W. L., 1911.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS); URY(MAL, MON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Oliveira, P. I. 367* (MBM)].

Skeptrostachys paraguayensis (Rchb. f.) Garay
Sin.: *Spiranthes paraguayensis* Rchb. f., *Stenorrhynchos paraguayense* (Rchb. f.) Cogn.
Referencias: Correa, M. N., 1955; Garay, L. A., 1982[1980]; Hoehne, F. C., 1945; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN, MIE); URY(MAL, RNO, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Naboulet, L. R. s.n.* (BA)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 9480* (NY)]; PRY[*Hassler, E. 5357* (G, NY)]; URY[*Rosengurtt, B. 4415* (SP)].

Skeptrostachys rupestris (Lindl.) Garay
Sin.: *Spiranthes rupestris* Lindl., *Stenorrhynchos rupestre* (Lindl.) Cogn., *Stenorrhynchos rupestre* (Lindl.) Cogn. var. *minor* Hoehne
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(PAR, RGS); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 9033* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 6427* (G)].

Skeptrostachys sancti-jacobi (Kraenzl.) Garay = **Sacoila lanceolata** (Aubl.) Garay
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Sophronia cernua (Lindl.) Lindl. = **Sophronitis cernua** Lindl.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Sophronitella violacea (Lindl.) Schltr. = **Isabelia violacea** (Lindl.) C. Berg & M.W. Chase

Sophronitis Lindl.

Número de especies: 3, 1 endémica

Sophronitis australis Cogn. = **Constantia australis** (Cogn.) Porto & Brade

Sophronitis cernua Lindl.
Sin.: *Cattleya cernua* (Lindl.) Beer, *Epidendrum humile* Vell., *Sophronia cernua* (Lindl.) Lindl., *Sophronitis hoffmannseggii* Rchb. f., *Sophronitis isopetala* Hoffm., *Sophronitis modesta* Lindl., *Sophronitis nutans* Hoffm., *Sophronitis pterocarpa* Lindl.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1903; Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Hauman, L. L., 1917b; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5610* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 976* (ICN)]; PRY[*Hassler, E. 3653* (G)].

Sophronitis coccinea (Lindl.) Rchb. f.
Sin.: *Hadrolaelia coccinea* (Lindl.) Chiron & V.P. Castro, *Sophronitis grandiflora* (Lindl.) Rchb. f.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1901; Hatschbach, G., 1963b; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sehnem, A. 5108* (SI)]; BRA[*Mattos, J. R. 12121* (SP)].

Sophronitis coccinea (Lindl.) Rchb. f. subsp. *mantiqueirae* Fowlie = **Sophronitis mantiqueirae** (Fowlie) Fowlie

Sophronitis grandiflora (Lindl.) Rchb. f. = **Sophronitis coccinea** (Lindl.) Rchb. f.

Sophronitis hoffmannseggii Rchb. f. = **Sophronitis cernua** Lindl.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Sophronitis isopetala Hoffm. = **Sophronitis cernua** Lindl.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Sophronitis lundii (Rchb. f. & Warm. ex Rchb. f.) C. Berg & M.W. Chase = **Microlaelia lundii** (Rchb. f. & Warm. ex Rchb. f.) Chiron & V.P. Castro

[Sophronitis mantiqueirae (Fowlie) Fowlie]
Sin.: *Hadrolaelia mantiqueirae* (Fowlie) Chiron & V.P. Castro, *Sophronitis coccinea* (Lindl.) Rchb. f. subsp. *mantiqueirae* Fowlie
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Sophronitis modesta Lindl. = **Sophronitis cernua** Lindl.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Sophronitis nutans Hoffm. = **Sophronitis cernua** Lindl.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Sophronitis pterocarpa Lindl. = **Sophronitis cernua** Lindl.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Sophronitis purpurata (Lindl.) C. Berg & M.W. Chase
Sin.: *Hadrolaelia purpurata* (Lindl. & Paxton) Chiron & V.P. Castro, *Laelia purpurata* Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1959a; van den Berg, C. & Chase, M. W., 2000.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 963* (ICN)].

Sophronitis violacea Lindl. = **Isabelia violacea** (Lindl.) C. Berg & M.W. Chase
Referencias: Schlechter, F. R. R., 1925.

Specklinia Lindl.

Número de especies: 8, 4 endémicas

Specklinia adenochila (Loefgr.) Luer = **Panmorphia adenochila** (Loefgr.) Luer

Specklinia adirii (Brade) Luer = **Acianthera adirii** (Brade) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Pridgeon, A. M. & Chase, M. N., 2001.

Specklinia alligatorifera (Rchb. f.) Luer = **Pabstiella alligatorifera** (Rchb. f.) Luer

Specklinia aphtosa (Lindl.) F. Barros = **Acianthera aphthosa** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Specklinia arcuata (Lindl.) Luer = **Pabstiella arcuata** (Lindl.) Luer

Specklinia atropurpurea Lindl. = **Zootrophion atropurpureum** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Specklinia auriculata (Lindl.) Luer = **Arthrosia auriculata** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2006.

Specklinia aveniformis (Hoehne) Luer, nom. illeg. = **Pabstiella aveniformis** (Hoehne) Luer

Specklinia bacillaris (Pabst) Luer = **Pabstiella bacillaris** (Pabst) Luer

Specklinia barbacenensis (Barb. Rodr.) Luer = **Arthrosia hygrophila** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Gonçalves, C. N. & Waechter, J. L., 2004.

Specklinia bertoniensis (Hauman) Luer = **Anathallis bertoniensis** (Hauman) Luer

Specklinia biglandulosa (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase = **Specklinia grobyi** (Bateman ex Lindl.) F. Barros

Specklinia bleyensis (Pabst) Luer = **Panmorphia bleyensis** (Pabst) Luer

Specklinia brachiloba (Hoehne) Luer = **Acianthera brachiloba** (Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Specklinia bradei (Schltr.) Luer = **Pabstiella bradei** (Schltr.) Luer

Specklinia caldensis (Hoehne & Schltr.) Luer = **Arthrosia caldensis** (Hoehne & Schltr.) Luer

Specklinia campestris (Barb. Rodr.) Luer = **Pabstiella campestris** (Barb. Rodr.) Luer

Specklinia capillaris (Lindl.) Luer = **Arthrosia floribunda** (Lindl.) Luer

Specklinia ciliolata (Schltr.) Luer = **Panmorphia ciliolata** (Schltr.) Luer

Specklinia citrina (Schltr.) Luer = **Anathallis citrina** (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase

Specklinia corticicola (Schltr. ex Hoehne) Luer = **Panmorphia corticicola** (Schltr. ex Hoehne) Luer

Specklinia crinita (Barb. Rodr.) Luer = **Acianthera crinita** (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Specklinia curtii-bradei (Pabst) Luer = **Pabstiella curtii-bradei** (Pabst) Luer

[Specklinia delicatula (Lindl.) Luer]
Sin.: *Pleurothallis delicatula* Lindl.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Specklinia depauperata (Cogn.) Luer = **Anathallis linearifolia** (Cogn.) Pridgeon & M.W. Chase

Specklinia dryadum (Schltr.) Luer = **Pabstiella dryadum** (Schltr.) Luer

Specklinia dutrai (Pabst) Luer = **Acianthera dutrai** (Pabst) C.N. Gonçalves & J.L. Waechter
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Specklinia eugenii (Pabst) Luer = **Anathallis linearifolia** (Cogn.) Pridgeon & M.W. Chase

Specklinia fernandiana (Hoehne) F. Barros
Sin.: *Pleurothallis fernandiana* Hoehne, *Stelis fernandiana* (Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Hoehne, F. C., 1938; Luer, C. A., 2002; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 4032* (MBM)].

Specklinia floribunda Lindl. = **Arthrosia floribunda** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2006.

Specklinia gert-hatschbachii (Hoehne) Luer = **Anathallis gert-hatschbachii** (Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Specklinia gonzalezii (Pabst) Luer = **Acianthera macuconensis** (Barb. Rodr.) F. Barros
Referencias: Barros, F., 2003.

Specklinia grobyi (Bateman ex Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, nom. illeg. = **Specklinia grobyi** (Bateman ex Lindl.) F. Barros
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Specklinia grobyi (Bateman ex Lindl.) F. Barros
Sin.: *Humboldtia grobyi* (Bateman ex Lindl.) Kuntze, *Humboldtia marginalis* (Rchb. f.) Kuntze, *Lepanthes marmorata* Barb. Rodr., *Lepanthes pluriflora* Barb. Rodr., *Lepanthes trilineata* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr., *Pleurothallis biglandulosa* Schltr., *Pleurothallis grobyi* Bateman ex Lindl., *Pleurothallis grobyi* Bateman ex Lindl. var. *marginalis* (Rchb. f.) Pabst, *Pleurothallis grobyi* Bateman ex Lindl. var. *marmorata* (Barb. Rodr.) Garay, *Pleurothallis grobyi* Bateman ex Lindl. var. *trilineata* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis lindleyana* Cogn., *Pleurothallis marginalis* Rchb. f., *Pleurothallis marmorata* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis perplexa* Rchb. f., *Pleurothallis pluriflora* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis trilineata* Barb. Rodr., *Specklinia biglandulosa* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Specklinia grobyi* (Bateman ex Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, nom. illeg., *Specklinia marginalis* (Rchb. f.) F. Barros
Referencias: Barros, F., 1983; Johnson, A. E., 2001; Leinig, M., 1964; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 484* (CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 6675* (MBM)].

Specklinia guimaraensii (Brade) Luer
Sin.: *Acianthera guimaraensii* (Brade) F. Barros, *Pleurothallis guimaraensii* Brade
Referencias: Barros, F., 2002b; Brade, A. C., 1943; Leinig, M., 1964; Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16073* (HB)].
Notas: La posición genérica de esta especie es dudosa.

Specklinia heterophylla (Barb. Rodr.) Luer = **Anathallis liparanges** (Rchb. f.) Luer

Specklinia hians (Lindl.) Luer = **Pabstiella hians** (Lindl.) Luer

Specklinia hygrophyla (Barb. Rodr.) Luer = **Arthrosia hygrophila** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2006.

Specklinia hypnicola (Lindl.) F. Barros, nom. illeg. = **Pabstiella hypnicola** (Lindl.) Luer

Specklinia hypnicola (Lindl.) Luer = **Pabstiella hypnicola** (Lindl.) Luer

Specklinia hystrix (Kraenzl.) Luer = **Apoda-prorepentia hystrix** (Kraenzl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2007.

Specklinia imbricata (Barb. Rodr.) Luer = **Anathallis imbricata** (Barb. Rodr.) Luer

Specklinia kleinii (Pabst) Luer = **Anathallis kleinii** (Pabst) Luer

Specklinia laciniata (Barb. Rodr.) Luer = **Panmorphia laciniata** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Specklinia leontoglossa (Rchb. f.) Luer = **Pabstiella uniflora** (Lindl.) Luer

Specklinia leptotifolia (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Acianthera leptotifolia* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis leptotifolia* Barb. Rodr.
Referencias: Luer, C. A., 2004; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 369* (RB)].

Specklinia leucopyramis (Rchb. f.) Luer
Sin.: *Pleurothallis leucopyramis* Rchb. f., *Pleurothallis pterophora* Cogn.
Referencias: Luer, C. A., 2004.; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Schenk, H. 1337* (MBM)].

Specklinia limbata (Cogn.) Luer = **Panmorphia limbata** (Cogn.) Luer

Specklinia linearifolia (Cogn.) Luer = **Anathallis linearifolia** (Cogn.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Specklinia longicaulis (Lindl.) Luer = **Arthrosia floribunda** (Lindl.) Luer

Specklinia luteola (Lindl.) F. Barros = **Acianthera luteola** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Specklinia malachantha (Rchb. f.) Luer = **Arthrosia malachantha** (Rchb. f.) Luer

Specklinia malmeana (Dutra ex Pabst) Luer = **Anathallis malmeana** (Dutra ex Pabst) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Specklinia marginalis (Rchb. f.) F. Barros = **Specklinia grobyi** (Bateman ex Lindl.) F. Barros

Specklinia matinhensis (Hoehne) Luer
Sin.: *Pleurothallis matinhensis* Hoehne, *Trichosalpinx matinhensis* (Hoehne) Luer
Referencias: Johnson, A. E., 2001; Luer, C. A., 1997, 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 476* (*)]; BRA[*Hatschbach, G. 818* (SP)].

Specklinia microblephara (Schltr.) Luer = **Panmorphia microblephara** (Schltr.) Luer

Specklinia microphyta (Barb. Rodr.) Luer = **Pleurothallis microphyta** (Barb. Rodr.) Cogn. var. **microphyta**
Referencias: Luer, C. A., 2002.

Specklinia microtis (Schltr.) Luer
Sin.: *Pleurothallis microtis* Schltr., *Stelis microtis* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, nom. illeg., *Stelis pumila* Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1143* (ICN)].

Specklinia mirabilis (Schltr.) Luer = **Pabstiella mirabilis** (Schltr.) Brieger & Senghas
Referencias: Barros, F., 2002b.

Specklinia miragliae (Leite) Luer
Sin.: *Pleurothallis miragliae* Leite
Referencias: Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 2990* (HB)].

Specklinia modesta (Barb. Rodr.) Luer = **Panmorphia brevipes** (H. Focke) Luer

Specklinia montana (Barb. Rodr.) Luer = **Arthrosia floribunda** (Lindl.) Luer

Specklinia murexoidea (Pabst) Luer = **Acianthera murexoidea** (Pabst) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Specklinia muscosa (Barb. Rodr.) Luer = **Arthrosia muscosa** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2006.

Specklinia muscosa (Barb. Rodr.) Luer var. **parvifolia** (Hoehne) Luer
Referencias: Hoehne, F. C., 1929; Luer, C. A., 2004; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 100–1800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kuhlmann, J. G. s.n.* (HB)].

Specklinia myrticola (Barb. Rodr.) Luer = **Arthrosia myrticola** (Barb. Rodr.) Luer

Specklinia obovata Lindl. = **Anathallis obovata** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Specklinia pabstii (Garay) Luer = **Anathallis pabstii** (Garay) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Specklinia paranaensis (Schltr.) Luer = **Panmorphia paranaensis** (Schltr.) Luer

Specklinia pellifeloides (Barb. Rodr.) Luer = **Pabstiella pellifeloides** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004, 2008.

Specklinia petersiana (Schltr.) Luer = **Anathallis petersiana** (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

[Specklinia picta (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase]
Sin.: *Humboldtia picta* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis picta* Lindl.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Specklinia piraquarensis (Hoehne) Luer,
Sin.: *Pleurothallis piraquarensis* Hoehne, *Stelis piraquarensis* (Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Leinig, M., 1964; Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 800–900 m.

Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 21309* (CTES, NY, SI)].

Specklinia piratiningana (Hoehne) F. Barros = **Anathallis piratiningana** (Hoehne) F. Barros
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Specklinia piratiningana (Hoehne) Luer, comb. superfl. = **Anathallis piratiningana** (Hoehne) F. Barros

Specklinia pleurothalloides (Cogn.) Luer = **Pabstiella pleurothalloides** (Cogn.) Luer

Specklinia podoglossa (Hoehne) Luer = **Pabstiella podoglossa** (Hoehne) Luer

Specklinia pristeoglossa (Rchb. f. & Warm.) Luer = **Pabstiella pristeoglossa** (Rchb. f. & Warm.) Luer

Specklinia quadridentata (Barb. Rodr.) Luer = **Pabstiella quadridentata** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004, 2007.

Specklinia recurva (Lindl.) F. Barros = **Acianthera recurva** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Specklinia rigidula (Cogn.) Luer = **Anathallis rigidula** (Cogn.) Luer

Specklinia rubens (Lindl.) F. Barros, nom. illeg. = **Anathallis rubens** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Specklinia rubens (Lindl.) Luer = **Anathallis rubens** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Specklinia rubrolimbata (Hoehne) Luer = **Panmorphia rubrolimbata** (Hoehne) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2006.

Specklinia rudolfii (Pabst) Luer = **Panmorphia rudolfii** (Pabst) Luer

Specklinia saundersiana (Rchb. f.) F. Barros = **Acianthera saundersiana** (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase

Specklinia sclerophylla (Lindl.) Luer = **Anathallis sclerophylla** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Specklinia seriata (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase = **Panmorphia seriata** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2006.

Specklinia sordida (Kraenzl.) Luer = **Pabstiella sordida** (Kraenzl.) Luer

Specklinia sororcula (Schltr.) Luer
Sin.: *Pleurothallis sororcula* Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 2004; Schlechter, F. R. R., 1922.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Brade, A. C. 6868* (HB)].

Specklinia sparsiflora (Schltr.) Luer = **Pabstiella sparsiflora** (Schltr.) Luer

Specklinia stictophylla (Schltr.) Luer
Sin.: *Pleurothallis stictophylla* Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19568* (HB, MBM)].

Specklinia subpicta (Schltr.) Luer
Sin.: *Pleurothallis subpicta* Schltr.
Referencias: Luer, C. A., 2004; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Jürgens, C. 103* (B)].

Specklinia tenera (Barb. Rodr.) Luer = **Pabstiella tenera** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004, 2007.

Specklinia tricolor (Barb. Rodr.) Luer = **Pabstiella tricolor** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004, 2007.

Specklinia trifida (Lindl.) Luer = **Pabstiella trifida** (Lindl.) Luer

Specklinia tripterantha (Rchb. f.) Luer = **Pabstiella tripterantha** (Rchb. f.) F. Barros
Referencias: Barros, F., 2002b.

Specklinia uniflora (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase = **Pabstiella uniflora** (Lindl.) Luer

Specklinia violacea Lem. = **Pleurothallis catharinensis** Cogn.

Specklinia violaceomaculata (Hoehne) Luer = **Acianthera violaceomaculata** (Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Specklinia wacketii (Handro & Pabst) Luer = **Pabstiella wackettii** (Handro & Pabst) Luer

Specklinia ypirangae (Kraenzl.) Luer = **Anathallis ypirangae** (Kraenzl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Spiranthes acaulis (Sm.) Cogn. var. *grandiflora* (Hook.) Lindl. = **Sarcoglottis grandiflora** (Hook.) Klotzsch
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Spiranthes actinosophila Barb. Rodr. = **Eurystyles actinosophila** (Barb. Rodr.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes alexandrae Kraenzl. = **Cyclopogon alexandrae** (Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Spiranthes alpestris Barb. Rodr. = **Cyclopogon congestus** (Vell.) Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Spiranthes alpestris Barb. Rodr. var. *bidentata* Barb. Rodr. = **Cyclopogon congestus** (Vell.) Hoehne
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes amblysepala Kraenzl. = **Cyclopogon apricus** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Spiranthes aprica Lindl. = **Cyclopogon apricus** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1996; Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes arechavaletae Kraenzl. = **Diskyphogyne arechavaletae** (Kraenzl.) Szlach. & R. González
Referencias: Szlachetko, D. L. & González Tamayo, R., 1996.

Spiranthes atramentaria Kraenzl. = **Brachystele widgreni** (Rchb. f.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Spiranthes atroviridis (Barb. Rodr.) Cogn. = **Garaya atroviridis** (Barb. Rodr.) Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1993b.

Spiranthes balanophorostachya Rchb. f. & Warm. = **Skeptrostachys balanophorastachya** (Rchb. f. & Warm.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes biflora (Vell.) Cogn. = **Sarcoglottis biflora** (Vell.) Schltr.
Referencias: Schlechter, F. R. R., 1919–1920.

Spiranthes bonariensis Lindl. = **Pachygenium bonariensis** (Lindl.) Szlach., R. González & Rutk.
Referencias: Correa, M. N., 1996; Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes bracteosa Lindl. = **Brachystele bracteosa** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Spiranthes butantanensis Hoehne = **Veyretia neuroptera** (Rchb. f. & Warm.) Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1995b.

Spiranthes calophylla Barb. Rodr. = **Cyclopogon calophyllus** (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.
Referencias: Correa, M. N., 1995.

Spiranthes camporum Lindl. = **Brachystele camporum** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1953, 1955.

Spiranthes castillonii (Hauman) L.O. Williams = **Odontorrhynchus castillonii** (Hauman) M.N. Correa
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes chilensis A. Rich. = **Odontorrhynchus chilensis** (A. Rich.) Garay

Spiranthes chloroleuca Barb. Rodr. = **Cyclopogon polyaden** (Vell.) F.S. Rocha & J.L. Waechter
Referencias: Johnson, A. E., 2001; Sprunger, S., 1996.

Spiranthes chlorops Rchb. f. = **Brachystele chlorops** (Rech. f.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1975a.

Spiranthes cuspidata Lindl. = **Mesadenella cuspidata** (Lindl.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes cyclochila Kraenzl. = **Brachystele cyclochila** (Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1975a.

Spiranthes delicatula auct. non Kraenzl. = **Brachystele camporum** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1975a.

Spiranthes dilatata Lindl. = **Brachystele dilatata** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1955.

Spiranthes disoides Kraenzl. = **Skeptrostachys disoides** (Kraenzl.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes diuretica Lindl. = **Brachystele unilateralis** (Poir.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1955.

Spiranthes diversifolia Cogn. = **Cyclopogon apricus** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes ekmanii (Kraenzl.) Hauman = **Pelexia ekmanii** (Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1955.

Spiranthes elata (Sw.) Rich. = **Cyclopogon elatus** (Sw.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes elata (Sw.) Rich. var. *ovata* Cogn. = **Cyclopogon elatus** (Sw.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes epiphyta Barb. Rodr. = **Lankesterella caespitosa** (Lindl.) Hoehne

Spiranthes esmeralda Lindl. & Rchb. f. = **Mesadenella cuspidata** (Lindl.) Garay
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Spiranthes euglossa Kraenzl. = **Lyroglossa euglossa** (Kraenzl.) Hoehne & Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Spiranthes excelsa Kraenzl. = **Schidorrhynchos andinum** (Hauman) Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1993a.

Spiranthes gardneri Lindl. = **Eurystyles cogniauxii** (Kraenzl.) Pabst
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Spiranthes grandiflora (Hook.) Lindl. = **Sarcoglottis grandiflora** (Hook.) Klotzsch
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes grisebachii Cogn. = **Lyroglossa grisebachii** (Cogn.) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Spiranthes hassleri Cogn. = **Veyretia hassleri** (Cogn.) Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1995b.

Spiranthes homologastra Rchb. f. & Warm. = **Sarcoglottis homalogastra** (Rchb. f. & Warm.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes hypnophila Barb. Rodr. = **Pelexia novofriburgensis** (Rchb. f.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes hysterantha Barb. Rodr. = **Pachygenium hysteranthum** (Barb. Rodr.) Szlach., R. González & Rutkowski
Referencias: Szlachetko, D. L., González Tamayo, R. & Rutkowski, P., 2001.

Spiranthes icmadophila (Barb. Rodr.) Barb. Rodr. = **Brachystele icmadophila** (Barb. Rodr.) Schltr. ex Pabst

Spiranthes itatiaiensis Kraenzl. = **Cyclopogon itatiaiensis** (Kraenzl.) Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Spiranthes lindmaniana Kraenzl. = **Veyretia neuroptera** (Rchb. f. & Warm.) Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1995b.

Spiranthes lineata Lindl. = **Hapalorchis lineatus** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes longibracteata Barb. Rodr. = **Cyclopogon longibracteatus** (Barb. Rodr.) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Spiranthes macrantha Rchb. f. = **Pteroglossa macrantha** (Rchb. f.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes macropoda Barb. Rodr. = **Pelexia macropoda** (Barb. Rodr.) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Spiranthes margaritifera Lindl. & Rchb. f. = **Mesadenella cuspidata** (Lindl.) Garay
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Spiranthes micrantha Barb. Rodr. = **Hapalorchis micrantha** (Barb. Rodr.) Hoehne
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes neuroptera Rchb. f. & Warm. = **Veyretia neuroptera** (Rchb. f. & Warm.) Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1995b.

Spiranthes nitida (Vell.) Cogn. var. *andina* Hauman = **Schidorrhynchos andinum** (Hauman) Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1993a.

Spiranthes oestrifera Rchb. f. & Warm. = **Pelexia oestrifera** (Rchb. f. & Warm.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Spiranthes oligantha Hoehne = **Cyclopogon oliganthus** (Hoehne) Hoehne & Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Spiranthes orobanchoides Kraenzl. = **Pelexia orobanchoides** (Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Spiranthes orthosepala Rchb. f. & Warm. = **Pelexia orthosepala** (Rchb. f. & Warm.) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Spiranthes pachychila Kraenzl. = **Schidorrhynchos andinum** (Hauman) Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1993a.

Spiranthes paludosa Cogn. = **Cyclopogon apricus** (Lindl.) Schltr.

Spiranthes paraguayensis Rchb. f. = **Skeptrostachys paraguayensis** (Rchb. f.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes picta (Anders) Lindl. var. *grandiflora* (Hook.) L.O. Williams = **Sarcoglottis grandiflora** (Hook.) Klotzsch
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Spiranthes pterygantha Rchb. f. & Warm. = **Pelexia pterygantha** (Rchb. f. & Warm.) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Spiranthes rupestris Lindl. = **Skeptrostachys rupestris** (Lindl.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes sagittata Rchb. f. & Warm. = **Veyretia sagittata** (Rchb. f. & Warm.) Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1995b.

Spiranthes saltensis Griseb. = **Pachygenium bonariensis** (Lindl.) Szlach., R. González & Rutk.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes sauroglossum G. Nicholson = **Schidorrhynchos andinum** (Hauman) Szlach.

Spiranthes sellilabris Griseb. = **Sauroglossum sellilabre** (Griseb.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes subfiliformis Cogn. = **Brachystele subfiliformis** (Cogn.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes ulaei Cogn. = **Brachystele dilatata** (Lindl.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Spiranthes uliginosa Barb. Rodr. = **Sarcoglottis uliginosa** Barb. Rodr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Spiranthes variegata (Barb. Rodr.) Cogn. = **Cyclopogon variegatus** Barb. Rodr.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Spiranthes warmingii Rchb. f. = **Cyclopogon warmingii** (Rchb. f.) Schltr.

Stanhopea Frost ex Hook.

Número de especies: 3

[Stanhopea graveolens Lindl.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Stanhopea graveolens Lindl. var. *atropurpurea* Hort ex Planch. = **Stanhopea insignis** Frost ex Hook.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Stanhopea graveolens Lindl. var. *flava* Lodd. = **Stanhopea insignis** Frost ex Hook.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Stanhopea graveolens Lindl. var. *leuchila* Lem. = **Stanhopea insignis** Frost ex Hook.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Stanhopea graveolens Lindl. var. *lietzei* Regel = **Stanhopea lietzei** (Regel) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1959.

Stanhopea graveolens Lindl. var. *major* Hort ex Planch. = **Stanhopea insignis** Frost ex Hook.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Stanhopea graveolens Lindl. var. *pallida* Hort ex Planch. = **Stanhopea insignis** Frost ex Hook.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Stanhopea graveolens Lindl. var. *punctata* Hort ex Planch. = **Stanhopea insignis** Frost ex Hook.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Stanhopea graveolens Lindl. var. *straminea* Porsch = **Stanhopea lietzei** (Regel) Schltr.
Referencias: Jenny, R., 1994.

Stanhopea graveolens Lindl. var. *superba* Hort ex Planch. = **Stanhopea insignis** Frost ex Hook.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Stanhopea insignis Frost ex Hook.
Sin.: *Stanhopea graveolens* Lindl. var. *atropurpurea* Hort ex Planch., *Stanhopea graveolens* Lindl. var. *flava* Lodd., *Stanhopea graveolens* Lindl. var. *leuchila* Lem., *Stanhopea graveolens* Lindl. var. *major* Hort ex Planch., *Stanhopea graveolens* Lindl. var. *pallida* Hort ex Planch., *Stanhopea graveolens* Lindl. var. *punctata* Hort ex Planch., *Stanhopea graveolens* Lindl. var. *superba* Hort ex Planch.
Referencias: Hoehne, F. C., 1942b; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lange, R. T. 10284* (MBM)].

Stanhopea lietzei (Regel) Schltr.
Sin.: *Stanhopea graveolens* Lindl. var. *lietzei* Regel, *Stanhopea graveolens* Lindl. var. *straminea* Porsch
Referencias: Jenny, R., 1994; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2894* (HB, MBM)].

Stanhopea xytriophora Rchb. f.
Referencias: Correa, M. N., 1959.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–1000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 757* (SI)].

Stelis Sw.

Número de especies: 12, 5 endémicas

Stelis aprica Lindl.
Sin.: *Stelis catharinensis* Lindl., *Stelis herzogii* Schltr., *Stelis miersii* Lindl., *Stelis rodriguesii* Cogn.

Referencias: Garay, L. A., 1956; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996; Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004; Waechter, J. L., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2640* (SI, SP)].

Stelis aquinoana Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 919* (SI)].

Stelis arcuata (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase = **Pabstiella arcuata** (Lindl.) Luer

Stelis argentata Lindl.
Sin.: *Stelis littoralis* Barb. Rodr.
Referencias: Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004; Waechter, J. L., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Waechter, J. L. 578* (ICN)].

Stelis bertoniensis (Hauman) Pridgeon & M.W. Chase = **Anathallis bertoniensis** (Hauman) Luer

[Stelis caespitosa Lindl.]
Sin.: *Stelis microcaulis* Barb. Rodr.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Stelis catharinensis Lindl. = **Stelis aprica** Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.

Stelis deregularis Barb. Rodr. = **Pseudostelis spiralis** (Lindl.) Schltr.

Stelis diaphana Schltr. = **Stelis papaquerensis** Rchb. f.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Stelis drosophila Barb. Rodr. = **Stelis intermedia** Poepp. & Endl.

Stelis dusenii Garay = **Stelis intermedia** Poepp. & Endl.

Stelis epilithica Garay = **Stelis papaquerensis** Rchb. f.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Stelis fasciculata Regel = **Anathallis obovata** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Stelis fernandiana (Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase = **Specklinia fernandiana** (Hoehne) F. Barros
Referencias: Hoehne, F. C., 1938.

Stelis foliosa Hook. = **Polystachya foliosa** (Hook.) Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Stelis fragrans Schltr. = **Stelis pauciflora** Lindl.
Referencias: Duque, O., 2003.

Stelis fraterna Lindl.
Sin.: *Stelis guttifera* Porsch, *Stelis inaequisepala* Hoehne & Schltr., *Stelis penduliflora* Barb. Rodr., *Stelis vinosa* Barb. Rodr., *Stelis vinosa* Barb. Rodr. var. *longifolia* Cogn.
Referencias: Sprunger, S., 1996; Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Santos, E. P. 802* (SP)].

Stelis guttifera Porsch = **Stelis fraterna** Lindl.

Stelis herzogii Schltr. = **Stelis aprica** Lindl.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Stelis hians (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase = **Pabstiella hians** (Lindl.) Luer

Stelis hoehnei Schltr. = **Stelis ruprechtiana** Rchb. f.

Stelis hygrophila (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase = **Arthrosia hygrophila** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Stelis hypnicola (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase = **Pabstiella hypnicola** (Lindl.) Luer

Stelis inaequisepala Hoehne & Schltr. = **Stelis fraterna** Lindl.

Stelis intermedia Poepp. & Endl.
Sin.: *Stelis drosophila* Barb. Rodr., *Stelis dusenii* Garay, *Stelis petropolitana* Rchb. f.
Referencias: Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gatti, G. 288* (SP)].

Stelis juergensii Schltr. = **Stelis papaquerensis** Rchb. f.

Stelis leinigii Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 300–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Leinig, M. 167* (HB)].

Stelis littoralis Barb. Rodr. = **Stelis argentata** Lindl.

Stelis macrochlamys Hoehne & Schltr. = **Stelis megantha** Barb. Rodr.

Stelis megantha Barb. Rodr.
Sin.: *Stelis macrochlamys* Hoehne & Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996; Waechter, J. L., 1998.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 37048* (CTES)].

Stelis microcaulis Barb. Rodr. = **Stelis caespitosa** Lindl.

Stelis microphylla Hoehne & Schltr., hom. illeg. = **Stelis parvifolia** Garay

Stelis microtis (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, nom. illeg. = **Specklinia microtis** (Schltr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Stelis miersii Lindl. = **Stelis aprica** Lindl.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Stelis mucronata Porsch = **Stelis pauciflora** Lindl.
Referencias: Duque, O., 2003.

Stelis mucronata Porsch var. *atrorubra* Pabst = **Stelis pauciflora** Lindl.
Referencias: Duque, O., 2003.

Stelis omalosantha Barb. Rodr. = **Stelis pauciflora** Lindl.
Referencias: Duque, O., 2003.

Stelis papaquerensis Rchb. f.
Sin.: *Stelis diaphana* Schltr., *Stelis epilithica* Garay, *Stelis juergensii* Schltr., *Stelis porschiana* Schltr., *Stelis pterostele* Hoehne & Schltr., *Stelis reflexisepala* Garay, *Stelis smaragdina* Barb. Rodr., *Stelis tweediana* Lindl.
Referencias: Fraga Nunes, V., 1997; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4381* (HB)].

Stelis parvifolia Garay
Sin.: *Stelis microphylla* Hoehne & Schltr., hom. illeg.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hoehne, F. C. s.n.* (SP)].

Stelis pauciflora Lindl.
Sin.: *Stelis fragrans* Schltr., *Stelis mucronata* Porsch, *Stelis mucronata* Porsch var. *atrorubra* Pabst, *Stelis omalosantha* Barb. Rodr., *Stelis pauloensis* Hoehne & Schltr.
Referencias: Duque, O., 2003.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19585* (NY)].

Stelis pauloensis Hoehne & Schltr. = **Stelis pauciflora** Lindl.
Referencias: Duque, O., 2003.

Stelis pellifeloides (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase = **Pabstiella pellifeloides** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Stelis penduliflora Barb. Rodr. = **Stelis fraterna** Lindl.

[Stelis perpusilla Cogn.]
Notas: Nombre dudoso.

Stelis petropolitana Rchb. f. = **Stelis intermedia** Poepp. & Endl.

Stelis piraquarensis (Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase = **Specklinia piraquarensis** (Hoehne) Luer

Stelis porschiana Schltr. = **Stelis papaquerensis** Rchb. f.

Stelis pterostele Hoehne & Schltr. = **Stelis papaquerensis** Rchb. f.
Referencias: Garay, L. A., 1979.

Stelis pumila Pridgeon & M.W. Chase = **Specklinia microtis** (Schltr.) Luer

Stelis reflexisepala Garay = **Stelis papaquerensis** Rchb. f.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Stelis reitzii Garay
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1000* (HBR)].

Stelis rodriguesii Cogn. = **Stelis aprica** Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Sprunger, S., 1996.

Stelis ruprechtiana Rchb. f.
Sin.: *Stelis hoehnei* Schltr.
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 300–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2056* (NY)].

Stelis smaragdina Barb. Rodr. = **Stelis papaquerensis** Rchb. f.
Referencias: Garay, L. A., 1979.

[Stelis thermophila Schltr.]
Notas: Nombre dudoso.

Stelis tricolor (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase = **Pabstiella tricolor** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Stelis tweediana Lindl. = **Stelis papaquerensis** Rchb. f.
Referencias: Garay, L. A., 1979.

Stelis vinosa Barb. Rodr. = **Stelis fraterna** Lindl.
Referencias: Garay, L. A., 1979.

Stelis vinosa Barb. Rodr. var. *longifolia* Cogn. = **Stelis fraterna** Lindl.

Stenocoryne aureo-fulva (Hook.) Kraenzl. = **Bifrenaria aureo-fulva** (Hook.) Lindl.
Referencias: Koehler, S. & Amaral, M. E., 2004.

Stenocoryne racemosa (Hook.) Kraenzl. = **Bifrenaria racemosa** (Hook.) Lindl.

Stenocoryne secunda (Vell.) Hoehne = **Bifrenaria aureo-fulva** (Hook.) Lindl.
Referencias: Castro Neto, V. P., 2004.

Stenocoryne vitellina (Lindl.) Kraenzl. = **Bifrenaria vitellina** (Lindl.) Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Stenoptera actinosophila (Barb. Rodr.) Cogn. = **Eurystyles actinosophila** (Barb. Rodr.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Stenoptera ananassocomos Rchb. f. = **Eurystyles cotyledon** Wawra
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Stenoptera aspidistrifolia Hauman = **Pterichis boliviana** Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1992.

Stenoptera lorenzii Cogn. = **Eurystyles lorenzii** (Cogn.) Schltr.
Referencias: Burns-Balogh, P., Robinson, H. E. & Foster, M. S., 1985.

Stenorrhynchos albicans Cogn. = **Pelexia albicans** (Cogn.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos apetalum Kraenzl. = **Sacoila lanceolata** (Aubl.) Garay
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Stenorrhynchos arechavaletanii Barb. Rodr. = **Skeptrostachys arechavaletanii** (Barb. Rodr.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos argentinum Griseb. = **Sacoila argentina** (Griseb.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos argentinum Griseb. var. *minor* Cogn. = **Sacoila argentina** (Griseb.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos australe Lindl. = **Sacoila lanceolata** (Aubl.) Garay
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Stenorrhynchos balanophorostachyum (Rchb. f. & Warm.) Cogn. = **Skeptrostachys balanophorastachya** (Rchb. f. & Warm.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos berroanum Kraenzl. = **Skeptrostachys berroana** (Kraenzl.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos bonariense (Lindl.) Cogn. = **Pachygenium bonariensis** (Lindl.) Szlach., R. González & Rutk.
Referencias: Correa, M. N., 1955.

Stenorrhynchos bradei Schltr. = **Sacoila duseniana** (Kraenzl.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos castillonii Hauman = **Odontorrhynchus castillonii** (Hauman) M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1953.

Stenorrhynchos ceracifolium Barb. Rodr. = **Lankesterella ceracifolia** (Barb. Rodr.) Ames
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Stenorrhynchos cogniauxii Kraenzl. = **Eurystyles cogniauxii** (Kraenzl.) Pabst
Referencias: Burns-Balogh, P., Robinson, H. E. & Foster, M. S., 1985.

Stenorrhynchos congestiflorum Cogn. = **Skeptrostachys congestiflora** (Cogn.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos densum Hauman = **Skeptrostachys disoides** (Kraenzl.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos dusenianum Cogn. = **Sacoila duseniana** (Kraenzl.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos ekmanii Kraenzl. = **Pelexia ekmanii** (Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Schlechter, F. R. R., 1920.

Stenorrhynchos esmeraldae (Lindl. & Rchb. f.) Cogn. = **Mesadenella cuspidata** (Lindl.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos exaltatum Kraenzl. = **Skeptrostachys arechavaletanii** (Barb. Rodr.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos giganteum Cogn. = **Skeptrostachys gigantea** (Cogn.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos hassleri Cogn. = **Sacoila hassleri** (Cogn.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos holosericeum Kraenzl. = **Pelexia tamanduensis** (Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos hypnophilum Barb. Rodr. = **Pelexia novofriburgensis** (Rchb. f.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos hysteranthum Barb. Rodr. = **Pachygenium hysteranthum** (Barb. Rodr.) Szlach., R. González & Rutkowski
Referencias: Szlachetko, D. L., González Tamayo, R. & Rutkowski, P., 2001.

Stenorrhynchos icmadophilus Barb. Rodr. = **Brachystele icmadophila** (Barb. Rodr.) Schltr. ex Pabst

Stenorrhynchos lanceolatum (Aubl.) Rich. ex Spreng. = **Sacoila lanceolata** (Aubl.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos lateritium Kraenzl. = **Skeptrostachys arechavaletanii** (Barb. Rodr.) Garay
Referencias: Pabst, G. F. J., 1952a.

Stenorrhynchos laxum Poepp. & Endl. = **Pelexia laxa** (Poepp. & Endl.) Lindl.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos lindmanianum Kraenzl. = **Pelexia lindmaniana** (Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos loefgrenii Porsch = **Pelexia loefgrenii** (Porsch) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos longifolium Cogn. = **Sacoila hassleri** (Cogn.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos macranthum (Rchb. f.) Cogn. = **Pteroglossa macrantha** (Rchb. f.) Schltr.
Referencias: Correa, M. N., 1955; Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos macropodum (Barb. Rodr.) Barb. Rodr. = **Pelexia macropoda** (Barb. Rodr.) Schltr.
Referencias: Schlechter, F. R. R., 1920.

Stenorrhynchos montevidense Barb. Rodr. = **Skeptrostachys montevidensis** (Barb. Rodr.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos novofriburgense Rchb. f. = **Pelexia novofriburgensis** (Rchb. f.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos oestriferum (Rchb. f. & Warm.) Cogn. = **Pelexia oestrifera** (Rchb. f. & Warm.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Schlechter, F. R. R., 1920.

Stenorrhynchos oestriferum (Rchb. f. & Warm.) Cogn. var. *minor* Kraenzl. = **Pelexia oestrifera** (Rchb. f. & Warm.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos orchidioides (Sw.) Rich. = **Sacoila lanceolata** (Aubl.) Garay
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Stenorrhynchos orchidioides (Sw.) Rich. var. *australis* Cogn. = **Sacoila lanceolata** (Aubl.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos orobanchoides Kraenzl. = **Pelexia orobanchoides** (Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos paraguayense (Rchb. f.) Cogn. = **Skeptrostachys paraguayensis** (Rchb. f.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos pedicellatum Cogn. = **Sacoila pedicellata** (Cogn.) Garay
Referencias: Correa, M. N., 1996; Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos pedicellatum Cogn. var. *major* Cogn. = **Sacoila pedicellata** (Cogn.) Garay

Stenorrhynchos polyanthum Kraenzl. = **Skeptrostachys montevidensis** (Barb. Rodr.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos pteryganthum (Rchb. f. & Warm.) Cogn. = **Pelexia pterygantha** (Rchb. f. & Warm.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos regium Kraenzl. = **Pteroglossa regia** (Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Schlechter, F. R. R., 1920.

Stenorrhynchos riograndense Kraenzl. = **Sacoila riograndensis** (Kraenzl.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos robustum Kraenzl. = **Pelexia robusta** (Kraenzl.) Hoehne
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos rodriguesii Cogn. = **Cyclopogon longibracteatus** (Barb. Rodr.) Schltr.
Referencias: Sprunger, S., 1996.

Stenorrhynchos rupestre (Lindl.) Cogn. = **Skeptrostachys rupestris** (Lindl.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos rupestre (Lindl.) Cogn. var. *minor* Hoehne = **Skeptrostachys rupestris** (Lindl.) Garay

Stenorrhynchos saltensis (Griseb.) Cogn. = **Pachygenium bonariensis** (Lindl.) Szlach., R. González & Rutk.
Referencias: Correa, M. N., 1996.

Stenorrhynchos sancti-jacobi Kraenzl. = **Sacoila lanceolata** (Aubl.) Garay
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Stenorrhynchos secundiflorum Lillo & Hauman = **Sacoila secundiflora** (Lillo & Hauman) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos speciosus Rchb. f. = **Sacoila lanceolata** (Aubl.) Garay

Stenorrhynchos stenophyllum Cogn. = **Skeptrostachys balanophorastachya** (Rchb. f. & Warm.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos tamanduense Kraenzl. = **Pelexia tamanduensis** (Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos taquaremboense Barb. Rodr. = **Cyclodium taquaremboensis** (Barb. Rodr.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos vaginatum Cogn. = **Pachygenium paraguayensis** (Garay) Szlach., R. González & Rutk.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

Stenorrhynchos ventricosum Cogn. = **Pelexia ventricosa** (Cogn.) Schltr.
Referencias: Schlechter, F. R. R., 1920.

Stenorrhynchos viride Cogn. = **Pelexia viridis** (Cogn.) Schltr.
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980].

[Stenorrhynchos vulnearium Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d; Rojas Acosta, N., 1918.
Notas: Nombre dudoso.

Stigmatosema Garay

Número de especies: 3 endémicas

Stigmatosema garayana Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1995a.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14605* (C, MBM)].

Stigmatosema hatschbachii (Pabst) Garay
Sin.: *Brachystele hatschbachii* Pabst
Referencias: Garay, L. A., 1982[1980]; Pabst, G. F. J., 1976.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 500–1100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24709* (HB, MBM)].

Stigmatosema odileana Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1995a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(COS); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 2791* (C)]; BRA[*sin colector 1327* (HBG)].

Stigmatosema polyaden (Vell.) Garay = **Cyclopogon polyaden** (Vell.) F.S. Rocha & J.L. Waechter
Referencias: Rocha, F. S. & Waechter, J. L., 2006.

Synanthes Burns-Bal., H. Rob. & M.S. Foster

Número de especies: 1

Synanthes bertonii Burns-Bal., H. Rob. & M.S. Foster
Referencias: Burns-Balogh, P., Robinson, H. E. & Foster, M. S., 1985.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 455* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 4054* (G)].

Tetragamestus modestus Rchb. f. = **Scaphyglottis modesta** (Rchb. f.) Schltr.
Referencias: Dressler, R. L., Whitten, W. M. & Williams, N. H., 2004.

Tetramicra bicolor (Lindl.) Rolfe = **Leptotes bicolor** Lindl.
Referencias: Campacci, M. A., 2004.

Tetramicra minuta Rolfe = **Leptotes tenuis** Rchb. f.

Tetramicra serrulata (Lindl.) G. Nicholson = **Leptotes bicolor** Lindl.
Referencias: Campacci, M. A., 2004.

Theodorea gomezoides Barb. Rodr. = **Rodrigueziella gomezoides** (Barb. Rodr.) Pabst

Theodorea handroi Hoehne = **Rodrigueziella handroi** (Hoehne) Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Tolumnia pusilla (L.) Hoehne = **Psygmorchis pusilla** (L.) Dodson & Dressler
Referencias: Dodson, C. H. & Dressler, R. L., 1972.

Trachelosiphon actinosophila (Barb. Rodr.) Schltr. = **Eurystyles actinosophila** (Barb. Rodr.) Schltr.
Referencias: Burns-Balogh, P., Robinson, H. E. & Foster, M. S., 1985.

Trachelosiphon cogniauxii (Kraenzl.) Schltr. = **Eurystyles cogniauxii** (Kraenzl.) Pabst
Referencias: Burns-Balogh, P., Robinson, H. E. & Foster, M. S., 1985.

Trachelosiphon lorenzii (Cogn.) Hoehne = **Eurystyles lorenzii** (Cogn.) Schltr.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945.

Trachelosiphon paranense Schltr. = **Eurystyles paranaensis** (Schltr.) Schltr.
Referencias: Burns-Balogh, P., Robinson, H. E. & Foster, M. S., 1985.

Trichocentrum Poepp. & Endl.

Número de especies: 5, 1 introducida

Trichocentrum cebolleta (Jacq.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Epidendrum cebolleta* Jacq., *Oncidium cebolleta* (Jacq.) Sw.
Referencias: Carnevali, G., Ramírez-Morillo, I. M., Romero-González, G. A., Vargas, C. A. & Foldats, E., 2003; Hauman, L. L., 1917b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2072* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 21394* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 16711* (SI)].

Trichocentrum fuscum Lindl.
Sin.: *Acoidium fuscum* Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Introducida. 300–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2091* (MBM, SP)].

Trichocentrum jonesianum (Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Oncidium jonesianum* Rchb. f.
Referencias: Dematteis, M. & Daviña, J. R., 1999; Hauman, L. L., 1921a; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR); PRY(CEN, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 3957* (CTES)]; BRA[*Carneiro, J. 641* (MBM)]; PRY[*Schinini, A. 27922* (CTES)].

Trichocentrum morenoi (Dodson & Luer) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Oncidium morenoi* Dodson & Luer
Referencias: Dematteis, M. & Daviña, J. R., 1999.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: PRY(APA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Dematteis, M. 585* (CTES)].

Trichocentrum pumilum (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Epidendrum ligulatum* Vell., *Lophiaris pumila* (Lindl.) Braem, *Oncidium pumilum* Lindl., *Oncidium pumilum* Lindl. var. *angustifolium* Cogn., *Oncidium pumilum* Lindl. var. *robustum* Cogn.
Referencias: Dematteis, M. & Daviña, J. R., 1999; Fraga Nunes, V., 1997; Johnson, A. E., 2001; Martínez Crovetto, R., 1981; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1952a; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, ITA, PAI, SPE); URY(TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2716* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2654* (MBM, SI, SP)]; PRY[*Hassler, E. 3860* (G)]; URY[*Berro, M. B. 2858* (*)].

Trichosalpinx Luer

Número de especies: 1

Trichosalpinx bicolor (Barb. Rodr.) Luer = **Pabstiella quadridentata** (Barb. Rodr.) Luer

Trichosalpinx carinifera (Barb. Rodr.) Luer = **Pabstiella carinifera** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 1983.

Trichosalpinx curtii-bradei (Pabst) Luer = **Pabstiella curtii-bradei** (Pabst) Luer

[Trichosalpinx dura (Lindl.) Luer]
Sin.: *Pleurothallis dura* Lindl., *Pleurothallis foliata* Griseb.
Referencias: Luer, C. A., 1997; Vásquez, R. & Ibisch, P. L., 2000.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Trichosalpinx matinhensis (Hoehne) Luer = **Specklinia matinhensis** (Hoehne) Luer

Trichosalpinx montana (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Lepanthes montana* Barb. Rodr., *Pleurothallis lepanthipoda* Hoehne & Schltr., *Pleurothallis quartzicola* Cogn.
Referencias: Luer, C. A., 1997.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Leinig, M. 331* (HB)].

Trichosalpinx mouraeoides (Hoehne) Luer = **Pabstiella mouraeoides** (Hoehne) Luer var. **mouraeoides**

Trichosalpinx podoglossa (Hoehne) Luer = **Pabstiella podoglossa** (Hoehne) Luer

Trichosalpinx quadridentata (Barb. Rodr.) Luer = **Pabstiella quadridentata** (Barb. Rodr.) Luer

Trichosalpinx sordida (Kraenzl.) Luer = **Pabstiella sordida** (Kraenzl.) Luer

Trichosalpinx tenera (Barb. Rodr.) Luer = **Pabstiella tenera** (Barb. Rodr.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 1983, 2007.

Trichosalpinx violacea (Lem.) Luer = **Pleurothallis catharinensis** Cogn.

Trigonidium Lindl.

Número de especies: 3, 1 endémica

Trigonidium latifolium Lindl.
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 43536* (MBM, NY, SP)].

Trigonidium macranthum Barb. Rodr.
Referencias: Hatschbach, G., 1974; Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18110* (HB, MBM)].

Trigonidium obtusum Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 69862* (MBM)].

Triphora Nutt.

Número de especies: 1

Triphora hassleriana (Cogn.) Schltr.
Sin.: *Pogonia hassleriana* Cogn.
Referencias: Correa, M. N., 1984h; Eskuche, U. G., 1989; Medley, M. E., 1996.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL); PRY(PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 1022* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 31662* (CTES)].

Trizeuxis Lindl.

Número de especies: 1

Trizeuxis falcata Lindl.
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10275* (NY)].

Uleiorchis Hoehne

Número de especies: 1

Uleiorchis cogniauxiana Hoehne = **Uleiorchis ulaei** (Cogn.) Handro
Referencias: Born, M. G., Maas, P. J. M., Dressler, R. L. & Westra, L. Y. T., 1999.

Uleiorchis ulaei (Cogn.) Handro
Sin.: *Uleiorchis cogniauxiana* Hoehne, *Wullschlaegelia ulaei* Cogn.
Referencias: Born, M. G., Maas, P. J. M., Dressler, R. L. & Westra, L. Y. T., 1999; Hoehne, F. C., 1945; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 1000* (BR, HBG, RB, US)].

Vanilla Mill.

Número de especies: 9, 3 endémicas

Vanilla angustipetala Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Schlechter, F. R. R., 1922.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–1200 m.
Países: BRA(PAR); PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Brade, A. C. 7775* (HB, R, SP)]; PRY[*Woolston, A. L. 1139* (HB)].

Vanilla argentina Hicken = **Vanilla chamissonis** Klotzsch var. **chamissonis**

Vanilla bertoniensis Bertoni
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–200 m.
Países: PRY(APA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Bertoni, M. S. 6039* (SP)].

Vanilla chamissonis Klotzsch var. *brevifolia* Cogn. = **Vanilla chamissonis** Klotzsch var. **chamissonis**
Referencias: Correa, M. N., 1996.

Vanilla chamissonis Klotzsch var. **chamissonis**
Sin.: *Vanilla argentina* Hicken, *Vanilla chamissonis* Klotzsch var. *brevifolia* Cogn.
Referencias: Hauman, L. L., 1921a; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Waechter, J. L., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(CHA, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6598* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15885* (MBM)]; PRY[*Rojas, T. 2040* (SI, SP)].

Vanilla chamissonis Klotzsch var. **longifolia** Hoehne
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1859* (MBM, SP)].

Vanilla dietschiana Edwall = **Dictyophyllaria dietschiana** (Edwall) Garay

Vanilla edwallii Hoehne
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952; Hoehne, F. C., 1945; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1002* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 9144* (MBM)].

Vanilla organensis Rolfe
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20888* (MBM)]; PRY[*Lindman, N. A. 1849* (S)].

Vanilla palmarum (Salzm. ex Lindl.) Lindl.
Sin.: *Epidendrum palmarum* Salzm. ex Lindl.
Referencias: Brade, A. C. & Pabst, G. F. J., 1952; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.

Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 48201* (MBM)].

Vanilla parvifolia Barb. Rodr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Santos, E. P. 741* (SP)]; PRY[*Jörgensen, P. 3943* (SI)].

Vanilla perexilis Bertoni
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: PRY(APA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Bertoni, M. S. s.n.* (*)].
Notas: Ejemplar depositado en el herbario de la Sociedad Científica del Paraguay.

[Vanilla pompona Schiede]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Vanilla rojasiana Hoehne
Referencias: Johnson, A. E., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 443* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 5082a* (AS, SP)].

[Vanilla verrucosa Hauman]
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Hauman, L. L., 1921a.
Notas: Nombre dudoso.

Veyretia Szlach.
Número de especies: 4, 2 endémicas

Veyretia hassleri (Cogn.) Szlach.
Sin.: *Sarcoglottis hassleri* (Cogn.) Schltr., *Spiranthes hassleri* Cogn.
Referencias: Hoehne, F. C., 1945; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Szlachetko, D. L., 1995b.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, MIE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 6846* (CTES)]; BRA[*Pedersen, T. M. 12700* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 8668* (G)].

Veyretia neuroptera (Rchb. f. & Warm.) Szlach.
Sin.: *Sarcoglottis butantanensis* (Hoehne) Hoehne & Schltr., *Sarcoglottis neuroptera* (Rchb. f. & Warm.) Schltr., *Spiranthes butantanensis* Hoehne, *Spiranthes lindmaniana* Kraenzl., *Spiranthes neuroptera* Rchb. f. & Warm.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Garay, L. A., 1982[1980]; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Szlachetko, D. L., 1995b.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 11893* (BAB)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 7320* (NY)].

Veyretia sagittata (Rchb. f. & Warm.) Szlach.
Sin.: *Sarcoglottis sagittata* (Rchb. f. & Warm.) Schltr., *Spiranthes sagittata* Rchb. f. & Warm.
Referencias: Correa, M. N., 1995; Garay, L. A., 1982[1980]; Hoehne, F. C., 1945; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1975; Szlachetko, D. L., 1995b.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(COS, MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 20766* (BAB, CTES)].

Veyretia undulata Szlach.
Referencias: Szlachetko, D. L., 1996.
Hierba terrestre. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1425* (B, HBR)].

Warmingia Rchb. f., nom. cons.
Número de especies: 1

Warmingia eugenii Rchb. f.
Sin.: *Warmingia loefgrenii* Cogn.
Referencias: Correa, M. N. & Johnson, A., 1993; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Rogalski, J. M. & Zanin, E. M., 2003.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Moreyra, P. 131* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 20922* (HB, MBM)].

Warmingia loefgrenii Cogn. = **Warmingia eugenii** Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Warrea Lindl.
Número de especies: 1

Warrea bidentata Lindl. = **Warrea warreana** (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Warrea speciosa Schltr. = **Warrea warreana** (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Warrea tricolor Lindl. = **Warrea warreana** (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Warrea unijugata Regel = **Warrea warreana** (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf.
Referencias: Johnson, A. E., 2001.

Warrea warreana (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf.
Sin.: *Aganisia tricolor* (Lindl.) Boiss., *Koellensteinia tricolor* (Lindl.) Rchb. f., *Maxillaria warreana* Lodd. ex Lindl., *Warrea bidentata* Lindl., *Warrea speciosa* Schltr., *Warrea tricolor* Lindl., *Warrea unijugata* Regel, *Warrea warreana* (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf. var. *unijugata* (Regel) Rchb. f.
Referencias: Hashimoto, T., 1993; Hauman, L. L., 1917b; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6898* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 1017* (ICN)].

Warrea warreana (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf. var. *unijugata* (Regel) Rchb. f. = **Warrea warreana** (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf.

Warscewiczella gehrtiana Hoehne = **Hoehneella gehrtiana** (Hoehne) Ruschi
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Wullschlaegelia Rchb. f.

Número de especies: 1

Wullschlaegelia aphylla (Sw.) Rchb. f.
Sin.: *Cranichis aphylla* Sw.
Referencias: Born, M. G., Maas, P. J. M., Dressler, R. L. & Westra, L. Y. T., 1999; Hauman, L. L., 1921a; Hoehne, F. C., 1945; Johnson, A. E., 2001; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Spegazzini, C. L., 1917.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1675* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 9479* (S)]; PRY[*Balansa, B. 3010* (BM, K, L)].

Wullschlaegelia paranaensis Kraenzl. = **Platythelys paranaensis** (Kraenzl.) Garay
Referencias: Garay, L. A., 1977.

Wullschlaegelia ulaei Cogn. = **Uleiorchis ulaei** (Cogn.) Handro
Referencias: Born, M. G., Maas, P. J. M., Dressler, R. L. & Westra, L. Y. T., 1999.

Xylobium Lindl.

Número de especies: 3

Xylobium brachystachyum Kraenzl. = **Xylobium colleyi** (Bateman ex Lindl.) Rolfe
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.

Xylobium colleyi (Bateman ex Lindl.) Rolfe
Sin.: *Maxillaria colleyi* Bateman ex Lindl., *Xylobium brachystachyum* Kraenzl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sobral, J. 2* (SP)].

Xylobium dusenii Kraenzl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Kraenzlin, F. W. L., 1911.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 7453* (S)].

Xylobium gracile Schltr. = **Xylobium variegatum** (Ruiz & Pav.) Garay & Dunst.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953.

Xylobium scabrilingue Schltr. = **Xylobium variegatum** (Ruiz & Pav.) Garay & Dunst.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953.

Xylobium squalens (Lindl.) Lindl. = **Xylobium variegatum** (Ruiz & Pav.) Garay & Dunst.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953.

Xylobium variegatum (Ruiz & Pav.) Garay & Dunst.
Sin.: *Dendrobium squalens* Lindl., *Maxillaria variegata* Ruiz & Pav., *Xylobium gracile* Schltr., *Xylobium scabrilingue* Schltr., *Xylobium squalens* (Lindl.) Lindl.
Referencias: Hoehne, F. C., 1953; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 25586* (HB, MBM, NY)].

Yolanda restrepioides Hoehne = **Brachionidium restrepioides** (Hoehne) Pabst

Zootrophion Luer

Número de especies: 1

Zootrophion atropurpureum (Lindl.) Luer
Sin.: *Cryptophoranthus atropurpureus* (Lindl.) Rolfe, *Cryptophoranthus schenckii* Cogn., *Pleurothallis atropurpurea* (Lindl.) Lindl., *Specklinia atropurpurea* Lindl., *Zootrophion schenckii* (Cogn.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 400–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. 2260* (ICN, RB)].

Zootrophion schenckii (Cogn.) Luer = **Zootrophion atropurpureum** (Lindl.) Luer
Referencias: Luer, C. A., 2004.

Zygopetalum Hook.

Número de especies: 5

Zygopetalum brachypetalum Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. M. 3218* (MBM)].

Zygopetalum crinitum Lodd.
Sin.: *Zygopetalum mackayi* Hook. var. *convexum* Mutel, *Zygopetalum mackayi* Hook. var. *crinitum* Lindl., *Zygopetalum pubescens* Hoffm., *Zygopetalum stenichilum* Lodd.
Referencias: Castro Neto, V. P. & Campacci, M. A., 2004; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15113* (MBM)].

Zygopetalum hasslerianum Kraenzl. = **Zygopetalum maxillare** Lodd.
Referencias: Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Zygopetalum intermedium Lodd. = **Zygopetalum maculatum** (Kunth) Garay

Zygopetalum jugosum (Lindl.) Schltr. = **Pabstia jugosa** (Lindl.) Garay
Referencias: Castro Neto, V. P., 1993.

Zygopetalum mackayi Hook.
Referencias: Garay, L. A., 1973; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953; Schlechter, F. R. R., 1925.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3012* (MBM, SI)].

Zygopetalum mackayi Hook. var. *convexum* Mutel = **Zygopetalum crinitum** Lodd.
Referencias: Castro Neto, V. P. & Campacci, M. A., 2004.

Zygopetalum mackayi Hook. var. *crinitum* Lindl. = **Zygopetalum crinitum** Lodd.
Referencias: Castro Neto, V. P. & Campacci, M. A., 2004.

Zygopetalum maculatum (Kunth) Garay
Sin.: *Dendrobium maculatum* Kunth, *Zygopetalum intermedium* Lodd.
Referencias: Hashimoto, T., 1993.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 6859* (NY)].

Zygopetalum mandibulare Rchb. f. = **Zygopetalum maxillare** Lodd.
Referencias: Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Zygopetalum maxillare Lodd.
Sin.: *Zygopetalum hasslerianum* Kraenzl., *Zygopetalum mandibulare* Rchb. f., *Zygopetalum maxillare* Lodd. var. *sanderianum* Cogn.
Referencias: Castro Neto, V. P. & Campacci, M. A., 2004; Garay, L. A., 1973; Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Hoehne, F. C., 1953; Johnson, A. E., 2001; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 28282* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 26356* (CTES, MBM, NY)]; PRY[*Schinini, A. 31457* (CTES)].

Zygopetalum maxillare Lodd. var. *sanderianum* Cogn. = **Zygopetalum maxillare** Lodd.

Zygopetalum micranthum Barb. Rodr. = **Paradisanthus bahiensis** Rchb. f.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Zygopetalum pubescens Hoffm. = **Zygopetalum crinitum** Lodd.
Referencias: Castro Neto, V. P. & Campacci, M. A., 2004.

Zygopetalum rollisonii Rchb. f. = **Promenaea rollisonii** (Rchb. f.) Lindl.
Referencias: Pabst, G. F. J., 1959c.

Zygopetalum stapelioides Klotzsch ex Rchb. f. = **Promenaea stapelioides** (Klotzsch ex Rchb. f.) Lindl.

Zygopetalum stenichilum Lodd. = **Zygopetalum crinitum** Lodd.
Referencias: Castro Neto, V. P. & Campacci, M. A., 2004.

Zygopetalum viridis (Lindl.) Schltr. = **Pabstia viridis** (Lindl.) Garay
Referencias: Castro Neto, V. P., 1993.

Zygostates Lindl.

Número de especies: 7, 4 endémicas

Zygostates alleniana Kraenzl.
Sin.: *Dipteranthus lindmanii* Kraenzl., *Zygostates aquinoi* Schltr., *Zygostates lindmanii* (Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Fraga Nunes, V., 1997; Hauman, L. L., 1921a; Johnson, A. E., 2001; Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Williams, L. O., 1939.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vanni, R. O. 3422* (CTES)]; BRA[*Dutra, J. 854* (ICN, SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 3947* (MO)].

Zygostates aquinoi Schltr. = **Zygostates alleniana** Kraenzl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Zygostates bradei (Schltr.) Garay = **Zygostates rotundiglossa** Pabst
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Zygostates comuta Lindl.
Sin.: *Zygostates lunata* Lindl. var. *subintegripetala* Cogn.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, A. 20870* (MBM, RB)].

Zygostates dasyrhiza (Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Ornithocephalus dasyrhyzus* Kraenzl., *Zygostates paranaensis* Schltr.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1911; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 39718* (CTES)].

Zygostates duseniana (Kraenzl.) Pabst = **Dipteranthus pustulatus** (Kraenzl.) Pabst

Zygostates lindmanii (Kraenzl.) Schltr. = **Zygostates alleniana** Kraenzl.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Zygostates lunata Lindl.
Referencias: Hatschbach, G., 1963b; Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Pabst, G. F. J., 1953.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18640* (HB, MBM)].

Zygostates lunata Lindl. var. *subintegripetala* Cogn. = **Zygostates comuta** Lindl.
Referencias: Toscano de Brito, A. L. V., 1994.

Zygostates multiflora (Rolfe) Schltr.
Sin.: *Ornithocephalus multiflorus* Rolfe
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 25991* (CTES, MBM)].

Zygostates papillosa Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977; Waechter, J. L. & Moura Baptista, L. R., 2004.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 200–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Waechter, J. L. 233* (ICN)].

Zygostates paranaensis Schltr. = **Zygostates dasyrhiza** (Kraenzl.) Schltr.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Zygostates pellucida Rchb. f. = **Dipteranthus pellucidus** (Rchb. f.) Cogn.
Referencias: Pabst, G. F. J. & Dungs, F., 1977.

Zygostates pustulata (Kraenzl.) Schltr. = **Dipteranthus pustulatus** (Kraenzl.) Pabst

Zygostates rotundiglossa Pabst
Sin.: *Dipteranthus bradei* Schltr., *Zygostates bradei* (Schltr.) Garay
Referencias: Toscano de Brito, A. L. V., 1994.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 9820* (HB, MBM)].

PHILESIACEAE

Autor: Arroyo-Leuenberger, S.

2 géneros, 2 especies endémicas.

Lapageria Ruiz & Pav.

Número de especies: 1 endémica

Lapageria rosea Ruiz & Pav.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 680* (B)].

Philesia Comm. ex Juss.

Número de especies: 1 endémica

Philesia buxifolia Lam. = **Philesia magellanica** J.F. Gmel.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. C., 2001a; Moore, D. M., 1974; Ravenna, P. F., 1969f.

Philesia magellanica J.F. Gmel.
Sin.: *Philesia buxifolia* Lam.
Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. C., 2001a; Gardner, M., 1995; Moore, D. M., 1974; Ravenna, P. F., 1969f.
Subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. s.n.* (BA)]; CHL[*Werdermann, E. 286* (B)].

POACEAE

Autores: Morrone, O., Zuloaga, F. O., Longhi-Wagner, H. M. (Sur de Brasil), Izaguirre, P. (Uruguay), Beyhaut, R. (Uruguay), Cialdella, A. M., Giussani, L., Denham, S. S., Guglieri, A. (Sur de Brasil), Boldrini, I. (Sur de Brasil), Zanín, A., Salariato, D. & De Gennaro, D.

203 géneros, 1528 especies, 540 especies endémicas, 184 especies introducidas.

Achnatherum caudatum (Trin.) S.W.L. Jacobs & J. Everett = **Amelichloa caudata** (Trin.) Arriaga & Barkworth

Achnatherum papposum (Nees) Barkworth, nom. illeg. = **Jarava plumosa** (Spreng.) S.W.L. Jacobs & J. Everett
Referencias: Jacobs, S. W. L. & Everett, J., 1997.

Achnatherum speciosum (Trin. & Rupr.) Barkworth = **Jarava speciosa** (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **speciosa**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aciachne Benth.

Número de especies: 1

Aciachne acicularis Laegaard
Referencias: Laegaard, S., 1987.
Hierba. Perenne. Nativa. 3600–4200 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Renvoize, S. A. 3832* (SI)].

[Aciachne pulvinata Benth.]
Referencias: Laegaard, S., 1997; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Acicarpa sacchariflora Raddi, nom. illeg. = **Digitaria insularis** (L.) Fedde
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994b.

Acroceras Stapf

Número de especies: 2

Acroceras excavatum (Henrard) Zuloaga & Morrone
Sin.: *Lasiacis excavata* (Henrard) Parodi, *Panicum excavatum* Henrard
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994a; Zuloaga, F. O., Morrone, O. & Sáenz, A. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, GUA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Balansa, B. 2947* (BAA)]; BRA[*Krapovickas, A. 22964* (CTES, SI)]; PRY[*Woolston, A. L. 128* (BAA, NY, SI)].

Acroceras oryzoides (Sw.) Stapf = **Acroceras zizanioides** (Kunth) Dandy
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O. & Sáenz, A. A., 1988.

Acroceras paucispicata (Morong) Henrard = **Urochloa paucispicata** (Morong) Morrone & Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy
Sin.: *Acroceras oryzoides* (Sw.) Stapf, *Acroceras paucispicata* (Morong) Henrard, *Panicum oryzoides* Sw., hom. illeg., *Panicum zizanioides* Kunth
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994a; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O. & Sáenz, A. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE); URY(ART, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 1957* (SI), *Zuloaga, F. O. 3324* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13733* (SI), *Hatschbach, G. 28521* (MBM)]; PRY[*Woolston, A. L. 79* (BAA, SI)]; URY[*Del Puerto, O. 15465* (MVFA)].

Aegilops incurva L. = **Parapholis incurva** (L.) C.E. Hubb.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aegopogon Willd.

Número de especies: 1

Aegopogon argentinus Mez = **Aegopogon bryophilus** Döll
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Aegopogon bryophilus Döll
Sin.: *Aegopogon argentinus* Mez
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Türpe, A. M., 1973.
Hierba. Anual. Nativa. 400–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 182* (B, US), *Rodríguez 495* (SI)].

[Aegopogon cenchroides Humb. & Bonpl. ex Willd.]
Sin.: *Aegopogon cenchroides* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *geminiflorus* (Kunth) Griseb., *Aegopogon geminiflorus* Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Aegopogon cenchroides Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *geminiflorus* (Kunth) Griseb. = **Aegopogon cenchroides** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Aegopogon geminiflorus Kunth = **Aegopogon cenchroides** Humb. & Bonpl. ex Willd.

Agenium Nees

Número de especies: 3

Agenium leptocladum (Hack.) Clayton
Sin.: *Andropogon leptocladus* Hack., *Andropogon leptocladus* Hack. f. *simplex* Hack., *Heteropogon leptocladus* (Hack.) Parodi, hom. illeg., *Heteropogon leptocladus* (Hack.) Roberty, *Heteropogon leptocladus* (Hack.) Roberty var. *pilosus* Parodi, *Sorghum leptocladum* (Hack.) Kuntze
Referencias: Parodi, L. R., 1961; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.

Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15356* (SI), *Martínez Crovetto, R. 9534* (BAA)]; BRA[*Hatschbach, G. 18717* (MBM)]; PRY[*Balansa, B. 222* (BM)].

Agenium majus Pilg.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6418* (US)].

Agenium nutans Nees = **Agenium villosum** (Nees) Pilg.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Agenium villosum (Nees) Pilg.
Sin.: *Agenium nutans* Nees, *Andropogon neesii* Kunth, hom. illeg., *Andropogon villosus* (Nees) Ekman, nom. illeg., *Heteropogon villosus* Nees
Referencias: Burkart, A. & Toursarkissian, M., 1969; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA); URY(CLA, COL, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 151* (SI), *Grüner, G. 1151* (BAA)]; BRA[*Hatschbach, G. 21015* (MBM)]; PRY[*Zuloaga, F. O. 7311* (SI)]; URY[*Marchi, M. 1484* (MVFA)].

Agropyron Gaertn.

Número de especies: 1 introducida

Agropyron agroelymoides (Hicken) J.H. Hunz. = **Elymus scabriglumis** (Hack.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron antarcticum Parodi = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron araucanum (Parodi) Nicora = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron attenuatum (Kunth) Roem. & Schult. = **Elymus cordilleranus** Davidse & Pohl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron attenuatum (Kunth) Roem. & Schult. var. *araucanum* Parodi = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron attenuatum (Kunth) Roem. & Schult. var. *platense* Parodi = **Elymus scabrifolius** (Döll) J.H. Hunz.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron attenuatum (Kunth) Roem. & Schult. var. *ruizianum* Parodi = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron breviaristatum Hitchc. = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron condensatum J. Presl = **Elymus scabrifolius** (Döll) J.H. Hunz.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron cristatum (L.) Gaertn.
Sin.: *Bromus cristatus* L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: CHL(XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 604* (CONC)].

Agropyron elongatum (Host) P. Beauv. = **Thinopyrum elongatum** (Host) D.R. Dewey
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron fuegianum (Speg.) Kurtz = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron fuegianum (Speg.) Macloskie, nom. illeg. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve

Agropyron fuegianum (Speg.) Kurtz f. *submutica* Kurtz = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron fuegianum (Speg.) Kurtz var. *brachyatherum* Parodi = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron fuegianum (Speg.) Kurtz var. *chaetophorum* Parodi = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron fuegianum (Speg.) Kurtz var. *patagonicum* (Speg.) Hauman & Vanderveken = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron fuegianum (Speg.) Kurtz var. *patagonicum* (Speg.) Macloskie, nom. illeg. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron fuegianum (Speg.) Kurtz var. *polystachyum* Parodi = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron magellanicum (E. Desv.) Hack. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron magellanicum (E. Desv.) Hack. var. *condensatum* (J. Presl) Hauman & Vanderveken = **Elymus scabrifolius** (Döll) J.H. Hunz.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron magellanicum (E. Desv.) Hack. var. *condensatum* (J. Presl) Macloskie, nom. illeg. = **Elymus scabrifolius** (Döll) J.H. Hunz.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron magellanicum (E. Desv.) Hack. var. *festucoides* (Speg.) Hauman & Vanderveken = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron magellanicum (E. Desv.) Hack. var. *festucoides* (Speg.) Macloskie, nom. illeg. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron magellanicum (E. Desv.) Hack. var. *glabrivalva* (Speg.) Hauman & Vanderveken, comb. superfl. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron magellanicum (E. Desv.) Hack. var. *glabrivalva* (Speg.) Macloskie & Dusén = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron magellanicum (E. Desv.) Hack. var. *lasiopodum* (Speg.) Hauman & Vanderveken = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron magellanicum (E. Desv.) Hack. var. *lasiopodum* (Speg.) Macloskie, nom. illeg. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron magellanicum (E. Desv.) Hack. var. *pubiflorum* (Steud.) Speg. ex Hauman & Vanderveken = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron magellanicum (E. Desv.) Hack. var. *secundum* (J. Presl) Macloskie, nom. illeg. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron mendocinum Parodi = **Elymus mendocinus** (Parodi) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron patagonicum (Speg.) Parodi = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron patagonicum (Speg.) Parodi var. *australe* Parodi = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron patagonicum (Speg.) Parodi var. *festucoides* (Speg.) Parodi = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron patagonicum (Speg.) Parodi var. *macrochaetum* (Parodi) Nicora = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron pubiflorum (Steud.) P. Candargy = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron pubiflorum (Steud.) Parodi, comb. superfl. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron pubiflorum (Steud.) P. Candargy var. *aristatum* P. Candargy = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron pubiflorum (Steud.) P. Candargy var. *fragile* Parodi = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron pubiflorum (Steud.) P. Candargy var. *megastachyum* P. Candargy = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron pubiflorum (Steud.) P. Candargy var. *microstachyum* P. Candargy = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron pubiflorum (Steud.) P. Candargy var. *tridentatum* P. Candargy = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron pubiflorum (Steud.) P. Candargy var. *trifidum* P. Candargy = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron remotiflorum Parodi = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron remotiflorum Parodi var. *macrochaetum* Parodi = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron repens (L.) P. Beauv. = **Elymus repens** (L.) Gould
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron repens (L.) P. Beauv. var. *maritimum* (Koch & Ziz) Hack. = **Elymus repens** (L.) Gould

Agropyron repens (L.) P. Beauv. var. *scabrifolium* (Döll) Arechav. = **Elymus scabrifolius** (Döll) J.H. Hunz.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron repens (L.) P. Beauv. var. *scabriglume* Hack. = **Elymus scabriglumis** (Hack.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron repens (L.) P. Beauv. var. *vulgare* Döll = **Elymus repens** (L.) Gould
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron scabrifolium (Döll) Parodi = **Elymus scabrifolius** (Döll) J.H. Hunz.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron scabriglume (Hack.) Parodi = **Elymus scabriglumis** (Hack.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron secundum J. Presl = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron subulatum (Scherb. ex Schweigg. & Körte) Herter, nom. illeg. = **Elymus repens** (L.) Gould
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron tenerum Vasey = **Elymus trachycaulus** (Link) Gould ex Shinners
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agropyron tilcarense J.H. Hunz. = **Elymus tilcarensis** (J.H. Hunz.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrosticula brasiliensis (Raddi) Herter = **Eragrostis airoides** Nees
Referencias: Boechat, S. C., 1980; Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Agrostis L., nom. cons.

Número de especies: 34, 16 endémicas, 7 introducidas

Agrostis aberrans Steud. = **Agrostis perennans** (Walter) Tuck.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis airaeformis Steud. = **Agrostis inconspicua** Kunze ex E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis airoides Franch. var. *flaccidifolia* Speg. = **Agrostis inconspicua** Kunze ex E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis alba auct. non L. = **Agrostis gigantea** Roth

Agrostis alba L. = **Poa nemoralis** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis alopecuroides Lam. = **Polypogon monspeliensis** (L.) Desf.
Referencias: Kämpf, A. N., 1975; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis ambatoensis Asteg.
Referencias: Astegiano, M. E., 1982; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 4300–4500 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 20880* (CORD)].

Agrostis andina Phil. = **Agrostis glabra** (J. Presl) Kunth var. **glabra**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis anomala (Trin.) Herter = **Bromidium anomalum** (Trin.) Döll
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis antarctica Hook. f. = **Agrostis magellanica** Lam.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis antoniana Griseb. = **Deyeuxia rigida** Kunth
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Agrostis araucana Phil. = **Agrostis magellanica** Lam.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Agrostis aristata Phil.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Agrostis aristulata Müll. Arg. = **Agrostis stolonifera** L. var. **stolonifera**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis arvensis Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. s.n.* (BAA, SGO, US)].

Agrostis asperigluma Steud. = **Polypogon exasperatus** (Trin.) Renvoize
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis asperula Phil. = **Relchela panicoides** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis avenacea J.F. Gmel. = **Lachnagrostis filiformis** (G. Forst.) Trin.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 2002.

Agrostis boliviana Mez = **Agrostis mertensii** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis brachyathera Steud.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & De Paula de Brooks, M. E., 1978; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(TDF); CHL(VII, VIII, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 12964* (BAA)]; CHL[*Lechler, W. 1236* (BAA, K, LE, P, US)].

Agrostis brasiliensis Spreng. = **Reimarochloa acuta** (Flüggé) Hitchc.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Agrostis breviculmis Hitchc.
Sin.: *Agrostis nana* (J. Presl) Kunth, comb. superfl., *Trichodium nanum* J. Presl
Referencias: Hitchcock, A. S., 1905; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997; Türpe, A. M., 1975a, b.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, SAL); CHL(IV, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Saravia Toledo, C. 14092* (SI)]; CHL[*Jiles, C. 3647* (CONC)].

Agrostis bromidioides Griseb. = **Deyeuxia rigescens** (J. Presl) Türpe
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Agrostis buchtienii Hack. = **Agrostis vidalii** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis campestris Phil. = **Agrostis gigantea** Roth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis canescens Griseb., hom. illeg. = **Deyeuxia deserticola** Phil. var. **deserticola**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Agrostis canina auct. non L. = **Agrostis meyenii** Trin.

Agrostis canina L. f. *inclusa* Hack. = **Agrostis meyenii** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis canina L. f. *mutica* Hack., hom. illeg. = **Agrostis meyenii** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis canina L. var. *falklandica* (Hook. f.) Hack. ex Skottsb., hom. illeg. = **Agrostis meyenii** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis canina L. var. *falklandica* (Hook. f.) Hack., comb. superfl. = **Agrostis meyenii** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis canina L. var. *hyemalis* (Walter) Kuntze = **Agrostis hyemalis** (Walter) Britton, Stern & Poggenb.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis canina L. var. *tenuifolia* (M. Bieb.) Boiss. = **Agrostis vinealis** Schreb.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis canina L. var. *umbellata* (Colla) Kuntze = **Agrostis umbellata** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis canina L. subsp. *grandiflora* Hack. = **Agrostis perennans** (Walter) Tuck.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis capillaris L.
Sin.: *Agrostis tenuis* H. Sibth., *Agrostis vulgaris* With.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Moore, D. M., 1983; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997; Widen, K. G., 1971.
Hierba. Perenne. Introducida. 900–1100 m.
Países: ARG(BAI, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); BRA(RGS); CHL(IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Luti, H. 1651* (BAA), *Rúgolo de Agrasar, Z. E. 1201* (SI)]; BRA[*Norrmann, G. A. 282* (BLA)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20047* (CONC, SGO), *Bleiholder, H. 18* (CONC), *Pedersen, T. M. 14220* (CTES, SI)].

Agrostis castellana Boiss. & Reut.
Sin.: *Agrostis tenuis* H. Sibth. var. *aristata* auct. non (Parn.) Druce
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1990, 1992, 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Solomon, J. C. 4759* (SI), *Villamil, C. B. 2814* (BAB)]; CHL[*Matthei, O. R. 27247* (CONC), *Ricardi, M. 9269* (CONC)].

Agrostis chilensis Trin. = **Agrostis umbellata** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Agrostis chonotica Phil.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso. Posible sinónimo de *Agrostis magellanica*.

Agrostis clausa Phil., hom. illeg. = **Agrostis philippiana** Parodi ex Rúgolo & De Paula
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis cognata Steud. = **Agrostis magellanica** Lam.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & De Paula de Brooks, M. E., 1978.

Agrostis compressa (Sw.) Poir., hom. illeg. = **Axonopus compressus** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Agrostis conferta Nees & Meyen = **Agrostis meyenii** Trin.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & De Paula de Brooks, M. E., 1978.

Agrostis conferta Nees & Meyen var. *austropatagonica* Pilg. = **Agrostis meyenii** Trin.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & De Paula de Brooks, M. E., 1978.

Agrostis corralensis Phil. = **Relchela panicoides** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis cryptandra Torr. = **Sporobolus cryptandrus** (Torr.) A. Gray

Agrostis delfini Phil. = **Agrostis serranoi** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis desvauxii Phil. = **Deschampsia airiformis** (Steud.) Benth. & Hook. f.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis distichophylla Phil., hom. illeg. = **Muhlenbergia asperifolia** (Nees & Meyen ex Trin.) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Agrostis eminens (J. Presl) Griseb. = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **eminens**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Agrostis eremophila Speg. = **Muhlenbergia asperifolia** (Nees & Meyen ex Trin.) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

[Agrostis exarata Trin.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Agrostis exarata Trin. var. *angustifolia* Hack. ex Dusén = **Agrostis perennans** (Walter) Tuck.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis exarata Trin. var. *mutica* Hicken = **Agrostis gigantea** Roth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis exasperata Trin. = **Polypogon exasperatus** (Trin.) Renvoize
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis exasperata Trin. var. *purpurascens* Kuntze, nom. nud. = **Polypogon exasperatus** (Trin.) Renvoize
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis exasperata Trin. var. *viridis* Kuntze, nom. nud. = **Polypogon exasperatus** (Trin.) Renvoize
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis falklandica Hook. f. = **Agrostis meyenii** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis filiformis (G. Forst.) Spreng., nom. illeg. = **Lachnagrostis filiformis** (G. Forst.) Trin.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 2002.

Agrostis flabellata Salzm. ex Steud., nom. nud. = **Setaria sulcata** Raddi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Agrostis flavidula Steud. = **Agrostis perennans** (Walter) Tuck.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992.

[Agrostis fonckii Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

Agrostis fuegiana Hack. = **Agrostis serranoi** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis fulva Griseb. = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **fulva** (Griseb.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a.

Agrostis gayana Desv. = **Agrostis glabra** (J. Presl) Kunth var. **glabra**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis gelida Trin. = **Agrostis mertensii** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis gigantea Roth
Sin.: *Agrostis alba* auct. non L., *Agrostis campestris* Phil., *Agrostis exarata* Trin. var. *mutica* Hicken
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & De Paula de Brooks, M. E., 1978; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Widen, K. G., 1971.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–2800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COS, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, TUC); BRA(RGS); CHL(IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, RME); URY(FLA, MON, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fischer, W. 199* (SI)]; BRA[*Araújo, A. C. 210* (BLA)]; CHL[*Garaventa, A. 5448* (CONC)]; URY[*Norrmann, G. A. s.n.* (BLA)].

Agrostis glabra (J. Presl) Kunth var. **glabra**
Sin.: *Agrostis andina* Phil., *Agrostis gayana* Desv., *Agrostis pyrogea* Speg., *Agrostis pyrogea* Speg. var. *mutica* Hack., *Trichodium glabrum* J. Presl
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & De Paula de Brooks, M. E., 1978; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF); CHL(IV, VI, VII, VIII, IX, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 15043* (SI)]; CHL[*Jiles, C. 4416* (CONC)].

Agrostis glabra (J. Presl) Kunth var. **melanthes** (Phil.) Rúgolo & De Paula
Sin.: *Agrostis melanthes* Phil., *Calamagrostis laxiflora* Phil., *Deyeuxia vidalii* Phil.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & De Paula de Brooks, M. E., 1978; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 5492* (SI)]; CHL[*Delfin, F. s.n.* (BAA, SGO)].

[Agrostis gracilis Pilg., nom. illeg.]
Notas: Nombre dudoso.

Agrostis hackelii R.E. Fr. = **Polypogon exasperatus** (Trin.) Renvoize
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis hackelii R.E. Fr. f. *viridiflora* Hack. = **Polypogon exasperatus** (Trin.) Renvoize
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Agrostis hyemalis (Walter) Britton, Stern & Poggenb.]
Sin.: *Agrostis canina* L. var. *hyemalis* (Walter) Kuntze, *Cornucopiae hyemalis* Walter
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Agrostis hygrometrica Nees = **Bromidium hygrometricum** (Nees) Nees & Meyen
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Agrostis hygrometrica Nees var. *tandilensis* (Kuntze) L.B. Sm. & Wassh. = **Bromidium tandilense** (Kuntze) Rúgolo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis idahoensis Nash
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(CHU); CHL(VII, VIII, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 10141* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 18771* (CONC)].

Agrostis imberbis Phil.
Sin.: *Agrostis moyanoi* Speg. var. *plicatifolia* Speg., *Agrostis pulchella* Kunth f. *purpurascens* (Kurtz) Stuck., nom. illeg., *Agrostis pulchella* Kunth f. *virescens* (Kurtz) Stuck., nom. illeg., *Agrostis scabra* F.W. Gray f. *purpurascens* Kurtz, nom. nud., *Agrostis scabra* F.W. Gray f. *virescens* Kurtz, nom. nud., *Agrostis scotanta* Phil., *Agrostis stenophylla* Phil.
Referencias: Cantero, J. J., Núñez, C. O., Geymonat, M. & Chiacchiera, G., 1996; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & De Paula de Brooks, M. E., 1978; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–2500 m.
Países: ARG(CHU, COR, COS, MEN, NEU, RNE, SCR, SLU); CHL(IV, VI, VII, VIII, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10360* (SI), *Boelcke, O. 10785* (BAA)]; CHL[*Ricardi, M. 1008* (CONC)].

Agrostis inconspicua Kunze ex E. Desv.
Sin.: *Agrostis airaeformis* Steud., *Agrostis airoides* Franch. var. *flaccidifolia* Speg., *Agrostis umbellata* Colla var. *mutica* Hack. ex Macloskie & Dusén
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & De Paula de Brooks, M. E., 1978; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, NEU, RNE, SCR, TDF, TUC); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 8447* (BAA), *Rúgolo de Agrasar, Z. E. 1181* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92551* (CONC), *Ricardi, M. 5392* (CONC)].

Agrostis indica L. = **Sporobolus indicus** (L.) R. Br.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.

Agrostis insularis Rúgolo & A.M. Molina
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Villagrán, C. 5890* (CONC, SI), *Villagrán, C. 6063* (CONC)].

Agrostis interrupta L. = **Apera interrupta** (L.) P. Beauv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis juergensii Hack. = **Bromidium hygrometricum** (Nees) Nees & Meyen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis kennedyana Beetle = **Bromidium tandilense** (Kuntze) Rúgolo
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis koelerioides Desv. = **Bromidium anomalum** (Trin.) Döll

Agrostis koelerioides Desv. var. *pampeana* Parodi = **Bromidium tandilense** (Kuntze) Rúgolo
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis kufuim Speg. = **Agrostis perennans** (Walter) Tuck.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis kuntzei Mez
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & De Paula de Brooks, M. E., 1978; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, MEN, NEU, SCR, SJU); CHL(IV, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dawson, G. 2176* (BAA)]; CHL[*Jiles, C. 4209* (CONC)].

Agrostis lasiantha Phil. = **Lachnagrostis filiformis** (G. Forst.) Trin.

Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 2002.

Agrostis laxiflora (Michx.) Richardson var. *aristata* Griseb. = **Agrostis montevidensis** Spreng. ex Nees f. **montevidensis**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis lechleri Steud. = **Agrostis leptotricha** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis lenis Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(TUC); BRA(RGS, SCA); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1230* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 3076* (BLA, ICN)]; URY[*Rosengurtt, B. 8091* (MVFA)].

Agrostis leonii Parodi = **Lachnagrostis filiformis** (G. Forst.) Trin.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 2002.

Agrostis leptotricha E. Desv.
Sin.: *Agrostis lechleri* Steud., *Agrostis moyanoi* Speg., *Agrostis moyanoi* Speg. var. *major* Speg., *Agrostis moyanoi* Speg. var. *puberigluma* Speg.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & De Paula de Brooks, M. E., 1978; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dawson, G. 2363* (BAA), *Rúgolo de Agrasar, Z. E. 1242* (SI)]; CHL[*Pfister, A. 13541* (CONC)].

Agrostis limonias Phil. = **Relchela panicoides** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis littoralis Lam. = **Sporobolus virginicus** (L.) Kunth
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Agrostis longiberbis Hack. ex Usteri, nom. nud. = **Agrostis longiberbis** Hack. ex L.B. Sm.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis longiberbis Hack. ex L.B. Sm.
Sin.: *Agrostis longiberbis* Hack. ex Usteri, nom. nud., *Calamagrostis capillaris* Nees ex Steud.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 900–1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Camargo, L. 3113* (PACA)].

Agrostis macrathera Phil. = **Agrostis magellanica** Lam.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis magellanica Lam.
Sin.: *Agrostis antarctica* Hook. f., *Agrostis araucana* Phil., *Agrostis cognata* Steud., *Agrostis macrathera* Phil., *Agrostis magellanica* Lam. var. *antarctica* (Hook. f.) Franch., *Agrostis magellanica* Lam. var. *antarctica* (Hook. f.) Pilg., nom. illeg., *Agrostis magellanica* Lam. var. *cognata* (Steud.) Macloskie, *Agrostis rinihuensis* Phil., *Vilfa magellanica* (Lam.) P. Beauv.
Referencias: Moore, D. M., 1983; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & De Paula de Brooks, M. E., 1978; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF); CHL(IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12582* (BAB), *Rúgolo de Agrasar, Z. E. 1249* (SI)]; CHL[*Philippi, R. A. 181* (SGO, US)].

Agrostis magellanica Lam. var. *antarctica* (Hook. f.) Franch. = **Agrostis magellanica** Lam.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis magellanica Lam. var. *antarctica* (Hook. f.) Pilg., nom. illeg. = **Agrostis magellanica** Lam.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis magellanica Lam. var. *cognata* (Steud.) Macloskie = **Agrostis magellanica** Lam.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis masafuerana Pilg.
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 1300 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, C. J. F. 424* (B, BAA, K, SGO, US)].

Agrostis melanthes Phil. = **Agrostis glabra** (J. Presl) Kunth var. **melanthes** (Phil.) Rúgolo & De Paula

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis mertensii Trin.
Sin.: *Agrostis boliviana* Mez, *Agrostis gelida* Trin., *Agrostis poeppigiana* Phil., *Agrostis williamsii* Phil.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SAL, SCR); CHL(VI, VII, VIII, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ambrosetti, A. 754* (BAB)]; CHL[*Pisano, E. 5103* (SI)].

Agrostis meyenii Trin.
Sin.: *Agrostis canina* auct. non L., *Agrostis canina* L. f. *inclusa* Hack., *Agrostis canina* L. f. *mutica* Hack., hom. illeg., *Agrostis canina* L. var. *falklandica* (Hook. f.) Hack. ex Skottsb., hom. illeg., *Agrostis canina* L. var. *falklandica* (Hook. f.) Hack., comb. superfl., *Agrostis conferta* Nees & Meyen, *Agrostis conferta* Nees & Meyen var. *austropatagonica* Pilg., *Agrostis falklandica* Hook. f.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Moore, D. M., 1983; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & De Paula de Brooks, M. E., 1978; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–4000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, SCR, TDF, TUC); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11352* (SI), *Ruíz Leal, R. A. 3157* (BAA)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92124* (CONC), *Jiles, C. 3647* (CONC)].

Agrostis miliacea L. = **Piptatherum miliaceum** (L.) Coss.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis monostachya Poir. = **Hymenachne amplexicaulis** (Rudge) Nees
Referencias: Cabrera, A. L., 1970a.

Agrostis montevidensis Spreng. ex Nees f. **montevidensis**
Sin.: *Agrostis laxiflora* (Michx.) Richardson var. *aristata* Griseb., *Agrostis montevidensis* Spreng. ex Nees var. *aristata* Döll, nom. superfl.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(ART, CAS, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 18486* (SI), *Montes, J. E. 12355* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 21221* (MBM)]; URY[*Cabrera, A. L. 32398* (SI), *Rosengurtt, B. 6587* (MVFA)].

Agrostis montevidensis Spreng. ex Nees f. **submutica** (Döll) Kämpf
Sin.: *Agrostis montevidensis* Spreng. ex Nees var. *submutica* Döll
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 104* (SI), *Zuloaga, F. O. 4888* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 16406* (SI), *Norrmann, G. A. s.n.* (BLA)]; CHL[*sin colector s.n.* (BAB, PACA)].

Agrostis montevidensis Spreng. ex Nees var. *aristata* Döll, nom. superfl. = **Agrostis montevidensis** Spreng. ex Nees f. **montevidensis**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Agrostis montevidensis Spreng. ex Nees var. *submutica* Döll = **Agrostis montevidensis** Spreng. ex Nees f. **submutica** (Döll) Kämpf

Agrostis moyanoi Speg. = **Agrostis leptotricha** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis moyanoi Speg. var. *major* Speg. = **Agrostis leptotricha** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis moyanoi Speg. var. *plicatifolia* Speg. = **Agrostis imberbis** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis moyanoi Speg. var. *puberigluma* Speg. = **Agrostis leptotricha** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis nana (J. Presl) Kunth, comb. superfl. = **Agrostis breviculmis** Hitchc.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis nana (J. Presl) Kunth var. *aristata* Griseb. = **Agrostis tolucensis** Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis nardifolia Griseb. = **Deyeuxia velutina** Nees & Meyen var. **nardifolia** (Griseb.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Agrostis nebulosa Boiss. & Reut.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–100 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 7687* (BAA)].

Agrostis nemoralis Phil. = **Agrostis stolonifera** L. var. **stolonifera**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis oligoclada Phil. = **Agrostis serranoi** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis palustris Huds. = **Agrostis stolonifera** L. var. **palustris** (Huds.) Farw.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis paradisiaca Steud. = **Agrostis umbellata** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis patagonica Phil. = **Polypogon exasperatus** (Trin.) Renvoize
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis patens Trin. = **Agrostis umbellata** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis paucinodis Hack. = **Agrostis uliginosa** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis pectinata Hack. & Arechav. = **Polypogon chilensis** (Kunth) Pilg.

Agrostis perennans (Walter) Tuck.
Sin.: *Agrostis aberrans* Steud., *Agrostis canina* L. subsp. *grandiflora* Hack., *Agrostis exarata* Trin. var. *angustifolia* Hack. ex Dusén, *Agrostis flavidula* Steud., *Agrostis kufuim* Speg., *Agrostis pulchella* Kunth, *Agrostis tenuifolia* Curtis var. *fretensis* Hook. f., *Agrostis violaceae* Phil., *Cornucopiae perennans* Walter, *Vilfa elegans* Kunth
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COS, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, TDF, TUC); CHL(VIII, IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 16931* (LP), *Collantes, M. 3102* (SI)]; CHL[*Artigas, J. 19557* (CONC)].

Agrostis pernambucensis Spreng. = **Hymenachne pernambucense** (Spreng.) Zuloaga
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991; Zuloaga, F. O., 1989, 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Agrostis peruviana (P. Beauv.) Spreng. = **Muhlenbergia peruviana** (P. Beauv.) Steud.

Agrostis philippiana Parodi ex Rúgolo & De Paula
Sin.: *Agrostis clausa* Phil., hom. illeg.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & De Paula de Brooks, M. E., 1978; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997.
Hierba. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(VIII, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 1239* (SI)]; CHL[*Boelcke, O. 6389* (BAB)].

Agrostis platensis Parodi
Referencias: Parodi, L. R., 1951; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, DFE); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 7562* (SI), *Parodi, L. R. 4793* (BAA, SI, US)]; BRA[*Arzivenco, L. s.n.* (BLA)].

Agrostis poeppigiana Phil. = **Agrostis mertensii** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis preslii Kunth = **Calamagrostis preslii** (Kunth) Hitchc.

Agrostis prostrata Hook. f. = **Agrostis stolonifera** L. var. **stolonifera**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis pulchella Kunth = **Agrostis perennans** (Walter) Tuck.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis pulchella Kunth f. *purpurascens* (Kurtz) Stuck., nom. illeg. = **Agrostis imberbis** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis pulchella Kunth f. *virescens* (Kurtz) Stuck., nom. illeg. = **Agrostis imberbis** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis pyramidata Lam. = **Sporobolus pyramidatus** (Lam.) Hitchc.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Agrostis pyrogea Speg. = **Agrostis glabra** (J. Presl) Kunth var. **glabra**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis pyrogea Speg. var. *mutica* Hack. = **Agrostis glabra** (J. Presl) Kunth var. **glabra**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis radiata L. = **Chloris radiata** (L.) Sw.

Agrostis ramboi Parodi = **Bromidium ramboi** (Parodi) Rúgolo var. **ramboi**
Referencias: Kämpf, A. N., 1975.

Agrostis ramboi Parodi var. *pubescens* Kämpf = **Bromidium ramboi** (Parodi) Rúgolo var. **pubescens** (Kämpf) Rúgolo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis ramulosa (Kunth) Roem. & Schult. = **Muhlenbergia ramulosa** (Kunth) Swallen
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Agrostis reuteri Boiss.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)].

Agrostis rigescens J. Presl = **Deyeuxia rigescens** (J. Presl) Türpe
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Agrostis rinihuensis Phil. = **Agrostis magellanica** Lam.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis rosea Griseb. = **Deyeuxia colorata** Beetle
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Agrostis santacruzensis Speg. = **Polypogon exasperatus** (Trin.) Renvoize
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis scabra Willd.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 5759* (BAB, SI), *Villamil, C. B. 2896* (SI)]; CHL[*Burkart, A. 9596* (SI)].

Agrostis scabra F.W. Gray f. *purpurascens* Kurtz, nom. nud. = **Agrostis imberbis** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis scabra F.W. Gray f. *virescens* Kurtz, nom. nud. = **Agrostis imberbis** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis scotanta Phil. = **Agrostis imberbis** Phil.

Agrostis semiverticillata (Forssk.) C. Chr. = **Polypogon viridis** (Gouan) Breistr.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis serranoi Phil.
Sin.: *Agrostis delfini* Phil., *Agrostis fuegiana* Hack., *Agrostis oligoclada* Phil., *Agrostis vaginata* Phil., hom. illeg.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(V, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 5554* (CTES), *Nicora, E. G. 9261* (SI)]; CHL[*Pfister, A. 19064* (CONC)].

Agrostis sesquiflora E. Desv. = **Podagrostis sesquiflora** (E. Desv.) Nicora
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis speeiana Mez = **Polypogon exasperatus** (Trin.) Renvoize

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis stenophylla Phil. = **Agrostis imberbis** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis stolonifera L. var. **palustris** (Huds.) Farw.
Sin.: *Agrostis palustris* Huds.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & De Paula de Brooks, M. E., 1978; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–400 m.
Países: ARG(BAI, NEU, RNE, SCR); CHL(II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII); URY(CAS, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 15542* (BAA), *Ulibarri, E. A. 1074* (SI)]; CHL[*Martin, H. C. 530* (SI)]; URY[*Felippone, F. 618* (SI)].

Agrostis stolonifera L. var. **stolonifera**
Sin.: *Agrostis aristulata* Müll. Arg., *Agrostis nemoralis* Phil., *Agrostis prostrata* Hook. f., *Sporobolus gaudichaudii* (Steud.) Albov
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & De Paula de Brooks, M. E., 1978; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, TDF); CHL(I, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IDE, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 10064* (SI), *Rúgolo de Agrasar, Z. E. 1118* (BAB, SI)]; CHL[*Marticorena, A. 1729* (CONC)].

Agrostis stricta Trin., hom. illeg. = **Agrostis umbellata** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis tandilensis (Kuntze) Parodi = **Bromidium tandilense** (Kuntze) Rúgolo
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Agrostis tehuelcha Speg. = **Polypogon imberbis** (Phil.) Johow
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis tenuifolia M. Bieb., hom. illeg. = **Agrostis vinealis** Schreb.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis tenuifolia Curtis var. *fretensis* Hook. f. = **Agrostis perennans** (Walter) Tuck.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis tenuis H. Sibth. = **Agrostis capillaris** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis tenuis H. Sibth. var. *aristata* auct. non (Parn.) Druce = **Agrostis castellana** Boiss. & Reut.

Agrostis tolucensis Kunth
Sin.: *Agrostis nana* (J. Presl) Kunth var. *aristata* Griseb., *Agrostis tolucensis* Kunth f. *viridiflora epaleata* Hack., nom. nud.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 9582* (SI)]; CHL[*Ruthsatz, B. s.n.* (SI)].

Agrostis tolucensis Kunth f. *viridiflora epaleata* Hack., nom. nud. = **Agrostis tolucensis** Kunth

Agrostis torreyi Kunth = **Muhlenbergia torreyi** (Kunth) Hitchc. ex Bush

Agrostis trichotoma (Nees) Nees ex Trin. = **Nassella trichotoma** (Nees) Hack. ex Arechav.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis trisetoides Steud. = **Bromidium trisetoides** (Steud.) Rúgolo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis uliginosa Phil.
Sin.: *Agrostis paucinodis* Hack.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & De Paula de Brooks, M. E., 1978; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 15558* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 4974* (SI)].

Agrostis umbellata Colla
Sin.: *Agrostis canina* L. var. *umbellata* (Colla) Kuntze, *Agrostis chilensis* Trin., *Agrostis paradisiaca* Steud., *Agrostis patens* Trin., *Agrostis stricta* Trin., hom. illeg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, RME).

Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 1826* (CONC)].

Agrostis umbellata Colla var. *mutica* Hack. ex Macloskie & Dusén = **Agrostis inconspicua** Kunze ex E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis vaginata Phil., hom. illeg. = **Agrostis serranoi** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Agrostis valdiviana Hack.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Agrostis ventricosa Gouan = **Gastridium ventricosum** (Gouan) Schinz & Thell.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis verticillata Vill. = **Polypogon viridis** (Gouan) Breistr.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis vidalii Phil.
Sin.: *Agrostis buchtienii* Hack.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & De Paula de Brooks, M. E., 1978; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 223* (SI)]; CHL[*Marticorena, C. 137* (CONC)].

Agrostis vinealis Schreb.
Sin.: *Agrostis canina* L. var. *tenuifolia* (M. Bieb.) Boiss., *Agrostis tenuifolia* M. Bieb., hom. illeg.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1997.
Hierba. Perenne. Introducida.
Países: ARG(CHU); CHL(IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pereyra s.n.* (BAB)]; CHL[*Jiles, C. 6179* (SI)].

Agrostis violaceae Phil. = **Agrostis perennans** (Walter) Tuck.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis virginica L. = **Sporobolus virginicus** (L.) Kunth
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1991; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Agrostis viridis Gouan = **Polypogon viridis** (Gouan) Breistr.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis vulgaris With. = **Agrostis capillaris** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Agrostis williamsii Phil. = **Agrostis mertensii** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aira L., nom. cons.

Número de especies: 4 introducidas

Aira aciphylla Franch. = **Deschampsia elongata** (Hook.) Munro ex Benth.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aira aciphylla Franch. var. *pumila* Franch. = **Deschampsia elongata** (Hook.) Munro ex Benth.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Aira acutigluma Steud.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Aira anomala Trin. = **Bromidium anomalum** (Trin.) Döll
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aira antarctica Hook. f., hom. illeg. = **Deschampsia antarctica** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aira aquatica L. = **Catabrosa aquatica** (L.) P. Beauv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aira atropurpurea Wahlenb. = **Vahlodea atropurpurea** (Wahlenb.) Fr. ex Hartmann

Aira atropurpurea Wahlenb. var. *magellanica* (Hook. f.) Skottsb. = **Vahlodea atropurpurea** (Wahlenb.) Fr. ex Hartmann

Aira brasiliensis Raddi = **Eragrostis airoides** Nees
Referencias: Boechat, S. C., 1980; Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Aira caespitosa L. = **Deschampsia caespitosa** (L.) P. Beauv. var. **caespitosa**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aira capillaris Host, hom. illeg. = **Aira elegantissima** Schur
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Aira caryophyllea L.
Sin.: *Aspris caryophyllea* (L.) Nash
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cantero, J. J., Núñez, C. O., Geymonat, M. & Chiacchiera, G., 1996; Moore, D. M., 1983; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, NEU, RNE, SCR, TDF, TUC); CHL(II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJR, RME); URY(FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 746* (SI), *Villamil, C. B. 1951* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 994861* (CONC), *Burkart, A. 9475* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 117* (SI), *Mujica Sallés, J. 217* (MVFA)].

Aira cupaniana Guss.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: URY(LAV, MAL, MON).
Ejemplares de referencia: URY[*Mujica Sallés, J. 314* (MVFA)].

Aira divaricata Pourr. = **Corynephorus divaricatus** (Pourr.) Breistr.

Aira elatior Steud. = **Deschampsia kingii** (Hook. f.) E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aira elegantissima Schur
Sin.: *Aira capillaris* Host, hom. illeg.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Tutin, T. G., 1980.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, TUC); BRA(RGS); CHL(V, IX); URY(CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, PAY, RIV, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11842* (SI), *Villamil, C. B. 2098* (SI)]; BRA[*Boldrini, I. J. s.n.* (ICN)]; CHL[*Garaventa, A. 3295* (CONC)]; URY[*Mujica Sallés, J. 727* (MVFA)].

Aira elongata Hook. = **Deschampsia elongata** (Hook.) Munro ex Benth.

Aira flexuosa L. = **Deschampsia flexuosa** (L.) Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aira flexuosa L. var. *montana* Brongn. = **Deschampsia flexuosa** (L.) Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aira gayana Steud. = **Deyeuxia erythrostachya** E. Desv. var. **erythrostachya**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Aira grandiflora Nees ex Steud., hom. illeg. = **Deschampsia kingii** (Hook. f.) E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aira kingii Hook. f. = **Deschampsia kingii** (Hook. f.) E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aira laxa Rich. = **Orthoclada laxa** (Rich.) P. Beauv.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Aira magellanica Hook. f., nom. nud. = **Vahlodea atropurpurea** (Wahlenb.) Fr. ex Hartmann

Aira montana L. var. *setacea* (Huds.) Huds. = **Deschampsia setacea** (Huds.) Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aira parvula Hook. f. = **Deschampsia parvula** (Hook. f.) E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aira praecox L.
Sin.: *Arundo praecox* (L.) Nash
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Moore, D. M., 1983; Nicora, E. G., 1978; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(X, XII, IJF); URY(LAV, MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12712* (BAB), *Ulibarri, E. A. 1071* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 2898* (CONC)]; URY[*Lombardo, A. 3472* (MVFA)].

Aira pulchra (Nees & Meyen) Steud. = **Deschampsia caespitosa** (L.) P. Beauv. var. **pulchra** (Nees & Meyen) Nicora
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aira setacea Huds. = **Deschampsia setacea** (Huds.) Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aira spicata L. = **Trisetum spicatum** (L.) K. Richt. var. **spicatum**

Aira spiciformis Steud. = **Poa spiciformis** (Steud.) Hauman & Parodi var. **spiciformis**
Referencias: Giussani, L. M., 1993.

Aira superbiens Steud. = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **fuegiana** (Hook. f.) Moore & Doggett
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aira tenuifolia (J. Presl) Steud. = **Puccinellia preslii** (Hack.) Ponert
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aira versicolor Roem. & Schult. = **Deschampsia flexuosa** (L.) Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aira vestita Steud. = **Deschampsia flexuosa** (L.) Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Airidium elegantulum Steud. = **Deschampsia antarctica** E. Desv.

Airopsis jubata Griseb. = **Eragrostis japonica** (Thunb.) Trin.

Airopsis millegrana Griseb. = **Eragrostis airoides** Nees
Referencias: Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Alopecurus L.

Número de especies: 9, 2 endémicas

Alopecurus aequalis Sobol.
Sin.: *Alopecurus aequalis* Sobol. f. *fluitans* Parodi, *Alopecurus aequalis* Sobol. f. *foliosus* Parodi, *Alopecurus aequalis* Sobol. f. *notacens* (Hack.) Parodi, *Alopecurus aequalis* Sobol. f. *violaceus* (Hack.) Parodi, *Alopecurus aequalis* Sobol. var. *fluitans* (Parodi) Mariano, *Alopecurus aequalis* Sobol. var. *violaceus* (Hack.) Mariano, *Alopecurus aristulatus* Michx., *Alopecurus fulvus* Sm., *Alopecurus fulvus* Sm. f. *violaceae* Hack., *Alopecurus geniculatus* L. var. *aristulatus* (Michx.) Torr.
Referencias: Mariano, M., 1978a; Parodi, L. R., 1931; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10932* (SI)].

Alopecurus aequalis Sobol. f. *fluitans* Parodi = **Alopecurus aequalis** Sobol.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus aequalis Sobol. f. *foliosus* Parodi = **Alopecurus aequalis** Sobol.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus aequalis Sobol. f. *notacens* (Hack.) Parodi = **Alopecurus aequalis** Sobol.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus aequalis Sobol. f. *violaceus* (Hack.) Parodi = **Alopecurus aequalis** Sobol.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus aequalis Sobol. var. *fluitans* (Parodi) Mariano = **Alopecurus aequalis** Sobol.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus aequalis Sobol. var. *violaceus* (Hack.) Mariano = **Alopecurus aequalis** Sobol.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus agrestis L. = **Alopecurus myosuroides** Huds.

Alopecurus alpinus Sm., hom. illeg. = **Alopecurus magellanicus** Lam. var. **magellanicus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus alpinus Sm. f. *antarcticus* (Vahl) Hack. = **Alopecurus magellanicus** Lam. var. **magellanicus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus alpinus Sm. var. *antarcticus* (Vahl) Macloskie = **Alopecurus magellanicus** Lam. var. **magellanicus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus alpinus Sm. var. *aristatus* Hook. f., nom. nud. = **Alopecurus magellanicus** Lam. var. **magellanicus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus antarcticus Vahl = **Alopecurus magellanicus** Lam. var. **magellanicus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus antarcticus Vahl var. *brachyatherus* Parodi = **Alopecurus bonariensis** Parodi & Thell.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus antarcticus Vahl var. *bracteatus* (Phil.) Parodi = **Alopecurus magellanicus** Lam. var. **bracteatus** (Phil.) Mariano
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus aristatus Huds. var. *monspeliensis* (L.) Huds. = **Polypogon monspeliensis** (L.) Desf.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus aristulatus auct. non Michx. = **Alopecurus bonariensis** Parodi & Thell.

Alopecurus aristulatus Michx. = **Alopecurus aequalis** Sobol.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus bonariensis Parodi & Thell.
Sin.: *Alopecurus antarcticus* Vahl var. *brachyatherus* Parodi, *Alopecurus aristulatus* auct. non Michx., *Alopecurus geniculatus* auct. non L., *Alopecurus magellanicus* Lam. var. *brachyatherus* (Parodi) Mariano
Referencias: Parodi, L. R., 1931; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, ERI, LPA, SFE); URY(CAS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19003b* (SI), *Parodi, L. R. 6526* (BAA, SI, US)]; URY[*Rosengurtt, B. 360* (MVFA)].

Alopecurus bracteatus Phil. = **Alopecurus magellanicus** Lam. var. **bracteatus** (Phil.) Mariano
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus fulvus Sm. = **Alopecurus aequalis** Sobol.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus fulvus Sm. f. *violaceus* Hack. = **Alopecurus aequalis** Sobol.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus geniculatus auct. non L. = **Alopecurus bonariensis** Parodi & Thell.

Alopecurus geniculatus L. var. *aristulatus* (Michx.) Torr. = **Alopecurus aequalis** Sobol.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus geniculatus L. var. **geniculatus**
Referencias: Mariano, M., 1978a; Moore, D. M., 1983; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: ARG(BAI, RNE, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 9467* (SI), *Vallerini, J. 77* (BAA)]; CHL[*Matthei, O. R. 198* (BAA)].

Alopecurus geniculatus L. var. **patagonicus** Parodi
Referencias: Mariano, M., 1978a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 2970* (SI), *Eyerdam, W. J. 24271* (SI)]; CHL[*Elvebakk, A. 747* (CONC)].

Alopecurus heleochloides Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 0–3000 m.
Países: CHL(IV, XII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Reiche, C. F. s.n.* (US, W)].

Alopecurus hitchcockii Parodi
Referencias: Nicora, E. G., 1998a.
Hierba. Anual. Nativa. 3700–4000 m.

Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 565* (SI)].

Alopecurus interruptus (Kunth) Poir. = **Polypogon interruptus** Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus lechleri Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Lechler, W. 440* (*)].

Alopecurus magellanicus Lam. var. *brachyatherus* (Parodi) Mariano = **Alopecurus bonariensis** Parodi & Thell.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus magellanicus Lam. var. **bracteatus** (Phil.) Mariano
Sin.: *Alopecurus antarcticus* Vahl var. *bracteatus* (Phil.) Parodi, *Alopecurus bracteatus* Phil.
Referencias: Mariano, M., 1978a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 14249* (SI), *Boelcke, O. 1777* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 7503* (CONC)].

Alopecurus magellanicus Lam. var. **magellanicus**
Sin.: *Alopecurus alpinus* Sm. f. *antarcticus* (Vahl) Hack., *Alopecurus alpinus* Sm. var. *antarcticus* (Vahl) Macloskie, *Alopecurus alpinus* Sm. var. *aristatus* Hook. f., nom. nud., *Alopecurus alpinus* Sm., hom. illeg., *Alopecurus antarcticus* Vahl, *Alopecurus triceps* Krause, *Alopecurus variegatus* Steud.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 259* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 7549* (CONC)].

Alopecurus maritimus (Willd.) Poir. = **Polypogon maritimus** Willd.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus monspeliensis L. = **Polypogon monspeliensis** (L.) Desf.
Referencias: Kämpf, A. N., 1975; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus myosuroides Huds.
Sin.: *Alopecurus agrestis* L.
Referencias: Clarke, G. C. S., 1980; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, RNE); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vallerini, J. 444* (SI)].
Notas: Citada para Chile (C. Marticorena, com. pers.) y Uruguay (Rosengurtt et al., 1970) sin mencionar ejemplar de referencia.

Alopecurus pratensis L.
Referencias: Mariano, M., 1978a; Moore, D. M., 1983; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, NEU, RNE, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 459* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 6101* (CONC)].

Alopecurus triceps Krause = **Alopecurus magellanicus** Lam. var. **magellanicus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Alopecurus variegatus Steud. = **Alopecurus magellanicus** Lam. var. **magellanicus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Amelichloa Arriaga & Barkworth

Número de especies: 4, 3 endémicas

Amelichloa ambigua (Speg.) Arriaga & Barkworth
Sin.: *Jarava ambigua* (Speg.) Peñailillo, *Stipa ambigua* Speg., *Stipa dusenii* Hitchc.
Referencias: Arriaga, M. O. & Barkworth, M. E., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, NEU, RNE, SCR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5429* (SI), *Cabrera, A. L. 8066* (SI)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o material de referencia (Rosengurtt et al., 1970).

Amelichloa brachychaeta (Godr.) Arriaga & Barkworth
Sin.: *Jarava brachychaeta* (Godr.) Peñailillo, *Nassella brachychaeta* (Godr.) Barkworth, *Stipa brachychaeta* Godr., *Stipa eminens* Cav. f. *viridis* Kuntze, *Stipa lorentziana* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Torres, M. A., 1968; Peñailillo, P. B., 2002; Roig, F. A., 1964; Torres, M. A., 1993.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 1469* (CORD)].
Notas: Citada para Chile y Uruguay sin indicar material de referencia (Soreng et al., 2003).

Amelichloa brevipes (E. Desv.) Arriaga & Barkworth
Sin.: *Jarava brevipes* (E. Desv.) Peñailillo, *Stipa brevipes* E. Desv., *Stipa hirtiflora* Hack.
Referencias: Arriaga, M. O. & Barkworth, M. E., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–1300 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*T.B.P.A. 42* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 2356* (CONC)].

Amelichloa caudata (Trin.) Arriaga & Barkworth
Sin.: *Achnatherum caudatum* (Trin.) S.W.L. Jacobs & J. Everett, *Jarava bertrandii* (Phil.) Peñailillo, *Jarava caudata* (Trin.) Peñailillo, *Stipa amphicarpa* Phil., *Stipa bertrandii* Phil., *Stipa brachychaeta* Godr. var. *major* Speg., *Stipa caudata* Trin., *Stipa litoralis* Phil.
Referencias: Arriaga, M. O. & Barkworth, M. E., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2600 m.
Países: ARG(BAI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SFE); CHL(V, VIII, IX, RME); URY(FLA, MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11951* (SI), *Renvoize, S. A. 3454* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 18270* (CONC)]; URY[*Lombardo, A. 5770* (MVJB)].

Ammophila Host
Número de especies: 1 introducida

Ammophila arenaria (L.) Link
Sin.: *Ammophila arundinacea* Host, *Arundo arenaria* L.
Referencias: Moore, D. M., 1968; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, SCR, TDF); CHL(IV, V, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 4923* (BAA), *Ulibarri, E. A. 1048* (SI)]; CHL[*Moore, D. M. 2241* (BAB)].

Ammophila arundinacea Host = **Ammophila arenaria** (L.) Link
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Ampelodesmos australis Brongn. ex Duperrey = **Cortaderia pilosa** (d'Urv.) Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Amphibromus Nees
Número de especies: 2

Amphibromus quadridentulus (Döll) Swallen
Sin.: *Avena montevidensis* Hack., *Avena quadridentula* Döll, *Helictotrichon quadridentulum* (Döll) Renvoize, *Uralepis quadridentata* Döll
Referencias: Burkart, A., 1969a; Nicora, E. G., 1978; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Swallen, J. R., 1931.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hauman, L. L. s.n.* (BAA), *Keller, H. A. 361* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 23048* (MBM), *Smith, L. B. 15458* (SI)]; URY[*Hauman, L. L. s.n.* (SI)].

Amphibromus scabrivalvis (Trin.) Swallen var. **indigestus** Nicora
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 38* (BAA, SI)].
Notas: Citada para Chile sin indicar localidad y material de referencia (Soreng et al., 2003).

Amphibromus scabrivalvis (Trin.) Swallen var. **scabrivalvis**
Sin.: *Avena scabrivalvis* Trin., *Bromus gilliesii* Nees ex Steud., *Bromus holciformis* Steud. & Hochst., *Helictotrichon scabrivalvis* (Trin.) Govaerts
Referencias: Burkart, A., 1969a; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Swallen, J. R., 1931.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, NEU, SFE); CHL(V, VII, VIII, IX, X); URY(CLA, FLO, MAL, MON, PAY, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 137* (SI)]; CHL[*Barros, E. 494* (SI), *Bertero, C. L. G. 329* (US)]; URY[*Rosengurtt, B. 11286* (MVFA)].

Amphilophis barbinodis (Lag.) Nash = **Bothriochloa barbinodis** (Lag.) Herter
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Amphilophis exaristatus Nash = **Bothriochloa exaristata** (Nash) Henrard
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Amphilophis saccharoides (Sw.) Nash = **Bothriochloa saccharoides** (Sw.) Rydb.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Vega, A. S., 2000.

Amphilophis torreyanus (Steud.) Nash = **Bothriochloa laguroides** (DC.) Herter subsp. **torreyana** (Steud.) Allred & Gould
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Amphilophis xerophilum Hassl. = **Amphilophium paniculatum** (L.) Kunth
Referencias: Lohmann, L. G., 2003; Lohmann, L. G., com. pers.

Anachyris paspaloides Nees = **Paspalum malacophyllum** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O., 1974; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Anastrophus compressus Schltr. ex Döll, nom. inval. = **Axonopus compressus** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Anastrophus paspaloides (Michx.) Nash = **Paspalum distichum** L.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; de Koning, R. & Sosef, M. S. M., 1985.

Anastrophus pectinatus (Nees ex Trin.) Schltdl. ex B.D. Jacks. = **Paspalum pectinatum** Nees ex Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Anastrophus platycaulis (Poir.) Nash ex Small = **Axonopus compressus** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Anatherostipa (Hack. ex Kuntze) Peñailillo

Número de especies: 7, 4 endémicas

Anatherostipa bomanii (Hauman) Peñailillo
Sin.: *Nicoraella bomanii* (Hauman) Torres, *Stipa bomanii* Hauman
Referencias: Parodi, L. R., 1946b; Peñailillo, P. B., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997c.
Hierba. Perenne. Nativa. 3200–4600 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boman s.n.* (SI)]; CHL[*Zöllner, O. 756* (CONC)].

Anatherostipa brevis (Torres) Peñailillo
Sin.: *Nicoraella brevis* Torres
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997c.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14047* (BAA, LP)].

Anatherostipa henrardiana (Parodi) Peñailillo
Sin.: *Nicoraella henrardiana* (Parodi) Torres, *Stipa henrardiana* Parodi
Referencias: Parodi, L. R., 1946b; Peñailillo, P. B., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997c.
Hierba. Perenne. Endémica. 4500–5000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9105* (BAA, LIL, LP)].

Anatherostipa mucronata (Griseb.) F. Rojas
Sin.: *Anatherostipa saltensis* (Kuntze) Peñailillo, *Nicoraella mucronata* (Griseb.) Torres, *Oryzopsis mucronata* (Griseb.) Parodi, *Piptochaetium mucronatum* Griseb., *Stipa saltensis* Kuntze
Referencias: Rojas P., F. P., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997c.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9380* (LP)]; CHL[*Arancio, G. 501* (CONC)].

Anatherostipa obtusa (Nees & Meyen) Peñailillo
Sin.: *Nicoraella obtusa* (Nees & Meyen) Torres, *Piptatherum obtusum* Nees & Meyen, *Stipa jujuyensis* Speg., *Stipa obtusa* (Nees & Meyen) Hitchc.
Referencias: Parodi, L. R., 1946b, 1950; Peñailillo, P. B., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997c.
Hierba. Perenne. Nativa. 3600–4100 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tezanos Pinto, M. s.n.* (LP)].

Anatherostipa rigidiseta (Pilg.) Peñailillo
Sin.: *Nicoraella rigidiseta* (Pilg.) Torres, *Oryzopsis rigidiseta* Pilg., *Stipa rigidiseta* (Pilg.) Hitchc.
Referencias: Peñailillo, P. B., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997c.
Hierba. Perenne. Nativa. 3800–4200 m.
Países: CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 175* (LP)].

Anatherostipa saltensis (Kuntze) Peñailillo = **Anatherostipa mucronata** (Griseb.) F. Rojas
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Anatherostipa venusta (Phil.) Peñailillo
Sin.: *Nicoraella venusta* (Phil.) Torres, *Stipa venusta* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Torres, M. A., 1997c.
Hierba. Perenne. Endémica. 3900–4100 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arancio, G. 10495* (ULS)].

Anatherum domingense Roem. & Schult. = **Andropogon leucostachyus** Kunth
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Anatherum holcoides Nees = **Eriochrysis holcoides** (Nees) Kuhlm.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Anatherum megapotamicum Spreng. = **Elionurus muticus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Anatherum virginicum (Desv. ex Ham.) Desv. var. *arenarium* (Hack.) Roberty = **Andropogon arenarius** Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon L., nom. cons.

Número de especies: 16, 4 endémicas, 1 introducida

Andropogon adustus Trin. = **Elionurus muticus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon agrostoides Speg. = **Sorghastrum setosum** (Griseb.) Hitchc.
Referencias: Dávila, P., 1988.

[Andropogon altissimus Colla]
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Andropogon altus Hitchc. = **Bothriochloa alta** (Hitchc.) Henrard
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Andropogon annulatus Forssk. = **Dichanthium annulatum** (Forssk.) Stapf
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon arenarius Hack.
Sin.: *Anatherum virginicum* (Desv. ex Ham.) Desv. var. *arenarium* (Hack.) Roberty, *Andropogon arenarius* Hack. f. *subcompletus* Hack. ex Lindm.
Referencias: Zanin, A., 2001b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, MAL, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Zanin, A. 753* (FLOR, SPF)]; URY[*Arechavaleta, J. 204* (US, W), *Herter, W. G. F. 328* (SI)].

Andropogon arenarius Hack. f. *subcompletus* Hack. ex Lindm. = **Andropogon arenarius** Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon argenteus DC. = **Bothriochloa saccharoides** (Sw.) Rydb.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon aristatus Poir. = **Dichanthium aristatum** (Poir.) C.E. Hubb.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon balansae (Hack.) Hack. = **Sorghastrum balansae** (Hack.) Dávila
Referencias: Dávila, P., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon barbatus L., hom. illeg. = **Chloris barbata** Sw.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Andropogon barbinodis Lag. = **Bothriochloa barbinodis** (Lag.) Herter
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Andropogon barretoi Norrmann & Quarín
Referencias: Norrmann, G. A. & Quarín, C. L., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Norrmann, G. A. 146* (BAA, CORD, CTES, ICN, K, MBM, SI, SP, US)].

Andropogon berteronianus Steud. = **Bothriochloa saccharoides** (Sw.) Rydb.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon bicornis L.
Sin.: *Andropogon bicornis* L. var. *gracillimus* Hack.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Pohl, R. W., 1980; Renvoize, S. A., 1988; Zanin, A., 2001a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1410* (SI), *Zuloaga, F. O. 5502* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 11090* (SI), *Zanin, A. 316* (ICN)]; PRY[*Pavetti, C. V. M. 10477* (SI), *Zardini, E. M. 7108* (FCQ, MO)].

Andropogon bicornis L. var. *gracillimus* Hack. = **Andropogon bicornis** L.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon bladhii Retz. = **Bothriochloa bladhii** (Retz.) S.T. Blake

Andropogon bracteatus Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Hyparrhenia bracteata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Stapf
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Andropogon brevifolius Sw. = **Schizachyrium brevifolium** (Sw.) Nees ex Büse
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon caespitosus Phil. = **Schizachyrium sanguineum** (Retz.) Alston
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

[Andropogon campestris Trin.]
Sin.: *Andropogon camporum* Trin. ex Steud., nom. superfl.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Andropogon camporum Trin. ex Steud., nom. superfl. = **Andropogon campestris** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon candidus Trin. = **Elionurus muticus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon capense Houtt. = **Eustachys paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **paspaloides**

Andropogon citratus DC. = **Cymbopogon citratus** (DC.) Stapf

Andropogon coloratus Hack.
Referencias: Hauman, L. L. & Vanderveken, G., 1917; Stuckert, T. T. J. V., 1911; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Stuckert, T. T. J. V. 20275* (US)].

Andropogon condensatus Kunth = **Schizachyrium condensatum** (Kunth) Nees
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Andropogon condensatus Kunth f. *lacitiflorus* Hack., nom. nud. = **Schizachyrium condensatum** (Kunth) Nees
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon condensatus Kunth var. *genuinus* Hack., nom. inval. = **Schizachyrium condensatum** (Kunth) Nees

Andropogon condensatus Kunth var. *paniculatus* (Kunth) Hack. = **Schizachyrium condensatum** (Kunth) Nees
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Andropogon condensatus Kunth subsp. *corymbosus* Hack. = **Schizachyrium condensatum** (Kunth) Nees
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Andropogon condensatus Kunth subsp. *elongatus* (Hack.) Hack. = **Schizachyrium microstachyum** (Desv. ex Ham.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon consanguineus Kunth = **Schizachyrium spicatum** (Spreng.) Herter
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon consanguineus Kunth var. *genuinus* Hack., nom. inval. = **Schizachyrium spicatum** (Spreng.) Herter
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon consanguineus Kunth var. *humilior* Hack. = **Schizachyrium spicatum** (Spreng.) Herter
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon dominguense (Roem. & Schult.) Steud. = **Andropogon leucostachyus** Kunth
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon dubius Kunth, nom. superfl. = **Elionurus muticus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon edwardsianus Gould = **Bothriochloa edwardsiana** (Gould) Parodi
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Andropogon exaratus Hack.
Referencias: Parodi, L. R., 1926a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(CEN, COA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 5450* (BAA)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6495* (SI), *Pedersen, T. M. 3207* (SI)].

[Andropogon exaratus Hack. var. major Ekman]
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Notas: Nombre dudoso. Probablemente se trate de un sinónimo de *Andropogon exaratus*.

[Andropogon exaratus Hack. var. minor Ekman]
Notas: Nombre dudoso.

Andropogon exaristatus (Nash) Hitchc. = **Bothriochloa exaristata** (Nash) Henrard
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Andropogon filiforme Hack. ex A. Camus, nom. illeg. = **Eriochrysis filiformis** (Hack.) Filg.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon francavillanus E. Fourn. = **Sorghastrum setosum** (Griseb.) Hitchc.
Referencias: Dávila, P., 1988; Flores, A. I. P. & Valls, J. F. M., 1993[1992].

Andropogon gayanum Kunth
Referencias: Zanin, A., 2001b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pott, A. s.n.* (ICN, SP)].

[Andropogon gerardii Vitman]
Referencias: Zanin, A., 2001b.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Andropogon glaucophyllus Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Zanin, A., 2001a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(CAS, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Zanin, A. 541* (FLOR, SPF)]; URY[*Rosengurtt, B. 2634b* (MVFA)].

Andropogon glaziovii Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(COA, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 27310* (FCQ, MO)].

Andropogon gracilipes Hack. = **Schizachyrium gracilipes** (Hack.) A. Camus
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon halepensis (L.) Brot. = **Sorghum halepense** (L.) Pers.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon hassleri Hack. = **Bothriochloa exaristata** (Nash) Henrard
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Andropogon hassleri Hack. var. *aristatus* Hack. = **Bothriochloa laguroides** (DC.) Herter subsp. **torreyana** (Steud.) Allred & Gould
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon herzogii Hack. = **Andropogon lateralis** Nees
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon hirtiflorus (Nees) Kunth = **Schizachyrium sanguineum** (Retz.) Alston
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Andropogon hirtiflorus (Nees) Kunth var. *genuinus* Hack., nom. inval. = **Schizachyrium sanguineum** (Retz.) Alston
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon hispidus Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Arundinella hispida** (Willd.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon humboldtianum Steud., nom. superfl. = **Sorghastrum stipoides** (Kunth) Nash
Referencias: Dávila, P., 1988.

Andropogon hypogynus Hack.
Sin.: *Andropogon hypogynus* Hack. var. *anatherus* Hack.
Referencias: Norrmann, G. A., 1985; Renvoize, S. A., 1988.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 649* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 33445* (MBM)]; PRY[*Schinini, A. 27678* (CTES)].

Andropogon hypogynus Hack. var. *anatherus* Hack. = **Andropogon hypogynus** Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon imberbis Hack., hom. illeg. = **Schizachyrium salzmannii** (Trin. ex Steud.) Nash
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon imberbis Hack. var. *genuinus* Hack., nom. inval. = **Schizachyrium salzmannii** (Trin. ex Steud.) Nash
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon imberbis Hack. var. *muticus* Hack. = **Schizachyrium salzmannii** (Trin. ex Steud.) Nash
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon imperatoides (Hack.) Lillo = **Bothriochloa imperatoides** (Hack.) Herter
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Andropogon incanus Hack. = **Andropogon lateralis** Nees
Referencias: Zanin, A., 2001b.

Andropogon incanus Hack. var. *lateralis* (Nees) Hack. = **Andropogon lateralis** Nees
Referencias: Zanin, A., 2001b.

Andropogon incanus Hack. var. *ramosissimus* Hack. = **Andropogon lateralis** Nees
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon incanus Hack. var. *trichocoleus* Hack. = **Andropogon lateralis** Nees
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon insularis L. = **Digitaria insularis** (L.) Fedde
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Barreto, I. L., 1981; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994b.

Andropogon laguriformis Griseb. = **Bothriochloa laguroides** (DC.) Herter subsp. **laguroides**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Vega, A. S., 2000.

Andropogon laguroides DC. = **Bothriochloa laguroides** (DC.) Herter subsp. **laguroides**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon laguroides Lag., nom. illeg. = **Bothriochloa laguroides** (DC.) Herter subsp. **laguroides**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon lateralis Nees
Sin.: *Andropogon herzogii* Hack., *Andropogon incanus* Hack., *Andropogon incanus* Hack. var. *lateralis* (Nees) Hack., *Andropogon incanus* Hack. var. *ramosissimus* Hack., *Andropogon incanus* Hack. var. *trichocoleus* Hack., *Andropogon lateralis* Nees var. *incanus* (Hack.) Henrard, *Andropogon virginicus* auct. non L., *Andropogon virginicus* L. subsp. *genuinus* auct. non Hack.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Burkart, A. & Toursarkissian, M., 1969; Renvoize, S. A., 1988; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Zanin, A., 2001b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, PAI); URY(ART, CAS, CLA, DUR, LAV, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 29051* (SI), *Montes, J. E. 15317* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 228a* (SI), *Hatschbach, G. 12893* (MBM), *Sacco, J. C. 19* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 229* (G, US), *Kiesling, R. 9863* (PY, SI)]; URY[*Cabrera, A. L. 32339* (SI)].

Andropogon lateralis Nees var. *incanus* (Hack.) Henrard = **Andropogon lateralis** Nees
Referencias: Zanin, A., 2001b.

Andropogon latiflorus Nees ex Steud. = **Elionurus muticus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon leptocladus Hack. = **Agenium leptocladum** (Hack.) Clayton
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon leptocladus Hack. f. *simplex* Hack. = **Agenium leptocladum** (Hack.) Clayton
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon leucostachyus Kunth
Sin.: *Anatherum domingense* Roem. & Schult., *Andropogon dominguense* (Roem. & Schult.) Steud.

Referencias: Burkart, A. & Toursarkissian, M., 1969; Norrmann, G. A., 1985; Pohl, R. W., 1980; Renvoize, S. A., 1988; Zanin, A., 2001b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CON, COA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1387* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 45718* (MBM), *Smith, L. B. 15747* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 2697* (SI)].

Andropogon leucostachyus Kunth subsp. *selloanus* Hack. = **Andropogon selloanus** (Hack.) Hack.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Andropogon lhotskyi Steud. = **Schizachyrium condensatum** (Kunth) Nees
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon lindmanii Hack.
Referencias: Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Zanin, A., 2001b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(CAS, ROC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 14207* (SI), *Zanin, A. 761* (FLOR)]; URY[*Rosengurtt, B. 8211b* (SI)].

Andropogon luxurians Ekman = **Schizachyrium sanguineum** (Retz.) Alston
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Andropogon macrothrix Trin.
Sin.: *Andropogon ternatus* (Spreng.) Nees subsp. *macrothrix* (Trin.) Hack.
Referencias: Norrmann, G. A., 1985; Parodi, L. R., 1943a; Zanin, A., 2001a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(GUA); URY(CLA, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 786* (SI), *Norrmann, G. A. 115* (CTES)]; BRA[*Smith, L. B. 15818* (SI), *Zanin, A. 441* (FLOR)]; PRY[*Morrone, O. 178* (SI), *Woolston, A. L. 83* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 4635pe* (MVFA)].

Andropogon megapotamicus Spreng. = **Elionurus muticus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon melanocarpus Elliott = **Heteropogon melanocarpus** (Elliot) Benth.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon microstachyus Desv. ex Ham. = **Schizachyrium microstachyum** (Desv. ex Ham.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon minarum (Nees) Kunth = **Sorghastrum minarum** (Nees) Hitchc.
Referencias: Dávila, P., 1988; Flores, A. I. P. & Valls, J. F. M., 1993[1992]; Renvoize, S. A., 1988.

Andropogon montufarii Kunth = **Trachypogon spicatus** (L. f.) Kuntze
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon neesii Kunth, hom. illeg. = **Agenium villosum** (Nees) Pilg.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon nutans L. = **Sorghastrum nutans** (L.) Nash
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon nutans L. var. *agrostoides* (Speg.) Hack. = **Sorghastrum setosum** (Griseb.) Hitchc.
Referencias: Dávila, P., 1988.

Andropogon nutans L. var. *albescens* (Hack.) Hack. = **Sorghastrum pellitum** (Hack.) Parodi
Referencias: Dávila, P., 1988.

Andropogon nutans L. var. *avenaceus* (Michx.) Hack. = **Sorghastrum nutans** (L.) Nash
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon nutans L. var. *burchellii* Hack. = **Sorghastrum stipoides** (Kunth) Nash
Referencias: Dávila, P., 1988.

Andropogon nutans L. var. *pellitus* (Hack.) Hack. = **Sorghastrum pellitum** (Hack.) Parodi
Referencias: Dávila, P., 1988.

Andropogon nutans L. var. *scaberrimus* (Nees) Hack. = **Sorghastrum scaberrimum** (Nees) Herter
Referencias: Dávila, P., 1988; Flores, A. I. P. & Valls, J. F. M., 1993[1992].

Andropogon nutans L. var. *stipoides* (Kunth) Hack. = **Sorghastrum stipoides** (Kunth) Nash
Referencias: Dávila, P., 1988; Flores, A. I. P. & Valls, J. F. M., 1993[1992].

Andropogon nutans L. var. *submuticus* (Hack.) Hack. = **Sorghastrum setosum** (Griseb.) Hitchc.
Referencias: Dávila, P., 1988.

Andropogon paniculatus Kunth, hom. illeg. = **Schizachyrium condensatum** (Kunth) Nees
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon paniculatus Lam. var. *elongatus* (Hack.) Hack. = **Schizachyrium microstachyum** (Desv. ex Ham.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon pellitus (Hack.) Herter = **Sorghastrum pellitum** (Hack.) Parodi
Referencias: Dávila, P., 1988; Flores, A. I. P. & Valls, J. F. M., 1993[1992]; Mujica Sallés, J., 1996.

Andropogon plumiger Ekman = **Schizachyrium condensatum** (Kunth) Nees
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon polydactylon L., nom. illeg. = **Chloris elata** Desv.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Andropogon quadrivalvis L. = **Themeda quadrivalvis** (L.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon riedelii Trin. = **Schizachyrium sanguineum** (Retz.) Alston
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon rufidulus Steud. = **Sorghastrum stipoides** (Kunth) Nash
Referencias: Dávila, P., 1988.

Andropogon saccharoides Sw. = **Bothriochloa saccharoides** (Sw.) Rydb.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Vega, A. S., 2000.

Andropogon saccharoides Sw. var. *barbinodis* (Lag.) Hack. = **Bothriochloa barbinodis** (Lag.) Herter
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon saccharoides Sw. var. *erianthoides* Hack. = **Bothriochloa brasiliensis** (Hack.) Henrard

Andropogon saccharoides Sw. var. *genuinus* Hack., nom. inval. = **Bothriochloa saccharoides** (Sw.) Rydb.

Andropogon saccharoides Sw. var. *hassleri* (Hack.) Ekman = **Bothriochloa exaristata** (Nash) Henrard
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Andropogon saccharoides Sw. var. *imperatoides* Hack. = **Bothriochloa imperatoides** (Hack.) Herter
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Andropogon saccharoides Sw. var. *laguroides* (DC.) Hack. = **Bothriochloa laguroides** (DC.) Herter subsp. **laguroides**
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Andropogon saccharoides Sw. var. *longipaniculatus* Gould = **Bothriochloa longipaniculata** (Gould) Allred & Gould
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Andropogon saccharoides Sw. var. *parvispiculus* (Hitchc.) Standl. = **Bothriochloa saccharoides** (Sw.) Rydb. subsp. **parvispiculis** (Hitchc.) Davidse
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Andropogon saccharoides Sw. var. *polytrichus* Griseb. = **Sorghastrum pellitum** (Hack.) Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon saccharoides Sw. var. *submuticus* Vasey ex Hack. = **Bothriochloa exaristata** (Nash) Henrard
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Andropogon saccharoides Sw. var. *torreyanus* (Steud.) Hack. = **Bothriochloa laguroides** (DC.) Herter subsp. **torreyana** (Steud.) Allred & Gould
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Andropogon saccharoides Sw. var. *typicus* Hack., nom. inval. = **Bothriochloa saccharoides** (Sw.) Rydb.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Vega, A. S., 2000.

Andropogon saccharoides Sw. subsp. *brasiliensis* Hack. = **Bothriochloa brasiliensis** (Hack.) Henrard
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon saccharoides Sw. subsp. *genuinus* Hack., nom. inval. = **Bothriochloa saccharoides** (Sw.) Rydb.

Referencias: Vega, A. S., 2000.

Andropogon saccharoides Sw. subsp. *laguroides* (DC.) Hack. = **Bothriochloa laguroides** (DC.) Herter subsp. **laguroides**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon saccharoides Sw. subsp. *leucopogon* (Nees) Hack. = **Bothriochloa barbinodis** (Lag.) Herter
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon saccharoides Sw. subsp. *parvispiculus* Hitchc. = **Bothriochloa saccharoides** (Sw.) Rydb. subsp. **parvispiculis** (Hitchc.) Davidse
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Andropogon salzmannii (Trin. ex Steud.) Hack. = **Schizachyrium salzmannii** (Trin. ex Steud.) Nash
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon salzmannii (Trin. ex Steud.) Hack. var. *aristatus* Hack. = **Schizachyrium salzmannii** (Trin. ex Steud.) Nash
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon scaberrimus (Nees) Kunth = **Sorghastrum scaberrimum** (Nees) Herter
Referencias: Dávila, P., 1988.

Andropogon scabriflorus Rupr. ex Hack. = **Schizachyrium scabriflorum** (Rupr. ex Hack.) A. Camus
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon schotti Rupr. ex Hack. = **Schizachyrium sanguineum** (Retz.) Alston
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon scoparius J. Presl, hom. illeg. = **Schizachyrium condensatum** (Kunth) Nees
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon scoparius Michx. = **Schizachyrium scoparium** (Michx.) Nash
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon secundus Willd. ex Griseb., nom. nud. = **Heteropogon contortus** (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon selloanus (Hack.) Hack.
Sin.: *Andropogon leucostachyus* Kunth subsp. *selloanus* Hack.
Referencias: Burkart, A. & Toursarkissian, M., 1969; Mujica Sallés, J., 1996; Norrmann, G. A., 1985; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CON, PAI, PHA); URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1012* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 28184* (MBM)]; PRY[*Morrone, O. 296* (SI)]; URY[*Cabrera, A. L. 32422* (SI), *Mujica Sallés, J. 449* (MVFA)].

Andropogon semiberbis (Nees) Kunth var. *incertus* Hack. = **Schizachyrium sanguineum** (Retz.) Alston
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon setosus Griseb. = **Sorghastrum setosum** (Griseb.) Hitchc.
Referencias: Dávila, P., 1988; Flores, A. I. P. & Valls, J. F. M., 1993[1992].

Andropogon sorghum (L.) Brot. var. *halepensis* (L.) Hack. = **Sorghum halepense** (L.) Pers.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon spathiflorus (Nees) Kunth = **Andropogon virgatus** Desv. ex Ham.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon springfieldii Gould = **Bothriochloa springfieldii** (Gould) Parodi
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Andropogon squarrosus auct. non L. f. = **Chrysopogon zizanioides** (L.) Roberty

Andropogon stipoides Kunth = **Sorghastrum stipoides** (Kunth) Nash
Referencias: Dávila, P., 1988; Flores, A. I. P. & Valls, J. F. M., 1993[1992].

Andropogon tener (Nees) Kunth = **Schizachyrium tenerum** Nees
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon tener (Nees) Kunth var. *filiformis* (Nees) Hack. = **Schizachyrium tenerum** Nees
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon ternatus (Spreng.) Nees
Sin.: *Andropogon ternatus* (Spreng.) Nees subsp. *genuinus* Hack., nom. inval., *Saccharum ternatum* Spreng.
Referencias: Burkart, A. & Toursarkissian, M., 1969; Mujica Sallés, J., 1996; Norrmann, G. A., 1985; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Zanin, A., 2001b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Norrmann, G. A. 307* (CTES)]; BRA[*Zanin, A. 344* (ICN)]; PRY[*Rojas, T. 3995* (AS, MO)]; URY[*Rosengurtt, B. 11272* (MVFA)].

Andropogon ternatus (Spreng.) Nees subsp. *genuinus* Hack., nom. inval. = **Andropogon ternatus** (Spreng.) Nees
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon ternatus (Spreng.) Nees subsp. *macrothrix* (Trin.) Hack. = **Andropogon macrothrix** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon torreyanus Steud. = **Bothriochloa laguroides** (DC.) Herter subsp. **torreyana** (Steud.) Allred & Gould
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Andropogon villosus (Nees) Ekman, nom. illeg. = **Agenium villosum** (Nees) Pilg.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Andropogon virgatus Desv. ex Ham.
Sin.: *Andropogon spathiflorus* (Nees) Kunth, *Hypogynium virgatum* (Desv. ex Ham.) Dandy
Referencias: Burkart, A. & Toursarkissian, M., 1969; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Zanin, A., 2001b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CAN); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 12086* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 20791* (SI)]; PRY[*Jiménez, B. 1740* (BM, CTES, G, MO, PY)]; URY[*Rosengurtt, B. 7060* (MVFA)].

Andropogon virginicus auct. non L. = **Andropogon lateralis** Nees

Andropogon virginicus L. subsp. *genuinus* auct. non Hack. = **Andropogon lateralis** Nees

Anisantha madritensis (L.) Nevski = **Bromus madritensis** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Anisantha rigida (Roth) Hyl. = **Bromus rigidus** Roth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Anisantha sterilis (L.) Nevski = **Bromus sterilis** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Anisantha tectorum (L.) Nevski = **Bromus tectorum** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Anthaenantia P. Beauv.

Número de especies: 1

Anthaenantia hackelii Arechav. = **Digitaria phaeotrix** (Trin.) Parodi var. **hackelii** (Arechav.) Henrard
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Anthaenantia lanata (Kunth) Benth.
Sin.: *Anthaenantia lanata* (Kunth) Benth. var. *mollis* (Nees) Arechav., *Leptocoryphium lanatum* (Kunth) Nees, *Leptocoryphium lanatum* (Kunth) Nees var. *molle* (Nees) Döll, *Milium juncoides* Speg., *Milium lanatum* (Kunth) Roem. & Schult., *Paspalum dentatosulcatum* Arechav., *Paspalum lanatum* Kunth
Referencias: Burkart, A., 1969a; Cialdella, A. M., 1994c; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE);

URY(ART, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3841* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15898* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4606* (G)]; URY[*Izaguirre de Artuccio, P. 50* (MVFA)].

Anthaenantia lanata (Kunth) Benth. var. *mollis* (Nees) Arechav. = **Anthaenantia lanata** (Kunth) Benth.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Anthaenantiopsis Mez ex Pilg.

Número de especies: 4, 1endémica

Anthaenantiopsis fiebrigii Mez, nom. illeg. = **Anthaenantiopsis fiebrigii** Parodi
Referencias: Morrone, O., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Dubcovsky, J., 1993.

Anthaenantiopsis fiebrigii Parodi
Sin.: *Anthaenantiopsis fiebrigii* Mez, nom. illeg.
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994b; Morrone, O., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Dubcovsky, J., 1993; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2100 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32666* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 11925* (G, US)].

Anthaenantiopsis perforata (Nees) Parodi
Sin.: *Panicum perforatum* Nees
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–700 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Jönsson, G. 1208* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4702* (G, SI)].

Anthaenantiopsis racemosa Renvoize = **Paspalum lachneum** Nees ex Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Anthaenantiopsis rojasiana Parodi
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994b; Morrone, O., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Dubcovsky, J., 1993; Parodi, L. R., 1943b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(AMA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1810* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 36* (G)].

Anthaenantiopsis trachystachya (Nees) Pilg.
Sin.: *Panicum trachystachyum* Nees
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: PRY(AMA, CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11418* (BAA, G, MO, W)].

Anthistiria ciliata L. f., nom. nud. = **Themeda quadrivalvis** (L.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Anthochloa Nees & Meyen

Número de especies: 1

Anthochloa lepidula Nees & Meyen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1975a.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000–5000 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Solomon, J. C. 13371* (SI)]; CHL[*Marticorena, A. 229* (CONC)].

Anthoxanthum L.

Número de especies: 8, 3 endémicas, 1 introducida

Anthoxanthum altissimum (Steud.) Veldkamp
Sin.: *Hierochloe altissima* Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Lechler, W. 246* (BAA, K, L, LE, P, US)].

Anthoxanthum crinitum L. f. = **Dichelachne crinita** (L. f.) Hook. f.

Anthoxanthum giganteum Walter = **Saccharum giganteum** (Walter) C.E. Hubb.
Referencias: Molina, A. M., 1981.

Anthoxanthum gunckelii (Parodi) Veldkamp
Sin.: *Hierochloe gunckelii* Parodi
Referencias: De Paula, M., 1975; Parodi, L. R., 1941b; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(RNE); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Calderón 1657* (BAA)]; CHL[*Parodi, L. R. 13643* (BAA, SI)].

Anthoxanthum juncifolium (Hack.) Veldkamp
Sin.: *Hierochloe juncifolia* (Hack.) Parodi, *Hierochloe utriculata* (Ruiz & Pav.) Kunth var. *juncifolia* Hack.
Referencias: De Paula, M., 1975; Parodi, L. R., 1941b; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 310* (SI)]; CHL[*Hollermayer, A. 1253* (CONC)].

Anthoxanthum odoratum L.
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Faggi, A. M., 1978; Renvoize, S. A., 1988; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, NEU, RNE, TDF); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VII, VIII, IX, X, XII, IJF); URY(CAS, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1082* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 2119* (SI), *Smith, L. B. 15532* (HBR, R, US)]; CHL[*Gunckel, L. H. 12570* (CONC), *Kunkel, G. W. H. 2053* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 372b* (MVFA)].

Anthoxanthum pusillum (Hack. ex Dusén) Veldkamp
Sin.: *Hierochloe pusilla* Hack. ex Dusén
Referencias: De Paula, M., 1975; Parodi, L. R., 1941b; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–900 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dusén, P. K. H. 5999* (BAA, S, US, W)]; CHL[*Pisano, E. 4679* (CONC)].

Anthoxanthum redolens (Vahl) P. Royen
Sin.: *Avena redolens* (Vahl) Pers., *Hierochloe arenaria* Steud., *Hierochloe magellanica* (Desr.) Hook. f., *Hierochloe magellanica* Hook. f., nom. nud., *Hierochloe moorei* De Paula, *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult., *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. var. *magellanicum* (Hook. f.) Macloskie, *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. var. *major* Speg., *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. var. *micrantha* Parodi, *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. var. *typica* Parodi, nom. inval., *Hierochloe sorianoi* De Paula, *Holcus redolens* Vahl, *Melica magellanica* Desr., *Savastana antarctica* (Labill.) Speg.
Referencias: De Paula, M., 1975; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IV, VIII, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 461* (SI), *Parodi, L. R. 11555* (BAA, SI)]; CHL[*Lechler, W. 1138* (BAA, G, L, LE, MPU, P, US, W)].

Anthoxanthum spicatum (Parodi) Veldkamp
Sin.: *Hierochloe spicata* Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1000 m.
Países: CHL(IX, XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Montero, G. 4810* (CONC)].

Anthoxanthum utriculatum (Ruiz & Pav.) Y. Schouten & Veldkamp
Sin.: *Hierochloe utriculata* (Ruiz & Pav.) Kunth, *Hierochloe utriculata* (Ruiz & Pav.) Kunth var. *minor* Desv., *Torresia utriculata* Ruiz & Pav.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; De Paula, M., 1975; Parodi, L. R., 1941b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(NEU); CHL(IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10783* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Parra, O. 822* (CONC)].

Antonella nicorae (Anton) Caro = **Tridens nicorae** Anton
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Apera Adans.
Número de especies: 1 introducida

Apera interrupta (L.) P. Beauv.
Sin.: *Agrostis interrupta* L.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Parodi, L. R., 1953; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 900–1700 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE); CHL(IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10718* (BAA, SI), *Nicora, E. G. 9661* (SI)]; CHL[*Alvaro Tomé 16* (SI), *Ricardi, M. 5657* (CONC)].

Apoclada McClure
Número de especies: 1

Apoclada diversa McClure & L.B. Sm. = **Apoclada simplex** McClure & L.B. Sm.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; McClure, F. A. & Smith, L. B., 1967.

Apoclada simplex McClure & L.B. Sm.
Sin.: *Apoclada diversa* McClure & L.B. Sm.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; McClure, F. A. & Smith, L. B., 1967; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 700–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 16355* (US)].

Apogonia glabrata E. Fourn. = **Schizachyrium salzmannii** (Trin. ex Steud.) Nash
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Aristavena setacea (Huds.) F. Albers & Butzin = **Deschampsia setacea** (Huds.) Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aristida L.

Número de especies: 48, 22 endémicas

Aristida achalensis Mez
Sin.: *Aristida achalensis* Mez var. *elongata* Henrard, *Aristida achalensis* Mez var. *tucumana* (Henrard) Henrard, *Aristida decipiens* Henrard, *Aristida tucumana* Henrard
Referencias: Sulekic, A. A., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 900–3300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 361* (SI)].

Aristida achalensis Mez var. *elongata* Henrard = **Aristida achalensis** Mez
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida achalensis Mez var. *tucumana* (Henrard) Henrard = **Aristida achalensis** Mez
Referencias: Sulekic, A. A., 2003.

Aristida acuminata Hack. = **Aristida circinalis** Lindm.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1993, 1999.

Aristida adscensionis L.
Sin.: *Aristida adscensionis* L. f. *modestina* Hack., nom. nud., *Aristida adscensionis* L. var. *breviseta* Hack., *Aristida adscensionis* L. var. *bromoides* (Kunth) Henrard, *Aristida adscensionis* L. var. *coerulescens* auct. non (Desf.) Trin. & Rupr., *Aristida adscensionis* L. var. *condensata* (Hack.) Henrard, *Aristida adscensionis* L. var. *humilis* (Kunth) Kuntze, *Aristida adscensionis* L. var. *modesta* Hack., *Aristida adscensionis* L. var. *normalis* Kuntze, nom. inval., *Aristida adscensionis* L. var. *scabriflora* Hack., *Aristida bromoides* Kunth, *Aristida coerulescens* Desf., *Aristida dispersa* Trin. & Rupr., *Aristida dispersa* Trin. & Rupr. var. *nana* Trin. & Rupr., *Aristida festucoides* Steud. & Hochst., nom. nud., *Aristida humilis* Kunth, *Aristida interrupta* Cav., *Aristida nana* Steud., nom. nud.
Referencias: Caro, J. A., 1961c; Henrard, J. T., 1926–1933; Longhi-Wagner, H. M., 1998; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 200–4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II, III, IV, V, RME); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Negritto, M. A. 435* (CORD, CTES, SI)]; CHL[*Bertero, C. L. G. 994* (B, LE, US)]; PRY[*Mereles, F. 6118* (FCQ, SI)].

Aristida adscensionis L. f. *modestina* Hack., nom. nud. = **Aristida adscensionis** L.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida adscensionis L. var. *americana* (L.) Kuntze = **Bouteloua americana** (L.) Scribn.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Aristida adscensionis L. var. *argentina* Hack. = **Aristida laevis** (Nees) Kunth
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida adscensionis L. var. *breviseta* Hack. = **Aristida adscensionis** L.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida adscensionis L. var. *bromoides* (Kunth) Henrard = **Aristida adscensionis** L.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida adscensionis L. var. *coerulescens* auct. non (Desf.) Trin. & Rupr. = **Aristida adscensionis** L.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida adscensionis L. var. *condensata* (Hack.) Henrard = **Aristida adscensionis** L.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

[Aristida adscensionis L. var. gigantea (L. f.) Kuntze]
Sin.: *Aristida gigantea* L. f.
Notas: Nombre dudoso.

Aristida adscensionis L. var. *humilis* (Kunth) Kuntze = **Aristida adscensionis** L.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida adscensionis L. var. *laevis* Hack. = **Aristida multiramea** Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida adscensionis L. var. *modesta* Hack. = **Aristida adscensionis** L.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida adscensionis L. var. *normalis* Kuntze, nom. inval. = **Aristida adscensionis** L.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

[Aristida adscensionis L. var. pumila (Decne.) Coss. & Durieu]
Sin.: *Aristida pumila* Decne.
Notas: Nombre dudoso.

Aristida adscensionis L. var. *scabriflora* Hack. = **Aristida adscensionis** L.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida altissima Arechav. = **Aristida laevis** (Nees) Kunth
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Aristida americana L. = **Bouteloua americana** (L.) Scribn.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Aristida amplexifolia Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1975; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 3600 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruthsatz, B. 25* (BAA, BAF)].

Aristida antoniana Steud. ex Döll
Sin.: *Aristida enodis* Hack.
Referencias: Sulekic, A. A., 2003; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11626* (SI)].

Aristida arechavaletae Henrard = **Aristida teretifolia** Arechav.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Aristida aristiglumis Caro = **Aristida circinalis** Lindm.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1993, 1999.

Aristida asplundii Henrard var. **asplundii**
Referencias: Parodi, L. R., 1943a; Sulekic, A. A., 2003; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 2400–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2659* (SI)].

Aristida asplundii Henrard var. **pauciflora** Sulekic
Referencias: Sulekic, A. A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2400–3100 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 2597* (BAA, SI)].

Aristida brasiliensis Longhi-Wagner
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999, 2001a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 15926* (HBR)].

Aristida bromoides Kunth = **Aristida adscensionis** L.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida chaseana Herter = **Aristida teretifolia** Arechav.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Aristida circinalis Lindm.
Sin.: *Aristida acuminata* Hack., *Aristida aristiglumis* Caro, *Aristida leptochaeta* Hack., *Aristida misionum* Mez, *Aristida rosacea* Mez, *Aristida succedanea* Henrard
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1993, 1998, 1999; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MEN, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CEN, GUA, MIE, PAI, SPE); URY(ART, CAS, COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1565* (SI)]; BRA[*Barreto, I. L. 47* (SI), *Mattos, J. R. 6177* (HAS)]; PRY[*Schinini, A. 30170* (SI), *Vanni, R. O. 309* (CTES)]; URY[*Rosengurtt, B. 11290* (ICN, MVFA)].

Aristida coerulescens Desf. = **Aristida adscensionis** L.

Aristida complanata Trin. = **Aristida laevis** (Nees) Kunth
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999.

Aristida condylifolia Caro
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1998, 1999; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); BRA(RGS); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25248* (SI)]; BRA[*Mattos, J. R. 29930* (HAS)]; PRY[*Teague, G. 302* (BM)].

Aristida constricta Longhi-Wagner
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 1562* (ICN, MO)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Longhi-Wagner, 1998, 1999).

Aristida cordobensis Hack. = **Aristida mendocina** Phil.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida decipiens Henrard = **Aristida achalensis** Mez
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

[Aristida diffusa Trin. & Rupr.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Aristida dispersa Trin. & Rupr. = **Aristida adscensionis** L.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida dispersa Trin. & Rupr. var. *nana* Trin. & Rupr. = **Aristida adscensionis** L.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida echinulata Roseng. & Izag.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(ART, FLA, PAY, RNO, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 1650* (ICN]; URY[*Rosengurtt, B. 7931* (BLA, K, MVFA, SI, US)].

Aristida ekmaniana Henrard
Sin.: *Aristida trinii* Henrard
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999, 2001a; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9710* (K, US)].

Aristida endomelas Mez = **Aristida macrophylla** Hack.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1992, 1993, 1999.

Aristida enodis Hack. = **Aristida antoniana** Steud. ex Döll
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida festucoides Steud. & Hochst., nom. nud. = **Aristida adscensionis** L.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida filifolia (Arechav.) Herter
Sin.: *Aristida pallens* Cav. f. *rubelliana* Arechav., *Aristida pallens* Cav. var. *filifolia* Arechav., *Aristida pallens* Cav. var. *patula* Trin. & Rupr., *Aristida rubelliana* (Arechav.) Herter
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999, 2001a; Mujica Sallés, J., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 13561* (HBR)]; URY[*Arechavaleta, J. s.n.* (W), *Rosengurtt, B. 594b* (SI)].

Aristida flabellata Caro var. **flabellata**
Referencias: Caro, J. A., 1961c; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 14174* (CORD)].

Aristida flabellata Caro var. **glabriflora** Caro
Referencias: Caro, J. A., 1961c; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 141741/2* (CORD)].

Aristida flaccida Trin. & Rupr.
Sin.: *Aristida flaccida* Trin. & Rupr. var. *uniglumis* Döll
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999, 2001a; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 33765* (K, MBM), *Rosengurtt, B. 9033* (SI)].

Aristida flaccida Trin. & Rupr. var. *uniglumis* Döll = **Aristida flaccida** Trin. & Rupr.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999.

Aristida friesii Hack. ex Henrard
Referencias: Sulekic, A. A., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 2900–3400 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sulekic, A. A. 1927* (ICN, SI)].

Aristida gigantea L. f. = **Aristida adscensionis** L. var. **gigantea** (L. f.) Kuntze

Aristida hackelii Arechav.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(LAV, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: URY[*Arechavaleta, J. 1104* (MVM)].

Aristida hassleri Hack.
Sin.: *Aristida longiramea* J. Presl var. *boliviana* Henrard
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1992, 1993, 1998, 1999; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rosengurtt, B. 8980* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 14608* (CTES)].

Aristida hassleri Hack. var. *aculeolata* Hack. = **Aristida macrophylla** Hack.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1992, 1993, 1999.

Aristida humboldtiana Trin. & Rupr.
Referencias: Türpe, A. M., 1975a.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 5687* (LIL)].

Aristida humilis Kunth = **Aristida adscensionis** L.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida implexa Trin. = **Aristida megapotamica** Spreng. var. **megapotamica**
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999.

Aristida implexa Trin. var. *aequa* Trin. & Rupr. = **Aristida riparia** Trin.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999.

Aristida intermedia Arechav., hom. illeg. = **Aristida teretifolia** Arechav.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Aristida interrupta Cav. = **Aristida adscensionis** L.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida inversa Hack. = **Aristida mendocina** Phil.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida inversa Hack. f. *macrantha* Parodi = **Aristida mendocina** Phil.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida jubata (Arechav.) Herter
Sin.: *Aristida pallens* Cav. f. *jubata* Arechav., *Aristida pallens* Cav. var. *macrochaeta* Hack., *Aristida pallens* Cav. var. *major* Döll, nom. superfl., *Aristida pallens* Cav. var. *tragopogon* Trin. & Rupr.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1998, 1999, 2001a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, COA, MIE, PAI); URY(ART, LAV, MAL, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1735* (SI)]; BRA[*Barreto, I. L. 56* (SI), *Rambo, B. 1871* (HBR, PACA)]; PRY[*Sparre, B. B. 288* (SI)]; URY[*Arechavaleta, J. 1108* (MVM)].

Aristida kleinii L.B. Sm. = **Aristida macrophylla** Hack.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1992, 1993, 1999.

Aristida laevis (Nees) Kunth
Sin.: *Aristida adscensionis* L. var. *argentina* Hack., *Aristida altissima* Arechav., *Aristida complanata* Trin., *Aristida laevis* (Nees) Kunth var. *argentina* (Hack.) Henrard, *Aristida subinterrupta* Arechav., *Aristida subinterrupta* Arechav. var. *argentina* (Hack.) Henrard, *Chaetaria laevis* Nees
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999, 2001a; Renvoize, S. A., 1988; Sulekic, A. A., 2003; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CLA, COL, LAV, MAL, RIV, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 2706p.p.* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 8252* (HBR, R)]; URY[*Arechavaleta, J. s.n.* (MVM, W), *Rosengurtt, B. 6429b* (SI)].

Aristida laevis (Nees) Kunth var. *argentina* (Hack.) Henrard = **Aristida laevis** (Nees) Kunth
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida laxa Cav. var. **longiramea** (J. Presl) Henrard
Referencias: Sulekic, A. A., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 1300–1600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sulekic, A. A. 2461* (ICN)].

Aristida leptochaeta Hack. = **Aristida circinalis** Lindm.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1993, 1999.

Aristida longiramea J. Presl var. *boliviana* Henrard = **Aristida hassleri** Hack.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1992, 1999.

Aristida macrantha Hack.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1998; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 9795* (US, W)].

Aristida macrophylla Hack.
Sin.: *Aristida endomelas* Mez, *Aristida hassleri* Hack. var. *aculeolata* Hack., *Aristida kleinii* L.B. Sm., *Aristida subarticulata* Mez

Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999, 2002; Henrard, J. T., 1926–1933; Killeen, T. J., 1990; Longhi-Wagner, H. M., 1992, 1993, 1998, 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28467* (SI), *Parodi, L. R. 6884* (BAA)]; BRA[*Valls, J. F. M. 2434* (ICN)]; PRY[*Jörgensen, P. 3566* (CTES)].

Aristida megapotamica Spreng. = **Jarava megapotamica** (Spreng.) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Aristida megapotamica Spreng. var. **brevipes**
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1998, 1999, 2001a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24006* (K, MBM, UPCB)]; PRY[*Rosengurtt, B. 5602* (SI)].

Aristida megapotamica Spreng. var. **longipes** Henrard
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1998, 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7619* (S)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5189* (M, US)].
Notas: Citada para Argentina (Zuloaga et al., 2003).

Aristida megapotamica Spreng. var. **megapotamica**
Sin.: *Aristida implexa* Trin., *Aristida paraguayensis* Lindm.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1998, 1999, 2001a; Renvoize, S. A., 1988; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PAI); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 4928* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 11401* (HBR), *Smith, L. B. 15646* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 187* (S), *Rosengurtt, B. 5569b* (SI)]; URY[*Pedersen, T. M. 11650* (MO)].

Aristida mendocina Phil.
Sin.: *Aristida cordobensis* Hack., *Aristida inversa* Hack., *Aristida inversa* Hack. f. *macrantha* Parodi, *Aristida mendocina* Phil. var. *macrantha* (Parodi) Henrard
Referencias: Caro, J. A., 1961c; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Killeen, T. J., 1990; Longhi-Wagner, H. M., 1998; Nicora, E. G., 1978; Sulekic, A. A., 2003; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 222* (SI), *Fortunato, R. H. 1337* (BAB)]; PRY[*Fortunato, R. H. 3791* (BAB, FCQ, G), *Vanni, R. O. 2042* (CTES)].

Aristida mendocina Phil. var. *macrantha* (Parodi) Henrard = **Aristida mendocina** Phil.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida minutiflora Caro var. **glabriflora** Caro
Referencias: Caro, J. A., 1961c; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Caro, J. A. 2993* (CORD)].

Aristida minutiflora Caro var. **minutiflora**
Referencias: Caro, J. A., 1961c; Frecentece, M., 1981; Sulekic, A. A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, MEN, SDE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20111* (SI), *Ragonese, A. E. 6313* (BAB, SI)].

Aristida misionum Mez = **Aristida circinalis** Lindm.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1993, 1999.

Aristida multiramea Hack.
Sin.: *Aristida adscensionis* L. var. *laevis* Hack.
Referencias: Caro, J. A., 1961c; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, LPA, SFE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lossen, W. 259* (SI), *Stuckert, T. T. J. V. 16807* (CORD, US, W)].

Aristida murina Cav.
Sin.: *Aristida pallens* Cav. var. *murina* (Cav.) Trin. & Rupr.
Referencias: Caro, J. A., 1970; Longhi-Wagner, H. M., 1999; Mujica Sallés, J., 1996; Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI); BRA(RGS); URY(ART, CAS, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22896* (SI)]; BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 1999* (ICN)]; URY[*Mujica Sallés, J. 327* (MVFA), *Rosengurtt, B. 6995b* (SI)].

Aristida nana Steud., nom. nud. = **Aristida adscensionis** L.

Aristida neesiana Trin. & Rupr. = **Aristida recurvata** Kunth
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999, 2001a.

Aristida nicorae Sulekic
Referencias: Sulekic, A. A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sulekic, A. A. 3260* (SI, US, W)].

Aristida niederleinii Mez
Referencias: Caro, J. A., 1961c; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SFE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 23612* (SI), *Hieronymus, G. H. E. W. 167* (US)].

Aristida oligospira (Hack.) Henrard
Sin.: *Aristida riparia* Trin. var. *oligospira* Hack.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1998, 1999, 2001a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Muello s.n.* (BAA)]; PRY[*Hassler, E. 8321* (G, K, MO, NY, P, S, W)].

Aristida pallens Cav. f. *breviaristata* Hack. = **Aristida venustula** Arechav. var. **venustula**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida pallens Cav. f. *jubata* Arechav. = **Aristida jubata** (Arechav.) Herter
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999.

Aristida pallens Cav. f. *rubelliana* Arechav. = **Aristida filifolia** (Arechav.) Herter
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Aristida pallens Cav. var. *filifolia* Arechav. = **Aristida filifolia** (Arechav.) Herter
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999; Mujica Sallés, J., 1996.

Aristida pallens Cav. var. **geminata** Caro
Referencias: Caro, J. A., 1961c, 1970; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Caro, J. A. 2951* (CORD), *Spegazzini, C. L. s.n.* (SI)].

Aristida pallens Cav. var. *genuina* Trin. & Rupr., nom. inval. = **Aristida pallens** Cav. var. **pallens**
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999; Mujica Sallés, J., 1996.

Aristida pallens Cav. var. *intermedia* Trin. & Rupr. = **Aristida pallens** Cav. var. **pallens**
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999; Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida pallens Cav. var. *macrochaeta* Hack. = **Aristida jubata** (Arechav.) Herter
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida pallens Cav. var. *major* Döll, nom. superfl. = **Aristida jubata** (Arechav.) Herter
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999.

Aristida pallens Cav. var. *murina* (Cav.) Trin. & Rupr. = **Aristida murina** Cav.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999; Mujica Sallés, J., 1996.

Aristida pallens Cav. var. **pallens**
Sin.: *Aristida pallens* Cav. var. *genuina* Trin. & Rupr., nom. inval., *Aristida pallens* Cav. var. *intermedia* Trin. & Rupr., *Chaetaria pallens* (Cav.) P. Beauv.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, LPA, MEN, MIS, RNE, SFE, SLU); BRA(PAR, SCA); CHL(VII, VIII, IX); URY(ART, DUR, FLO, MAL, MON, RNO, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Piccinini, B. 1471* (BAB), *Rúgolo de Agrasar, Z. E. 1044* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 15602* (HBR, K, NY)]; CHL[*Pfister, A. 394* (CONC)]; URY[*Mujica Sallés, J. 364* (MVFA)].

Aristida pallens Cav. var. *patula* Trin. & Rupr. = **Aristida filifolia** (Arechav.) Herter
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Aristida pallens Cav. var. *tenuicula* Hack., p.p. = **Aristida spegazzinii** Arechav.

Aristida pallens Cav. var. *tenuicula* Hack., p.p. = **Aristida venustula** Arechav. var. **venustula**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida pallens Cav. var. *tenuifolia* Nees ex Trin. & Rupr. = **Aristida venustula** Arechav. var. **venustula**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida pallens Cav. var. *tragopogon* Trin. & Rupr. = **Aristida jubata** (Arechav.) Herter
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999.

Aristida pampeana Speg. = **Aristida spegazzinii** Arechav.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida paraguayensis Lindm. = **Aristida megapotamica** Spreng. var. **megapotamica**
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida parodii Henrard
Referencias: Henrard, J. T., 1926–1933; Sulekic, A. A., 2003; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras,

T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2321* (SI)].

Aristida pedroensis Henrard
Referencias: Henrard, J. T., 1926–1933; Sulekic, A. A., 2003; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 600 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 9784* (L, US)].

Aristida planifolia Swallen = **Aristida riparia** Trin.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999.

Aristida pubescens Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1975; Sulekic, A. A., 2003; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruthsatz, B. 250/2 pp* (BAA, BAF)].

Aristida pumila Decne. = **Aristida adscensionis** L. var. **pumila** (Decne.) Coss. & Durieu

Aristida recurvata Kunth
Sin.: *Aristida neesiana* Trin. & Rupr., *Aristida riedeliana* Trin. & Rupr., *Chaetaria recurvata* (Kunth) Roem. & Schult.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999, 2001a; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1400 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Swallen, J. R. 8341* (PEL, US)].

Aristida riedeliana Trin. & Rupr. = **Aristida recurvata** Kunth
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999.

Aristida riograndensis Severo & Boldrini
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Valls, J. F. M. 4241* (ICN)].

Aristida riparia Trin.
Sin.: *Aristida implexa* Trin. var. *aequa* Trin. & Rupr., *Aristida planifolia* Swallen
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999, 2001a; Parodi, L. R., 1922a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COR, ERI, SDE); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Solomon, J. C. 7734* (SI)]; BRA[*Dombrowski, L. T. 12870* (MBM), *Dusén, P. K. H. 11682* (SI)].
Notas: Citada para Paraguay (Pohl & Davidse, 1994), su presencia es dudosa según Longhi-Wagner (1999).

Aristida riparia Trin. var. *oligospira* Hack. = **Aristida oligospira** (Hack.) Henrard
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999.

Aristida rosacea Mez = **Aristida circinalis** Lindm.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1993, 1999.

Aristida rubelliana (Arechav.) Herter = **Aristida filifolia** (Arechav.) Herter
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Aristida sayapensis Caro
Referencias: Caro, J. A., 1961c; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA)].

Aristida spegazzinii Arechav.
Sin.: *Aristida pallens* Cav. var. *tenuicula* Hack., p.p., *Aristida pampeana* Speg., *Aristida spegazzinii* Arechav. f. *colorata* Hack., nom. nud., *Aristida spegazzinii* Arechav. var. *abbreviata* Hack., *Aristida spegazzinii* Arechav. var. *genuina* Hack., nom. inval., *Aristida spegazzinii* Arechav. var. *pallescens* Hack.
Referencias: Caro, J. A., 1961c, 1970; Longhi-Wagner, H. M., 1993, 1999; Sulekic, A. A., 2003; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VIII, IX); URY(ART, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11855* (SI), *Montes, J. E. 2336* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 4251* (ICN)]; CHL[*Montero, G. 3475* (CONC)]; URY[*Rosengurtt, B. 5324b* (SI), *Solís Neffa, V. 425* (CTES)].

Aristida spegazzinii Arechav. f. *colorata* Hack., nom. nud. = **Aristida spegazzinii** Arechav.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida spegazzinii Arechav. var. *abbreviata* Hack. = **Aristida spegazzinii** Arechav.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999.

Aristida spegazzinii Arechav. var. *genuina* Hack., nom. inval. = **Aristida spegazzinii** Arechav.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida spegazzinii Arechav. var. *pallescens* Hack. = **Aristida spegazzinii** Arechav.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999.

[Aristida spiciformis Elliot]
Sin.: *Aristida stricta* Michx.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Aristida stricta Michx. = **Aristida spiciformis** Elliot
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida subarticulata Mez = **Aristida macrophylla** Hack.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1992, 1993, 1999.

Aristida subinterrupta Arechav. = **Aristida laevis** (Nees) Kunth
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida subinterrupta Arechav. var. *argentina* (Hack.) Henrard = **Aristida laevis** (Nees) Kunth
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Aristida subulata Henrard
Referencias: Caro, J. A., 1961c; Sulekic, A. A., 2003; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, MEN, RNE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15837* (SI), *Hunziker, A. T. 20286* (CORD)].

Aristida succedanea Henrard = **Aristida circinalis** Lindm.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999.

Aristida teretifolia Arechav.
Sin.: *Aristida arechavaletae* Henrard, *Aristida chaseana* Herter, *Aristida intermedia* Arechav., hom. illeg.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(ART, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 1622* (ICN)]; URY[*Arechavaleta, J. 1094* (MVFA, MVM, W)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Longhi-Wagner, 1998, 1999).

Aristida trachyantha Henrard
Referencias: Caro, J. A., 1961c; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 8140* (L, US)].

Aristida trinii Henrard = **Aristida ekmaniana** Henrard
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999.

Aristida tucumana Henrard = **Aristida achalensis** Mez
Referencias: Sulekic, A. A., 2003.

Aristida uruguayensis Henrard var. **laevis** Caro
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(COR, ERI, SDE); BRA(RGS); URY(RNO, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22894* (SI)]; BRA[*H.S.A. 70a* (ICN)]; URY[*Rosengurtt, B. 43801/2* (MVFA)].

Aristida uruguayensis Henrard var. **uruguayensis**
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SDE); BRA(RGS); URY(ART, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20672* (SI)]; BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 2167* (ICN)]; URY[*Berro, M. B. 7450* (MVFA)].

Aristida valida Henrard
Referencias: Henrard, J. T., 1926–1933; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1768* (SI)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Longhi-Wagner, 1998).

Aristida venustula Arechav. var. **scabrifolia** Hack.
Referencias: Henrard, J. T., 1926–1933; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Stuckert, T. T. J. V. 19195* (CORD)].

Aristida venustula Arechav. var. **venustula**
Sin.: *Aristida pallens* Cav. f. *breviaristata* Hack., *Aristida pallens* Cav. f. *breviaristata* Hack., *Aristida pallens* Cav. var. *tenuicula* Hack., p.p., *Aristida pallens* Cav. var. *tenuifolia* Nees ex Trin. & Rupr., *Chaetaria pallens* (Cav.) P. Beauv. var. *tenuifolia* Nees
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1998, 1999; Mujica Sallés, J., 1996; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Sulekic, A. A., 2003; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SFE, TUC); BRA(RGS); PRY(CAU, GUA, ITA, PAI); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14072* (SI)]; BRA[*Boldrini, I. J. 238* (ICN)]; PRY[*Krapovickas, A. 12380* (SI)]; URY[*Arechavaleta, J. s.n.* (MVM, W), *Rosengurtt, B. 4379b* (SI)].

Aristida venustula Arechav. var. **venustuloides** (Caro) Longhi-Wagner
Sin.: *Aristida venustuloides* Caro
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22900* (SI, US)]; BRA[*Valls, J. F. M. s.n.* (BLA)].

Aristida venustuloides Caro = **Aristida venustula** Arechav. var. **venustuloides** (Caro) Longhi-Wagner
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999.

[Aristida vestita Thunb.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Aristida vexativa Henrard
Referencias: Henrard, J. T., 1926–1933.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, D. 3288* (BAA)].

Aristida victoriana Sulekic
Referencias: Sulekic, A. A., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2900–3500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sulekic, A. A. 1929* (ICN, SI)].

Arrhenatherum P. Beauv.

Número de especies: 1 introducida

Arrhenatherum avenaceum (Scop.) P. Beauv. = **Arrhenatherum elatius** (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl var. **elatius**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Arrhenatherum bulbosum (Willd.) Link, comb. superfl. = **Arrhenatherum elatius** (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl var. **bulbosum** (Willd.) Spenn.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl var. **bulbosum** (Willd.) Spenn.
Sin.: *Arrhenatherum bulbosum* (Willd.) Link, comb. superfl., *Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl subsp. *bulbosus* (Willd.) Schübl. & G. Martens, *Avena bulbosa* Willd.
Referencias: Nicora, E. G., 1973a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–600 m.
Países: ARG(NEU, TDF); CHL(V, VIII, IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 955* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 24898* (CONC)].

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl var. **elatius**
Sin.: *Arrhenatherum avenaceum* (Scop.) P. Beauv., *Avena elatior* L.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SFE, TDF); BRA(RGS); CHL(VIII, IX, X, RME); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2149* (BAA, BAB)]; BRA[*H.S.A. 55* (ICN)]; CHL[*Gunckel, L. H. 12940* (CONC)]; URY[*Marchesi, E. 21332* (MVFA)].

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl subsp. *bulbosus* (Willd.) Schübl. & G. Martens = **Arrhenatherum elatius** (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl var. **bulbosum** (Willd.) Spenn.

Arrozia micrantha Schrad. ex Nees, nom. nud. = **Luziola brasiliensis** (Trin.) Swallen
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Arthropogon Nees

Número de especies: 2

Arthropogon villosus Nees
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. s.n.* (K)].

Arthropogon xerachne Ekman
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 13231* (K)].

Arthrostylidium effusum (Hack.) McClure = **Aulonemia effusa** (Hack.) McClure
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Arthrostylidium leptophyllum (Nees) Döll = **Chusquea leptophylla** Nees
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Arthrostylidium racemiflorum Steud. = **Rhipidocladum racemiflorum** (Steud.) McClure
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Arthrostylidium trinii auct. non Rupr. = **Chusquea leptophylla** Nees
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Arundarbor distorta (Nees) Kuntze = **Guadua tagoara** (Nees) Kunth
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Arundarbor trinii (Nees) Kuntze = **Guadua trinii** (Nees) Nees ex Rupr.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Arundinaria aristulata Döll = **Aulonemia aristulata** (Döll) McClure
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Arundinaria effusa Hack. = **Aulonemia effusa** (Hack.) McClure
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Arundinaria paraguayensis Kuntze = **Gouinia paraguayensis** (Kuntze) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Arundinaria pinifolia Nees = **Chusquea pinifolia** (Nees) Nees
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Arundinaria radiata Rupr. = **Aulonemia radiata** (Rupr.) McClure & L.B. Sm.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Arundinaria rhizantha Hack. = **Colanthelia rhizantha** (Hack.) McClure
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Clark, L. G., 2000.

Arundinaria ulei Hack. = **Aulonemia ulei** (Hack.) McClure & L.B. Sm.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Arundinella Raddi

Número de especies: 2

Arundinella berteroniana (Schult.) Hitchc. & Chase
Sin.: *Trichachne berteroniana* Schult.
Referencias: Parodi, L. R., 1928a; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: ARG(FOR, SAL); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pensiero, J. F. 4503* (SI), *Zuloaga, F. O. 7739* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 25811* (MBM)].

Arundinella brasiliensis Raddi = **Arundinella hispida** (Willd.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Arundinella flammida Trin. = **Loudetia flammida** (Trin.) C.E. Hubb.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Arundinella hispida (Willd.) Kuntze
Sin.: *Andropogon hispidus* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Arundinella brasiliensis* Raddi
Referencias: Burkart, A., 1969a; Renvoize, S. A., 1988; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI); URY(ART, PAY, RNO, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5338* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 16174* (MBM, SI)]; PRY[*Rosengurtt, B. 5464b* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 2248* (MO)].

Arundo L.

Número de especies: 1 introducida

Arundo alopecuros Gaudich. ex Mirb. = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **alopecurus**
Referencias: Moore, D. M., 1983; Nicora, E. G., 1978.

Arundo antarctica d'Urv. = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **alopecurus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Arundo arenaria L. = **Ammophila arenaria** (L.) Link
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Arundo arguta Larrañaga]
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Arundo australis Cav. = **Phragmites australis** (Cav.) Trin. ex Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

[Arundo biflora Larrañaga, hom. illeg.]
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

[Arundo diclina Larrañaga]
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Arundo dioica Spreng., hom. illeg. = **Cortaderia selloana** (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.

Arundo donax L.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Cabrera, A. L., 1970a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SFE); BRA(RGS); CHL(I, II, III, IV, IX, IDE, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5606* (SI)]; BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 9747* (ICN)]; CHL[*Matthei, O. R. 511.* (CONC)].
Notas: Cultivada en Uruguay.

Arundo epigejos L. = **Calamagrostis epigejos** (L.) Roth

Arundo festucacea Willd. = **Gynerium sagittatum** (Aubl.) P. Beauv.

[Arundo flora Larrañaga]
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

[Arundo gayana E. Desv.]
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

[Arundo gigas Larrañaga]
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Arundo occidentalis Sieber ex Schult. = **Phragmites australis** (Cav.) Trin. ex Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Arundo phragmites L. = **Phragmites australis** (Cav.) Trin. ex Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Arundo pilosa d'Urv. = **Cortaderia pilosa** (d'Urv.) Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Arundo praecox (L.) Nash = **Aira praecox** L.

Arundo quila Molina = **Chusquea quila** Kunth
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Arundo sagittata (Aubl.) Pers. = **Gynerium sagittatum** (Aubl.) P. Beauv.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Arundo selloana Schult. & Schult. f. = **Cortaderia selloana** (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

[Arundo tacuara Larrañaga]
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

[Arundo triflora Larrañaga]
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Arundo viridiflavescens Poir. = **Deyeuxia viridiflavescens** (Poir.) Kunth var. **viridiflavescens**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Asprella hexandra (Sw.) P. Beauv. = **Leersia hexandra** Sw.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Asprella mexicana (Kunth) Roem. & Schult. = **Leersia hexandra** Sw.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Asprella virginica (Willd.) P. Beauv. = **Leersia virginica** Willd.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Aspris caryophyllea (L.) Nash = **Aira caryophyllea** L.

Atheropogon acuminatus E. Fourn. = **Bouteloua curtipendula** (Michx.) Torr. var. **caespitosa** Gould & Kapadia
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Atheropogon medius E. Fourn. = **Bouteloua media** (E. Fourn.) Gould & Kapadia
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Atropis argentinensis Hack. = **Puccinellia argentinensis** (Hack.) Parodi
Referencias: Nicora, E. G., 1999a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Atropis argentinensis Hack. f. *mendozina* Hack. = **Puccinellia mendozina** (Hack.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Atropis battandieri Speg. = **Puccinellia festuciformis** (Host) Parl. subsp. **tenuifolia** (Boiss. & Reut.) W.E. Hughes
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Atropis biflora (Steud.) St.-Yves & A. Camus = **Puccinellia biflora** (Steud.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Atropis carinata Griseb. = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **uninervia** (J. Presl) N. Snow
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Atropis convoluta Griseb. var. *mendozina* Hack. = **Puccinellia mendozina** (Hack.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Atropis laxa Pilg. = **Puccinellia magellanica** (Hook. f.) Parodi
Referencias: Nicora, E. G., 1999a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Atropis magellanica (Hook. f.) Desv. = **Puccinellia magellanica** (Hook. f.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Atropis millegrana Griseb. = **Eragrostis airoides** Nees
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Atropis osteniana Pilg. = **Puccinellia glaucescens** (Phil.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Atropis parviflora Hack. ex Dusén = **Puccinellia pusilla** (Hack.) Parodi
Referencias: Nicora, E. G., 1999a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Atropis preslii Hack. = **Puccinellia preslii** (Hack.) Ponert
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Atropis preslii Hack. subsp. *breviculmis* Hack. = **Puccinellia pusilla** (Hack.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Atropis preslii Hack. subsp. *pusilla* Hack. = **Puccinellia pusilla** (Hack.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Atropis skottsbergii Pilg. = **Puccinellia skottsbergii** (Pilg.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Atropis tenuifolia (J. Presl) Hauman, hom. illeg. = **Puccinellia preslii** (Hack.) Ponert

Referencias: Parodi, L. R., 1937a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Atropis tenuifolia (J. Presl) Speg., hom. illeg.
= **Puccinellia preslii** (Hack.) Ponert
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Aulonemia Goudot

Número de especies: 5, 2 endémicas

Aulonemia aristulata (Döll) McClure
Sin.: *Arundinaria aristulata* Döll, *Sieglingia aristulata* (Döll) Kuntze
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 7354* (HBR, US)].

Aulonemia cingulata McClure & L.B. Sm. = **Colanthelia cingulata** (McClure & L.B. Sm.) McClure
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Aulonemia effusa (Hack.) McClure
Sin.: *Arthrostylidium effusum* (Hack.) McClure, *Arundinaria effusa* Hack.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 1300 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 27145* (MBM, US)].

Aulonemia fimbriatifolia L.G. Clark
Referencias: Clark, L. G., 2004.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Clark, L. G. 936* (MBM)].

Aulonemia intermedia McClure & L.B. Sm.
= **Colanthelia intermedia** (McClure & L.B. Sm.) McClure
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Aulonemia lanciflora McClure & L.B. Sm. = **Colanthelia lanciflora** (McClure & L.B. Sm.) McClure
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Aulonemia radiata (Rupr.) McClure & L.B. Sm.
Sin.: *Arundinaria radiata* Rupr.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 900–1800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 9739* (HBR, US)].

Aulonemia ulei (Hack.) McClure & L.B. Sm.
Sin.: *Arundinaria ulei* Hack.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 1200–2000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 8120* (HBR, US)].

Austrostipa S.W.L. Jacobs & J. Everett

Número de especies: 1 introducida

Austrostipa plumigera (Hughes) S.W.L. Jacobs & J. Everett
Sin.: *Stipa gracilis* (Speg.) Speg., *Stipa plumigera* Hughes, *Stipa plumosa* Trin. var. *gracilis* Speg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)].

Avena L.

Número de especies: 6, 4 introducidas

Avena algeriensis Trab. = **Avena sterilis** L. subsp. **sterilis**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena ariguensis Steud. = **Danthonia chilensis** E. Desv. var. **chilensis**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Avena barbata Pott ex Link
Sin.: *Avena hirsuta* (Roth) Mathieu, hom. illeg., *Avena hirsuta* Moench, *Avena strigosa* Schreb. subsp. *barbata* (Pott ex Link) Thell.

Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–2300 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, TUC); BRA(RGS); CHL(II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); URY(CAS, FLA, FLO, LAV, MON, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4660* (SI), *Piccinini, B. 1310* (BAB)]; BRA[*Gonçalves, J. O. N. s.n.* (BLA)]; CHL[*Burkart, A. 9317* (SI), *Gunckel, L. H. 24382* (CONC)]; URY[*Burkart, A. 19980* (SI)].

Avena bulbosa Willd. = **Arrhenatherum elatius** (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl var. **bulbosum** (Willd.) Spenn.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena byzantina C. Koch var. **biaristata** (Hack. ex Trab.) Thell.
Sin.: *Avena sativa* L. var. *biaristata* Hack. ex Trab.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Nicora, E. G., 1978.
Hierba. Anual. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, NEU, RNE, SLU, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4553* (SI)].

Avena byzantina C. Koch var. **byzantina**
Sin.: *Avena sterilis* L. subsp. *byzantina* (C. Koch) Thell.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LRI, MEN, NEU, RNE, TDF); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giardelli, M. L. 21* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 902a* (SI)].

Avena byzantina C. Koch var. **hipomelanathera** (Thell.) Parodi
Sin.: *Avena sterilis* L. f. *hipomelanathera* Thell.
Referencias: Fabris, H. A., 1970a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 6740* (BAA)].

Avena cernua (Trin.) Kunth = **Trisetum cernuum** Trin.

Avena elatior L. = **Arrhenatherum elatius** (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl var. **elatius**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena fatua L.
Sin.: *Avena fatua* L. var. *glabrata* Peterm., *Avena fatua* L. var. *intermedia* (T. Lestib.) Lej. & Courtois, *Avena fatua* L. var. *pilosissima* Gray, *Avena fatua* L. var. *vilis* (Wallr.) Hausskn., *Avena intermedia* T. Lestib., *Avena ludoviciana* Durieu var. *glabrescens* Durieu ex Gren. & Godr., *Avena vilis* Wallr.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, TDF, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, IDE, RME); URY(COL, MAL, MON, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Muñoz, J. D. 5111* (SI)]; BRA[*Carvalheiro, A. C. 852* (BLA)]; CHL[*Gunckel, L. H. 37514* (CONC)]; URY[*Burkart, A. 18165* (SI)].

Avena fatua L. f. *glaberrima* Thell. = **Avena sativa** L. var. **sativa**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena fatua L. f. *macrathera* Thell. = **Avena sativa** L. var. **macrathera** (Thell.) Parodi

Avena fatua L. f. *setulosa* Thell. = **Avena sativa** L. var. **setulosa** (Thell.) Parodi

Avena fatua L. var. *glabrata* Peterm. = **Avena fatua** L.

Avena fatua L. var. *intermedia* (T. Lestib.) Lej. & Courtois = **Avena fatua** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena fatua L. var. *pilosissima* Gray = **Avena fatua** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena fatua L. var. *subuniflora* Trab. = **Avena sativa** L. var. **subuniflora** (Trab.) Thell.

Avena fatua L. var. *transiens* Hausskn. = **Avena sativa** L. var. **pilosa** (Koeler) Tab.Morais

Avena fatua L. var. *vilis* (Wallr.) Hausskn. = **Avena fatua** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena fatua L. subsp. *sativa* (L.) Thell. = **Avena sativa** L. var. **sativa**

Avena flavescens L. = **Trisetum flavescens** (L.) P. Beauv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena fragilis L. = **Gaudinia fragilis** (L.) P. Beauv.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson,

P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena hirsuta (Roth) Mathieu, hom. illeg. = **Avena barbata** Pott ex Link
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena hirsuta Moench = **Avena barbata** Pott ex Link
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena intermedia T. Lestib. = **Avena fatua** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena lanata (L.) Koeler = **Holcus lanatus** L.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Avena leptostachya Hook. f. = **Trisetum cernuum** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena ludoviciana Durieu = **Avena sterilis** L. subsp. **ludoviciana** (Durieu) Nyman
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena ludoviciana Durieu var. *glabrescens* Durieu ex Gren. & Godr. = **Avena fatua** L.

Avena ludoviciana Durieu var. *psilathera* Thell. = **Avena sterilis** L. subsp. **sterilis**

Avena macrocarpa Moench = **Avena sterilis** L. subsp. **sterilis**
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena montevidensis Hack. = **Amphibromus quadridentulus** (Döll) Swallen
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Avena paupercula Phil. = **Bromus berteroanus** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena phleoides d'Urv. = **Trisetum phleoides** (d'Urv.) Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena pilosa J. Presl, hom. illeg. = **Trisetum preslei** (Kunth) E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena preslei Kunth = **Trisetum preslei** (Kunth) E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena quadridentula Döll = **Amphibromus quadridentulus** (Döll) Swallen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena redolens (Vahl) Pers. = **Anthoxanthum redolens** (Vahl) P. Royen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena sativa L. var. *biaristata* Hack. ex Trab. = **Avena byzantina** C. Koch var. **biaristata** (Hack. ex Trab.) Thell.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena sativa L. var. *glaberrima* (Thell.) Parodi = **Avena sativa** L. var. **sativa**

Avena sativa L. var. **macrathera** (Thell.) Parodi
Sin.: *Avena fatua* L. f. *macrathera* Thell.
Referencias: Nicora, E. G., 1978.
Hierba. Anual. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6575* (BAA)].

Avena sativa L. var. **montana** Alef.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, SDE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Millán, A. R. s.n.* (SI), *Parodi, L. R. 3498* (BAA)].

Avena sativa L. var. **pilosa** (Koeler) Tab.Morais
Sin.: *Avena fatua* L. var. *transiens* Hausskn., *Avena sativa L.* subvar. *Pilosa* Koeler
Referencias: Fabris, H. A., 1970a; Nicora, E. G., 1978.
Hierba. Anual. Introducida. 0–700 m.
Países: ARG(BAI, DFE, LPA, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, D. 11410* (BAA)].

Avena sativa L. var. **sativa**
Sin.: *Avena fatua* L. f. *glaberrima* Thell., *Avena fatua* L. subsp. *sativa* (L.) Thell., *Avena sativa* L. var. *glaberrima* (Thell.) Parodi
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Burkart, A., 1969a; Nicora, E. G., 1978; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Renvoize,

S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1700 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, NEU, RNE, SCR, SFE, TDF); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VII, VIII, IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Millán, A. R. 799* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 13276* (HBR, R, US)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996009* (CONC)].
Notas: Cultivada en Uruguay.

Avena sativa L. var. **setulosa** (Thell.) Parodi
Sin.: *Avena fatua* L. f. *setulosa* Thell.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Anual. Introducida. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Martínez Crovetto, R. 3189* (BAA)].

Avena sativa L. var. **subuniflora** (Trab.) Thell.
Sin.: *Avena fatua* L. var. *subuniflora* Trab.
Referencias: Fabris, H. A., 1970a; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 10403* (BAA)].

Avena scabrivalvis Trin. = **Amphibromus scabrivalvis** (Trin.) Swallen var. **scabrivalvis**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena secalina (L.) Salisb. = **Bromus secalinus** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena sterilis L. f. *hipomelanathera* Thell. = **Avena byzantina** C. Koch var. **hipomelanathera** (Thell.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena sterilis L. var. *ludoviciana* (Durieu) Husn. = **Avena sterilis** L. subsp. **ludoviciana** (Durieu) Nyman

Avena sterilis L. subsp. *byzantina* (C. Koch) Thell. = **Avena byzantina** C. Koch var. **byzantina**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena sterilis L. subsp. **ludoviciana** (Durieu) Nyman
Sin.: *Avena ludoviciana* Durieu, *Avena sterilis* L. var. *ludoviciana* (Durieu) Husn.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, SFE, SLU); URY(MAL, MON, PAY, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. s.n.* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 5248* (SI)].

Avena sterilis L. subsp. *macrocarpa* (Moench) Briq. = **Avena sterilis** L. subsp. **sterilis**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena sterilis L. subsp. **sterilis**
Sin.: *Avena algeriensis* Trab., *Avena ludoviciana* Durieu var. *psilathera* Thell., *Avena macrocarpa* Moench, *Avena sterilis* L. subsp. *macrocarpa* (Moench) Briq.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE); BRA(RGS); CHL(RME); URY(CAS, COL, FLA, MON, PAY, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25890* (SI)]; BRA[*Freitas, J. M. s.n.* (BLA)]; CHL[*Gunckel, L. H. 36546* (CONC)]; URY[*Cabrera, A. L. 3229* (SI)].

Avena strigosa Schreb.
Sin.: *Avena strigosa* Schreb. subsp. *glabrescens* Marquand, *Avena strigosa* Schreb. var. *glabrescens* (Marquand) Thell.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–800 m.
Países: ARG(ERI, LPA, NEU, RNE); BRA(RGS); CHL(VIII, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 12753* (SI), *Burkart, A. 6573* (BAA)]; BRA[*Dillenburg, C. R. 300* (BLA)]; CHL[*Barros, E. 1810* (CONC)].
Notas: Cultivada en Uruguay.

Avena strigosa Schreb. var. *glabrescens* (Marquand) Thell. = **Avena strigosa** Schreb.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena strigosa Schreb. subsp. *barbata* (Pott ex Link) Thell. = **Avena barbata** Pott ex Link
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena strigosa Schreb. subsp. *glabrescens* Marquand = **Avena strigosa** Schreb.

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Avena vilis Wallr. = **Avena fatua** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Axonopus P. Beauv.

Número de especies: 20, 2 endémicas, 1 introducida

Axonopus affinis Chase = **Axonopus fissifolius** (Raddi) Kuhlm.
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Axonopus anomalus Swallen = **Axonopus purpusii** (Mez) Chase
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Axonopus argentinus Parodi
Sin.: *Axonopus argentinus* Parodi f. *hirsutus* Parodi, *Axonopus argentinus* Parodi subsp. *glabripes* (Parodi) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Axonopus argentinus* Parodi subsp. *pubiflorus* (Parodi) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Axonopus argentinus* Parodi var. *glabriflorus* Parodi, *Axonopus argentinus* Parodi var. *glabripes* Parodi, *Axonopus hagenbeckianus* (Kuntze) Parodi var. *pratensis* G.A. Black, *Axonopus paraguayensis* G.A. Black, *Axonopus ramboi* G.A. Black; *Axonopus suffultus* (J.C. Mikan ex Trin.) Parodi var. *pubiflorus* Parodi
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA); URY(ART, CLA, DUR, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22922* (SI)]; BRA[*Swallen, J. R. 9169* (US)]; PRY[*Rojas, T. 5254* (BAA)]; URY[*Izaguirre, P. s.n.* (MVFA)].

Axonopus argentinus Parodi f. *hirsutus* Parodi = **Axonopus argentinus** Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Axonopus argentinus Parodi var. *glabriflorus* Parodi = **Axonopus argentinus** Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Axonopus argentinus Parodi var. *glabripes* Parodi = **Axonopus argentinus** Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Axonopus argentinus Parodi subsp. *glabripes* (Parodi) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Axonopus argentinus** Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Axonopus argentinus Parodi subsp. *pubiflorus* (Parodi) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Axonopus argentinus** Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Axonopus barbatus (Nees) Kuhlm., nom. inval. = **Axonopus siccus** (Nees) Kuhlm.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Axonopus barbatus Chase ex Parodi, hom. illeg. = **Axonopus siccus** (Nees) Kuhlm.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Axonopus barbigerus (Kunth) Hitchc. = **Axonopus siccus** (Nees) Kuhlm.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Axonopus barbigerus (Kunth) Hitchc. var. *venturii* G.A. Black = **Axonopus siccus** (Nees) Kuhlm.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Axonopus bijugus (Steud.) A. Camus = **Axonopus brasiliensis** (Spreng.) Kuhlm.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Axonopus brasiliensis (Spreng.) Kuhlm.
Sin.: *Axonopus bijugus* (Steud.) A. Camus, *Axonopus dissitiflorus* (Trin.) Chase, *Eriochloa brasiliensis* Spreng., *Lappagopsis bijuga* Steud., *Paspalum brasiliense* (Spreng.) Hack., *Paspalum dissitiflorum* Trin.
Referencias: Giraldo-Cañas, D., 2002; Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 45704* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4694* (G)].

Axonopus chaseanus Herter, nom. illeg. = **Axonopus obtusifolius** (Raddi) Chase

Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Axonopus chloridiformis Herter = **Axonopus suffultus** (J.C. Mikan ex Trin.) Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Axonopus chrysoblepharis (Lag.) Chase
Sin.: *Cabrera chrysoblepharis* Lag.
Referencias: Giraldo-Cañas, D., 2001; Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16838* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5048* (BAA, G)].

Axonopus comans (Trin. ex Döll) Kuhlm.
Sin.: *Paspalum comans* Trin. ex Döll
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, GUA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 40445* (MBM)]; PRY[*Balansa, B. 104* (BAA, G)].

Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv.
Sin.: *Agrostis compressa* (Sw.) Poir., hom. illeg., *Anastrophus compressus* Schltr. ex Döll, nom. inval., *Anastrophus platycaulis* (Poir.) Nash ex Small, *Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv. var. *affinis* (Chase) Henderson, *Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv. var. *australis* G.A. Black, *Digitaria platicaulis* (Poir.) Desv., *Milium compressum* Sw., *Paspalum compressum* (Sw.) Nees, comb. superfl., *Paspalum compressum* (Sw.) Raspail, *Paspalum depressum* Steud., *Paspalum filostachyum* A. Rich. ex Steud., *Paspalum furcatum* Flüggé var. *parviflorum* Döll, *Paspalum tristachyon* Lam., *Paspalum uniflorum* Salzm. ex Steud.
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI); URY(CAS, CLA, LAV, MAL, PAY, RIV, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1411* (SI)]; BRA[*Del Mazo, V. C. 12383* (SI), *Hatschbach, G. 28177* (MBM)]; PRY[*Rojas, T. 14345* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 6491* (BAA, MVFA)].

Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. var. *affinis* (Chase) Henderson = **Axonopus compressus** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. var. *australis* G.A. Black = **Axonopus compressus** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994.

Axonopus derbyanus G.A. Black = **Axonopus pressus** (Steud.) Parodi
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994.

Axonopus dissitiflorus (Trin.) Chase = **Axonopus brasiliensis** (Spreng.) Kuhlm.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Axonopus equitans Hitchc. & Chase
Sin.: *Axonopus oteroi* G.A. Black
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ramos de Otero, J. 273* (US)].

Axonopus fissifolius (Raddi) Kuhlm.
Sin.: *Axonopus affinis* Chase, *Axonopus stragulus* Chase, *Paspalum compressum* (Sw.) Raspail var. *arenarium* Bertoni, *Paspalum fissifolium* Raddi
Referencias: Anton, A. M., 1982; Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, ITA, PAI, PHA, SPE); URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3687* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 28415* (MBM)]; PRY[*Morrone, O. 461* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 830* (MVFA)].

Axonopus fissifolius (Raddi) Kuhlm. var. *polystachyus* (G.A. Black) L.B. Sm. & Wassh. = **Axonopus polystachyus** G.A. Black
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Axonopus flexilis (Mez) Henrard = **Axonopus purpusii** (Mez) Chase
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

[Axonopus furcatus (Flüggé) Hitchc.]
Sin.: *Paspalum furcatum* Flüggé
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Axonopus hagenbeckianus (Kuntze) Parodi = **Axonopus suffultus** (J.C. Mikan ex Trin.) Parodi
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Axonopus hagenbeckianus (Kuntze) Parodi var. *iridaceus* (Mez) G.A. Black = **Axonopus suffultus** (J.C. Mikan ex Trin.) Parodi
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994.

Axonopus hagenbeckianus (Kuntze) Parodi var. *pratensis* G.A. Black = **Axonopus argentinus** Parodi
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994.

Axonopus iridaceus (Mez) Herter, comb. superfl. = **Axonopus suffultus** (J.C. Mikan ex Trin.) Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Axonopus iridaceus (Mez) Hitchc. & Chase = **Axonopus suffultus** (J.C. Mikan ex Trin.) Parodi
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Axonopus kleinii L.B. Sm. & Wassh. = **Axonopus marginatus** (Trin.) Chase
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Axonopus leptostachyus (Flüggé) Hitchc.
Sin.: *Axonopus paranaënsis* Parodi, *Axonopus paranaënsis* Parodi ex G.A. Black, hom. illeg., *Paspalum leptostachyum* Flüggé
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994; Parodi, L. R., 1961; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS); PRY(ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 24253* (SI)]; PRY[*Jiménez 14675* (BAA)].

Axonopus longecilius (Hack.) Parodi = **Axonopus marginatus** (Trin.) Chase
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994, 1995.

Axonopus malmei G.A. Black = **Axonopus siccus** (Nees) Kuhlm.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Axonopus marginatus (Trin.) Chase
Sin.: *Axonopus kleinii* L.B. Sm. & Wassh., *Axonopus longecilius* (Hack.) Parodi, *Paspalum marginatum* Trin., *Paspalum marginatum* Trin. var. *longecilium* Hack.
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994, 1995; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1604* (SI), *Quarín, C. L. 3495* (CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 32928* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 9746* (G)].

Axonopus obtusifolius (Raddi) Chase
Sin.: *Axonopus chaseanus* Herter, nom. illeg., *Paspalum furcatum* Flüggé var. *grandiflorum* Döll, *Paspalum obtusifolium* Raddi
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1995; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 722* (SI), *Quarín, C. L. 569* (CTES)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 14404* (SI), *Hatschbach, G. 28600* (MBM)].

Axonopus oteroi G.A. Black = **Axonopus equitans** Hitchc. & Chase
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Axonopus paraguayensis G.A. Black = **Axonopus argentinus** Parodi
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994.

Axonopus paranaënsis Parodi = **Axonopus leptostachyus** (Flüggé) Hitchc.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Axonopus paranaënsis Parodi ex G.A. Black, hom. illeg. = **Axonopus leptostachyus** (Flüggé) Hitchc.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Axonopus pellitus (Nees ex Trin.) Hitchc. & A. Chase
Sin.: *Paspalum pellitum* Nees ex Trin.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 44911* (MBM)].

Axonopus plumosus (Henrard) Henrard = **Axonopus uninodis** (Hack.) G.A. Black
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Axonopus poiretii Roem. & Schult. = **Sporobolus indicus** (L.) R. Br.

Axonopus polystachyus G.A. Black
Sin.: *Axonopus fissifolius* (Raddi) Kuhlm. var. *polystachyus* (G.A. Black) L.B. Sm. & Wassh.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 29315* (MBM)].

Axonopus pressus (Steud.) Parodi
Sin.: *Axonopus derbyanus* G.A. Black, *Paspalum pressum* Nees ex Steud.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999, 2002; Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 29208* (MBM)]; PRY[*Morrone, O. 394* (MO, SI), *Rojas, T. 5112* (BAA)].

Axonopus pseudochloris Herter, nom. nud. = **Axonopus suffultus** (J.C. Mikan ex Trin.) Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Axonopus purpusii (Mez) Chase
Sin.: *Axonopus anomalus* Swallen, *Axonopus flexilis* (Mez) Henrard, *Paspalum flexile* Mez, *Paspalum platycaulon* Poir. var. *gracilius* Döll, *Paspalum platycualon* Poir. var. *parviflorum* Döll, *Paspalum purpusii* Mez
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CON, COA); URY(CLA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pott s.n.* (BLA, ICN)]; PRY[*Hassler, E. 8248* (G, LIL, MO), *Morrone, O. 559* (SI)]; URY[*Osten, C. 18634* (MVFA)].

Axonopus ramboi G.A. Black = **Axonopus argentinus** Parodi

Axonopus rojasii G.A. Black = **Axonopus siccus** (Nees) Kuhlm.
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994.

Axonopus rosengurttii G.A. Black
Referencias: Black, G. A., 1963; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(DFE); URY(COL, MON, PAY, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. s.n.* (BAA)]; URY[*Rosengurtt, B. 3818-1/2* (US)].

Axonopus scoparius (Flüggé) Kuhlm.
Sin.: *Panicum columbiense* Kuntze, *Paspalum giganteum* Kuntze, *Paspalum scoparium* Flüggé, *Paspalum tripinnatum* Mez
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 11108* (HBR)].

Axonopus siccus (Nees) Kuhlm.
Sin.: *Axonopus barbatus* (Nees) Kuhlm., nom. inval., *Axonopus barbatus* Chase ex Parodi, hom. illeg., *Axonopus barbigerus* (Kunth) Hitchc., *Axonopus barbigerus* (Kunth) Hitchc. var. *venturii* G.A. Black, *Axonopus malmei* G.A. Black, *Axonopus rojasii* G.A. Black, *Axonopus siccus* (Nees) Kuhlm. var. *laxior* (Döll) G.A. Black, *Axonopus siccus* (Nees) Kuhlm. var. *scaber* (Pilg.) G.A. Black, *Axonopus ulei* (Hack.) Dedecca, *Paspalum barbatum* Nees ex Trin. var. *glabrum* Döll, *Paspalum barbatum* Nees ex Trin. var. *laxius* Döll, *Paspalum barbatum* Nees ex Trin. var. *scabrum* Pilg., *Paspalum barbatum* Nees ex Trin., hom. illeg., *Paspalum barbigerum* Kunth, *Paspalum siccus* Nees, *Paspalum ulei* Hack.
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–2000 m.
Países: ARG(COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE); URY(ART, DUR, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4413* (SI), *Zuloaga, F. O. 7632* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 46029* (MBM)]; PRY[*Zardini, E. M. 26188* (MO, SI)]; URY[*Pedersen, T. M. 15694* (MO)].

Axonopus siccus (Nees) Kuhlm. var. *laxior* (Döll) G.A. Black = **Axonopus siccus** (Nees) Kuhlm.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Axonopus siccus (Nees) Kuhlm. var. *scaber* (Pilg.) G.A. Black = **Axonopus siccus** (Nees) Kuhlm.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Axonopus stragulus Chase = **Axonopus fissifolius** (Raddi) Kuhlm.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Axonopus succulentus G.A. Black
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 6176* (BAA, SI, US)].

Axonopus suffultus (J.C. Mikan ex Trin.) Henrard, comb. superfl. = **Axonopus suffultus** (J.C. Mikan ex Trin.) Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Axonopus suffultus (J.C. Mikan ex Trin.) Parodi
Sin.: *Axonopus chloridiformis* Herter, *Axonopus hagenbeckianus* (Kuntze) Parodi, *Axonopus hagenbeckianus* (Kuntze) Parodi var. *iridaceus* (Mez) G.A. Black, *Axonopus iridaceus* (Mez) Herter, comb. superfl., *Axonopus iridaceus* (Mez) Hitchc. & Chase, *Axonopus pseudochloris* Herter, nom. nud., *Axonopus suffultus* (J.C. Mikan ex Trin.) Henrard, comb. superfl., *Panicum hagenbeckianum* Kuntze, *Paspalum iridaceum* Mez, *Paspalum suffultum* J.C. Mikan ex Trin.
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26192* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 30691* (MBM)]; PRY[*Rojas, T. 2304* (SI)]; URY[*Gallinal, J. P. 1235* (BAA, SI)].

Axonopus suffultus (J.C. Mikan ex Trin.) Parodi var. *pubiflorus* Parodi = **Axonopus argentinus** Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Axonopus ulei (Hack.) Dedecca = **Axonopus siccus** (Nees) Kuhlm.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Axonopus uninodis (Hack.) G.A. Black
Sin.: *Axonopus plumosus* (Henrard) Henrard, *Paspalum plumosum* Henrard, *Paspalum uninode* Hack.
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, GUA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 105* (G)].

Baldomiria chloridiformis (Hack.) Herter = **Leptochloa chloridiformis** (Hack.) Parodi
Referencias: Nicora, E. G., 1995b.

Bambusa barbata Trin. = **Guadua tagoara** (Nees) Kunth
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Bambusa chacoensis Rojas Acosta = **Guadua chacoensis** (Rojas Acosta) Londoño & P.M. Peterson
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Bambusa distorta Nees = **Guadua tagoara** (Nees) Kunth
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Bambusa glaziovii Hack. = **Guadua tagoara** (Nees) Kunth
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Bambusa guadua Humb. & Bonpl. = **Guadua angustifolia** Kunth
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Bambusa munroi Hack. = **Guadua paniculata** Munro
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Bambusa paniculata (Munro) Hack. = **Guadua paniculata** Munro
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Bambusa paraguayana (Döll) Bertoni = **Guadua paraguayana** Döll
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Bambusa pubescens Döll, hom. illeg. = **Merostachys pluriflora** Munro ex E.G. Camus
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Bambusa riograndensis Dutra = **Guadua trinii** (Nees) Nees ex Rupr.
Referencias: McClure, F. A. & Smith, L. B., 1967; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Bambusa spinosissima Hack. = **Guadua tagoara** (Nees) Kunth
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Bambusa tacuara Arechav. = **Guadua trinii** (Nees) Nees ex Rupr.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Bambusa tagoara auct. non Nees = **Guadua angustifolia** Kunth

Bambusa tagoara Nees = **Guadua tagoara** (Nees) Kunth
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Bambusa trinii Nees = **Guadua trinii** (Nees) Nees ex Rupr.
Referencias: McClure, F. A. & Smith, L. B., 1967.

Blepharidachne Hack.

Número de especies: 2 endémicas

Blepharidachne benthamiana (Hack. ex Kuntze) Hitchc.
Sin.: *Munroa benthamiana* Hack. ex Kuntze
Referencias: Hunziker, A. T. & Anton, A. M., 1979; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 4070* (SI), *Hunziker, A. T. 4811* (SI)].

Blepharidachne hitchcockii Lahitte
Referencias: Hunziker, A. T. & Anton, A. M., 1979; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Endémica. 600–1000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 23801* (SI), *Giacomelli, A. 1638* (BAB, BAF, US)].

Bothriochloa Kuntze

Número de especies: 13, 2 endémicas, 1 introducida

Bothriochloa alta (Hitchc.) Cabrera, comb. superfl. = **Bothriochloa alta** (Hitchc.) Henrard
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Bothriochloa alta (Hitchc.) Henrard
Sin.: *Andropogon altus* Hitchc., *Bothriochloa alta* (Hitchc.) Cabrera, comb. superfl.
Referencias: Burkart, A. & Toursarkissian, M., 1969; Nicora, E. G., 1970a; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–2900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, JUJ, LPA, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 9028* (SI), *Rúgolo de Agrasar, Z. E. 1065* (SI)].

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Henrard, comb. superfl. = **Bothriochloa barbinodis** (Lag.) Herter
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter
Sin.: *Amphilophis barbinodis* (Lag.) Nash, *Andropogon barbinodis* Lag., *Andropogon saccharoides* Sw. subsp. *leucopogon* (Nees) Hack., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *barbinodis* (Lag.) Hack., *Bothriochloa barbinodis* (Lag.) Henrard, comb. superfl., *Holcus saccharoides* (Sw.) Stuck. var. *barbinodis* (DC.) Stuck.
Referencias: Burkart, A. & Toursarkissian, M., 1969; Marchi, M. & Longhi-Wagner, H. M., 1998; Nicora, E. G., 1978; Vega, A. S., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); BRA(RGS); PRY(APY); URY(COL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 28146* (SI)]; BRA[*Swallen, J. R. 7698* (US)]; PRY[*Rojas, T. 2729* (US)]; URY[*Archer 4968* (NY)].

Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T. Blake
Sin.: *Andropogon bladhii* Retz.
Referencias: Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(LPA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troiani, H. O. 9577* (SRFA)].

[Bothriochloa brasiliensis (Hack.) Henrard]
Sin.: *Andropogon saccharoides* Sw. subsp. *brasiliensis* Hack., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *erianthoides* Hack.
Referencias: Vega, A. S., 2000.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Bothriochloa edwardsiana (Gould) Parodi
Sin.: *Andropogon edwardsianus* Gould
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Burkart, A. & Toursarkissian, M., 1969; Cantero, J. J., Núñez, C. O., Geymonat, M. & Chiacchiera, G., 1996; Nicora, E. G., 1978; Vega, A. S., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN, SAL, SFE, TUC); URY(CAS, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 11447* (CORD, MCNS), *Pedersen, T. M. 8249* (A, NY, SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 7713* (US)].

Bothriochloa eurylemma M. Marchi & Longhi-Wagner
Referencias: Vega, A. S., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, ERI, FOR, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 5725* (NY)].

Bothriochloa exaristata (Nash) Henrard
Sin.: *Amphilophis exaristatus* Nash, *Andropogon exaristatus* (Nash) Hitchc., *Andropogon hassleri* Hack., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *hassleri* (Hack.) Ekman, *Andropogon saccharoides* Sw. var. *submuticus* Vasey ex Hack., *Bothriochloa hassleri* (Hack.) Cabrera, comb. superfl., *Bothriochloa hassleri* (Hack.) Henrard
Referencias: Allred, K. W. & Gould, F. W., 1983; Marchi, M. & Longhi-Wagner, H. M., 1998; Vega, A. S., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 721* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 41216* (LIL, US)]; PRY[*Rojas, T. 2314* (SI, US)].

Bothriochloa hassleri (Hack.) Cabrera, comb. superfl.
= **Bothriochloa exaristata** (Nash) Henrard
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Bothriochloa hassleri (Hack.) Henrard = **Bothriochloa exaristata** (Nash) Henrard
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Bothriochloa imperatoides (Hack.) Herter
Sin.: *Andropogon imperatoides* (Hack.) Lillo, *Andropogon saccharoides* Sw. var. *imperatoides* Hack., *Bothriochloa springfieldii* (Gould) Parodi var. *australis* de Wet
Referencias: Marchi, M. & Longhi-Wagner, H. M., 1998; Mujica Sallés, J., 1996; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Vega, A. S., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(BAI, COS, SFE, TUC); BRA(RGS); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 2660* (NY)]; BRA[*Valls, J. F. M. 12383* (ICN)]; URY[*Rosengurtt, B. 7405* (US), *Rosengurtt, B. 7693b* (SI)].

Bothriochloa laguroides (DC.) Pilg., comb. superfl.
= **Bothriochloa laguroides** (DC.) Herter subsp. **laguroides**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Vega, A. S., 2000.

Bothriochloa laguroides (DC.) Herter subsp. **laguroides**
Sin.: *Andropogon laguriformis* Griseb., *Andropogon laguroides* DC., *Andropogon laguroides* Lag., nom. illeg., *Andropogon saccharoides* Sw. subsp. *laguroides* (DC.) Hack., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *laguroides* (DC.) Hack., *Bothriochloa laguroides* (DC.) Pilg., comb. superfl., *Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. var. *laguroides* (DC.) Beetle, *Deyeuxia megapotamica* Spreng., *Holcus saccharoides* (Sw.) Stuck. var. *laguroides* (DC.) Stuck., *Sorghum saccharoides* (Sw.) Kuntze subsp. *laguroides* (DC.) Kuntze, *Trachypogon laguroides* (DC.) Nees
Referencias: Allred, K. W. & Gould, F. W., 1983; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Marchi, M. & Longhi-Wagner, H. M., 1998; Mujica Sallés, J., 1996; Vega, A. S., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, RNE, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(VII, VIII, IX); PRY(CEN, GUA); URY(ART, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 858* (SI)]; BRA[*Del Mazo, V. C. 12393* (SI)]; CHL[*Kuntze, C. E. O. s.n.* (NY)]; PRY[*Rosengurtt, B. 5905* (BAA, US)]; URY[*Rosengurtt, B. 6500b* (SI)].

Bothriochloa laguroides (DC.) Herter subsp. **torreyana** (Steud.) Allred & Gould
Sin.: *Amphilophis torreyanus* (Steud.) Nash, *Andropogon hassleri* Hack. var. *aristatus* Hack., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *torreyanus* (Steud.) Hack., *Andropogon torreyanus* Steud., *Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. var. *torreyana* (Steud.) Gould
Referencias: Allred, K. W. & Gould, F. W., 1983; Marchi, M. & Longhi-Wagner, H. M., 1998; Vega, A. S., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–1900 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 4944* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 12128* (CEN, ICN)].

Bothriochloa longipaniculata (Gould) Allred & Gould
Sin.: *Andropogon saccharoides* Sw. var. *longipaniculatus* Gould, *Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. var. *longipaniculata* (Gould) Gould
Referencias: Allred, K. W. & Gould, F. W., 1983; Marchi, M. & Longhi-Wagner, H. M., 1998; Vega, A. S., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–2300 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(SCA); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 4438* (US)]; BRA[*Valls, J. F. M. 3097* (TAES)]; PRY[*Rosengurtt, B. 5865* (US)].

Bothriochloa meridionalis M. Marchi & Longhi-Wagner
Referencias: Marchi, M. & Longhi-Wagner, H. M., 1995, 1998; Vega, A. S., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Boldrini, I. J. 305b* (ICN)].

Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. var. *laguroides* (DC.) Beetle = **Bothriochloa laguroides** (DC.) Herter subsp. **laguroides**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Vega, A. S., 2000.

Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. var. *longipaniculata* (Gould) Gould = **Bothriochloa longipaniculata** (Gould) Allred & Gould
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. var. *parvispiculus* (Hitchc.) Tovar = **Bothriochloa saccharoides** (Sw.) Rydb. subsp. **parvispiculis** (Hitchc.) Davidse
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. var. *torreyana* (Steud.) Gould = **Bothriochloa laguroides** (DC.) Herter subsp. **torreyana** (Steud.) Allred & Gould
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. subsp. **parvispiculis** (Hitchc.) Davidse
Sin.: *Andropogon saccharoides* Sw. subsp. *parvispiculus* Hitchc., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *parvispiculus* (Hitchc.) Standl., *Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. var. *parvispiculus* (Hitchc.) Tovar
Referencias: Vega, A. S., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–3900 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 25136* (CTES, TAES)].

Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. subsp. **saccharoides**
Sin.: *Amphilophis saccharoides* (Sw.) Nash, *Andropogon argenteus* DC., *Andropogon berteronianus* Steud., *Andropogon saccharoides* Sw., *Andropogon saccharoides* Sw. subsp. *genuinus* Hack., nom. inval., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *genuinus* Hack., nom. inval., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *typicus* Hack., nom. inval., *Dichanthium saccharoides* (Sw.) Roberty, *Holcus saccharoides* (Sw.) Stuck., *Sorghum saccharoides* (Sw.) Kuntze
Referencias: Allred, K. W. & Gould, F. W., 1983; Marchi, M. & Longhi-Wagner, H. M., 1998; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Vega, A. S., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–2600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, RNE, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS); CHL(V, VII, VIII, IX); PRY(COA); URY(ART, MAL, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21026* (SI)]; BRA[*Marchi, M. 97* (ICN)]; CHL[*sin colector s.n.* (US)]; PRY[*Zardini, E. M. 17387* (AS, MO)]; URY[*Herter, W. G. F. 533a* (SI), *Rosengurtt, B. 6811* (TAES)].

Bothriochloa springfieldii (Gould) Parodi
Sin.: *Andropogon springfieldii* Gould
Referencias: Cantero, J. J., Núñez, C. O., Geymonat, M. & Chiacchiera, G., 1996; Nicora, E. G., 1978; Vega, A. S., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–2100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SDE, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ambrosetti, A. 1916* (MERL), *Kiesling, R. 3289* (SI)].

Bothriochloa springfieldii (Gould) Parodi var. *australis* de Wet = **Bothriochloa imperatoides** (Hack.) Herter
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Bothriochloa velutina M. Marchi & Longhi-Wagner
Referencias: Marchi, M. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Vega, A. S., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Valls, J. F. M. 11332* (ICN)].

Bouteloua Lag.

Número de especies: 6

[Bouteloua americana (L.) Scribn.]
Sin.: *Aristida adscensionis* L. var. *americana* (L.) Kuntze, *Aristida americana* L.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Bouteloua aristidoides (Kunth) Griseb.
Sin.: *Bouteloua ciliata* Griseb., *Bouteloua gracilis* Vasey, hom. illeg., *Dinebra aristidoides* Kunth
Referencias: Gould, F. W., 1979; Herrera Arrieta, Y., Peterson, P. M. & Lemus, M. C., 2004; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Sánchez, E. A., 1971.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Scarpa, G. F. 612* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 7172* (US)].

Bouteloua barbata Lag.
Sin.: *Chondrosum barbatum* (Lag.) Clayton
Referencias: Clayton, W. D., 1982; Herrera Arrieta, Y., Peterson, P. M. & Lemus, M. C., 2004; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Nativa. 2700–2900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2687* (SI)].

Bouteloua brachyanthera Phil. = **Bouteloua simplex** Lag.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Bouteloua brasiliensis Ekman = **Bouteloua media** (E. Fourn.) Gould & Kapadia

Bouteloua ciliata Griseb. = **Bouteloua aristidoides** (Kunth) Griseb.

Bouteloua curtipendula auct. non (Michx.) Torr. = **Bouteloua curtipendula** (Michx.) Torr. var. **caespitosa** Gould & Kapadia

Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. var. *aristosa* auct. non A. Gray = **Bouteloua curtipendula** (Michx.) Torr. var. **caespitosa** Gould & Kapadia

Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. var. **caespitosa** Gould & Kapadia
Sin.: *Atheropogon acuminatus* E. Fourn., *Bouteloua curtipendula* (Michx.) Torr. var. *aristosa* auct. non A. Gray, *Bouteloua curtipendula* auct. non (Michx.) Torr., *Bouteloua racemosa* Lag.
Referencias: Gould, F. W., 1979; Herrera Arrieta, Y., Peterson, P. M. & Lemus, M. C., 2004; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–2100 m.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SLU, TUC); URY(PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 313* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 4615b* (US)].

Bouteloua gracilis Vasey, hom. illeg. = **Bouteloua aristidoides** (Kunth) Griseb.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Bouteloua humilis (Kunth) Hieron. = **Bouteloua simplex** Lag.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Bouteloua lophostachya Griseb. = **Neobouteloua lophostachya** (Griseb.) S. Gould
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Bouteloua media (E. Fourn.) Gould & Kapadia
Sin.: *Atheropogon medius* E. Fourn., *Bouteloua brasiliensis* Ekman
Referencias: Gould, F. W., 1979; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COR, ERI); PRY(AMA); URY(PAY, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6364* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 11078* (BM)]; URY[*Rosengurtt, B. 4615c* (MVFA)].

Bouteloua megapotamica (Spreng.) Kuntze
Sin.: *Bouteloua multiseta* (Nees) Griseb., *Bouteloua multiseta* (Nees) Griseb. var. *pallida* Hack., *Eutriana multiseta* Nees, *Pappophorum eutrianoides* Trin. ex Nees, *Pappophorum megapotamicum* Spreng.
Referencias: Gould, F. W., 1979; Herrera Arrieta, Y., Peterson, P. M. & Lemus, M. C., 2004; Mujica Sallés, J., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MIS, RNE, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS); URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2331* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 12350* (CEN, ICN)]; URY[*Mujica Sallés, J. 325* (MVFA)].

Bouteloua multiseta (Nees) Griseb. = **Bouteloua megapotamica** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Bouteloua multiseta (Nees) Griseb. var. *pallida* Hack. = **Bouteloua megapotamica** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Bouteloua nana Griseb. = **Neobouteloua lophostachya** (Griseb.) S. Gould
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

[Bouteloua parryi (E. Fourn.) Griffiths]
Sin.: *Bouteloua vestita* (S. Watson) Scribn., *Chondrosum parryi* E. Fourn.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Bouteloua racemosa Lag. = **Bouteloua curtipendula** (Michx.) Torr. var. **caespitosa** Gould & Kapadia

Bouteloua rahmeri Phil. = **Bouteloua simplex** Lag.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Bouteloua simplex Lag.
Sin.: *Bouteloua brachyanthera* Phil., *Bouteloua humilis* (Kunth) Hieron., *Bouteloua rahmeri* Phil., *Bouteloua simplex* Lag. var. *rahmeri* (Phil.) Henrard, *Bouteloua tenuis* (P. Beauv. ex Kunth) Griseb., *Bouteloua tenuis* (P. Beauv. ex Kunth) Griseb. var. *humilis* Griseb., *Chondrosum simplex* (Lag.) Kunth
Referencias: Clayton, W. D., 1982; Herrera Arrieta, Y., Peterson, P. M. & Lemus, M. C., 2004; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 2200–4500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, TUC); CHL(I, II, V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 306* (SI)]; CHL[*Martin, H. C. 571* (SI), *Philippi, R. A. 268* (SGO, US)].

Bouteloua simplex Lag. var. *rahmeri* (Phil.) Henrard = **Bouteloua simplex** Lag.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Bouteloua tenuis (P. Beauv. ex Kunth) Griseb. = **Bouteloua simplex** Lag.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Bouteloua tenuis (P. Beauv. ex Kunth) Griseb. var. *humilis* Griseb. = **Bouteloua simplex** Lag.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Bouteloua vestita (S. Watson) Scribn. = **Bouteloua parryi** (E. Fourn.) Griffiths
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Brachiaria adspera (Trin.) Parodi = **Urochloa adspersa** (Trin.) R.D. Webster
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Brachiaria arrecta (Hack. ex T. Durand & Schinz) Stent = **Urochloa arrecta** (Hack. ex T. Durand & Schinz) Morrone & Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Brachiaria brizantha (Hochst. ex A. Rich.) Stapf = **Urochloa brizantha** (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster

Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Brachiaria decumbens Stapf = **Urochloa decumbens** (Stapf) R.D. Webster
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Brachiaria dictyoneura (Fig. & De Not.) Stapf = **Urochloa dictyoneura** (Fig. & De Not.) Veldkamp
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Brachiaria echinulata (Mez) Parodi = **Urochloa adspersa** (Trin.) R.D. Webster
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Brachiaria eruciformis Griseb. = **Moorochloa eruciformis** (Sm.) Veldkamp

Brachiaria extensa Chase = **Urochloa platyphylla** (Munro ex C. Wright) R.D. Webster
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Brachiaria fasciculata (Sw.) Parodi = **Urochloa fusca** (Sw.) B.F. Hansen & Wunderlin
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Brachiaria fasciculata (Sw.) S.T. Blake, comb. superfl. = **Urochloa fusca** (Sw.) B.F. Hansen & Wunderlin
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Brachiaria glabrinodis (Hack.) Henrard = **Paspalum glabrinode** (Hack.) Morrone & Zuloaga
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1989; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Brachiaria lorentziana (Mez) Parodi = **Urochloa lorentziana** (Mez) Morrone & Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Brachiaria mollis (Sw.) Parodi = **Urochloa mollis** (Sw.) Morrone & Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf = **Urochloa mutica** (Forssk.) T.Q. Nguyen
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Brachiaria paucispicata (Morong) Clayton = **Urochloa paucispicata** (Morong) Morrone & Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc. = **Urochloa plantaginea** (Link) R.D. Webster
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Brachiaria platyphylla (Munro ex C. Wright) Nash = **Urochloa platyphylla** (Munro ex C. Wright) R.D. Webster
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Brachiaria purpurascens (Raddi) Henrard = **Urochloa mutica** (Forssk.) T.Q. Nguyen
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Brachiaria ruziziensis R. Germ. & Evrard = **Urochloa ruziziensis** (R. Germ. & Evrard) Crins
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Brachiaria villosa (Lam.) A. Camus = **Urochloa villosa** (Lam.) T.Q. Nguyen
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Brachypodium P. Beauv.

Número de especies: 2 introducidas

Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv.
Sin.: *Bromus distachyos* L., *Trachynia distachya* (L.) Link
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Burkart, A., 1969a; Macaya, J. & Faúndez Y., L., 1996a; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IJF); URY(ART, CAS, MON, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22857* (SI)]; CHL[*Faúndez, L. 5-011* (AGUCH)]; URY[*Berro, M. B. 2257* (MVFA)].

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.
Sin.: *Festuca sylvatica* Huds.
Referencias: Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1987; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz,

E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Introducida. 0–100 m.
Países: ARG(DFE); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 836* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. s.n.* (MVFA)].

Brasilocalamus pubescens Nakai = **Merostachys pluriflora** Munro ex E.G. Camus
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Briza L.

Número de especies: 3 introducidas

Briza berteroniana Steud. = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza bidentata Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Rhombolytrum monandrum** (Hack.) Nicora & Rúgolo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza brachychaeta Ekman = **Poidium brachychaetum** (Ekman) Matthei

Briza brasiliensis (Nees ex Steud.) Ekman = **Poidium brasiliensis** Nees ex Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza brizoides (Lam.) Kuntze = **Calotheca brizoides** (Lam.) Desv.

Briza calotheca (Trin.) Hack. = **Poidium calotheca** (Trin.) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza elegans (P. Beauv.) Döll = **Calotheca brizoides** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza eragrostis L. = **Eragrostis cilianensis** (All.) Vignolo ex Janch.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Briza erecta Lam. = **Chascolytrum erectum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza flava Desv. = **Poidium uniolae** (Nees) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza fusca (Parodi) Parodi = **Chascolytrum lamarckianum** (Nees) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza glomerata Hack. & Arechav. = **Poidium rufum** (J. Presl) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza glomerata Kuntze, hom. illeg. = **Poidium rufum** (J. Presl) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza hackelii (Lindm.) Ekman = **Poidium poimorphum** (J. Presl) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza hackelii (Lindm.) Ekman f. *pseudisachne* Ekman = **Poidium poimorphum** (J. Presl) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza juergensii Hack. = **Poidium juergensii** (Hack.) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza lamarckiana Nees = **Chascolytrum lamarckianum** (Nees) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza lilloi Parodi = **Poidium monandrum** (Hack.) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza lindmanii Ekman = **Chascolytrum lamarckianum** (Nees) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza macrostachya (J. Presl) Steud. = **Chascolytrum erectum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza mandoniana (Griseb.) Henrard = **Poidium monandrum** (Hack.) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza mandoniana (Griseb.) Henrard var. *herzogiana* Henrard = **Poidium monandrum** (Hack.) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza mandoniana (Griseb.) Henrard var. *tuberculata* Henrard = **Poidium monandrum** (Hack.) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza mandoniana (Griseb.) Henrard var. *vallegrandensis* Henrard = **Poidium monandrum** (Hack.) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza maxima L.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Longhi-Wagner, H. M., 1987; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1981b; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Anual. Introducida. 0–400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, SFE); BRA(PAR, RGS); CHL(III, V, VII, VIII, IX, X, XII, IJF); URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MAL, MON, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 1606bis* (CORD)]; BRA[*Hatschbach, G. 33826* (MBM)]; CHL[*Gunckel, L. H. 13731* (CONC)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 2686* (MVM)].

Briza media L.
Referencias: Matthei, O. R., 1975; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1981b; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 500–1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ellenberg, H. 1039* (BAA)].

Briza minor L.
Sin.: *Briza virens* L.
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Longhi-Wagner, H. M., 1987; Matthei, O. R., 1975; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1981b; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Torres, M. A., 1970a.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); URY(CAS, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 18108* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 646* (HBR, US)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996077* (CONC, SGO)]; URY[*Herter, W. G. F. 8706* (SI), *Mujica Sallés, J. 222* (MVFA)].

Briza monandra (Hack.) Pilg. = **Poidium monandrum** (Hack.) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza montevidensis Trin. ex Steud., nom. nud. = **Chascolytrum erectum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza neesii Döll = **Poidium calotheca** (Trin.) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza nutans Lindl. ex Steud. = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza paleapilifera Parodi = **Chascolytrum paleapiliferum** (Parodi) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza parodiana Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Chascolytrum parodianum** (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza patula Phil. = **Calotheca brizoides** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza poa Nees ex Steud. = **Poidium calotheca** (Trin.) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza poiformis (Spreng.) Kuntze = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Briza poimorpha (J. Presl) Henrard = **Poidium poimorphum** (J. Presl) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza reniformis (J. Presl) Steud. = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza rotundata (Kunth) Steud. = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza rufa (J. Presl) Steud. = **Poidium rufum** (J. Presl) Matthei
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988.

Briza rufa (J. Presl) Steud. var. *sparsipilosa* Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Poidium rufum** (J. Presl) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza scabra (Nees ex Steud.) Ekman = **Chascolytrum scabrum** (Nees ex Steud.) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza scabra auct. non (Nees ex Steud.) Ekman = **Poidium rufum** (J. Presl) Matthei
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Briza scabra Nees ex Steud., nom. nud. = **Poidium calotheca** (Trin.) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza sellowii Nees ex Steud. = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza sesquiflora (Desv.) Pilg. = **Podagrostis sesquiflora** (E. Desv.) Nicora
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza spicigera (J. Presl) Steud. = **Poidium uniolae** (Nees) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza stricta (Hook. & Arn.) Steud. = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza stricta (Hook. & Arn.) Steud. var. *mandoniana* (Griseb.) Hauman = **Poidium monandrum** (Hack.) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza subaristata Lam. = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza subaristata Lam. var. *fusca* Parodi = **Chascolytrum lamarckianum** (Nees) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza subaristata Lam. var. *interrupta* (Hack. ex Stuck.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza tandilensis Parodi = **Calotheca brizoides** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza triloba Nees = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza triloba Nees f. *pumila* Hack. ex Kneuck. = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza triloba Nees f. *violascens* Hack. = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza triloba Nees var. *grandiflora* Döll = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza triloba Nees var. *interrupta* Hack. = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza triloba Nees var. *typica* Parodi, nom. inval. = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.

Briza uniolae (Nees) Nees ex Steud. = **Poidium uniolae** (Nees) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza uniolae (Nees) Nees ex Steud. var. *modestior* Döll = **Poidium uniolae** (Nees) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza uniolae (Nees) Nees ex Steud. var. *robustior* Döll = **Poidium uniolae** (Nees) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza violascens Steud. = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Briza virens L. = **Briza minor** L.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Bromelica cepacea (Phil.) Nicora = **Melica cepacea** (Phil.) Scribn.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromidium Nees & Meyen

Número de especies: 5, 1 endémica

Bromidium anomalum (Trin.) Döll
Sin.: *Agrostis anomala* (Trin.) Herter, *Agrostis koelerioides* Desv., *Aira anomala* Trin., *Didymochatea chilensis* Steud., *Koeleria chilensis* Steud., nom. nud.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1982; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Donat, A. 72* (BAA)]; CHL[*Lechler, W. 293* (L)].

Bromidium hygrometricum (Nees) Nees & Meyen
Sin.: *Agrostis hygrometrica* Nees, *Agrostis juergensii* Hack.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1982; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1600 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE); BRA(PAR, RGS); URY(CAS, CLA, FLA, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 1145* (SI)]; BRA[*Barreto, I. L. s.n.* (BLA)]; URY[*Rosengurtt, B. 11283* (MVFA)].

Bromidium hygrometricum (Nees) Nees & Meyen var. *rigescens* (J. Presl) Kuntze = **Deyeuxia rigescens** (J. Presl) Türpe
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Bromidium hygrometricum (Nees) Nees & Meyen var. *spectabilis* (Nees & Meyen) Kuntze = **Deyeuxia rigescens** (J. Presl) Türpe
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Bromidium hygrometricum (Nees) Nees & Meyen var. *tandilense* Kuntze = **Bromidium tandilense** (Kuntze) Rúgolo
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromidium ramboi (Parodi) Rúgolo var. **pubescens** (Kämpf) Rúgolo
Sin.: *Agrostis ramboi* Parodi var. *pubescens* Kämpf
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Valls, J. F. M. 3152b* (BLA, SI)].

Bromidium ramboi (Parodi) Rúgolo var. **ramboi**
Sin.: *Agrostis ramboi* Parodi
Referencias: Kämpf, A. N., 1975; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Valls, J. F. M. 1874* (ICN)].

Bromidium rigescens (J. Presl) Nees & Meyen = **Deyeuxia rigescens** (J. Presl) Türpe
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Bromidium tandilense (Kuntze) Rúgolo
Sin.: *Agrostis hygrometrica* Nees var. *tandilensis* (Kuntze) L.B. Sm. & Wassh., *Agrostis kennedyana* Beetle, *Agrostis koelerioides* Desv. var. *pampeana* Parodi, *Agrostis tandilensis* (Kuntze) Parodi, *Bromidium hygrometricum* (Nees) Nees & Meyen var. *tandilense*

Kuntze, *Deyeuxia hygrometrica* (Nees) Speg. var. *tandilensis* (Kuntze) Speg.
Referencias: Kämpf, A. N., 1975; Mujica Sallés, J., 1996; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1982; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS); URY(ART, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 15333* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 631* (BLA)]; URY[*Rosengurtt, B. 9672* (MVFA)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar material de referencia (Soreng et al., 2003).

Bromidium trisetoides (Steud.) Rúgolo
Sin.: *Agrostis trisetoides* Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Lechler, W. 724* (B, BAA, P, US)].

Bromopsis auletica (Trin. ex Nees) Herter = **Bromus auleticus** Trin. ex Nees
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. = **Bromus erectus** Huds.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromopsis uruguayensis (Arechav.) Herter = **Bromus brachyanthera** Döll var. **uruguayensis** (Arechav.) J.A. Cámara
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Bromus L., nom. cons.

Número de especies: 33, 11 endémicas, 16 introducidas

Bromus alpestris Steud., nom. nud. = **Bromus araucanus** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus andinus Phil. = **Bromus lithobius** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus andinus Phil. var. *scabrivalva* Speg. = **Bromus lithobius** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus angustatus Pilg. = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus araucanus Phil.
Sin.: *Bromus alpestris* Steud., nom. nud., *Bromus araucanus* Phil. var. *obtusiflorus* (Hack.) J.A. Cámara, *Bromus obtusiflorus* Hack.
Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CHU, RNE, TDF); CHL(IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2863* (BAA)]; CHL[*Lechler, W. 1314* (LE, US)].

Bromus araucanus Phil. var. *obtusiflorus* (Hack.) J.A. Cámara = **Bromus araucanus** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus arundinaceus (Scherb.) Roth = **Schedonorus arundinaceus** (Schreb.) Dumort.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus arvensis L.
Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arriaga, M. O. s.n.* (SI)].

Bromus auleticus Trin. ex Nees
Sin.: *Bromopsis auletica* (Trin. ex Nees) Herter, *Bromus erectus* Huds. var. *auleticus* (Trin. ex Nees) Döll
Referencias: Burkart, A., 1969a; Cámara Hernández, J. A., 1970; Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SFE, SLU); BRA(RGS, SCA); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19251* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 15931* (ICN, US)]; URY[*Mujica Sallés, J. 738* (MVFA)].

Bromus berteroanus Colla
Sin.: *Avena paupercula* Phil., *Bromus bicuspis* Nees ex Steud., *Bromus trinii* E. Desv., *Bromus trinii* E. Desv. var. *effusa* E. Desv., *Bromus trinii* E. Desv. var. *manicata* E. Desv., *Bromus trinii* E. Desv. var. *micranthera* E. Desv., *Bromus trinii* E. Desv. var.

pallidiflora E. Desv., *Bromus trinii* E. Desv. var. *stricta* E. Desv., *Danthonia pseudospicata* Müll. Hal., nom. superfl., *Trisetobromus hirtus* (Trin.) Nevski, *Trisetum barbatum* Steud., *Trisetum hirtum* Trin., *Trisetum litorale* Phil., *Trisetum trinii* (Trin.) Louis-Marie, *Trisetum trinii* (Trin.) Louis-Marie var. *effusum* (E. Desv.) Louis-Marie, *Trisetum trinii* (Trin.) Louis-Marie var. *litorale* (Phil.) Louis-Marie, *Trisetum trinii* (Trin.) Louis-Marie var. *manicatum* (E. Desv.) Louis-Marie, *Trisetum trinii* (Trin.) Louis-Marie var. *micrantherum* (E. Desv.) Louis-Marie, *Trisetum trinii* (Trin.) Louis-Marie var. *pallidiflora* (E. Desv.) Louis-Marie, *Trisetum trinii* (Trin.) Louis-Marie var. *strictum* (E. Desv.) Louis-Marie

Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Macaya, J. & Faúndez Y., L., 1996a; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.

Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, IJF, RME).

Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10764* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996069* (CONC, SGO].

Bromus bicuspis Nees ex Steud. = **Bromus berteroanus** Colla

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus bonariensis Parodi & J.A. Cámara

Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, LPA, SFE).

Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 10329* (BAA, SI, US)].

Bromus brachyanthera Döll var. **brachyanthera**

Sin.: *Bromus uruguayensis* Arechav. var. *glabrescens* Arechav., *Bromus uruguayensis* Arechav. var. *robustior* Arechav.

Referencias: Cámara Hernández, J. A., 1970; Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, MIS, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(FLO, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1367* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 7848* (HBR, US)]; URY[*Mujica Sallés, J. 214* (MVFA)].

Bromus brachyanthera Döll var. **uruguayensis** (Arechav.) J.A. Cámara

Sin.: *Bromopsis uruguayensis* (Arechav.) Herter, *Bromus brachyanthera* Döll subsp. *uruguayensis* (Arechav.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Bromus uruguayensis* Arechav., *Bromus uruguayensis* Arechav. var. *genuinus* Arechav., nom. inval.

Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, ERI); BRA(RGS); URY(ART, CAS, CLA, LAV, MAL, SAO, TAC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 2039* (SI)]; BRA[*Swallen, J. R. 7257* (PEL)]; URY[*Rosengurtt, B. 11273* (MVFA)].

Bromus brachyanthera Döll subsp. *uruguayensis* (Arechav.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Bromus brachyanthera** Döll var. **uruguayensis** (Arechav.) J.A. Cámara

Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987.

Bromus breviaristatus (Hook.) Thurb., hom. illeg. = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus brevis Nees ex Steud. = **Bromus catharticus** Vahl var. **rupestris** (Speg.) Planchuelo & P.M. Peterson

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus brevis Nees ex Steud. subsp. *festucarioides* Covas & Millot = **Bromus catharticus** Vahl var. **rupestris** (Speg.) Planchuelo & P.M. Peterson

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus brizoides Lam. = **Calotheca brizoides** (Lam.) Desv.

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus burkartii Muñoz = **Bromus mango** E. Desv.

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus catharticus Vahl var. **catharticus**

Sin.: *Bromus angustatus* Pilg., *Bromus breviaristatus* (Hook.) Thurb., hom. illeg., *Bromus haenkeanus* (J. Presl) Kunth, *Bromus preslii* Kunth, *Bromus strictus* Brongn., *Bromus unioloides* (Willd.) Raspail, hom. illeg., *Bromus unioloides* Kunth, *Bromus unioloides* Kunth f. *chasmogama* Hack., *Bromus unioloides* Kunth f. *cleistogama* Hack., *Bromus unioloides* Kunth subf. *achalensis* Hack. ex Stuck., *Bromus unioloides* Kunth var. *glaucescens* Nees, *Bromus unioloides* Kunth var. *haenkeanus* (J. Presl) Shear, *Bromus unioloides* Kunth var. *humilis* Speg., hom. illeg., *Bromus unioloides* Kunth var. *micrantha* Speg., *Bromus unioloides* Kunth var. *montanus* Hack., *Bromus unioloides* Kunth var. *sanjuaninus* Hieron., *Bromus willdenowii* Kunth,

Ceratochloa breviaristata Hook., *Ceratochloa cathartica* (Vahl) Herter, *Ceratochloa haenkeana* J. Presl, *Ceratochloa haenkeana* J. Presl var. *patens* Nees, nom. nud., *Ceratochloa haenkeana* J. Presl var. *subspicata* Nees, nom. nud., *Ceratochloa secunda* J. Presl, *Ceratochloa unioloides* (Willd.) P. Beauv., *Festuca unioloides* Willd., *Forasaccus breviaristatus* (Hook.) Lunell, *Schedonorus unioloides* (Kunth) Roem. & Schult., *Tragus unioloides* (Willd.) Panz ex B.D. Jacks., nom. nud., *Zerna unioloides* (Kunth) Lindm.

Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Longhi-Wagner, H. M., 1987; Matthei, O. R., 1986; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; San Martin, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R., 2001; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Hierba. Indefinido. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IDE, IJF, RME); PRY(CEN, SPE); URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR).

Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3269* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 4655* (HBR, US)]; CHL[*Gunckel, L. H. 12924* (CONC), *Moore, D. M. 77* (SI)]; PRY[*Woolston, A. L. 41* (SI)]; URY[*Felippone, F. 4576* (SI), *Mujica Sallés, J. 734* (MVFA)].

Bromus catharticus Vahl var. **elata** (E. Desv.) Planchuelo

Sin.: *Bromus cebadilla* Steud., *Bromus stamineus* E. Desv., *Bromus unioloides* Kunth var. *elata* E. Desv., *Bromus valdivianus* Phil., *Ceratochloa valdiviana* (Phil.) Holub

Referencias: Planchuelo, A. M., 2006.

Hierba. Perenne. Nativa. 500–2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, IJF, RME).

Ejemplares de referencia: ARG[*Moore, D. M. 2136* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996089* (CONC)].

Bromus catharticus Vahl var. **rupestris** (Speg.) Planchuelo & P.M. Peterson

Sin.: *Bromus brevis* Nees ex Steud., *Bromus brevis* Nees ex Steud. subsp. *festucarioides* Covas & Millot, *Bromus unioloides* Kunth f. *brevis* (Nees ex Steud.) Kloos, *Bromus unioloides* Kunth var. *brevis* (Nees ex Steud.) Hack., *Bromus unioloides* Kunth var. *rupestris* Speg., *Ceratochloa brevis* Nees ex B.D. Jacks., nom. nud.

Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Peterson, P. M. & Planchuelo, A. M., 1988.

Hierba. Indefinido. Endémica. 0–2600 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Lutz, A. 344* (CTES), *Nicora, E. G. 8275* (SI)].

Bromus cebadilla Steud. = **Bromus catharticus** Vahl var. **elata** (E. Desv.) Planchuelo

Referencias: Planchuelo, A. M., 2006.

Bromus chilensis Trin. = **Bromus lithobius** Trin.

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus collinus Phil. = **Bromus erectus** Huds.

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus coloratus Steud.

Sin.: *Bromus coloratus* Steud. var. *vivipara* Speg., *Bromus hackelii* Macloskie, *Bromus patagonicus* Hack., hom. illeg., *Bromus patagonicus* Phil., *Bromus unioloides* (Willd.) Raspail var. *coloratus* (Steud.) Pilg.

Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(V, VIII, IX, X, XI, XII).

Ejemplares de referencia: ARG[*Dusén, P. K. H. 5648* (SI), *Eyerdam, W. J. 24117* (SI)]; CHL[*Bonarelli, G. 67* (SI), *Lechler, W. 1221* (K, LE, M, P, US)].

Bromus coloratus Steud. var. *vivipara* Speg. = **Bromus coloratus** Steud.

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus commutatus Schrad.

Sin.: *Serrafalcus commutatus* (Schrad.) Bab.

Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Longhi-Wagner, H. M., 1987; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.

Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–1500 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, LPA, MEN, NEU, RNE); BRA(RGS); URY(CAS, COL, MON, ROC, SJO, SOR).

Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 804* (SI)]; BRA[*Barreto, I. L. s.n.* (BLA)]; URY[*Barreto, I. L. s.n.* (BLA)].

[Bromus condensatus Hack.]

Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Bromus cristatus L. = **Agropyron cristatum** (L.) Gaertn.

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus culmineus Phil. = **Bromus tunicatus** Phil.

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus dertonensis All. = **Vulpia bromoides** (L.) Gray

Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Bromus diandrus Roth var. *rigidus* (Roth) F. Sales = **Bromus rigidus** Roth

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus distachyos L. = **Brachypodium distachyon** (L.) P. Beauv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus erectus Huds.
Sin.: *Bromopsis erecta* (Huds.) Fourr., *Bromus collinus* Phil.
Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, SFE); CHL(VIII, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini 65* (BAB)]; CHL[*Barros, E. 1974* (BAA)].

Bromus erectus Huds. var. *auleticus* (Trin. ex Nees) Döll = **Bromus auleticus** Trin. ex Nees
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Bromus fernandezianus (Phil.) Skottsb. = **Megalachne berteroana** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus flexuosus Planchuelo
Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 20464* (CORD, US)].

Bromus fonkii Phil. = **Bromus lithobius** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus gilliesii Nees ex Steud. = **Amphibromus scabrivalvis** (Trin.) Swallen var. **scabrivalvis**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus glomeratus (L.) Scop. = **Dactylis glomerata** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus gunckelii Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 3300 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 192* (CONC)].

Bromus hackelii Macloskie = **Bromus coloratus** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus haenkeanus (J. Presl) Kunth = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus holciformis Steud. & Hochst. = **Amphibromus scabrivalvis** (Trin.) Swallen var. **scabrivalvis**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus hordeaceus L.
Sin.: *Bromus megapotamicus* Spreng., *Bromus mollis* L.
Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE); BRA(RGS); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, IJF, RME); URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 13628* (SI)]; BRA[*Valla, J. J. 2367* (ICN)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 994898* (CONC)]; URY[*Mujica Sallés, J. 331* (MVFA)].

Bromus inermis Leyss.
Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, DFE); URY(COL, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19967* (SI)]; URY[*Burkart, A. 15779* (SI)].

Bromus japonicus Thunb., nom. superfl. = **Bromus japonicus** Thunb. ex A. Murray

Bromus japonicus Thunb. ex A. Murray
Sin.: *Bromus japonicus* Thunb., nom. superfl., *Bromus patulus* Mert. & Koch, *Serrafalcus patulus* (Mert. & Koch) Parl.
Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Piccinini, B. 1509* (BAB)].
Notas: Citada para Chile sin mencionar ejemplar de referencia (Soreng et al., 2003).

Bromus lanatus Kunth
Sin.: *Bromus oliganthus* Pilg., *Bromus pflanzii* Pilg., *Festuca mollis* Kunth, nom. illeg., *Schenodorus lanatus* (Kunth) Roem. & Schult.

Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SJU, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 498* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 255* (CONC)].

Bromus lanceolatus Roth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: CHL(VII); URY(MAL, PAY, RNO).
Ejemplares de referencia: URY[*Rosengurtt, B. 11689* (MVFA)].
Notas: Citada para Chile sin indicar ejemplar de referencia (Soreng et al., 2003).

Bromus lithobius Trin.
Sin.: *Bromus andinus* Phil., *Bromus andinus* Phil. var. *scabrivalva* Speg., *Bromus chilensis* Trin., *Bromus fonkii* Phil., *Bromus scaber* Phil., *Bromus unioloides* Kunth f. *humilis* (E. Desv.) Kloos, *Bromus unioloides* Kunth var. *humilis* E. Desv., *Bromus unioloides* Kunth var. *pubescens* Hack.
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vallerini, J. 453* (SI)]; CHL[*Burkart, A. 27447* (SI)].

Bromus macranthos Meyen, nom. nud. = **Bromus setifolius** J. Presl var. **brevifolius** Nees
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Bromus macranthos Desv. var. dusenii Hack. ex Macloskie & Dusén]
Notas: Nombre dudoso.

Bromus macranthos Meyen ex E. Desv. var. *macrantha* E. Desv., nom. superfl. = **Bromus setifolius** J. Presl var. **brevifolius** Nees
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus macranthos Meyen ex E. Desv. var. *minor* E. Desv. = **Bromus setifolius** J. Presl var. **pictus** (Hook. f.) Skottsb.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus macranthos E. Desv. var. *setifolius* (J. Presl) E. Desv. = **Bromus setifolius** J. Presl var. **setifolius**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus madritensis L.
Sin.: *Anisantha madritensis* (L.) Nevski, *Festuca madritensis* (L.) Desf.
Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, JUJ, NEU); CHL(IV, V, VII, IX); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 15620* (SI)]; CHL[*Jiles P., C. 2833* (CONC)]; URY[*Villega Suárez s.n.* (MVFA)].

Bromus mandonianus Henrard = **Dielsiochloa floribunda** (Pilg.) Pilg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus mango E. Desv.
Sin.: *Bromus burkartii* Muñoz, *Ceratochloa mango* (E. Desv.) Holuby
Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Bianual. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(IX, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 4351* (BAB)]; CHL[*Burkart, A. 9504* (SGO, SI)].

Bromus masafueranus Skottsb. & Pilg. ex Pilg. = **Megalachne masafuerana** (Skottsb. & Pilg. ex Pilg.) Matthei
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002.

Bromus maximus Desf. = **Bromus rigidus** Roth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus megalachne Pilg. = **Megalachne berteroana** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus megapotamicus Spreng. = **Bromus hordeaceus** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus modestus Renvoize
Referencias: Sulekic, A. A., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 3300–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sulekic, A. A. 2798* (SI)].

Bromus mollis L. = **Bromus hordeaceus** L.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Bromus mollis L. var. *secalinus* (L.) Huds. = **Bromus secalinus** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus obtusiflorus Hack. = **Bromus araucanus** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus oliganthus Pilg. = **Bromus lanatus** Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus parodii Covas & Itria
Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(LPA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwabe, H. 63* (BAA)].

Bromus patagonicus Hack., hom. illeg. = **Bromus coloratus** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus patagonicus Phil. = **Bromus coloratus** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus patulus Mert. & Koch = **Bromus japonicus** Thunb. ex A. Murray
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus pellitus Hack.
Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 262* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 3656* (CONC)].

Bromus pflanzii Pilg. = **Bromus lanatus** Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus pictus Hook. f. = **Bromus setifolius** J. Presl var. **pictus** (Hook. f.) Skottsb.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus preslii Kunth = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus racemosus L.
Sin.: *Serrafalcus racemosus* (L.) Parl.
Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, DFE); CHL(X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2321* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 7197* (BAA)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Soreng et al., 2003).

Bromus rigidus Roth
Sin.: *Anisantha rigida* (Roth) Hyl., *Bromus diandrus* Roth var. *rigidus* (Roth) F. Sales, *Bromus maximus* Desf., *Bromus villosus* Forssk. var. *rigidus* (Roth) Asch. & Graebn.
Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, CHA, LPA, NEU, RNE, SCR); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vallerini, J. 250* (SI)]; CHL[*Barros, E. 3992* (BAA)].

Bromus rotundatus Kunth = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus rubens L.
Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ancibor, E. s.n.* (BAB)].

Bromus scaber Phil. = **Bromus lithobius** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus scoparius L.
Sin.: *Bromus scoparius* L. var. *villiglumis* Maire & Weiller
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1300 m.
Países: CHL(V, VI, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ahumada s.n.* (CONC), *Zöllner, O. 2028* (CONC)].

Bromus scoparius L. var. *villiglumis* Maire & Weiller = **Bromus scoparius** L.

Bromus secalinus L.
Sin.: *Avena secalina* (L.) Salisb., *Bromus mollis* L. var. *secalinus* (L.) Huds.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Cámara Hernández, J. A., 1978; Parodi, L. R., 1937b; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 6655* (SI)]; CHL[*Grandjot, G. F. 3980* (SI)].

Bromus setifolius J. Presl var. **brevifolius** Nees
Sin.: *Bromus macranthos* Meyen ex E. Desv. var. *macrantha* E. Desv., nom. superfl., *Bromus macranthos* Meyen, nom. nud.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–4000 m.
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dusén, P. K. H. 5649* (SI), *Vanni, R. O. 4424* (CTES)]; CHL[*Meyen s.n.* (B, US)].

Bromus setifolius J. Presl var. *pictus* (Hook. f.) J.A. Cámara, comb. superfl. = **Bromus setifolius** J. Presl var. **pictus** (Hook. f.) Skottsb.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus setifolius J. Presl var. **pictus** (Hook. f.) Skottsb.
Sin.: *Bromus macranthos* Meyen ex E. Desv. var. *minor* E. Desv., *Bromus pictus* Hook. f., *Bromus setifolius* J. Presl var. *pictus* (Hook. f.) J.A. Cámara, comb. superfl.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3700 m.
Países: ARG(MEN, RNE, SCR, SJU); CHL(XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 7455* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 174* (CONC)].

Bromus setifolius J. Presl var. **setifolius**
Sin.: *Bromus macranthos* E. Desv. var. *setifolius* (J. Presl) E. Desv.
Referencias: Chiapella, J. & Ezcurra, C., 1999; Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(III, IV, VI, VII, VIII, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vallerini, J. 231* (SI), *Vanni, R. O. 4369* (CTES)]; CHL[*Steppe 624a* (*)].

Bromus spicatus Nees = **Tripogon spicatus** (Nees) Ekman
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Bromus squarrosus L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 2000 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Araya s.n.* (CONC)].

Bromus stamineus E. Desv. = **Bromus catharticus** Vahl var. **elata** (E. Desv.) Planchuelo
Referencias: Planchuelo, A. M., 2006.

Bromus sterilis L.
Sin.: *Anisantha sterilis* (L.) Nevski
Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, DFE, NEU, SFE); CHL(V, VI, VIII, IX, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 1404* (BAA)]; CHL[*Gunckel, L. H. 2028¼* (BAA)].

Bromus strictus Brongn. = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Bromus tectorum L.
Sin.: *Anisantha tectorum* (L.) Nevski
Referencias: Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE); CHL(IX, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vanni, R. O. 4452* (CTES)]; CHL[*Finot, V. L. 1995* (CONC)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Rosengurtt et al., 1970; Soreng et al., 2003).

Bromus trinii E. Desv. = **Bromus berteroanus** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus trinii E. Desv. var. *effusa* E. Desv. = **Bromus berteroanus** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus trinii E. Desv. var. *manicata* E. Desv. = **Bromus berteroanus** Colla

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus trinii E. Desv. var. *micranthera* E. Desv. = **Bromus berteroanus** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus trinii E. Desv. var. *pallidiflora* E. Desv. = **Bromus berteroanus** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus trinii E. Desv. var. *stricta* E. Desv. = **Bromus berteroanus** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus tunicatus Phil.
Sin.: *Bromus culmineus* Phil., *Bromus unioloides* Kunth var. *hirsuta* Speg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Gutiérrez, H. F. & Pensiero, J. F., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–4000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(IV, VI, VII, VIII, IX, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Werdermann, E. 1330* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20066* (CONC)].

Bromus unioloides (Willd.) Raspail, hom. illeg. = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus unioloides Kunth = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus unioloides Kunth f. *brevis* (Nees ex Steud.) Kloos = **Bromus catharticus** Vahl var. **rupestris** (Speg.) Planchuelo & P.M. Peterson
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus unioloides Kunth f. *chasmogama* Hack. = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus unioloides Kunth f. *cleistogama* Hack. = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus unioloides Kunth f. *humilis* (E. Desv.) Kloos = **Bromus lithobius** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus unioloides Kunth subf. *achalensis* Hack. ex Stuck. = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus unioloides Kunth var. *brevis* (Nees ex Steud.) Hack. = **Bromus catharticus** Vahl var. **rupestris** (Speg.) Planchuelo & P.M. Peterson
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus unioloides (Willd.) Raspail var. *coloratus* (Steud.) Pilg. = **Bromus coloratus** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus unioloides Kunth var. *elata* E. Desv. = **Bromus catharticus** Vahl var. **elata** (E. Desv.) Planchuelo

Bromus unioloides Kunth var. *glaucescens* Nees = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus unioloides Kunth var. *haenkeanus* (J. Presl) Shear = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus unioloides Kunth var. *hirsuta* Speg. = **Bromus tunicatus** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus unioloides Kunth var. *humilis* E. Desv. = **Bromus lithobius** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus unioloides Kunth var. *humilis* Speg., hom. illeg. = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus unioloides Kunth var. *micrantha* Speg. = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus unioloides Kunth var. *montanus* Hack. = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus unioloides Kunth var. *pubescens* Hack. = **Bromus lithobius** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus unioloides Kunth var. *rupestris* Speg. = **Bromus catharticus** Vahl var. **rupestris** (Speg.) Planchuelo & P.M. Peterson
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus unioloides Kunth var. *sanjuaninus* Hieron. = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus uruguayensis Arechav. = **Bromus brachyanthera** Döll var. **uruguayensis** (Arechav.) J.A. Cámara
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Bromus uruguayensis Arechav. var. *genuinus* Arechav., nom. inval. = **Bromus brachyanthera** Döll var. **uruguayensis** (Arechav.) J.A. Cámara
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Bromus uruguayensis Arechav. var. *glabrescens* Arechav. = **Bromus brachyanthera** Döll var. **brachyanthera**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Bromus uruguayensis Arechav. var. *robustior* Arechav. = **Bromus brachyanthera** Döll var. **brachyanthera**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus valdivianus Phil. = **Bromus catharticus** Vahl var. **elata** (E. Desv.) Planchuelo
Referencias: Planchuelo, A. M., 2006.

[Bromus villosissimus Hitchc.]
Referencias: Sulekic, A. A., 2004.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Bromus villosus Forssk. var. *rigidus* (Roth) Asch. & Graebn. = **Bromus rigidus** Roth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Bromus willdenowii Kunth = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Cabrera chrysoblepharis Lag. = **Axonopus chrysoblepharis** (Lag.) Chase
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994.

Calamagrostis alba (J. Presl) Steud. = **Deyeuxia alba** J. Presl subsp. **alba**

Calamagrostis alba (J. Presl) Steud. subsp. *tricholemma* Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Deyeuxia alba** J. Presl subsp. **tricholemma** (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a.

Calamagrostis ameghinoi (Speg.) Hauman = **Deyeuxia poaeoides** (Steud.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis amoena (Pilg.) Pilg. = **Deyeuxia filifolia** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a.

[Calamagrostis ampliflora Tovar]
Notas: Nombre dudoso.

Calamagrostis anomala Steud. ex Lechl. = **Nassella pubiflora** (Trin. & Rupr.) E. Desv. var. **pubiflora**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Calamagrostis antoniana (Griseb.) D.M. Moore, hom. illeg. = **Deyeuxia rigida** Kunth

Calamagrostis antoniana (Griseb.) Steud. ex Hitchc. = **Deyeuxia rigida** Kunth
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis antoniana Steud. ex Lechl., nom. nud. = **Deyeuxia rigida** Kunth

Calamagrostis armata (Döll) Parodi = **Deyeuxia alba** J. Presl subsp. **alba**

Calamagrostis armata (Döll) Parodi var. *subaristata* Parodi = **Deyeuxia alba** J. Presl subsp. **alba**

Calamagrostis armata (Döll) Parodi var. *subcontracta* (Döll) Parodi = **Deyeuxia alba** J. Presl subsp. **alba**

Calamagrostis beyrichiana Nees ex Döll = **Deyeuxia rupestris** (Trin.) Rúgolo var. **rupestris**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis breviaristata (Wedd.) Pilg. = **Deyeuxia breviaristata** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis brevifolia (J. Presl) Steud. = **Deyeuxia brevifolia** J. Presl var. **brevifolia**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a.

Calamagrostis brevifolia (J. Presl) Steud. var. *expansa* (Rúgolo & Villav.) Soreng = **Deyeuxia brevifolia** J. Presl var. **expansa** Rúgolo & Villav.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis cabrerae Parodi = **Deyeuxia cabrerae** (Parodi) Parodi var. **cabrerae**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis cabrerae Parodi var. *aristulata* (Rúgolo & Villav.) Soreng = **Deyeuxia cabrerae** (Parodi) Parodi var. **aristulata** Rúgolo & Villav.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis cabrerae Parodi var. *maxima* (Rúgolo) Soreng = **Deyeuxia cabrerae** (Parodi) Parodi var. **maxima** Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis cabrerae Parodi var. *trichopoda* (Parodi ex Rúgolo) Soreng = **Deyeuxia cabrerae** (Parodi) Parodi var. **trichopoda** Parodi ex Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis cajatambensis Pilg. = **Deyeuxia rigescens** (J. Presl) Türpe
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis calderillensis Pilg. = **Deyeuxia calderillensis** (Pilg.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a.

Calamagrostis capillaris Nees ex Steud. = **Agrostis longiberbis** Hack. ex L.B. Sm.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Calamagrostis cephalantha Pilg. = **Deyeuxia lagurus** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis chilensis (Desv.) R.E. Fr. = **Deyeuxia velutina** Nees & Meyen var. **velutina**

Calamagrostis chilensis Phil. = **Calamagrostis epigejos** (L.) Roth
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis chrysantha (J. Presl) Steud. = **Deyeuxia chrysantha** J. Presl var. **chrysantha**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis chrysantha (J. Presl) Steud. var. *phalaroides* (Wedd.) Soreng = **Deyeuxia chrysantha** J. Presl var. **phalaroides** (Wedd.) Villav.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis chrysophylla (Phil.) Govaerts = **Deyeuxia chrysophylla** Phil.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis chrysostachya (E. Desv.) Kuntze = **Deyeuxia chrysostachya** E. Desv.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis chrysostachya (E. Desv.) V.N. Vassil., comb. superfl. = **Deyeuxia chrysostachya** E. Desv.

Calamagrostis crispa (Rúgolo & Villav.) Govaerts = **Deyeuxia crispa** Rúgolo & Villav.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis cryptolopha (Wedd.) Hitchc. = **Deyeuxia cryptolopha** Wedd.

Calamagrostis curta (Wedd.) Hitchc., comb. superfl. = **Deyeuxia curta** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a.

Calamagrostis curta (Wedd.) Pilg. = **Deyeuxia curta** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a.

Calamagrostis curvula (Wedd.) Pilg. = **Deyeuxia curvula** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis deserticola (Phil.) Phil. = **Deyeuxia deserticola** Phil. var. **deserticola**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis deserticola (Phil.) Phil. var. *breviaristata* (Rúgolo & Villav.) Soreng = **Deyeuxia deserticola** Phil. var. **breviaristata** Rúgolo & Villav.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis diemii (Rúgolo) Soreng = **Deyeuxia diemii** Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis eminens (J. Presl) Steud. = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **eminens**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis eminens (J. Presl) Steud. f. *brevipila* Hack. = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **fulva** (Griseb.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a.

Calamagrostis eminens (J. Presl) Steud. var. *discreta* (Rúgolo & Villav.) Soreng = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **discreta** Rúgolo & Villav.

Calamagrostis eminens (J. Presl) Steud. var. *fulva* (Griseb.) Soreng = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **fulva** (Griseb.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis eminens (J. Presl) Steud. var. *grisebachiana* Kuntze = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **fulva** (Griseb.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a.

Calamagrostis eminens (J. Presl) Steud. var. *sordida* Kuntze = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **eminens**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis eminens (J. Presl) Steud. var. *tunariensis* Kuntze = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **eminens**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

[Calamagrostis epigejos (L.) Roth]
Sin.: *Arundo epigejos* L., *Calamagrostis chilensis* Phil.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Calamagrostis erythrostachya (E. Desv.) Hack. = **Deyeuxia erythrostachya** E. Desv. var. **erythrostachya**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

[Calamagrostis falklandiae Steud.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso. Probablemente *Trisetum spicatum* s.l.

Calamagrostis fiebrigii Pilg. = **Deyeuxia fiebrigii** (Pilg.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a.

Calamagrostis filifolia (Wedd.) Pilg., hom. illeg. = **Deyeuxia filifolia** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a.

Calamagrostis freticola (Speg.) Macloskie = **Deyeuxia freticola** Speg.

Calamagrostis fuegiana Speg. = **Deyeuxia poaeoides** (Steud.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis fulva (Griseb.) Kuntze = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **fulva** (Griseb.) Rúgolo

Calamagrostis fuscata (J. Presl) Steud. = **Deyeuxia fuscata** J. Presl
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis gayana (Steud.) Soreng = **Deyeuxia erythrostachya** E. Desv. var. **erythrostachya**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis gayana (Steud.) Soreng var. *neuquenensis* (Rúgolo) Soreng = **Deyeuxia erythrostachya** E. Desv. var. **neuquenensis** Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis grata Phil. = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **fulva** (Griseb.) Rúgolo

Calamagrostis gusindei Pilg. ex Skottsb. = **Deyeuxia rigida** Kunth
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis hackelii Lillo = **Deyeuxia hackelii** (Lillo) Parodi
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis heterophylla (Wedd.) Pilg. = **Deyeuxia heterophylla** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a.

Calamagrostis hieronymi Hack. = **Deyeuxia hieronymi** (Hack.) Türpe
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis hirthii Phil. = **Deschampsia laxa** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Calamagrostis hookeri (Syme) Druce = **Deyeuxia poaeoides** (Steud.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis humboldtiana Steud. = **Deyeuxia recta** Kunth
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis intermedia (J. Presl) Steud. = **Deyeuxia intermedia** J. Presl
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis lagurus (Wedd.) Pilg. = **Deyeuxia lagurus** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis laxiflora Phil. = **Agrostis glabra** (J. Presl) Kunth var. **melanthes** (Phil.) Rúgolo & De Paula
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Calamagrostis lilloi Hack. = **Deyeuxia polygama** (Griseb.) Parodi
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis lilloi Hack. f. *grandiflora* Hack. = **Deyeuxia polygama** (Griseb.) Parodi
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis longearistata (Wedd.) Hack. ex Sodiro = **Deyeuxia rupestris** (Trin.) Rúgolo var. **rupestris**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis longearistata (Wedd.) Hack. ex Sodiro f. *minor* Kämpf = **Deyeuxia rupestris** (Trin.) Rúgolo var. **minor** (Kämpf) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis longearistata (Wedd.) Hack. ex Sodiro f. *pilosa* Kämpf = **Deyeuxia rupestris** (Trin.) Rúgolo f. **pilosa** (Kämpf) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis macloviana Steud. = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **alopecurus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Calamagrostis magellanica Phil. = **Deyeuxia poaeoides** (Steud.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis malamalensis Hack. = **Deyeuxia malamalensis** (Hack.) Parodi
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis montevidensis Nees = **Deyeuxia viridiflavescens** (Poir.) Kunth var. **montevidensis** (Nees) Cabrera & Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis montevidensis Nees var. *ampliflora* Döll = **Deyeuxia viridiflavescens** (Poir.) Kunth var. **viridiflavescens**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis montevidensis Nees var. *armata* Döll = **Deyeuxia alba** J. Presl subsp. **alba**

Calamagrostis montevidensis Nees var. *linearis* Hack. = **Deyeuxia rupestris** (Trin.) Rúgolo var. **rupestris**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis montevidensis Nees var. *subcontracta* Döll = **Deyeuxia alba** J. Presl subsp. **alba**

Calamagrostis mutica Steud. ex Lechl., nom. nud. = **Deyeuxia chrysantha** J. Presl var. **chrysantha**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis nardifolia (Griseb.) Hack. = **Deyeuxia velutina** Nees & Meyen var. **nardifolia** (Griseb.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., comb. superfl. = **Deyeuxia poaeoides** (Steud.) Rúgolo

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn. var. *poaeoides* (Steud.) Hack. = **Deyeuxia poaeoides** (Steud.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis nematophylla (Wedd.) Pilg. = **Deyeuxia orbignyana** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis nemoralis Kuntze, hom. illeg. = **Deyeuxia viridis** Phil.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis nemoralis Phil. = **Deyeuxia viridis** Phil.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis nitida Hack. = **Deyeuxia chrysantha** J. Presl var. **chrysantha**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis orbignyana (Wedd.) Pilg. = **Deyeuxia orbignyana** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis patagonica (Speg.) Macloskie = **Deyeuxia patagonica** Speg.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis patula Steud. = **Cortaderia pilosa** (d'Urv.) Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Calamagrostis pentapogonodes Kuntze = **Deyeuxia vicunarum** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis plumosa Spreng. = **Jarava plumosa** (Spreng.) S.W.L. Jacobs & J. Everett
Referencias: Jacobs, S. W. L. & Everett, J., 1997; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Calamagrostis poaeoides Steud. = **Deyeuxia poaeoides** (Steud.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis polygama (Griseb.) Parodi = **Deyeuxia polygama** (Griseb.) Parodi
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

[Calamagrostis preslii (Kunth) Hitchc.]
Sin.: *Agrostis preslii* Kunth
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Calamagrostis pulvinata Hack. = **Deyeuxia vicunarum** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. ex Steud. = **Deyeuxia recta** Kunth
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis reitzii Swallen = **Deyeuxia reitzii** (Swallen) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis rigescens (J. Presl) Scribn. = **Deyeuxia rigescens** (J. Presl) Türpe
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis rigida (Kunth) Trin. ex Steud. = **Deyeuxia rigida** Kunth
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis robusta (Phil.) Phil., hom. illeg. = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **eminens**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis rosea (Griseb.) Hack. = **Deyeuxia colorata** Beetle
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis rosea (Griseb.) Hack. f. *typica* Hack., nom. inval. = **Deyeuxia colorata** Beetle

Calamagrostis rosea (Griseb.) Hack. var. *macrochaeta* Hack. = **Deyeuxia tarmensis** (Pilg.) Sodiro var. **macrochaeta** (Hack.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis rosea (Griseb.) Hack. var. *viridula* Hack. = **Deyeuxia colorata** Beetle
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis rupestris Trin. = **Deyeuxia rupestris** (Trin.) Rúgolo var. **rupestris**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis scirpiformis Phil. = **Cortaderia pilosa** (d'Urv.) Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Calamagrostis sclerantha Hack. = **Deyeuxia sclerantha** (Hack.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis setiflora (Wedd.) Pilg. = **Deyeuxia setiflora** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a.

Calamagrostis spiciformis Hack. = **Deyeuxia sclerantha** (Hack.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis spiciformis Hack. var. *acutiflora* Hack. ex Buchtien, nom. nud. = **Deyeuxia vicunarum** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis spicigera (J. Presl) Steud. = **Deyeuxia spicigera** J. Presl var. **spicigera**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis spicigera (J. Presl) Steud. var. *cephalotes* (Wedd.) Soreng = **Deyeuxia spicigera** J. Presl var. **cephalotes** (Wedd.) Rúgolo & Villav.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis stipitata Hitchc. = **Deyeuxia erythrostachya** E. Desv. var. **erythrostachya**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis stricta (Timm) Koeler = **Deyeuxia poaeoides** (Steud.) Rúgolo

Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis suka Speg. = **Deyeuxia suka** (Speg.) Parodi
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis tarijensis Pilg. = **Deyeuxia tarmensis** (Pilg.) Sodiro var. **macrochaeta** (Hack.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis tarmensis Pilg. = **Deyeuxia tarmensis** (Pilg.) Sodiro var. **tarmensis**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis tarmensis Pilg. var. *macrochaeta* (Hack.) Soreng = **Deyeuxia tarmensis** (Pilg.) Sodiro var. **macrochaeta** (Hack.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis tenuifolia (Phil.) R.E. Fr., hom. illeg. = **Deyeuxia curvula** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis tenuifolia Kunth = **Muhlenbergia tenuifolia** (Kunth) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Calamagrostis trichodonta (Wedd.) Soreng = **Deyeuxia trichodonta** Wedd. var. **trichodonta**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis trichophylla Pilg. = **Deyeuxia filifolia** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a.

Calamagrostis variegata (Phil.) Kuntze, hom. illeg. = **Deyeuxia breviaristata** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis velutina (Nees & Meyen) Hauman, hom. illeg. = **Deyeuxia velutina** Nees & Meyen var. **velutina**

Calamagrostis velutina (Nees & Meyen) Steud. = **Deyeuxia velutina** Nees & Meyen var. **velutina**

Calamagrostis velutina (Nees & Meyen) Steud. var. *breviculmis* Hauman = **Deyeuxia velutina** Nees & Meyen var. **velutina**

Calamagrostis vicunarum (Wedd.) Pilg. = **Deyeuxia vicunarum** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis vicunarum (Wedd.) Pilg. var. *abscondita* Pilg. = **Deyeuxia vicunarum** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis vicunarum (Wedd.) Pilg. var. *elatior* Pilg. = **Deyeuxia vicunarum** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis vicunarum (Wedd.) Pilg. var. *humilior* Pilg. = **Deyeuxia vicunarum** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis vicunarum (Wedd.) Pilg. var. *minima* Pilg. = **Deyeuxia minima** (Pilg.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Calamagrostis vicunarum (Wedd.) Pilg. var. *setulosa* Pilg. = **Deyeuxia vicunarum** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis vicunarum (Wedd.) Pilg. var. *tenuior* Pilg. = **Deyeuxia vicunarum** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis violacea (Wedd.) Hitchc. = **Deyeuxia violacea** Wedd. var. **violacea**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis violacea (Wedd.) Hitchc. var. *puberula* (Rúgolo & Villav.) Soreng = **Deyeuxia violacea** Wedd. var. **puberula** Rúgolo & Villav.

Calamagrostis viridiflavescens (Poir.) Steud. = **Deyeuxia viridiflavescens** (Poir.) Kunth var. **viridiflavescens**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis viridiflavescens (Poir.) Steud. var. *montevidensis* (Nees) Kämpf = **Deyeuxia viridiflavescens** (Poir.) Kunth var. **montevidensis** (Nees) Cabrera & Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Calamagrostis viridis (Phil.) Soreng = **Deyeuxia viridis** Phil.

Calotheca Desv.

Número de especies: 1

Calotheca brizoides (Lam.) Desv.
Sin.: *Briza brizoides* (Lam.) Kuntze, *Briza elegans* (P. Beauv.) Döll, *Briza patula* Phil., *Briza tandilensis* Parodi, *Bromus brizoides* Lam., *Calotheca elegans* P. Beauv.

Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Matthei, O. R., 1975; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1981a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–400 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS); CHL(VI, VIII, IX); URY(CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19272* (SI), *Cabrera, A. L. 17183* (LP)]; BRA[*Swallen, J. R. 7592* (PEL)]; CHL[*Marticorena, C. 450* (CONC)]; URY[*Gallinal, J. P. 795* (SI), *Rosengurtt, B. 11268* (MVFA)].

Calotheca dilatata Link = **Chascolytrum erectum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Calotheca elegans P. Beauv. = **Calotheca brizoides** (Lam.) Desv.

Calotheca macrostachya J. Presl = **Chascolytrum erectum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Calotheca microstachya J. Presl = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Calotheca montevidensis Spreng. ex Steud., nom. nud. = **Chascolytrum erectum** (Lam.) Desv.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Calotheca poiformis Spreng. = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Calotheca reniformis J. Presl = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Calotheca rotundata (Kunth) Roem. & Schult. = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Calotheca stricta Hook. & Arn. = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Calotheca stricta Hook. & Arn. var. *mandoniana* Griseb. = **Poidium monandrum** (Hack.) Matthei

Calotheca triloba (Nees) Kunth = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Campulosus aromaticus Trin. ex Steud., nom. nud. = **Ctenium aromaticum** (Walter) A.W. Wood
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Campulosus brachystachyus Nees = **Ctenium brachystachyum** (Nees) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Campulosus cirrosus Nees = **Ctenium cirrosum** (Nees) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Canastra Morrone, Zuloaga, Filg. & Davidse

Número de especies: 1

Canastra aristella (Döll) Zuloaga & Morrone
Sin.: *Panicum aristellum* Döll
Referencias: Zuloaga, F. O., Giussani, L. M. & Morrone, O., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14888* (MBM)].

Capriola dactylon (L.) Kuntze = **Cynodon dactylon** (L.) Pers. var. **dactylon**

Caryochloa bahiensis Steud. = **Luziola bahiensis** (Steud.) Hitchc.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Caryochloa brasiliensis Trin. = **Luziola brasiliensis** (Trin.) Swallen
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Caryochloa montevidensis Spreng. = **Piptochaetium montevidense** (Spreng.) Parodi
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Parodi, L. R., 1944; Renvoize, S. A., 1988.

Caryochloa montevidensis Spreng. var. *brasiliensis* (Trin. & Rupr.) Döll ap. Ekman = **Piptochaetium montevidense** (Spreng.) Parodi

Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Parodi, L. R., 1944; Renvoize, S. A., 1988; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Catabrosa P. Beauv.

Número de especies: 2

Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.
Sin.: *Aira aquatica* L.
Referencias: Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1981a; Nicora, E. G., 1973a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12393* (BAA, BAB)]; CHL[*Pisano, E. 5160* (CONC, SI)].

Catabrosa burkartii Hitchc. = **Poa perligulata** Pilg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Catabrosa frigida Phil. = **Puccinellia frigida** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Nicora, E. G., 1995a.

Catabrosa glaucescens Phil. = **Puccinellia glaucescens** (Phil.) Parodi

Catabrosa latifolia Phil., nom. nud. = **Catabrosa werdermannii** (Pilg.) Nicora & Rúgolo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Catabrosa magellanica Hook. f. = **Puccinellia magellanica** (Hook. f.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Catabrosa tenuifolia J. Presl = **Puccinellia preslii** (Hack.) Ponert
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Catabrosa werdermannii (Pilg.) Nicora & Rúgolo
Sin.: *Catabrosa latifolia* Phil., nom. nud., *Panicularia latifolia* (Phil.) Kuntze, *Phippsia werdermanii* Pilg., *Phippsia werdermanii* Pilg. f. *major* Pilg., *Phippsia werdermanii* Pilg. f. *minor* Pilg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1981a.
Hierba. Perenne. Nativa. 3200–3500 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU); CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2548* (SI)]; CHL[*Muñoz-Schick, M. 3868* (SGO)].

Catapodium Link

Número de especies: 1 introducida

Catapodium rigidum (L.) Dony
Sin.: *Desmazeria rigida* (L.) Tutin, *Glyceria rigida* (L.) Sm., *Poa rigida* L., *Scleropoa rigida* (L.) Griseb.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1987; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1980.
Hierba. Anual. Introducida. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, SFE); BRA(RGS); CHL(IV, V, VIII, IX, X, XII, RME); URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 18216* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 644* (ICN)]; CHL[*Gunckel, L. H. 30648* (CONC)]; URY[*Herter, W. G. F. 79515* (SI)].

Cenchrus L.

Número de especies: 6, 1 introducida

Cenchrus ciliaris L.
Sin.: *Pennisetum ciliare* (L.) Link
Referencias: Biurrun, F. & Pagliari, E., 1998; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Filgueiras, T. S., 1984; Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994c; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–900 m.
Países: ARG(COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4651* (SI)]; BRA[*Kornelius s.n.* (BLA)]; PRY[*Hahn, W. J. 1618* (MO, PY), *Zuloaga, F. O. 7323* (SI)].

Cenchrus echinatus L.
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1970a; De Lisle, D. G., 1963; Filgueiras, T. S., 1984; Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994c; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, X, IDE); PRY(APY, APA, CEN, CON, COA, GUA, PHA, SPE); URY(ART, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4629* (SI)]; BRA[*Jönsson, G. 68a* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 703* (MO, NY)]; PRY[*Krapovickas, A. 14254* (BAA)]; URY[*Rosengurtt, B. 7099b* (MVFA)].

Cenchrus echinatus L. f. *longispina* Hack. = **Cenchrus longispinus** (Hack.) Fernald
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Cenchrus granularis L. = **Mnesithea granularis** (L.) de Koning & Sosef
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Cenchrus incertus M.A. Curtis
Sin.: *Cenchrus pauciflorus* Benth., *Cenchrus pauciflorus* Benth. var. *muricatus* Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1967; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(III); PRY(CEN); URY(CAS, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pozner, R. 173* (CTES, SI)]; BRA[*Klein, R. M. 5857* (HBR)]; CHL[*Pisano, E. 992* (CONC)]; PRY[*Balansa, B. 151* (US)]; URY[*Herter, W. G. F. 68056a* (SI)].

Cenchrus longisetus M.C. Johnst. = **Pennisetum villosum** R. Br. ex Fresen.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald
Sin.: *Cenchrus echinatus* L. f. *longispina* Hack.
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1967; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(COS, ERI, LRI, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sorarú, S. B. 1851* (BAF)].

Cenchrus myosuroides Kunth var. **longisetus** Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1967; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 23603* (SI)].

Cenchrus myosuroides Kunth var. **myosuroides**
Sin.: *Cenchrus scabridus* Arechav., *Pennisetum myosuroides* (Kunth) Spreng.
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1967, 1969a, 1970a; Filgueiras, T. S., 1984; Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994c; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–2200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(I, III, VII); PRY(APY, COA, GUA, PAI); URY(COL, MON, PAY, RNO, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4331* (SI)]; BRA[*Orth s.n.* (SP)]; CHL[*Garaventa, A. 5475* (CONC), *Werdermann, E. 713* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 3567* (BAA, MO, SI)]; URY[*Del Puerto, O. s.n.* (IAC)].

Cenchrus parviflorus Poir. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Cenchrus pauciflorus Benth. = **Cenchrus incertus** M.A. Curtis
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Cenchrus pauciflorus Benth. var. *muricatus* Caro & E.A. Sánchez = **Cenchrus incertus** M.A. Curtis
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Cenchrus racemosus L. = **Tragus racemosus** (L.) All.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Cenchrus scabridus Arechav. = **Cenchrus myosuroides** Kunth var. **myosuroides**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Cenchrus tribuloides L.
Referencias: Filgueiras, T. S., 1984; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pott s.n.* (BLA)].

Ceratochloa breviaristata Hook. = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Ceratochloa brevis Nees ex B.D. Jacks., nom. nud. = **Bromus catharticus** Vahl var. **rupestris** (Speg.) Planchuelo & P.M. Peterson
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Ceratochloa haenkeana J. Presl = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Ceratochloa haenkeana J. Presl var. *patens* Nees, nom. nud. = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Ceratochloa haenkeana J. Presl var. *subspicata* Nees, nom. nud. = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Ceratochloa mango (E. Desv.) Holuby = **Bromus mango** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Ceratochloa secunda J. Presl = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Ceratochloa unioloides (Willd.) P. Beauv. = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Ceratochloa valdiviana (Phil.) Holub = **Bromus catharticus** Vahl var. **elata** (E. Desv.) Planchuelo
Referencias: Planchuelo, A. M., 2006.

Chaboissaea E. Fourn.

Número de especies: 1

Chaboissaea atacamensis (Parodi) P.M. Peterson & Annable
Sin.: *Muhlenbergia atacamensis* Parodi, *Muhlenbergia atacamensis* Parodi var. *brachyanthera* Parodi
Referencias: Peterson, P. M. & Annable, C. R., 1992; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 9125* (SI), *Zuloaga, F. O. 6032* (SI)].

Chaetaria laevis Nees = **Aristida laevis** (Nees) Kunth
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999.

Chaetaria pallens (Cav.) P. Beauv. = **Aristida pallens** Cav. var. **pallens**
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999; Mujica Sallés, J., 1996.

Chaetaria pallens (Cav.) P. Beauv. var. *tenuifolia* Nees = **Aristida venustula** Arechav. var. **venustula**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Chaetaria recurvata (Kunth) Roem. & Schult. = **Aristida recurvata** Kunth
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1999.

Chaetochloa argentina (R.A.W. Herrm.) Hitchc. = **Setaria lachnea** (Nees) Kunth
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Chaetochloa grisebachii (E. Fourn.) Scribn. = **Setaria grisebachii** E. Fourn.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Chaetochloa leucopila Scribn. & Merr. = **Setaria leucopila** (Scribn. & Merr.) K. Schum.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Chaetochloa macrostachya (Kunth) Scribn. & Merr. = **Setaria macrostachya** Kunth
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Chaetochloa oblongata (Griseb.) Hitchc. = **Setaria oblongata** (Griseb.) Parodi
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Chaetochloa poiretiana (Schult.) Hitchc. = **Setaria sulcata** Raddi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Chaetochloa scandens (Schrad. ex Schult.) Scribn. = **Setaria scandens** Schrad. ex Schult.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Chaetochloa vulpiseta (Lam.) Hitchc. & Chase = **Setaria vulpiseta** (Lam.) Roem. & Schult. var. **vulpiseta**
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Chaetotropis araucana Phil. = **Polypogon exasperatus** (Trin.) Renvoize
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Chaetotropis asperigluma (Steud.) Nicora = **Polypogon exasperatus** (Trin.) Renvoize
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Chaetotropis chilensis Kunth = **Polypogon chilensis** (Kunth) Pilg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Chaetotropis elongata (Kunth) Björkman = **Polypogon elongatus** Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Chaetotropis elongata (Kunth) Björkman var. *longearistata* Nicora = **Polypogon elongatus** Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Chaetotropis hackelii (R.E. Fr.) Björkman = **Polypogon exasperatus** (Trin.) Renvoize
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Chaetotropis imberbis (Phil.) Björkman = **Polypogon imberbis** (Phil.) Johow
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Chaetotropis imberbis (Phil.) Björkman var. *bonariensis* Nicora = **Polypogon imberbis** (Phil.) Johow
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Chaetotropis latifolia Phil. = **Polypogon chilensis** (Kunth) Pilg.

Chaetotropis parvula (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Nicora = **Polypogon parvulus** Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Chaetotropis rioplatensis (Herter) Björkman = **Polypogon imberbis** (Phil.) Johow

Chamaeraphis composita (Kunth) Kuntze = **Setaria vulpiseta** (Lam.) Roem. & Schult. var. **vulpiseta**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Chamaeraphis paucifolia Morong = **Setaria paucifolia** (Morong) Lindm.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Chascolytrum Desv.

Número de especies: 6, 2 endémicas

Chascolytrum coarctatum Phil. = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Chascolytrum erectum (Lam.) Desv.
Sin.: *Briza erecta* Lam., *Briza macrostachya* (J. Presl) Steud., *Briza montevidensis* Trin. ex Steud., nom. nud., *Calotheca dilatata* Link, *Calotheca macrostachya* J. Presl, *Calotheca montevidensis* Spreng. ex Steud., nom. nud., *Festuca brizoides* Spreng., *Festuca erecta* (Lam.) Spreng. ex Kunth, nom. illeg.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1981b; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SFE, SLU); BRA(RGS, SCA); PRY(CAU, PAI); URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1125* (SI)]; BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 1014* (ICN)]; PRY[*Zardini, E. M. 29035* (MO, PY)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 2256* (MVFA)].

Chascolytrum lamarckianum (Nees) Matthei
Sin.: *Briza fusca* (Parodi) Parodi, *Briza lamarckiana* Nees, *Briza lindmanii* Ekman, *Briza subaristata* Lam. var. *fusca* Parodi
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1981b; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M. 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1200 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 3913* (MVM, SI)]; BRA[*Smith, L. B. 12834* (HBR, R, US)]; URY[*Herter, W. G. F. 50481* (SI), *Mujica Sallés, J. 353* (MVFA)].

Chascolytrum nutans Lindl. & Nees = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Chascolytrum paleapiliferum (Parodi) Matthei
Sin.: *Briza paleapilifera* Parodi
Referencias: Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1981b; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pastore, A. L. s.n.* (SI)].

Chascolytrum parodianum (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Matthei
Sin.: *Briza parodiana* Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(LAV, MAL).
Ejemplares de referencia: BRA[*Valls, J. F. M. 2254* (ICN)]; URY[*Rosengurtt, B. 5273* (K, MVFA)].

Chascolytrum rotundatum (Kunth) Kunth
= **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Chascolytrum rufum J. Presl = **Poidium rufum** (J. Presl) Matthei
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988.

Chascolytrum scabrum (Nees ex Steud.) Matthei
Sin.: *Briza scabra* (Nees ex Steud.) Ekman, *Chondrachyrum scabrum* Nees ex Steud.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rosengurtt, B. 8984* (MVFA)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Soreng et al., 2003).

Chascolytrum spicigerum J. Presl = **Poidium uniolae** (Nees) Matthei
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Chascolytrum strictum (Hook. & Arn.) E. Desv.
= **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Chascolytrum subaristatum (Lam.) Desv.
Sin.: *Briza berteroniana* Steud., *Briza nutans* Lindl. ex Steud., *Briza poiformis* (Spreng.) Kuntze, *Briza reniformis* (J. Presl) Steud., *Briza rotundata* (Kunth) Steud., *Briza sellowii* Nees ex Steud., *Briza stricta* (Hook. & Arn.) Steud., *Briza subaristata* Lam., *Briza subaristata* Lam. var. *interrupta* (Hack. ex Stuck.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Briza triloba* Nees, *Briza triloba* Nees f. *pumila* Hack. ex Kneuck., *Briza triloba* Nees f. *violascens* Hack., *Briza triloba* Nees var. *grandiflora* Döll, *Briza triloba* Nees var. *interrupta* Hack., *Briza triloba* Nees var. *typica* Parodi, nom. inval., *Briza violascens* Steud., *Bromus rotundatus* Kunth, *Calotheca microstachya* J. Presl, *Calotheca poiformis* Spreng., *Calotheca reniformis* J. Presl, *Calotheca rotundata* (Kunth) Roem. & Schult., *Calotheca stricta* Hook. & Arn., *Calotheca triloba* (Nees) Kunth, *Chascolytrum coarctatum* Phil., *Chascolytrum nutans* Lindl. & Nees, *Chascolytrum rotundatum* (Kunth) Kunth, *Chascolytrum strictum* (Hook. & Arn.) E. Desv., *Chascolytrum trilobum* (Nees) Desv., *Festuca commersonii* Spreng., nom. superfl.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1981b; Renvoize, S. A., 1988; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Torres, M. A., 1970a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); PRY(GUA); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 336* (SI), *Kneucker, J. A. 264* (BM, K, MA, MVFA, US)]; BRA[*Smith, L. B. 12834a* (US), *Smith, L. B. 13411* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 994990* (CONC)]; PRY[*Montes, J. E. 12879* (LP)]; URY[*Mujica Sallés, J. 471* (MVFA)].

Chascolytrum trilobum (Nees) Desv. = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Chauvinia chilensis Steud. = **Spartina densiflora** Brongn.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Chloris Sw.

Número de especies: 18, 4 endémicas, 2 introducidas

Chloris accumbens Hack. ex Arechav., nom. nud.
= **Chloris berroi** Arechav.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris affinis Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Sánchez, E. A., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 8367* (LIL)].

Chloris argentina (Hack.) Lillo & Parodi = **Eustachys retusa** (Lag.) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris bahiensis Steud. = **Eustachys paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **caribaea** (Spreng.) Nowack
Referencias: Nowack, R., 1995; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris bahiensis Steud. f. *glabrescens* Hack.
= **Eustachys paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **caribaea** (Spreng.) Nowack
Referencias: Nowack, R., 1995; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris barbata Sw.
Sin.: *Andropogon barbatus* L., hom. illeg., *Chloris inflata* Link, *Chloris paraguaiensis* Steud.
Referencias: Anderson, D. E., 1974; Fosberg, F. R., 1976; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Anual. Nativa. 100–1000 m.
Países: ARG(BAI, FOR, MIS); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 740* (BAA, MERL, SI)]; PRY[*Molina, A. M. 4411* (BAB)].

Chloris berroi Arechav.
Sin.: *Chloris accumbens* Hack. ex Arechav., nom. nud.
Referencias: Anderson, D. E., 1974; Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, SFE); URY(MON, PAY, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 6254* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 6385* (US)].

Chloris beyrichiana Kunth = **Chloris pycnothrix** Trin.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Chloris brachyathera (Hack. ex Parodi) Herter = **Chloris ciliata** Sw. f. **breviseta** Hack.
Referencias: Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004.

Chloris brevipila Roseng. & Izag. = **Eustachys brevipila** (Roseng. & Izag.) Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris calvescens Hack. = **Eustachys calvescens** (Hack.) Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris canterae Arechav.
Referencias: Anderson, D. E., 1974; Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(RGS); PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, MIE, PAI, PHA); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Muñoz, J. D. 5421* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 2702* (ICN)]; PRY[*Ramírez, J. R. 35* (BAA)]; URY[*Del Puerto, O. 1958* (MVFA)].

Chloris canterae Arechav. var. *grandiflora* (Roseng. & Izag.) Anderson = **Chloris grandiflora** Roseng. & Izag.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris capensis (Houtt.) Thell. = **Eustachys paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **paspaloides**

Chloris capensis (Houtt.) Thell. var. *bahiensis* (Steud.) Parodi = **Eustachys paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **caribaea** (Spreng.) Nowack
Referencias: Nowack, R., 1995; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris capensis (Houtt.) Thell. var. *glabrescens* (Hack.) Parodi = **Eustachys paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **caribaea** (Spreng.) Nowack
Referencias: Nowack, R., 1995; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris caribaea Spreng. = **Eustachys paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **caribaea** (Spreng.) Nowack
Referencias: Nowack, R., 1995; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris castilloniana Lillo & Parodi var. **castilloniana**
Referencias: Anderson, D. E., 1974; Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 3450* (SI)]; PRY[*Vanni, R. O. 2166* (CTES)].

Chloris castilloniana Lillo & Parodi var. **pubescens** Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Anderson, D. E., 1974; Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1971a; Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–800 m.
Países: ARG(FOR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 4088* (SI)]; PRY[*Adámoli s.n.* (BAA)].

Chloris ciliata Sw. f. **breviseta** Hack.
Sin.: *Chloris brachyathera* (Hack. ex Parodi) Herter, *Chloris ciliata* Sw. var. *brachyathera* Hack. ex Parodi, *Chloris ciliata* Sw. var. *brachyathera* Hack. in Kurtz, nom. nud.
Referencias: Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004; Parodi, L. R., 1919; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Saravia Toledo, C. 1510* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 25779* (CTES, FCQ, G)].

Chloris ciliata Sw. f. **ciliata**
Sin.: *Chloris ciliata* Sw. var. *texana* Vasey
Referencias: Anderson, D. E., 1974; Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS); PRY(APY); URY(ART, CAS, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 252* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 22771* (CTES)]; PRY[*Mereles, F. 2629* (G)]; URY[*Herter, W. G. F. 78757* (SI), *Pedersen, T. M. 13870* (CTES)].

Chloris ciliata Sw. f. **reptans** A.M. Molina & Rúgolo
Referencias: Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sulekic, A. A. 855* (SI)].

Chloris ciliata Sw. var. *brachyathera* Hack. ex Parodi = **Chloris ciliata** Sw. f. **breviseta** Hack.
Referencias: Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004.

Chloris ciliata Sw. var. *brachyathera* Hack. in Kurtz, nom. nud. = **Chloris ciliata** Sw. f. **breviseta** Hack.
Referencias: Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004.

Chloris ciliata Sw. var. *texana* Vasey = **Chloris ciliata** Sw. f. **ciliata**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris compressa DC. = **Chloris virgata** Sw.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris confertifolia Trin. = **Eustachys distichophylla** (Lag.) Nees
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris crinita Lag. = **Trichloris crinita** (Lag.) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris dandyana C.D. Adams = **Chloris elata** Desv.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

[Chloris dandyana C.D. Adams var. breviaristata (Hack.) A.M. Molina & Rúgolo]
Sin.: *Chloris polydactyla* (L.) Sw. var. *breviaristata* Hack.
Notas: Nombre dudoso.

[Chloris dandyana C.D. Adams var. stolonifera (Parodi) A.M. Molina & Rúgolo]
Sin.: *Chloris polydactyla* (L.) Sw. f. *stolonifera* Parodi
Notas: Nombre dudoso.

Chloris distichophylla Lag. = **Eustachys distichophylla** (Lag.) Nees
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris distichophylla Lag. var. *acuminata* (Trin.) Hack. = **Eustachys distichophylla** (Lag.) Nees
Referencias: Molina, A. M., 1996; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris distichophylla Lag. var. *argentina* Hack. = **Eustachys distichophylla** (Lag.) Nees
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris dubia Kunth = **Leptochloa dubia** (Kunth) Nees
Referencias: Renvoize, S. A., 1998.

Chloris dusenii Ekman = **Eustachys uliginosa** (Hack.) Herter
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Chloris elata Desv.
Sin.: *Andropogon polydactylon* L., nom. illeg., *Chloris dandyana* C.D. Adams, *Chloris polydactyla* (L.) Sw., *Chloris polydactyla* (L.) Sw. f. *pauciradiata* Kurtz
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 2001b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA); URY(ART, FLA, RNO, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 638* (SI)]; BRA[*Pereira, S. C. 93* (ICN)]; PRY[*Morrone, O. 193* (SI), *Vanni, R. O. 1809* (CTES)]; URY[*Meyer, T. 10783* (LIL)].

Chloris elegans Kunth = **Chloris virgata** Sw.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris gayana Kunth
Sin.: *Chloris guaranitica* Parodi
Referencias: Anderson, D. E., 1974; Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS); CHL(IDE); PRY(APY).

Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14708* (SI)]; BRA[*Swallen, J. R. 7302* (PEL)]; CHL[*Lücke, K. 21* (CONC)]; PRY[*Vanni, R. O. 2110* (CTES)].

Chloris glabrescens (Hack.) Roseng. & Izag. = **Eustachys paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **caribaea** (Spreng.) Nowack
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris grandiflora Roseng. & Izag.
Sin.: *Chloris canterae* Arechav. var. *grandiflora* (Roseng. & Izag.) Anderson
Referencias: Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, SFE, SLU); BRA(RGS); URY(ART, CLA, COL, FLO, LAV, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rosengurtt, B. 10172* (SI)]; BRA[*Porto, M. L. 918* (ICN)]; URY[*Montoro Guarch, A. 503* (SI), *Rosengurtt, B. 7341* (MVFA)].

Chloris guaranitica Parodi = **Chloris gayana** Kunth
Referencias: Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004.

Chloris halophila Parodi var. **halophila**
Sin.: *Gymnopogon beyrichianus* auct. non Parodi
Referencias: Anderson, D. E., 1974; Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tivano, J. C. 125* (SI)].
Notas: Citada para Brasil y Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Molina & Rúgolo de Agrasar, 2004).

Chloris halophila Parodi var. **humilis** C.Müller
Referencias: Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004; Müller, C., 1983; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–3500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 1960* (SI)].

Chloris humilis Kunth = **Chloris pycnothrix** Trin.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Chloris inflata Link = **Chloris barbata** Sw.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris mendocina Phil. = **Trichloris crinita** (Lag.) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris orthonoton Döll
Referencias: Anderson, D. E., 1974; Longhi-Wagner, H. M., 2001b; Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 5817* (BAA)]; BRA[*Araújo, A. A. 613* (BLA)].

Chloris paraguaiensis Steud. = **Chloris barbata** Sw.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris parodiana Roseng. & Izag.
Referencias: Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR); PRY(CEN, CON, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 27834* (CTES)]; PRY[*Rosengurtt, B. 5979* (BAA, MVFA)].

Chloris parvispicula Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004; Sánchez, E. A., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Scarpa, G. F. 640* (SI)]; PRY[*Vanni, R. O. 1809* (CTES, LIL)].

Chloris petraea Sw. = **Eustachys petraea** (Sw.) Desv.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris petraea Thunb., hom. illeg. = **Eustachys paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **paspaloides**
Referencias: Nowack, R., 1995; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris pluriflora (E. Fourn.) Clayton = **Trichloris pluriflora** E. Fourn. f. **pluriflora**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris polydactyla (L.) Sw. = **Chloris elata** Desv.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris polydactyla (L.) Sw. f. *pauciradiata* Kurtz = **Chloris elata** Desv.

Chloris polydactyla (L.) Sw. f. *stolonifera* Parodi = **Chloris dandyana** C.D. Adams var. **stolonifera** (Parodi) A.M. Molina & Rúgolo

Chloris polydactyla (L.) Sw. var. *breviaristata* Hack. = **Chloris dandyana** C.D. Adams var. **breviaristata** (Hack.) A.M. Molina & Rúgolo

Chloris pycnothrix Trin.
Sin.: *Chloris beyrichiana* Kunth, *Chloris humilis* Kunth, *Chloris radiata* (L.) Sw. var. *beyrichiana* (Kunth) Hack., *Chloris radiata* auct. non (L.) Sw., *Gymnopogon beyrichianus* (Kunth) Parodi, *Gymnopogon haumanii* Parodi, *Gymnopogon radiatus* (L.) Parodi var. *beyrichiana* (Kunth) Parodi
Referencias: Anderson, D. E., 1974; Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1990; Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1600 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 15395* (SI), *Seijo, G. J. 847* (CTES, MNES)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 14473* (SI), *Hatschbach, G. 23969* (MBM)]; PRY[*Rosengurtt, B. 5849* (MVFA)].

Chloris radiata auct. non (L.) Sw. = **Chloris pycnothrix** Trin.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Chloris radiata (L.) Sw.
Sin.: *Agrostis radiata* L., *Gymnopogon radiatus* (L.) Parodi
Referencias: Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2800 m.
Países: BRA(RGS); CHL(I).
Ejemplares de referencia: BRA[*Beetle, A. A. 1498* (MO)]; CHL[*Marticorena, A. 275* (CONC)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Molina & Rúgolo de Agrasar, 2004).

Chloris radiata (L.) Sw. var. *beyrichiana* (Kunth) Hack. = **Chloris pycnothrix** Trin.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Chloris retusa Lag. = **Eustachys retusa** (Lag.) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chloris sesquiflora Burkart
Referencias: Anderson, D. E., 1974; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(COS, ERI); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25676* (SI)]; PRY[*Degen, R. 3169* (FCQ, SI)].

Chloris swartziana Döll = **Eustachys uliginosa** (Hack.) Herter
Referencias: Molina, A. M., 1996.

Chloris truncata R. Br.
Referencias: Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–200 m.
Países: ARG(SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tivano, J. C. 298* (SI)].

Chloris uliginosa Hack. = **Eustachys uliginosa** (Hack.) Herter
Referencias: Molina, A. M., 1996.

Chloris virgata Sw.
Sin.: *Chloris compressa* DC., *Chloris elegans* Kunth
Referencias: Anderson, D. E., 1974; Molina, A. M. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2004; Parodi, L. R., 1919; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 200–2800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(I); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 521* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 3338* (CONC)]; PRY[*Molina, A. M. 4389* (BAB)].

Chloropsis blanchardiana (E. Fourn. ex Scribn.) Kuntze = **Trichloris crinita** (Lag.) Parodi

Chloropsis crinita (Lag.) Kuntze = **Trichloris crinita** (Lag.) Parodi

Chloropsis mendocina (Phil.) Kuntze = **Trichloris crinita** (Lag.) Parodi

Chloropsis pluriflora (E. Fourn.) Kuntze = **Trichloris pluriflora** E. Fourn. f. **pluriflora**

Chondrachyrum scabrum Nees ex Steud. = **Chascolytrum scabrum** (Nees ex Steud.) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Chondrosum barbatum (Lag.) Clayton = **Bouteloua barbata** Lag.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chondrosum parryi E. Fourn. = **Bouteloua parryi** (E. Fourn.) Griffiths
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chondrosum simplex (Lag.) Kunth = **Bouteloua simplex** Lag.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Chrysopogon Trin., nom. cons.

Número de especies: 1 introducida

Chrysopogon minarum (Nees) Benth. = **Sorghastrum minarum** (Nees) Hitchc.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Chrysopogon stipoides Trin., nom. superfl. = **Sorghastrum minarum** (Nees) Hitchc.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty
Sin.: *Andropogon squarrosus* auct. non L. f., *Holcus zizanioides* (L.) Kuntze ex Stuck., *Phalaris zizanioides* L., *Vetiveria zizanioides* (L.) Nash
Referencias: Parodi, L. R., 1959; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, MIS); PRY(CEN, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 680* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 5358* (MO, PY)].

Chusquea Kunth

Número de especies: 32, 17 endémicas

Chusquea affinis Munro ex A. Camus = **Chusquea ramosissima** Lindm.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Chusquea andina Phil.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. 521* (US)].

Chusquea anelytra Nees
Sin.: *Dendragrostis anelytra* Munro, nom. nud.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 700–1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6131* (HBR, US)].

Chusquea anelytroides Rupr. ex Döll
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14058* (MBM)].

Chusquea argentina Parodi = **Chusquea culeou** E. Desv.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999.

Chusquea bambusoides (Raddi) Hack. var. **bambusoides**
Sin.: *Chusquea gaudichaudii* Kunth, *Nastus brunneus* Desv., *Rettbergia bambusoides* Raddi
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; McClure, F. A. & Smith, L. B., 1967; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 100–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4641* (HBR, US)].

Chusquea bambusoides (Raddi) Hack. var. **minor** McClure
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; McClure, F. A. & Smith, L. B., 1967; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2020* (US)].

Chusquea bambusoides (Raddi) Hack. subsp. *oxylepis* Hack. = **Chusquea oxylepis** (Hack.) Ekman
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Chusquea breviglumis Phil. = **Chusquea culeou** E. Desv.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Chusquea capitata Nees
Sin.: *Rettbergia capitata* Döll, nom. inval.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; McClure, F. A. & Smith, L. B., 1967; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 600–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 10619* (HBR, US)].

Chusquea capituliflora Trin. var. **capituliflora**
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 4613* (HBR, US)].

Chusquea capituliflora Trin. var. **pubescens** McClure & L.B. Sm.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 572* (US)].

Chusquea ciliata Phil.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (US)].

Chusquea culeou E. Desv.
Sin.: *Chusquea argentina* Parodi, *Chusquea breviglumis* Phil., *Chusquea culeou* E. Desv. f. *longiramea* Parodi
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Nicora, E. G., 1978.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(IV, VII, VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 5386* (SI), *Parodi, L. R. 11737* (BAA, US)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20005* (CONC, SGO), *Gunckel, L. H. 16029* (SI)].

Chusquea culeou E. Desv. f. *longiramea* Parodi = **Chusquea culeou** E. Desv.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Chusquea cumingii Nees
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cuming, H. 639* (US), *Jiles, C. 231* (SI)].

Chusquea deficiens Parodi
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Parodi, L. R., 1941a.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Devoto, F. E. 1010* (BAA, US)].

Chusquea discolor Hack. = **Chusquea oligophylla** Rupr.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Chusquea effusa Renvoize = **Colanthelia lanciflora** (McClure & L.B. Sm.) McClure
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Chusquea elegans Renvoize = **Chusquea mimosa** McClure & L.B. Sm. subsp. **mimosa**
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Chusquea fernandeziana Phil.
Sin.: *Chusquea ligulata* Munro, p.p.
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(V, IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (US)].

Chusquea gaudichaudii Kunth = **Chusquea bambusoides** (Raddi) Hack. var. **bambusoides**
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Chusquea gracilis McClure & L.B. Sm.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 700–800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Swallen, J. R. 8285* (US)].

Chusquea heterophylla Griseb., hom. illeg. = **Guadua trinii** (Nees) Nees ex Rupr.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Chusquea ibiramae McClure & L.B. Sm.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 300–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3449* (US)].

Chusquea intermedia Steud., nom. nud. = **Chusquea valdiviensis** E. Desv.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Chusquea juergensii Hack.
Sin.: *Chusquea swallenii* McClure & L.B. Sm.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J.,

Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 400–600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(MAL, RIV, TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Jürgens, C. 322* (US, W), *Swallen, J. R. 8284* (US)]; URY[*Rosengurtt, B. 4821b* (SI)].

Chusquea leptophylla Nees
Sin.: *Arthrostylidium leptophyllum* (Nees) Döll, *Arthrostylidium trinii* auct. non Rupr.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 700–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6717* (HBR, US)].

Chusquea ligulata Munro, p.p. = **Chusquea fernandeziana** Phil.
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002.

Chusquea lorentziana Griseb.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Parodi, L. R., 1941a.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 1000–1700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 181* (CORD), *Morrone, O. 3523* (SI)].

Chusquea macrostachya Phil.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(X, XI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Kausel, E. M. L. 4753* (SI), *Philippi, R. A. 517* (US)].

Chusquea meyeriana Rupr. ex Döll
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; McClure, F. A. & Smith, L. B., 1967; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 300–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 13304* (SI), *Reitz, P. R. 5441* (HBR, US)].

Chusquea mimosa McClure & L.B. Sm. subsp. **australis** L.G. Clark
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 900–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 415* (SI), *Soderstrom, T. R. 2042* (US)].

Chusquea mimosa McClure & L.B. Sm. subsp. **mimosa**
Sin.: *Chusquea elegans* Renvoize, *Chusquea peruviana* auct. non E.G. Camus
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 200–1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6139* (US)].

Chusquea montana Phil. f. **montana**
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Matthei, O. R., 1998.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bernasconi, P. s.n.* (SI)]; CHL[*Philippi, R. A. 516* (SGO, US)].

Chusquea montana Phil. f. **nigricans** (Phil.) Matthei
Sin.: *Chusquea nigricans* Phil.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: CHL(X, XI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 542* (CONC)].

Chusquea nigricans Phil. = **Chusquea montana** Phil. f. **nigricans** (Phil.) Matthei

Chusquea nudiramea L.G. Clark
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bresolin, A. 1002* (US)].

Chusquea oligophylla Rupr.
Sin.: *Chusquea discolor* Hack., *Chusquea wettsteinii* Hack.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 700–1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 3658* (SI), *Reitz, P. R. 4102* (HBR, US)].

Chusquea oxylepis (Hack.) Ekman
Sin.: *Chusquea bambusoides* (Raddi) Hack. subsp. *oxylepis* Hack.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; McClure, F. A. & Smith, L. B., 1967; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 9691* (HBR, US)].

Chusquea palenae Phil. = **Chusquea valdiviensis** E. Desv.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Chusquea parviflora Phil. = **Chusquea quila** Kunth
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Chusquea peruviana auct. non E.G. Camus = **Chusquea mimosa** McClure & L.B. Sm. subsp. **mimosa**
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Chusquea phacellophora Pilg. = **Chusquea ramosissima** Lindm.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Chusquea pinifolia (Nees) Nees
Sin.: *Arundinaria pinifolia* Nees, *Ludolphia pinifolia* (Nees) A. Dietr.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 700–2300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22210* (MBM, SI)].

[Chusquea pubescens Steud.]
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999.
Notas: Nombre dudoso.

Chusquea quila auct. non Kunth = **Chusquea valdiviensis** E. Desv.

Chusquea quila Kunth
Sin.: *Arundo quila* Molina, *Chusquea parviflora* Phil., *Chusquea quila* Kunth var. *laxiflora* E. Desv., *Chusquea quila* Kunth var. *longipila* E.G. Camus, *Coliquea quila* (Molina) Steud. ex Bibra, nom. illeg., *Cortaderia quila* (Molina) Stapf, *Gynerium quila* (Molina) Nees & Meyen, *Moorea quila* (Molina) Stapf, *Nastus productus* (Pilg.) Holttum, *Oreiostachys producta* Pilg.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO, US)].

Chusquea quila Kunth var. *laxiflora* E. Desv. = **Chusquea quila** Kunth
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Chusquea quila Kunth var. *longipila* E.G. Camus = **Chusquea quila** Kunth
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Chusquea ramosissima Lindm.
Sin.: *Chusquea affinis* Munro ex A. Camus, *Chusquea phacellophora* Pilg.
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; McClure, F. A. & Smith, L. B., 1967; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Stutz, L. C., 1983.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAN, GUA, ITA, PAI); URY(ART, MAL, RIV, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Klein, R. M. 9115* (HBR, SI, US)]; BRA[*Dutra, J. 418* (SI), *Klein, R. M. 11421* (HBR, US)]; PRY[*Stutz, L. C. 1693* (G)]; URY[*Herter, W. G. F. 1089b* (MO)].

Chusquea sellowii Rupr.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 1000–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 7820* (HBR, US)].

Chusquea swallenii McClure & L.B. Sm. = **Chusquea juergensii** Hack.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Chusquea tenella Nees
Sin.: *Chusquea tenella* Nees var. *latifolia* Dutra, *Chusquea uruguayensis* Arechav.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 200–900 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CLA, LAV, MAL, RIV, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1746* (SI), *Tressens, S. G. 6414* (CTES)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 17788* (SI), *Reitz, P. R. 14763* (HBR, US)]; URY[*Felippone, F. 4432* (SI), *Mujica Sallés, J. 405* (MVFA)].

Chusquea tenella Nees var. *latifolia* Dutra = **Chusquea tenella** Nees
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999.

Chusquea tenuiflora Phil. = **Chusquea uliginosa** Phil.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Chusquea uliginosa Phil.
Sin.: *Chusquea tenuiflora* Phil.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(X, XI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Montero, G. 4126* (SI), *Philippi, R. A. 520* (US)].

Chusquea urelytra Hack.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dziewa, A. 7* (MBM)].

Chusquea uruguayensis Arechav. = **Chusquea tenella** Nees
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Chusquea valdiviensis E. Desv.
Sin.: *Chusquea intermedia* Steud., nom. nud., *Chusquea palenae* Phil., *Chusquea quila* auct. non Kunth
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; McClure, F. A., 1973.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. s.n.* (BA, SI)]; CHL[*Gay, C. 292* (US), *Junge, C. 59* (SI)].

Chusquea wettsteinii Hack. = **Chusquea oligophylla** Rupr.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Chusquea windischii L.G. Clark
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Clark, L. G. 1046* (HBR, ISC, MBM, MO, SP, US)].

[Cinna valdiviana Phil.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Cinnagrostis polygama Griseb. = **Deyeuxia polygama** (Griseb.) Parodi
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Clomena peruviana P. Beauv. = **Muhlenbergia peruviana** (P. Beauv.) Steud.

Coelorachis aurita (Steud.) A. Camus = **Mnesithea aurita** (Steud.) de Koning & Sosef
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Coelorachis balansae (Hack.) A. Camus = **Mnesithea balansae** (Hack.) de Koning & Sosef
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Coelorachis balansae (Hack.) Herter, comb. superfl. = **Mnesithea balansae** (Hack.) de Koning & Sosef
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Coelorachis parodiana Henrard = **Mnesithea parodiana** (Henrard) de Koning & Sosef
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Coelorachis selloana (Hack.) A. Camus = **Mnesithea selloana** (Hack.) de Koning & Sosef
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Coelorachis selloana (Hack.) Herter, comb. superfl. = **Mnesithea selloana** (Hack.) de Koning & Sosef
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Coix L.

Número de especies: 1 introducida

Coix lacryma-jobi L.
Referencias: Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1987; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–100 m.
Países: ARG(BAI, MIS, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1298* (SI)]; BRA[*Bresolin, A. 1225* (FLOR, HBR, US)]; PRY[*Soria, N. 7328* (MO)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Rosengurtt et al., 1970).

Colanthelia McClure & E.W. Sm.

Número de especies: 4, 2 endémicas

Colanthelia cingulata (McClure & L.B. Sm.) McClure
Sin.: *Aulonemia cingulata* McClure & L.B. Sm.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 9679* (US)].

Colanthelia intermedia (McClure & L.B. Sm.) McClure
Sin.: *Aulonemia intermedia* McClure & L.B. Sm.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 4612* (US)].

Colanthelia lanciflora (McClure & L.B. Sm.) McClure
Sin.: *Aulonemia lanciflora* McClure & L.B. Sm., *Chusquea effusa* Renvoize
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 800–1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2346* (US)].

Colanthelia rhizantha (Hack.) McClure
Sin.: *Arundinaria rhizantha* Hack.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Clark, L. G., 2000.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 100–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 856* (SI)]; BRA[*Jürgens, C. 6314* (US, W)].

Coleataenia gynerioides Griseb. = **Panicum prionitis** Nees
Referencias: Zuloaga, F. O., 1989.

Coliquea quila (Molina) Steud. ex Bibra, nom. illeg. = **Chusquea quila** Kunth
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Colpodium planifolium (Kuntze) K. Schum. = **Poa planifolia** Kuntze
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Cornucopiae hyemalis Walter = **Agrostis hyemalis** (Walter) Britton, Stern & Poggenb.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Cornucopiae perennans Walter = **Agrostis perennans** (Walter) Tuck.

Cortaderia Stapf, nom. cons.

Número de especies: 8, 3 endémicas

Cortaderia araucana Stapf
Sin.: *Cortaderia araucana* Stapf var. *fuenzalidae* Acevedo, *Cortaderia araucana* Stapf var. *skottsbergii* Acevedo, *Cortaderia argentea* (Nees) Stapf, *Cortaderia dioica* Speg., *Cortaderia longicauda* Hack., *Cortaderia quila* (Nees & Meyen) Stapf var. *patagonica* Speg., *Gynerium argenteum* Nees, *Gynerium argenteum* Nees var. *parviflorum* E. Desv., *Moorea araucana* (Stapf) Stapf
Referencias: Astegiano, M. E., Anton, A. M. & Connor, H. E., 1995; Nicora, E. G., 1973a.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 6237* (SI)]; CHL[*Espinosa Bustos, M. R. s.n.* (SGO)].

Cortaderia araucana Stapf var. *fuenzalidae* Acevedo = **Cortaderia araucana** Stapf
Referencias: Astegiano, M. E., Anton, A. M. & Connor, H. E., 1995; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Cortaderia araucana Stapf var. *skottsbergii* Acevedo = **Cortaderia araucana** Stapf
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Cortaderia argentea (Nees) Stapf = **Cortaderia araucana** Stapf
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Cortaderia atacamensis (Phil.) Pilg.
Sin.: *Gynerium atacamense* Phil.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3900 m.
Países: ARG(JUJ, LRI); CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arenas, P. 1880* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 686* (CONC), *Zöllner, O. 11282* (SI)].

Cortaderia dioica Speg. = **Cortaderia araucana** Stapf
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf
Sin.: *Cortaderia quila* (Nees & Meyen) Stapf, *Gynerium jubatum* Lemoine ex Carrière
Referencias: Astegiano, M. E., Anton, A. M. & Connor, H. E., 1995; Connor, H. E. & Edgar, E., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 5174* (SI), *Türpe, A. M. 219* (LIL)].

Cortaderia longicauda Hack. = **Cortaderia araucana** Stapf
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Cortaderia minima Conert = **Cortaderia pilosa** (d'Urv.) Hack.
Referencias: Astegiano, M. E., Anton, A. M. & Connor, H. E., 1995.

Cortaderia pilosa (d'Urv.) Hack.
Sin.: *Ampelodesmos australis* Brongn. ex Duperrey, *Arundo pilosa* d'Urv., *Calamagrostis patula* Steud., *Calamagrostis scirpiformis* Phil., *Cortaderia minima* Conert, *Cortaderia pilosa* (d'Urv.) Hack. var. *minima* (Conert) Nicora, *Gynerium nanum* Phil., *Gynerium pilosum* (d'Urv.) Macloskie, *Poa phragmites* Phil.
Referencias: Astegiano, M. E., Anton, A. M. & Connor, H. E., 1995; Moore, D. M., 1983; Nicora, E. G., 1978; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 4194* (BAA), *Ulibarri, E. A. 1243* (SI)]; CHL[*Benove, A. 48* (SI), *Dusén, P. K. H. 613* (CORD)].

Cortaderia pilosa (d'Urv.) Hack. var. *minima* (Conert) Nicora = **Cortaderia pilosa** (d'Urv.) Hack.
Referencias: Astegiano, M. E., Anton, A. M. & Connor, H. E., 1995.

Cortaderia quila (Molina) Stapf = **Chusquea quila** Kunth
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Cortaderia quila (Nees & Meyen) Stapf = **Cortaderia jubata** (Lemoine ex Carrière) Stapf

Cortaderia quila (Nees & Meyen) Stapf var. *patagonica* Speg. = **Cortaderia araucana** Stapf
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Cortaderia rudiuscula Stapf
Sin.: *Gynerium rudiusculum* (Stapf) Kuntze ex Hack.
Referencias: Astegiano, M. E., Anton, A. M. & Connor, H. E., 1995; Nicora, E. G., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(CHU, COR, JUJ, MEN, SJU); CHL(III, IV, V, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Anton, A. M. 217* (CORD), *Ariza Espinar, L. 160* (CORD)]; CHL[*Cuming, H. 386* (K)].

Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.
Sin.: *Arundo dioica* Spreng., hom. illeg., *Arundo selloana* Schult. & Schult. f.
Referencias: Astegiano, M. E., Anton, A. M. & Connor, H. E., 1995; Burkart, A., 1969a; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G., 1973a, 1978; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, RME); URY(CAS, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 390* (CORD)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 14573* (SI), *Krapovickas, A. 46446* (CTES)]; CHL[*Gunckel, L. H. 22949* (CONC)]; URY[*Herter, W. G. F. 578* (SI)].

Cortaderia speciosa (Nees & Meyen) Stapf
Sin.: *Gynerium argenteum* Nees var. *strictum* E. Desv., *Gynerium speciosum* Nees & Meyen
Referencias: Astegiano, M. E., Anton, A. M. & Connor, H. E., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU); CHL(I, II, III, IV, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Botta, S. M. 753* (LIL, SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 44726* (CONC), *Werdermann, E. 178* (SI)].

Cortaderia vaginata Swallen
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2398* (HBR, US)].

Corynephorus P. Beauv.

Número de especies: 2 introducidas

Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr.
Sin.: *Aira divaricata* Pourr.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1999.
Hierba. Anual. Introducida. 0–800 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*sin colector 174* (SGO)].

Corynephorus fasciculatus Boiss. & Reut.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Villamil, C. B. & Sánchez, G. Z., 1987.

Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Villamil, C. B. 4123* (SI)].

Cottea Kunth

Número de especies: 1

Cottea pappophoroides Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Roig, F. A., 1971.
Hierba. Perenne. Nativa. 900–2300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 577* (SI)].

Craepalia temulenta (L.) Schrank = **Lolium temulentum** L.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Craspedorhachis texana (Hitchc.) Pilg. var. *stolonifera* (Parodi) Pilg. = **Willkommia texana** Hitchc. var. **stolonifera** Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Critesion brachyatherum (Phil.) A. Löve = **Hordeum brachyatherum** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Critesion chilense (Roem. & Schult.) A. Löve = **Hordeum chilense** Roem. & Schult.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Critesion comosum (J. Presl) A. Löve = **Hordeum comosum** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Critesion cordobense (Bothmer, Jacobsen & Nicora) A. Löve = **Hordeum cordobense** Bothmer, Jacobsen & Nicora
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Critesion flexuosum (Steud.) A. Löve = **Hordeum flexuosum** Nees ex Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Critesion glaucum (Steud.) A. Löve = **Hordeum murinum** L. subsp. **glaucum** (Steud.) Tzvelev
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Critesion lechleri (Steud.) A. Löve = **Hordeum lechleri** (Steud.) Schenck
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Critesion magellanicum (Parodi & Nicora) A. Löve = **Hordeum patagonicum** (Hauman) Covas subsp. **magellanicum** (Parodi ex Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Critesion mustersii (Nicora) A. Löve = **Hordeum patagonicum** (Hauman) Covas subsp. **mustersii** (Nicora) Bothmer, Giles & Jacobsen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Critesion parodii (Covas) A. Löve = **Hordeum parodii** Covas
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Critesion procerum (Nevski) A. Löve = **Hordeum procerum** Nevski
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Critesion pubiflorum (Hook. f.) A. Löve = **Hordeum pubiflorum** Hook. f. subsp. **pubiflorum**
Referencias: Baden, C. & Bothmer, R., 1994.

Critesion pubiflorum (Hook. f.) A. Löve subsp. *halophilum* (Griseb.) A. Löve = **Hordeum pubiflorum** Hook. f. subsp. **halophilum** (Griseb.) Baden & Bothmer
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Critesion pusillum (Nutt.) A. Löve = **Hordeum pusillum** Nutt.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Critesion pusillum (Nutt.) A. Löve subsp. *euclaston* (Steud.) A. Löve = **Hordeum euclaston** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Critesion santacrucense (Parodi ex Nicora) A. Löve = **Hordeum patagonicum** (Hauman) Covas subsp.

santacrucense (Parodi ex Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Critesion setifolium (Parodi ex Nicora) A. Löve = **Hordeum patagonicum** (Hauman) Covas subsp. **setifolium** (Parodi ex Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Critesion tetraploideum (Covas) A. Löve = **Hordeum tetraploideum** Covas
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Cryptochloris spathacea Speg., nom. nud. = **Leymus erianthus** (Phil.) Dubcovsky

Cryptochloris spathacea Benth.= **Tetrapogon spathaceus** (Benth.) Hack.

Cryptochloris spathacea auct. non Benth. = **Leymus erianthus** (Phil.) Dubcovsky
Referencias: Seberg, O. & Linde-Laursen, I., 1996.

Ctenium Panz
Número de especies: 4

[Ctenium aromaticum (Walter) A.W. Wood]
Sin.: *Campulosus aromaticus* Trin. ex Steud., nom. nud., *Ctenium carolinianum* Panz
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Ctenium brachystachyum (Nees) Kunth
Sin.: *Campulosus brachystachyus* Nees
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1988; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10407* (BM, L, NY, US)]; PRY[*Zardini, E. M. 51275* (AS, MO)].

Ctenium brevispicatum J.G. Sm.
Sin.: *Ctenium trinii* Ekman
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Anual. Nativa. 1100–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Jonsson, C. 1340a* (BM, MO, NY, US)].

Ctenium carolinianum Panz = **Ctenium aromaticum** (Walter) A.W. Wood
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Ctenium cirrosum (Nees) Kunth
Sin.: *Campulosus cirrosus* Nees
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 320a* (MO)].

Ctenium polystachyum Balansa
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1988; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24004* (MBM), *Swallen, J. R. 8996* (US)]; PRY[*Balansa, B. 4341* (US)].

Ctenium trinii Ekman = **Ctenium brevispicatum** J.G. Sm.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Cymbopogon Spreng.
Número de especies: 1 introducida

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
Sin.: *Andropogon citratus* DC.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–2700 m.
Países: ARG(MIS); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 603* (SI)]; CHL[*Richter s.n.* (CONC)].

Cynodon Rich.
Número de especies: 12, 5 endémicas, 2 introducidas

Cynodon affinis Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1969b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, MIS); CHL(I, IV, V, VIII, RME); URY(SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21604* (SI), *Nicora, E. G. 6976* (BAA)]; CHL[*Gunckel, L. H. 20156* (CONC)]; URY[*Osten, C. 4432* (SI)].

Cynodon aristiglumis Caro & E.A. Sánchez = **Cynodon dactylon** (L.) Pers. var. **dactylon**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Cynodon aristulatus Caro & E.A. Sánchez = **Cynodon dactylon** (L.) Pers. var. **dactylon**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. **biflorum** Merino
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1969b; dos Santos, A. M. P. V. & Boechat, S. C., 1994; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, ERI, LPA, TUC); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 1213* (BAA)]; BRA[*Rambo, B. s.n.* (PACA)].

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. **dactylon**
Sin.: *Capriola dactylon* (L.) Kuntze, *Cynodon aristiglumis* Caro & E.A. Sánchez, *Cynodon aristulatus* Caro & E.A. Sánchez, *Cynodon erectus* J. Presl, *Cynodon pascuus* Nees, *Panicum dactylon* L.
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1969b; dos Santos, A. M. P. V. & Boechat, S. C., 1994; Nicora, E. G., 1978; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IDE, RME); PRY(COA, GUA); URY(MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21038* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 608* (SI), *Hatschbach, G. 15193* (MBM)]; CHL[*Jiles, C. 3916* (CONC)]; PRY[*Jörgensen, P. 3541* (BM)]; URY[*Alonso Paz, E. 3670* (MVFQ)].

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. *hirsutissima* (Litard. & Maire) Maire = **Cynodon hirsutissimus** (Litard. & Maire) Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. **longiglumis** Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1969b; Mujica Sallés, J., 1996; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(ITA); URY(MAL, MON, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 8846* (SI)]; PRY[*Schrottky, C. 210* (SI)]; URY[*Mujica Sallés, J. 443* (MVFA), *Rimbach 21* (SI)].

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. *maritimum* (Kunth) Hack. = **Cynodon maritimus** Kunth var. **maritimus**
Referencias: dos Santos, A. M. P. V. & Boechat, S. C., 1994; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. **pilosus** Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1969b; dos Santos, A. M. P. V. & Boechat, S. C., 1994; Longhi-Wagner, H. M., 2001b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, FOR, LPA, MEN, SAL, SDE, SJU); BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Caro, J. A. 333* (BAA)]; BRA[*Valls, J. F. M. 3273* (ICN)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Peterson et al., 2001).

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. *sarmentosus* Parodi = **Cynodon niemfuensis** Vanderyst
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. *subvar. hirsutissima* Litard. & Maire = **Cynodon hirsutissimus** (Litard. & Maire) Caro & E.A. Sánchez

Cynodon distichioides Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(CAS, MAL, MON).
Ejemplares de referencia: URY[*Bordalé, L. F. s.n.* (BAA)].

Cynodon erectus J. Presl = **Cynodon dactylon** (L.) Pers. var. **dactylon**

Cynodon fascicularis (Lam.) Raspail = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **fascicularis** (Lam.) N. Snow
Referencias: Snow, N., 1998c.

Cynodon grandispiculus Caro & E.A. Sánchez = **Cynodon maritimus** Kunth var. **grandispiculus** Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Cynodon hirsutissimus (Litard. & Maire) Caro & E.A. Sánchez
Sin.: *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *hirsutissima* (Litard. & Maire) Maire, *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *subvar. hirsutissima* Litard. & Maire
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1969b; Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1970b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI, LPA, MEN, MIS, SFE); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. s.n.* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 26a* (SI)].

Cynodon hirsutus Stent var. **hirsutus**
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1969b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, SFE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 18215* (SI), *Nicora, E. G. 629* (SI)].

Cynodon hirsutus Stent var. **sesquiflorus** Parodi
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1970b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Petetin, C. A. 514* (BAA, SI)].

Cynodon laeviglumis Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1969b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(LPA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Legaspi s.n.* (BAA)].

Cynodon maritimus Kunth var. **breviglumis** Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1969b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 4314* (LP)].

Cynodon maritimus Kunth var. **grandispiculus** Caro & E.A. Sánchez
Sin.: *Cynodon grandispiculus* Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1969b; dos Santos, A. M. P. V. & Boechat, S. C., 1994; Longhi-Wagner, H. M., 2001b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LRI, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(MAL, MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 2737* (BA, BAA, BAB, LIL, LP, SI, US)]; BRA[*Simas, V. 231* (BLA)]; URY[*Berro, M. B. 5865* (SI)].

Cynodon maritimus Kunth var. **maritimus**
Sin.: *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *maritimum* (Kunth) Hack.
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1970b; dos Santos, A. M. P. V. & Boechat, S. C., 1994; Longhi-Wagner, H. M., 2001b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, MIS, RNE, SFE, TUC); BRA(RGS); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rosillo, R. D. 372b* (SI)]; BRA[*Jung 71* (ICN)]; URY[*Felippone, F. 5424* (SI)].
Notas: Citada para Chile y Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Peterson et al., 2001).

Cynodon maritimus Kunth var. **vaginiflorus** Caro
Referencias: Caro, J. A., 1983; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Isler 6* (US)].

Cynodon mucronatus Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1969b; dos Santos, A. M. P. V. & Boechat, S. C., 1994; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, MIS); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Porta, R. E. 85* (BAA)]; BRA[*Rambo, B. s.n.* (PACA)].

Cynodon niemfuensis Vanderyst
Sin.: *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *sarmentosus* Parodi, *Cynodon parodii* Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 2001b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Pohl, R. W., 1980.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(TUC); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Heredia Luna s.n.* (BAA)]; BRA[*Valls, J. F. M. 3270* (ICN)].

Cynodon nitidus Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1400 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 704* (GH, LIL, NY, SI, US)].

Cynodon parodii Caro & E.A. Sánchez = **Cynodon niemfuensis** Vanderyst
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Cynodon pascuus Nees = **Cynodon dactylon** (L.) Pers. var. **dactylon**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Cynodon pedicellatus Caro
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(MON).
Ejemplares de referencia: URY[*Praderi 579* (LIL)].

Cynodon plectostachyum (K. Schum.) Pilg.
Sin.: *Leptochloa plectostachya* K. Schum.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1969b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, MIS, SFE); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5589* (SI)]; PRY[*Vanni, R. O. 1866* (CTES)].

Cynodon ternatus A. Rich. = **Digitaria ternata** (A. Rich.) Stapf
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974; Subils, R., 1995.

Cynosurus L.

Número de especies: 2 introducidas

Cynosurus aegyptius L. = **Dactyloctenium aegyptium** (L.) Willd.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Cynosurus aureus L. = **Lamarckia aurea** (L.) Moench
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Cynosurus cristatus L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1970a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, MEN, NEU, RNE, TDF); CHL(V, VIII, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 805* (SI), *Soriano, A. 5152* (BAB)]; CHL[*Barros, E. 1589* (CONC)].

Cynosurus dominguensis Jacq. = **Leptochloa virgata** (L.) P. Beauv. var. **virgata**
Referencias: Nicora, E. G., 1995b.

Cynosurus durus L. = **Sclerochloa dura** (L.) P. Beauv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Cynosurus echinatus L.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Macaya, J. & Faúndez Y., L., 1996; Nicora, E. G., 1978; Petetin, C. A., 1950; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Anual. Introducida. 0–2200 m.
Países: ARG(BAI, LPA, NEU, RNE, TDF); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, IJF, RME); URY(COL, MAL, MON, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 1331* (CORD)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20075* (CONC)]; URY[*Burkart, A. 18175* (SI)].

Cynosurus indicus L. = **Eleusine indica** (L.) Gaertn.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Cynosurus paspaloides Vahl = **Eustachys paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **paspaloides**

Cynosurus tristachyos Lam. = **Eleusine tristachya** (Lam.) Lam.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Cynosurus virgatus L. = **Leptochloa virgata** (L.) P. Beauv. var. **virgata**
Referencias: Nicora, E. G., 1995b.

Dactylis L.

Número de especies: 1 introducida

Dactylis caespitosa G. Forst. = **Poa flabellata** (Lam.) Raspail
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Dactylis glomerata L.
Sin.: *Bromus glomeratus* (L.) Scop., *Festuca glomerata* (L.) All.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Longhi-Wagner, H. M., 1987; Macaya, J. & Faúndez Y., L., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, TDF, TUC); BRA(RGS); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 1318* (SI)]; BRA[*H.S.A. 10* (ICN)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996037* (CONC)]; URY[*Herter, W. G. F. 953* (SI)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Soreng et al., 2003).

Dactyloctenium Willd.

Número de especies: 1 introducida

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.
Sin.: *Cynosurus aegyptius* L.
Referencias: Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Mariano, M., 1978b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN,

SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(PHA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 1593* (CORD)]; PRY[*Zuloaga, F. O. 7329* (SI)]; URY[*Montoro 2469* (MVFA)].

Danthonia DC., nom. cons.

Número de especies: 11, 7 endémicas

Danthonia americana Scribn. = **Danthonia californica** Bol. var. **americana** (Scribn.) Hitchc.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Danthonia andina Phil. = **Rytidosperma virescens** (E. Desv.) Nicora var. **virescens**
Referencias: Grun, S., 1993.

Danthonia annableae P.M. Peterson & Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Sulekic, A. A., 1998; Sulekic, A. A., 1999b.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lugo, M. A. 117* (CORD), *Sulekic, A. A. 1833* (SI)].

Danthonia araucana Phil.
Referencias: Baeza, C. M., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–1000 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 156a* (CONC)].

Danthonia aureofulva E. Desv. = **Danthonia chilensis** E. Desv. var. **aureofulva** (E. Desv.) Baeza
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Danthonia californica Bol. var. **americana** (Scribn.) Hitchc.
Sin.: *Danthonia americana* Scribn., *Danthonia grandiflora* Phil., nom. illeg.
Referencias: Baeza, C. M., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–500 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 22* (B, CONC)].

Danthonia calva Phil. = **Danthonia chilensis** E. Desv. var. **glabriflora** Nicora
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Danthonia charruana Swallen = **Danthonia secundiflora** J. Presl subsp. **charruana** (Swallen) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: dos Santos, A. M. P. V. & Boechat, S. C., 1989.

Danthonia chilensis E. Desv. var. **aureofulva** (E. Desv.) Baeza
Sin.: *Danthonia aureofulva* E. Desv.
Referencias: Baeza, C. M., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Montero, G. 2495* (BAA, CONC)].

Danthonia chilensis E. Desv. var. **chilensis**
Sin.: *Avena ariguensis* Steud.
Referencias: Baeza, C. M., 1996; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Grun, S., 1993; Nicora, E. G., 1973a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(VII, VIII, IX, X, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 268* (BAA)]; CHL[*Boelcke, O. 329* (SI), *Lechler, W. 749* (BAA)].

Danthonia chilensis E. Desv. var. **glabriflora** Nicora
Sin.: *Danthonia calva* Phil.
Referencias: Baeza, C. M., 1996; Grun, S., 1993; Nicora, E. G., 1973a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 278* (BAB, MVFA)]; CHL[*Montero, G. 4100* (CONC)].

Danthonia cirrata Hack. & Arechav.
Sin.: *Danthonia tandilensis* Kuntze
Referencias: Baeza, C. M., 1996; Grun, S., 1993; dos Santos, A. M. P. V. & Boechat, S. C., 1989; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G., 1978; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, COR, NEU, RNE); BRA(RGS, SCA); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 4843* (SI)]; BRA[*Rosengurtt, B. 9248* (MVFA)]; URY[*Rosengurtt, B. 10197* (MVFA)].

Danthonia cirrata Hack. & Arechav. var. *melanathera* Hack.
= **Danthonia melanathera** (Hack.) G. Bernardello
Referencias: Grun, S., 1993.

Danthonia collina Phil. = **Danthonia malacantha** (Steud.) Pilg.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Danthonia dusenii Ekman = **Danthonia secundiflora** J. Presl subsp. **secundiflora**
Referencias: Grun, S., 1993; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988.

Danthonia dusenii Ekman var. *charruana* (Swallen) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Danthonia secundiflora** J. Presl subsp. **charruana** (Swallen) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: dos Santos, A. M. P. V. & Boechat, S. C., 1989.

Danthonia filifolia C.E. Hubb. = **Danthonia secundiflora** J. Presl subsp. **secundiflora**
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Danthonia glabra Phil. = **Rytidosperma lechleri** Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Danthonia grandiflora Phil., nom. illeg. = **Danthonia californica** Bol. var. **americana** (Scribn.) Hitchc.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Danthonia hieronymi (Kuntze) Hack. = **Lamprothyrsus hieronymi** (Kuntze) Pilg.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Danthonia hieronymi (Kuntze) Hack. var. *pyramidata* Pilg. ex Rojas, nom. nud. = **Lamprothyrsus hieronymi** (Kuntze) Pilg.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Danthonia hieronymi (Kuntze) Hack. var. *ticta* Pilg. ex Rojas, nom. nud. = **Lamprothyrsus hieronymi** (Kuntze) Pilg.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Danthonia malacantha (Steud.) Pilg.
Sin.: *Danthonia collina* Phil., *Danthonia octoflora* Phil., *Danthonia oresigena* Phil., *Trisetum malacanthum* Steud.
Referencias: Baeza, C. M., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 338* (CONC)].

Danthonia melanathera (Hack.) G. Bernardello
Sin.: *Danthonia cirrata* Hack. & Arechav. var. *melanathera* Hack.
Referencias: Baeza, C. M., 1996; Bernardello, L. M., 1977; Grun, S., 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 10144* (SI), *Stuckert, T. T. J. V. 16810* (BAA)].

Danthonia montana Döll = **Danthonia secundiflora** J. Presl subsp. **secundiflora**
Referencias: Baeza, C. M., 1996; Renvoize, S. A., 1988.

Danthonia montevidensis Hack. & Arechav.
Referencias: Baeza, C. M., 1996; Burkart, A., 1969a; dos Santos, A. M. P. V. & Boechat, S. C., 1989; Grun, S., 1993; Mujica Sallés, J., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS, SCA); URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 13440* (SI)]; BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 1547* (ICN)]; URY[*Rosengurtt, B. 7755* (MVFA)].

Danthonia nardoides Phil. = **Nassella nardoides** (Phil.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Danthonia octoflora Phil. = **Danthonia malacantha** (Steud.) Pilg.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Danthonia oresigena Phil. = **Danthonia malacantha** (Steud.) Pilg.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Danthonia picta Nees & Meyen = **Rytidosperma pictum** (Nees & Meyen) Nicora var. **pictum**
Referencias: Baeza, C. M., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Danthonia picta Nees & Meyen var. *patagonica* Speg. = **Rytidosperma virescens** (E. Desv.) Nicora var. **virescens**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Danthonia pseudospicata Müll. Hal., nom. superfl. = **Bromus berteroanus** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Danthonia quinquinervata Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Danthonia secundiflora** J. Presl subsp. **secundiflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Danthonia rhizomata Swallen
Referencias: Baeza, C. M., 1996; dos Santos, A. M. P. V. & Boechat, S. C., 1989; Grun, S., 1993; Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G.,

Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(RGS); URY(CAS, LAV, MAL, ROC, TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 13787* (SI), *Swallen, J. R. 7364* (PEL, US)]; URY[*Rosengurtt, B. 5267b* (SI), *Rosengurtt, B. 5320* (MVFA)].

Danthonia rugoloana Sulekic
Referencias: Sulekic, A. A., 1999b.
Hierba. Perenne. Endémica. 3200–3300 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sulekic, A. A. 2596* (SI)].

Danthonia secundiflora J. Presl subsp. **charruana** (Swallen) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Sin.: *Danthonia charruana* Swallen, *Danthonia dusenii* Ekman var. *charruana* (Swallen) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: dos Santos, A. M. P. V. & Boechat, S. C., 1989; Grun, S., 1993; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(FLO, RIV, ROC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Swallen, J. R. 7414* (US)]; URY[*Rosengurtt, B. 11121* (MVFA)].

Danthonia secundiflora J. Presl subsp. **mattheii** Baeza
Referencias: Baeza, C. M., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 1300–2400 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kummrow, R. 2423* (C, CONC, G, S)].

Danthonia secundiflora J. Presl subsp. **secundiflora**
Sin.: *Danthonia dusenii* Ekman, *Danthonia filifolia* C.E. Hubb., *Danthonia montana* Döll, *Danthonia quinquinervata* Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Baeza, C. M., 1996; dos Santos, A. M. P. V. & Boechat, S. C., 1989; Grun, S., 1993; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Sulekic, A. A., 1999b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 1200–1400 m.
Países: ARG(SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sulekic, A. A. 1928* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 17292* (SI), *Hatschbach, G. 20022* (MBM)]; URY[*Rosengurtt, B. 8257* (MVFA)].

Danthonia tandilensis Kuntze = **Danthonia cirrata** Hack. & Arechav.
Referencias: Grun, S., 1993.

Danthonia violacea E. Desv. = **Rytidosperma violaceum** (E. Desv.) Nicora
Referencias: Grun, S., 1993.

Danthonia virescens E. Desv. = **Rytidosperma virescens** (E. Desv.) Nicora var. **virescens**
Referencias: Grun, S., 1993.

Danthonia werdermanni Pilg. = **Rytidosperma virescens** (E. Desv.) Nicora var. **virescens**
Referencias: Grun, S., 1993.

Dasyochloa argentina (Kuntze) Caro = **Erioneuron pilosum** (Buckley) Nash var. **longearistatum** (Kurtz) Anton
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Dasyochloa argentina (Kuntze) Caro var. *aristiglumis* Caro = **Erioneuron pilosum** (Buckley) Nash var. **longearistatum** (Kurtz) Anton
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Dasyochloa argentina (Kuntze) Caro var. *parodiana* (E.A. Sánchez) Caro = **Erioneuron pilosum** (Buckley) Nash var. **longearistatum** (Kurtz) Anton
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Dasyochloa kurtziana (Parodi) Caro = **Erioneuron avenaceum** (Kunth) Tateoka var. **kurtzianum** (Parodi) Anton
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Dasyochloa longiglumis (Parodi) Caro = **Erioneuron avenaceum** (Kunth) Tateoka var. **longiglume** (Parodi) Anton
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Dasyochloa longiglumis (Parodi) Caro var. *cabrerae* Caro = **Erioneuron avenaceum** (Kunth) Tateoka var. **longiglume** (Parodi) Anton
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Dasyochloa pygmaea (Hack.) Caro = **Erioneuron avenaceum** (Kunth) Tateoka var. **pygmaeum** (Hack.) Anton
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Dendragrostis anelytra Munro, nom. nud. = **Chusquea anelytra** Nees
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Deschampsia P. Beauv.

Número de especies: 17, 13 endémicas, 1 introducida

Deschampsia aciphylla (Franch.) Speg. = **Deschampsia elongata** (Hook.) Munro ex Benth.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Deschampsia airiformis (Steud.) Parodi, comb. superfl. = **Deschampsia airiformis** (Steud.) Benth. & Hook. f.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Deschampsia airiformis (Steud.) Benth. & Hook. f.
Sin.: *Agrostis desvauxii* Phil., *Deschampsia airiformis* (Steud.) Parodi, comb. superfl., *Trisetum airiformis* Steud.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU); CHL(IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 4365* (BAA)]; CHL[*Lechler, W. 723* (BAA)].

Deschampsia andicola (Louis-Marie) Valencia = **Trisetum longiglume** Hack. var. **longiglume**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Deschampsia andina Phil. = **Deschampsia caespitosa** (L.) P. Beauv. var. **caespitosa**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Deschampsia antarctica E. Desv.
Sin.: *Aira antarctica* Hook. f., hom. illeg., *Airidium elegantulum* Steud., *Deschampsia elegantula* (Steud.) Parodi
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, IX, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 251* (SI)]; CHL[*Eyerdam, W. J. 24115* (SI), *Pisano, E. 3584* (CONC)].

Deschampsia atropurpurea (Wahlenb.) Scheele = **Vahlodea atropurpurea** (Wahlenb.) Fr. ex Hartmann
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Deschampsia berteroana (Kunth) Trin.
Sin.: *Deschampsia berteroana* (Kunth) Trin. var. *parvispicula* Parodi, *Deschampsia desvauxii* Pilg., *Monandraira berteroana* (Kunth) E. Desv., *Trisetum berteroanum* Kunth
Referencias: Finot, V. L. & Matthei, O. R., 2001[2000]; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 2200 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ambrosetti, A. 1202* (MERL)]; CHL[*Barros, E. 530* (SI), *Bertero, C. L. G. 30* (SGO)].

Deschampsia berteroana (Kunth) Trin. var. *parvispicula* Parodi = **Deschampsia berteroana** (Kunth) Trin.
Referencias: Finot, V. L. & Matthei, O. R., 2001[2000].

Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. var. **caespitosa**
Sin.: *Aira caespitosa* L., *Deschampsia andina* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Nicora, E. G., 1978; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IV, VII, IX, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eyerdam, W. J. 24518* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15016* (MBM)]; CHL[*Pisano, E. 6815* (CONC)].

Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. var. **pulchra** (Nees & Meyen) Nicora
Sin.: *Aira pulchra* (Nees & Meyen) Steud., *Deschampsia pulchra* Nees & Meyen, *Deyeuxia grata* Phil.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2100 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SJU); CHL(VI, VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 14127* (BAA)]; CHL[*Meyen, F. J. F. s.n.* (US)].

Deschampsia cordillerarum Hauman
Referencias: Parodi, L. R., 1949a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3500 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 9765* (SI)]; CHL[*Jiles, C. 3623* (CONC)].

Deschampsia desvauxii Pilg. = **Deschampsia berteroana** (Kunth) Trin.
Referencias: Finot, V. L. & Matthei, O. R., 2001[2000].

Deschampsia discolor auct. non (Thuill.) P. Beauv. = **Deschampsia flexuosa** (L.) Trin.

Deschampsia elegantula (Steud.) Parodi = **Deschampsia antarctica** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Deschampsia elegantula (Steud.) Parodi var. *patula* (Phil.) Parodi = **Deschampsia patula** (Phil.) Pilg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Deschampsia elongata (Hook.) Munro ex Benth.
Sin.: *Aira aciphylla* Franch., *Aira aciphylla* Franch. var. *pumila* Franch., *Aira elongata* Hook., *Deschampsia aciphylla* (Franch.) Speg.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Parodi, L. R., 1949a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, TDF); CHL(IV, IX, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10858* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Burkart, A. 9529* (SI), *Savatier 161* (BAA)].

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Sin.: *Aira flexuosa* L., *Aira flexuosa* L. var. *montana* Brongn., *Aira versicolor* Roem. & Schult., *Aira vestita* Steud., *Deschampsia discolor* auct. non (Thuill.) P. Beauv., *Deschampsia fuegina* Phil., *Deschampsia macloviana* Gand., *Deschampsia martinii* Phil., *Deschampsia philippii* Macloskie, *Deschampsia tenella* Phil., *Deschampsia vestita* (Steud.) Hauman & Parodi
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Moore, D. M., 1983; Nicora, E. G., 1978; Parodi, L. R., 1949a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3300 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(VIII, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 249* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92316* (CONC, SGO), *Rentzell, I. 6294* (SI)].

Deschampsia fuegina Phil. = **Deschampsia flexuosa** (L.) Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Deschampsia glauca (E. Desv.) Parodi, hom. illeg. = **Deschampsia monandra** Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Deschampsia grandiflora Macloskie, hom. illeg. = **Deschampsia kingii** (Hook. f.) E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Deschampsia juergensii (Hack.) Valencia = **Trisetum juergensii** Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Deschampsia kingii (Hook. f.) E. Desv.
Sin.: *Aira elatior* Steud., *Aira grandiflora* Nees ex Steud., hom. illeg., *Aira kingii* Hook. f., *Deschampsia grandiflora* Macloskie, hom. illeg.
Referencias: Moore, D. M., 1983; Nicora, E. G., 1978; Parodi, L. R., 1949a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(IX, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 510* (SI)]; CHL[*Pastore, F. 72* (SI), *Pisano, E. 8484* (CONC)].

Deschampsia lasiantha Phil. = **Trisetum preslei** (Kunth) E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Deschampsia latifolia Phil., hom. illeg. = **Poa chonotica** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Deschampsia laxa Phil.
Sin.: *Calamagrostis hirthii* Phil., *Trisetum dozei* Franch.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Parodi, L. R., 1953; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 3493* (BAA)]; CHL[*Bonarelli, G. 78* (SI), *Hirth, A. s.n.* (SGO, US)].

Deschampsia looseriana Parodi var. **looseriana**
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 300–700 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, A. 387* (CONC)].

Deschampsia looseriana Parodi var. **triandra** Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 500 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 2049* (BAA)].

Deschampsia macloviana Gand. = **Deschampsia flexuosa** (L.) Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Deschampsia martinii Phil. = **Deschampsia flexuosa** (L.) Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Deschampsia mendocina Parodi
Referencias: Parodi, L. R., 1949a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1700 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 4685* (BAA)].

Deschampsia micrantha Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO, US)].

Deschampsia monandra Parodi
Sin.: *Deschampsia glauca* (E. Desv.) Parodi, hom. illeg., *Monandraira glauca* E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: CHL(IV, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 20414* (CONC)].

Deschampsia parvula (Hook. f.) E. Desv.
Sin.: *Aira parvula* Hook. f., *Trisetum parvulum* (Hook. f.) Speg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Moore, D. M., 1983; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1100 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hauman, L. L. 126* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92413* (CONC, SGO)].

Deschampsia patula (Phil.) Pilg.
Sin.: *Deschampsia elegantula* (Steud.) Parodi var. *patula* (Phil.) Parodi, *Monandraira patula* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Nicora, E. G., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12358* (BAA, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92378* (CONC)].

Deschampsia philippii Macloskie = **Deschampsia flexuosa** (L.) Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Deschampsia pulchra Nees & Meyen = **Deschampsia caespitosa** (L.) P. Beauv. var. **pulchra** (Nees & Meyen) Nicora
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Deschampsia setacea (Huds.) Hack.
Sin.: *Aira montana* L. var. *setacea* (Huds.) Huds., *Aira setacea* Huds., *Aristavena setacea* (Huds.) F. Albers & Butzin
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 3400–3600 m.
Países: CHL(IV, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 544* (CONC), *Morrison, J. L. 17424* (SI)].

Deschampsia tenella Phil. = **Deschampsia flexuosa** (L.) Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Deschampsia venustula Parodi
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2400–2600 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(VII, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10025* (SI), *Roig, F. A. 5159* (BAA)]; CHL[*Marticorena, A. 997* (CONC)].

Deschampsia vestita (Steud.) Hauman & Parodi = **Deschampsia flexuosa** (L.) Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Desmazeria rigida (L.) Tutin = **Catapodium rigidum** (L.) Dony
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Deyeuxia Clarion ex P. Beauv.

Número de especies: 45, 9 endémicas

[Deyeuxia agrostidea Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

Deyeuxia alba J. Presl subsp. **alba**
Sin.: *Calamagrostis alba* (J. Presl) Steud., *Calamagrostis armata* (Döll) Parodi, *Calamagrostis armata* (Döll) Parodi var. *subaristata* Parodi, *Calamagrostis armata* (Döll) Parodi var. *subcontracta* (Döll) Parodi, *Calamagrostis montevidensis* Nees var. *armata* Döll, *Calamagrostis montevidensis* Nees var. *subcontracta* Döll, *Deyeuxia armata* (Döll) Parodi
Referencias: Cantero, J. J., Núñez, C. O., Geymonat, M. & Chiacchiera, G., 1996; Kämpf, A. N., 1975; Mujica Sallés, J., 1996; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS); BRA(RGS, SCA); URY(CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 1024* (SI)]; BRA[*Norrmann, G. A. 206* (BLA)]; PRY[*Woolston, A. L. s.n.* (BAA)]; URY[*Mujica Sallés, J. 302* (MVFA)].

Deyeuxia alba J. Presl subsp. **breviaristata** Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Villamil, C. B. 3166* (NY)]; BRA[*Mattos, J. R. 21017* (HAS, SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 6396* (MVFA)].

Deyeuxia alba J. Presl subsp. **tricholemma** (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Rúgolo
Sin.: *Calamagrostis alba* (J. Presl) Steud. subsp. *tricholemma* Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Kämpf, A. N., 1975; Mujica Sallés, J., 1996; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a, 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); BRA(RGS); URY(MAL, PAY, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Galli 294* (SI)]; BRA[*Norrmann, G. A. s.n.* (BLA)]; URY[*Millot 492* (MVFA)].

Deyeuxia ameghinoi Speg. = **Deyeuxia poaeoides** (Steud.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia amoena Pilg. = **Deyeuxia filifolia** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a.

Deyeuxia antoniana (Griseb.) Parodi = **Deyeuxia rigida** Kunth
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Deyeuxia armata (Döll) Parodi = **Deyeuxia alba** J. Presl subsp. **alba**

Deyeuxia arundinacea Phil. = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **eminens**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia beyrichiana (Nees ex Döll) Sodiro = **Deyeuxia rupestris** (Trin.) Rúgolo var. **rupestris**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia breviaristata Wedd.
Sin.: *Calamagrostis breviaristata* (Wedd.) Pilg., *Calamagrostis variegata* (Phil.) Kuntze, hom. illeg., *Deyeuxia mutica* Wedd., *Deyeuxia variegata* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 3300–4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2715* (SI)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (BAA, SGO)].

Deyeuxia brevifolia J. Presl var. **brevifolia**
Sin.: *Calamagrostis brevifolia* (J. Presl) Steud.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a, 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 21364* (BAA, LIL)].

Deyeuxia brevifolia J. Presl var. **expansa** Rúgolo & Villav.
Sin.: *Calamagrostis brevifolia* (J. Presl) Steud. var. *expansa* (Rúgolo & Villav.) Soreng
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 3400 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Peterson, P. M. 15621* (SI)].

Deyeuxia cabrerae (Parodi) Parodi var. **aristulata** Rúgolo & Villav.
Sin.: *Calamagrostis cabrerae* Parodi var. *aristulata* (Rúgolo & Villav.) Soreng
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1995, 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 3200–4600 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruthsatz, B. 444/4* (B, SI)]; CHL[*Peterson, P. M. 15574* (SI)].

Deyeuxia cabrerae (Parodi) Parodi var. **cabrerae**
Sin.: *Calamagrostis cabrerae* Parodi
Referencias: Parodi, L. R., 1953; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1986a, 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–4200 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 22541* (BAA)]; CHL[*Peterson, P. M. 15531* (SI)].

Deyeuxia cabrerae (Parodi) Parodi var. **maxima** Rúgolo
Sin.: *Calamagrostis cabrerae* Parodi var. *maxima* (Rúgolo) Soreng
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1986a, 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 15404* (BAA)].

Deyeuxia cabrerae (Parodi) Parodi var. **trichopoda** Parodi ex Rúgolo
Sin.: *Calamagrostis cabrerae* Parodi var. *trichopoda* (Parodi ex Rúgolo) Soreng
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1986a, 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 3700 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 4131* (BAA, BAB)]; CHL[*Peterson, P. M. 15520* (SI)].

Deyeuxia calderillensis (Pilg.) Rúgolo
Sin.: *Calamagrostis calderillensis* Pilg.

Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a, 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4738* (BAA, BAB, SI, US)].

Deyeuxia cephalotes Wedd. = **Deyeuxia spicigera** J. Presl var. **cephalotes** (Wedd.) Rúgolo & Villav.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia chilensis Desv. = **Deyeuxia velutina** Nees & Meyen var. **velutina**

Deyeuxia chrysantha J. Presl var. **chrysantha**
Sin.: *Calamagrostis chrysantha* (J. Presl) Steud., *Calamagrostis mutica* Steud. ex Lechl., nom. nud., *Calamagrostis nitida* Hack., *Deyeuxia leiopoda* Wedd., *Stylagrostis chrysantha* (J. Presl) Mez
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1986b, 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–5000 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 4033* (BAA, LP, US)]; CHL[*Marticorena, C. 258* (CONC)].

Deyeuxia chrysantha J. Presl var. **phalaroides** (Wedd.) Villav.
Sin.: *Calamagrostis chrysantha* (J. Presl) Steud. var. *phalaroides* (Wedd.) Soreng, *Deyeuxia phalaroides* Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 4100–5000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2552* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 1877* (CONC)].

Deyeuxia chrysophylla Phil.
Sin.: *Calamagrostis chrysophylla* (Phil.) Govaerts
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 3700–5300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC); CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3561* (SI)]; CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO, US)].

Deyeuxia chrysostachya E. Desv.
Sin.: *Calamagrostis chrysostachya* (E. Desv.) Kuntze, *Calamagrostis chrysostachya* (E. Desv.) V.N. Vassil., comb. superfl.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Marticorena, A., Pardo, V., Peñaloza, A., Negritto, M. A., Cavieres, L. & Parada, M., 2004; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1986b, 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(JUJ, MEN, SJU); CHL(II, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 7480* (SI)]; CHL[*Zöllner, O. 2614* (CONC)].

Deyeuxia colorata Beetle
Sin.: *Agrostis rosea* Griseb., *Calamagrostis rosea* (Griseb.) Hack., *Calamagrostis rosea* (Griseb.) Hack. f. *typica* Hack., nom. inval., *Calamagrostis rosea* (Griseb.) Hack. var. *viridula* Hack., *Deyeuxia rosea* (Griseb.) Türpe, comb. superfl.
Referencias: Beetle, A. A., 1964; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 1700–4400 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 160* (SI), *Lorentz, P. G. 655* (BA, LIL, US)].

Deyeuxia crispa Rúgolo & Villav.
Sin.: *Calamagrostis crispa* (Rúgolo & Villav.) Govaerts
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1995; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000–5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arenas, P. s.n.* (B, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 94002* (CONC)].

Deyeuxia cryptolopha Wedd.
Sin.: *Calamagrostis cryptolopha* (Wedd.) Hitchc.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–4500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3723* (SI)].

Deyeuxia curta Wedd.
Sin.: *Calamagrostis curta* (Wedd.) Hitchc., comb. superfl., *Calamagrostis curta* (Wedd.) Pilg.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a, 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 4200–5000 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 5346* (SI)].

Deyeuxia curta Wedd. var. *longearistata* Türpe = **Deyeuxia lagurus** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia curvula Wedd.
Sin.: *Calamagrostis curvula* (Wedd.) Pilg., *Calamagrostis tenuifolia* (Phil.) R.E. Fr., hom. illeg., *Deyeuxia tenuifolia* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b; Hunziker, J. H., 1952; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 3400–4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 430* (SI), *Deginani, N. B. 553* (SI)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (BAA, SGO, W)].

Deyeuxia deserticola Phil. var. **breviaristata** Rúgolo & Villav.
Sin.: *Calamagrostis deserticola* (Phil.) Phil. var. *breviaristata* (Rúgolo & Villav.) Soreng

Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1995, 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 4300–5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 4139* (BAA)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 94056* (CONC)].

Deyeuxia deserticola Phil. var. **deserticola**
Sin.: *Agrostis canescens* Griseb., hom. illeg., *Calamagrostis deserticola* (Phil.) Phil., *Deyeuxia trisetoides* Phil.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 2800–4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 10587* (SI)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Deyeuxia diemii Rúgolo
Sin.: *Calamagrostis diemii* (Rúgolo) Soreng
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1975, 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 1200–2000 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 254* (BAA, MVFA, US)]; CHL[*Ricardi, M. 929* (CONC)].

Deyeuxia eminens J. Presl f. *brevipila* (Hack.) Türpe
= **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **fulva** (Griseb.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a.

Deyeuxia eminens J. Presl var. **discreta** Rúgolo & Villav.
Sin.: *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud. var. *discreta* (Rúgolo & Villav.) Soreng, *Deyeuxia leiopoda* Wedd. var. *discreta* Wedd., nom. nud.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 3900–4500 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 1157* (SI, US)].

Deyeuxia eminens J. Presl var. **eminens**
Sin.: *Agrostis eminens* (J. Presl) Griseb., *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud., *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud. var. *sordida* Kuntze, *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud. var. *tunariensis* Kuntze, *Calamagrostis robusta* (Phil.) Phil., hom. illeg., *Deyeuxia arundinacea* Phil., *Deyeuxia robusta* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006; Türpe, A. M., 1962.
Hierba. Perenne. Nativa. 2900–4700 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 425* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 94049* (CONC)].

Deyeuxia eminens J. Presl var. **fulva** (Griseb.) Rúgolo
Sin.: *Agrostis fulva* Griseb., *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud. f. *brevipila* Hack., *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud. var. *fulva* (Griseb.) Soreng, *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud. var. *grisebachiana* Kuntze, *Calamagrostis fulva* (Griseb.) Kuntze, *Calamagrostis grata* Phil., *Deyeuxia eminens* J. Presl f. *brevipila* (Hack.) Türpe, *Deyeuxia fulva* (Griseb.) Parodi, *Deyeuxia laxiflora* Phil.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a, 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 3200–4200 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC); CHL(II, III, IV, V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 2156* (BAA, SI)]; CHL[*Philippi, F. s.n.* (BAA, SGO, W)].

Deyeuxia eminens J. Presl & C. Presl var. **inclusa** Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 3200–4600 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30062* (SI)].

Deyeuxia erythrostachya E. Desv. var. **erythrostachya**
Sin.: *Aira gayana* Steud., *Calamagrostis erythrostachya* (E. Desv.) Hack., *Calamagrostis gayana* (Steud.) Soreng, *Calamagrostis stipitata* Hitchc., *Stylagrostis erythrostachya* (E. Desv.) Mez
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1975, 1978a, b, 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–4100 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IV, V, VII, VIII, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 14082* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92138* (CONC, SGO)].

Deyeuxia erythrostachya E. Desv. var. **neuquenensis** Rúgolo
Sin.: *Calamagrostis gayana* (Steud.) Soreng var. *neuquenensis* (Rúgolo) Soreng
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1975, 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 1700–2200 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(VI, VII, VIII, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schajowskoy, S. 2848* (BAA)]; CHL[*Werdermann, E. 1293* (CONC)].

Deyeuxia fiebrigii (Pilg.) Rúgolo
Sin.: *Calamagrostis fiebrigii* Pilg., *Deyeuxia nardifolia* (Griseb.) Phil. var. *elatior* Türpe
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a, 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 2600–4300 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2479* (SI)].

Deyeuxia filifolia Wedd.
Sin.: *Calamagrostis amoena* (Pilg.) Pilg., *Calamagrostis filifolia* (Wedd.) Pilg., hom. illeg., *Calamagrostis trichophylla* Pilg., *Deyeuxia amoena* Pilg.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a.

Hierba. Perenne. Nativa. 2700–5200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 10923* (LIL)].

Deyeuxia flavescens Clarion ex Spreng., nom. illeg. = **Deyeuxia viridiflavescens** (Poir.) Kunth var. **montevidensis** (Nees) Cabrera & Rúgolo

[Deyeuxia freticola Speg.]
Sin.: *Calamagrostis freticola* (Speg.) Macloskie
Notas: Nombre dudoso.

Deyeuxia fulva (Griseb.) Parodi = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **fulva** (Griseb.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

[Deyeuxia fuscata J. Presl]
Sin.: *Calamagrostis fuscata* (J. Presl) Steud.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Deyeuxia gracilis Wedd. = **Deyeuxia rigida** Kunth
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia grata Phil. = **Deschampsia caespitosa** (L.) P. Beauv. var. **pulchra** (Nees & Meyen) Nicora

Deyeuxia gusindei (Pilg. ex Skottsb.) Parodi = **Deyeuxia rigida** Kunth

Deyeuxia hackelii (Lillo) Parodi
Sin.: *Calamagrostis hackelii* Lillo
Referencias: Parodi, L. R., 1953; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006; Türpe, A. M., 1962.
Hierba. Perenne. Endémica. 3800–5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31755* (SI), *Núñez, V. 591* (CTES, SI)].

Deyeuxia heterophylla Wedd.
Sin.: *Calamagrostis heterophylla* (Wedd.) Pilg.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a, 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4800 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30581* (SI)]; CHL[*Peterson, P. M. 15735* (CONC, SI)].

Deyeuxia heterophylla Wedd. var. *elatior* Wedd. = **Deyeuxia rupestris** (Trin.) Rúgolo var. **rupestris**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Deyeuxia hieronymi (Hack.) Türpe
Sin.: *Calamagrostis hieronymi* Hack.
Referencias: Cantero, J. J., Núñez, C. O., Geymonat, M. & Chiacchiera, G., 1996; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006; Türpe, A. M., 1962.
Hierba. Perenne. Nativa. 1100–4500 m.
Países: ARG(COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 4* (BAA, LIL, US, W)].

Deyeuxia hookeri (Syme) Druce = **Deyeuxia poaeoides** (Steud.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia hygrometrica (Nees) Speg. var. *tandilensis* (Kuntze) Speg. = **Bromidium tandilense** (Kuntze) Rúgolo
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Deyeuxia imberbis Wedd. = **Deyeuxia rigescens** (J. Presl) Türpe
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

[Deyeuxia intermedia J. Presl]
Sin.: *Calamagrostis intermedia* (J. Presl) Steud.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Deyeuxia lagurus Wedd.
Sin.: *Calamagrostis cephalantha* Pilg., *Calamagrostis lagurus* (Wedd.) Pilg., *Deyeuxia curta* Wedd. var. *longearistata* Türpe
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006; Türpe, A. M., 1962.
Hierba. Perenne. Nativa. 4300–5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 3254* (BAA, LIL)].

Deyeuxia laxiflora Phil. = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **fulva** (Griseb.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a.

Deyeuxia leiopoda Wedd. = **Deyeuxia chrysantha** J. Presl var. **chrysantha**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia leiopoda Wedd. var. *discreta* Wedd., nom. nud. = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **discreta** Rúgolo & Villav.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1995.

Deyeuxia longearistata Wedd. = **Deyeuxia rupestris** (Trin.) Rúgolo var. **rupestris**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia malamalensis (Hack.) Parodi
Sin.: *Calamagrostis malamalensis* Hack.
Referencias: Parodi, L. R., 1953; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006; Türpe, A. M., 1962.
Hierba. Perenne. Nativa. 2700–4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 3503* (BAA, LIL, W)].

Deyeuxia megapotamica Spreng. = **Bothriochloa laguroides** (DC.) Herter subsp. **laguroides**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Deyeuxia minima (Pilg.) Rúgolo
Sin.: *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *minima* Pilg.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000–4900 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruthsatz, B. s.n.* (SI)].

Deyeuxia mutica Wedd. = **Deyeuxia breviaristata** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia nardifolia (Griseb.) Phil. = **Deyeuxia velutina** Nees & Meyen var. **nardifolia** (Griseb.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Deyeuxia nardifolia (Griseb.) Phil. var. *elatior* Türpe = **Deyeuxia fiebrigii** (Pilg.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a.

Deyeuxia neglecta (Ehrh.) Kunth, comb. superfl. = **Deyeuxia poaeoides** (Steud.) Rúgolo

Deyeuxia nematophylla Wedd. = **Deyeuxia orbignyana** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a.

Deyeuxia obtusata Wedd. = **Deyeuxia spicigera** J. Presl var. **spicigera**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia orbignyana Wedd.
Sin.: *Calamagrostis nematophylla* (Wedd.) Pilg., *Calamagrostis orbignyana* (Wedd.) Pilg., *Deyeuxia nematophylla* Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a, 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 1200–4300 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 10563* (SI)].

Deyeuxia patagonica Speg.
Sin.: *Calamagrostis patagonica* (Speg.) Macloskie
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1978a, 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU); CHL(IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Illin, N. s.n.* (BAA, LP, US)]; CHL[*Montero 4243* (CONC)].

Deyeuxia phalaroides Wedd. = **Deyeuxia chrysantha** J. Presl var. **phalaroides** (Wedd.) Villav.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia poaeoides (Steud.) Rúgolo
Sin.: *Calamagrostis ameghinoi* (Speg.) Hauman, *Calamagrostis fuegiana* Speg., *Calamagrostis hookeri* (Syme) Druce, *Calamagrostis magellanica* Phil., *Calamagrostis neglecta* (Ehrh.) Gaertn. var. *poaeoides* (Steud.) Hack., *Calamagrostis neglecta* (Ehrh.) Gaertn., comb. superfl., *Calamagrostis poaeoides* Steud., *Calamagrostis stricta* (Timm) Koeler, *Deyeuxia ameghinoi* Speg., *Deyeuxia hookeri* (Syme) Druce, *Deyeuxia neglecta* (Ehrh.) Kunth, comb. superfl.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1978a, b, 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 250* (SI)]; CHL[*Lechler, W. 1234* (BAA, LE, P, US)].

Deyeuxia polygama (Griseb.) Parodi
Sin.: *Calamagrostis lilloi* Hack., *Calamagrostis lilloi* Hack. f. *grandiflora* Hack., *Calamagrostis polygama* (Griseb.) Parodi, *Cinnagrostis polygama* Griseb.
Referencias: Parodi, L. R., 1953; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006; Türpe, A. M., 1962.
Hierba. Perenne. Endémica. 1800–3200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 76* (BAA, CORD)].

Deyeuxia pulvinata (Hack.) Türpe = **Deyeuxia vicunarum** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia recta Kunth
Sin.: *Calamagrostis humboldtiana* Steud., *Calamagrostis recta* (Kunth) Trin. ex Steud., *Deyeuxia stricta* Kunth
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 3800–4200 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5983* (SI)].

Deyeuxia reitzii (Swallen) Rúgolo
Sin.: *Calamagrostis reitzii* Swallen
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 1900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2390* (ICN, US)].

Deyeuxia rigescens (J. Presl) Türpe
Sin.: *Agrostis bromidioides* Griseb., *Agrostis rigescens* J. Presl, *Bromidium hygrometricum* (Nees) Nees & Meyen var. *rigescens* (J. Presl) Kuntze, *Bromidium hygrometricum* (Nees) Nees & Meyen var. *spectabilis* (Nees & Meyen) Kuntze, *Bromidium rigescens* (J. Presl) Nees & Meyen, *Calamagrostis cajatambensis* Pilg., *Calamagrostis rigescens* (J. Presl) Scribn., *Deyeuxia imberbis* Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1982, 2006; Türpe, A. M., 1962.
Hierba. Perenne. Nativa. 2400–4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC); CHL(I, III).

Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 471* (SI), *Lorentz, P. G. 69* (BAA, US)]; CHL[*Marticorena, A. 305* (CONC)].

Deyeuxia rigida Kunth
Sin.: *Agrostis antoniana* Griseb., *Calamagrostis antoniana* (Griseb.) D.M. Moore, hom. illeg., *Calamagrostis antoniana* (Griseb.) Steud. ex Hitchc., *Calamagrostis antoniana* Steud. ex Lechl., nom. nud., *Calamagrostis gusindei* Pilg. ex Skottsb., *Calamagrostis rigida* (Kunth) Trin. ex Steud., *Deyeuxia antoniana* (Griseb.) Parodi, *Deyeuxia gracilis* Wedd., *Deyeuxia gusindei* (Pilg. ex Skottsb.) Parodi, *Deyeuxia sulcata* Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1978a, 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 3400–5600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6080* (SI)]; CHL[*Gusinde 40* (B, BAA, GB)].

Deyeuxia robusta Phil. = **Deyeuxia eminens** J. Presl var. **eminens**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia rosea (Griseb.) Türpe, comb. superfl. = **Deyeuxia colorata** Beetle
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia rupestris (Trin.) Rúgolo f. **pilosa** (Kämpf) Rúgolo
Sin.: *Calamagrostis longearistata* (Wedd.) Hack. ex Sodiro f. *pilosa* Kämpf
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Clayton 4465* (BLA)].

Deyeuxia rupestris (Trin.) Rúgolo var. **minor** (Kämpf) Rúgolo
Sin.: *Calamagrostis longearistata* (Wedd.) Hack. ex Sodiro f. *minor* Kämpf
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kämpf, A. N. 315* (BLA)].

Deyeuxia rupestris (Trin.) Rúgolo var. **rupestris**
Sin.: *Calamagrostis beyrichiana* Nees ex Döll, *Calamagrostis longearistata* (Wedd.) Hack. ex Sodiro, *Calamagrostis montevidensis* Nees var. *linearis* Hack., *Calamagrostis rupestris* Trin., *Deyeuxia beyrichiana* (Nees ex Döll) Sodiro, *Deyeuxia heterophylla* Wedd. var. *elatior* Wedd., *Deyeuxia longearistata* Wedd.
Referencias: Kämpf, A. N., 1975; Renvoize, S. A., 1988; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(ERI); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, MON, RIV, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*León, R. 4716* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 28172* (MBM)]; URY[*Rosengurtt, B. 6033* (CONC, GH, LIL, US)].

Deyeuxia scabriuscula Wedd. = **Deyeuxia velutina** Nees & Meyen var. **nardifolia** (Griseb.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Deyeuxia sclerantha (Hack.) Rúgolo
Sin.: *Calamagrostis sclerantha* Hack., *Calamagrostis spiciformis* Hack., *Deyeuxia spiciformis* (Hack.) Türpe
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006; Türpe, A. M., 1962.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 60* (BAA, LIL, W), *Sanso, A. M. 193* (SI)].
Notas: Citada para Chile sin indicar localidad o material de referencia (C. Marticorena & Quezada, 1985).

Deyeuxia sesquiflora (E. Desv.) Benth. & Hook. f. ex W.D. Jacks. = **Podagrostis sesquiflora** (E. Desv.) Nicora

Deyeuxia setiflora Wedd.
Sin.: *Calamagrostis setiflora* (Wedd.) Pilg.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a, 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 3600–5000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 8806* (SI)].

Deyeuxia spicata Spreng. = **Schizachyrium spicatum** (Spreng.) Herter
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Deyeuxia spiciformis (Hack.) Türpe = **Deyeuxia sclerantha** (Hack.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia spicigera J. Presl var. **cephalotes** (Wedd.) Rúgolo & Villav.
Sin.: *Calamagrostis spicigera* (J. Presl) Steud. var. *cephalotes* (Wedd.) Soreng, *Deyeuxia cephalotes* Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a, 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 3700–4700 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 1933* (BAA)].

Deyeuxia spicigera J. Presl var. **spicigera**
Sin.: *Calamagrostis spicigera* (J. Presl) Steud., *Deyeuxia obtusata* Wedd., *Deyeuxia subsimilis* Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 3600–5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 576* (SI)].

Deyeuxia splendens Brongn. = **Deyeuxia viridiflavescens** (Poir.) Kunth var. **montevidensis** (Nees) Cabrera & Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia stricta Kunth = **Deyeuxia recta** Kunth
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia subsimilis Wedd. = **Deyeuxia spicigera** J. Presl var. **spicigera**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia suka (Speg.) Parodi
Sin.: *Calamagrostis suka* Speg.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1978a, b; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grondona, E. M. 4413* (BAA)]; CHL[*Spegazzini, C. L. s.n.* (BAA, LP)].

Deyeuxia sulcata Wedd. = **Deyeuxia rigida** Kunth
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Deyeuxia tarmensis (Pilg.) Sodiro var. **macrochaeta** (Hack.) Rúgolo
Sin.: *Calamagrostis rosea* (Griseb.) Hack. var. *macrochaeta* Hack., *Calamagrostis tarijensis* Pilg., *Calamagrostis tarmensis* Pilg. var. *macrochaeta* (Hack.) Soreng, *Deyeuxia tarmensis* (Pilg.) Sodiro var. *tarijensis* (Pilg.) Villav.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a, 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 2400–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6109* (SI)].

Deyeuxia tarmensis (Pilg.) Sodiro var. *tarijensis* (Pilg.) Villav. = **Deyeuxia tarmensis** (Pilg.) Sodiro var. **macrochaeta** (Hack.) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

[Deyeuxia tarmensis (Pilg.) Sodiro var. tarmensis]
Sin.: *Calamagrostis tarmensis* Pilg.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Deyeuxia tenuifolia Phil. = **Deyeuxia curvula** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia trichodonta Wedd. var. **hirsuta** Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 3100–3300 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sulekic, A. A. 1708* (SI)].

Deyeuxia trichodonta Wedd. var. **trichodonta**
Sin.: *Calamagrostis trichodonta* (Wedd.) Soreng
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 2600–4300 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 9131* (SI)].

Deyeuxia trisetoides Phil. = **Deyeuxia deserticola** Phil. var. **deserticola**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Deyeuxia variegata Phil. = **Deyeuxia breviaristata** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia velutina Nees & Meyen var. **nardifolia** (Griseb.) Rúgolo
Sin.: *Agrostis nardifolia* Griseb., *Calamagrostis nardifolia* (Griseb.) Hack., *Deyeuxia nardifolia* (Griseb.) Phil., *Deyeuxia scabriuscula* Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 3800–4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC); CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 477* (SI), *Zuloaga, F. O. 6093* (SI)]; CHL[*Ruthsatz, B. 8063* (SI)].

Deyeuxia velutina Nees & Meyen var. **velutina**
Sin.: *Calamagrostis chilensis* (Desv.) R.E. Fr., *Calamagrostis velutina* (Nees & Meyen) Hauman, hom. illeg., *Calamagrostis velutina* (Nees & Meyen) Hauman, hom. illeg. var. *breviculmis* Hauman, *Calamagrostis velutina* (Nees & Meyen) Steud., *Deyeuxia chilensis* Desv.
Referencias: Luebert B., F. & Gajardo M., R., 1999; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1978b, 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 3800–4200 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, TUC); CHL(I, II, III, IV, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11313* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Luebert B., F. 40* (EIF), *Ricardi, M. 1661* (CONC)].

Deyeuxia vicunarum Wedd.
Sin.: *Calamagrostis pentapogonodes* Kuntze, *Calamagrostis pulvinata* Hack., *Calamagrostis spiciformis* Hack. var. *acutiflora* Hack. ex Buchtien, nom. nud., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *abscondita* Pilg., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *elatior* Pilg., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *humilior* Pilg., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *setulosa* Pilg., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *tenuior* Pilg., *Deyeuxia pulvinata* (Hack.) Türpe, *Deyeuxia vicunarum* Wedd. var. *major* Wedd., *Deyeuxia vicunarum* Wedd. var. *tenuifolia* Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006; Türpe, A. M., 1962.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5947* (SI)]; CHL[*Stübel, A. 113* (BAA)].

Deyeuxia vicunarum Wedd. var. *major* Wedd. = **Deyeuxia vicunarum** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia vicunarum Wedd. var. *tenuifolia* Wedd. = **Deyeuxia vicunarum** Wedd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia vidalii Phil. = **Agrostis glabra** (J. Presl) Kunth var. **melanthes** (Phil.) Rúgolo & De Paula

Deyeuxia violacea Wedd. var. *puberula* Wedd., nom. nud.
= **Deyeuxia violacea** Wedd. var. **puberula** Rúgolo & Villav.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Deyeuxia violacea Wedd. var. **puberula** Rúgolo & Villav.
Sin.: *Calamagrostis violacea* (Wedd.) Hitchc. var. *puberula* (Rúgolo & Villav.) Soreng, *Deyeuxia violacea* Wedd. var. *puberula* Wedd., nom. nud.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1995; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 3600–5200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11760* (SI)].

Deyeuxia violacea Wedd. var. **violacea**
Sin.: *Calamagrostis violacea* (Wedd.) Hitchc.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994a, 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000–4900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11876* (SI)].

Deyeuxia viridiflavescens (Poir.) Kunth var. **montevidensis** (Nees) Cabrera & Rúgolo
Sin.: *Calamagrostis montevidensis* Nees, *Calamagrostis viridiflavescens* (Poir.) Steud. var. *montevidensis* (Nees) Kämpf, *Deyeuxia flavescens* Clarion ex Spreng., nom. illeg., *Deyeuxia splendens* Brongn.
Referencias: Kämpf, A. N., 1975; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VIII); PRY(APY, APA, CEN, CON, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2887* (SI)]; BRA[*d'Urville, J. S. C. D. s.n.* (BAA, P, US)]; CHL[*Pfister, A. 7103* (CONC)]; PRY[*Jörgensen, P. 3531* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 4651* (MVFA)].

Deyeuxia viridiflavescens (Poir.) Kunth var. **viridiflavescens**
Sin.: *Arundo viridiflavescens* Poir., *Calamagrostis montevidensis* Nees var. *ampliflora* Döll, *Calamagrostis viridiflavescens* (Poir.) Steud., *Donax viridiflavescens* (Poir.) Roem. & Schult.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Cabrera, A. L. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1970; Kämpf, A. N., 1975; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1978a, 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VIII); PRY(APA, AMA, CAU, CEN); URY(COL, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 6428* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 12830* (MBM)]; CHL[*Pfister, A. s.n.* (CONC)]; PRY[*Hassler, E. 11644* (G)]; URY[*Mujica Sallés, J. 439* (MVFA), *Rosengurtt, B. 650* (BAA)].

Deyeuxia viridis Phil.
Sin.: *Calamagrostis nemoralis* Kuntze, hom. illeg., *Calamagrostis nemoralis* Phil., *Calamagrostis viridis* (Phil.) Soreng
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1978a, b; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 72* (BAB)]; CHL[*Gunckel, L. H. 12541* (BAA, CONC)].

Deyeuxia vivipara Phil. = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **fuegiana** (Hook. f.) Moore & Doggett
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Deyeuxia vulcanica Phil. = **Poa obvallata** Steud.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1978b.

Diachyrium arundinaceum Griseb. = **Sporobolus rigens** (Trin.) E. Desv. var. **rigens**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Diachyrium rigens (Trin.) Mez = **Sporobolus rigens** (Trin.) E. Desv. var. **rigens**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Diandrochloa glomerata (Walter) Burkart = **Eragrostis japonica** (Thunb.) Trin.

Dichanthelium (Hitchc. & Chase) Gould

Número de especies: 6

Dichanthelium hebotes (Trin.) Zuloaga
Sin.: *Panicum hebotes* Trin., *Panicum subtiliracemosum* Renvoize, *Panicum subtipaniculatum* Renvoize, nom. nud.
Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dombrowski, L. T. 3943* (K, PKDC)].

Dichanthelium sabulorum (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **cordatum** (Zuloaga & Morrone) Zuloaga
Sin.: *Panicum sabulorum* Lam. var. *cordatum* Zuloaga & Morrone
Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Zuloaga, F. O., Ellis, R. P. & Morrone, O., 1993; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5504* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 2361* (ICN)].

Dichanthelium sabulorum (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **polycladum** (Ekman) Zuloaga
Sin.: *Panicum deltae* Parodi ex Burkart, *Panicum demissum* Trin., *Panicum nitidum* auct. non Lam., *Panicum pencanum* Phil., *Panicum polycladum* Ekman, *Panicum ramosissimum* Trin., *Panicum sabulorum* Lam. var. *polycladum* (Ekman) R.A. Palacios
Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 1991a; Zuloaga, F. O., 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VII, VIII); PRY(CAU, CAA, GUA, ITA, PAI, SPE); URY(CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7779* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 12293* (MBM)]; CHL[*Barros, E. 291* (SI)]; PRY[*Woolston, A. L. 117* (NY)]; URY[*Alonso Paz, E. 3728* (MVFQ)].

Dichanthelium sabulorum (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **sabulorum**
Sin.: *Panicum acutatum* Steud., *Panicum fultum* Hack., *Panicum latiglume* Döll, *Panicum latiglume* Döll var. *decalvatum* Döll, *Panicum sabulorum* Lam.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 1991a; Zuloaga, F. O., 1989, 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IX); PRY(COA, GUA, PAI); URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7113* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15192* (MBM)]; CHL[*Schlegel, F. 1784* (CONC)]; PRY[*Hassler, E. 3124* (BAA, G, NY, W)]; URY[*Marchesi, E. 1425* (MVFA)].

[Dichanthelium sciurotis (Trin.) Davidse]
Sin.: *Panicum cordifolium* Steud., nom. superfl., *Panicum sciurotis* Trin., *Panicum sciurotis* Trin. var. *breviglume* Döll, *Panicum sciurotis* Trin. var. *scabriusculum* Döll
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Dichanthelium sciurotoides (Zuloaga & Morrone) Davidse
Sin.: *Panicum sciurotis* auct. non Trin., *Panicum sciurotoides* Zuloaga & Morrone
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 1991b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14758* (K, MBM, US)].

Dichanthelium stigmosum (Trin.) Zuloaga
Sin.: *Panicum stigmosum* Trin.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Ellis, R. P. & Morrone, O., 1993; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 28400* (MBM)].

Dichanthelium superatum (Hack.) Zuloaga
Sin.: *Panicum superatum* Hack.
Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Valls, J. F. M. 1398* (ICN)].

Dichanthelium surrectum (Chase ex Zuloaga & Morrone) Zuloaga
Sin.: *Panicum missionum* Mez, hom. illeg., *Panicum surrectum* Chase ex Zuloaga & Morrone
Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 1991a; Zuloaga, F. O., 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 44693* (PACA)]; PRY[*Balansa, B. 7* (G)].

Dichanthium Willemet

Número de especies: 2 introducidas

Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf
Sin.: *Andropogon annulatus* Forssk.
Referencias: Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1987; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Quarín, C. L. 3530* (CTES)].

Dichanthium aristatum (Poir.) C.E. Hubb.
Sin.: *Andropogon aristatus* Poir.
Referencias: Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1987; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7250* (SI)]; PRY[*Zuloaga, F. O. 7322* (SI)].

Dichanthium saccharoides (Sw.) Roberty = **Bothriochloa saccharoides** (Sw.) Rydb.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

[Dichelachne crinita (L. f.) Hook. f.]
Sin.: *Anthoxanthum crinitum* L. f.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Taxón excluido del área del proyecto. Citada para Chile sobre la base de una mala identificación de *Didymochatea micrantha*.

Didymochatea chilensis Steud. = **Bromidium anomalum** (Trin.) Döll
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Dielsiochloa Pilg.

Número de especies: 1

Dielsiochloa floribunda (Pilg.) Pilg.
Sin.: *Bromus mandonianus* Henrard, *Trisetum floribundum* Pilg.
Referencias: Nicora, E. G., 1975; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 4500–5300 m.
Países: ARG(JUJ, LRI); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 6241* (BAA)]; CHL[*Arancio, G. 472* (CONC)].

Digitaria Haller, nom. cons.

Número de especies: 41, 4 endémicas, 10 introducidas

Digitaria abortiva Reeder = **Digitaria ciliaris** (Retz.) Koeler
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001.

Digitaria adscendens (Kunth) Henrard = **Digitaria ciliaris** (Retz.) Koeler
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1976; Webster, R. D., 1984.

Digitaria adusta (Nees) Griseb. = **Digitaria phaeotrix** (Trin.) Parodi var. **adusta** (Nees) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974.

Digitaria adusta (Nees) Griseb. var. *hackelii* (Arechav.) Henrard = **Digitaria phaeotrix** (Trin.) Parodi var. **hackelii** (Arechav.) Henrard
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Digitaria adusta (Nees) Griseb. var. *leiantha* Hack. = **Digitaria leiantha** (Hack.) Parodi
Referencias: Parodi, L. R., 1928a.

Digitaria adusta (Nees) Griseb. var. *leucotricha* (Hack.) Parodi = **Digitaria phaeotrix** (Trin.) Parodi var. **adusta** (Nees) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974.

Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi var. **aequiglumis**
Sin.: *Digitaria campestris* Henrard, *Digitaria chillanensis* Phil. ex Henrard, nom. nud., *Panicum aequiglume* Hack. & Arechav., *Panicum debile* Desf. var. *aequiglume* (Hack. & Arechav.) Hack., *Panicum debile* Phil., nom. illeg., *Panicum ramosum* Arechav., hom. illeg., *Panicum tridactylum* Phil., *Syntherisma aequiglumis* (Hack. & Arechav.) Hitchc.
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1988; Renvoize, S. A., 1988; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b; Vega, A. S. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2002.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VII, VIII, IX); PRY(APA, CEN, ITA, PHA); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, RIV, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Quarín, C. L. 3000* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 12364* (MBM)]; CHL[*Miguez 67* (K)]; PRY[*Pavetti, C. V. M. 10974* (BAA)]; URY[*Burkart, A. 21524* (SI), *Cavalheiro, E. M. 466* (BLA)].

Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi var. **laetevirens** (Mez) Henrard
Sin.: *Digitaria laetevirens* Mez
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b.
Hierba. Anual. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, SAL, SFE, TUC); BRA(RGS); PRY(PHA); URY(CAS, CLA, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 45* (SI), *Quarín, C. L. 1895* (SI)]; BRA[*Cavalheiro, E. M. 532* (SI), *Rambo, B. 45908* (BLA, PACA)]; PRY[*Pavetti, C. V. M. 10525* (BAA)]; URY[*Arechavaleta, J. 263* (W)].

Digitaria arechavaletae Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Digitaria phaeotrix** (Trin.) Parodi var. **hackelii** (Arechav.) Henrard
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001.

Digitaria argyrostachya (Steud.) Fernald = **Digitaria ternata** (A. Rich.) Stapf
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001.

Digitaria argyrostachya (Steud.) Fernald var. *hirticulmis* Henrard = **Digitaria ternata** (A. Rich.) Stapf
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001.

Digitaria balansae Henrard
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, ITA, MIE, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15466* (SI), *Pedersen, T. M. 5845* (BAA)]; BRA[*Cavalheiro, E. M. 771* (BLA)]; PRY[*Rosengurtt, B. 5920* (BAA, MVFA, SI)].

Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult.
Sin.: *Panicum glaucescens* Nees, hom. illeg., *Paspalum bicorne* Lam.
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Lombardo, A., 1984; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1976, 1994b; Vega, A. S. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2002; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 100–1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA, PHA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4048* (SI)]; BRA[*Boldrini, I. J. 962* (ICN)]; PRY[*Rosengurtt, B. 5498* (MVFA), *Zuloaga, F. O. 7289* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 11781* (MVFA)].

Digitaria bonplandii Henrard
Sin.: *Panicum gerdesii* Hack. f. *pleostachyum* Hack.
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Zuloaga, F. O. 4579* (MO, SI)]; PRY[*Hassler, E. 8310* (G)].

Digitaria californica (Benth.) Henrard var. **californica**
Sin.: *Eriachne rigida* Phil., *Panicum californicum* Benth., *Panicum friesii* Hack. ex R.E. Fr., *Trichachne californica* (Benth.) Chase
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 2100–2200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY); URY(MON, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 528* (SI)]; PRY[*Vanni, R. O. 1993* (CTES)]; URY[*Lombardo, A. 2977* (MVFA)].

Digitaria californica (Benth.) Henrard var. **villosissima** Henrard
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b; Vega, A. S. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Herrera, S. M. E. 342* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2766* (BAA)].

Digitaria campestris Henrard = **Digitaria aequiglumis** (Hack. & Arechav.) Parodi var. **aequiglumis**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Digitaria catamarcensis Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1976; Vega, A. S. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2002; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–1000 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 14356* (BAA, LP, SI)].

Digitaria chacoensis (Parodi) Henrard
Sin.: *Digitaria phaeotrix* (Trin.) Parodi var. *chacoensis* Parodi
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 8250* (BAA)].

Digitaria chillanensis Phil. ex Henrard, nom. nud. = **Digitaria aequiglumis** (Hack. & Arechav.) Parodi var. **aequiglumis**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler
Sin.: *Digitaria abortiva* Reeder, *Digitaria adscendens* (Kunth) Henrard, *Digitaria marginata* Link, *Digitaria tarapacana* Phil., *Panicum adscendes* Kunth, *Panicum ciliare* Retz.
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1976, 1994b; Webster, R. D., 1984; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I); PRY(APY, APA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3853* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 13113* (SI)]; PRY[*Kiesling, R. 9570* (G, PY, SI)]; URY[*Cavalheiro, E. M. 452* (BLA)].

Digitaria connivens (Trin.) Henrard var. **connivens**
Sin.: *Panicum connivens* Trin.
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Burkart, A. 25060* (SI), *Hatschbach, G. 12377* (MBM)].

Digitaria connivens (Trin.) Henrard var. **pilosa** Canto-Dorow & Longhi-Wagner
Referencias: Canto-Dorow, T. S. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Cavalheiro, E. M. 414* (BLA)].

Digitaria corynotricha (Hack.) Henrard
Sin.: *Panicum corynotrichum* Hack.
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Davidse, G. 10980* (MO)].

Digitaria cuyabensis (Trin.) Parodi
Sin.: *Panicum cuyabense* Trin.
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b; Vega, A. S. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2002; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CEN, COA, PAI, PHA); URY(ART, CLA, RIV, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Quarín, C. L. 3319* (SI)]; BRA[*Canto-Dorow, T. S. 312* (ICN)]; PRY[*Hassler, E. 12464* (BAF, G)]; URY[*Rosengurtt, B. 4627e* (MVFA)].

Digitaria decumbens Stent = **Digitaria eriantha** Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Digitaria dusenii Chase ex Renvoize = **Digitaria purpurea** Swallen
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Digitaria enodis (Hack. ex Arechav.) Parodi
Sin.: *Paspalum enode* Hack. ex Arechav.
Referencias: Canto-Dorow, T. S. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Canto-Dorow, T. S., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(SCA); URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Davidse, G. 11105* (SP)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 2683* (BLA)].

Digitaria eriantha Steud.
Sin.: *Digitaria decumbens* Stent, *Digitaria eriantha* Steud. subsp. *pentzii* (Stent) Kok, *Digitaria pentzii* Stent
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–600 m.
Países: ARG(CHA, COS, LPA, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CEN, COA, MIE, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 2099* (SI)]; BRA[*Burkart, A. 25065* (SI), *Longhi-Wagner, H. M. 1932* (ICN)]; PRY[*Rojas, T. 13960* (BAA, LIL), *Zuloaga, F. O. 7254* (SI)].

Digitaria eriantha Steud. subsp. *pentzii* (Stent) Kok = **Digitaria eriantha** Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Digitaria eriostachya Mez
Sin.: *Digitaria fallens* Parodi
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI); URY(ART, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 12602* (SI)]; BRA[*Canto-Dorow, T. S. 639* (ICN, SMDB)]; PRY[*Balansa, B. 4352* (G)]; URY[*Rosengurtt, B. 7185b* (MVFA)].

Digitaria fallens Parodi = **Digitaria eriostachya** Mez
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974.

Digitaria fiebrigii (Hack.) A. Camus
Sin.: *Panicum fiebrigii* Hack.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1993, 1994b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CON, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Burkart, A. 18421* (SI)].

Digitaria filiformis (L.) Koeler
Sin.: *Panicum filiforme* L.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(APA, AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11384* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 10952* (BAA, BAF, LIL)].

Digitaria fuscescens (J. Presl) Henrard
Sin.: *Paspalum fuscescens* J. Presl
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994b; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CEN, CON, COA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Dombrowski, L. T. 4130* (MBM)]; PRY[*Morrone, O. 330* (SI)].

Digitaria gerdesii (Hack.) Parodi
Sin.: *Panicum gerdesii* Hack.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6865* (MBM)]; PRY[*Morrone, O. 458* (SI)].

[Digitaria hitchcockii (Chase) Stuck.]
Sin.: *Valota hitchcockii* Chase
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Digitaria horizontalis Willd.
Sin.: *Panicum horizontale* (Willd.) G. Mey., *Paspalum oxyanthum* Steud.
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1200 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL); BRA(PAR, SCA); PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4028* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 9233* (HBR)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5369* (G), *Zuloaga, F. O. 7287* (SI)].

Digitaria insularis (L.) Mez ex Ekman, comb. superfl. = **Digitaria insularis** (L.) Fedde
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001; Schumann, K. M. & Fedde, F. K. G., 1903.

Digitaria insularis (L.) Fedde
Sin.: *Acicarpa sacchariflora* Raddi, nom. illeg., *Andropogon insularis* L., *Digitaria insularis* (L.) Mez ex Ekman, comb. superfl., *Panicum insulare* (L.) G. Mey. var. *typicum* Hack., nom. inval., *Panicum leucophaeum* Kunth, *Trichachne insularis* (L.) Nees, *Tricholaena insularis* (L.) Griseb., *Valota insularis* (L.) Chase
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Barreto, I. L., 1981; Renvoize, S. A., 1988; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994b; Schumann, K. M. & Fedde, F. K. G., 1903; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE); URY(ART, RIV, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 571* (SI)]; BRA[*Canto-Dorow, T. S. 396* (ICN, SMDB)]; PRY[*Hassler, E. 636* (G), *Pérez, B. 1307* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 873* (MVFA)].

Digitaria ischaemum (Schreb. ex Schweigg.) Schreb. ex Muhl.
Sin.: *Panicum ischaemum* Schreb.
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA); CHL(VIII, X).
Ejemplares de referencia: BRA[*Canto-Dorow, T. S. 437* (ICN, SMDB)]; CHL[*Montero, G. 9228* (CONC)].

Digitaria laetevirens Mez = **Digitaria aequiglumis** (Hack. & Arechav.) Parodi var. **laetevirens** (Mez) Henrard
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b.

Digitaria lanuginosa (Nees) Henrard
Sin.: *Paspalum lanuginosum* Nees
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Swallen, J. R. 9045* (US)].

Digitaria laxa (Rchb. ex A. Spreng.) Parodi
Sin.: *Panicum recalvum* (Nees) Kunth, *Reimaria laxa* Rchb. ex A. Spreng.
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, MIS, SFE); BRA(PAR); PRY(CEN, CON, ÑEE, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1857* (SI)]; BRA[*Lindeman, J. C. 459* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 27524* (SI)].

Digitaria lehmanniana Henrard var. **dasyantha** Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1968; Vega, A. S. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–1700 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 11060* (BAA)].

Digitaria leiantha (Hack.) Parodi
Sin.: *Digitaria adusta* (Nees) Griseb. var. *leiantha* Hack., *Panicum adustum* Nees var. *leianthum* Hack.
Referencias: Parodi, L. R., 1926a; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); PRY(AMA, CON, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Muello 4704* (BAA)]; PRY[*Balansa, B. 4351* (G)].

Digitaria leiantha (Hack.) Parodi var. *leucotricha* (Hack.) Henrard = **Digitaria phaeotrix** (Trin.) Parodi var. **adusta** (Nees) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974.

Digitaria longiflora (Retz.) Pers.
Sin.: *Paspalum longiflorum* Retz.
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 12732* (MBM)].

Digitaria marginata Link = **Digitaria ciliaris** (Retz.) Koeler
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001; Webster, R. D., 1984.

Digitaria mattogrossensis (Pilg.) Henrard
Sin.: *Panicum adustum* Nees var. *mattogrossense* Pilg.
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Meyer 508* (B, US)]; PRY[*Balansa, B. 4367* (G), *Zuloaga, F. O. 7277* (SI)].

Digitaria megapotamica Mez = **Panicum elephantipes** Nees ex Trin.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Zuloaga, F. O., 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Digitaria myriostachya (Hack.) Henrard
Sin.: *Panicum myriostachyum* Hack.
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 1343* (US)].

Digitaria nuda A. Schumach.
Sin.: *Panicum sanguinale* L. var. *digitatum* (Sw.) Hack. ex Urb.
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1992, 1994b; Vega, A. S. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2002; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CEN, COA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morel, I. 2667* (SI)]; BRA[*Kranz 251* (FUEL)]; PRY[*Quarín, C. L. 1603* (BAA, CTES)].

Digitaria paraguayensis Henrard
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1992, 1994b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fernández 248* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 4363* (G)].

Digitaria pentzii Stent = **Digitaria eriantha** Steud.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi var. **adusta** (Nees) Rúgolo
Sin.: *Digitaria adusta* (Nees) Griseb., *Digitaria adusta* (Nees) Griseb. var. *leucotricha* (Hack.) Parodi, *Digitaria leiantha* (Hack.) Parodi var. *leucotricha* (Hack.) Henrard, *Panicum adustum* Nees, *Panicum adustum* Nees var. *leucotrichum* Hack.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE); BRA(PAR); PRY(AMA, CON, COA, ITA, PAI, SPE); URY(RNO, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 1261* (SI), *Schulz 10996* (SI)]; BRA[*Swallen, J. R. 8388* (US)]; PRY[*Jiménez 13470* (BAA)]; URY[*Rosengurtt, B. 7124b* (SI)].

Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi var. *chacoensis* Parodi = **Digitaria chacoensis** (Parodi) Henrard
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi var. **hackelii** (Arechav.) Henrard
Sin.: *Anthaenantia hackelii* Arechav., *Digitaria adusta* (Nees) Griseb. var. *hackelii* (Arechav.) Henrard, *Digitaria arechavaletae* Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Panicum hackelii* (Arechav.) Arechav., *Syntherisma hackelii* (Hack.) Chase
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, SFE); BRA(RGS, SCA); URY(FLA, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 4951* (BAA), *Quarín, C. L. 1978* (SI)]; BRA[*Boldrini, I. J. 1135* (ICN, SMDB)]; URY[*Rosengurtt, B. 398be* (MVFA)].

Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi var. **phaeotrix**
Sin.: *Panicum adustum* Nees var. *phaeothrix* (Trin.) Hack., *Panicum phaeotrix* Trin., *Trichachne ferruginea* Nees
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Sánchez, E. A., 1989; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CLA, FLA, LAV, ROC, SOR).

Ejemplares de referencia: ARG[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 2106* (SI)]; BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 2660* (ICN), *Smith, L. B. 15877* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 5364pe* (SI), *Rosengurtt, B. s.n.* (PACA)].

Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi var. **saltensis** (Henrard) Rúgolo
Sin.: *Digitaria saltensis* Henrard
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1976; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); URY(ART, MON, PAY, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fernández, J. G. 518* (SI)]; URY[*Orihuela, G. s.n.* (BAA, L)].

Digitaria platicaulis (Poir.) Desv. = **Axonopus compressus** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Digitaria plebeia Phil. = **Digitaria sanguinalis** (L.) Scop.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Digitaria purpurea Swallen
Sin.: *Digitaria dusenii* Chase ex Renvoize
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15670* (MVFA, SI, US), *Hatschbach, G. 43821* (CTES, MBM)].

Digitaria queenslandica Henrard
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001.
Hierba. Anual. Introducida. 0–600 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kranz 267* (FUEL)]; PRY[*Vanni, R. O. 2107* (G)].

Digitaria sacchariflora (Nees) Henrard
Sin.: *Leptocoryphium penicilligerum* Speg., *Panicum insulare* (L.) G. Mey. var. *sacchariflorum* (Nees) Hack., *Panicum penicilligerum* (Speg.) Hack., *Trichachne penicilligera* (Speg.) Parodi, *Trichachne sacchariflora* Nees, *Valota penicilligera* (Speg.) Chase ex Parodi
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1970, 1974, 1994b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS); PRY(APA, AMA, CEN, GUA, MIE, SPE); URY(ART, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28640* (SI), *Romanczuk, M. C. 275* (SI)]; BRA[*Grun, S. s.n.* (MVFA, SI)]; PRY[*Morrone, O. 391* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 7337* (MVFA)].

Digitaria saltensis Henrard = **Digitaria phaeotrix** (Trin.) Parodi var. **saltensis** (Henrard) Rúgolo
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Sin.: *Digitaria plebeia* Phil., *Panicum sanguinale* L., *Panicum sanguinale* L. var. *vulgare* (Schrad.) Döll
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Canto-Dorow, T. S., 2001; Cámara Hernández, J. A., 2001; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); PRY(APY, APA); URY(CAS, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Villamil, C. B. 4761* (SI)]; BRA[*Canto-Dorow, T. S. 405* (ICN, SMDB)]; CHL[*Gunckel, L. H. 15873* (BLA, PACA)]; PRY[*Vanni, R. O. 2226* (CTES)]; URY[*Cavalheiro, E. M. 470* (BLA)].

Digitaria sellowii (Müll. Hal.) Henrard
Sin.: *Trichachne sellowii* Müll. Hal.
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Canto-Dorow, T. S. 625* (ICN, SMDB)].

Digitaria similis Beetle ex Gould
Sin.: *Trichachne affinis* Swallen
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Cavalheiro, E. M. & Barreto, I. L., 1981; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1992, 1994b; Vega, A. S. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CON, COA, ÑEE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 1230* (SI), *Quarín, C. L. 3279* (SI)]; BRA[*Grun, S. s.n.* (MVFA, SI)]; PRY[*Rojas, T. 2776* (BAA)].

Digitaria singularis Mez
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Martínez Crovetto, R. 9411* (BAA)]; PRY[*Balansa, B. 4668* (BAA, G)].

Digitaria swalleniana Henrard
Sin.: *Trichachne sericea* Swallen, hom. illeg.
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(CEN, COA, PHA); URY(CAS, COL, FLA, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 926* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 12479* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 11573* (BAF, G)]; URY[*Izaguirre de Artuccio, P. s.n.* (MVFA, SI), *Rosengurtt, B. 7068* (BLA, K)].

Digitaria tarapacana Phil. = **Digitaria ciliaris** (Retz.) Koeler
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

[Digitaria tenuis (Nees) Henrard]
Sin.: *Panicum insulare* (L.) Mez var. *tenerrimum* (Kunth) Hack., *Trichachne tenuis* Nees
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Digitaria ternata (A. Rich.) Stapf
Sin.: *Cynodon ternatus* A. Rich., *Digitaria argyrostachya* (Steud.) Fernald, *Digitaria argyrostachya* (Steud.) Fernald var. *hirticulmis* Henrard, *Panicum argyrostachyum* Steud.
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974; Subils, R., 1995.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–2000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, LPA, SFE, TUC); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 25* (SI), *Deginani, N. B. 819* (SI)]; BRA[*Canto-Dorow, T. S. 366* (ICN)].

Digitaria violascens Link
Sin.: *Panicum violascens* (Link) Kunth, *Paspalum chinense* Nees, *Paspalum filiculme* Nees ex Miq., *Paspalum minutiflorum* Steud.
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1340* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 48926* (MBM), *Klein, R. M. 11249* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 13365* (BAA)].

Dinebra aristidoides Kunth = **Bouteloua aristidoides** (Kunth) Griseb.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Diplachne aquatica Bosc ex Roem. & Schult. = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **fascicularis** (Lam.) N. Snow
Referencias: Snow, N., 1998c.

Diplachne carinata (Griseb.) Hack. = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **uninervia** (J. Presl) N. Snow
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Diplachne chloridiformis Hack. = **Leptochloa chloridiformis** (Hack.) Parodi
Referencias: Nicora, E. G., 1995b.

Diplachne dubia (Kunth) Scribn. = **Leptochloa dubia** (Kunth) Nees
Referencias: Renvoize, S. A., 1998.

Diplachne fascicularis (Lam.) P. Beauv. = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **fascicularis** (Lam.) N. Snow
Referencias: Snow, N., 1998c.

Diplachne fusca (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **muelleri** (Benth.) N. Snow

Diplachne fusca auct. non (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **uninervia** (J. Presl) N. Snow

Diplachne fusca (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. var. *macrotricha* Hack. = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **uninervia** (J. Presl) N. Snow
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Diplachne latifolia (Griseb.) Hack. = **Gouinia latifolia** (Griseb.) Vasey
Referencias: Nicora, E. G., 1995b.

Diplachne malabarica (L.) Merr. = **Poa malabarica** L.
Referencias: Snow, N. & Davidse, G., 1998.

Diplachne mendocina (Phil.) Kurtz = **Leptochloa dubia** (Kunth) Nees
Referencias: Renvoize, S. A., 1998.

Diplachne muelleri Benth. = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **muelleri** (Benth.) N. Snow

Diplachne procumbens (Mühlenb.) Nash, hom. illeg. = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **fascicularis** (Lam.) N. Snow
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Diplachne procumbens Arechav. = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **uninervia** (J. Presl) N. Snow
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Diplachne reptatrix (L.) Druce = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **muelleri** (Benth.) N. Snow
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Diplachne rigescens J. Presl = **Festuca rigescens** (J. Presl) Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Diplachne scabra (Nees) Nicora = **Leptochloa scabra** Nees
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Diplachne spicata (Nees) Döll = **Tripogon spicatus** (Nees) Ekman
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Diplachne tarapacana Phil. = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **uninervia** (J. Presl) N. Snow
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Diplachne uninervia (J. Presl) Hitchc., comb. superfl. = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **uninervia** (J. Presl) N. Snow

Diplachne uninervia (J. Presl) Parodi = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **uninervia** (J. Presl) N. Snow
Referencias: Snow, N., 1998c.

Diplachne uninervia (J. Presl) Parodi f. *abbreviata* Parodi = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **uninervia** (J. Presl) N. Snow
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Diplachne uninervia (J. Presl) Parodi var. *procumbens* (Arechav.) Parodi = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **uninervia** (J. Presl) N. Snow
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Dissanthelium Trin.

Número de especies: 2

Dissanthelium atropidiforme (Hack.) Soreng = **Poa atropidiformis** Hack. var. **atropidiformis**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Dissanthelium atropidiforme (Hack.) Soreng var. *patagonica* (Parodi) Soreng = **Poa atropidiformis** Hack. var. **patagonica** (Parodi) Nicora
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Dissanthelium macusaniense (E.H.L. Krause) R.C. Foster & L.B. Sm.
Sin.: *Graminastrum macusaniense* E.H.L. Krause
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Sulekic, A. A., 1999a.
Hierba. Anual. Nativa. 4100–4600 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Saravia Toledo, C. 14069* (SI)].

Dissanthelium patagonicum Parodi = **Poa atropidiformis** Hack. var. **patagonica** (Parodi) Nicora
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Dissanthelium peruvianum (Nees & Meyen) Pilg.
Sin.: *Phalaridium peruvianum* Nees & Meyen
Referencias: Anton, A. M. & Negritto, M. A., 1997; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 4144* (LP)]; CHL[*Peterson, P. M. 15771* (CONC)].

Distichlis Raf.

Número de especies: 5, 3 endémicas

Distichlis ammobia Phil. = **Poa cumingii** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Distichlis araucana Phil. = **Distichlis spicata** (L.) Greene var. **stricta** (Torr.) Scribn.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Distichlis australis (Speg.) Villamil
Sin.: *Monanthochloe australis* Speg.
Referencias: Villamil, C. B., 1969b.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33053* (SI)].

Distichlis deserticola Phil. = **Distichlis spicata** (L.) Greene var. **mendocina** (Phil.) Hack.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Distichlis hirsuta Phil. = **Distichlis spicata** (L.) Greene var. **mendocina** (Phil.) Hack.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Distichlis hirta Phil. = **Distichlis spicata** (L.) Greene var. **mendocina** (Phil.) Hack.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Distichlis humilis Phil.
Sin.: *Distichlis misera* Phil., *Distichlis spicata* (L.) Greene var. *humilis* (Phil.) Kuntze
Referencias: Beetle, A. A., 1955; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 3100–3300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU); CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31808* (SI)]; CHL[*Arancio, G. 531* (CONC), *Barros, E. 963* (SI)].

Distichlis laxiflora Hack.
Sin.: *Distichlis scoparia* (Kunth) Arechav. f. *laxiflora* (Hack.) Beetle
Referencias: Nicora, E. G., 1970f; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, SAL, SFE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 6839* (SI)].

Distichlis maritima Raf. = **Distichlis spicata** (L.) Greene var. **spicata**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Distichlis mendocina Phil. = **Distichlis spicata** (L.) Greene var. **mendocina** (Phil.) Hack.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Distichlis misera Phil. = **Distichlis humilis** Phil.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Distichlis prostrata (Kunth) E. Desv. = **Distichlis spicata** (L.) Greene var. **stricta** (Torr.) Scribn.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Distichlis scoparia (Kunth) Arechav. f. *erinacea* Beetle = **Distichlis scoparia** (Kunth) Arechav. var. **erinacea** (Beetle) Nicora

Distichlis scoparia (Kunth) Arechav. f. *laxiflora* (Hack.) Beetle = **Distichlis laxiflora** Hack.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Distichlis scoparia (Kunth) Arechav. var. **erinacea** (Beetle) Nicora
Sin.: *Distichlis scoparia* (Kunth) Arechav. f. *erinacea* Beetle
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 3792* (SI)].

Distichlis scoparia (Kunth) Arechav. var. **scoparia**
Sin.: *Poa scoparia* Kunth, *Uniola scoparia* (Kunth) Steud.
Referencias: Beetle, A. A., 1955; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, RME); URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15983* (SI)]; CHL[*Hosseus, C. C. 89* (CORD)]; URY[*Berro, M. B. 1003* (MVFA)].

Distichlis spicata (L.) Greene var. **andina** Beetle
Referencias: Beetle, A. A., 1955; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 2200–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 14930* (BAA, LIL, SI)].

Distichlis spicata (L.) Greene var. *humilis* (Phil.) Kuntze = **Distichlis humilis** Phil.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Distichlis spicata (L.) Greene var. **mendocina** (Phil.) Hack.
Sin.: *Distichlis deserticola* Phil., *Distichlis hirsuta* Phil., *Distichlis hirta* Phil., *Distichlis mendocina* Phil.
Referencias: Beetle, A. A., 1955; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 2200–3000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU); CHL(III, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 1389* (SI), *Zuloaga, F. O. 3721* (SI)]; CHL[*Philippi, R. A. 407* (*)].

Distichlis spicata (L.) Greene var. **spicata**
Sin.: *Distichlis maritima* Raf., *Uniola spicata* L.
Referencias: Marticorena, A., Pardo, V., Peñaloza, A., Negritto, M. A., Cavieres, L. & Parada, M., 2004; Nicora, E. G., 1978; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–3600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, RME); URY(CAS, COL, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15895* (SI), *Stuckert, T. T. J. V. 2914* (CORD)]; CHL[*Hosseus, C. C. 87* (CORD), *Martin, H. C. 12* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 580* (SI)].

Distichlis spicata (L.) Greene var. *stricta* (Torr.) Beetle, hom. illeg. = **Distichlis spicata** (L.) Greene var. **stricta** (Torr.) Scribn.

Distichlis spicata (L.) Greene var. **stricta** (Torr.) Scribn.
Sin.: *Distichlis araucana* Phil., *Distichlis prostrata* (Kunth) E. Desv., *Distichlis spicata* (L.) Greene var. *stricta* (Torr.) Beetle, hom. illeg., *Distichlis stricta* (Torr.) Rydb., *Poa prostrata* Kunth, *Uniola stricta* Torr.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Marticorena, C., com. pers.; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, SCR, SFE); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Herrera, S. M. E. 209* (SI)].
Notas: Citada para Chile sin citar ejemplar de referencia (C. Marticorena, com. pers.).

Distichlis stricta (Torr.) Rydb. = **Distichlis spicata** (L.) Greene var. **stricta** (Torr.) Scribn.

Distichlis volckmannii Phil. = **Poa cumingii** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Donax viridiflavescens (Poir.) Roem. & Schult. = **Deyeuxia viridiflavescens** (Poir.) Kunth var. **viridiflavescens**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Echinochloa P. Beauv., nom. cons.

Número de especies: 7, 2 introducidas

Echinochloa chacoënsis Michael ex Renvoize
Referencias: Renvoize, S. A., 1995; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 400–500 m.
Países: ARG(JUJ, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 2997* (SI)].

Echinochloa colonum (L.) Link
Sin.: *Echinochloa colonum* (L.) Link f. *zonalis* (Guss.) Wiegand, *Oplismenus colonus* (L.) Kunth, *Panicum colonum* L., *Panicum colonum* L. f. *maculatum* Arechav.
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994d; Mujica Sallés, J., 1996; Pfitcher, E. M. & Barreto, I. L., 1976; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(IJF); PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PHA); URY(ART, CLA, COL, MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 8258* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 11747* (HBR)]; CHL[*Jiles, C. 1710* (CONC)]; PRY[*Morrone, O. 397* (SI)]; URY[*Costa s.n.* (MVFA), *Herter, W. G. F. 329* (SI)].

Echinochloa colonum (L.) Link f. *zonalis* (Guss.) Wiegand = **Echinochloa colonum** (L.) Link
Referencias: Pfitcher, E. M. & Barreto, I. L., 1976.

Echinochloa crus-pavonis (Kunth) Schult.
Sin.: *Echinochloa crusgalli* (L.) P. Beauv. var. *crus-pavonis* (Kunth) Hitchc., *Oplismenus crus-pavonis* Kunth, *Panicum crus-galli* L. var. *sabulicola* (Nees) Trin.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1942; Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994d; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, IV, V, VII, VIII, IX, X, RME); PRY(APY, APA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PHA); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 24101* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 23973* (MBM)]; CHL[*Garaventa, A. 2800* (CONC)]; PRY[*Montes, J. E. 3339* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 926* (SI)].

Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. var. *crus-pavonis* (Kunth) Hitchc. = **Echinochloa crus-pavonis** (Kunth) Schult.
Referencias: Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970.

Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. var. **crusgalli**
Sin.: *Panicum crus-galli* L.
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994d; Pfitcher, E. M. & Barreto, I. L., 1976; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME); PRY(CEN, COA, PHA); URY(ART, CAS, CLA, FLA, MON, RIV, ROC, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 1230* (SI)]; BRA[*Clayton 4422* (US)]; CHL[*Gunckel, L. H. 14893* (CONC)]; PRY[*Rojas, T. 55* (G)]; URY[*Felippone, F. 3565* (SI)].

Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. var. **mitis** (Pursh) Peterm.
Sin.: *Panicum crus-galli* L. var. *mite* Pursh

Referencias: Martínez Crovetto, R., 1942; Nicora, E. G., 1978; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SFE); CHL(V, VI, VII, IX, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 734* (SI)]; CHL[*Kunkel, G. W. H. 2054* (SI), *Matthei, O. R. 361* (CONC)]; URY[*Felippone, F. 5466* (SI)].

Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. var. **zelayensis** (Kunth) Hitchc.
Sin.: *Oplismenus zelayensis* Kunth
Referencias: Marticorena, C., com. pers.; Martínez Crovetto, R., 1942; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, JUJ, SAL); CHL(VII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Türpe, A. M. 902* (BAA)].
Notas: Citada para Chile sin indicar ejemplar de referencia (Zuloaga et al., 2003).

Echinochloa helodes (Hack.) Parodi
Sin.: *Panicum helodes* (Hack.) Hauman, *Panicum spectabile* Nees ex Trin. var. *gracile* Kuntze ex Hicken, *Panicum spectabile* Nees ex Trin. var. *helodes* Hack., *Pseudechinolaena helodes* (Hack.) Herter
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1942; Sánchez, E. A., 1969; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, DFE, ERI, SFE); PRY(APY); URY(ART, CAS, COL, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 24066* (SI)]; PRY[*Vanni, R. O. 2584* (CTES)]; URY[*Rosengurtt, B. 10789* (MVFA)].
Notas: Citada para Brasil sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Zuloaga et al., 2003).

Echinochloa najada (Hack. & Arechav.) Parodi = **Oplismenopsis najada** (Hack. & Arechav.) Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch
Sin.: *Panicum crus-galli* L. var. *grandiflorum* Döll, *Panicum oryzoides* Ard.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1942; Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994d; Sánchez, E. A., 1969; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SJU); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21654* (SI)]; PRY[*Lurvey 60* (MO)].

Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc. var. **polystachya**
Sin.: *Oplismenus polystachyus* Kunth
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994d; Pfitcher, E. M. & Barreto, I. L., 1976; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, DFE, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PHA); URY(COL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7031* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 34361* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 2781* (G)]; URY[*Osten, C. 16499* (MVM)].

Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc. var. **spectabilis** (Nees) Mart. Crov.
Sin.: *Echinochloa spectabilis* (Nees) Link, *Panicum spectabile* Nees ex Trin., *Pseudechinolaena spectabilis* (Nees ex Trin.) Herter
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994d; Pfitcher, E. M. & Barreto, I. L., 1976; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Sánchez, E. A., 1969; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, DFE, ERI, FOR, SFE); BRA(SCA); PRY(CEN, ÑEE, PHA); URY(CAS, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 8339* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 11461* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 1689* (SI), *Rojas, T. 1689* (SI)]; URY[*García Zorrón, N. 1704* (MVFA)].

Echinochloa spectabilis (Nees) Link = **Echinochloa polystachya** (Kunth) Hitchc. var. **spectabilis** (Nees) Mart. Crov.
Referencias: Pfitcher, E. M. & Barreto, I. L., 1976.

Echinolaena Desv.

Número de especies: 1

Echinolaena minarum (Nees) Pilg.
Sin.: *Ichnanthus lilloi* Hack., *Ichnanthus minarum* (Nees) Döll, *Oplismenus minarum* Nees
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., 1981a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual o perenne. Nativa. 500–2600 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4434* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 21157* (MBM)].

Echinolaena nemorosa (Sw.) Kunth = **Ichnanthus nemorosus** (Sw.) Döll
Referencias: Zuloaga, F. O., 1981a.

Echinolaena polystachya Kunth = **Pseudechinolaena polystachya** (Kunth) Stapf

Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Echinolaena procurrens (Nees ex Trin.) Kunth = **Ichnanthus procurrens** (Nees ex Trin.) Stieber var. **procurrens**
Referencias: Zuloaga, F. O., 1981a.

Ehrharta Thunb.

Número de especies: 1 introducida

Ehrharta villosa Schult. f.
Referencias: Nicora, E. G., 1970g.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 15424* (BAA)].

Eleusine Gaertn.

Número de especies: 2, 1 introducida

Eleusine barbata Desv. = **Leptochloa barbata** (Desv.) Parodi ex Nicora
Referencias: Nicora, E. G., 1993, 1995b.

Eleusine filiformis Pers. = **Leptochloa panicea** (Retz.) Ohwi subsp. **brachiata** (Steud.) N. Snow

Eleusine indica (L.) Gaertn.
Sin.: *Cynosurus indicus* L.
Referencias: Basualdo, I. Z., Soria Rey, N., Degen, R., Ortíz, M. & Zardini, E. M., 2005; Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Burkart, A., 1969a; Cabrera, A. L., 1970a; Renvoize, S. A., 1988; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997; Sánchez, E. A., 1974.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAA, CEN, GUA); URY(MON, PAY, RNO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5602* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 16408* (SI)]; PRY[*Morrone, O. 399* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 7871* (MVFA)].

Eleusine indica (L.) Gaertn. var. *condensata* Döll = **Eleusine tristachya** (Lam.) Lam.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eleusine mucronata Michx. = **Leptochloa panicea** (Retz.) Ohwi subsp. **mucronata** (Michx.) Nowack
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eleusine oligostachya Link = **Eleusine tristachya** (Lam.) Lam.

Eleusine tristachya (Lam.) Kunth, comb. superfl. = **Eleusine tristachya** (Lam.) Lam.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eleusine tristachya (Lam.) Lam.
Sin.: *Cynosurus tristachyos* Lam., *Eleusine indica* (L.) Gaertn. var. *condensata* Döll, *Eleusine oligostachya* Link, *Eleusine tristachya* (Lam.) Kunth, comb. superfl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1970a; Macaya, J. & Faúndez Y., L., 1996a; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G., 1978; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Anual. Nativa. 0–400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(II, III, V, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); PRY(CEN, MIE, PAI); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Honfi, A. I. 474* (CTES, MNES)]; BRA[*Hatschbach, G. 33882* (MBM)]; CHL[*Acevedo, R. 81* (SI)]; PRY[*Burkart, A. 18293* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 30a* (SI)].

Elionurus Humb. & Bonpl. ex Willd., nom. cons.

Número de especies: 4, 1 endémica

Elionurus adustus (Trin.) Ekman = **Elionurus muticus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Elionurus adustus (Trin.) Ekman var. *calvescens* (Hack.) Hicken = **Elionurus muticus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Elionurus candidus (Trin.) Hack. = **Elionurus muticus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Elionurus candidus (Trin.) Hack. var. *bisetosus* Hack. & Lindm. = **Elionurus muticus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Elionurus ciliaris Kunth
Sin.: *Elionurus tripsacoides* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *ciliaris* (Kunth) Hack.
Referencias: Renvoize, S. A., 1978; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2890* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 46004* (AS, MO)].

Elionurus latiflorus (Nees ex Steud.) Hack. var. *calvescens* Hack. = **Elionurus muticus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Elionurus latiflorus (Nees ex Steud.) Hack. var. *gracilescens* Hack. = **Elionurus muticus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Elionurus latiflorus (Nees ex Steud.) Hack. var. *pectinatus* Hack. = **Elionurus muticus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Elionurus lividus Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 294* (K, SI)].

Elionurus megapotamicum (Spreng.) Herter = **Elionurus muticus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze
Sin.: *Anatherum megapotamicum* Spreng., *Andropogon adustus* Trin., *Andropogon candidus* Trin., *Andropogon dubius* Kunth, nom. superfl., *Andropogon latiflorus* Nees ex Steud., *Andropogon megapotamicus* Spreng., *Elionurus adustus* (Trin.) Ekman, *Elionurus adustus* (Trin.) Ekman var. *calvescens* (Hack.) Hicken, *Elionurus candidus* (Trin.) Hack., *Elionurus candidus* (Trin.) Hack. var. *bisetosus* Hack. & Lindm., *Elionurus latiflorus* (Nees ex Steud.) Hack. var. *calvescens* Hack., *Elionurus latiflorus* (Nees ex Steud.) Hack. var. *gracilescens* Hack., *Elionurus latiflorus* (Nees ex Steud.) Hack. var. *pectinatus* Hack., *Elionurus megapotamicum* (Spreng.) Herter, *Elionurus planifolius* Renvoize, *Elionurus rostratus* Nees, *Elionurus viridulus* Hack., *Lycurus muticus* Spreng.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1978, 1988; Roig, F. A., 1997[1996]; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, PHA); URY(ART, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1608* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 13007* (MBM)]; PRY[*Mereles, F. 4550* (FCQ, MO, NY, SI)]; URY[*Mujica Sallés, J. 235* (MVFA)].

Elionurus planifolius Renvoize = **Elionurus muticus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Elionurus rostratus Nees = **Elionurus muticus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Elionurus tripsacoides Humb. & Bonpl. ex Willd.
Sin.: *Elionurus tripsacoides* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *brevidentatus* Hack., *Elionurus tripsacoides* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *subcandidus* Kuntze
Referencias: Renvoize, S. A., 1978; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2400 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Saravia Toledo, C. 731* (CORD, MCNS)]; PRY[*Hassler, E. 10744* (BM)].
Notas: Citada para Brasil sin indicar distribución ni material de referencia (Zuloaga et al., 2003).

Elionurus tripsacoides Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *brevidentatus* Hack. = **Elionurus tripsacoides** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Elionurus tripsacoides Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *ciliaris* (Kunth) Hack. = **Elionurus ciliaris** Kunth
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Elionurus tripsacoides Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *subcandidus* Kuntze = **Elionurus tripsacoides** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Elionurus viridulus Hack. = **Elionurus muticus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Elymus L., nom. cons.

Número de especies: 8, 5 endémicas, 1 introducida

Elymus agropyroides J. Presl = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus agropyroides J. Presl var. *brevimucronatus* Hauman = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus albowianus Kurtz = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus andinus Poepp. ex Trin. = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus angulatus J. Presl
Sin.: *Agropyron breviaristatum* Hitchc., *Elymus agropyroides* J. Presl, *Elymus agropyroides* J. Presl var. *brevimucronatus* Hauman, *Elymus albowianus* Kurtz, *Elymus andinus* Poepp. ex Trin., *Elymus antarcticus* Hook. f., *Elymus antarcticus* Hook. f. var. *fulvescens* Kurtz, *Elymus asper* Nees, *Elymus breviaristatus* (Hitchc.) A. Löve, nom. illeg., *Elymus chonoticus* Phil., *Elymus chubutensis* Speg., *Elymus corralensis* Phil., *Elymus gayanus* E. Desv., *Elymus gracilis* Phil., *Elymus hitchcockii* Davidse, *Elymus latiglumis* Phil., *Elymus leptostachyus* Speg., *Elymus muticus* Phil., *Elymus oreophilus* Phil., *Elymus palenae* Phil., *Elymus paposanus* Phil., *Elymus pratensis* Phil., *Elymus rigescens* Poepp. ex Trin., *Elymus uniflorus* Phil., *Elymus vaginatus* Phil., *Elymus valdiviae* Steud., nom. inval., *Elytrigia antarctica* (Parodi) Covas, nom. illeg., *Elytrigia breviaristata* (Hitchc.) Covas ex J. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia breviaristata* (Hitchc.) Covas, nom. illeg., *Hordeum valdiviae* (Steud.) Schenck, nom. illeg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Hunziker, J. H., 1966; Seberg, O. & Petersen, G., 1998; Seberg, O., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF, TUC); CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 2072* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996361* (CONC, SGO)].

Elymus antarcticus Hook. f. = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus antarcticus Hook. f. f. *agroelymoides* Hicken = **Elymus scabriglumis** (Hack.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus antarcticus Hook. f. var. *fulvescens* Kurtz = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus araucanus (Parodi) A. Löve = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus arenarius L. = **Leymus arenarius** (L.) Hochst.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus asper Nees = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus attenuatus A. Löve, hom. illeg. = **Elymus cordilleranus** Davidse & Pohl

Elymus barbatus Kurtz, nom. nud. = **Leymus erianthus** (Phil.) Dubcovsky
Referencias: Seberg, O. & Linde-Laursen, 1996.

Elymus breviaristatus (Hitchc.) A. Löve, nom. illeg. = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus breviaristatus (Hitchc.) A. Löve subsp. *scabrifolius* (Döll) A. Löve = **Elymus scabrifolius** (Döll) J.H. Hunz.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus caput-medusae L. = **Taeniatherum caput-medusae** (L.) Nevski

Elymus chonoticus Phil. = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus chubutensis Speg. = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Elymus cordilleranus Davidse & Pohl]
Sin.: *Agropyron attenuatum* (Kunth) Roem. & Schult., *Elymus attenuatus* A. Löve, hom. illeg., *Elytrigia attenuata* (Kunth) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda,

Elytrigia attenuata (Kunth) Covas, nom. illeg., *Triticum attenuatum* Kunth
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Elymus corralensis Phil. = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus erianthus Phil. = **Leymus erianthus** (Phil.) Dubcovsky
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus erianthus Phil. var. *aristatus* Hicken = **Leymus erianthus** (Phil.) Dubcovsky
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus erianthus Phil. var. *spegazzinii* Kurtz ex Hauman = **Leymus erianthus** (Phil.) Dubcovsky
Referencias: Seberg, O. & Linde-Laursen, 1996.

Elymus fuegianus (Speg.) A. Löve = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus gayanus E. Desv. = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus glaucescens Seberg = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus gracilis Phil. = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus hitchcockii Davidse = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Seberg, O., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus latiglumis Phil. = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus lechleri Steud. = **Hordeum lechleri** (Steud.) Schenck
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus leptostachyus Speg. = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus magellanicus (E. Desv.) A. Löve
Sin.: *Agropyron antarcticum* Parodi, *Agropyron araucanum* (Parodi) Nicora, *Agropyron attenuatum* (Kunth) Roem. & Schult. var. *araucanum* Parodi, *Agropyron attenuatum* (Kunth) Roem. & Schult. var. *ruizianum* Parodi, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz f. *submutica* Kurtz, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *brachyatherum* Parodi, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *chaetophorum* Parodi, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *patagonicum* (Speg.) Hauman & Vanderveken, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *patagonicum* (Speg.) Macloskie, nom. illeg., *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *polystachyum* Parodi, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Macloskie, nom. illeg., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *festucoides* (Speg.) Hauman & Vanderveken, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *festucoides* (Speg.) Macloskie, nom. illeg., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *glabrivalva* (Speg.) Hauman & Vanderveken, comb. superfl., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *glabrivalva* (Speg.) Macloskie & Dusén, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *lasiopodum* (Speg.) Hauman & Vanderveken, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *lasiopodum* (Speg.) Macloskie, nom. illeg., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *pubiflorum* (Steud.) Speg. ex Hauman & Vanderveken, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *secundum* (J. Presl) Macloskie, nom. illeg., *Agropyron patagonicum* (Speg.) Parodi, *Agropyron patagonicum* (Speg.) Parodi var. *australe* Parodi, *Agropyron patagonicum* (Speg.) Parodi var. *festucoides* (Speg.) Parodi, *Agropyron patagonicum* (Speg.) Parodi var. *macrochaetum* (Parodi) Nicora, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *aristatum* P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *fragile* Parodi, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *megastachyum* P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *microstachyum* P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *tridentatum* P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *trifidum* P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) Parodi, comb. superfl., *Agropyron remotiflorum* Parodi, *Agropyron remotiflorum* Parodi var. *macrochaetum* Parodi, *Agropyron secundum* J. Presl, *Elymus araucanus* (Parodi) A. Löve, *Elymus fuegianus* (Speg.) A. Löve, *Elymus glaucescens* Seberg, *Elymus notius* A. Löve, *Elymus remotiflorus* (Parodi) A. Löve, *Elytrigia araucana* (Parodi) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia fuegiana* (Speg.) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia fuegiana* (Speg.) Covas, nom. illeg., *Elytrigia magellanica* (Desv.) Covas, nom. illeg., *Elytrigia patagonica* (Parodi) Covas, nom. illeg., *Elytrigia patagonica* (Speg.) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia pubiflora* (Steud.) Tzvelev, *Triticum fuegianum* Speg., *Triticum fuegianum* Speg. var. *patagonicum* Speg., *Triticum glaucum* auct. non Desf.

ex DC. & Lam., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *festucoides* Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *glabrivalva* Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *lasiopoda* Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *patagonica* (Speg.) De Wild., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *pubiflorum* (Steud.) Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *secundum* (J. Presl) Speg., *Triticum pubiflorum* Steud., *Triticum repens* L. var. *magellanicum* E. Desv., *Triticum secundum* (J. Presl) Kunth

Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Seberg, O., 1989, 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.

Países: ARG(CHU, LPA, NEU, SCR, TDF); CHL(XII).

Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. A. s.n.* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92183* (CONC, SGO)].

Elymus mendocinus (Parodi) A. Löve

Sin.: *Agropyron mendocinum* Parodi, *Elytrigia mendocina* (Parodi) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia mendocina* (Parodi) Covas, nom. illeg., *Leymus mendocinus* (Parodi) Dubcovsky

Referencias: Dubcovsky, J., Schlatter, A. R. & Echaide, M., 1997; Seberg, O. & Petersen, G., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Perenne. Endémica. 1500–3000 m.

Países: ARG(MEN).

Ejemplares de referencia: ARG[*Mácola, T. 18* (BAA, BM, SI)].

Elymus muticus Phil. = **Elymus angulatus** J. Presl

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus notius A. Löve = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus oreophilus Phil. = **Elymus angulatus** J. Presl

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus palenae Phil. = **Elymus angulatus** J. Presl

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus paposanus Phil. = **Elymus angulatus** J. Presl

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus parodii Seberg & G. Petersen = **Elymus scabrifolius** (Döll) J.H. Hunz.

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus patagonicus Speg.

Referencias: Nicora, E. G., 1978; Seberg, O. & Petersen, G., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR, TDF); CHL(XI, XII).

Ejemplares de referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 5312* (BAB)].

Notas: Citada para Chile sin mencionar material de referencia (Soreng et al., 2003).

Elymus pratensis Phil. = **Elymus angulatus** J. Presl

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus remotiflorus (Parodi) A. Löve = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus repens (L.) Gould

Sin.: *Agropyron repens* (L.) P. Beauv., *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. var. *maritimum* (Koch & Ziz) Hack., *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. var. *vulgare* Döll, *Agropyron subulatum* (Scherb. ex Schweigg. & Körte) Herter, nom. illeg., *Elytrigia repens* (L.) Desv. ex B.D. Jacks., *Triticum repens* L., *Triticum repens* L. var. *subulatum* Nees

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Perenne. Introducida. 0–1100 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IX, X, XII, RME).

Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, D. 15665* (BAA)]; CHL[*Matthei, O. R. 511* (CONC)].

Elymus rigescens Poepp. ex Trin. = **Elymus angulatus** J. Presl

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus scabrifolius (Döll) J.H. Hunz.

Sin.: *Agropyron attenuatum* (Kunth) Roem. & Schult. var. *platense* Parodi, *Agropyron condensatum* J. Presl, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *condensatum* (J. Presl) Hauman & Vanderveken, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *condensatum* (J. Presl) Macloskie, nom. illeg., *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. var. *scabrifolium* (Döll) Arechav., *Agropyron scabrifolium* (Döll) Parodi, *Elymus breviaristatus* (Hitchc.) A. Löve subsp. *scabrifolius* (Döll) A. Löve, *Elymus parodii* Seberg & G. Petersen, *Elytrigia scabrifolia* (Döll) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia scabrifolia* (Döll) Covas, nom. illeg., *Triticum condensatum* (J. Presl) Kunth, *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *condensata* (J. Presl) Speg., *Triticum repens* L. var. *scabrifolium* Döll

Referencias: Hunziker, J. H., 1998b; Linde-Laursen, I. & Seberg, O., 2001; Seberg, O., 2000.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, SFE, TUC); URY(CAS, COL, MON, PAY, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 8832½* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 11095* (MVFA)].

Elymus scabriglumis (Hack.) A. Löve
Sin.: *Agropyron agroelymoides* (Hicken) J.H. Hunz., *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. var. *scabriglume* Hack., *Agropyron scabriglume* (Hack.) Parodi, *Elymus antarcticus* Hook. f. f. *agroelymoides* Hicken, *Elytrigia scabriglumis* (Hack.) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia scabriglumis* (Parodi) Covas, nom. illeg.
Referencias: Hunziker, J. H. & Xifreda, C. C., 2000; Löve, A., 1984; Seberg, O. & Petersen, G., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, TUC); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fischer, W. 228* (F, GH, K, MO, SI, US)]; CHL[*Pisano, E. 6250* (CONC)].

Elymus spegazzinii Kurtz, nom. nud. = **Leymus erianthus** (Phil.) Dubcovsky
Referencias: Seberg, O. & Linde-Laursen, 1996.

Elymus tilcarensis (J.H. Hunz.) A. Löve
Sin.: *Agropyron tilcarense* J.H. Hunz., *Elytrigia tilcarensis* (J.H. Hunz.) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia tilcarensis* (J.H. Hunz.) Covas, nom. illeg.
Referencias: Hunziker, J. H. & Xifreda, C. C., 2000; Löve, A., 1984; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 8082* (BAA, BAB, CORD, LP, SI, UC)].

[Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners]
Sin.: *Agropyron tenerum* Vasey, *Triticum trachycaulum* Link
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Elymus uniflorus Phil. = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus vaginatus Phil. = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elymus valdiviae Steud., nom. inval. = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elytrigia antarctica (Parodi) Covas, nom. illeg. = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elytrigia araucana (Parodi) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elytrigia attenuata (Kunth) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda = **Elymus cordilleranus** Davidse & Pohl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elytrigia attenuata (Kunth) Covas, nom. illeg. = **Elymus cordilleranus** Davidse & Pohl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elytrigia breviaristata (Hitchc.) Covas ex J. Hunz. & Xifreda = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elytrigia breviaristata (Hitchc.) Covas, nom. illeg. = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elytrigia elongata (Host) Nevski = **Thinopyrum elongatum** (Host) D.R. Dewey
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elytrigia fuegiana (Speg.) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elytrigia fuegiana (Speg.) Covas, nom. illeg. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elytrigia magellanica (Desv.) Covas, nom. illeg. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve

Elytrigia mendocina (Parodi) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda = **Elymus mendocinus** (Parodi) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elytrigia mendocina (Parodi) Covas, nom. illeg. = **Elymus mendocinus** (Parodi) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elytrigia patagonica (Parodi) Covas, nom. illeg. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve

Elytrigia patagonica (Speg.) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elytrigia pubiflora (Steud.) Tzvelev = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elytrigia repens (L.) Desv. ex B.D. Jacks. = **Elymus repens** (L.) Gould
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elytrigia scabrifolia (Döll) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda = **Elymus scabrifolius** (Döll) J.H. Hunz.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elytrigia scabrifolia (Döll) Covas, nom. illeg. = **Elymus scabrifolius** (Döll) J.H. Hunz.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elytrigia scabriglumis (Hack.) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda = **Elymus scabriglumis** (Hack.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elytrigia scabriglumis (Parodi) Covas, nom. illeg. = **Elymus scabriglumis** (Hack.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elytrigia tilcarensis (J.H. Hunz.) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda = **Elymus tilcarensis** (J.H. Hunz.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Elytrigia tilcarensis (J.H. Hunz.) Covas, nom. illeg. = **Elymus tilcarensis** (J.H. Hunz.) A. Löve

Enneapogon P. Beauv.

Número de especies: 1

Enneapogon desvauxii P. Beauv. ex Desv., hom. illeg. = **Enneapogon desvauxii** P. Beauv.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Enneapogon desvauxii P. Beauv.
Sin.: *Enneapogon desvauxii* P. Beauv. ex Desv., hom. illeg.
Referencias: Parodi, L. R., 1947b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tombesi, T. S. 53* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 358* (CONC)].

Epicampes arundinacea (Griseb.) Hack. = **Sporobolus rigens** (Trin.) E. Desv. var. **rigens**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Epicampes coerulea Griseb. = **Muhlenbergia angustata** (J. Presl) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Epicampes coerulea Griseb. var. *submutica* Hack. = **Muhlenbergia angustata** (J. Presl) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Epicampes kunthiana Griseb. = **Muhlenbergia angustata** (J. Presl) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Epicampes phleoides (Kunth) Griseb. = **Muhlenbergia angustata** (J. Presl) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Epicampes rigens (Trin.) Phil., hom. illeg. = **Sporobolus rigens** (Trin.) E. Desv. var. **rigens**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis Wolf

Número de especies: 47, 9 endémicas, 12 introducidas

Eragrostis abyssinica (Jacq.) Link = **Eragrostis tef** (Zuccagni) Trotter
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis acicularis Trin. = **Eragrostis rufescens** Schult.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Nicora, E. G., 1998b.

Eragrostis acuminata Döll = **Eragrostis maypurensis** (Kunth) Steud.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis acutiglumis Parodi
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Nicora, E. G., 1998b; Parodi, L. R., 1937a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); BRA(RGS); URY(ART, DUR, FLO, FLA, PAY, RNO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 6168* (SI)]; BRA[*Boechat, S. C. 4718* (ICN)]; URY[*Barreto, I. L. s.n.* (BLA)].

Eragrostis affinis Salzm. ex Steud. = **Eragrostis rufescens** Schult.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis airoides Nees
Sin.: *Agrosticula brasiliensis* (Raddi) Herter, *Aira brasiliensis* Raddi, *Airopsis millegrana* Griseb., *Atropis millegrana* Griseb., *Eragrostis triflora* Ekman, *Poa airoides* (Nees) Kunth, hom. illeg., *Sporobolus brasiliensis* (Raddi) Hack.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Burkart, A. & Nicora, E. G., 1969; Cabrera, A. L., 1970a; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G., 1978, 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CEN, GUA, PAI, PHA, SPE); URY(ART, DUR, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Seijo, G. J. 815* (CTES, G, MNES)]; BRA[*Dutra, J. 328* (ICN)]; PRY[*Hassler, E. 7967* (G, K)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees
Sin.: *Eragrostis ciliaris* (L.) R. Br. var. *patens* Chapm. ex Beal, *Eragrostis plumosa* (Retz.) Link, *Eragrostis tenella* (L.) Roem. & Schult., *Poa amabilis* L., *Poa tenella* L.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CEN, COA, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bergalli 3456* (US)]; PRY[*Arenas, P. 391* (BAA, CTES, SI)].

Eragrostis amoena C. Presl = **Eragrostis maypurensis** (Kunth) Steud.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis andicola R.E. Fr.
Referencias: Nicora, E. G., 1998b.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 3503* (SI), *Morrone, O. 2426* (SI)].

Eragrostis argentina Jedwabn. = **Eragrostis cilianensis** (All.) Vignolo ex Janch.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980.

Eragrostis articulata (Schrank) Nees
Sin.: *Eragrostis articulata* (Schrank) Nees var. *eglandulosa* Nicora, *Eragrostis articulata* (Schrank) Nees var. *pauciflora* Döll, *Eragrostis glareosa* Trin., *Eragrostis neesi* Trin. var. *laxa* Jedwabn., *Eragrostis pilosissima* Link, *Eragrostis villosa* Salzm. ex Steud., *Poa articulata* Schrank
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Nicora, E. G., 1940, 1941, 1998b; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL); BRA(PAR); PRY(APY, AMA, CAU, CEN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 922* (SI), *Quiroga, H. 48* (BA, BAA)]; BRA[*Hatschbach, A. 21027* (MBM, US)]; PRY[*Schinini, A. 20326* (CTES)].

Eragrostis articulata (Schrank) Nees var. *eglandulosa* Nicora = **Eragrostis articulata** (Schrank) Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis articulata (Schrank) Nees var. *pauciflora* Döll = **Eragrostis articulata** (Schrank) Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis atrovirens auct. non (Desf.) Trin. = **Eragrostis bahiensis** Schrad. ex Schult.

Eragrostis attenuata Hitchc.
Sin.: *Sporobolus scaber* Phil.
Referencias: Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5229* (BAA)].

Eragrostis bahiensis Schrad. ex Schult.
Sin.: *Eragrostis atrovirens* auct. non (Desf.) Trin., *Eragrostis bahiensis* Schrad. ex Schult. f. *riparia* Burkart, *Eragrostis bahiensis* Schrad. ex Schult. var. *contracta* Döll, *Eragrostis bahiensis* Schrad. ex Schult. var. *laxiuscula* Döll, *Eragrostis blepharophylla* Jedwabn., *Eragrostis expansa* Link, *Eragrostis firma* Trin., *Eragrostis macra* Jedwabn., *Eragrostis microstachya* (Link) Link, *Eragrostis psammodes* Trin., *Eragrostis psammodes* Trin. var. *microstachya* (Link) Döll, *Eragrostis squamata* auct. non (Lam.) Steud., *Poa expansa* (Link) Kunth, *Poa microstachya* Link, *Poa psammodes* (Trin.) Kunth

Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boeckeler, J. O., 1896; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE); URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 2980* (BAA)]; BRA[*Klein, R. M. 10403* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 9973* (BAA), *Schinini, A. 28221* (CTES)]; URY[*Mujica Sallés, J. 382* (MVFA)].

Eragrostis bahiensis Schrad. ex Schult. f. *riparia* Burkart = **Eragrostis bahiensis** Schrad. ex Schult.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis bahiensis Schrad. ex Schult. var. *contracta* Döll = **Eragrostis bahiensis** Schrad. ex Schult.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis bahiensis Schrad. ex Schult. var. *laxiuscula* Döll = **Eragrostis bahiensis** Schrad. ex Schult.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis barbiglumis Jedwabn. = **Eragrostis seminuda** Trin.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis barrelieri Daveau
Referencias: Nicora, E. G., 1941, 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, SDE, SLU); URY(CAS, MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Villamil, C. B. 1995* (SI)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 3629* (SI)].

Eragrostis blepharophylla Jedwabn. = **Eragrostis bahiensis** Schrad. ex Schult.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis calotheca Trin. = **Poidium calotheca** (Trin.) Matthei
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987.

Eragrostis cataclasta Nicora
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Burkart, A. & Nicora, E. G., 1969; Nicora, E. G., 1998b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI); BRA(RGS, SCA); URY(CAS, CLA, COL, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 8061* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 478* (HBR, PACA)]; URY[*Boelcke, O. 8222* (SI)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar material de referencia (Boechat & Longhi-Wagner, 2001).

Eragrostis chiquitaniensis Killeen
Referencias: Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Vanni, R. O. 2474* (CTES)].

Eragrostis chloromelas Steud. = **Eragrostis curvula** (Schrad.) Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch.
Sin.: *Briza eragrostis* L., *Eragrostis argentina* Jedwabn., *Eragrostis major* Host, *Eragrostis megastachya* (Koeler) Link, *Eragrostis megastachya* (Koeler) Link f. *nana* Lorentz & Niederl., *Poa cilianensis* All., *Poa megastachya* Koeler
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Nicora, E. G., 1978, 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Introducida. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); PRY(APY); URY(CLA, COL, MON, PAY, RNO, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 7415* (BAA)]; BRA[*Valls, J. F. M. 2547* (ICN)]; PRY[*Vanni, R. O. 2308* (CTES)]; URY[*Berro, M. B. 7780d* (MVFA)].

Eragrostis ciliaris (L.) R. Br.
Sin.: *Megastachya ciliaris* (L.) P. Beauv., *Poa ciliaris* L.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Nicora, E. G., 1998b; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Anual. Introducida. 0–900 m.
Países: ARG(MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5661* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 1538* (ICN)]; PRY[*Schinini, A. 1343* (SI)].

Eragrostis ciliaris (L.) R. Br. var. *patens* Chapm. ex Beal = **Eragrostis amabilis** (L.) Wight & Arn. ex Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis cordobensis Jedwabn. = **Eragrostis mexicana** (Hornem.) Link subsp. **mexicana**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis crassa Jedwabn. = **Poidium calotheca** (Trin.) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees
Sin.: *Eragrostis chloromelas* Steud., *Eragrostis filiformis* (Thunb.) Nees, nom. illeg., *Poa curvula* Schrad.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boeckeler, J. O., 1896; Nicora, E. G., 1978, 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, JUJ, LPA, MEN, SFE, SLU); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VIII, XII); URY(COL, FLA, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32577* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 1322* (ICN)]; CHL[*Marticorena, C. 1781* (SI)]; URY[*Burkart, A. 15780* (SI)].

Eragrostis cuspidata (Schult.) Link = **Eragrostis rufescens** Schult.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis damiensiana (Bonnet) Thell. = **Eragrostis pilosa** (L.) P. Beauv.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis damiensiana (Bonnet) Thell. var. *condensata* (Hack.) Thell. = **Eragrostis pilosa** (L.) P. Beauv.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis deserticola Phil. = **Eragrostis peruviana** (Jacq.) Trin.
Referencias: Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis diffusa Buckley = **Eragrostis pectinacea** (Michx.) Nees var. **pectinacea**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis elegans (Nees) Nees = **Eragrostis japonica** (Thunb.) Trin.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis eragrostis (L.) P. Beauv., nom. inval. = **Eragrostis minor** Host
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis expansa Link = **Eragrostis bahiensis** Schrad. ex Schult.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Mujica Sallés, J., 1996.

Eragrostis filiformis (Thunb.) Nees, nom. illeg. = **Eragrostis curvula** (Schrad.) Nees
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Eragrostis firma Trin. = **Eragrostis bahiensis** Schrad. ex Schult.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis flaccida Lindm. = **Eragrostis lugens** Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Mujica Sallés, J., 1996.

Eragrostis floridana Hitchc. = **Eragrostis polytricha** Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis fragilis Swallen = **Eragrostis polytricha** Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis glareosa Trin. = **Eragrostis articulata** (Schrank) Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Eragrostis glomerata (Walter) Dewey = **Eragrostis japonica** (Thunb.) Trin.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis gracilis Schrad. = **Eragrostis pilosa** (L.) P. Beauv.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis hackelii Hassl.
Referencias: Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CEN, COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10380* (BAA, BAF, P)].

Eragrostis hypnoides (Lam.) Britton, Stern & Poggenb.
Sin.: *Eragrostis reptans* (Michx.) Nees var. *pygmaea* Döll, *Erosion hypnoides* (Lam.) Lunell, *Megastachya gouinii* E. Fourn., *Megastachya hypnoides* (Lam.) P. Beauv., *Neeragrostis hypnoides* (Lam.) Bush, *Poa carinata* Poir., *Poa hypnoides* Lam.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Burkart, A. & Nicora, E. G., 1969; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Anual. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CEN, COA, PHA); URY(ART, CAS, PAY, ROC, SAO, SOR, TAC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1891* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 4686* (ICN)]; PRY[*Mereles, F. 5265* (FCQ)]; URY[*Felippone, F. 4479* (SI)].

Eragrostis interrupta (Lam.) Döll = **Eragrostis japonica** (Thunb.) Trin.

Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.

Sin.: *Airopsis jubata* Griseb., *Diandrochloa glomerata* (Walter) Burkart, *Eragrostis elegans* (Nees) Nees, *Eragrostis glomerata* (Walter) Dewey, *Eragrostis interrupta* (Lam.) Döll, *Poa japonica* Thunb.

Referencias: Boechat, S. C., 1980; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1984, 1988.

Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, APA, CON, ÑEE, SPE); URY(ART, PAY, RNO, SAO).

Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15460* (SI)]; BRA[*Boechat, S. C. 4687* (ICN)]; PRY[*Mereles, F. 5247* (CTES, FCQ, MO)]; URY[*Osten, C. 16606* (BAA)].

Eragrostis kuschelii Skottsb.

Referencias: Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Hierba. Anual. Endémica. 0–400 m.

Países: CHL(IDE).

Ejemplares de referencia: CHL[*Kuschel, G. 15* (K, SGO)].

Eragrostis lehmanniana Nees

Referencias: Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Hierba. Perenne. Introducida.

Países: ARG(MEN).

Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. A. 15121* (MERL, SI)].

Eragrostis leucosticta Nees ex Döll

Referencias: Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988.

Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.

Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAU).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18849* (MBM)]; PRY[*Pedersen, T. M. 12278* (SI)].

Eragrostis lindeniana Steud. = **Eragrostis maypurensis** (Kunth) Steud.

Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis lindmanii Hack. = **Eragrostis neesii** Trin. var. **lindmanii** (Hack.) Ekman

Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis longipila Hack. = **Eragrostis orthoclada** Hack.

Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis lugens Nees

Sin.: *Eragrostis flaccida* Lindm., *Eragrostis lugens* Nees f. *pallida* Hack., *Eragrostis lugens* Nees subsp. *flaccida* (Lindm.) Hack., *Eragrostis lugens* Nees var. *glabrata* Döll, *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. var. *lugens* (Nees) Griseb., *Poa lugens* (Nees) Kunth

Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Burkart, A. & Nicora, E. G., 1969; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G., 1978, 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CEN, CON, GUA, PAI); URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 250* (SI), *Montes, J. E. 2384* (SI)]; BRA[*Poliquesi, C. B. 73* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5611* (CTES, FCQ, SI)]; URY[*Marchi, M. 1426* (MVFA)].

Eragrostis lugens Nees f. *pallida* Hack. = **Eragrostis lugens** Nees

Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis lugens Nees var. *glabrata* Döll = **Eragrostis lugens** Nees

Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis lugens Nees var. *villosa* Döll = **Eragrostis polytricha** Nees

Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis lugens Nees subsp. *flaccida* (Lindm.) Hack. = **Eragrostis lugens** Nees

Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis macra Jedwabn. = **Eragrostis bahiensis** Schrad. ex Schult.

Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Mujica Sallés, J., 1996.

Eragrostis macrothyrsa Hack.

Referencias: Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.

Países: PRY(AMA, CEN, CON).

Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11036* (BAA, G, K)].

Eragrostis major Host = **Eragrostis cilianensis** (All.) Vignolo ex Janch.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boeckeler, J. O., 1896.

Eragrostis mattogrossensis Pilg. = **Eragrostis solida** Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis mattogrossensis Pilg. f. *glabrescens* Pilg. = **Eragrostis solida** Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis maypurensis (Kunth) Steud.
Sin.: *Eragrostis acuminata* Döll, *Eragrostis amoena* C. Presl, *Eragrostis lindeniana* Steud., *Eragrostis maypurensis* (Kunth) Steud. var. *densiuscula* Pilg., *Eragrostis maypurensis* (Kunth) Steud. var. *meratiana* (Kunth) Pilg., *Eragrostis meratiana* (Kunth) Steud., *Eragrostis panamensis* C. Presl, *Megastachya maypurensis* (Kunth) Roem. & Schult., *Megastachya swainsoni* Raddi, *Poa maypurensis* Kunth, *Poa racemosa* Vahl, *Poa squarrosa* Salzm. ex Steud.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Nicora, 1998b).

Eragrostis maypurensis (Kunth) Steud. var. *densiuscula* Pilg. = **Eragrostis maypurensis** (Kunth) Steud.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis maypurensis (Kunth) Steud. var. *meratiana* (Kunth) Pilg. = **Eragrostis maypurensis** (Kunth) Steud.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis megapotamica (Spreng.) Schult. = **Eragrostis purpurascens** (Spreng.) Schult.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980.

Eragrostis megastachya (Koeler) Link = **Eragrostis cilianensis** (All.) Vignolo ex Janch.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980.

Eragrostis megastachya (Koeler) Link f. *nana* Lorentz & Niederl. = **Eragrostis cilianensis** (All.) Vignolo ex Janch.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis mendocina (Phil.) Jedwabn. = **Leptochloa dubia** (Kunth) Nees
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis meratiana (Kunth) Steud. = **Eragrostis maypurensis** (Kunth) Steud.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link subsp. **mexicana**
Sin.: *Eragrostis cordobensis* Jedwabn., *Eragrostis neomexicana* Vasey ex L.H. Dewey, *Poa chilensis* Moris, hom. illeg., *Poa mexicana* Hornem.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Nicora, E. G., 1978, 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2700 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, SFE, SJU, SLU); CHL(I); URY(FLA, MON, RNO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 26036* (SI)]; CHL[*Peterson, P. M. 15685* (CONC)]; URY[*Felippone, F. 3281* (SI)].

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link subsp. **virescens** (J. Presl) S.D. Koch & Sanchéz Vega
Sin.: *Eragrostis rahmeri* Phil., *Eragrostis scabra* Phil., *Eragrostis virescens* J. Presl, *Poa virescens* (J. Presl) Kunth
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1986b; Boechat, S. C., 1980; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G., 1978, 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME); PRY(APY, CAU, CEN, ÑEE); URY(ART, CLA, COL, MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 8612* (SI), *Galander 54b* (BAA)]; BRA[*Rambo, B. 858* (HBR)]; CHL[*Gay, C. s.n.* (BAA)]; PRY[*Hassler, E. 8960* (G)]; URY[*Mujica Sallés, J. 385* (MVFA)].

Eragrostis microstachya (Link) Link = **Eragrostis bahiensis** Schrad. ex Schult.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis minor Host
Sin.: *Eragrostis eragrostis* (L.) P. Beauv., nom. inval., *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. var. *minor* (Host) Kuntze, *Eragrostis poaeoides* P. Beauv. ex Roem. & Schult., nom. superfl., *Eragrostis poaeoides* P. Beauv., nom. nud., *Eragrostis poiformis* Link, nom. illeg., *Poa eragrostis* L.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Nicora, E. G., 1978, 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Beetle, A. A. 277* (BAA)]; URY[*Lombardo, A. 2978* (MVFA)].

Eragrostis monandra Hack. = **Rhombolytrum monandrum** (Hack.) Nicora & Rúgolo
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Eragrostis montufari (Kunth) Steud. = **Eragrostis pastoensis** (Kunth) Trin.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis multicaulis Steud. = **Eragrostis pilosa** (L.) P. Beauv.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis multipes S. Moore = **Eragrostis rufescens** Schult.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis neesi Trin. var. **expansiflora** Nicora
Referencias: Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE); PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 342* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 15523* (BAA)].

Eragrostis neesi Trin. var. *laxa* Jedwabn. = **Eragrostis articulata** (Schrank) Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis neesii Trin. var. **lindmanii** (Hack.) Ekman
Sin.: *Eragrostis lindmanii* Hack.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Burkart, A. & Nicora, E. G., 1969; Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, CEN, MIE, PAI); URY(CLA, COL, FLA, PAY, RIV, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 75* (SI), *Pérez-Moreau, R. A. s.n.* (BA)]; BRA[*Dutra, J. 472* (ICN)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6412* (BAA)]; URY[*Barreto, I. L. s.n.* (BLA)].

Eragrostis neesii Trin. var. **neesii**
Sin.: *Poa neesii* (Trin.) Kunth
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Burkart, A. & Nicora, E. G., 1969; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G., 1940, 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, GUA, ITA, PAI); URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 432* (CTES, SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 4311* (ICN)]; PRY[*Hassler, E. 1458* (G, SI)]; URY[*Mujica Sallés, J. 318* (MVFA)].

Eragrostis neomexicana Vasey ex L.H. Dewey = **Eragrostis mexicana** (Hornem.) Link subsp. **mexicana**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis nigricans (Kunth) Steud. var. **nigricans**
Sin.: *Poa nigricans* Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b; Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Steudel, E. G., 1853–1855.
Hierba. Anual. Nativa. 2000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27438* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 65* (CONC)].

Eragrostis nigricans (Kunth) Steud. var. **punensis** Nicora
Referencias: Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 2500–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 26382* (SI)]; CHL[*Matthei, O. R. 93* (CONC)].

Eragrostis orthoclada Hack.
Sin.: *Eragrostis longipila* Hack., *Eragrostis villamontana* Jedwabn.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Burkart, A. & Nicora, E. G., 1969; Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); PRY(APY, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27520* (SI)]; PRY[*Burkart, A. 18409* (SI)].

Eragrostis panamensis C. Presl = **Eragrostis maypurensis** (Kunth) Steud.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis pastoensis (Kunth) Trin.
Sin.: *Eragrostis montufari* (Kunth) Steud., *Eragrostis virescens* J. Presl f. *major* Hack., *Eragrostis virescens* J. Presl var. *trichophylla* (Benth.) Hack., *Megastachya montufari* (Kunth) Roem. & Schult., *Poa montufari* Kunth, *Poa pastoensis* Kunth
Referencias: Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Türpe, A. M., 1975a.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32638* (SI)].

Eragrostis pectinacea (Michx.) Steud., hom. illeg. = **Eragrostis pectinacea** (Michx.) Nees var. **pectinacea**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees var. **miserrima** (E. Fourn.) Reeder
Sin.: *Eragrostis purshii* Schrad. ex A. Gray var. *miserrima* E. Fourn., *Eragrostis tephrosanthos* Schult.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, DFE, ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Villamil, C. B. 2970* (SI)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Peterson et al., 2001).

Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees var. **pectinacea**
Sin.: *Eragrostis diffusa* Buckley, *Eragrostis pectinacea* (Michx.) Steud., hom. illeg., *Poa pectinacea* Michx.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Burkart, A. & Nicora, E. G., 1969; Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, DFE, LPA); URY(CAS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Villamil, C. B. 2970* (SI)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Peterson et al., 2001).

Eragrostis peregrina Wiegand = **Eragrostis pilosa** (L.) P. Beauv.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis perennis Döll
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Nicora, E. G., 1973b, 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS); URY(PAY, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2200* (SI), *Zuloaga, F. O. 448* (CTES, SI)]; BRA[*Rosengurtt, B. 8892* (BAA, BLA, K, MVFA, SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 9321* (MVFA)].

Eragrostis peruviana (Jacq.) Trin.
Sin.: *Eragrostis deserticola* Phil., *Poa peruviana* Jacq.
Referencias: Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 300–3200 m.
Países: CHL(I, II, III, IDE).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 121* (CTES)].

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.
Sin.: *Eragrostis damiensiana* (Bonnet) Thell., *Eragrostis damiensiana* (Bonnet) Thell. var. *condensata* (Hack.) Thell., *Eragrostis gracilis* Schrad., *Eragrostis multicaulis* Steud., *Eragrostis peregrina* Wiegand, *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. subsp. *damiensiana* (Bonnet) Thell., *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. var. *condensata* Hack., *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. var. *damiensiana* Bonnet, *Eragrostis verticillata* (Cav.) P. Beauv., *Poa pilosa* L.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Nicora, E. G., 1973a, 1998b; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IV, VII, XII, RME); PRY(COA); URY(ART, CAS, CLA, FLO, LAV, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Honfi, A. I. 558* (MNES), *Nicora, E. G. 2218* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 10071* (HBR)]; CHL[*Garaventa, A. 5219* (CONC)]; PRY[*Lurvey 119* (CTES, PY)]; URY[*Rosengurtt, B. 4763* (BLA)].

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. var. *condensata* Hack. = **Eragrostis pilosa** (L.) P. Beauv.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. var. *damiensiana* Bonnet = **Eragrostis pilosa** (L.) P. Beauv.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. var. *lugens* (Nees) Griseb. = **Eragrostis lugens** Nees
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. var. *minor* (Host) Kuntze = **Eragrostis minor** Host
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. subsp. *damiensiana* (Bonnet) Thell. = **Eragrostis pilosa** (L.) P. Beauv.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis pilosissima Link = **Eragrostis articulata** (Schrank) Nees
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Eragrostis plana Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CLA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Valls, J. F. M. 4246* (ICN)]; URY[*Menéndez 19511* (MVFA)].

Eragrostis plumosa (Retz.) Link = **Eragrostis amabilis** (L.) Wight & Arn. ex Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis poaeoides P. Beauv. ex Roem. & Schult., nom. superfl. = **Eragrostis minor** Host
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis poaeoides P. Beauv., nom. nud. = **Eragrostis minor** Host
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis poiformis Link, nom. illeg. = **Eragrostis minor** Host
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis polyneura Jedwabn. = **Eragrostis rufescens** Schult.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis polytricha Nees
Sin.: *Eragrostis floridana* Hitchc., *Eragrostis fragilis* Swallen, *Eragrostis lugens* Nees var. *villosa* Döll, *Eragrostis polytricha* Nees var. *glabrior* Döll, *Eragrostis polytricha* Nees var. *hirsutior* Döll, *Poa conceptionis* Steud., *Poa polytricha* (Nees) Kunth
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Burkart, A. & Nicora, E. G., 1969; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G., 1998b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VIII, IX, X, RME); PRY(AMA, CAN, CON, MIE, PAI); URY(CLA, FLA, LAV, MAL, RNO, RIV, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 17* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 615* (ICN)]; CHL[*Barros, E. 256* (SI)]; PRY[*Marín, G. 549* (BM, G, MO)]; URY[*Rosengurtt, B. 9686* (MVFA)].

Eragrostis polytricha Nees var. *glabrior* Döll = **Eragrostis polytricha** Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Mujica Sallés, J., 1996; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis polytricha Nees var. *hirsutior* Döll = **Eragrostis polytricha** Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Mujica Sallés, J., 1996; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis psammodes Trin. = **Eragrostis bahiensis** Schrad. ex Schult.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Mujica Sallés, J., 1996.

Eragrostis psammodes Trin. var. *microstachya* (Link) Döll = **Eragrostis bahiensis** Schrad. ex Schult.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis purpurascens (Spreng.) Schult.
Sin.: *Eragrostis megapotamica* (Spreng.) Schult., *Poa purpurascens* Spreng.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA); PRY(CON); URY(ART, CAS, CLA, MAL, MON, RIV, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Valls, J. F. M. 3288* (ICN)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4797* (BM)]; URY[*Rosengurtt, B. 7047* (BLA)].

Eragrostis purshii Schrad. ex A. Gray var. *miserrima* E. Fourn. = **Eragrostis pectinacea** (Michx.) Nees var. **miserrima** (E. Fourn.) Reeder
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis pycnantha (Phil.) Parodi ex Nicora
Sin.: *Poa pycnantha* Phil.
Referencias: Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz-Pizarro, C. 1982* (SGO, SI)].

Eragrostis rahmeri Phil. = **Eragrostis mexicana** (Hornem.) Link subsp. **virescens** (J. Presl) S.D. Koch & Sanchéz Vega
Referencias: Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis reptans (Michx.) Nees var. *pygmaea* Döll = **Eragrostis hypnoides** (Lam.) Britton, Stern & Poggenb.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis retinens Hack. & Arechav.
Sin.: *Eragrostis retinens* Hack. & Arechav. var. *pergaminensis* Parodi
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Burkart, A. & Nicora, E. G., 1969; Cantero, J. J., Núñez, C. O., Geymonat, M. & Chiacchiera, G., 1996; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G., 1998b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SFE, SLU); BRA(RGS); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, RNO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 4943* (BAA)]; BRA[*Valls, J. F. M. 4708* (ICN)]; URY[*Mujica Sallés, J. 389* (MVFA)].

Eragrostis retinens Hack. & Arechav. var. *pergaminensis* Parodi = **Eragrostis retinens** Hack. & Arechav.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Mujica Sallés, J., 1996; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis rojasii Hack.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Hackel, E., 1909; Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(AMA, CAU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Martínez Crovetto, R. 9127* (CTES)]; BRA[*Valls, J. F. M. 2575* (ICN)]; PRY[*Hassler, E. 9858* (BAA)].

Eragrostis rufescens Schult.
Sin.: *Eragrostis acicularis* Trin., *Eragrostis affinis* Salzm. ex Steud., *Eragrostis cuspidata* (Schult.) Link, *Eragrostis multipes* S. Moore, *Eragrostis polyneura* Jedwabn.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Riedel, L. 1140* (LE)]; PRY[*Rojas, T. 6697* (AS, MO)].

Eragrostis rufescens Schult. var. *spiciramea* Döll = **Eragrostis solida** Nees
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis scabra Phil. = **Eragrostis mexicana** (Hornem.) Link subsp. **virescens** (J. Presl) S.D. Koch & Sanchéz Vega

Eragrostis seminuda Trin.
Sin.: *Eragrostis barbiglumis* Jedwabn., *Eragrostis seminuda* Trin. var. *hirta* Döll, *Eragrostis seminuda* Trin. var. *pilosissima* Döll, *Poa seminuda* (Trin.) Kunth
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(MIE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 5485* (BAA)]; BRA[*Valls, J. F. M. 4723* (ICN)]; PRY[*Burkart, A. 18647* (SI)].

Eragrostis seminuda Trin. var. *hirta* Döll = **Eragrostis seminuda** Trin.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis seminuda Trin. var. *pilosissima* Döll = **Eragrostis seminuda** Trin.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis solida Nees
Sin.: *Eragrostis mattogrossensis* Pilg., *Eragrostis mattogrossensis* Pilg. f. *glabrescens* Pilg., *Eragrostis rufescens* Schult. var. *spiciramea* Döll, *Eragrostis solida* Nees var. *mattogrossensis* (Pilg.) Pilg., *Poa solida* (Nees) Kunth
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR); PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 14875* (CTES)]; BRA[*Sendulsky, T. 136* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 12493* (G)].

Eragrostis solida Nees var. *mattogrossensis* (Pilg.) Pilg. = **Eragrostis solida** Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis spicata Vasey
Sin.: *Sporobolus tenuispica* Hack.
Referencias: Burkart, A. & Nicora, E. G., 1969; Nicora, E. G., 1998b; Parodi, L. R., 1928a; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, ERI, FOR, SAL, SFE); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21106* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2752* (SI)].

Eragrostis squamata auct. non (Lam.) Steud. = **Eragrostis bahiensis** Schrad. ex Schult.

Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter
Sin.: *Eragrostis abyssinica* (Jacq.) Link, *Poa tef* Zuccagni
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Nicora, E. G., 1939; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Hierba. Anual. Introducida.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 2939* (SI)].

Eragrostis tenella (L.) Roem. & Schult. = **Eragrostis amabilis** (L.) Wight & Arn. ex Nees
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis tenuifolia (A. Rich.) Hochst. ex Steud.
Sin.: *Poa tenuifolia* A. Rich.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Introducida. 0–2000 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS); CHL(V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 28* (SI), *Deginani, N. B. 1776* (SI)]; BRA[*Longhi-Wagner, H. M. s.n.* (ICN)]; CHL[*Lücke 10* (CONC)].

Eragrostis tephrosanthos Schult. = **Eragrostis pectinacea** (Michx.) Nees var. **miserrima** (E. Fourn.) Reeder
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis triangularis Henrard
Referencias: Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 236* (G, K, P)].

Eragrostis trichocolea Hack. & Arechav.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Burkart, A. & Nicora, E. G., 1969; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SFE, SJU, SLU); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, ITA); URY(ART, CAS, COL, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1701* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 4777* (ICN)]; PRY[*Schinini, A. 22899* (CTES)]; URY[*Mujica Sallés, J. 431* (MVFA)].

Eragrostis triflora Ekman = **Eragrostis airoides** Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis uninervia (J. Presl) Steud. = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **uninervia** (J. Presl) N. Snow
Referencias: Snow, N., 1998c.

Eragrostis uniolae Nees = **Poidium uniolae** (Nees) Matthei
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Eragrostis verticillata (Cav.) P. Beauv. = **Eragrostis pilosa** (L.) P. Beauv.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Eragrostis villamontana Jedwabn. = **Eragrostis orthoclada** Hack.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis villosa Salzm. ex Steud. = **Eragrostis articulata** (Schrank) Nees
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis virescens J. Presl = **Eragrostis mexicana** (Hornem.) Link subsp. **virescens** (J. Presl) S.D. Koch & Sanchéz Vega
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis virescens J. Presl f. *major* Hack. = **Eragrostis pastoensis** (Kunth) Trin.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis virescens J. Presl var. *trichophylla* (Benth.) Hack. = **Eragrostis pastoensis** (Kunth) Trin.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eragrostis weberbaueri Pilg.
Referencias: Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 2300–3700 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Villagrán, C. 2294* (CONC)].

Eremium erianthum (Phil.) Seberg & Linde-Laursen = **Leymus erianthus** (Phil.) Dubcovsky
Referencias: Dubcovsky, J., Schlatter, A. R. & Echaide, M., 1997.

[Eriachne malouinensis Steud.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Eriachne rigida Phil. = **Digitaria californica** (Benth.) Henrard var. **californica**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Erianthecium Parodi

Número de especies: 1 endémica

Erianthecium bulbosum Parodi
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(CLA, LAV, MAL, ROC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 208* (ICN)]; URY[*Rosengurtt, B. 3154* (MVFA), *Rosengurtt, B. 5265b* (SI)].

Erianthus angustifolius Nees = **Saccharum angustifolium** (Nees) Steud.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

[Erianthus angustifolius Nees var. colorata Andersson]
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Erianthus asper Nees = **Saccharum asperum** (Nees) Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Erianthus asper Nees var. *brasilianus* (Trin.) Hack. = **Saccharum asperum** (Nees) Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Erianthus asper Nees var. *typicus* Hack., nom. inval. = **Saccharum asperum** (Nees) Steud.
Referencias: Molina, A. M., 1981.

Erianthus balansae Hack. = **Saccharum villosum** Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Erianthus biaristatus (Hack.) Swallen = **Saccharum angustifolium** (Nees) Steud.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Erianthus brasilianus (Trin.) Anders = **Saccharum asperum** (Nees) Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Erianthus clandestinus Swallen, nom. inval. = **Saccharum villosum** Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Erianthus divaricatus (L.) Hitchc. var. *angustifolius* (Nees) Hack. = **Saccharum angustifolium** (Nees) Steud.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Erianthus giganteus (Walter) Muhl. = **Saccharum giganteum** (Walter) C.E. Hubb.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Erianthus glabrinodes (Hack.) Swallen = **Saccharum villosum** Steud.
Referencias: Filgueiras, T. S. & Lerina, R., 2001b.

Erianthus purpureus Swallen = **Saccharum villosum** Steud.
Referencias: Filgueiras, T. S. & Lerina, R., 2001b.

Erianthus saccharoides Michx. var. *trinii* Hack. = **Saccharum villosum** Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Erianthus saccharoides Michx. subsp. *angustifolius* (Nees) Hack. = **Saccharum angustifolium** (Nees) Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Erianthus trinii (Hack.) Hack. = **Saccharum villosum** Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Eriochloa Kunth

Número de especies: 9, 1 endémica, 2 introducidas

Eriochloa acuminata (J. Presl) Kunth
Sin.: *Eriochloa gracilis* (E. Fourn.) Hitchc., *Helopus gracilis* E. Fourn.
Referencias: Parodi, L. R., 1965; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 500–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 10990* (BAA)].

Eriochloa brasiliensis Spreng. = **Axonopus brasiliensis** (Spreng.) Kuhlm.
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Eriochloa castanea Hack. = **Paspalum macranthecium** Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Eriochloa distachya Kunth
Referencias: Arriaga, M. O., 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11034* (BAA, BAF, G)].

Eriochloa gracilis (E. Fourn.) Hitchc. = **Eriochloa acuminata** (J. Presl) Kunth
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Eriochloa grandiflora (Trin.) Benth.
Sin.: *Helopus grandiflorus* Trin.
Referencias: Arriaga, M. O., 1994; Renvoize, S. A., 1988; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Nicora, E. G., 1993.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fontana, J. L. 177-7* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 16865* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5167* (BAA, G)].

Eriochloa montevidensis Griseb.
Sin.: *Eriochloa montevidensis* Griseb. f. *subcolorata* Hack., *Eriochloa punctata* (L.) Desv. ex Ham. var. *montevidensis* (Griseb.) Herter, *Helopus annulatus* (Flüggé) Nees var. *montevidensis* Döll, nom. inval.
Referencias: Arriaga, M. O., 1994; Cabrera, A. L., 1970a; Parodi, L. R., 1965; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(RGS); CHL(I); PRY(APY, CEN, PHA); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 7482* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 2703* (ICN)]; CHL[*Ricardi, M. 3337* (CONC)]; PRY[*Balansa, B. 117* (G)]; URY[*Felippone, F. 32* (SI)].

Eriochloa montevidensis Griseb. f. *subcolorata* Hack. = **Eriochloa montevidensis** Griseb.
Referencias: Parodi, L. R., 1965.

Eriochloa nana Arriaga
Referencias: Arriaga, M. O., 1995; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(COS, FOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 19154* (CTES)].

Eriochloa polystachya Kunth
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 1190* (HBR)].

Eriochloa pseudoacrotricha (Stapf ex Thell.) J.M. Black
Sin.: *Eriochloa ramosa* (Retz.) Kuntze var. *pseudoacrotricha* Stapf ex Thell.
Referencias: Parodi, L. R., 1965; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lahitte s.n.* (BAA)].

Eriochloa punctata (L.) Desv. ex Ham.
Sin.: *Eriochloa punctata* (L.) Desv. ex Ham. f. *intermedia* Parodi, *Eriochloa punctata* (L.) Desv. ex Ham. var. *parodii* Herter, *Milium punctatum* L.
Referencias: Arriaga, M. O., 1994; Parodi, L. R., 1965; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual o perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAU, CEN, CON, PAI, PHA); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 269* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 14347* (MBM)]; PRY[*Balansa, B. 118* (G)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Eriochloa punctata (L.) Desv. ex Ham. f. *intermedia* Parodi = **Eriochloa punctata** (L.) Desv. ex Ham.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Eriochloa punctata (L.) Desv. ex Ham. var. *montevidensis* (Griseb.) Herter = **Eriochloa montevidensis** Griseb.
Referencias: Parodi, L. R., 1965.

Eriochloa punctata (L.) Desv. ex Ham. var. *parodii* Herter = **Eriochloa punctata** (L.) Desv. ex Ham.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Eriochloa ramosa (Retz.) Kuntze var. *pseudoacrotricha* Stapf ex Thell. = **Eriochloa pseudoacrotricha** (Stapf ex Thell.) J.M. Black
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Eriochloa tridentata (Trin.) Kuhlm.
Sin.: *Paspalum tridentatum* Trin.
Referencias: Arriaga, M. O., 1993; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 14148* (BAA)].

Eriochrysis P. Beauv.

Número de especies: 4

Eriochrysis cayennensis P. Beauv.
Sin.: *Eriochrysis glabrifolia* Swallen, *Saccharum cayennense* (P. Beauv.) Benth.
Referencias: Burkart, A. & Toursarkissian, M., 1969; Judziewicz, E. J., 1990; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CAN); URY(DUR, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2855* (SI), *Schwarz, G. J. 6532* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 12385* (MBM)]; PRY[*Jiménez, B. 79* (BM, PY)]; URY[*Rosengurtt, B. 8415* (SI)].

Eriochrysis filiformis (Hack.) Filg.
Sin.: *Andropogon filiforme* Hack. ex A. Camus, nom. illeg., *Saccharum filiforme* Hack.
Referencias: Filgueiras, T. S. & Lerina, R., 2001a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Swallen, J. R. 8366* (US)]; PRY[*Balansa, B. 231* (P, US)].

Eriochrysis glabrifolia Swallen = **Eriochrysis cayennensis** P. Beauv.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Eriochrysis holcoides (Nees) Kuhlm.
Sin.: *Anatherum holcoides* Nees, *Saccharum holcoides* (Nees) Hack., *Saccharum holcoides* (Nees) Hack. var. *brevipilum* Hack., *Saccharum holcoides* (Nees) Hack. var. *penicillare* Hack.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–1200 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN, COA, GUA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6313* (MBM)]; PRY[*Zardini, E. M. 51267* (AS, MO)].

Eriochrysis laxa Swallen
Referencias: Filgueiras, T. S. & Lerina, R., 2001a; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Swallen, J. R., 1966.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 526* (BAA)]; BRA[*Klein, R. M. 10855* (FLOR, HBR, US)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar material de referencia (Filgueiras & Lerina, 2001).

[Eriochrysis villosa Swallen]
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Erioneuron Nash

Número de especies: 2

[Erioneuron avenaceum (Kunth) Tateoka var. avenaceum]
Sin.: *Triodia avenacea* Kunth, *Triodia avenacea* Kunth var. *breviaristata* Kurtz
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Erioneuron avenaceum (Kunth) Tateoka var. *cabrerae* (Caro) E.A. Sánchez = **Erioneuron avenaceum** (Kunth) Tateoka var. **longiglume** (Parodi) Anton
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Erioneuron avenaceum (Kunth) Tateoka var. **kurtzianum** (Parodi) Anton
Sin.: *Dasyochloa kurtziana* (Parodi) Caro, *Tridens avenacea* (Kunth) Hitchc. var. *kurtziana* Parodi
Referencias: Anton, A. M., 1977; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997; Sánchez, E. A., 1983; Valdés Reyna, J. & Hatch, S. L., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(LPA, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 5466* (SI)].

Erioneuron avenaceum (Kunth) Tateoka var. **longiglume** (Parodi) Anton
Sin.: *Dasyochloa longiglumis* (Parodi) Caro, *Dasyochloa longiglumis* (Parodi) Caro var. *cabrerae* Caro, *Erioneuron avenaceum* (Kunth) Tateoka var. *cabrerae* (Caro) E.A. Sánchez, *Tridens avenacea* (Kunth) Hitchc. var. *longiglumis* Parodi
Referencias: Anton, A. M., 1977; Sánchez, E. A., 1983; Valdés Reyna, J. & Hatch, S. L., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27050* (SI)].

Erioneuron avenaceum (Kunth) Tateoka var. **pygmaeum** (Hack.) Anton
Sin.: *Dasyochloa pygmaea* (Hack.) Caro, *Tridens avenacea* (Kunth) Hitchc. var. *pygmaea* (Hack.) Parodi, *Triodia avenacea* Kunth var. *pygmaea* Hack.
Referencias: Anton, A. M., 1977; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Sánchez, E. A., 1983; Valdés Reyna, J. & Hatch, S. L., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 187* (SI)].

Erioneuron pilosum (Buckley) Nash var. *argentinum* (Kuntze) Nicora = **Erioneuron pilosum** (Buckley) Nash var. **longearistatum** (Kurtz) Anton
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Erioneuron pilosum (Buckley) Nash var. *aristiglumis* (Caro) E.A. Sánchez = **Erioneuron pilosum** (Buckley) Nash var. **longearistatum** (Kurtz) Anton
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Erioneuron pilosum (Buckley) Nash var. **longearistatum** (Kurtz) Anton
Sin.: *Dasyochloa argentina* (Kuntze) Caro, *Dasyochloa argentina* (Kuntze) Caro var. *aristiglumis* Caro, *Dasyochloa argentina* (Kuntze) Caro var. *parodiana* (E.A. Sánchez) Caro, *Erioneuron pilosum* (Buckley) Nash var. *argentinum* (Kuntze) Nicora, *Erioneuron pilosum* (Buckley) Nash var. *aristiglumis* (Caro) E.A. Sánchez, *Erioneuron pilosum* (Buckley) Nash var. *parodianum* E.A. Sánchez, *Sieglingia argentina* Kuntze, *Tridens pilosus* (Buckley) Hitchc. var. *argentina* (Kuntze) Parodi, *Triodia argentina* (Kuntze) K. Schum., *Triodia avenacea* Kunth var. *longearistata* Kurtz
Referencias: Anton, A. M., 1977; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Sánchez, E. A., 1983; Valdés Reyna, J. & Hatch, S. L., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SDE, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 25060* (CORD)].

Erioneuron pilosum (Buckley) Nash var. **mendocinum** (Parodi) Nicora
Sin.: *Tridens pilosus* (Buckley) Hitchc. var. *mendocina* Parodi
Referencias: Anton, A. M., 1977; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997; Valdés Reyna, J. & Hatch, S. L., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(LPA, MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. s.n.* (BA, SI)].

Erioneuron pilosum (Buckley) Nash var. *parodianum* E.A. Sánchez = **Erioneuron pilosum** (Buckley) Nash var. **longearistatum** (Kurtz) Anton
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Erosion hypnoides (Lam.) Lunell = **Eragrostis hypnoides** (Lam.) Britton, Stern & Poggenb.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eustachys Desv.

Número de especies: 9, 2 endémicas

Eustachys argentina (Hack.) Herter, hom. illeg. = **Eustachys retusa** (Lag.) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eustachys argentinensis (Hack.) Herter = **Eustachys retusa** (Lag.) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eustachys bahiensis (Steud.) Herter = **Eustachys paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **caribaea** (Spreng.) Nowack
Referencias: Nowack, R., 1995; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eustachys bahiensis (Steud.) Herter var. **robusta** A.M. Molina
Referencias: Molina, A. M., 1996; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2294* (BAA, MBM)].

Eustachys brevipila (Roseng. & Izag.) Caro & E.A. Sánchez
Sin.: *Chloris brevipila* Roseng. & Izag.
Referencias: Molina, A. M., 1996; Mujica Sallés, J., 1996; Sánchez, E. A., 1971.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); BRA(RGS); URY(FLA, MAL, PAY, RNO, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 4746* (BAA, SI)]; BRA[*Swallen, J. R. 7618* (PEL)]; URY[*Rosengurtt, B. 10173* (MVFA)].

Eustachys calvescens (Hack.) Caro & E.A. Sánchez
Sin.: *Chloris calvescens* Hack.
Referencias: Molina, A. M., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CON, COA, PAI, SPE); URY(CLA, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 2011* (LIL)]; BRA[*Swallen, J. R. 8984* (PEL)]; PRY[*Hassler, E. 10978* (BAA, G)]; URY[*Berro, M. B. 4661* (MVFA)].

Eustachys caribaea (Spreng.) Herter = **Eustachys paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **caribaea** (Spreng.) Nowack
Referencias: Nowack, R., 1995.

Eustachys distichophylla (Lag.) Nees
Sin.: *Chloris confertifolia* Trin., *Chloris distichophylla* Lag., *Chloris distichophylla* Lag. var. *acuminata* (Trin.) Hack., *Chloris distichophylla* Lag. var. *argentina* Hack.
Referencias: Anderson, D. E., 1974; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Molina, A. M., 1996; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI,); URY(PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 4925* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 21153* (MBM)]; PRY[*Zardini, E. M. 3744* (FCQ, MO)]; URY[*Rosengurtt, B. 4283* (BAA, MO)].

Eustachys glabrescens (Hack.) Caro & E.A. Sánchez = **Eustachys paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **caribaea** (Spreng.) Nowack
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Eustachys paranensis A.M. Molina
Referencias: Molina, A. M., 1996; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Swallen, J. R. 8459* (PEL, US)].

Eustachys paspaloides (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **caribaea** (Spreng.) Nowack
Sin.: *Chloris bahiensis* Steud., *Chloris bahiensis* Steud. f. *glabrescens* Hack., *Chloris capensis* (Houtt.) Thell. var. *bahiensis* (Steud.) Parodi, *Chloris capensis* (Houtt.) Thell. var. *glabrescens* (Hack.) Parodi, *Chloris caribaea* Spreng., *Chloris glabrescens* (Hack.) Roseng. & Izag., *Eustachys bahiensis* (Steud.) Herter, *Eustachys caribaea* (Spreng.) Herter, *Eustachys glabrescens* (Hack.) Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Anderson, D. E., 1974; Molina, A. M., 1996; Mujica Sallés, J., 1996; Nowack, R., 1995; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–400 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, CAU, PAI, SPE); URY(CAS, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 4010* (BAA)]; BRA[*Hatschbach, G. 44610* (MBM)]; PRY[*Rojas, T. 13404* (LIL)]; URY[*Mujica Sallés, J. 907* (MVFA)].

[Eustachys paspaloides (Vahl) Lanza & Mattei subsp. paspaloides]
Sin.: *Andropogon capense* Houtt., *Chloris capensis* (Houtt.) Thell., *Chloris petraea* Thunb., hom. illeg., *Cynosurus paspaloides* Vahl
Referencias: Nowack, R., 1995.

[Eustachys petraea (Sw.) Desv.]
Sin.: *Chloris petraea* Sw.
Referencias: Molina, A. M., 1996.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Eustachys retusa (Lag.) Kunth
Sin.: *Chloris argentina* (Hack.) Lillo & Parodi, *Chloris retusa* Lag., *Eustachys argentina* (Hack.) Herter, hom. illeg., *Eustachys argentinensis* (Hack.) Herter
Referencias: Cantero, J. J., Núñez, C. O., Geymonat, M. & Chiacchiera, G., 1996; Molina, A. M., 1996; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN, COA, ITA); URY(CLA, COL, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Muñoz, J. D. 5458* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 22799* (CTES, ICN)]; PRY[*Zardini, E. M. 24338* (MO)]; URY[*Marchesi, E. 1482* (MVFA)].

Eustachys swalleniana A.M. Molina
Referencias: Molina, A. M., 1996; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS); URY(CLA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Swallen, J. R. 7287* (PEL)]; URY[*Montoro Guarch, A. 14* (BAA)].

Eustachys uliginosa (Hack.) Herter
Sin.: *Chloris dusenii* Ekman, *Chloris swartziana* Döll, *Chloris uliginosa* Hack.
Referencias: Molina, A. M., 1996; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Sánchez, E. A., 1971.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1200 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA, ITA, PAI); URY(CLA, FLO, SAO, SJO, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14078* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 28209* (MBM)]; PRY[*Rosengurtt, B. 6179* (MVFA)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 2276* (MVFA)].

Eutriana multiseta Nees = **Bouteloua megapotamica** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Festuca L.

Número de especies: 56, 34 endémicas, 3 introducidas

Festuca acanthophylla E. Desv.
Sin.: *Festuca acanthophylla* E. Desv. f. *vivipara* St.-Yves, nom. nud., *Festuca acuta* Phil., *Festuca desvauxii* Phil., *Festuca desvauxii* Phil. var. *ampla* St.-Yves
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Matthei, O. R., 1982.
Hierba. Perenne. Nativa. 1700–3600 m.
Países: ARG(JUJ, MEN, NEU, SJU, SLU); CHL(I, IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 18366* (LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996173* (CONC, SGO)].

Festuca acanthophylla E. Desv. f. *vivipara* St.-Yves, nom. nud. = **Festuca acanthophylla** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca acuta Phil. = **Festuca acanthophylla** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca alopecurus (Gaudich. ex Mirb.) Brongn., nom. superfl. = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **alopecurus**
Referencias: Nicora, E. G., 1978.

Festuca ampliflora Döll = **Festuca fimbriata** Nees
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca angustata Griseb. = **Poa parviceps** Hack. var. **parviceps**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca antarctica (d'Urv.) Kunth, hom. illeg. = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **alopecurus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca antarctica Spreng. = **Poa flabellata** (Lam.) Raspail
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca antucensis (Trin.) Steud. = **Vulpia antucensis** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca aquatica Bosc ex Roem. & Schult., nom. inval. = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **fascicularis** (Lam.) N. Snow
Referencias: Snow, N., 1998c.

Festuca arenaria Lam. = **Poa robusta** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca argentina (Speg.) Parodi
Sin.: *Festuca cavillieri* St.-Yves, *Poa argentina* Speg.
Referencias: Matthei, O. R., 1982; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33017* (SI)]; CHL[*Hohenacker, W. R. F. 3085* (G, LE, P)].

Festuca argentinensis (St.-Yves) Türpe
Sin.: *Festuca scirpifolia* (J. Presl) Kunth var. *argentinensis* St.-Yves
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Negritto, M. A. 406* (CORD)].

Festuca arundinacea Schreb. = **Schedonorus arundinaceus** (Schreb.) Dumort.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca arundo Hook. f. = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **alopecurus**
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca asperata Phil. = **Festuca tunicata** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca australis Nees ex Steud. = **Vulpia australis** (Nees ex Steud.) C.H. Blom
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Festuca barbata L. = **Schismus barbatus** (L.) Thell.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Festuca barrazi Muñoz = **Festuca tunicata** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca berteroniana Steud. = **Festuca tunicata** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca biflora Steud. = **Puccinellia biflora** (Steud.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca binodis (Hack. Ex St.-Yves) Lillo = **Festuca uninodis** Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca bonariensis Lam. = **Poa bonariensis** (Lam.) Kunth
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Festuca brizoides Spreng. = **Chascolytrum erectum** (Lam.) Desv.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca bromoides L. = **Vulpia bromoides** (L.) Gray
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca buchtienii Hack. = **Festuca humilior** Nees & Meyen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca cabrerae Parodi = **Festuca kurtziana** St.-Yves
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca calchaquiensis Hack. = **Festuca nardifolia** Griseb. var. **calchaquiensis** (Hack.) St.-Yves
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca castilloniana Türpe
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 2884* (LIL)].

Festuca cavillieri St.-Yves = **Festuca argentina** (Speg.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca cepacea Phil. = **Melica cepacea** (Phil.) Scribn.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca chrysophylla Phil.
Sin.: *Festuca deserticola* Phil. var. *chrysophylla* (Phil.) St.-Yves, *Festuca deserticola* Phil. var. *juncea* St.-Yves, *Festuca juncea* Phil., hom. illeg., *Festuca saltana* St.-Yves
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Matthei, O. R., 1982; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL); CHL(I, II, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 1882* (BAA)]; CHL[*Arancio, G. 636* (CONC)].

Festuca circinata Griseb.
Referencias: Cantero, J. J., Núñez, C. O., Geymonat, M. & Chiacchiera, G., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 535* (CORD, GOET, US)].

Festuca cirrosa (Speg.) Parodi
Sin.: *Festuca erecta* d'Urv. var. *cirrosa* Speg., *Festuca longidiurna* Parodi
Referencias: Matthei, O. R., 1982; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 505* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 4995* (CONC)].

Festuca coiron Steud. = **Festuca tunicata** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca commersonii Franch., hom. illeg. = **Festuca thermarum** Phil.

Festuca commersonii Spreng., nom. superfl. = **Chascolytrum subaristatum** (Lam.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca commutata Steud., hom. illeg. = **Vulpia myuros** (L.) C.C. Gmel. var. **megalura** (Nutt.) Auquier
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca contracta Kirk
Sin.: *Festuca erecta* d'Urv., hom. illeg., *Festuca paludicola* Roiv.
Referencias: Matthei, O. R., 1982; Moore, D. M., 1983; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(TDF, TUC); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 7300* (BAA)]; CHL[*Ricardi, M. 318* (CONC)].

Festuca cristata L. = **Rostraria cristata** (L.) Tzvelev
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca davilae Phil. = **Festuca purpurascens** Banks & Sol. ex Hook. f.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca delicatula auct. non Lag. = **Vulpia australis** (Nees ex Steud.) C.H. Blom

Festuca dertonensis (All.) Asch. & Graebn. = **Vulpia bromoides** (L.) Gray
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Festuca deserticola Phil.
Sin.: *Festuca deserticola* Phil. var. *paupera* (Phil.) St.-Yves, *Festuca oligantha* Phil. ex St.-Yves, *Festuca paupera* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Cabrera, A. L., 1957b; Matthei, O. R., 1982; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2900–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8281* (LP)]; CHL[*Muñoz-Schick, M. 3865* (CONC)].

Festuca deserticola Phil. var. *chrysophylla* (Phil.) St.-Yves = **Festuca chrysophylla** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca deserticola Phil. var. *hypsophila* (Phil.) St.-Yves = **Festuca hypsophila** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca deserticola Phil. var. *juncea* St.-Yves = **Festuca chrysophylla** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca deserticola Phil. var. *paupera* (Phil.) St.-Yves = **Festuca deserticola** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca desvauxii Phil. = **Festuca acanthophylla** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca desvauxii Phil. var. *ampla* St.-Yves = **Festuca acanthophylla** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca dissitiflora Steud. ex Griseb.
Sin.: *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. subsp. *eudissitiflora* St.-Yves, nom. inval., *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–4000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, MEN, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 71* (CORD)].

Festuca dissitiflora Steud. ex Griseb. var. *euloricata* St.-Yves, nom. inval. = **Festuca loricata** (Griseb.) Pilg.

Festuca dissitiflora Steud. ex Griseb. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval. = **Festuca dissitiflora** Steud. ex Griseb.

Festuca dissitiflora Steud. ex Griseb. var. *loricata* Griseb. = **Festuca loricata** (Griseb.) Pilg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Festuca dissitiflora Steud. ex Griseb. var. mutica Griseb.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Festuca dissitiflora Steud. ex Griseb. var. *villipalea* St.-Yves = **Festuca villipalea** (St.-Yves) E.B. Alexeev
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca dissitiflora Steud. ex Griseb. subsp. *eudissitiflora* St.-Yves, nom. inval. = **Festuca dissitiflora** Steud. ex Griseb.

Festuca dissitiflora Steud. ex Griseb. subsp. *loricata* (Griseb.) St.-Yves = **Festuca loricata** (Griseb.) Pilg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca distichovaginata Pilg.
Sin.: *Festuca distichovaginata* Pilg. f. *angustiflora* St.-Yves
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 3900–4800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 10604* (SI), *Rodríguez, D. 1324* (SI)].

Festuca distichovaginata Pilg. f. *angustiflora* St.-Yves = **Festuca distichovaginata** Pilg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.

Festuca dumetorum Phil., hom. illeg. = **Festuca purpurascens** Banks & Sol. ex Hook. f.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca elatior L. = **Schedonorus arundinaceus** (Schreb.) Dumort.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca elatior L. var. *arundinacea* (Schreb.) Wimm. = **Schedonorus arundinaceus** (Schreb.) Dumort.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Festuca elatior L. subsp. *arundinacea* (Schreb.) Hack. = **Schedonorus arundinaceus** (Schreb.) Dumort.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca elatior L. subsp. *pratensis* (Huds.) Hack. = **Schedonorus pratensis** (Huds.) P. Beauv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca elliotii Hack. = **Poa holciformis** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca erecta (Lam.) Spreng. ex Kunth, nom. illeg. = **Chascolytrum erectum** (Lam.) Desv.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Festuca erecta d'Urv., hom. illeg. = **Festuca contracta** Kirk
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca erecta d'Urv. var. *aristulata* Griseb. = **Festuca villipalea** (St.-Yves) E.B. Alexeev
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca erecta d'Urv. var. *cirrosa* Speg. = **Festuca cirrosa** (Speg.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca erecta d'Urv. var. *mutica* Griseb. = **Festuca hieronymi** Hack. var. **hieronymi**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca eriolepis E. Desv. = **Vulpia antucensis** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca eriolepis E. Desv. var. *nana* Hieron. = **Vulpia antucensis** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca eriostoma Hack.
Sin.: *Festuca orthophylla* Pilg. var. *eriostoma* (Hack.) St.-Yves
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 781* (B, CORD, K, S, US, W)].

Festuca fascicularis Lam. = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **fascicularis** (Lam.) N. Snow
Referencias: Snow, N., 1998c.

Festuca fiebrigii Pilg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.

Hierba. Perenne. Nativa. 2800–4500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11710* (SI)].

Festuca filiformis Lam., hom. illeg. = **Leptochloa panicea** (Retz.) Ohwi subsp. **brachiata** (Steud.) N. Snow
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Festuca filiformis Pourr.
Sin.: *Festuca tenuifolia* Sibth.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Nicora, E. G., 1988; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–600 m.
Países: ARG(SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ambrosetti, A. 3413* (SI)].
Notas: Citada para Chile sin mencionar ejemplar de referencia (Soreng et al., 2003).

Festuca fimbriata Nees
Sin.: *Festuca ampliflora* Döll
Referencias: Alexeev, E. B., 1985; Longhi-Wagner, H. M., 1987; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA); URY(CLA, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28766* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 10127* (HBR, R, US)]; PRY[*Zardini, E. M. 7701* (FCQ, MO)]; URY[*Rosengurtt, B. 2764* (ICN, MVFA)].

Festuca flabellata Lam. = **Poa flabellata** (Lam.) Raspail
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca fluitans L. = **Glyceria fluitans** (L.) R. Br.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca fuegiana Hook. f. = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **fuegiana** (Hook. f.) Moore & Doggett
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca fuegiana Hook. f. var. *vivipara* Hook., nom. inval. = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **fuegiana** (Hook. f.) Moore & Doggett
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca geniculata Willd. var. *monandra* Döll = **Vulpia bromoides** (L.) Gray
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca glaucophylla Phil. = **Festuca purpurascens** Banks & Sol. ex Hook. f.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca glomerata (L.) All. = **Dactylis glomerata** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca gracillima Hook. f. f. *scabra* St.-Yves = **Festuca pallescens** (St.-Yves) Parodi var. **scabra** (St.-Yves) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca gracillima Hook. f. var. *brevifolia* Speg. = **Festuca gracillima** Hook. f. var. **gracillima**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca gracillima Hook. f. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval. = **Festuca gracillima** Hook. f. var. **gracillima**

Festuca gracillima Hook. f. var. **glacialis** Rúgolo & Nicora
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Nicora, E. G., 1988; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arroyo-Leuenberger, S. 2535* (SI)]; CHL[*Latour, C. M. 1755* (BAA, SI)].

Festuca gracillima Hook. f. var. **gracillima**
Sin.: *Festuca gracillima* Hook. f. var. *brevifolia* Speg., *Festuca gracillima* Hook. f. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Matthei, O. R., 1982; Nicora, E. G., 1978; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Nicora, E. G., 1988; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(VIII, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 253* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92101* (CONC, SGO)].

Festuca gracillima Hook. f. var. *monticola* (Phil.) St.-Yves = **Festuca monticola** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca gracillima Hook. f. var. *patagonica* Speg. = **Festuca pallescens** (St.-Yves) Parodi var. **pallescens**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca gracillima Hook. f. var. *ramosa* St.-Yves = **Festuca pallescens** (St.-Yves) Parodi var. **pallescens**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca haenkei Kunth var. *humilior* (Nees & Meyen) St.-Yves = **Festuca humilior** Nees & Meyen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca hieronymi Hack. f. *panicula expansa* Hack., nom. inval. = **Festuca hieronymi** Hack. var. **expansa** (St.-Yves) Türpe
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca hieronymi Hack. var. **expansa** (St.-Yves) Türpe
Sin.: *Festuca hieronymi* Hack. f. *panicula expansa* Hack., nom. inval., *Festuca hieronymii* Hack. f. *subvar. expansa* St.-Yves
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CAT, COR, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 3993* (CORD, LIL)].

Festuca hieronymi Hack. var. **hieronymi**
Sin.: *Festuca erecta* d'Urv. var. *mutica* Griseb.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–4200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 529* (CORD, GOET)].

Festuca hieronymii Hack. f. *subvar. expansa* St.-Yves = **Festuca hieronymi** Hack. var. **expansa** (St.-Yves) Türpe
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Festuca hieronymii Hack. f. trachyantha Hack.]
Notas: Nombre dudoso.

Festuca humilior Nees & Meyen
Sin.: *Festuca buchtienii* Hack., *Festuca haenkei* Kunth var. *humilior* (Nees & Meyen) St.-Yves, *Festuca proxima* R.E. Fr., *Festuca scirpifolia* (J. Presl) Kunth subsp. *buchtienii* (Hack.) St.-Yves
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Negritto, M. A. 343* (CORD)].

Festuca hypsophila Phil.
Sin.: *Festuca deserticola* Phil. var. *hypsophila* (Phil.) St.-Yves
Referencias: Matthei, O. R., 1982; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 3800 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2502* (SI)]; CHL[*Marticorena, A. 83580* (CONC)].

Festuca hystricola (Hack.) E.B. Alexeev = **Festuca magellanica** Lam.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca insularis Steud. = **Festuca purpurascens** Banks & Sol. ex Hook. f.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca juncea Phil., hom. illeg. = **Festuca chrysophylla** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca juncifolia St.-Amans
Referencias: Matthei, O. R., 1982; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 4961* (BAA, BAB)]; CHL[*Pisano, E. 2478* (BAA)].

Festuca kurtziana St.-Yves
Sin.: *Festuca cabrerae* Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(IV, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 11284* (US), *Kurtz, F. 7196* (B, CORD)]; CHL[*Ricardi, M. 871* (CONC)].

Festuca laeteviridis Pilg. var. *lasiorrhachis* (Pilg.) St.-Yves = **Festuca lasiorrhachis** Pilg.
Referencias: Nicora, E. G., 1998a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca lanata Spreng. = **Poa lanuginosa** Poir.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca lasiorrhachis Pilg.
Sin.: *Festuca laeteviridis* Pilg. var. *lasiorrhachis* (Pilg.) St.-Yves
Referencias: Marticorena, C., com. pers.; Nicora, E. G., 1998a.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31676* (SI)].
Notas: Citada para Chile sin mencionar ejemplar de referencia (C. Marticorena, com. pers.).

Festuca laxiflora Phil., hom. illeg. = **Festuca purpurascens** Banks & Sol. ex Hook. f.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca lechleriana Steud. = **Festuca purpurascens** Banks & Sol. ex Hook. f.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca leptothrix Trin. ex Steud., nom. nud. = **Festuca ulochaeta** Nees ex Steud.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca lilloi Hack.
Sin.: *Festuca setifolia* Steud. ex Griseb. var. *lilloi* (Hack.) St.-Yves
Referencias: Parodi, L. R., 1950; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969, 1975a.
Hierba. Perenne. Nativa. 1800–4500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11308* (SI)].

Festuca lilloi Hack. var. *breviaristata* Türpe = **Festuca tucumanica** E.B. Alexeev
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca longidiurna Parodi = **Festuca cirrosa** (Speg.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca loricata (Griseb.) Pilg.
Sin.: *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. subsp. *loricata* (Griseb.) St.-Yves, *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. var. *euloricata* St.-Yves, nom. inval., *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. var. *loricata* Griseb.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 68* (CORD, GOET, LE, US)].

Festuca madritensis (L.) Desf. = **Bromus madritensis** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca magellanica Lam.
Sin.: *Festuca hystricola* (Hack.) E.B. Alexeev, *Festuca ovina* L. subsp. *hystricola* Hack., *Festuca ovina* L. var. *antarctica* Hack., *Festuca ovina* L. var. *magellanica* (Lam.) Hack., *Festuca ovina* L. var. *wilczekii* St.-Yves, *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *recurvata* Hook.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Matthei, O. R., 1982; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3900 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IV, VII, VIII, IX, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dusén, P. K. H. 5389* (S, US, W)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92106* (CONC, SGO)].

Festuca magensiana Potztal
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Sillard s.n.*(B, CONC, HIP)].

Festuca magniflora E.B. Alexeev
Sin.: *Festuca pallescens* (St.-Yves) Parodi var. *grandiflora* Parodi
Referencias: Alexeev, E. B., 1984; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1100 m.
Países: ARG(CHU, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Illin, N. s.n.*(BAA)].

Festuca megalura Nutt. = **Vulpia myuros** (L.) C.C. Gmel. var. **megalura** (Nutt.) Auquier
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Festuca mollis Kunth, nom. illeg. = **Bromus lanatus** Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca monticola Phil.
Sin.: *Festuca gracillima* Hook. f. var. *monticola* (Phil.) St.-Yves, *Poa monticola* Phil.
Referencias: Matthei, O. R., 1982; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 438* (BAA)]; CHL[*Philippi, O. s.n.* (BAA)].

Festuca morenensis Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 1407* (CONC)].

Festuca muralis Kunth = **Vulpia myuros** (L.) C.C. Gmel. var. **myuros**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca myuros L. = **Vulpia myuros** (L.) C.C. Gmel. var. **myuros**
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Festuca myuros L. var. *muralis* Kunth ex Speg. = **Vulpia muralis** (Kunth) Nees
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca nardifolia Griseb. var. **calchaquiensis** (Hack.) St.-Yves
Sin.: *Festuca calchaquiensis* Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 4000–4700 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 3073* (LIL, US, W)].

Festuca nardifolia Griseb. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval. = **Festuca nardifolia** Griseb. var. **nardifolia**

Festuca nardifolia Griseb. var. **nardifolia**
Sin.: *Festuca nardifolia* Griseb. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval.
Referencias: Matthei, O. R., 1982; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 3200–4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 84* (CORD, GOET, US)]; CHL[*Werdermann, E. 1127* (CONC)].

Festuca nemoralis Türpe
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 2800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 11049* (BAA)].

Festuca neuquenensis St.-Yves, nom. nud. = **Festuca thermarum** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca neuquenensis St.-Yves var. *aspera* St.-Yves = **Festuca scabriuscula** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca neuquenensis St.-Yves var. *parodiana* St.-Yves = **Festuca thermarum** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca obtusiflora Willd. ex Spreng. = **Leptochloa dubia** (Kunth) Nees
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Festuca octoflora Walter = **Vulpia octoflora** (Walter) Rydb.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca oligantha Phil. ex St.-Yves = **Festuca deserticola** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca orthophylla Pilg.
Sin.: *Festuca orthophylla* Pilg. var. *boliviana* Pilg., *Festuca orthophylla* Pilg. var. *glabrescens* Pilg.
Referencias: Matthei, O. R., 1982; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); CHL(I, II, IV, VII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2555* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 1075* (CONC)].

Festuca orthophylla Pilg. var. *boliviana* Pilg. = **Festuca orthophylla** Pilg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca orthophylla Pilg. var. *eriostoma* (Hack.) St.-Yves = **Festuca eriostoma** Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca orthophylla Pilg. var. *glabrescens* Pilg. = **Festuca orthophylla** Pilg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca ovina L. var. *antarctica* Hack. = **Festuca magellanica** Lam.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca ovina L. var. *magellanica* (Lam.) Hack. = **Festuca magellanica** Lam.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca ovina L. var. *pyrogea* (Speg.) Hack. = **Festuca pyrogea** Speg. var. **pyrogea**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca ovina L. var. *wilczekii* St.-Yves = **Festuca magellanica** Lam.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca ovina L. subsp. *hystricola* Hack. = **Festuca magellanica** Lam.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca pallescens (St.-Yves) Parodi var. **foliosa** Parodi
Referencias: Nicora, E. G., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2464* (BAA)].

Festuca pallescens (St.-Yves) Parodi var. *grandiflora* Parodi = **Festuca magniflora** E.B. Alexeev
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca pallescens (St.-Yves) Parodi var. **pallescens**
Sin.: *Festuca gracillima* Hook. f. var. *patagonica* Speg., *Festuca gracillima* Hook. f. var. *ramosa* St.-Yves
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Nicora, E. G., 1988; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR), CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 233* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 430* (CONC)].

Festuca pallescens (St.-Yves) Parodi var. **scabra** (St.-Yves) Parodi
Sin.: *Festuca gracillima* Hook. f. f. *scabra* St.-Yves
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1700 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 3190* (BAA)].

Festuca paludicola Roiv. = **Festuca contracta** Kirk
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca pampeana Speg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1970a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5321* (SI)].

Festuca panda Swallen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2900 m.
Países: CHL(I, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 2151* (US)].

Festuca parodiana (St.-Yves ex Parodi) Nicora
Sin.: *Festuca subulata* Trin. var. *parodiana* St.-Yves ex Parodi
Referencias: Nicora, E. G., 1998a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ambrosetti, A. 662* (MERL, SI), *Cialdella, A. M. 106* (SI), *Parodi, L. R. 10698* (G)].

Festuca parodii St.-Yves
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 2342* (BAA)].

Festuca pascua Phil. = **Festuca scabriuscula** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca patagonica Phil. = **Poa secunda** J. Presl subsp. **secunda**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca paupera Phil. = **Festuca deserticola** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca phleoides Vill. = **Rostraria cristata** (L.) Tzvelev
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca platyphylla Steud. = **Festuca purpurascens** Banks & Sol. ex Hook. f.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca pogonantha Franch. = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **fuegiana** (Hook. f.) Moore & Doggett
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca pratensis Huds. = **Schedonorus pratensis** (Huds.) P. Beauv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca proxima R.E. Fr. = **Festuca humilior** Nees & Meyen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca purpurascens Banks & Sol. ex Hook. f.
Sin.: *Festuca davilae* Phil., *Festuca dumetorum* Phil., hom. illeg., *Festuca glaucophylla* Phil., *Festuca insularis* Steud., *Festuca laxiflora* Phil., hom. illeg., *Festuca lechleriana* Steud., *Festuca platyphylla* Steud., *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. f. f. *aristata* St.-Yves, *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. f. f. *scabrisucula* St.-Yves, *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. f. f. *submutica* E. Desv., *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. f. var. *aristata* E. Desv., *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. f. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval., *Festuca serranoi* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Matthei, O. R., 1982; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF); CHL(VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 349c* (SI)]; CHL[*Lechler, W. 276* (LE, US, W), *Rúgolo de Agrasar, Z. E. 1159* (SI)].

Festuca purpurascens Banks & Sol. ex Hook. f. f. *aristata* St.-Yves = **Festuca purpurascens** Banks & Sol. ex Hook. f.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca purpurascens Banks & Sol. ex Hook. f. f. *scabrisucula* St.-Yves = **Festuca purpurascens** Banks & Sol. ex Hook. f.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca purpurascens Banks & Sol. ex Hook. f. f. *submutica* E. Desv. = **Festuca purpurascens** Banks & Sol. ex Hook. f.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca purpurascens Banks & Sol. ex Hook. f. var. *aristata* E. Desv. = **Festuca purpurascens** Banks & Sol. ex Hook. f.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca purpurascens Banks & Sol. ex Hook. f. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval. = **Festuca purpurascens** Banks & Sol. ex Hook. f.

Festuca pyrogea Speg. var. **elata** Parodi
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, D. 11643* (BAA)].

Festuca pyrogea Speg. var. **pyrogea**
Sin.: *Festuca ovina* L. var. *pyrogea* (Speg.) Hack.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Matthei, O. R., 1982; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IX, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 15060* (BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92121* (CONC)].

Festuca reptatrix L. = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **muelleri** (Benth.) N. Snow

Festuca rigescens (J. Presl) Kunth
Sin.: *Diplachne rigescens* J. Presl
Referencias: Johnston, I. M., 1929b; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: ARG(CAT, JUJ, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 1838* (BAA)].

Festuca robusta Phil., hom. illeg. = **Festuca tunicata** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca robusta Phil. var. *scabriuscula* (Phil.) St.-Yves = **Festuca scabriuscula** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca roigii Dubcovsky & Rúgolo
Referencias: Dubcovsky, J. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1990.
Hierba. Perenne. Endémica. 2200 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Méndez, E. 3672* (SI)].

Festuca rubra L.
Referencias: Moore, D. M., 1983; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–3300 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, TDF); CHL(IV, V, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, D. 15605* (BAA)]; CHL[*Pisano, E. 7738* (CONC)].

Festuca rubra L. var. *simpliciuscula* Hack. = **Festuca simpliciuscula** (Hack.) E.B. Alexeev
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Festuca rubra L. subsp. corcovadensis St.-Yves]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Festuca saltana St.-Yves = **Festuca chrysophylla** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca scabriuscula Phil.
Sin.: *Festuca neuquenensis* St.-Yves var. *aspera* St.-Yves, *Festuca pascua* Phil., *Festuca robusta* Phil. var. *scabriuscula* (Phil.) St.-Yves, *Festuca steudelii* Phil.
Referencias: Matthei, O. R., 1982; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 2696* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 13949* (CONC)].

Festuca scirpifolia auct. non (J. Presl) Kunth = **Festuca villipalea** (St.-Yves) E.B. Alexeev

Festuca scirpifolia (J. Presl) Kunth var. *argentinensis* St.-Yves = **Festuca argentinensis** (St.-Yves) Türpe
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca scirpifolia (J. Presl) Kunth subsp. *buchtienii* (Hack.) St.-Yves = **Festuca humilior** Nees & Meyen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca sciuroides Roth = **Vulpia bromoides** (L.) Gray
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca serranoi Phil. = **Festuca purpurascens** Banks & Sol. ex Hook. f.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Festuca setifolia Steud. ex Griseb.]
Sin.: *Festuca setifolia* Steud. ex Griseb. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Festuca setifolia Steud. ex Griseb. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval. = **Festuca setifolia** Steud. ex Griseb.

Festuca setifolia Steud. ex Griseb. var. *lilloi* (Hack.) St.-Yves = **Festuca lilloi** Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.

Festuca shuka Speg. = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **prichardii** (Rendle) Giussani & Soreng
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca simpliciuscula (Hack.) E.B. Alexeev
Sin.: *Festuca rubra* L. var. *simpliciuscula* Hack.
Referencias: Dubcovsky, J. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1990; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 14238* (BAA, BAB, SI)].

Festuca spaniantha Phil. = **Poa secunda** J. Presl subsp. **secunda**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca steudelii Phil. = **Festuca scabriuscula** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca stuckertii St.-Yves
Referencias: Saint-Yves, A., 1927; Türpe, A. M., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 2600 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 8873* (LIL)].

Festuca subandina Phil. = **Festuca thermarum** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca subantarctica Parodi = **Festuca thermarum** Phil.

Festuca subulata Trin. var. *parodiana* St.-Yves ex Parodi = **Festuca parodiana** (St.-Yves ex Parodi) Nicora
Referencias: Nicora, E. G., 1998a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca superba Parodi ex Türpe
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 14552* (BAA)].

Festuca sylvatica Huds. = **Brachypodium sylvaticum** (Huds.) P. Beauv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca tectoria St.-Yves
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 3300–4000 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 188* (CONC)].

Festuca tenella auct. non Willd. = **Vulpia australis** (Nees ex Steud.) C.H. Blom
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Festuca tenuifolia Sibth. = **Festuca filiformis** Pourr.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca thermarum Phil.
Sin.: *Festuca commersonii* Franch., hom. illeg., *Festuca neuquenensis* St.-Yves var. *parodiana* St.-Yves, *Festuca neuquenensis* St.-Yves, nom. nud., *Festuca subandina* Phil., *Festuca subantarctica* Parodi
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Matthei, O. R., 1982; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 3195* (BAA, P)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20016* (CONC)].

Festuca tucumanica E.B. Alexeev
Sin.: *Festuca lilloi* Hack. var. *breviaristata* Türpe, *Festuca setifolia* Steud. ex Griseb. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval.
Referencias: Alexeev, E. B., 1984; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)].

Festuca tunicata E. Desv.
Sin.: *Festuca asperata* Phil., *Festuca barrazi* Muñoz, *Festuca berteroniana* Steud., *Festuca coiron* Steud., *Festuca robusta* Phil., hom. illeg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(II, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz-Pizarro, C. 1393* (SGO)].

Festuca ulochaeta Nees ex Steud.
Sin.: *Festuca leptothrix* Trin. ex Steud., nom. nud.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–1800 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2443* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 11384* (HBR, R, US)].

Festuca uninodis Hack.
Sin.: *Festuca binodis* (Hack. Ex St.-Yves) Lillo, *Festuca uninodis* Hack. f. *binodis* Hack. ex St.-Yves
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.

Hierba. Perenne. Endémica. 4100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 2025b* (LIL)].

Festuca uninodis Hack. f. *binodis* Hack. ex St.-Yves = **Festuca uninodis** Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca unioloides Willd. = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Festuca urvilleana Steud. = **Poa flabellata** (Lam.) Raspail
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Festuca ventanicola Speg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1970a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. 12540* (BAA)].

Festuca villipalea (St.-Yves) E.B. Alexeev
Sin.: *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. var. *villipalea* St.-Yves, *Festuca erecta* d'Urv. var. *aristulata* Griseb., *Festuca scirpifolia* auct. non (J. Presl) Kunth
Referencias: Alexeev, E. B., 1985; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 654* (CORD, GOET)].

Festuca weberbaueri Pilg.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3800 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, M. F. 6* (SI)].

Festuca werdermannii St.-Yves
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 3600 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 94061* (CONC), *Werdermann, E. 209* (B, G, S, SI, US)].

Forasaccus breviaristatus (Hook.) Lunell = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Gastridium P. Beauv.

Número de especies: 1 introducida

Gastridium phleoides (Nees & Meyen) C.E. Hubb.
Sin.: *Lachnagrostis phleoides* Nees & Meyen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–900 m.
Países: CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IDE, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 630* (CONC)].

Gastridium lendigerum (L.) Desv. = **Gastridium ventricosum** (Gouan) Schinz & Thell.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.]
Sin.: *Agrostis ventricosa* Gouan, *Gastridium lendigerum* (L.) Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Gaudinia P. Beauv.

Número de especies: 1 introducida

Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.
Sin.: *Avena fragilis* L.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1970b.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 8060* (SI)]; URY[*Mujica Sallés, J. 1376* (MVFA)].

Ginannia lanata (L.) F.T. Hubb. = **Holcus lanatus** L.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Ginannia pubescens Bubani = **Holcus lanatus** L.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Glyceria R. Br., nom. cons.

Número de especies: 3, 1 endémica, 1 introducida

Glyceria antarctica Speg. = **Puccinellia magellanica** (Hook. f.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Sin.: *Festuca fluitans* L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1700 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Coronel 43* (CONC)].

Glyceria fluitans (L.) R. Br. var. *plicata* R.E. Fr. = **Glyceria notata** Chevall.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Glyceria fluitans (L.) R. Br. var. *stricta* Desv. = **Glyceria multiflora** Steud.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Glyceria fuegiana Speg. = **Puccinellia magellanica** (Hook. f.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Glyceria glaucescens (Phil.) Benth. = **Puccinellia glaucescens** (Phil.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Glyceria leptostachys Speg. = **Puccinellia biflora** (Steud.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Glyceria magellanica (Hook. f.) Benth. = **Puccinellia magellanica** (Hook. f.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Glyceria multiflora Steud.
Sin.: *Glyceria fluitans* (L.) R. Br. var. *stricta* Desv.
Referencias: Cantero, J. J., Núñez, C. O., Geymonat, M. & Chiacchiera, G., 1996; Longhi-Wagner, H. M., 1987; Nicora, E. G., 1978; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, NEU, RNE, SCR, SFE); BRA(RGS, SCA); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME); URY(MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*León, R. 717* (BLA)]; BRA[*Smith, L. B. 7791* (R)]; CHL[*Bertero 1240* (MO, P, US), *Rúgolo de Agrasar, Z. E. 1171* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 680* (BLA)].

[Glyceria notata Chevall.]
Sin.: *Glyceria fluitans* (L.) R. Br. var. *plicata* R.E. Fr., *Glyceria plicata* (R.E. Fr.) R.E. Fr.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Glyceria plicata (R.E. Fr.) R.E. Fr. = **Glyceria notata** Chevall.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Glyceria plicata (R.E. Fr.) R.E. Fr. var. scabriflora Hack.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Glyceria rigida (L.) Sm. = **Catapodium rigidum** (L.) Dony
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Glyceria saltensis Sulekic & Rúgolo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Sulekic, A. A. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 2900–3100 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sulekic, A. A. 1396* (SI)].

Glyceria tenuifolia (J. Presl) Steud. = **Puccinellia preslii** (Hack.) Ponert
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Glyceria tenuifolia Boiss. & Reut. = **Puccinellia festuciformis** (Host) Parl. subsp. **tenuifolia** (Boiss. & Reut.) W.E. Hughes
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Gouinia E. Fourn. ex Benth. & Hook. f.

Número de especies: 4

Gouinia brasiliensis (S. Moore) Swallen
Sin.: *Pogochloa brasiliensis* S. Moore
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Türpe, A. M., 1975b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Saravia Toledo, C. 74* (LIL)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar material de referencia (Peterson et al., 2001).

Gouinia latifolia (Griseb.) Vasey
Sin.: *Diplachne latifolia* (Griseb.) Hack., *Sieglingia latifolia* (Griseb.) Kuntze, *Tricuspis latifolia* Griseb.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Cantero, J. J., Núñez, C. O., Geymonat, M. & Chiacchiera, G., 1996; Parodi, L. R., 1927b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); PRY(CAN, CON, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 573* (SI), *Nicora, E. G. 1428* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 4475* (MO)].
Notas: Citada para Brasil sin indicar distribución ni material de referencia (Peterson et al., 2001).

Gouinia paraguayensis (Kuntze) Parodi
Sin.: *Arundinaria paraguayensis* Kuntze, *Sieglingia paraguayensis* Kuntze, *Triodia paraguayensis* (Kuntze) Hack.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Türpe, A. M., 1975b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 12889* (CTES, SI), *Stuckert, T. T. J. V. 17077* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5606* (FCQ, SI)].

Gouinia paraguayensis (Kuntze) Parodi var. *tortuosa* (Swallen) Türpe = **Gouinia tortuosa** Swallen

Gouinia tortuosa Swallen
Sin.: *Gouinia paraguayensis* (Kuntze) Parodi var. *tortuosa* (Swallen) Türpe
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, LRI, SAL, SDE, SJU); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Molina 1987* (BAB)]; PRY[*Mereles, F. 2647* (SI)].

Graminastrum macusaniense E.H.L. Krause = **Dissanthelium macusaniense** (E.H.L. Krause) R.C. Foster & L.B. Sm.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Guadua Kunth
Número de especies: 6

Guadua angustifolia Kunth
Sin.: *Bambusa guadua* Humb. & Bonpl., *Bambusa tagoara* auct. non Nees, *Nastus guadua* (Humb. & Bonpl.) Spreng.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR, SCA); PRY(CAA, SPE); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 5543* (BAA)]; BRA[*Reitz, P. R. 3772a* (HBR, US)]; PRY[*Rojas, T. 2311* (MO)]; URY[*Brussa, C. s.n.* (MVFA)].

Guadua angustifolia Kunth subsp. *chacoensis* (Rojas Acosta) Young & Judd = **Guadua chacoensis** (Rojas Acosta) Londoño & P.M. Peterson
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Guadua chacoensis (Rojas Acosta) Londoño & P.M. Peterson
Sin.: *Bambusa chacoensis* Rojas Acosta, *Guadua angustifolia* Kunth subsp. *chacoensis* (Rojas Acosta) Young & Judd
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Londoño, X. & Peterson, P. M., 1992; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, TUC); BRA(PAR); PRY(CAA, CEN, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14526* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 20546* (MBM)]; PRY[*Morrone, O. 317* (MO, SI)].

Guadua distorta (Nees) Rupr. = **Guadua tagoara** (Nees) Kunth
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Guadua glaziovii (Hack.) E.G. Camus = **Guadua tagoara** (Nees) Kunth
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Guadua paniculata Munro
Sin.: *Bambusa munroi* Hack., *Bambusa paniculata* (Munro) Hack.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Parodi, L. R., 1936b.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Molfino, J. F. s.n.* (BAA)].

Guadua paraguayana Döll
Sin.: *Bambusa paraguayana* (Döll) Bertoni
Referencias: Burkart, A., 1969a; Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Parodi, L. R., 1936b.

Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); PRY(CEN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26828* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 133* (K, LE, US)].
Notas: Citada para Brasil sin indicar distribución ni material de referencia (Judziewicz et al., 2001).

Guadua ribbentropii Herter = **Guadua trinii** (Nees) Nees ex Rupr.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Guadua riograndensis (Dutra) Herter = **Guadua trinii** (Nees) Nees ex Rupr.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Guadua spinosissima (Hack.) E.G. Camus = **Guadua tagoara** (Nees) Kunth
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Guadua tagoara (Nees) Kunth
Sin.: *Arundarbor distorta* (Nees) Kuntze, *Bambusa barbata* Trin., *Bambusa distorta* Nees, *Bambusa glaziovii* Hack., *Bambusa spinosissima* Hack., *Bambusa tagoara* Nees, *Guadua distorta* (Nees) Rupr., *Guadua glaziovii* (Hack.) E.G. Camus, *Guadua spinosissima* (Hack.) E.G. Camus
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 200–400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2283* (HBR, US)].

Guadua tomentosa Hack. & Lindm. = **Guadua trinii** (Nees) Nees ex Rupr.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Guadua trinii (Nees) Nees ex Rupr.
Sin.: *Arundarbor trinii* (Nees) Kuntze, *Bambusa riograndensis* Dutra, *Bambusa tacuara* Arechav., *Bambusa trinii* Nees, *Chusquea heterophylla* Griseb., hom. illeg., *Guadua ribbentropii* Herter, *Guadua riograndensis* (Dutra) Herter, *Guadua tomentosa* Hack. & Lindm., *Guadua trinii* (Nees) Nees ex Rupr. var. *scabra* Döll
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(RIV, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2179* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 9289* (HBR, R, RB, US)]; URY[*Pintos s.n.* (MVM)].

Guadua trinii (Nees) Nees ex Rupr. var. *scabra* Döll = **Guadua trinii** (Nees) Nees ex Rupr.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Gymnachne Parodi

Número de especies: 1 endémica

Gymnachne jaffuelii Parodi = **Gymnachne koelerioides** (Trin.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Gymnachne koelerioides (Trin.) Parodi
Sin.: *Gymnachne jaffuelii* Parodi, *Poa koelerioides* Trin., *Poa philippii* Steud., *Poa tenuiculmis* Steud., *Rhombolytrum berteroanum* E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: CHL(V, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jaffuel, F. 1884a* (US)].

Gymnopogon P. Beauv.

Número de especies: 6, 2 endémicas

Gymnopogon beyrichianus (Kunth) Parodi = **Chloris pycnothrix** Trin.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Gymnopogon beyrichianus auct. non Parodi = **Chloris halophila** Parodi var. **halophila**

Gymnopogon biflorus Pilg. = **Gymnopogon spicatus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1990.

Gymnopogon biflorus Pilg. var. *ciliatilemma* Burkart = **Gymnopogon legrandii** Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1990.

Gymnopogon brevisetus (Hack.) J.P. Sm. = **Gymnopogon grandiflorus** Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1990.

Gymnopogon burchellii (Munro ex Döll) Ekman
Sin.: *Gymnopogon muticus* Hack., nom. nud., *Leptochloa burchelii* Munro ex Döll
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1990; Longhi-Wagner, H. M., 2001b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 11516* (CEN)]; BRA[*Valls, J. F. M. 9843* (CEN, ICN)].
Notas: Citada para Paraguay y Uruguay sin indicar material de referencia (Peterson et al., 2001).

Gymnopogon filiformis Griseb. = **Gymnopogon spicatus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1990.

Gymnopogon glaber Caro
Referencias: Caro, J. A., 1982b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(SAL, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Mercado, S. E. 2711* (SI)].

Gymnopogon grandiflorus Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Sin.: *Gymnopogon brevisetus* (Hack.) J.P. Sm., *Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze var. *brevisetus* Hack.
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1990; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, SFE); BRA(RGS, SCA); URY(FLA, MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 2332* (SP)]; BRA[*Valls, J. F. M. 10000* (CEN, ICN)]; URY[*Rosengurtt, B. 6347* (BLA, US)].

Gymnopogon haumanii Parodi = **Chloris pycnothrix** Trin.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Gymnopogon laevis Nees = **Gymnopogon spicatus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1990; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Gymnopogon laevis Nees var. *pluriflorus* Döll = **Gymnopogon spicatus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1990.

Gymnopogon legrandii Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Sin.: *Gymnopogon biflorus* Pilg. var. *ciliatilemma* Burkart, *Gymnopogon swallenii* J.P. Sm.
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1990; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS, SCA); URY(CAS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5747* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 10040* (CEN, ICN)]; URY[*Lema s.n.* (BLA, IAC, MVFA)].

Gymnopogon muticus Hack., nom. nud. = **Gymnopogon burchellii** (Munro ex Döll) Ekman
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Gymnopogon radiatus (L.) Parodi = **Chloris radiata** (L.) Sw.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Gymnopogon radiatus (L.) Parodi var. *beyrichiana* (Kunth) Parodi = **Chloris pycnothrix** Trin.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Gymnopogon spicatus (Spreng.) Kuntze
Sin.: *Gymnopogon biflorus* Pilg., *Gymnopogon filiformis* Griseb., *Gymnopogon laevis* Nees, *Gymnopogon laevis* Nees var. *pluriflorus* Döll, *Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze var. *pluriflorus* (Döll) Hack., nom. illeg., *Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze var. *pluriflorus* (Döll) Parodi, comb. superfl., *Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze var. *typicum* Parodi, nom. inval., *Polypogon spicatus* Spreng.
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1990; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA); URY(DUR, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 26* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 29210* (MBM)]; PRY[*Zuloaga, F. O. 7278* (SI)]; URY[*Schroeder s.n.* (RB)].

Gymnopogon spicatus (Spreng.) Kuntze var. *brevisetus* Hack. = **Gymnopogon grandiflorus** Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1990.

Gymnopogon spicatus (Spreng.) Kuntze var. *pluriflorus* (Döll) Hack., nom. illeg. = **Gymnopogon spicatus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1990.

Gymnopogon spicatus (Spreng.) Kuntze var. *pluriflorus* (Döll) Parodi, comb. superfl. = **Gymnopogon spicatus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Gymnopogon spicatus (Spreng.) Kuntze var. *typicum* Parodi, nom. inval. = **Gymnopogon spicatus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1990.

Gymnopogon swallenii J.P. Sm. = **Gymnopogon legrandii** Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1990.

Gymnopogon toldensis Sulekic & Rúgolo
Referencias: Sulekic, A. A. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 1600 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sulekic, A. A. 810* (SI)].

Gymnotrix chilensis E. Desv. = **Pennisetum chilense** (E. Desv.) B.D. Jacks. ex R.E. Fr.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Gymnotrix latifolia (Spreng.) Schult. = **Pennisetum latifolium** Spreng.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Gymnotrix nervosa Nees = **Pennisetum nervosum** (Nees) Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Gymnotrix rigida Griseb. = **Pennisetum rigidum** (Griseb.) Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Gymnotrix tristachya auct. non Kunth = **Pennisetum latifolium** Spreng.

Gymnotrix tristachya Kunth = **Pennisetum tristachyum** (Kunth) Spreng.

Gynerium P. Beauv.

Número de especies: 1

Gynerium argenteum Nees = **Cortaderia araucana** Stapf
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Gynerium argenteum Nees var. *parviflorum* E. Desv. = **Cortaderia araucana** Stapf
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Gynerium argenteum Nees var. *strictum* E. Desv. = **Cortaderia speciosa** (Nees & Meyen) Stapf
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Gynerium atacamense Phil. = **Cortaderia atacamensis** (Phil.) Pilg.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Gynerium jubatum Lemoine ex Carrière = **Cortaderia jubata** (Lemoine ex Carrière) Stapf
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Gynerium nanum Phil. = **Cortaderia pilosa** (d'Urv.) Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Gynerium pilosum (d'Urv.) Macloskie = **Cortaderia pilosa** (d'Urv.) Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Gynerium quila (Molina) Nees & Meyen = **Chusquea quila** Kunth
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Gynerium rudiusculum (Stapf) Kuntze ex Hack. = **Cortaderia rudiuscula** Stapf
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauv.
Sin.: *Arundo festucacea* Willd., *Arundo sagittata* (Aubl.) Pers., *Saccharum sagittatum* Aubl.
Referencias: Conert, H. J., 1961; Renvoize, S. A., 1988; Türpe, A. M., 1975a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CEN, COA, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7685* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 12011* (HBR, US)]; PRY[*Zardini, E. M. 55578* (FCQ, MO)].

Gynerium speciosum Nees & Meyen = **Cortaderia speciosa** (Nees & Meyen) Stapf
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Hackelochloa granularis (L.) Kuntze = **Mnesithea granularis** (L.) de Koning & Sosef
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Hainardia Greuter

Número de especies: 1 introducida

Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter
Sin.: *Lepturus cylindricus* (Willd.) Trin., *Monerma cylindrica* (Willd.) Coss. & Durieu, *Rottboellia cylindrica* Willd.
Referencias: Greuter, W. R. & Rechinger, K. H., 1967; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1987; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); CHL(V, VIII); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 7105* (SI)]; CHL[*Matthei, O. R. 170* (CONC)]; URY[*Herter, W. G. F. 335* (SI)].

Halochloa acerosa Griseb. = **Monanthochloe acerosa** (Griseb.) Speg.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Helictotrichon bulbosum (Hitchc.) Parodi = **Trisetum bulbosum** Hitchc.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Helictotrichon quadridentulum (Döll) Renvoize = **Amphibromus quadridentulus** (Döll) Swallen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Helictotrichon scabrivalvis (Trin.) Govaerts = **Amphibromus scabrivalvis** (Trin.) Swallen var. **scabrivalvis**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Helopus annulatus (Flüggé) Nees var. *montevidensis* Döll, nom. inval. = **Eriochloa montevidensis** Griseb.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Helopus gracilis E. Fourn. = **Eriochloa acuminata** (J. Presl) Kunth
Referencias: Parodi, L. R., 1965.

Helopus grandiflorus Trin. = **Eriochloa grandiflora** (Trin.) Benth.
Referencias: Arriaga, M. O., 1994; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Nicora, E. G., 1993.

Hemarthria R. Br.

Número de especies: 1 introducida

Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E. Hubb.
Sin.: *Manisuris altissima* (Poir.) Hitchc., *Rottboellia altissima* Poir., *Rottboellia compressa* L. f. *fasciculata* (Lam.) Hack.
Referencias: Burkart, A. & Toursarkissian, M., 1969; Cabrera, A. L., 1970a; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003; Van den Heuvel, E. & Veldkamp, J., 2000.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(CEN, PAI, PHA); URY(ART, CAS, COL, MON, PAY, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2349* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15788* (MBM)]; PRY[*Zardini, E. M. 37745* (AS, MO)]; URY[*García Zorrón, N. 406* (MVFA)].

Hemimunroa andina (Phil.) Parodi = **Munroa andina** Phil.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Hemimunroa andina (Phil.) Parodi var. *breviseta* (Hack.) Parodi = **Munroa andina** Phil.

Heteropogon Pers.

Número de especies: 2

Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.
Sin.: *Andropogon secundus* Willd. ex Griseb., nom. nud., *Holcus contortus* (L.) Kuntze ex Stuck.
Referencias: Parodi, L. R., 1961; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC); PRY(CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15356* (SI)]; PRY[*Arenas, P. 1517* (SI)].

Heteropogon leptocladus (Hack.) Parodi, hom. illeg. = **Agenium leptocladum** (Hack.) Clayton
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Heteropogon leptocladus (Hack.) Roberty = **Agenium leptocladum** (Hack.) Clayton
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Heteropogon leptocladus (Hack.) Roberty var. *pilosus* Parodi = **Agenium leptocladum** (Hack.) Clayton
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Heteropogon melanocarpus (Elliot) Benth.
Sin.: *Andropogon melanocarpus* Elliott
Referencias: Parodi, L. R., 1961; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 237* (SI)]; PRY[*Degen, R. 3234* (MO)].

Heteropogon villosus Nees = **Agenium villosum** (Nees) Pilg.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Hierochloe altissima Steud. = **Anthoxanthum altissimum** (Steud.) Veldkamp
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierochloe arenaria Steud. = **Anthoxanthum redolens** (Vahl) P. Royen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierochloe gunckelii Parodi = **Anthoxanthum gunckelii** (Parodi) Veldkamp
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierochloe juncifolia (Hack.) Parodi = **Anthoxanthum juncifolium** (Hack.) Veldkamp
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierochloe magellanica (Desr.) Hook. f. = **Anthoxanthum redolens** (Vahl) P. Royen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierochloe magellanica Hook. f., nom. nud. = **Anthoxanthum redolens** (Vahl) P. Royen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierochloe moorei De Paula = **Anthoxanthum redolens** (Vahl) P. Royen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierochloe pusilla Hack. ex Dusén = **Anthoxanthum pusillum** (Hack. ex Dusén) Veldkamp
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierochloe redolens (Vahl) Roem. & Schult. = **Anthoxanthum redolens** (Vahl) P. Royen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierochloe redolens (Vahl) Roem. & Schult. var. *magellanicum* (Hook. f.) Macloskie = **Anthoxanthum redolens** (Vahl) P. Royen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierochloe redolens (Vahl) Roem. & Schult. var. *major* Speg. = **Anthoxanthum redolens** (Vahl) P. Royen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierochloe redolens (Vahl) Roem. & Schult. var. *micrantha* Parodi = **Anthoxanthum redolens** (Vahl) P. Royen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierochloe redolens (Vahl) Roem. & Schult. var. *typica* Parodi, nom. inval. = **Anthoxanthum redolens** (Vahl) P. Royen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierochloe sorianoi De Paula = **Anthoxanthum redolens** (Vahl) P. Royen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierochloe spicata Parodi = **Anthoxanthum spicatum** (Parodi) Veldkamp
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierochloe utriculata (Ruiz & Pav.) Kunth = **Anthoxanthum utriculatum** (Ruiz & Pav.) Y. Schouten & Veldkamp
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierochloe utriculata (Ruiz & Pav.) Kunth var. *juncifolia* Hack. = **Anthoxanthum juncifolium** (Hack.) Veldkamp
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierochloe utriculata (Ruiz & Pav.) Kunth var. *minor* Desv. = **Anthoxanthum utriculatum** (Ruiz & Pav.) Y. Schouten & Veldkamp
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Holcus L., nom. cons.

Número de especies: 1 introducida

Holcus contortus (L.) Kuntze ex Stuck. = **Heteropogon contortus** (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Holcus halepensis L. = **Sorghum halepense** (L.) Pers.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Holcus lanatus L.
Sin.: *Avena lanata* (L.) Koeler, *Ginannia lanata* (L.) F.T. Hubb., *Ginannia pubescens* Bubani, *Holcus mollis* auct. non L.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Moore, D. M., 1983; Nicora, E. G., 1978; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IX); URY(MON, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bonarelli, G. 120* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 16130* (MBM)]; CHL[*Garaventa, A. 495* (CONC)]; URY[*Del Puerto, O. 668* (MVFA)].

Holcus mollis auct. non L. = **Holcus lanatus** L.

Holcus nutans (L.) Kuntze ex Stuck. = **Sorghastrum nutans** (L.) Nash
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Holcus nutans (L.) Kuntze ex Stuck. var. *avenaceus* Stuck. = **Sorghastrum nutans** (L.) Nash
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Holcus redolens Vahl = **Anthoxanthum redolens** (Vahl) P. Royen

Holcus saccharoides (Sw.) Stuck. = **Bothriochloa saccharoides** (Sw.) Rydb.
Referencias: Vega, A. S., 2000.

Holcus saccharoides (Sw.) Stuck. var. *barbinodis* (DC.) Stuck. = **Bothriochloa barbinodis** (Lag.) Herter
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Holcus saccharoides (Sw.) Stuck. var. *laguroides* (DC.) Stuck. = **Bothriochloa laguroides** (DC.) Herter subsp. **laguroides**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Holcus zizanioides (L.) Kuntze ex Stuck. = **Chrysopogon zizanioides** (L.) Roberty
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Homalocenchrus gouinii (E. Fourn.) Kuntze = **Leersia hexandra** Sw.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Homalocenchrus grandiflorus (Döll) Hitchc. = **Leersia ligularis** Trin. var. **grandiflora** (Döll) Pyrah
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Homalocenchrus hexandrus (Sw.) Kuntze = **Leersia hexandra** Sw.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Homalocenchrus virginicus (Willd.) Britton = **Leersia virginica** Willd.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Homolepis Chase

Número de especies: 2

Homolepis glutinosa (Sw.) Zuloaga & Soderstr.
Sin.: *Panicum glutinosum* Sw.
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 1994a; Zuloaga, F. O. & Soderstrom, T. R., 1985; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI); URY(TYT).

Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 2265* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 12477* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4793* (G)]; URY[*Rosengurtt, B. 4820* (MVFA)].

Homolepis villaricensis (Mez) Zuloaga & Soderstr.
Sin.: *Panicum villaricense* Mez
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 1994a; Zuloaga, F. O. & Soderstrom, T. R., 1985; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(APY, APA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 1996* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 12432* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4790* (G)].

Hordeum L.

Número de especies: 21, 12 endémicas, 4 introducidas

Hordeum ambiguum Döll = **Hordeum murinum** L. subsp. **leporinum** (Link) Arcang.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum andicola Griseb. = **Hordeum muticum** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum andinum Trin. = **Hordeum comosum** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum berteroanum E. Desv. var. *pumila* E. Desv. = **Hordeum marinum** Huds. subsp. **gussoneanum** (Parl.) Thell.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum bonariense Parodi & Nicora = **Hordeum flexuosum** Nees ex Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum brachyatherum Phil.
Sin.: *Critesion brachyatherum* (Phil.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV, V, VII, XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ortega, P. s.n.* (SGO, US)].

[Hordeum bulbosum L.]
Referencias: Grun, S., 1998.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Hordeum chilense Brongn., hom. illeg. = **Hordeum chilense** Roem. & Schult.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum chilense Roem. & Schult.
Sin.: *Critesion chilense* (Roem. & Schult.) A. Löve, *Hordeum chilense* Brongn. var. *pseudosecalinum* Hauman, *Hordeum chilense* Brongn., hom. illeg., *Hordeum cylindricum* Steud., *Hordeum depauperatum* Steud., *Hordeum pratense* Huds. var. *brongniarti* Macloskie, *Hordeum secalinum* Schreb. var. *chilense* (Brongn.) Desv.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Macaya, J. & Faúndez Y., L., 1996; Parodi, L. R. & Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–4200 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR); CHL(I, II, IV, V, VI, VIII, XII, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Crespo, S. 1697* (SI)]; CHL[*Faúndez, L. 05-029* (AGUCH)].

Hordeum chilense Brongn. f. *elongatum* Hauman = **Hordeum stenostachys** Godr.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum chilense Brongn. f. *longearistatum* Hauman = **Hordeum stenostachys** Godr.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum chilense Brongn. var. *compressum* (Griseb.) Hauman = **Hordeum stenostachys** Godr.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum chilense Roem. & Schult. var. *magellanicum* Parodi ex Nicora = **Hordeum patagonicum** (Hauman) Covas subsp. **magellanicum** (Parodi ex Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum chilense Brongn. var. *muticum* (J. Presl) Hauman = **Hordeum muticum** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum chilense Brongn. var. *pseudosecalinum* Hauman = **Hordeum chilense** Roem. & Schult.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum coeleste Viborg ex Kunth var. *trifurcatum* Schltdl. = **Hordeum vulgare** L. var. **trifurcatum** (Schltdl.) Alef.

[Hordeum coleophorum Phil.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Hordeum comosum J. Presl
Sin.: *Critesion comosum* (J. Presl) A. Löve, *Hordeum andinum* Trin., *Hordeum comosum* J. Presl var. *bifidum* Parodi & Nicora, *Hordeum comosum* J. Presl var. *flavescens* Desv., *Hordeum comosum* J. Presl var. *humilis* Desv., *Hordeum comosum* J. Presl var. *rigida* Desv., *Hordeum divergens* Nees & Meyen ex Steud., nom. nud., *Hordeum jubatum* L. f. *flavidum* Kuntze, *Hordeum jubatum* L. f. *versicolor* Kuntze, *Hordeum jubatum* L. var. *comosum* (J. Presl) Kuntze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Baden, C. & Bothmer, R., 1994; Moore, D. M., 1983; Parodi, L. R. & Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 254* (SI), *Otto, C. 11631* (BAA)]; CHL[*Guillou s.n.* (P)].

Hordeum comosum J. Presl var. *bifidum* Parodi & Nicora = **Hordeum comosum** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum comosum J. Presl var. *flavescens* Desv. = **Hordeum comosum** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum comosum J. Presl var. *humilis* Desv. = **Hordeum comosum** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum comosum J. Presl var. *pubiflorum* (Hook. f.) Thell. = **Hordeum pubiflorum** Hook. f. subsp. **pubiflorum**
Referencias: Baden, C. & Bothmer, R., 1994; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum comosum J. Presl var. *rigida* Desv. = **Hordeum comosum** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum compressum Griseb. = **Hordeum stenostachys** Godr.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum compressum Griseb. var. *superatum* Hack. = **Hordeum stenostachys** Godr.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Hordeum compressum Griseb. var. *tenuispicatum* Hack., nom. nud. = **Hordeum stenostachys** Godr.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum cordobense Bothmer, Jacobsen & Nicora
Sin.: *Critesion cordobense* (Bothmer, Jacobsen & Nicora) A. Löve
Referencias: Bothmer, R., Jacobsen, N. & Nicora, E. G., 1980; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, LPA, SFE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Scrivanti, R. 21* (CORD)].

Hordeum cylindricum Steud. = **Hordeum chilense** Roem. & Schult.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum depauperatum Steud. = **Hordeum chilense** Roem. & Schult.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum distichon L. = **Hordeum vulgare** L. var. **vulgare**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum divergens Nees & Meyen ex Steud., nom. nud. = **Hordeum comosum** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum erectifolium Bothmer, Jacobsen & M. Jørg.
Referencias: Bothmer, R., Jacobsen, N. & Jörgensen, R. B., 1985; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jacobsen, N. 3050* (BAA, BAB, C, K, SI)].

Hordeum euclaston Steud.
Sin.: *Critesion pusillum* (Nutt.) A. Löve subsp. *euclaston* (Steud.) A. Löve, *Hordeum euclaston* Steud. var. *puberulum* Parodi & Nicora, *Hordeum euclaston* Steud. var. *pubescens* Nevski, *Hordeum fragile* Godr., hom. illeg., *Hordeum pusillum* Nutt. subsp. *euclaston* (Steud.) Covas, *Hordeum pusillum* Nutt. var. *euclaston* (Steud.) Hauman, *Hordeum subfastigiatum* Döll
Referencias: Bothmer, R., Jacobsen, N., Baden, C., Jörgensen, R. B. & Linde-Laursen, J., 1991; Grun, S., 1998; Mujica Sallés, J., 1996; Parodi, L. R. & Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SCR, SFE, TUC); BRA(RGS); URY(MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Piccinini, B. 1221* (BAB)]; BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 879* (ICN)]; URY[*Mujica Sallés, J. 266* (MVFA)].

Hordeum euclaston Steud. var. *puberulum* Parodi & Nicora = **Hordeum euclaston** Steud.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum euclaston Steud. var. *pubescens* Nevski = **Hordeum euclaston** Steud.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Hordeum flexuosum Nees ex Steud.
Sin.: *Critesion flexuosum* (Steud.) A. Löve, *Hordeum bonariense* Parodi & Nicora, *Hordeum pusillum* Nutt. subsp. *flexuosum* (Nees ex Steud.) Covas
Referencias: Bothmer, R., Jacobsen, N., Baden, C., Jörgensen, R. B. & Linde-Laursen, J., 1991; Bothmer, R., Jacobsen, N., Jörgensen, R. B. & Nicora, E. G., 1982; Grun, S., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, SCR); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Piccinini, B. 1219* (BAB)]; URY[*Rosengurtt, B. 11692* (MVFA)].

Hordeum fragile Godr., hom. illeg. = **Hordeum euclaston** Steud.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Hordeum fuegianum Bothmer, N. Jacobsen & R.B. Jørg.
Referencias: Bothmer, R., Jacobsen, N. & Jörgensen, R. B., 1986; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grondona, E. M. 7371* (BAA)].
Notas: Citada para Chile sin mencionar ejemplar de referencia (Soreng et al., 2003).

Hordeum glaucum Steud. = **Hordeum murinum** L. subsp. **glaucum** (Steud.) Tzvelev
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum gussoneanum Parl. = **Hordeum marinum** Huds. subsp. **gussoneanum** (Parl.) Thell.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum halophilum Griseb. = **Hordeum pubiflorum** Hook. f. subsp. **halophilum** (Griseb.) Baden & Bothmer
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum halophilum Griseb. var. *breviaristatum* Parodi & Nicora = **Hordeum pubiflorum** Hook. f. subsp. **halophilum** (Griseb.) Baden & Bothmer
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum hexaploidum Covas = **Hordeum procerum** Nevski
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum incognitum Parodi & Nicora, nom. nud. = **Hordeum lechleri** (Steud.) Schenck

Hordeum jubatum L.
Sin.: *Hordeum jubatum* L. var. *pampeanum* Hauman, *Hordeum pampeanum* (Hauman) Herter
Referencias: Baden, C. & Bothmer, R., 1994; Parodi, L. R. & Nicora, E. G., 1978; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SFE, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. 1742* (BAA, SI)]; CHL[*Matthei, O. R. 596* (CONC)].

Hordeum jubatum L. f. *flavidum* Kuntze = **Hordeum comosum** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum jubatum L. f. *versicolor* Kuntze = **Hordeum comosum** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum jubatum L. f. *violaceum* Kuntze = **Hordeum lechleri** (Steud.) Schenck
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum jubatum L. f. *viride* Kuntze = **Hordeum pubiflorum** Hook. f. subsp. **halophilum** (Griseb.) Baden & Bothmer
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum jubatum L. var. *comosum* (J. Presl) Kuntze = **Hordeum comosum** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum jubatum L. var. *pampeanum* Hauman = **Hordeum jubatum** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum jubatum L. var. *pilosulum* Franch. = **Hordeum pubiflorum** Hook. f. subsp. **pubiflorum**
Referencias: Baden, C. & Bothmer, R., 1994; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum lechleri (Steud.) Schenck
Sin.: *Critesion lechleri* (Steud.) A. Löve, *Elymus lechleri* Steud., *Hordeum incognitum* Parodi & Nicora, nom. nud., *Hordeum jubatum* L. f. *violaceum* Kuntze, *Hordeum secalinum* Schreb. f. *intermedia* Hauman, p.p.
Referencias: Baden, C. & Bothmer, R., 1994; Parodi, L. R. & Nicora, E. G., 1978; Seberg, O. & Petersen, G., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hogberg, C. 70* (BAA)]; CHL[*Lechler, W. 1235* (BAA, G, K, NY, P, S, UPS, W)].

Hordeum leporinum Link = **Hordeum murinum** L. subsp. **leporinum** (Link) Arcang.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum marinum Huds. subsp. **gussoneanum** (Parl.) Thell.
Sin.: *Hordeum berteroanum* E. Desv. var. *pumila* E. Desv., *Hordeum gussoneanum* Parl., *Hordeum utriculatum* Bertero
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1600 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. 215* (P, US)].

Hordeum marinum Huds. subsp. **marinum**
Referencias: Bothmer, R. & Jacobsen, N., 1985; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–2200 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU); CHL(V, VII, VIII, IX, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11029* (BAA)]; CHL[*Gunckel, L. H. 43900* (CONC)].

Hordeum maritimum (Huds.) Stokes var. *patagonicum* Hauman = **Hordeum patagonicum** (Hauman) Covas subsp. **patagonicum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum murinum L. var. *chilensis* Brongn. = **Hordeum murinum** L. subsp. **leporinum** (Link) Arcang.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum murinum L. var. *leporinum* (Link) A. Rich. = **Hordeum murinum** L. subsp. **leporinum** (Link) Arcang.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum murinum L. var. *velutinum* Speg. = **Hordeum murinum** L. subsp. **leporinum** (Link) Arcang.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum murinum L. subsp. **glaucum** (Steud.) Tzvelev
Sin.: *Critesion glaucum* (Steud.) A. Löve, *Hordeum glaucum* Steud., *Hordeum stebbinsii* Covas
Referencias: Bothmer, R. & Jacobsen, N., 1985; Bothmer, R., Jacobsen, N., Baden, C., Jörgensen, R. B. & Linde-Laursen, J., 1991; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Anual. Introducida. 0–700 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 135* (CORD)].

Hordeum murinum L. subsp. *leporinum* (Link) Asch. & Graebn., comb. superfl. = **Hordeum murinum** L. subsp. **leporinum** (Link) Arcang.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum murinum L. subsp. **leporinum** (Link) Arcang.
Sin.: *Hordeum ambiguum* Döll, *Hordeum leporinum* Link, *Hordeum murinum* L. subsp. *leporinum* (Link) Asch. & Graebn., comb. superfl., *Hordeum murinum* L. var. *chilensis* Brongn., *Hordeum murinum* L. var. *leporinum* (Link) A. Rich., *Hordeum murinum* L. var. *velutinum* Speg.
Referencias: Bothmer, R. & Jacobsen, N., 1985; Grun, S., 1998; Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005; Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(V, VIII); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lanfranchi, A. E. 1* (SI)]; CHL[*Kunkel, G. W. H. 2052* (SI)]; URY[*Costa s.n.* (MVFA)].

Hordeum murinum L. subsp. **murinum**
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Parodi, L. R. & Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–2300 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Piccinini, B. 1620* (BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996112* (CONC)].

Hordeum mustersii Nicora = **Hordeum patagonicum** (Hauman) Covas subsp. **mustersii** (Nicora) Bothmer, Giles & Jacobsen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum muticum J. Presl
Sin.: *Hordeum andicola* Griseb., *Hordeum chilense* Brongn. var. *muticum* (J. Presl) Hauman, *Hordeum muticum* J. Presl var. *andicola* (Griseb.) Thell., *Hordeum secalinum* Schreb. var. *andicola* (Griseb.) Hauman, *Hordeum secalinum* Schreb. var. *parviflorum* Hack.
Referencias: Bothmer, R., Jacobsen, N. & Nicora, E. G., 1980; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Negritto, M. A. 362* (CORD)]; CHL[*Marticorena, A. 83520* (CONC)].

[Hordeum muticum J. Presl f. pusilla Hack. ex Dusén]
Notas: Nombre dudoso.

Hordeum muticum J. Presl var. *andicola* (Griseb.) Thell. = **Hordeum muticum** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum muticum J. Presl var. *compressum* (Griseb.) Thell. = **Hordeum stenostachys** Godr.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum muticum J. Presl var. *superatum* (Hack.) Thell. = **Hordeum stenostachys** Godr.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum pampeanum (Hauman) Herter = **Hordeum jubatum** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum parodii Covas
Sin.: *Critesion parodii* (Covas) A. Löve, *Hordeum parodii* Covas var. *araucanum* Parodi & Nicora
Referencias: Bothmer, R., Jacobsen, N. & Jörgensen, R. B., 1986; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2227* (CORD, SI), *Piccinini, B. 1435* (BAB)].

Hordeum parodii Covas var. *araucanum* Parodi & Nicora = **Hordeum parodii** Covas
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum patagonicum (Hauman) Covas subsp. **magellanicum** (Parodi ex Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen
Sin.: *Critesion magellanicum* (Parodi & Nicora) A. Löve, *Hordeum chilense* Roem. & Schult. var. *magellanicum* Parodi ex Nicora
Referencias: Bothmer, R., Giles, B. E. & Jacobsen, N., 1988; Bothmer, R., Jacobsen, N., Baden, C., Jörgensen, R. B. & Linde-Laursen, J., 1991; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*James, P. 456* (SI)]; CHL[*Boelcke, O. 7458* (BAA)].

Hordeum patagonicum (Hauman) Covas subsp. **mustersii** (Nicora) Bothmer, Giles & Jacobsen
Sin.: *Critesion mustersii* (Nicora) A. Löve, *Hordeum mustersii* Nicora
Referencias: Bothmer, R., Giles, B. E. & Jacobsen, N., 1988; Bothmer, R., Jacobsen, N., Baden, C., Jörgensen, R. B. & Linde-Laursen, J., 1991.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Méndez, E. 1048* (BAA)].

Hordeum patagonicum (Hauman) Covas subsp. **patagonicum**
Sin.: *Hordeum maritimum* (Huds.) Stokes var. *patagonicum* Hauman
Referencias: Bothmer, R., Giles, B. E. & Jacobsen, N., 1988; Parodi, L. R. & Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: ARG(CHU, MEN, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lutz, A. 405* (CTES)].

Hordeum patagonicum (Hauman) Covas subsp. **santacrucense** (Parodi ex Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen
Sin.: *Critesion santacrucense* (Parodi ex Nicora) A. Löve, *Hordeum santacrucense* Parodi ex Nicora
Referencias: Bothmer, R., Giles, B. E. & Jacobsen, N., 1988; Bothmer, R., Jacobsen, N., Baden, C., Jörgensen, R. B. & Linde-Laursen, J., 1991; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 3257* (BAB)]; CHL[*Domínguez, E. 164* (CONC)].

Hordeum patagonicum (Hauman) Covas subsp. **setifolium** (Parodi ex Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen
Sin.: *Critesion setifolium* (Parodi ex Nicora) A. Löve, *Hordeum setifolium* Parodi ex Nicora
Referencias: Bothmer, R., Giles, B. E. & Jacobsen, N., 1988; Bothmer, R., Jacobsen, N., Baden, C., Jörgensen, R. B. & Linde-Laursen, J., 1991.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 4808* (BAA)].

Hordeum pratense Huds. = **Hordeum secalinum** Schreb.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum pratense Huds. var. *brongniarti* Macloskie = **Hordeum chilense** Roem. & Schult.

Hordeum procerum Nevski
Sin.: *Critesion procerum* (Nevski) A. Löve, *Hordeum hexaploidum* Covas
Referencias: Baden, C. & Bothmer, R., 1994; Bothmer, R. & Jacobsen, N., 1985; Bothmer, R., Jacobsen, N., Baden, C., Jörgensen, R. B. & Linde-Laursen, J., 1991; Parodi, L. R. & Nicora, E. G., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SLU, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 12386* (BAA, K, SI)].
Notas: Citada para Chile y Uruguay (Soreng et al., 2003) y Uruguay (Baden & Bothmer, 1994) sin indicar localidad o material de referencia.

Hordeum pubiflorum Hook. f. var. *intermedia* (Hauman) Melderis, p.p. = **Hordeum pubiflorum** Hook. f. subsp. **halophilum** (Griseb.) Baden & Bothmer
Referencias: Baden, C. & Bothmer, R., 1994; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum pubiflorum Hook. f. subsp. **halophilum** (Griseb.) Baden & Bothmer
Sin.: *Critesion pubiflorum* (Hook. f.) A. Löve subsp. *halophilum* (Griseb.) A. Löve, *Hordeum halophilum* Griseb., *Hordeum halophilum* Griseb. var. *breviaristatum* Parodi & Nicora, *Hordeum jubatum* L. f. *viride* Kuntze, *Hordeum pubiflorum* Hook. f. var. *intermedia* (Hauman) Melderis, p.p.
Referencias: Baden, C. & Bothmer, R., 1994; Bothmer, R., Jacobsen, N., Baden, C., Jörgensen, R. B. & Linde-Laursen, J., 1991; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC); CHL(II, III, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 441* (BAA, GOET, K, US)]; CHL[*Kuntze, C. E. O. s.n.* (NY)].

Hordeum pubiflorum Hook. f. subsp. **pubiflorum**
Sin.: *Critesion pubiflorum* (Hook. f.) A. Löve, *Hordeum comosum* J. Presl var. *pubiflorum* (Hook. f.) Thell., *Hordeum jubatum* L. var. *pilosulum* Franch., *Hordeum secalinum* Schreb. var. *pubiflorum* (Hook. f.) Hauman
Referencias: Baden, C. & Bothmer, R., 1994; Bothmer, R. & Jacobsen, N., 1985; Bothmer, R., Jacobsen, N., Baden, C., Jörgensen, R. B. & Linde-Laursen, J., 1991; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3500 m.
Países: ARG(NEU, SCR, TDF); CHL(VIII, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Platen, L. 79* (MO)]; CHL[*King, G. s.n.* (BAA, K, US)].

Hordeum pusillum Nutt.
Sin.: *Critesion pusillum* (Nutt.) A. Löve, *Hordeum pusillum* Nutt. var. *typicum* Hauman, nom. inval.

Referencias: Bothmer, R. & Jacobsen, N., 1985; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 13152* (BAA)].

Hordeum pusillum Nutt. var. *euclaston* (Steud.) Hauman = **Hordeum euclaston** Steud.

Hordeum pusillum Nutt. var. *typicum* Hauman, nom. inval. = **Hordeum pusillum** Nutt.

Hordeum pusillum Nutt. subsp. *euclaston* (Steud.) Covas = **Hordeum euclaston** Steud.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Hordeum pusillum Nutt. subsp. *flexuosum* (Nees ex Steud.) Covas = **Hordeum flexuosum** Nees ex Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum santacrucense Parodi ex Nicora = **Hordeum patagonicum** (Hauman) Covas subsp. **santacrucense** (Parodi ex Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Hordeum secalinum Schreb.]
Sin.: *Hordeum pratense* Huds.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Hordeum secalinum Schreb. f. *intermedia* Hauman, p.p. = **Hordeum lechleri** (Steud.) Schenck
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Hordeum secalinum Schreb. f. pusillum Hack.]
Notas: Nombre dudoso.

Hordeum secalinum Schreb. f. *scabriusculum* Kuntze = **Hordeum stenostachys** Godr.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum secalinum Schreb. var. *andicola* (Griseb.) Hauman = **Hordeum muticum** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum secalinum Schreb. var. *chilense* (Brongn.) Desv. = **Hordeum chilense** Roem. & Schult.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum secalinum Schreb. var. *parviflorum* Hack. = **Hordeum muticum** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum secalinum Schreb. var. *puberulum* Kuntze = **Hordeum stenostachys** Godr.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum secalinum Schreb. var. *pubiflorum* (Hook. f.) Hauman = **Hordeum pubiflorum** Hook. f. subsp. **pubiflorum**
Referencias: Baden, C. & Bothmer, R., 1994; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum setifolium Parodi ex Nicora = **Hordeum patagonicum** (Hauman) Covas subsp. **setifolium** (Parodi ex Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum stebbinsii Covas = **Hordeum murinum** L. subsp. **glaucum** (Steud.) Tzvelev
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum stenostachys Godr.
Sin.: *Hordeum chilense* Brongn. f. *elongatum* Hauman, *Hordeum chilense* Brongn. f. *longearistatum* Hauman, *Hordeum chilense* Brongn. var. *compressum* (Griseb.) Hauman, *Hordeum compressum* Griseb., *Hordeum compressum* Griseb. var. *superatum* Hack., *Hordeum compressum* Griseb. var. *tenuispicatum* Hack., nom. nud., *Hordeum muticum* J. Presl var. *compressum* (Griseb.) Thell., *Hordeum muticum* J. Presl var. *superatum* (Hack.) Thell., *Hordeum secalinum* Schreb. f. *scabriusculum* Kuntze, *Hordeum secalinum* Schreb. var. *puberulum* Kuntze, *Hordeum stenostachys* Godr. var. *superatum* (Hack.) Stuck., nom. illeg., *Hordeum stenostachys* Godr. var. *tenuispicatum* (Hack. & Stuck.) Stuck., nom. illeg.
Referencias: Bothmer, R., Jacobsen, N. & Nicora, E. G., 1980; Grun, S., 1998; Parodi, L. R. & Nicora, E. G., 1978; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); URY(FLA, LAV).

Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1786* (SI)]; BRA[*Lourteig, A. 2218* (HBR, P, US)]; URY[*Lombardo, A. 1162* (MVJB)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar material de referencia (Soreng et al., 2003).

Hordeum stenostachys Godr. var. *superatum* (Hack.) Stuck., nom. illeg. = **Hordeum stenostachys** Godr.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum stenostachys Godr. var. *tenuispicatum* (Hack. & Stuck.) Stuck., nom. illeg. = **Hordeum stenostachys** Godr.

Hordeum subfastigiatum Döll = **Hordeum euclaston** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum tetraploideum Covas
Sin.: *Critesion tetraploideum* (Covas) A. Löve
Referencias: Bothmer, R. & Jacobsen, N., 1985; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 4485* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Teillier A., S. 4328* (CONC)].

Hordeum utriculatum Bertero = **Hordeum marinum** Huds. subsp. **gussoneanum** (Parl.) Thell.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum valdiviae (Steud.) Schenck, nom. illeg. = **Elymus angulatus** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hordeum vulgare L. var. **trifurcatum** (Schltdl.) Alef.
Sin.: *Hordeum coeleste* Viborg ex Kunth var. *trifurcatum* Schltdl.
Referencias: Burkart, A., 1945.
Hierba. Anual. Introducida. 4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11701* (SI)].

Hordeum vulgare L. var. **vulgare**
Sin.: *Hordeum distichon* L., *Hordeum vulgare* L. subsp. *distichum* (L.) Thell.
Referencias: Grun, S., 1998; Parodi, L. R. & Nicora, E. G., 1978; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SLU); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(III, VIII, IX, RME); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6612* (BAA)]; BRA[*Camargo, O. s.n.* (BLA)]; CHL[*Gunckel, L. H. 47628* (CONC)]; URY[*Lema 7455* (MVFA)].

Hordeum vulgare L. subsp. *distichum* (L.) Thell. = **Hordeum vulgare** L. var. **vulgare**

Hymenachne P. Beauv.

Número de especies: 4

Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees
Sin.: *Agrostis monostachya* Poir., *Panicum amplexicaule* Rudge
Referencias: Burkart, A., 1969a; Cabrera, A. L., 1970a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994e; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2107* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 14350* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4709* (G)]; URY[*Deloche s.n.* (US)].

Hymenachne campestris Nees = **Sacciolepis vilvoides** (Trin.) Chase
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Hymenachne donacifolia (Raddi) Chase
Sin.: *Panicum donacifolium* Raddi
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994e; Parodi, L. R., 1969; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS, SAL); BRA(RGS, SCA); PRY(CAN, CEN, GUA, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 2006* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 8252* (HBR)]; PRY[*Woolston, A. L. 63* (BAA, SI)].

Hymenachne grumosa (Nees) Zuloaga
Sin.: *Panicum grumosum* Nees, *Panicum knuthii* Herter, *Panicum pycnanthum* Steud., *Panicum rivulare* Trin. var. *grumosum* (Nees) Hack., *Panicum schroederi* Herter
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; Cabrera, A. L., 1970a; Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Palacios, R. A., 1969; Zuloaga, F. O., 1989, 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA); URY(CAS, COL, RNO, ROC, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 484* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 57243* (PACA)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 421* (F, G)]; URY[*Rosengurtt, B. 6470* (BAA)].

Hymenachne montana Griseb. = **Pennisetum montanum** (Griseb.) Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Hymenachne pernambucense (Spreng.) Zuloaga
Sin.: *Agrostis pernambucensis* Spreng., *Panicum excelsum* Nees, *Panicum pernambucense* (Spreng.) Mez ex Pilg., *Panicum rivulare* Trin., *Panicum urticans* L.B. Sm. & Wassh.
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991; Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., 1989, 1994; Zuloaga, F. O., Ellis, R. P. & Morrone, O., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3251* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 9496* (MBM)]; PRY[*Rojas, T. 2326* (SI)].

Hyparrhenia Andersson ex E. Fourn.

Número de especies: 2, 1 introducida

Hyparrhenia bracteata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Stapf
Sin.: *Andropogon bracteatus* Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13981* (MBM)].

Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf
Sin.: *Trachypogon rufus* Nees
Referencias: Parodi, L. R., 1959; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CEN, CON, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 15287* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 1548* (ICN, US)]; PRY[*Morrone, O. 421* (MO)].

Hypogynium virgatum (Desv. ex Ham.) Dandy = **Andropogon virgatus** Desv. ex Ham.
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.

Ichnanthus P. Beauv.

Número de especies: 10

Ichnanthus bambusiflorus (Trin.) Döll
Sin.: *Panicum bambusiflorum* Trin.
Referencias: Stieber, M. T., 1987.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 322a* (MO)].

Ichnanthus exilis K.E. Rogers = **Ichnanthus ruprechtii** Döll
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Ichnanthus fastigiatus Brongn. = **Ichnanthus leiocarpus** (Spreng.) Kunth
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Ichnanthus inconstans (Trin. ex Nees) Döll
Sin.: *Ichnanthus pubescens* Swallen, *Ichnanthus reclinatus* Swallen, *Ichnanthus subinclusus* Swallen, *Panicum inconstans* Trin. ex Nees
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994f; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., 1981a.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, COA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6485* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 14236* (MBM)]; PRY[*Rojas, T. 3698* (BAA), *Zuloaga, F. O. 7303* (SI)].

Ichnanthus leiocarpus (Spreng.) Kunth
Sin.: *Ichnanthus fastigiatus* Brongn., *Panicum leiocarpon* Spreng.
Referencias: Boechat, S. C., 2005; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 9506* (HBR)].

Ichnanthus lilloi Hack. = **Echinolaena minarum** (Nees) Pilg.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Ichnanthus minarum (Nees) Döll = **Echinolaena minarum** (Nees) Pilg.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Ichnanthus nemoralis (Schrad.) Hitchc. & Chase
Sin.: *Panicum nemorale* Schrad.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Stieber, M. T., 1982; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16320* (MBM)].

Ichnanthus nemorosus (Sw.) Döll
Sin.: *Echinolaena nemorosa* (Sw.) Kunth, *Ichnanthus venturii* K.E. Rogers, *Panicum nemorosum* Sw.
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994f; Zuloaga, F. O., 1981a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7833* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 8049* (BAA)].

Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth. var. **majus** (Nees) Stieber
Sin.: *Ichnanthus swallenii* K.E. Rogers, *Panicum pallens* Sw. var. *majus* Nees
Referencias: Stieber, M. T., 1987; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 148* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 17977* (BR, F, MO), *Rambo, B. 29037* (US)].

Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth. var. **pallens**
Sin.: *Ichnanthus parodii* K.E. Rogers, *Panicum hemignostum* Steud., *Panicum pallens* Sw.
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994f; Renvoize, S. A., 1988; Stieber, M. T., 1987; Zuloaga, F. O., 1981a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 664* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 12476* (MBM)]; PRY[*Balansa, B. 4372* (G)]; URY(*Rosengurtt, B. 7942* (MVFA)].

Ichnanthus parodii K.E. Rogers = **Ichnanthus pallens** (Sw.) Munro ex Benth. var. **pallens**
Referencias: Zuloaga, F. O., 1981a.

Ichnanthus parodii K.E. Rogers var. *villosissimus* K.E. Rogers = **Ichnanthus tenuis** (J. Presl) Hitchc. & Chase
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Ichnanthus procurrens (Nees ex Trin.) Stieber var. **procurrens**
Sin.: *Echinolaena procurrens* (Nees ex Trin.) Kunth, *Panicum procurrens* Nees ex Trin.
Referencias: Killeen, T. J. & Kirpes, C. C., 1991; Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994f; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CON, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 886* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 12090* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4605* (G)].

Ichnanthus procurrens (Nees ex Trin.) Stieber var. **subaequiglume** (Hack.) Killeen & Kirpes
Sin.: *Panicum procurrens* Nees ex Trin. var. *subaequiglume* Hack.
Referencias: Killeen, T. J. & Kirpes, C. C., 1991; Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994f; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CEN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3221* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 16577a* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 961* (G)].

Ichnanthus pubescens Swallen = **Ichnanthus inconstans** (Trin. ex Nees) Döll
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Ichnanthus ramosissimus K.E. Rogers = **Ichnanthus ruprechtii** Döll
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Ichnanthus reclinatus Swallen = **Ichnanthus inconstans** (Trin. ex Nees) Döll
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Ichnanthus ruprechtii Döll
Sin.: *Ichnanthus exilis* K.E. Rogers, *Ichnanthus ramosissimus* K.E. Rogers
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen. D. C. & Klein, R. M., 1982a; Stieber, M. T., 1987; Zuloaga, F. O., 1981a.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–2100 m.
Países: ARG(JUJ, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5099* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 16145* (MBM)].

Ichnanthus subinclusus Swallen = **Ichnanthus inconstans** (Trin. ex Nees) Döll
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Ichnanthus swallenii K.E. Rogers = **Ichnanthus pallens** (Sw.) Munro ex Benth. var. **majus** (Nees) Stieber
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Ichnanthus tarijianus K.E. Rogers
Referencias: Zuloaga, F. O., 1981a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 11268* (LIL)].

Ichnanthus tenuis (J. Presl) Hitchc. & Chase
Sin.: *Ichnanthus parodii* K.E. Rogers var. *villosissimus* K.E. Rogers, *Oplismenus tenuis* J. Presl
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994f; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Stieber, M. T., 1987; Zuloaga, F. O., 1981a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CAN, CON, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 15344* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 16118* (MBM)]; PRY[*Montes, J. E. 3319* (BAA, SI)].

Ichnanthus venturii K.E. Rogers = **Ichnanthus nemorosus** (Sw.) Döll
Referencias: Zuloaga, F. O., 1981a.

Imperata Cirillo

Número de especies: 6, 1 endémica

Imperata arundinacea (L.) Cyr. var. *condensata* (Steud.) Hack. = **Imperata condensata** Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Imperata arundinacea (L.) Cyr. var. *condensata* (Steud.) Macloskie, comb. superfl. = **Imperata condensata** Steud.

Imperata brasiliensis Trin.
Referencias: Burkart, A. & Toursarkissian, M., 1969; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, SCA); PRY(COA); URY(SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 624* (SI), *Porta, R. E. 207* (BAA)]; BRA[*Hatschbach, G. 28290* (MBM)]; PRY[*Burkart, A. 18597* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 1305* (SI)].

Imperata caudata (G. Mey.) Trin. = **Imperata contracta** (Kunth) Hitchc.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Imperata condensata Steud.
Sin.: *Imperata arundinacea* (L.) Cyr. var. *condensata* (Steud.) Hack., *Imperata arundinacea* (L.) Cyr. var. *condensata* (Steud.) Macloskie, comb. superfl., *Imperata cylindrica* (L.) P. Beauv. var. *condensata* (Steud.) Hack.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Nicora, E. G., 1978; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2200 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, SJU); CHL(III, IV, V, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 2550* (SI)]; CHL[*Boelcke, O. 2951* (SI), *Lechler, W. 831* (P, US)].

Imperata contracta (Kunth) Hitchc.
Sin.: *Imperata caudata* (G. Mey.) Trin., *Imperata exaltata* (Roxb.) Brongn. var. *caudata* (G. Mey.) Hack., *Saccharum contractum* Kunth
Referencias: Killeen, T. J., 1990; Parodi, L. R., 1964; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, TUC); BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rojas, T. 11847* (BAA)]; BRA[*Jönsson, G. 53a* (SI), *Reitz, P. R. 8797* (HBR, US)]; PRY[*Rosengurtt, B. 5925b* (SI)].

Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. var. *condensata* (Steud.) Hack. = **Imperata condensata** Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Imperata exaltata (Roxb.) Brongn. var. *caudata* (G. Mey.) Hack. = **Imperata contracta** (Kunth) Hitchc.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Imperata minutiflora Hack.
Referencias: Türpe, A. M., 1975a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dinelli, E. 714* (SI), *Zuloaga, F. O. 6339* (SI)].

Imperata parodii Acevedo
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Reiche, C. F. s.n.* (SGO)].

Imperata tenuis Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zuloaga, F. O. 7297* (SI)].

Ipnum mendocinum Phil. = **Leptochloa dubia** (Kunth) Nees
Referencias: Renvoize, S. A., 1998.

Isachne hackelii Lindm. = **Poidium poimorphum** (J. Presl) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Ischaemum L.

Número de especies: 1

Ischaemum minus J. Presl
Sin.: *Ischaemum urvilleanum* Kunth, *Paspalum axicilium* Steud.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1987; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(MAL, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Toursarkissian, M. s.n.* (BA, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15191* (MBM)]; URY[*Mujica Sallés, J. 290* (MVFA)].

Ischaemum secundatum Walter = **Stenotaphrum secundatum** (Walter) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Ischaemum urvilleanum Kunth = **Ischaemum minus** J. Presl
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988.

Jarava Ruiz & Pav.

Número de especies: 52, 39 endémicas

Jarava academica (Hicken) Peñailillo
Sin.: *Stipa academica* Hicken, *Stipa brachychaeta* Godr. var. *minor* Speg., nom. nud., *Stipa cordobensis* Mez, hom. illeg.
Referencias: Hicken, C. M., 1924c; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. s.n.* (CORD)].

Jarava ambigua (Speg.) Peñailillo = **Amelichloa ambigua** (Speg.) Arriaga & Barkworth

Jarava ameghinoi (Speg.) Peñailillo var. **ameghinoi**
Sin.: *Stipa ameghinoi* Speg.
Referencias: Chiapella, J. & Ezcurra, C., 1999; Parodi, L. R., 1960; Peñailillo, P. B., 2002; Roig, F. A., 1978a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lutz, A. 407* (CTES)].

Jarava ameghinoi (Speg.) Peñailillo var. **digona** (Parodi) Peñailillo
Sin.: *Stipa ameghinoi* Speg. var. *digona* Parodi
Referencias: Parodi, L. R., 1960; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12121* (BAA)].

Jarava ameghinoi (Speg.) Peñailillo var. **precordillerana** (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa ameghinoi* Speg. var. *precordillerana* F.A. Roig
Referencias: Roig, F. A., 1965; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3100 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. A. 5284* (BAA)].

Jarava annua (Mez) Peñailillo
Sin.: *Stipa annua* Mez
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–3700 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 814* (SI)].

Jarava arenicola (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa arenicola* F.A. Roig
Referencias: Roig, F. A., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. A. 14624* (LP, SI)].

Jarava atacamensis (Parodi) Peñailillo
Sin.: *Stipa atacamensis* Parodi
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997b.
Hierba. Perenne. Endémica. 3300–4300 m.
Países: ARG(CAT); CHL(II, III, IV, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 3221* (LIL)]; CHL[*Krapovickas, A. 5789* (BAA)].

Jarava barrancaensis (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Nassella barrancaensis* (F.A. Roig) Barkworth, *Stipa barrrancaensis* F.A. Roig
Referencias: Barkworth, M. E., 1990; Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 21547* (MERL)].

Jarava bertrandii (Phil.) Peñailillo = **Amelichloa caudata** (Trin.) Arriaga & Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Jarava brachychaeta (Godr.) Peñailillo = **Amelichloa brachychaeta** (Godr.) Arriaga & Barkworth

Jarava braun-blanqueti (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa braun-blanquetii* F.A. Roig
Referencias: Roig, F. A., 1975; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 27150* (LP, MERL)].

Jarava brevipes (E. Desv.) Peñailillo = **Amelichloa brevipes** (E. Desv.) Arriaga & Barkworth

Jarava breviseta (Caro & E.A. Sánchez) Peñailillo
Sin.: *Stipa breviseta* Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997b.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hueck, J. 200* (LIL)].

Jarava castellanosii (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa castellanosii* F.A. Roig
Referencias: Roig, F. A., 1965; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1900–3900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 469* (SI), *Roig, F. A. 5296* (LP)].

Jarava caudata (Trin.) Peñailillo = **Amelichloa caudata** (Trin.) Arriaga & Barkworth

Jarava chrysophylla (E. Desv.) Peñailillo f. **minuta** (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa chrysophylla* E. Desv. f. *minuta* F.A. Roig
Referencias: Roig, F. A., 1964; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*T.B.P.A. 580* (BAB)].

Jarava chrysophylla (E. Desv.) Peñailillo f. **modica** (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa chrysophylla* E. Desv. f. *modica* F.A. Roig
Referencias: Roig, F. A., 1964; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 23249* (MERL)].

Jarava chrysophylla (E. Desv.) Peñailillo var. **chrysophylla**
Sin.: *Stipa chrysophylla* E. Desv., *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *major* E. Desv., *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *minor* Desv., *Stipa humilis* Cav. f. *chrysophylla* (Desv.) Kuntze, *Stipa kurtzii* Mez, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. subsp. *chrysophylla* (E. Desv.) Dusén, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *andina* Hauman, nom. nud., *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *gymnostachya* Hauman
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Parodi, L. R., 1960; Peñailillo, P. B., 2002; Roig, F. A., 1978a; Torres, M. A., 1997b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pujalte, J. C. 223* (SI)]; CHL[*Zöllner, O. 11364* (SI)].

Jarava chrysophylla (E. Desv.) Peñailillo var. **cordillerarum** (Parodi) Peñailillo
Sin.: *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *cordillerarum* Parodi
Referencias: Parodi, L. R., 1960; Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997b.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–4500 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SAL, SJU); CHL(III, IV, V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cajal, J. L. 104* (SI)].

Jarava chrysophylla (E. Desv.) Peñailillo var. **crispula** (Kuntze) Peñailillo
Sin.: *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *crispula* (Kuntze) Parodi, *Stipa humilis* Cav. f. *crispula* Kuntze

Referencias: Parodi, L. R., 1960; Roig, F. A., 1964; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 7337* (BAA)].

Jarava chubutensis (Speg.) Peñailillo var. **chubutensis**
Sin.: *Stipa chubutensis* Speg., *Stipa dasycnemis* Speg.
Referencias: Parodi, L. R., 1960; Peñailillo, P. B., 2002; Roig, F. A., 1964; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. 96* (SI), *Pennington, M. S. 444* (SI)].

Jarava chubutensis (Speg.) Peñailillo var. **hirsutissima** (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa chubutensis* Speg. var. *hirsutissima* F.A. Roig
Referencias: Roig, F. A., 1972; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12694* (BAB)].

Jarava durifolia (Parodi ex Torres) Peñailillo
Sin.: *Stipa durifolia* Parodi ex Torres
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997b.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–3600 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 14906* (SI), *Soriano, A. 637* (BAA, SI)].

Jarava eriostachya (Kunth) Peñailillo = **Jarava ichu** Ruiz & Pav.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Jarava frigida (Phil.) F. Rojas var. **frigida**
Sin.: *Stipa brevifolia* Phil., *Stipa frigida* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Peñailillo, P. B., 2002; Rojas P., F. P., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 3600–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU); CHL(I, II, III, IV, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 433* (SI)]; CHL[*Arancio, G. 10399* (ULS)].

Jarava frigida (Phil.) F. Rojas var. **parvispicula** (Parodi) Peñailillo
Sin.: *Stipa frigida* Phil. var. *parvispicula* Parodi
Referencias: Parodi, L. R., 1960; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997b.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4100 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 5798* (BAA, BAB, CORD)].

Jarava hieronymusii (Pilg.) Peñailillo
Sin.: *Stipa hieronymusii* Pilg.
Referencias: Parodi, L. R., 1960; Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997b.
Hierba. Perenne. Endémica. 2900–4500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 314* (BAA, CORD)].

Jarava humilis (Cav.) Peñailillo var. **decrescens** (Kuntze) Peñailillo
Sin.: *Stipa humilis* Cav. var. *decrescens* Kuntze
Referencias: Parodi, L. R., 1960; Roig, F. A., 1978a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 7550* (BAA)].

Jarava humilis (Cav.) Peñailillo var. **humilis**
Sin.: *Stipa humilis* Cav., *Stipa humilis* Cav. f. *major* Speg., *Stipa humilis* Cav. var. *intermedia* Kuntze
Referencias: Parodi, L. R., 1960; Peñailillo, P. B., 2002; Roig, F. A., 1978a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*James, P. 41* (SI), *Nicora, E. G. 3624* (SI)]; CHL[*Morrison, J. L. 17272* (SI)].

Jarava humilis (Cav.) Peñailillo var. **ruiziana** (Parodi) Peñailillo
Sin.: *Stipa humilis* Cav. var. *ruiziana* Parodi
Referencias: Parodi, L. R., 1960; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1400 m.
Países: ARG(LPA, MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Prina, A. O. 1850* (SI)].

Jarava hypsophila (Speg.) Peñailillo
Sin.: *Stipa hypsophila* Speg.
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Roig, F. A., 1964, 1978a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Böcher, T. W. 1431* (SI)].

Jarava hystricina (Speg.) Peñailillo
Sin.: *Stipa hystricina* Speg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997b.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arenas, P. 1720* (SI), *Deginani, N. B. 654* (SI), *Schreiter, R. 6120* (BAA)].

Jarava ibarii (Phil.) Peñailillo f. **pallescens** (Parodi) Peñailillo
Sin.: *Stipa ibarii* Phil. f. *pallescens* Parodi
Referencias: Roig, F. A., 1964; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2600–2800 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 4830* (BAA)].

Jarava ibarii (Phil.) Peñailillo var. **anomala** (Parodi) Peñailillo
Sin.: *Stipa ibarii* Phil. var. *anomala* Parodi
Referencias: Parodi, L. R., 1960; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 5080* (BAA)].

Jarava ibarii (Phil.) Peñailillo var. **ibarii**
Sin.: *Stipa ibarii* Phil.
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Roig, F. A., 1978a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Méndez, E. 1014* (SI)]; CHL[*Domínguez, E. 9* (CONC)].

Jarava ichu Ruiz & Pav.
Sin.: *Jarava eriostachya* (Kunth) Peñailillo, *Stipa eriostachya* Kunth, *Stipa gynerioides* Phil., *Stipa ichu* (Ruiz & Pav.) Kunth, *Stipa ichu* (Ruiz & Pav.) Kunth f. *interrupta* Hack., *Stipa ichu* (Ruiz & Pav.) Kunth var. *gyneroides* (Phil.) Hack.
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1973; Roig, F. A., 1978a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997b.
Hierba. Perenne. Nativa. 1600–4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 578* (SI), *Türpe, A. M. 1153* (LP)].

Jarava illimanica (Hack.) F. Rojas
Sin.: *Stipa illimanica* Hack.
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Rojas P., F. P., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–2500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 22407* (LP)].

Jarava juncoides (Speg.) Peñailillo
Sin.: *Stipa flexibarbata* Mez, *Stipa juncoides* Speg., *Stipa megapotamica* Spreng. ex Trin. var. *juncoides* (Speg.) Speg., *Stipa megapotamica* Spreng. ex Trin. var. *typica* Speg., nom. inval.
Referencias: Cabrera, A. L. & Torres, M. A., 1970; Mujica Sallés, J., 1996; Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, RNE, SLU); URY(MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19260* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 5239-b* (SI)].

Jarava leptostachya (Griseb.) F. Rojas
Sin.: *Stipa andina* F.A. Roig, *Stipa capilliseta* Hitchc., *Stipa leptostachya* Griseb., *Stipa leptostachya* Griseb. var. *capilliseta* (Hitchc.) Parodi
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Rojas P., F. P., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997b.
Hierba. Perenne. Nativa. 1200–4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 417* (SI), *Fabris, H. A. 4047* (LP), *Zuloaga, F. O. 3557* (MU, SI)]; CHL[*Marticorena, A. 303* (CONC)].

Jarava maeviae (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa maeviae* F.A. Roig
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Roig, F. A., 1972; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2900–3000 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11290* (BAA)].

Jarava malalhuensis (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa malalhuensis* F.A. Roig
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Roig, F. A., 1964; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CHU, MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 20948* (BAB)].

Jarava matthei F. Rojas
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Peterson, P. M. 15594* (CONC)].

Jarava media (Speg.) Peñailillo
Sin.: *Stipa media* (Speg.) Caro, *Stipa plumosa* Trin. var. *media* Speg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997b.
Hierba. Perenne. Endémica. 2100–3500 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 408* (SI), *Kurtz, F. 9798* (BAF)].

Jarava megapotamica (Spreng.) Peñailillo
Sin.: *Aristida megapotamica* Spreng., *Stipa filifolia* Nees
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Peñailillo, P. B., 2002; Torres, M. A., 1993; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3200 m.
Países: ARG(BAI, TUC); BRA(RGS); URY(ART, COL, FLA, LAV, MAL, MON, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 20575* (SI), *Troncoso, N. S. 1298* (SI)]; BRA[*Valla, J. J. 12307* (CEN)]; URY[*Rosengurtt, B. 11011* (MVFA)].

Jarava nana (Speg.) Peñailillo
Sin.: *Stipa nana* Speg.
Referencias: Parodi, L. R., 1960; Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Méndez, E. 1045* (SI)].

Jarava neaei (Nees ex Steud.) Peñailillo
Sin.: *Stipa bella* Phil., *Stipa neaei* Nees ex Steud., *Stipa pulchella* Munro ex Ball, nom. nud.
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Roig, F. A., 1978a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 1600–1700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU); CHL(IV, V, VII, XI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vanni, R. O. 4377* (SI)]; CHL[*Grandjot, G. F. 1291* (SI)].

Jarava nicorae (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa nicorae* F.A. Roig
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Roig, F. A., 1987a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997b.
Hierba. Perenne. Endémica. 3600 m.
Países: ARG(CAT, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 8201* (LP, SI)].

Jarava parodiana (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa parodiana* F.A. Roig
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Roig, F. A., 1964; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1600 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fischer, W. 46* (SI)].

Jarava patagonica (Speg.) Peñailillo
Sin.: *Stipa patagonica* Speg.
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997; Torres, M. A., 1991.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*T.B.P.A. 251* (SI)].

Jarava plumosa (Spreng.) S.W.L. Jacobs & J. Everett
Sin.: *Achnatherum papposum* (Nees) Barkworth, nom. illeg., *Calamagrostis plumosa* Spreng., *Stipa delilei* Steud., *Stipa papposa* Nees f. *major* Speg., *Stipa papposa* Nees f. *minor* Speg., *Stipa papposa* Nees, nom. illeg., *Stipa tenuiflora* Phil.
Referencias: Jacobs, S. W. L. & Everett, J., 1997; Mujica Sallés, J., 1996; Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997b; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, RNE, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME); URY(ART, CAS, MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15833* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 9753* (CEN, ICN)]; CHL[*Boelcke, O. 3808* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 621* (SI)].

Jarava plumosula (Nees ex Steud.) F. Rojas
Sin.: *Stipa plumosa* Trin., *Stipa plumosa* Trin. var. *micrura* Speg., *Stipa plumosula* Nees ex Steud.
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Rojas P., F. P., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, RNE, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(II, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4361* (SI)]; CHL[*Looser, G. 2781* (CONC), *Zöllner, O. 11316* (SI)].

Jarava pogonathera (E. Desv.) Peñailillo
Sin.: *Stipa buchtienii* Hack., *Stipa pogonathera* E. Desv., *Stipa uspallatensis* Hack., hom. illeg.
Referencias: Johnston, I. M., 1929b; Matthei, O. R., 1965; Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–3700 m.
Países: ARG(MEN); CHL(II, III, IV, V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Buchtien, O. s.n.* (SI)]; CHL[*Marticorena, A. 83334* (CONC)].

Jarava polyclada (Hack.) Peñailillo
Sin.: *Stipa polyclada* Hack.
Referencias: Caro, J. A., 1966; Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997b.

Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Márquez, J. 46* (SI), *Stuckert, T. T. J. V. 17118* (CORD, LIL)].

Jarava pseudoichu (Caro) F. Rojas
Sin.: *Stipa pseudoichu* Caro
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Rojas P., F. P., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, DFE, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 4232* (LP), *Nicora, E. G. 8791* (SI)].

Jarava psylantha (Speg.) Peñailillo
Sin.: *Stipa argentea* Hitchc., *Stipa dasyantha* Speg., *Stipa psylantha* Speg.
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Roig, F. A., 1978a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Méndez, E. 1046* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 438* (CONC)].

Jarava pungens (Nees & Meyen) Matthei
Sin.: *Stipa ichu* (Ruiz & Pav.) Kunth var. *pungens* (Nees & Meyen) Kuntze, *Stipa pungens* Nees & Meyen
Referencias: Matthei, O. R. & Espinoza, N., 1997; Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997b.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 345* (SI), *Fabris, H. A. 4112* (LP)]; CHL[*Peterson, P. M. 15737* (CONC)].

Jarava pungionata (Caro & E.A. Sánchez) Matthei
Sin.: *Stipa pungionata* Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1973; Matthei, O. R., 1998; Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997b.
Hierba. Perenne. Endémica. 3700–4500 m.
Países: ARG(CAT); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hueck, J. 512* (BA, BAA, LIL)]; CHL[*Teillier, S. 3239* (CONC)].

Jarava ruiz-lealii (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa ruiz-lealii* F.A. Roig
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Roig, F. A., 1964; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2800 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 20774* (BAA)].

Jarava scabrifolia (Torres) Peñailillo
Sin.: *Stipa scabrifolia* Torres
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3900 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 303* (SI)].

Jarava scirpea (Speg.) Peñailillo
Sin.: *Stipa axilliflora* Parodi, nom. nud., *Stipa scirpea* Speg.
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Roig, F. A., 1964; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3300 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31292* (SI), *Spegazzini, C. L. 23437* (SI)].

Jarava semperiana (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa semperiana* F.A. Roig
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Roig, F. A., 1964; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(LPA, MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 11138* (MERL)].

Jarava sorianoi (Parodi) Peñailillo
Sin.: *Stipa sorianoi* Parodi
Referencias: Parodi, L. R., 1960; Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 4775* (BAA)].

Jarava speciosa (Trin. & Rupr.) Peñailillo f. **abscondita** (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. f. *abscondita* F.A. Roig
Referencias: Roig, F. A., 1964; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cajal, J. L. 66* (SI)].

Jarava speciosa (Trin. & Rupr.) Peñailillo f. **horrida** (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. f. *horrida* F.A. Roig
Referencias: Roig, F. A., 1964; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 10501* (SI)].

Jarava speciosa (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **atuelensis** (F.A. Roig) Peñailillo

Sin.: *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. f. *atuelensis* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *atuelensis* (F.A. Roig) F.A. Roig
Referencias: Roig, F. A., 1978a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1400 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11718* (BAA)].

Jarava speciosa (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **breviglumis** (Parodi) Peñailillo
Sin.: *Stipa speciosa* Trin. var. *breviglumis* Parodi
Referencias: Parodi, L. R., 1960; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cajal, J. L. 68* (SI)].

Jarava speciosa (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **ciliata** (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa speciosa* Trin. var. *ciliata* F.A. Roig
Referencias: Roig, F. A., 1978a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2200 m.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 22093* (SI)].

Jarava speciosa (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **major** (Speg.) Peñailillo
Sin.: *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. f. *major* Speg., *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *major* (Speg.) Parodi, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *rhomalea* F.A. Roig
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1700 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Carette, B. s.n.* (SI)].

Jarava speciosa (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **manqueclensis** (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *manqueclensis* F.A. Roig
Referencias: Roig, F. A., 1965, 1978a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10200* (BAA)].

Jarava speciosa (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **media** (Torres) Peñailillo
Sin.: *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *media* Torres
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, LPA, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 32816* (SI)].

Jarava speciosa (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **parva** (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *parva* F.A. Roig
Referencias: Roig, F. A., 1964, 1978a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vallerini, J. 2097* (SI)].

Jarava speciosa (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **speciosa**
Sin.: *Achnatherum speciosum* (Trin. & Rupr.) Barkworth, *Stipa humilis* Cav. f. *minor* Speg., *Stipa humilis* Cav. var. *speciosa* (Trin. & Rupr.) Kuntze, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr., *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. f. *minor* Speg., *Stipa tehuelches* Speg.
Referencias: Parodi, L. R., 1960; Peñailillo, P. B., 2002; Roig, F. A., 1978a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1993.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–2700 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU); CHL(I, II, III, IV, V, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guerrido, C. 61* (MU, SI), *Villamil, C. B. 2298* (SI)]; CHL[*Parodi, L. R. 3288* (SI)].

Jarava subaristata (Matthei) Matthei
Sin.: *Stipa leptostachya* Griseb. var. *subaristata* Matthei, *Stipa subaristata* (Matthei) Caro & E.A. Sánchez
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 433* (SI)]; CHL[*Escobar A., H. 184-a* (SI)].

Jarava subnitida (Roseng. & B.R. Arrill.) Peñailillo
Sin.: *Nassella subnitida* (Roseng. & B.R. Arrill.) Barkworth, *Stipa subnitida* Roseng. & B.R. Arrill.
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(PAY).
Ejemplares de referencia: URY[*Rosengurtt, B. 9318* (MVFA)].

Jarava subplumosa (Hicken ex F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa subplumosa* Hicken ex F.A. Roig
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. 28* (SI)].

Jarava tortuosa (E. Desv.) Peñailillo
Sin.: *Stipa tortuosa* E. Desv.
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 1101* (SI), *Werdermann, E. 822* (SI)].

Jarava vaginata (Phil.) F. Rojas f. **contracta** (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa vaginata* Phil. f. *contracta* F.A. Roig
Referencias: Roig, F. A., 1964; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 20144* (LP)].

Jarava vaginata (Phil.) F. Rojas f. **immersa** (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa vaginata* Phil. f. *inmersa* F.A. Roig
Referencias: Roig, F. A., 1964; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2800 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. A. 4319* (LP)].

Jarava vaginata (Phil.) F. Rojas f. **laevis** (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa vaginata* Phil. f. *laevis* F.A. Roig
Referencias: Roig, F. A., 1964; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2800 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. A. 4318* (MERL)].

Jarava vaginata (Phil.) F. Rojas f. **rigida** (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa vaginata* Phil. f. *rigida* F.A. Roig
Referencias: Roig, F. A., 1964; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2800–2900 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. A. 4927* (LP)].

Jarava vaginata (Phil.) F. Rojas var. **argyroidea** (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa vaginata* Phil. var. *argyroidea* F.A. Roig
Referencias: Roig, F. A., 1972, 1978a; Torres, M. A., 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1100 m.
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. A. 4514* (LP)].

Jarava vaginata (Phil.) F. Rojas var. **dilatata** (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa vaginata* Phil. var. *dilatata* F.A. Roig
Referencias: Roig, F. A., 1964; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 4523* (LP)].

Jarava vaginata (Phil.) F. Rojas var. **vaginata**
Sin.: *Stipa cacheutensis* Speg., *Stipa formosa* Phil., *Stipa vaginata* Phil.
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Rojas P., F. P., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997b.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4100 m.
Países: ARG(JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU); CHL(I, II, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 403* (SI)]; CHL[*Jiles, C. 3771* (CONC)].

Jarava vatroensis (F.A. Roig) Peñailillo
Sin.: *Stipa vatroensis* F.A. Roig
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Roig, F. A., 1964, 1978a; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica. 1100 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 21501* (MERL)].

Koeleria Pers.

Número de especies: 9, 7 endémicas

Koeleria argentina Domin = **Koeleria kurtzii** Hack. ex Kurtz
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria bergii Hieron. = **Koeleria permollis** Nees ex Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria bergii Hieron. var. *aristulata* Domin = **Koeleria permollis** Nees ex Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria bergii Hieron. var. *fallacina* Domin = **Koeleria kurtzii** Hack. ex Kurtz
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria bergii Hieron. var. *minor* Domin = **Koeleria permollis** Nees ex Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria bergii Hieron. var. *patagonica* Domin = **Koeleria vurilochensis** C.E. Calderón ex Nicora var. **patagonica** (Domin) Molina
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria bergii Hieron. var. *typica* Domin, nom. inval. = **Koeleria permollis** Nees ex Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria calderonii Molina
Referencias: Molina, A. M., 1990, 1993; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 3700 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Valdes 5616* (BAA)].

Koeleria campestris Phil. = **Rostraria cristata** (L.) Tzvelev
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria caudulata (Trin.) Griseb. = **Trisetum caudulatum** Trin. var. **caudulatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria chilensis Steud., nom. nud. = **Bromidium anomalum** (Trin.) Döll
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria cristata (L.) Bertol. = **Rostraria cristata** (L.) Tzvelev

Koeleria cumingii Nees ex Steud. = **Trisetum spicatum** (L.) K. Richt. var. **cumingii** (Nees ex Steud.) Finot
Referencias: Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Matthei, O. R. & Soreng, R. J., 2005.

Koeleria fuegina C.E. Calderón ex Nicora
Sin.: *Trisetum toluccense* Kunth var. *tomentosum* E. Desv., *Trisetum tomentosum* (E. Desv.) Nicora
Referencias: Molina, A. M., 1993; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VI, VII, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 257* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 2456* (CONC)].

Koeleria grisebachii Domin, nom. superfl. = **Trisetum caudulatum** Trin. var. **caudulatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria grisebachii Domin var. *catamarcensis* Domin = **Koeleria kurtzii** Hack. ex Kurtz
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria grisebachii Domin var. *mendocinensis* Hauman = **Koeleria mendocinensis** (Hauman) C.E. Calderón & Nicora
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria grisebachii Domin var. *riojensis* Domin = **Koeleria kurtzii** Hack. ex Kurtz
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria grisebachii Domin var. *typica* Domin, nom. inval. = **Koeleria kurtzii** Hack. ex Kurtz
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria hieronymi Domin = **Koeleria kurtzii** Hack. ex Kurtz
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria inaequaliglumis Molina
Referencias: Molina, A. M., 1990, 1993; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 15603* (BAA, BAB, CTES, MERL, SI)].

Koeleria kurtzii Hack. ex Kurtz
Sin.: *Koeleria argentina* Domin, *Koeleria bergii* Hieron. var. *fallacina* Domin, *Koeleria grisebachii* Domin var. *catamarcensis* Domin, *Koeleria grisebachii* Domin var. *riojensis* Domin, *Koeleria grisebachii* Domin var. *typica* Domin, nom. inval., *Koeleria hieronymi* Domin, *Koeleria kurtzii* Hack. ex Kurtz var. *mollis* Hack., *Koeleria lilloi* Hack., *Koeleria niederleinii* Domin, *Koeleria niederleinii* Domin var. *mutica* Domin, *Koeleria niederleinii* Domin var. *pseudobergii* Domin, *Koeleria pseudocristata* Domin var. *andicola* Domin, *Trisetum kurtzii* (Hack.) Zotov
Referencias: Molina, A. M., 1991; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, TUC); CHL(I, VII, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 158* (SI)]; CHL[*Garaventa, A. 536* (CONC)].

Koeleria kurtzii Hack. ex Kurtz var. *mollis* Hack. = **Koeleria kurtzii** Hack. ex Kurtz
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria lechleri Steud. = **Trisetum caudulatum** Trin. var. **caudulatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria lilloi Hack. = **Koeleria kurtzii** Hack. ex Kurtz
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria mendocinensis (Hauman) C.E. Calderón & Nicora
Sin.: *Koeleria grisebachii* Domin var. *mendocinensis* Hauman
Referencias: Molina, A. M., 1993; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vallerini, J. 555* (SI)].

Koeleria micrathera (E. Desv.) Griseb. = **Leptophyllochloa micrathera** (E. Desv.) C.E. Calderón ex Nicora
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria niederleinii Domin = **Koeleria kurtzii** Hack. ex Kurtz
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria niederleinii Domin var. *mutica* Domin = **Koeleria kurtzii** Hack. ex Kurtz
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria niederleinii Domin var. *pseudobergii* Domin = **Koeleria kurtzii** Hack. ex Kurtz
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria permollis Nees ex Steud.
Sin.: *Koeleria bergii* Hieron., *Koeleria bergii* Hieron. var. *aristulata* Domin, *Koeleria bergii* Hieron. var. *minor* Domin, *Koeleria bergii* Hieron. var. *typica* Domin, nom. inval.
Referencias: Cabrera, A. L., 1970a; Molina, A. M., 1991, 1993; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, TDF); CHL(VII); URY(SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 388* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 5279pe* (MVFA)].

Koeleria philippiana E. Desv., nom. nud. = **Leptophyllochloa micrathera** (E. Desv.) C.E. Calderón ex Nicora
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria phleoides (Vill.) Pers. = **Rostraria cristata** (L.) Tzvelev
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria poaeoides Nees ex Steud. = **Poa holciformis** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria praeandina Molina
Referencias: Molina, A. M., 1990, 1993; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(MEN, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Negritto, M. A. 339* (CORD)].

Koeleria pseudocristata Domin var. *andicola* Domin = **Koeleria kurtzii** Hack. ex Kurtz
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria rigidula Steud. = **Poa denudata** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria sterilis Steud. = **Poa spiciformis** (Steud.) Hauman & Parodi var. **spiciformis**
Referencias: Giussani, L. M., 1993; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria trachyantha Phil. = **Rostraria trachyantha** (Phil.) Tzvelev
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Koeleria ventanicola Molina
Referencias: Molina, A. M., 1990, 1993; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1000 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gómez, R. s.n.* (BAA, BAB)].

Koeleria vurilochensis C.E. Calderón ex Nicora var. **patagonica** (Domin) Molina
Sin.: *Koeleria bergii* Hieron. var. *patagonica* Domin

Referencias: Molina, A. M., 1993; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Martínez Crovetto, R. 3026* (SI)].

Koeleria vurilochensis C.E. Calderón ex Nicora var. **vurilochensis**
Referencias: Molina, A. M., 1993; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11398* (SI)].

Lachnagrostis Trin.

Número de especies: 1 introducida

Lachnagrostis filiformis (G. Forst.) Trin.
Sin.: *Agrostis avenacea* J.F. Gmel., *Agrostis filiformis* (G. Forst.) Spreng., nom. illeg., *Agrostis lasiantha* Phil., *Agrostis leonii* Parodi
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1990, 2002; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1982; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–200 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, SFE); CHL(V, VII, X, IDE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 28150* (SI)]; CHL[*Cabrera, A. L. 31917* (SI), *Zöllner, O. 2932* (CONC)].

Lachnagrostis phleoides Nees & Meyen = **Gastridium phleoides** (Nees & Meyen) C.E. Hubb.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Lagurus L.

Número de especies: 1 introducida

Lagurus ovatus L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1970a; Kämpf, A. N., 1975; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–300 m.
Países: ARG(BAI, LPA); BRA(RGS); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22372* (SI)]; BRA[*Camargo, O. s.n.* (BLA)]; CHL[*Gunckel, L. H. 10058* (CONC)]; URY[*Rosengurtt, B. 5556* (MVFA)].

Lamarckia Moench

Número de especies: 1 introducida

Lamarckia aurea (L.) Moench
Sin.: *Cynosurus aureus* L.
Referencias: Fabris, H. A., 1970b; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, SFE); CHL(III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 1683* (SI)]; CHL[*Garaventa, A. 2218* (CONC)].

Lamprothyrsus Pilg.

Número de especies: 1

Lamprothyrsus hieronymi (Kuntze) Pilg.
Sin.: *Danthonia hieronymi* (Kuntze) Hack., *Danthonia hieronymi* (Kuntze) Hack. var. *pyramidata* Pilg. ex Rojas, nom. nud., *Danthonia hieronymi* (Kuntze) Hack. var. *ticta* Pilg. ex Rojas, nom. nud., *Lamprothyrsus hieronymi* (Kuntze) Pilg. var. *jujuyensis* Pilg., *Lamprothyrsus hieronymi* (Kuntze) Pilg. var. *nervosus* Pilg., *Lamprothyrsus hieronymi* (Kuntze) Pilg. var. *pyramidatus* Pilg., *Lamprothyrsus hieronymi* (Kuntze) Pilg. var. *tinctus* Pilg., *Lamprothyrsus venturii* Conert, *Triraphis hieronymi* Kuntze, *Triraphis hieronymi* Kuntze var. *jujuyensis* Kuntze
Referencias: Bernardello, L. M., 1979; Hitchcock, A. S., 1927.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7470* (SI)].

Lamprothyrsus hieronymi (Kuntze) Pilg. var. *jujuyensis* Pilg. = **Lamprothyrsus hieronymi** (Kuntze) Pilg.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Lamprothyrsus hieronymi (Kuntze) Pilg. var. *nervosus* Pilg. = **Lamprothyrsus hieronymi** (Kuntze) Pilg.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Lamprothyrsus hieronymi (Kuntze) Pilg. var. *pyramidatus* Pilg. = **Lamprothyrsus hieronymi** (Kuntze) Pilg.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Lamprothyrsus hieronymi (Kuntze) Pilg. var. *tinctus* Pilg. = **Lamprothyrsus hieronymi** (Kuntze) Pilg.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Lamprothyrsus venturii Conert = **Lamprothyrsus hieronymi** (Kuntze) Pilg.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Lappago aliena Spreng. = **Tragus berteronianus** Schult.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Lappago oplismenoides Speg. = **Pseudechinolaena polystachya** (Kunth) Stapf
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Lappagopsis bijuga Steud. = **Axonopus brasiliensis** (Spreng.) Kuhlm.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Lasiacis (Griseb.) Hitchc.

Número de especies: 3

Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. var. **austroamericana** Davidse
Sin.: *Lasiacis leptostachya* auct. non Hitchc.
Referencias: Davidse, G., 1978[1979]; Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994g; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, GUA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4609* (SI), *Zuloaga, F. O. 706* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 7201* (US)]; PRY[*Jörgensen, P. 3559* (MO, SI)].

[Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. var. divaricata]
Sin.: *Panicum divaricatum* L.
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Lasiacis excavata (Henrard) Parodi = **Acroceras excavatum** (Henrard) Zuloaga & Morrone
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O. & Sáenz, A. A., 1988.

Lasiacis guaranitica (Speg.) Parodi = **Lasiacis sorghoidea** (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase
Referencias: Davidse, G., 1978[1979].

Lasiacis leptostachya auct. non Hitchc. = **Lasiacis divaricata** (L.) Hitchc. var. **austroamericana** Davidse
Referencias: Davidse, G., 1978[1979].

Lasiacis ligulata Hitchc. & Chase
Referencias: Davidse, G., 1978[1979]; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7898* (MO, NY)].

Lasiacis patentiflora Hitchc. & Chase = **Lasiacis sorghoidea** (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase
Referencias: Davidse, G., 1978[1979].

Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase
Sin.: *Lasiacis guaranitica* (Speg.) Parodi, *Lasiacis patentiflora* Hitchc. & Chase, *Lasiacis sorghoidea* (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase var. *patentiflora* (Hitchc. & Chase) Davidse, *Panicum guaraniticum* Speg., *Panicum sorghoideum* Desv. ex Ham.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Davidse, G., 1978[1979]; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994g; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 400 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR); PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 258* (SI), *Morrone, O. 4530* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 13301* (F)]; PRY[*Palacios, R. A. 1948* (MO)].

Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase var. *patentiflora* (Hitchc. & Chase) Davidse = **Lasiacis sorghoidea** (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase
Referencias: Davidse, G., 1978[1979].

Leersia Sw.

Número de especies: 3

Leersia contracta Nees = **Leersia hexandra** Sw.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Leersia debilis Balansa & Poitr. = **Leersia ligularis** Trin. var. **grandiflora** (Döll) Pyrah
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Leersia distichophylla Balansa & Poitr. = **Leersia ligularis** Trin. var. **grandiflora** (Döll) Pyrah
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Leersia gouinii E. Fourn. = **Leersia hexandra** Sw.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Leersia grandiflora (Döll) Prodoehl = **Leersia ligularis** Trin. var. **grandiflora** (Döll) Pyrah
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Leersia hexandra Sw.
Sin.: *Asprella hexandra* (Sw.) P. Beauv., *Asprella mexicana* (Kunth) Roem. & Schult., *Homalocenchrus gouinii* (E. Fourn.) Kuntze, *Homalocenchrus hexandrus* (Sw.)

Kuntze, *Leersia contracta* Nees, *Leersia gouinii* E. Fourn., *Oryza hexandra* (Sw.) Döll, *Oryza hexandra* (Sw.) Döll var. *grandiflora* Döll, *Oryza mexicana* (Kunth) Döll

Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Pyrah, G. L., 1969; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY); URY(DUR, ROC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1771* (SI), *Zuloaga, F. O. 3269* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 13714* (MBM)]; PRY[*Vanni, R. O. 2595* (CTES)]; URY[*Herter, W. G. F. 555* (SI)].

Leersia hexandra Sw. subsp. *grandiflora* (Döll) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Leersia ligularis** Trin. var. **grandiflora** (Döll) Pyrah

Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Leersia ligularis Trin. var. **grandiflora** (Döll) Pyrah

Sin.: *Homalocenchrus grandiflorus* (Döll) Hitchc., *Leersia debilis* Balansa & Poitr., *Leersia distichophylla* Balansa & Poitr., *Leersia grandiflora* (Döll) Prodoehl, *Leersia hexandra* Sw. subsp. *grandiflora* (Döll) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Leersia monandra* auct. non Ekman, *Oryza monandra* (Sw.) Döll var. *grandiflora* Döll

Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Pyrah, G. L., 1969; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Hierba. Perenne. Nativa. 100–1200 m.

Países: ARG(FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(GUA).

Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 13008* (BAA), *Zuloaga, F. O. 6907* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 5077* (HBR, US), *Reitz, P. R. 3355* (HBR)]; PRY[*Balansa, B. 266* (P)].

Leersia monandra auct. non Ekman = **Leersia ligularis** Trin. var. **grandiflora** (Döll) Pyrah

Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Leersia virginica Willd.

Sin.: *Asprella virginica* (Willd.) P. Beauv., *Homalocenchrus virginicus* (Willd.) Britton, *Leersia virginica* Willd. var. *brasiliensis* Ekman

Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Hierba. Perenne. Nativa. 800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Swallen, J. R. 8059* (US)].

Leersia virginica Willd. var. *brasiliensis* Ekman = **Leersia virginica** Willd.

Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Renvoize, S. A., 1988.

Lepideilema lanciflorum Trin. = **Streptochaeta spicata** Schrad. ex Nees

Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Leptochloa P. Beauv.

Número de especies: 8

Leptochloa barbata (Desv.) Parodi ex Nicora

Sin.: *Eleusine barbata* Desv.

Referencias: Nicora, E. G., 1993, 1995b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Hierba. Perenne. Nativa. 900–1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC); PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CON, PAI).

Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14502* (BAA), *Cialdella, A. M. 575* (SI)]; PRY[*Arenas, P. 148* (MVFA)].

Leptochloa brachiata Steud. = **Leptochloa panicea** (Retz.) Ohwi subsp. **brachiata** (Steud.) N. Snow

Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Leptochloa burchelii Munro ex Döll = **Gymnopogon burchellii** (Munro ex Döll) Ekman

Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1990; Nicora, E. G., 1995b.

Leptochloa chloridiformis (Hack.) Parodi

Sin.: *Baldomiria chloridiformis* (Hack.) Herter, *Diplachne chloridiformis* Hack.

Referencias: Burkart, A., 1969a; Cabrera, A. L., 1970a; Nicora, E. G., 1995b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, CON, PHA); URY(RNO).

Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21034* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 2695* (SI)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Leptochloa dominguensis (Jacq.) Trin. = **Leptochloa virgata** (L.) P. Beauv. var. **virgata**

Referencias: Nicora, E. G., 1995b.

Leptochloa dubia (Kunth) Nees

Sin.: *Chloris dubia* Kunth, *Diplachne dubia* (Kunth) Scribn., *Diplachne mendocina* (Phil.) Kurtz, *Eragrostis mendocina* (Phil.) Jedwabn., *Festuca obtusiflora* Willd. ex Spreng., *Ipnum mendocinum* Phil., *Leptochloa dubia* (Kunth) Nees subsp. *patens* (J. Presl) Steibel & Covas, *Rabdochloa dubia* (Kunth) Kuntze ex Stuck., *Schismus patens* J. Presl

Referencias: Cabrera, A. L., 1970a; Nicora, E. G., 1995b; Parodi, L. R., 1927b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1998; Snow, N. & Simon, B. K., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27566* (SI), *Cialdella, A. M. 196* (SI)].

Leptochloa dubia (Kunth) Nees subsp. *patens* (J. Presl) Steibel & Covas = **Leptochloa dubia** (Kunth) Nees
Referencias: Nicora, E. G., 1995b.

Leptochloa fascicularis (Lam.) A. Gray = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **fascicularis** (Lam.) N. Snow
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Leptochloa filiformis (Pers.) P. Beauv. = **Leptochloa panicea** (Retz.) Ohwi subsp. **brachiata** (Steud.) N. Snow
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Leptochloa fusca (L.) Kunth subsp. **fascicularis** (Lam.) N. Snow
Sin.: *Cynodon fascicularis* (Lam.) Raspail, *Diplachne aquatica* Bosc ex Roem. & Schult., *Diplachne fascicularis* (Lam.) P. Beauv., *Diplachne procumbens* (Mühlenb.) Nash, hom. illeg., *Festuca aquatica* Bosc ex Roem. & Schult., nom. inval., *Festuca fascicularis* Lam., *Leptochloa fascicularis* (Lam.) A. Gray, *Leptochloa polystachya* (Michx.) Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1970a; Nicora, E. G., 1995b; Parodi, L. R., 1927b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Snow, N., 1998c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, FOR, MIS); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arenas, P. 2388* (SI)]; PRY[*Hahn, W. J. 801* (SI)].
Notas: Citado para Chile sin indicar localidad o material de referencia (Peterson et al., 2001).

Leptochloa fusca (L.) Kunth subsp. **muelleri** (Benth.) N. Snow
Sin.: *Diplachne fusca* (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult., *Diplachne muelleri* Benth., *Diplachne reptatrix* (L.) Druce, *Festuca reptatrix* L.
Referencias: Nicora, E. G., 1995b; Snow, N. & Simon, B. K., 1999; Snow, N., 1998c.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(DFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 7237* (BAA)].

Leptochloa fusca (L.) Kunth subsp. **uninervia** (J. Presl) N. Snow
Sin.: *Atropis carinata* Griseb., *Diplachne carinata* (Griseb.) Hack., *Diplachne fusca* (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. var. *macrotricha* Hack., *Diplachne fusca* auct. non (L.) P. Beauv., *Diplachne procumbens* Arechav., *Diplachne tarapacana* Phil., *Diplachne uninervia* (J. Presl) Hitchc., comb. superfl., *Diplachne uninervia* (J. Presl) Parodi, *Diplachne uninervia* (J. Presl) Parodi f. *abbreviata* Parodi, *Diplachne uninervia* (J. Presl) Parodi var. *procumbens* (Arechav.) Parodi, *Eragrostis uninervia* (J. Presl) Steud., *Leptochloa uninervia* (J. Presl) Hitchc. & Chase, *Megastachya uninervia* J. Presl, *Poa uninervia* (J. Presl) Kunth
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Nicora, E. G., 1995b; Parodi, L. R., 1927b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Snow, N. & Simon, B. K., 1999; Snow, N., 1998c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II, III); PRY(APY, CEN, CON, PAI, PHA); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25260* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 735* (LIL, SI)]; PRY[*Mereles, F. 6091* (CTES, FCQ, MO)]; URY[*Rosengurtt, B. 7410b* (SI)].

Leptochloa mucronata (Michx.) Kunth = **Leptochloa panicea** (Retz.) Ohwi subsp. **mucronata** (Michx.) Nowack
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Leptochloa mucronata auct. non (Michx.) Kunth = **Leptochloa panicea** (Retz.) Ohwi subsp. **brachiata** (Steud.) N. Snow
Referencias: Snow, N., 1998c.

Leptochloa panicea (Retz.) Ohwi subsp. **brachiata** (Steud.) N. Snow
Sin.: *Eleusine filiformis* Pers., *Festuca filiformis* Lam., hom. illeg., *Leptochloa brachiata* Steud., *Leptochloa filiformis* (Pers.) P. Beauv., *Leptochloa mucronata* auct. non (Michx.) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Snow, N. & Simon, B. K., 1999; Snow, N., 1998c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31373* (SI), *Venturi, S. 19* (SI)]; PRY[*Morong, T. 211* (BM)].

[Leptochloa panicea (Retz.) Ohwi subsp. mucronata (Michx.) Nowack]
Sin.: *Eleusine mucronata* Michx., *Leptochloa mucronata* (Michx.) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Notas: Subespecie excluida del área del proyecto.

Leptochloa plectostachya K. Schum. = **Cynodon plectostachyum** (K. Schum.) Pilg.
Referencias: Nicora, E. G., 1995b.

Leptochloa polystachya (Michx.) Kunth = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **fascicularis** (Lam.) N. Snow
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Leptochloa procera Nees
Referencias: Nicora, E. G., 1993, 1995b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL); PRY(APY, CEN, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3341* (SI)]; PRY[*Rosengurtt, B. 5831b* (MVFA), *Vanni, R. O. 1909* (CTES)].

Leptochloa scabra Nees
Sin.: *Diplachne scabra* (Nees) Nicora
Referencias: Nicora, E. G., 1993, 1995b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(FOR); PRY(APY, CEN, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Piccinini, B. 1030* (BAB, SI)]; PRY[*Rojas, T. 2738* (BAA)].

Leptochloa uninervia (J. Presl) Hitchc. & Chase = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **uninervia** (J. Presl) N. Snow
Referencias: Snow, N., 1998c.

Leptochloa virgata (L.) P. Beauv. var. *mutica* (Steud.) Döll = **Leptochloa virgata** (L.) P. Beauv. var. **virgata**

Leptochloa virgata (L.) P. Beauv. var. **puberula** Hack.
Referencias: Nicora, E. G., 1995b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SFE); PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 2675* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 14570* (BAA, BAF)].

Leptochloa virgata (L.) P. Beauv. var. **virgata**
Sin.: *Cynosurus dominguensis* Jacq., *Cynosurus virgatus* L., *Leptochloa dominguensis* (Jacq.) Trin., *Leptochloa virgata* (L.) P. Beauv. var. *mutica* (Steud.) Döll
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Judziewicz, E. J., 1990; Nicora, E. G., 1995b; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2930* (SI), *Zuloaga, F. O. 5069* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 14353* (MBM)]; PRY[*Morrone, O. 361* (SI)].

Leptocoryphium lanatum (Kunth) Nees = **Anthaenantia lanata** (Kunth) Benth.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Leptocoryphium lanatum (Kunth) Nees var. *molle* (Nees) Döll = **Anthaenantia lanata** (Kunth) Benth.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Leptocoryphium penicilligerum Speg. = **Digitaria sacchariflora** (Nees) Henrard
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Leptophyllochloa C.E. Calderón ex Nicora

Número de especies: 1 endémica

Leptophyllochloa micrathera (E. Desv.) C.E. Calderón ex Nicora
Sin.: *Koeleria micrathera* (E. Desv.) Griseb., *Koeleria philippiana* E. Desv., nom. nud., *Trisetum araeanthum* Phil., *Trisetum brachyatherum* Phil., *Trisetum depauperatum* Phil., *Trisetum laxiflorum* Phil., *Trisetum laxum* Phil., *Trisetum micratherum* E. Desv., *Trisetum nemorosum* Phil.
Referencias: Molina, A. M., 1989; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(V, VII, VIII, IX, X, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 7500* (BAA), *Rúgolo de Agrasar, Z. E. 1076* (SI)]; CHL[*Gay, C. 289* (BAA)].

Lepturus cylindricus (Willd.) Trin. = **Hainardia cylindrica** (Willd.) Greuter
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Lepturus incurvatus (L.) Trin. = **Parapholis incurva** (L.) C.E. Hubb.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Lepturus paniculatus Nutt. = **Schedonnardus paniculatus** (Nutt.) Trel.

Lepturus strigosus Dumort. = **Parapholis strigosa** (Dumort.) C.E. Hubb.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Leymus Hochst.

Número de especies: 2, 1 endémica, 1 introducida

Leymus arenarius (L.) Hochst.
Sin.: *Elymus arenarius* L.
Referencias: Moore, D. M., 1983; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 15061* (BAB)]; CHL[*Ricardi, M. 83* (CONC)].

Leymus erianthus (Phil.) Dubcovsky
Sin.: *Cryptochloris spatacea* Speg., nom. nud., *Cryptochloris spathacea* auct. non Benth., *Elymus barbatus* Kurtz, nom. nud., *Elymus erianthus* Phil., *Elymus erianthus* Phil. var. *aristatus* Hicken, *Elymus erianthus* Phil. var. *spegazzinii* Kurtz ex Hauman, *Elymus spegazzinii* Kurtz, nom. nud., *Eremium erianthum* (Phil.) Seberg & Linde-Laursen
Referencias: Dubcovsky, J., Schlatter, A. R. & Echaide, M., 1997; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3100 m.
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU); CHL(V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fischer, W. 170* (SI)]; CHL[*Zoellner, O. 13256* (CONC)].

Leymus mendocinus (Parodi) Dubcovsky = **Elymus mendocinus** (Parodi) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Lithachne P. Beauv.

Número de especies: 1

Lithachne axillaris P. Beauv. = **Lithachne pauciflora** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Lithachne pauciflora (Sw.) P. Beauv.
Sin.: *Lithachne axillaris* P. Beauv., *Olyra axillaris* Lam., *Olyra pauciflora* Sw.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 4131* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 1782* (ICN, US)]; PRY[*Rojas, T. 6072* (US)].

Lolium L.

Número de especies: 5, 4 introducidas

Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. = **Schedonorus arundinaceus** (Schreb.) Dumort.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Lolium berteronianum Steud.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Lolium brasilianum Nees = **Lolium perenne** L.
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1990; Longhi-Wagner, H. M., 1987.

Lolium italicum A. Braun = **Lolium multiflorum** Lam.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Lolium linicolum Sond., nom. nud. = **Lolium remotum** Schrank
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Lolium loliaceum (Bory & Chaub.) Hand.-Mazz. = **Lolium rigidum** Gaudin subsp. **lepturoides** Sennen & Mauricio
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Lolium multiflorum Lam.
Sin.: *Lolium italicum* A. Braun, *Lolium multiflorum* Lam. var. *italicum* (A. Braun) R.Beck, *Lolium multiflorum* Lam. var. *muticum* DC.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Cabrera, A. L., 1970a; Cantero, J. J., Núñez, C. O., Geymonat, M. & Chiacchiera, G., 1996; Longhi-Wagner, H. M., 1987; Renvoize, S. A., 1988; San Martin, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R., 2001; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SLU, TDF, TUC); BRA(PAR, RGS); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, IJF, RME); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Muñoz, J. D. 4647* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 28471* (MBM)]; CHL[*Garaventa, A. 5210* (CONC)]; URY[*Mujica Sallés, J. 732* (MVFA)].

Lolium multiflorum Lam. var. *italicum* (A. Braun) R.Beck = **Lolium multiflorum** Lam.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Lolium multiflorum Lam. var. *muticum* DC. = **Lolium multiflorum** Lam.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Lolium perenne L.
Sin.: *Lolium brasilianum* Nees, *Lolium perenne* L. var. *brasilianum* (Nees) Kuntze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Longhi-Wagner, H. M., 1987; Macaya, J. & Faúndez Y., L., 1996a; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, CHU, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, IJF, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Muñoz, J. D. 5227* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 634* (ICN)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996065* (CONC)]; URY[*Berro, M. B. 6164* (MVFA)].

Lolium perenne L. var. *brasilianum* (Nees) Kuntze = **Lolium perenne** L.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987.

Lolium remotum Schrank
Sin.: *Lolium linicolum* Sond., nom. nud.
Referencias: Caro, J. A., Sánchez, E. A. & Elisetch, M., 1978.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lahitte 77* (BAB)].

[Lolium rigidum Gaudin var. aristatum Hack.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Lolium rigidum Gaudin subsp. **lepturoides** Sennen & Mauricio
Sin.: *Lolium loliaceum* (Bory & Chaub.) Hand.-Mazz., *Lolium subulatum* Vis., *Rottboellia loliacea* Bory & Chaub.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, D. 11407* (BAA)].
Notas: Citada para Chile sin indicar material de referencia.

Lolium rigidum Gaudin subsp. **rigidum**
Referencias: Caro, J. A., Sánchez, E. A. & Elisetch, M., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, RNE, SFE); CHL(IV, V, VI, VIII, IX, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Millán, A. R. 20* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 13794* (CONC)].

Lolium subulatum Vis. = **Lolium rigidum** Gaudin subsp. **lepturoides** Sennen & Mauricio
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Lolium temulentum L.
Sin.: *Craepalia temulenta* (L.) Schrank, *Lolium temulentum* L. f. *arvense* (With.) Junge, *Lolium temulentum* L. var. *leptochaeton* A. Braun
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Burkart, A., 1969a; Longhi-Wagner, H. M., 1987; Nicora, E. G., 1978; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–700 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TDF); BRA(RGS); CHL(IV, V, VIII, IX, X, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rivarola, N. 23* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 253* (ICN)]; CHL[*Gunckel, L. H. 39766* (CONC)]; URY[*Herter, W. G. F. 593* (SI)].

Lolium temulentum L. f. *arvense* (With.) Junge = **Lolium temulentum** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Lolium temulentum L. var. *leptochaeton* A. Braun = **Lolium temulentum** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Lombardochloa rufa (J. Presl) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Poidium rufum** (J. Presl) Matthei
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Lombardochloa rufa (J. Presl) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. var. *sparsepilosa* (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Poidium rufum** (J. Presl) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Lophochloa cristata (L.) Hyl. = **Rostraria cristata** (L.) Tzvelev

Lophochloa phleoides (Vill.) Pers. = **Rostraria cristata** (L.) Tzvelev

Lophopyrum elongatum (Host) A. Löve = **Thinopyrum elongatum** (Host) D.R. Dewey
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Loudetia Hochst. ex Steud., nom. cons.
Número de especies: 1

Loudetia flammida (Trin.) C.E. Hubb.
Sin.: *Arundinella flammida* Trin.
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jiménez, B. 21* (BM, CTES, MO, PY, SI)].

Loudetiopsis Conert
Número de especies: 1

Loudetiopsis chrysothryx (Nees) Conert
Sin.: *Tristachya chrysothrix* Nees, *Tristachya chrysothrix* Nees f. *pallida* Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 200 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zuloaga, F. O. 7309* (SI)].

Ludolphia pinifolia (Nees) A. Dietr. = **Chusquea pinifolia** (Nees) Nees
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Luziola Juss.
Número de especies: 7

Luziola bahiensis (Steud.) Hitchc.
Sin.: *Caryochloa bahiensis* Steud., *Luziola contracta* Hack., *Luziola longivalvula* Döll, nom. superfl., *Luziola pusilla* S. Moore, *Luziola striata* Balansa & Poitr.
Referencias: Burkart, A., 1969c; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 5470* (BAA)]; BRA[*Hatschbach, G. 28236* (MBM)]; PRY[*Balansa, B. 181* (K)].

Luziola brasiliensis (Trin.) Swallen
Sin.: *Arrozia micrantha* Schrad. ex Nees, nom. nud., *Caryochloa brasiliensis* Trin., *Luziola micrantha* (Schrad.) Benth.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M. & Lerina, R., 2001; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 9963* (FLOR, HBR, US)].

Luziola contracta Hack. = **Luziola bahiensis** (Steud.) Hitchc.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Luziola fragilis Swallen
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14321* (MBM)].

Luziola gracillima Prodoehl
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR, SAL); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Saravia Toledo, C. 1563* (CORD)]; PRY[*Hassler, E. 2721* (BM)].

Luziola leiocarpa Lindm. = **Luziola peruviana** Juss. ex J.F. Gmel.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Luziola longivalvula Döll, nom. superfl. = **Luziola bahiensis** (Steud.) Hitchc.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Luziola mexicana Kunth = **Luziola peruviana** Juss. ex J.F. Gmel.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Luziola micrantha (Schrad.) Benth. = **Luziola brasiliensis** (Trin.) Swallen
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Luziola peruviana Juss. ex J.F. Gmel.
Sin.: *Luziola leiocarpa* Lindm., *Luziola mexicana* Kunth, *Milium natans* Spreng.

Referencias: Cabrera, A. L., 1970a; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, CEN, COA, PAI, PHA); URY(FLA, PAY, RNO, ROC, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1821* (SI)]; BRA[*Lindman, C. A. M. 1213* (S, US)]; PRY[*Mereles, F. 427* (SI)]; URY[*Berreta s.n.* (MVFA)].

Luziola pusilla S. Moore = **Luziola bahiensis** (Steud.) Hitchc.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Luziola spisiformis Andersson ex Balansa & Poit. = **Luziola spruceana** Benth. ex Döll
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Luziola spruceana Benth. ex Döll
Sin.: *Luziola spisiformis* Andersson ex Balansa & Poit.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CEN, PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 180* (P, US)].

Luziola striata Balansa & Poitr. = **Luziola bahiensis** (Steud.) Hitchc.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Luziola subintegra Swallen
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 2709* (BAB, G, MO, SI)]; PRY[*Hassler, E. 1664* (SI)].

Lycurus Kunth

Número de especies: 2

Lycurus alopecuroides Griseb. = **Lycurus setosum** (Nutt.) C. Reeder

Lycurus muticus Spreng. = **Elionurus muticus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Lycurus phalaroides Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Sánchez, E. A. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–2800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2381* (SI)].

Lycurus setosus (Nutt.) C. Reeder
Sin.: *Lycurus alopecuroides* Griseb., *Pleopogon setosum* Nutt.
Referencias: Peterson, P. M. & Morrone, O., 1997; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Sánchez, E. A. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–3800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lugo, M. A. 140* (CORD), *Morrone, O. 2420* (SI)].

Manisuris altissima (Poir.) Hitchc. = **Hemarthria altissima** (Poir.) Stapf & C.E. Hubb.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Manisuris aurita (Steud.) Hitchc. & Chase, comb. superfl. = **Mnesithea aurita** (Steud.) de Koning & Sosef
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Manisuris aurita (Steud.) Kuntze = **Mnesithea aurita** (Steud.) de Koning & Sosef
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Manisuris balansae (Hack.) Parodi = **Mnesithea balansae** (Hack.) de Koning & Sosef
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Manisuris selloana (Hack.) Kuntze = **Mnesithea selloana** (Hack.) de Koning & Sosef
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Megalachne Steud.

Número de especies: 2 endémicas

Megalachne berteroana Steud.
Sin.: *Bromus fernandezianus* (Phil.) Skottsb., *Bromus megalachne* Pilg., *Pantathera avenacea* Phil. ex Hemsl., nom. nud., *Pantathera fernandeziana* Phil.
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero 1440* (P, US)].

Megalachne masafuerana (Skottsb. & Pilg.) H. Scholz, comb. superfl. = **Megalachne masafuerana** (Skottsb. & Pilg. ex Pilg.) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Megalachne masafuerana (Skottsb. & Pilg. ex Pilg.) Matthei
Sin.: *Bromus masafueranus* Skottsb. & Pilg. ex Pilg., *Megalachne masafuerana* (Skottsb. & Pilg.) H. Scholz, comb. superfl.
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1300 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, C. J. F. 415* (GB, P, S, UPS)].

Megastachya ciliaris (L.) P. Beauv. = **Eragrostis ciliaris** (L.) R. Br.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Megastachya gouinii E. Fourn. = **Eragrostis hypnoides** (Lam.) Britton, Stern & Poggenb.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Megastachya hypnoides (Lam.) P. Beauv. = **Eragrostis hypnoides** (Lam.) Britton, Stern & Poggenb.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Megastachya maypurensis (Kunth) Roem. & Schult. = **Eragrostis maypurensis** (Kunth) Steud.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Megastachya montufari (Kunth) Roem. & Schult. = **Eragrostis pastoensis** (Kunth) Trin.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Megastachya swainsoni Raddi = **Eragrostis maypurensis** (Kunth) Steud.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Megastachya uninervia J. Presl = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **uninervia** (J. Presl) N. Snow
Referencias: Snow, N., 1998c.

Megathyrsus (Pilg.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs

Número de especies: 1 introducida

Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs var. **maximus**
Sin.: *Panicum maximum* Jacq., *Urochloa maxima* (Jacq.) R.D. Webster
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., 1975, 1979, 1994.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3343* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 17068* (MBM)]; PRY[*Lurvey 2* (MO)].

Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs var. **pubiglumis** (K. Schum.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs
Sin.: *Panicum maximum* Jacq. var. *pubiglume* K. Schum., *Panicum maximum* Jacq. var. *trichoglume* Rob.
Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Zuloaga, F. O., 1979.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, FOR, MIS); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 11770* (BAA)]; BRA[*Sacco, J. C. 335* (PEL, RB)].

Melica L., nom. cons.

Número de especies: 31, 26 endémicas

Melica adhaerens Hack. = **Melica chilensis** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica alata Nees ex Steud. = **Melica violacea** Cav.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica alata Nees ex Steud. var. *filiculmis* (Desv.) Papp = **Melica violacea** Cav.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica alata Nees ex Steud. var. *mollis* Papp = **Melica violacea** Cav.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica ampla Phil. = **Melica argentata** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica andina Hauman = **Melica chilensis** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica andina Hauman var. *laxissima* Papp = **Melica chilensis** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica andina Hauman var. *trinervis* Papp = **Melica chilensis** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica animarum Mujica-Sallés & M. Marchi
Referencias: Mujica Sallés, J. & Marchi, M., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 400–500 m.
Países: URY(MAL).
Ejemplares de referencia: URY[*Mujica Sallés, J. 240* (MVFA)].

Melica argentata E. Desv.
Sin.: *Melica ampla* Phil., *Melica argentata* E. Desv. var. *breviglumis* Papp, *Melica glabra* Steud., *Melica nitida* Phil., *Melica tortuosa* Phil., *Melica violacea* Cav. var. *argentata* Papp
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2200 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero 423* (P, SGO), *LandBeck, S. G. s.n.* (SGO, US), *Morrison, J. L. 16888* (SI)].

Melica argentata E. Desv. var. *breviglumis* Papp = **Melica argentata** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica argyrea Hack.
Sin.: *Melica argyrea* Hack. f. *pilosa* (Papp) Hempel, *Melica argyrea* Hack. var. *pilosa* Papp, *Melica papilionacea* L. var. *laxiflora* Kuntze
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997; Torres, M. A., 1980.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, SFE, SJU, SLU); BRA(RGS); URY(CLA, COL, MON, PAY, RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Quarín, C. L. 1667* (CTES, MVFA), *Rentzell, I. 1104* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15045* (MVFA), *Valls, J. F. M. 2494* (ICN)]; URY[*Rosengurtt, B. 4091* (P, US)].

Melica argyrea Hack. f. *pilosa* (Papp) Hempel = **Melica argyrea** Hack.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Melica argyrea Hack. var. *pilosa* Papp = **Melica argyrea** Hack.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Melica arzivencoi Valls & Barcellos
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Valls, J. F. M. 1411* (ICN, US)].

Melica aurantiaca Desr. ex Lam. = **Melica brasiliana** Ard.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Melica aurantiaca Desr. ex Lam. f. *pallida* Papp = **Melica brasiliana** Ard.

Melica aurantiaca Desr. ex Lam. f. *violacea* Hack. ex Papp = **Melica brasiliana** Ard.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica aurantiaca Desr. ex Lam. var. *montevidensis* Papp = **Melica hyalina** Döll
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Melica aurantiaca Desr. ex Lam. var. *mucronata* Papp = **Melica brasiliana** Ard.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica aurantiaca Desr. ex Lam. var. *rigida* (Cav.) Papp = **Melica rigida** Cav.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Melica aurantiaca Desr. ex Lam. var. *tandilensis* Kuntze = **Melica brasiliana** Ard.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Melica aurantiaca Desr. ex Lam. var. *typica* Papp, nom. inval. = **Melica brasiliana** Ard.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Melica aurantiaca Desr. ex Lam. subsp. *cymbara* Ekman = **Melica brasiliana** Ard.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

[Melica bahuinii All.]
Sin.: *Melica litoralis* Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Melica berteroana Phil. = **Melica longiflora** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica berteroana Phil. f. *violaceae* Papp = **Melica longiflora** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica berteroana Phil. var. *exaltata* (Phil.) Papp = **Melica longiflora** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica berteroana Phil. var. *pilosula* Papp = **Melica longiflora** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica berteroana Phil. var. *puberula* Papp = **Melica longiflora** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica berteroana Phil. var. *typica* Papp, nom. inval. = **Melica longiflora** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica bonariensis Parodi
Sin.: *Melica papilionacea* L. var. *violacea* Hieron.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1980.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, LPA, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19245* (SI), *Parodi, D. 13888* (BAA, SI, US)].

Melica brasiliana auct. non Ard. = **Melica rigida** Cav.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987.

Melica brasiliana Ard.
Sin.: *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam., *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. f. *pallida* Papp, *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. f. *violacea* Hack. ex Papp, *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. subsp. *cymbara* Ekman, *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. var. *mucronata* Papp, *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. var. *tandilensis* Kuntze, *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. var. *typica* Papp, nom. inval., *Melica brasiliana* Ard. f. *tandilensis* (Kuntze) Hempel, *Melica brasiliana* Ard. var. *aurantiaca* (Desr. ex Lam.) Hempel, *Melica mucronata* (Papp) Herter, *Melica papilionacea* L., *Melica tandilensis* (Kuntze) Herter
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997; Torres, M. A., 1980.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MIS, SDE, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19275* (SI))]; BRA[*Hatschbach, G. 15045* (MVFA), *Rambo, B. 34138* (SI)]; URY[*Izaguirre de Artuccio, P. 17872* (MVFA)].

Melica brasiliana Ard. f. *tandilensis* (Kuntze) Hempel = **Melica brasiliana** Ard.

Melica brasiliana Ard. f. *truncata* (Papp) Hempel = **Melica hyalina** Döll
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica brasiliana Ard. var. *aurantiaca* (Desr. ex Lam.) Hempel = **Melica brasiliana** Ard.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica brevicoronata Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(FLO, FLA, LAV, MAL, SJO, TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bertels, A. 124* (MVFA)]; URY[*Del Puerto, O. 7560* (SI), *Rosengurtt, B. 2711* (MVFA)].

Melica cepacea (Phil.) Scribn.
Sin.: *Bromelica cepacea* (Phil.) Nicora, *Festuca cepacea* Phil.
Referencias: Nicora, E. G., 1973b, 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1300 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10817* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Grandjot, K. s.n.* (BAA)].

Melica chilensis J. Presl
Sin.: *Melica adhaerens* Hack., *Melica andina* Hauman, *Melica andina* Hauman var. *laxissima* Papp, *Melica andina* Hauman var. *trinervis* Papp, *Melica pilgeriana* Papp, *Melica popoviciana* Papp
Referencias: Muñoz-Schick, M., 1983–1984; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–3700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 12099* (SI), *Hauman, L. L. 2396* (BA, US)].

Melica commersonii Nees ex Steud.
Sin.: *Melica commutata* Steud., *Melica violacea* Cav. var. *commersonii* (Nees ex Steud.) Papp, *Melica violacea* Cav. var. *commutata* (Steud.) Papp, *Melica violacea* Cav. var. *pallida* E. Desv.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1800 m.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 222* (CONC)].

Melica commutata Steud. = **Melica commersonii** Nees ex Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica cordobensis Hack. = **Melica stuckertii** Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica decipiens Caro
Sin.: *Melica violacea* Cav. f. *mucronata* Papp, *Melica violacea* Cav. var. *glabrior* Papp
Referencias: Torres, M. A., 1980.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 15534* (LIL)].

Melica decumbens Papp = **Melica lilloi** Bech.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica eremophila Torres
Sin.: *Melica monantha* Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1980.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, SFE); BRA(RGS, SCA); URY(ART, COL, LAV, MAL, MON, RIV, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19619* (LP)]; BRA[*Rosengurtt, B. 9050* (MVFA)]; URY[*Rosengurtt, B. 10935* (K, MVFA, NY, P)].

Melica exaltata Phil. = **Melica longiflora** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica filiculmis Desv. = **Melica violacea** Cav.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica flava Nees ex Steud. = **Melica violacea** Cav.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica flava Nees ex Steud. var. *violaceae* Papp = **Melica longiflora** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica glabra Steud. = **Melica argentata** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica glabrescens (Torres) Torres
Sin.: *Melica violacea* Cav. var. *glabrescens* Torres
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1980.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, D. 2951* (BAA)].

Melica hirta Phil. = **Melica longiflora** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica hunzikeri Nicora
Referencias: Nicora, E. G., 1999b; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1792* (SI)].

Melica hyalina Döll
Sin.: *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. var. *montevidensis* Papp, *Melica brasiliana* Ard. f. *truncata* (Papp) Hempel, *Melica hyalina* Döll f. *violacea* Papp, nom. nud., *Melica hyalina* Döll var. *truncata* Papp, *Melica montevidensis* (Papp) Herter, *Melica papilionacea* L. var. *hyalina* (Döll) Hack. ex Kneuck.

Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1980.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, ERI); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15794* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 20486* (MBM)]; URY[*Felippone, F. 3255* (SI), *Mujica Sallés, J. 201* (MVFA)].

Melica hyalina Döll f. *violacea* Papp, nom. nud. = **Melica hyalina** Döll
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Melica hyalina Döll var. *truncata* Papp = **Melica hyalina** Döll
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Melica laxiflora Cav. = **Melica violacea** Cav.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica laxiflora E. Desv. ex M. Muñoz, nom. illeg. = **Melica longiflora** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica laxiflora Cav. f. *hirta* (Phil.) Papp = **Melica longiflora** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica laxiflora Cav. f. *macrior* Hack., nom. nud. = **Melica lilloi** Bech.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica laxiflora Cav. var. *glabra* Papp = **Melica longiflora** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica laxiflora Cav. var. *hirsuta* E. Desv. = **Melica longiflora** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica laxiflora Cav. var. *longiflora* (Steud.) Papp = **Melica longiflora** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica laxiflora Cav. var. *pilosula* Papp = **Melica longiflora** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica laxiflora Cav. var. *typica* Papp, nom. inval. = **Melica longiflora** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica lilloi Bech.
Sin.: *Melica decumbens* Papp, *Melica laxiflora* Cav. f. *macrior* Hack., nom. nud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1980.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CAT, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez 325* (LIL, SI)].

Melica litoralis Phil. = **Melica bahuinii** All.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica litoralis Phil. var. *paulsenii* (Phil.) Papp = **Melica paulsenii** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica litoralis Phil. var. *werdermannii* Papp = **Melica paulsenii** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica longiflora Steud.
Sin.: *Melica berteroana* Phil., *Melica berteroana* Phil. f. *violaceae* Papp, *Melica berteroana* Phil. var. *exaltata* (Phil.) Papp, *Melica berteroana* Phil. var. *pilosula* Papp, *Melica berteroana* Phil. var. *puberula* Papp, *Melica berteroana* Phil. var. *typica* Papp, nom. inval., *Melica exaltata* Phil., *Melica flava* Nees ex Steud. var. *violaceae* Papp, *Melica hirta* Phil., *Melica laxiflora* Cav. f. *hirta* (Phil.) Papp, *Melica laxiflora* Cav. var. *glabra* Papp, *Melica laxiflora* Cav. var. *hirsuta* E. Desv., *Melica laxiflora* Cav. var. *longiflora* (Steud.) Papp, *Melica laxiflora* Cav. var. *pilosula* Papp, *Melica laxiflora* Cav. var. *typica* Papp, nom. inval., *Melica laxiflora* E. Desv. ex M. Muñoz, nom. illeg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Behn, F. s.n.* (SI), *Bertero 422* (G)].

Melica macra Nees
Sin.: *Melica macra* Nees var. *pilosa* Papp
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 3039* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 12979* (MVFA, SI), *Valls, J. F. M. 2969* (ICN)]; URY[*Rosengurtt, B. 6576* (MVFA)].

Melica macra Nees var. *pilosa* Papp = **Melica macra** Nees
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica magellanica Desr. = **Anthoxanthum redolens** (Vahl) P. Royen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica mollis Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Geisse, G. s.n.* (SGO, US)].

Melica monantha Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Melica eremophila** Torres
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Melica montevidensis (Papp) Herter = **Melica hyalina** Döll
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Melica mucronata (Papp) Herter = **Melica brasiliana** Ard.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Melica nitida Phil. = **Melica argentata** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica papilionacea auct. non L. = **Melica rigida** Cav.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Melica papilionacea L. = **Melica brasiliana** Ard.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

[Melica papilionacea L. var. grandiflora Kuntze]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Melica papilionacea L. var. *hyalina* (Döll) Hack. ex Kneuck. = **Melica hyalina** Döll
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica papilionacea L. var. *laxiflora* Kuntze = **Melica argyrea** Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica papilionacea L. var. *violacea* Hieron. = **Melica bonariensis** Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica parodiana Torres
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1980.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); URY(CAS, LAV, MAL, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 17124* (LP, MVFA)]; URY[*Marchi, M. 1481* (MVFA)].

Melica patagonica Parodi
Sin.: *Melica stuckertii* Hack. var. *tenuis* Papp
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1980.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11194* (SI)].

Melica paulsenii Phil.
Sin.: *Melica litoralis* Phil. var. *paulsenii* (Phil.) Papp, *Melica litoralis* Phil. var. *werdermannii* Papp
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(IV, V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO, US)].

Melica pilgeriana Papp = **Melica chilensis** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica poecilantha E. Desv.
Sin.: *Melica poecilantha* E. Desv. var. *umbrosa* E. Desv.

Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. 212* (K, P, US)].

Melica poecilantha E. Desv. var. *umbrosa* E. Desv. = **Melica poecilantha** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica popoviciana Papp = **Melica chilensis** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica rigida Cav.
Sin.: *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. var. *rigida* (Cav.) Papp, *Melica brasiliana* auct. non Ard., *Melica papilionacea* auct. non L.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1975, 1980.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, ERI, RNE, SFE); BRA(RGS, SCA); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 3150* (BAA, MVFA)]; BRA[*Pedersen, T. M. 12567* (CTES, MVFA)]; URY[*Mujica Sallés, J. 333* (MVFA)].

Melica riograndensis Longhi-Wagner & Valls
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Simas, V. 73* (BLA, ICN)].

[Melica sarmentosa Nees var. cymbaria Ekman]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Melica sarmentosa Nees var. *glabrior* Döll = **Melica sarmentosa** Nees var. **sarmentosa**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica sarmentosa Nees var. **monticola** Torres
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1980.
Hierba. Perenne. Endémica. 1300–1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiner, E. J. 1391* (MVFA), *Venturi, S. 4064* (SI)].

Melica sarmentosa Nees var. **pilosula** Döll
Sin.: *Melica sarmentosa* Nees var. *typica* Papp, nom. inval.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1980.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 460* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 12527* (MVFA)]; PRY[*Hassler, E. 1415* (SI), *Rojas, T. 333* (MVM)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Longhi-Wagner, 1987; Mujica Sallés, 1996; Soreng et al., 2003).

Melica sarmentosa Nees var. **sarmentosa**
Sin.: *Melica sarmentosa* Nees var. *glabrior* Döll
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1980.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA); URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 643* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 17339* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5407* (BM)]; URY[*Rosengurtt, B. 11267* (MVFA)].

Melica sarmentosa Nees var. *typica* Papp, nom. inval. = **Melica sarmentosa** Nees var. **pilosula** Döll

[Melica scandens Larrañaga]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Melica serrana Mujica-Sallés & M. Marchi
Referencias: Mujica Sallés, J. & Marchi, M., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 400–600 m.
Países: URY(MAL).
Ejemplares de referencia: URY[*Marchi, M. 1464* (MVFA)].

Melica spartinoides L.B. Sm.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Valls, J. F. M. 3108* (ICN)].

Melica stuckertii Hack.
Sin.: *Melica cordobensis* Hack., *Melica stuckertii* Hack. var. *cordobensis* (Hack.) Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1970c, 1980.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, SDE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 1315* (CORD), *Burkart, A. 10911* (SI)].

[Melica stuckertii Hack. f. violacea Papp]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Melica stuckertii Hack. var. *cordobensis* (Hack.) Hack. = **Melica stuckertii** Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica stuckertii Hack. var. *tenuis* Papp = **Melica patagonica** Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica tandilensis (Kuntze) Herter = **Melica brasiliana** Ard.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996.

Melica tenuis Hack. ex Arechav.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1980.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(GUA); URY(LAV, MAL, MON, PAY, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwartz 6417* (BAA, LIL)]; BRA[*Rosengurtt, B. 9044* (MVFQ)]; PRY[*Montes, J. E. 3321* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 9893* (MVFA)].

Melica tortuosa Phil. = **Melica argentata** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica valdiviana Phil. = **Melica violacea** Cav.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica violacea Cav.
Sin.: *Melica alata* Nees ex Steud., *Melica alata* Nees ex Steud. var. *filiculmis* (Desv.) Papp, *Melica alata* Nees ex Steud. var. *mollis* Papp, *Melica filiculmis* Desv., *Melica flava* Nees ex Steud., *Melica laxiflora* Cav., *Melica valdiviana* Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (B, US)].

Melica violacea Cav. f. *mucronata* Papp = **Melica decipiens** Caro
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica violacea Cav. var. *argentata* Papp = **Melica argentata** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica violacea Cav. var. *commersonii* (Nees ex Steud.) Papp = **Melica commersonii** Nees ex Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica violacea Cav. var. *commutata* (Steud.) Papp = **Melica commersonii** Nees ex Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica violacea Cav. var. *glabrescens* Torres = **Melica glabrescens** (Torres) Torres
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica violacea Cav. var. *glabrior* Papp = **Melica decipiens** Caro
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Melica violacea Cav. var. *pallida* E. Desv. = **Melica commersonii** Nees ex Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Melica weberbaueri Pilg. var. talcahuanoensis Papp]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Melinis P. Beauv.
Número de especies: 2 introducidas

Melinis minutiflora P. Beauv.
Referencias: Cialdella, A. M., 1994d; Martínez Crovetto, R., 1977; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–900 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Martínez Crovetto, R. 10032* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 24836* (MBM)]; PRY[*Brunner, D. R. 1963* (MO)].

Melinis repens (Willd.) Zizka
Sin.: *Rhynchelytrum repens* (Willd.) A. Berger, *Rhynchelytrum roseum* (Nees) Stapf & C.E. Hubb., *Saccharum repens* Willd.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortiz, M., 1994; Burkart, A., 1969a; Cantero, J. J., Núñez, C. O., Geymonat, M. & Chiacchiera, G., 1996; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1300 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CAN, PAI); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1048* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 15392* (HBR)]; PRY[*Kiesling, R. 9515* (G, PY, SI)]; URY[*Millot 2110* (IAC)].

Merostachys Spreng.

Número de especies: 14, 5 endémicas

Merostachys anomala Dutra = **Merostachys multiramea** Hack.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Merostachys ciliata McClure & L.B. Sm.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5940* (US)].

Merostachys claussenii Munro
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Parodi, L. R., 1936b.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5139* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 14367* (SI)].

Merostachys fischeriana Rupr. ex Döll
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15934* (MBM)].

Merostachys glauca McClure & L.B. Sm.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 200–700 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2737* (US)].

Merostachys kleinii Send.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Sendulsky, T., 1995.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 11008* (RB, US)].

Merostachys kunthii Rupr.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 11990* (S)].

Merostachys multiramea Hack.
Sin.: *Merostachys anomala* Dutra
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Renvoize, S. A., 1988; Sendulsky, T., 1995; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 400–1100 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 5989* (BAA)]; BRA[*Smith, L. B. 15703* (HBR, US)]; PRY[*Klein, R. M. 9321* (HBR, US)].

Merostachys petiolata Döll
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 18154* (HBR, US)].

Merostachys pilifera Send.
Referencias: Sendulsky, T. & Soderstrom, T. R., 1984; Sendulsky, T., 1995.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 900–1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Soderstrom, T. R. 1987* (RB)].

Merostachys pluriflora Munro ex E.G. Camus
Sin.: *Bambusa pubescens* Döll, hom. illeg., *Brasilocalamus pubescens* Nakai

Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 7866* (HBR, US)].

Merostachys skvortzovii Send.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Sendulsky, T., 1995.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Porto, M. L. s.n.* (ICN)].

Merostachys speciosa Spreng.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; McClure, F. A. & Smith, L. B., 1967; Renvoize, S. A., 1988; Sendulsky, T., 2001; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 2116* (HBR, US)].

Merostachys ternata Nees
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6725* (HBR, US)].

Merostachys vestita McClure & L.B. Sm.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Swallen, J. R. 8290* (US)].

Mesosetum Steud.

Número de especies: 3, 1 endémica

Mesosetum chaseae Luces
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 1994b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. s.n.* (BAA)].

Mesosetum comatum Swallen
Referencias: Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1987.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1000* (SI), *Zuloaga, F. O. 5329* (SI)].

Mesosetum ferrugineum (Trin.) Chase
Sin.: *Panicum ferrugineum* Trin.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10610* (K, NY)].

Microbriza brachychaete (Ekman) Parodi ex Nicora & Rúgolo = **Poidium brachychaetum** (Ekman) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Microbriza poimorpha (J. Presl) Parodi ex Nicora & Rúgolo = **Poidium poimorphum** (J. Presl) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Microchloa R. Br.

Número de especies: 2

Microchloa indica (L. f.) Kuntze, comb. superfl. = **Microchloa indica** (L. f.) P. Beauv. var. **indica**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Microchloa indica (L. f.) P. Beauv. var. **indica**
Sin.: *Microchloa indica* (L. f.) Kuntze, comb. superfl., *Microchloa setacea* (Roxb.) R. Br., *Nardus indica* L. f.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Türpe, A. M., 1975a.
Hierba. Perenne. Introducida. 2300–2400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(I); PRY(PAI); URY(ART, LAV, PAY, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 102* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 11538* (HBR)]; CHL[*Troll, C. 3257* (CONC)]; PRY[*Morrone, O. 187* (MO, SI)]; URY[*Marchesi, E. 23431* (MVFA)].

Microchloa indica (L. f.) P. Beauv. var. **tenuis** Hack.
Referencias: Parodi, L. R., 1918; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Stuckert, T. T. J. V. 226* (BAA)].

Microchloa kunthii Desv.
Referencias: Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1987; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS); BRA(PAR); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 925* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 21035* (MBM)]; CHL[*Peterson, P. M. 15698* (CONC)].

Microchloa setacea (Roxb.) R. Br. = **Microchloa indica** (L. f.) P. Beauv. var. **indica**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Milium compressum Sw. = **Axonopus compressus** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994.

Milium juncoides Speg. = **Anthaenantia lanata** (Kunth) Benth.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Milium lanatum (Kunth) Roem. & Schult. = **Anthaenantia lanata** (Kunth) Benth.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G., 1978.

Milium natans Spreng. = **Luziola peruviana** Juss. ex J.F. Gmel.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Milium punctatum L. = **Eriochloa punctata** (L.) Desv. ex Ham.
Referencias: Arriaga, M. O., 1994; Burkart, A., 1969a.

Miscanthus Andersson

Número de especies: 1 introducida

Miscanthus sinensis Andersson
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: CHL(VII); URY(MON).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 549* (CONC)]; URY[*Lombardo, A. 6196* (MVJB)].

Mnesithea Kunth

Número de especies: 6

Mnesithea aurita (Steud.) de Koning & Sosef
Sin.: *Coelorachis aurita* (Steud.) A. Camus, *Manisuris aurita* (Steud.) Hitchc. & Chase, comb. superfl., *Manisuris aurita* (Steud.) Kuntze, *Rottboellia aurita* Steud.
Referencias: Quarín, C. L., 1979; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 24670* (SI)]; BRA[*Dombrowski, L. T. 9398* (MBM)]; PRY[*Balansa, B. 2975* (SI)].

Mnesithea balansae (Hack.) de Koning & Sosef
Sin.: *Coelorachis balansae* (Hack.) A. Camus, *Coelorachis balansae* (Hack.) Herter, comb. superfl., *Manisuris balansae* (Hack.) Parodi, *Rottboellia balansae* Hack.
Referencias: Quarín, C. L., 1979; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS); PRY(AMA, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 4074* (BAA), *Quarín, C. L. 2849* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 30204* (SI)].

Mnesithea granularis (L.) de Koning & Sosef
Sin.: *Cenchrus granularis* L., *Hackelochloa granularis* (L.) Kuntze
Referencias: Parodi, L. R., 1928a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(SAL); PRY(AMA, CON, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 31821* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 12907* (BM)].

Mnesithea parodiana (Henrard) de Koning & Sosef
Sin.: *Coelorachis parodiana* Henrard, *Rottboellia parodiana* (Henrard) Burkart
Referencias: Quarín, C. L., 1979; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, FOR, LRI); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 8410* (BAA, L)]; PRY[*Nicora, E. G. 9728* (SI)].

Mnesithea selloana (Hack.) de Koning & Sosef
Sin.: *Coelorachis selloana* (Hack.) A. Camus, *Coelorachis selloana* (Hack.) Herter, comb. superfl., *Manisuris selloana* (Hack.) Kuntze, *Rottboellia selloana* Hack.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Quarín, C. L., 1979; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(GUA); URY(FLA, MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14089* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 11019* (HBR)]; PRY[*Montes, J. E. 3322* (SI)]; URY[*Gallinal 5860* (SI), *Mujica Sallés, J. 260* (MVFA)].

Mnesithea subgibbosa (Winkl. ex Hack.) de Koning & Sosef
Sin.: *Rhytachne subgibbosa* (Winkl. ex Hack.) Clayton, *Rottboellia loricata* Trin. subsp. *subgibbosa* Winkl. ex Hack.
Referencias: Quarín, C. L., 1979; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAU, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Quarín, C. L. 2739* (CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 30684* (MBM)]; PRY[*Morrone, O. 560* (MO, SI)].

Monachne racemosa P. Beauv. = **Panicum racemosum** (P. Beauv.) Spreng.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Monachne urvilleana (Kunth) Herter = **Panicum urvilleanum** Kunth
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Monandraira berteroana (Kunth) E. Desv. = **Deschampsia berteroana** (Kunth) Trin.
Referencias: Finot, V. L. & Matthei, O. R., 2001[2000].

Monandraira glauca E. Desv. = **Deschampsia monandra** Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Monandraira patula Phil. = **Deschampsia patula** (Phil.) Pilg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Monanthochloe Engelm.

Número de especies: 1 endémica

Monanthochloe acerosa (Griseb.) Speg.
Sin.: *Halochloa acerosa* Griseb.
Referencias: Parodi, L. R., 1954; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(COR, LRI, SDE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 1909* (CORD)].

Monanthochloe australis Speg. = **Distichlis australis** (Speg.) Villamil
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Monerma cylindrica (Willd.) Coss. & Durieu = **Hainardia cylindrica** (Willd.) Greuter
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Moorea araucana (Stapf) Stapf = **Cortaderia araucana** Stapf
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Moorea quila (Molina) Stapf = **Chusquea quila** Kunth
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Moorochloa Veldkamp

Número de especies: 1 introducida

Moorochloa eruciformis (Sm.) Veldkamp
Sin.: *Brachiaria eruciformis* Griseb., *Panicum eruciforme* Sm.
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1992; Veldkamp, J., 2004.
Hierba. Anual. Introducida. 0–100 m.
Países: ARG(ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7045* (SI)].

Muhlenbergia Schreb.

Número de especies: 14, 1 endémica

Muhlenbergia angustata (J. Presl) Kunth
Sin.: *Epicampes coerulea* Griseb., *Epicampes coerulea* Griseb. var. *submutica* Hack., *Epicampes kunthiana* Griseb., *Epicampes phleoides* (Kunth) Griseb., *Muhlenbergia coerulea* (Griseb.) Mez, *Podosaemum angustatum* J. Presl
Referencias: Soderstrom, T. R., 1967; Türpe, A. M., 1975a.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(COR, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 24202* (CORD)].

Muhlenbergia arenicola Buckley
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 8770* (GB, MO, NY, POM)].

Muhlenbergia asperifolia (Nees & Meyen ex Trin.) Matthei, comb. superfl. = **Muhlenbergia asperifolia** (Nees & Meyen ex Trin.) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Muhlenbergia asperifolia (Nees & Meyen ex Trin.) Parodi
Sin.: *Agrostis distichophylla* Phil., hom. illeg., *Agrostis eremophila* Speg., *Muhlenbergia asperifolia* (Nees & Meyen ex Trin.) Matthei, comb. superfl., *Sporobolus asperifolius* (Nees & Meyen ex Trin.) Nees, *Sporobolus copiapinus* Phil., *Sporobolus deserticolus* Phil., *Sporobolus distichophyllus* Phil., *Sporobolus sarmentosus* Griseb., *Vilfa asperifolia* Nees & Meyen ex Trin.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SFE, SJU, TUC); CHL(I, II, III, IV, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 163* (CORD)]; CHL[*Werdermann, E. 955* (CONC)].

Muhlenbergia atacamensis Parodi = **Chaboissaea atacamensis** (Parodi) P.M. Peterson & Annable
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Muhlenbergia atacamensis Parodi var. *brachyanthera* Parodi = **Chaboissaea atacamensis** (Parodi) P.M. Peterson & Annable
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Muhlenbergia breviaristata (Hack.) Parodi
Sin.: *Muhlenbergia phragmitoides* Griseb. var. *breviaristata* Hack.
Referencias: Parodi, L. R., 1928c; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Türpe, A. M., 1975a.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 1696* (BAA)].

Muhlenbergia ciliata (Kunth) Kunth, comb. superfl. = **Muhlenbergia ciliata** (Kunth) Trin.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Muhlenbergia ciliata (Kunth) Trin.
Sin.: *Muhlenbergia ciliata* (Kunth) Kunth, comb. superfl., *Podosaemum ciliatum* Kunth
Referencias: Peterson, P. M. & Annable, C. R., 1991; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 3700 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 8770* (GB, MO, NY, POM)].

[Muhlenbergia circinata Kuntze]
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Notas: Nombre dudoso.

Muhlenbergia clomena Kunth, nom. superfl. = **Muhlenbergia peruviana** (P. Beauv.) Steud.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Muhlenbergia coerulea (Griseb.) Mez = **Muhlenbergia angustata** (J. Presl) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Muhlenbergia diffusa Schreb., hom. illeg. = **Muhlenbergia schreberi** J.F. Gmel.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Muhlenbergia diffusa Willd. = **Muhlenbergia schreberi** J.F. Gmel.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Muhlenbergia elegans (Kunth) Trin. = **Muhlenbergia rigida** (Kunth) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Muhlenbergia fastigiata (J. Presl) Henrard
Sin.: *Sporobolus fastigiatus* J. Presl
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b; Matthei, O. R., 1984; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 3400–4500 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2693* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 1138* (CONC)].

Muhlenbergia gracillima Torr. = **Muhlenbergia torreyi** (Kunth) Hitchc. ex Bush
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Muhlenbergia ligularis (Hack.) Hitchc.
Sin.: *Sporobolus ligularis* Hack.
Referencias: Peterson, P. M. & Annable, C. R., 1991; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 1000–1400 m.
Países: ARG(CAT, COR, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 6377* (US)].

Muhlenbergia nana Benth. = **Muhlenbergia peruviana** (P. Beauv.) Steud.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Muhlenbergia nardifolia Griseb. = **Muhlenbergia torreyi** (Kunth) Hitchc. ex Bush
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Muhlenbergia peruviana (P. Beauv.) Steud.
Sin.: *Agrostis peruviana* (P. Beauv.) Spreng., *Clomena peruviana* P. Beauv., *Muhlenbergia clomena* Kunth, nom. superfl., *Muhlenbergia nana* Benth.
Referencias: Matthei, O. R., 1984; Parodi, L. R., 1928c; Peterson, P. M. & Annable, C. R., 1991; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 3000–4500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC); CHL(I, II, VII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Negritto, M. A. 386* (CORD, CTES, SI)]; CHL[*Marticorena, A. 351* (CONC)].

Muhlenbergia phragmitoides Griseb. = **Muhlenbergia rigida** (Kunth) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Muhlenbergia phragmitoides Griseb. var. *breviaristata* Hack. = **Muhlenbergia breviaristata** (Hack.) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Muhlenbergia quitensis (Kunth) Hitchc. = **Muhlenbergia tenuifolia** (Kunth) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Muhlenbergia ramulosa (Kunth) Swallen
Sin.: *Agrostis ramulosa* (Kunth) Roem. & Schult., *Sporobolus ramulosus* (Kunth) Kunth, *Vilfa ramulosa* Kunth
Referencias: Peterson, P. M. & Annable, C. R., 1991.
Hierba. Anual. Nativa.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 2993* (US)].

Muhlenbergia rariflora Hook. f. = **Ortachne rariflora** (Hook. f.) Hughes
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Muhlenbergia rigida (Kunth) Trin., nom. inval. = **Muhlenbergia rigida** (Kunth) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Muhlenbergia rigida (Kunth) Kunth
Sin.: *Muhlenbergia elegans* (Kunth) Trin., *Muhlenbergia phragmitoides* Griseb., *Muhlenbergia rigida* (Kunth) Trin., nom. inval., *Podosaemum rigidum* Kunth
Referencias: Parodi, L. R., 1928c; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Türpe, A. M., 1975a.
Hierba. Perenne. Nativa. 1200–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 6866* (SI)].

Muhlenbergia schreberi J.F. Gmel.
Sin.: *Muhlenbergia diffusa* Schreb., hom. illeg., *Muhlenbergia diffusa* Willd.
Referencias: Parodi, L. R., 1928c; Peterson, P. M. & Annable, C. R., 1991; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 1300–2000 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hauman, L. L. s.n.* (BA), *Montes, J. E. 15340* (SI), *Morrone, O. 2282* (SI)]; URY[*Marchesi, E. 20248* (MVFA)].
Notas: Citada para Brasil sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Peterson et al., 2001).

Muhlenbergia tenella (Kunth) Trin.
Sin.: *Podosaemum tenellum* Kunth
Referencias: Parodi, L. R., 1928c, 1948; Türpe, A. M., 1975a.
Hierba. Anual. Nativa. 1400–3700 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11579* (SI)].

Muhlenbergia tenuifolia (Kunth) Kunth
Sin.: *Calamagrostis tenuifolia* Kunth, *Muhlenbergia quitensis* (Kunth) Hitchc.
Referencias: Peterson, P. M. & Annable, C. R., 1991; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Nativa.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 7239* (BAA)].

Muhlenbergia torreyi (Kunth) Hitchc. ex Bush
Sin.: *Agrostis torreyi* Kunth, *Muhlenbergia gracillima* Torr., *Muhlenbergia nardifolia* Griseb.
Referencias: Jacob, N. C. & Covas, G., 1981; Peterson, P. M. & Ortíz Diaz, J. J., 1998; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, MEN, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Peterson, P. M. 11418* (US)].

Munroa Torr.

Número de especies: 4, 1 endémica

Munroa andina Phil.
Sin.: *Hemimunroa andina* (Phil.) Parodi, *Hemimunroa andina* (Phil.) Parodi var. *breviseta* (Hack.) Parodi, *Munroa andina* Phil. var. *breviseta* Hack., *Munroa multiflora* Phil.
Referencias: Anton, A. M. & Hunziker, A. T., 1978; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 2600–4100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos 27724* (SI), *Lillo, M. 9645* (LIL)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 97727* (CONC), *Matthei, O. R. 215* (CONC)].

Munroa andina Phil. var. *breviseta* Hack. = **Munroa andina** Phil.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Munroa argentina Griseb.
Referencias: Anton, A. M. & Hunziker, A. T., 1978; Matthei, O. R., Marticorena, C., Arroyo, M. T. K., Muñoz, M., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 2300–4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 397* (SI)]; CHL[*Peterson, P. M. 15505* (CONC)].

Munroa benthamiana Hack. ex Kuntze = **Blepharidachne benthamiana** (Hack. ex Kuntze) Hitchc.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Munroa decumbens Phil.
Referencias: Anton, A. M. & Hunziker, A. T., 1978; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 2800–4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31699* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 84* (CONC)].

Munroa mendocina Phil.
Referencias: Anton, A. M. & Hunziker, A. T., 1978.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 7817* (SI)].

Munroa multiflora Phil. = **Munroa andina** Phil.

Nardus indica L. f. = **Microchloa indica** (L. f.) P. Beauv. var. **indica**

Nassella (Trin.) E. Desv.
Número de especies: 98, 72 endémicas

Nassella aemulans F. Phil., nom. nud. = **Nassella gigantea** (Steud.) M. Muñoz
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Nassella airoides (Ekman) Barkworth
Sin.: *Stipa airoides* Ekman
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Barkworth, M. E., 1990; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1730* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 13236* (SI)].
Notas: Citada para Paraguay y Uruguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Soreng et al., 2003).

Nassella amethystina (Steud.) Barkworth = **Nassella poeppigiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Nassella arcaënsis (Speg.) Torres
Sin.: *Stipa arcaënsis* Speg., *Stipa paniculata* Hitchc.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 275* (SI), *Jörgensen, P. 1393* (BA, LIL, LP)].

Nassella arcuata (R.E. Fr.) Torres
Sin.: *Stipa arcuata* R.E. Fr.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 1800–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 183* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 101* (CONC)].

Nassella arechavaletae (Speg.) Barkworth
Sin.: *Stipa arechavaletae* Speg.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Barkworth, M. E., 1990; Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS); URY(MAL, MON, RIV, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)]; BRA[*Swallen, J. R. 7533* (PEL)]; URY[*Rosengurtt, B. 9707* (MVFA)].

Nassella argentinensis (Speg.) Peñailillo
Sin.: *Stipa argentinensis* Speg., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *virescens* Hack.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Peñailillo, P. B., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Spegazzini, C. L., 1925a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Costany 5* (SI)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Barkworth & Torres, 2001).

Nassella asplundii Hitchc.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 3600–4000 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, A. 366* (CONC)].

Nassella barrancaensis (F.A. Roig) Barkworth = **Jarava barrancaensis** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Nassella bonariensis (Henrard & Parodi) Barkworth = **Nassella melanosperma** (J. Presl) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Nassella brachychaeta (Godr.) Barkworth = **Amelichloa brachychaeta** (Godr.) Arriaga & Barkworth
Referencias: Arriaga, M. O. & Barkworth, M. E., 2006.

Nassella brachychaetoides (Speg.) Barkworth
Sin.: *Stipa brachychaetoides* Speg.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Türpe, A. M. 1151p.p.* (LIL)].

Nassella brachyphylla (Hitchc.) Barkworth
Sin.: *Stipa brachyphylla* Hitchc.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30729* (LP)].

Nassella brasiliensis (A. Zanin & Longhi-Wagner) Peñailillo
Sin.: *Stipa brasiliensis* A. Zanin & Longhi-Wagner
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Peñailillo, P. B., 1998; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Zanin, A. 17* (CEN, ICN, MVFA)].

Nassella burkartii (Torres) Barkworth & Torres
Sin.: *Stipa burkartii* Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 5660* (SI)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Barkworth & Torres, 2001; Soreng et al., 2003).

Nassella cabrerae Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 3400–3900 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9299* (BAA, LP), *Cialdella, A. M. 161* (SI), *Deginani, N. B. 501* (SI)].

Nassella caespitosa Griseb.
Sin.: *Oryzopsis caespitosa* (Griseb.) Ball, *Stipa caespitosa* (Griseb.) Speg., *Stipa caespitosa* (Griseb.) Speg. var. *subtypica* Speg., *Stipa plagiostephana* Speg., *Stipa violacea* Hitchc.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 2400–4200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 446* (SI), *Lorentz, P. G. 78* (BAA, CORD)].

Nassella carettei (Hauman) Torres
Sin.: *Stipa carettei* Hauman
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1200–2100 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dawson, G. 3185* (LP)].

Nassella catamarcensis Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1600–2000 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 14174* (BAA)].

Nassella charruana (Arechav.) Barkworth
Sin.: *Stipa charruana* Arechav., *Stipa longicylindrica* Kuntze
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Barkworth, M. E., 1990; Cabrera, A. L. & Torres. M. A., 1968; Mujica Sallés, J., 1996; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1993; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE); BRA(RGS); URY(CAS, COL, FLO, MAL, MON, PAY, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 12* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 6983* (CEN, CNPO)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 1351* (SI)].

Nassella chilensis (Trin.) E. Desv.
Sin.: *Nassella floribunda* Phil., *Nassella landbeckii* Phil., *Nassella landbeckii* Phil. var. *eremophila* Phil., *Nassella laxiflora* Phil., *Nassella major* (Trin. & Rupr.) E. Desv., *Nassella obscura* F. Phil., *Nassella planifolia* Phil., *Nassella ramosa* E. Desv., *Nassella sadae* Phil., *Piptatherum lindleyanum* Nees, *Piptatherum ramosum* Nees, *Urachne chilensis* Trin., *Urachne major* Trin., *Urachne ramosa* Steud., nom. superfl.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Barkworth, M. E., 1990.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 340* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996172* (CONC)].

Nassella chilensis (Trin.) E. Desv. var. *juncea* (Phil.) M. Muñoz = **Nassella juncea** Phil.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Nassella clarazii (Ball) Barkworth
Sin.: *Stipa clarazii* Ball, *Stipa clarazii* Ball var. *bulbosa* Speg., *Stipa clarazii* Ball var. *typica* Speg., nom. inval., *Stipa quadrifaria* Kuntze
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, RNE, SAL, SFE, SLU, TUC); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Claraz, M. G. 21* (BAA), *Deginani, N. B. 368* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 7440* (SI)].

Nassella coquimbensis (Matthei) Peñailillo
Sin.: *Stipa coquimbensis* Matthei
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Peñailillo, P. B., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 163* (CONC)].

Nassella cordobensis (Speg.) Barkworth
Sin.: *Stipa cordobensis* Speg., *Stipa cordobensis* Speg. var. *tuberculata* F.A. Roig, *Stipa papillosa* (Hack.) Hitchc., *Stipa tenuis* Phil. var. *papillosa* Hack.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–2100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 24589* (LP), *Giardelli, M. L. 928* (SI)].

Nassella corniculata Hack. = **Nassella meyeniana** (Trin. & Rupr.) Parodi
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Nassella crassiflora (Roseng. & B.R. Arrill.) Barkworth
Sin.: *Stipa crassiflora* Roseng. & B.R. Arrill.
Referencias: Barkworth, M. E., 1990; Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(MAL).
Ejemplares de referencia: URY[*Chebataroff, J. 500–575* (MVFA)].

Nassella curamalalensis (Speg.) Barkworth
Sin.: *Stipa curamalalensis* Speg., *Stipa tenuissima* Trin. var. *curamalalensis* (Speg.) Hack.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Cabrera, A. L. & Torres, M. A., 1970; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA); URY(SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini s.n.* (LP, LPS)]; URY[*Rosengurtt, B. 5526pe* (MVFA)].

Nassella curviseta (Hitchc.) Barkworth
Sin.: *Stipa curviseta* Hitchc.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 1800–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 15274* (LP), *Deginani, N. B. 649* (SI)].

Nassella dasycarpa (Hitchc.) Torres
Sin.: *Stipa dasycarpa* Hitchc.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 25073* (LP)].

Nassella deltoidea Hack. = **Nassella pubiflora** (Trin. & Rupr.) E. Desv. var. **pubiflora**
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Nassella depauperata (Pilg.) Barkworth var. **depauperata**
Sin.: *Stipa depauperata* Pilg., *Stipa depauperata* Pilg. var. *humilis* Pilg., *Stipa leptothera* Speg. var. *atroviolacea* Hack.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.

Hierba. Perenne. Nativa. 3200–5000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 4099* (LP)].

Nassella depauperata (Pilg.) Barkworth var. **glabrata** (Pilg.) Torres
Sin.: *Stipa depauperata* Pilg. var. *glabrata* Pilg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 12132* (BAA, LP)].

Nassella duriuscula (Phil.) Barkworth
Sin.: *Stipa barbinodis* Phil., *Stipa duriuscula* Phil.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1100 m.
Países: CHL(III, IV, V, VI, VIII, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 5292* (CONC)].

Nassella elata (Speg.) Torres
Sin.: *Stipa caespitosa* (Griseb.) Speg. var. *elata* Speg.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 16281* (LP)].

Nassella entrerriensis (Burkart) Peñailillo
Sin.: *Stipa entrerriensis* Burkart
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Burkart, A., 1969a; Peñailillo, P. B., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); URY(CAS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jozami, J. M. 8* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 7279b* (MVFA)].

Nassella exserta Phil. = **Nassella gigantea** (Steud.) M. Muñoz
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Nassella exserta Phil. var. *asperata* Parodi = **Nassella gibba** (Phil.) M. Muñoz
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Nassella fabrisii Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1300–2000 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 1374* (LP)].

Nassella famatinensis Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3500 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 1965* (BAA)].

Nassella filiculmis (Delile) Barkworth
Sin.: *Stipa ceresiensis* Kuntze, *Stipa filiculmis* Delile, *Stipa filiculmis* Delile var. *major* Speg., *Stipa filiculmis* Delile var. *minor* Speg., *Stipa leucogluma* Steud., *Stipa trichocaulos* Phil.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SFE, SLU); BRA(RGS, SCA); CHL(VIII, IX, X); URY(FLA, LAV, MAL, PAY, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28589* (SI)]; BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 1647* (CEN, ICN)]; CHL[*Philippi, R. A. 312* (BM)]; URY[*Mujica Sallés, J. 230* (MVFA)].

Nassella flaccidula Hack. = **Nassella pubiflora** (Trin. & Rupr.) E. Desv. var. **pubiflora**
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Nassella flaccidula Hack. var. *humilior* Hack. = **Nassella pubiflora** (Trin. & Rupr.) E. Desv. var. **humilior** (Hack.) Torres
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Nassella floribunda Phil. = **Nassella chilensis** (Trin.) E. Desv.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Nassella formicarum (Delile) Barkworth
Sin.: *Stipa formicarum* Delile
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Caro, J. A., 1966; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, RNE); URY(SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15888* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 139e* (MVFA)].

Nassella fuscescens Phil. = **Nassella gigantea** (Steud.) M. Muñoz
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Nassella gibba (Phil.) M. Muñoz
Sin.: *Nassella exserta* Phil. var. *asperata* Parodi, *Piptochaetium gibbum* Phil.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Boelcke, O. 3809* (SI)].

Nassella gigantea (Steud.) M. Muñoz
Sin.: *Nassella aemulans* F. Phil., nom. nud., *Nassella exserta* Phil., *Nassella fuscescens* Phil., *Nassella melanocarpa* Phil., *Nassella pugae* Phil., *Urachne aemulans* Steud. ex Lechl., *Urachne gigantea* Steud., *Urachne melanocarpa* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Muñoz-Schick, M., 1990; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 423* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 994893* (CONC, SGO)].

Nassella glabripoda Torres var. **glabripoda**
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4500 m.
Países: ARG(JUJ, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. s.n.* (BAA, LIL)].

Nassella glabripoda Torres var. **planifolia** Torres
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3500 m.
Países: ARG(JUJ, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 5993* (BAA, CORD)].

Nassella hirtifolia (Hitchc.) Barkworth
Sin.: *Stipa hirtifolia* Hitchc.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(IV, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 223* (CONC)].

Nassella holwayii (Hitchc.) Barkworth
Sin.: *Stipa holwayii* Hitchc.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4200 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 20688a* (LP), *Cialdella, A. M. 493* (SI)].

Nassella humilis Phil. = **Nassella pungens** E. Desv.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Nassella hunzikeri (Caro) Barkworth
Sin.: *Stipa hunzikeri* Caro
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Cantero, J. J., Núñez, C. O., Geymonat, M. & Chiacchiera, G., 1996; Caro, J. A., 1966; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 12566* (CORD)].

Nassella hyalina (Nees) Barkworth
Sin.: *Stipa hyalina* Nees
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS); URY(CAS, FLO, FLA, MON, PAY, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 13907* (SI), *Burkart, A. 21111* (SI), *Lillo, M. 18000* (LIL)]; BRA[*Valls, J. F. M. 2508* (CEN, ICN)]; URY[*Del Puerto, O. 2345* (SI), *Herter, W. G. F. 83102* (SI), *Rosengurtt, B. 5836* (MVFA)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Soreng et al., 2003).

Nassella inconspicua (J. Presl) Barkworth
Sin.: *Stipa caespitosa* (Griseb.) Speg. var. *lilloi* Hack., *Stipa caespitosa* (Griseb.) Speg. var. *subelata* Speg., *Stipa inconspicua* J. Presl
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 1600–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 59* (SI)].

Nassella johnstonii Parodi = **Nassella pungens** E. Desv.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Nassella juergensii (Hack.) Barkworth
Sin.: *Stipa juergensii* Hack.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Barkworth, M. E., 1990; Mujica Sallés, J., 1996; Parodi, L. R., 1943a; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 100 m.
Países: ARG(COS, ERI); BRA(RGS, SCA); URY(FLO, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, TYT).

Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 12657* (BAA)]; BRA[*Jürgens, C. s.n.* (W)]; URY[*Izaguirre de Artuccio, P. 47* (MVFA), *Rosengurtt, B. 2696-b* (SI)].

Nassella juncea Phil.
Sin.: *Nassella chilensis* (Trin.) E. Desv. var. *juncea* (Phil.) M. Muñoz
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(VII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Krause s.n.* (K, SGO, US)].

Nassella lachnophylla (Trin.) Barkworth
Sin.: *Stipa cumingiana* Trin., *Stipa cumingiana* Trin. var. *lachnophylla* (Trin.) Trin. & Rupr., *Stipa hirta* Phil., *Stipa lachnophylla* Trin., *Stipa laxa* E. Desv., *Stipa leiocarpa* Nees ex Steud.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: CHL(IV, V, VI, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grandjot, G. F. 4657* (SI)].

Nassella laevissima (Phil.) Barkworth
Sin.: *Nassella longearistata* Phil., *Piptochaetium collinum* Phil., *Piptochaetium laevissimum* Phil., *Stipa breviculmis* Hitchc., *Stipa collina* Phil., *Stipa laevissima* (Phil.) Speg., *Stipa lahittei* Parodi
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Parodi, L. R., 1944; Roig, F. A., 1978a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(CHU, LPA); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 9793* (SI)]; CHL[*Espinoza, N. 48* (SI)].

Nassella landbeckii Phil. = **Nassella chilensis** (Trin.) E. Desv.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Nassella landbeckii Phil. var. *eremophila* Phil. = **Nassella chilensis** (Trin.) E. Desv.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Nassella laxiflora Phil. = **Nassella chilensis** (Trin.) E. Desv.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Nassella leptocoronata (Roseng. & B.R. Arrill.) Barkworth
Sin.: *Stipa leptocoronata* Roseng. & B.R. Arrill.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(ART, COL, SAO).
Ejemplares de referencia: URY[*Millot 540* (MVFA)].

Nassella leptothera (Speg.) Torres
Sin.: *Stipa leptothera* Speg.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–3000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 24894* (CORD)].

Nassella ligularis (Griseb.) Barkworth & Torres
Sin.: *Stipa ligularis* (Griseb.) Speg., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *ligularis* Griseb.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 485* (CORD)].

Nassella linearifolia (E. Fourn.) R. W. Pohl
Sin.: *Stipa linearifolia* E. Fourn.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Nativa. 2800–4200 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Peterson, P. M. 15593* (CONC)].

Nassella longearistata Phil. = **Nassella laevissima** (Phil.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Nassella longicoronata (Roseng. & B.R. Arrill.) Barkworth
Sin.: *Stipa longicoronata* Roseng. & B.R. Arrill.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(ART).
Ejemplares de referencia: URY[*Millot 538 b* (SI)].

Nassella longiglumis (Phil.) Barkworth
Sin.: *Stipa longiglumis* Phil.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(IV, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 466* (CONC)].

Nassella macrathera (Phil.) Barkworth
Sin.: *Stipa macrathera* Phil., *Stipa rudolphii* Speg., nom. illeg.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: CHL(IV, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 20281* (CONC)].

Nassella major (Trin. & Rupr.) E. Desv. = **Nassella chilensis** (Trin.) E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Nassella manicata (E. Desv.) Barkworth
Sin.: *Stipa manicata* E. Desv.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Roig, F. A., 1964; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2800 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN); CHL(III, IV, V, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Illin, N. 142* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 35769* (CONC)].

Nassella megapotamica (Spreng. ex Trin.) Barkworth
Sin.: *Stipa latifolia* Hack. ex Arechav., hom. illeg., *Stipa latissimifolia* Kuntze, *Stipa manicata* E. Desv. var. *latifolia* Speg., *Stipa manicata* E. Desv. var. *media* Speg., *Stipa megapotamica* Spreng. ex Trin., *Stipa quinquenervis* Hack.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Mujica Sallés, J., 1996; Peñailillo, P. B., 2002; Renvoize, S. A., 1988; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(COL, FLO, LAV, MAL, MON, RIV, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. 61* (SI), *Venturi, S. 2719* (LIL)]; BRA[*Sacco, J. C. 198* (SI), *Valls, J. F. M. 6809* (CEN, ICN)]; URY[*Gallinal 4465-pe* (SI), *Rosengurtt, B. 9684* (MVFA)].

Nassella melanocarpa Phil. = **Nassella gigantea** (Steud.) M. Muñoz
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Nassella melanosperma (J. Presl) Barkworth
Sin.: *Nassella bonariensis* (Henrard & Parodi) Barkworth, *Stipa bonariensis* Henrard & Parodi, *Stipa melanosperma* J. Presl, *Stipa melanosperma* J. Presl var. *erythrina* Hack.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Cabrera, A. L. & Torres, M. A., 1970; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1993; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN, MIE); URY(FLA, LAV, MAL, MON, PAY, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1727* (SI)]; BRA[*Zanin, A. 52* (CEN, ICN)]; PRY[*Ramírez, J. R. 1184* (SI)]; URY[*Mujica Sallés, J. 276* (MVFA)].

Nassella mexicana (Hitchc.) Pohl
Sin.: *Stipa mexicana* Hitchc.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–3300 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 3949* (BAA, LP), *Iudica, C. 170* (SI)].

Nassella meyeniana (Trin. & Rupr.) Parodi
Sin.: *Nassella corniculata* Hack., *Piptochaetium laeve* (Nees) Pilg., *Stipa laevis* (Trin. & Rupr.) Parodi, comb. superfl., *Urachne laevis* Trin. & Rupr., *Urachne meyeniana* Trin. & Rupr.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Barkworth, M. E., 1990; Parodi, L. R., 1947a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 2700–5000 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 9385* (BAA, SI)].

Nassella meyeri Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2400–3700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 488* (SI), *Meyer, T. 14886* (BAA, LIL, SI)].

Nassella mucronata (Kunth) Pohl
Sin.: *Stipa mucronata* Kunth, *Stipa setigera* J. Presl
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 2100–2500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, TUC); CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Illin, N. 268* (SI), *Lillo, M. 2785* (LP)]; CHL[*Grandjot, G. F. 2795* (SI)].

Nassella nardoides (Phil.) Barkworth
Sin.: *Danthonia nardoides* Phil., *Stipa calchaquia* Speg., *Stipa nardoides* (Phil.) Hack. ex Hitchc.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 3700–4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL); CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabezas, V. 17* (LP), *Nicora, E. G. 8933* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 466* (CONC)].

Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth
Sin.: *Stipa contracta* Phil., *Stipa eminens* Nees, hom. illeg., *Stipa fernandeziana* Phil., hom. illeg., *Stipa hispida*

Phil., *Stipa longiflora* Steud., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. f. *contorta* Hack., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. f. *depauperata* Hack., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *chilensis* Trin. & Rupr., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *fernandeziana* Trin. & Rupr., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *glabrata* Arechav., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *hirsuta* Arechav., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *hispidula* (Speg.) Hack., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *longiaristata* Arechav., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *sublaevis* (Speg.) Speg. ex Caro, *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *sublaevis* (Speg.) Speg., comb. superfl., *Stipa setigera* auct. non J. Presl, *Stipa setigera* J. Presl var. *glabrata* (Arechav.) Speg., *Stipa setigera* J. Presl var. *hispidula* Speg., *Stipa setigera* J. Presl var. *hispidula* Speg. f. *pallida* Speg., *Stipa setigera* J. Presl var. *hispidula* Speg. f. *purpurascens* Speg., *Stipa setigera* J. Presl var. *hispidula* Speg. f. *versicolor* Speg., *Stipa setigera* J. Presl var. *longiaristata* (Arechav.) Roseng., *Stipa skottsbergii* Pilg., *Stipa sublaevis* Speg., *Stipa trachysperma* Phil., *Urachne longiflora* Steud., nom. nud.

Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–2700 m.

Paises: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(IV, V, VIII, IX, X, IJF, RME); PRY(COA, PAI); URY(ART, CAS, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 5169* (BAA, BAB, SI)]; BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 1514* (ICN)]; CHL[*Jiles, C. 2682* (CONC)]; PRY[*Burkart, A. 18867* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 9341* (MVFA)].

Nassella nidulans (Mez) Barkworth

Sin.: *Stipa nidulans* Mez

Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Cantero, J. J., Núñez, C. O., Geymonat, M. & Chiacchiera, G., 1996; Caro, J. A., 1966.

Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Ejemplares de referencia: ARG[*Mercado, S. E. 2744* (SI)].

Nassella niduloides (Caro) Barkworth

Sin.: *Stipa niduloides* Caro

Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Hierba. Perenne. Endémica. 1800–3100 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, SLU).

Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 9553* (CORD)].

Nassella novari Torres

Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 18524* (LP), *Cialdella, A. M. 308* (SI)].

Nassella nubicola (Speg.) Torres

Sin.: *Stipa nubicola* Speg.

Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Hierba. Perenne. Endémica. 2500–5000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 181* (SI), *Kiesling, R. 5784* (MU, SI)].

Nassella nutans (Hack.) Barkworth

Sin.: *Stipa nutans* Hack.

Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.

Países: ARG(COS); BRA(RGS).

Ejemplares de referencia: ARG[*Charpin, A. 20056* (SI)]; BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 1984* (CEN, ICN)].

Nassella obscura F. Phil. = **Nassella chilensis** (Trin.) E. Desv.

Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Nassella pampagrandensis (Speg.) Barkworth

Sin.: *Stipa pampagrandensis* Speg.

Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Hierba. Perenne. Nativa. 1300–3100 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4356* (SI)].

Nassella pampeana (Speg.) Barkworth

Sin.: *Stipa pampeana* Speg.

Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Roig, F. A., 1978a; Torres, M. A., 1993.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, SCR).

Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 15563* (SI), *Villamil, C. B. 2022* (MU, SI)].

Nassella paramilloensis (Speg.) Torres

Sin.: *Stipa gilliesii* Hitchc., *Stipa paramilloensis* Speg., *Stipa perrigida* Speg.

Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Hierba. Perenne. Endémica. 2500–3500 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 4364* (BAA, SI)].

Nassella parodii (Matthei) Barkworth

Sin.: *Stipa parodii* Matthei

Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–400 m.

Países: CHL(VIII).

Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, A. 452* (CONC)].

Nassella parva Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–3400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Türpe, A. M. 1148* (LIL)].

Nassella pauciciliata (Roseng. & Izag.) Barkworth
Sin.: *Stipa megapotamica* Spreng. ex Trin. var. *pauciciliata* Roseng. & Izag., *Stipa pauciciliata* (Roseng. & Izag.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(MAL, ROC).
Ejemplares de referencia: URY[*Rosengurtt, B. 9280–b* (SI)].
Notas: Citada para Brasil sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Barkworth & Torres, 2001; Soreng et al., 2003).

Nassella pfisteri (Matthei) Barkworth
Sin.: *Stipa pfisteri* Matthei
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: CHL(VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles, C. 5430* (CONC)].

Nassella philippii (Steud.) Barkworth
Sin.: *Stipa bavioensis* Speg., *Stipa bavioensis* Speg. var. *minor* Speg., *Stipa lenta* Hitchc., *Stipa philippii* Steud.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Burkart, A., 1969a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1993; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE); BRA(RGS); CHL(VII, VIII, IX, X); URY(CLA, MAL, RIV, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 49* (SI)]; BRA[*Valla, J. J. 9639* (CEN, ICN)]; CHL[*Acevedo, R. 71* (SI)]; URY[*Montoro Guarch, A. 317* (SI)].

Nassella planaltina (A. Zanin & Longhi-Wagner) Peñailillo
Sin.: *Stipa planaltina* A. Zanin & Longhi-Wagner
Referencias: Peñailillo, P. B., 1998; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Zanin, A. 151a* (CEN, ICN)].

Nassella planifolia Phil. = **Nassella chilensis** (Trin.) E. Desv.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Nassella poeppigiana (Trin. & Rupr.) Barkworth
Sin.: *Nassella amethystina* (Steud.) Barkworth, *Stipa amethystina* Steud., *Stipa araucana* Phil., *Stipa curicoana* Phil., *Stipa latifolia* Hack. ex Arechav. var. *grandiflora* Hack., *Stipa manicata* E. Desv. var. *typica* Speg., nom. inval., *Stipa megapotamica* Spreng. ex Trin. var. *latiflora* Roseng. & Izag., *Stipa montana* Phil., *Stipa poeppigiana* Trin. & Rupr., *Stipa pratensis* Phil.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, NEU, RNE, SLU); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 1228* (SI)]; CHL[*Burkart, A. 9458* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 11276* (MVFA)].

Nassella pseudopampagrandensis (Caro) Barkworth
Sin.: *Stipa pseudopampagrandensis* Caro
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(COR, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 7251* (SI)].

Nassella psittacorum (Speg.) Peñailillo
Sin.: *Stipa psittacorum* Speg.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Peñailillo, P. B., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bartlett, H. H. 19312* (SI)].

Nassella pubiflora (Trin. & Rupr.) E. Desv. var. **humilior** (Hack.) Torres
Sin.: *Nassella flaccidula* Hack. var. *humilior* Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000–4500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 25171 1/2* (LP)].

Nassella pubiflora (Trin. & Rupr.) E. Desv. var. **levipoda** Torres
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3600 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 26399* (LP)].

Nassella pubiflora (Trin. & Rupr.) E. Desv. var. **pubiflora**
Sin.: *Calamagrostis anomala* Steud. ex Lechl., *Nassella deltoidea* Hack., *Nassella flaccidula* Hack., *Stipa airoides* Mez, hom. illeg., *Stipa meziana* Hicken, *Stipa pubiflora* (Trin. & Rupr.) M. Muñoz, *Urachne pubiflora* Trin. & Rupr.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 2200–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC); CHL(I, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 168* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 100* (CONC)].

Nassella pugae Phil. = **Nassella gigantea** (Steud.) M. Muñoz
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Nassella punensis Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 3400–4300 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 428* (SI), *Zuloaga, F. O. 3579* (MU, SI)].

Nassella pungens E. Desv.
Sin.: *Nassella humilis* Phil., *Nassella johnstonii* Parodi
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(I, II, III, IV, VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles, C. 5430* (CONC)].

Nassella quinqueciliata (Roseng. & Izag.) Barkworth & Torres
Sin.: *Stipa nutans* Hack. var. *quinqueciliata* Roseng. & Izag., *Stipa quinqueciliata* (Roseng. & Izag.) A. Zanin & Izag.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(MAL).
Ejemplares de referencia: URY[*Rosengurtt, B. 5271b* (MVFA)].

Nassella ragonesei Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 9777* (BAA)].

Nassella ramosa E. Desv. = **Nassella chilensis** (Trin.) E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Nassella rhizomata (A. Zanin & Longhi-Wagner) Peñailillo
Sin.: *Stipa rhizomata* A. Zanin & Longhi-Wagner
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Peñailillo, P. B., 1998; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Valls, J. F. M. 10561* (CEN, MVFA)].

Nassella rosengurttii (Chase) Barkworth
Sin.: *Stipa rosengurttii* Chase
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(MON, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Valls, J. F. M. 2838* (CEN, ICN)]; URY[*Del Puerto, O. 322a* (MVFA)].

Nassella rupestris (Phil.) Torres
Sin.: *Stipa rupestris* Phil.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 3200–4000 m.
Países: ARG(SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 22000* (LIL, SI)]; CHL[*Philippi, F. s.n.* (BAA, SGO)].

Nassella sadae Phil. = **Nassella chilensis** (Trin.) E. Desv.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Nassella sanluisensis (Speg.) Barkworth
Sin.: *Stipa debilis* Mez, *Stipa debilis* Mez var. *papillosa* Caro, *Stipa sanluisensis* Speg., *Stipa sanluisensis* Speg. var. *longispicula* Caro
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3160* (SI)].

Nassella sellowiana (Nees ex Trin. & Rupr.) Peñailillo
Sin.: *Stipa eminens* Cav. var. *sellowiana* (Nees ex Trin. & Rupr.) Kuntze, *Stipa molfinoi* Speg., *Stipa sellowiana* Nees ex Trin. & Rupr.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Parodi, L. R., 1928a; Peñailillo, P. B., 1998; Renvoize, S. A., 1988; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–1200 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Molfino, J. F. s.n.* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 17291* (SI)].

Nassella spegazzinii (Arechav.) Barkworth
Sin.: *Stipa spegazzini* Arechav., *Stipa uruguaycola* Speg.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(RNO).
Ejemplares de referencia: URY[*Herter, W. G. F. 82868* (SI)].

Nassella stuckertii (Hack.) Barkworth
Sin.: *Stipa stuckertii* Hack.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Cantero, J. J., Núñez, C. O., Geymonat, M. & Chiacchiera, G., 1996; Caro, J. A., 1966.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Stuckert, T. T. J. V. 20737* (SI)].

Nassella subnitida (Roseng. & B.R. Arrill.) Barkworth
= **Jarava subnitida** (Roseng. & B.R. Arrill.) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Nassella tenuiculmis (Hack.) Peñailillo
Sin.: *Stipa tenuiculmis* Hack.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Peñailillo, P. B., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, LPA, RNE); BRA(RGS, SCA); URY(TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 3157* (BAA)]; BRA[*Jürgens, C. s.n.* (US, W)]; URY[*Rosengurtt, B. 10288* (MVFA, SI)].

Nassella tenuis (Phil.) Barkworth
Sin.: *Stipa argentina* Speg., *Stipa neesiana* Kuntze, hom. illeg., *Stipa puelches* Speg., *Stipa tenuis* Phil., *Stipa tenuis* Phil. var. *argentina* (Speg.) Speg.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Roig, F. A., 1978a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SLU); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19210* (SI), *Rúgolo de Agrasar, Z. E. 2097* (SI)].

Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth
Sin.: *Stipa geniculata* Phil., *Stipa mendocina* Phil., *Stipa oreophila* Speg., *Stipa tenuissima* Trin., *Stipa tenuissima* Trin. var. *oreophila* (Speg.) Speg., *Stipa tenuissima* Trin. var. *planicola* Speg.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, RNE, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 57* (SI), *Parodi, L. R. 14158* (BAA)].

Nassella torquata (Speg.) Barkworth
Sin.: *Stipa torquata* Speg.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Cabrera, A. L. & Torres, M. A., 1970; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1993; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, SFE); BRA(RGS); URY(PAY, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*D'Angelo 574* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 12346* (CEN)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 1522* (SI), *Del Puerto, O. 297* (MVFA)].

Nassella trichotoma (Nees) Hack. ex Arechav.
Sin.: *Agrostis trichotoma* (Nees) Nees ex Trin., *Oryzopsis trichotoma* (Nees) Druce, *Piptatherum macrantherum* Nees ex B.D. Jacks., *Piptochaetium trichotomum* (Nees) Griseb., *Stipa macrathera* Speg., hom. illeg., *Stipa trichotoma* Nees, *Urachne macranthera* Nees ex Steud., *Urachne trichotoma* (Nees) Trin.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SFE, SLU); BRA(RGS); URY(MON, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 15700* (CORD)]; BRA[*Rambo, B. 26655* (SI)]; URY[*Burkart, A. 15753* (SI)].

Nassella tucumana (Parodi) Torres
Sin.: *Stipa tucumana* Parodi
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 900–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3774* (SI), *Zuloaga, F. O. 3431* (MU, SI)].

Nassella uspallatensis (Speg.) Torres
Sin.: *Stipa uspallatensis* Speg.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–4000 m.
Países: ARG(COR, LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 5596* (BAA, CORD), *Nicora, E. G. 8268* (SI)].

Nassella vallsii (A. Zanin & Longhi-Wagner) Peñailillo
Sin.: *Stipa vallsii* A. Zanin & Longhi-Wagner
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Peñailillo, P. B., 1998; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.

Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Zanin, A. 148* (CEN, MVFA)].

Nassella ventanicola (Cabrera & Torres) Barkworth
Sin.: *Stipa ventanicola* Cabrera & Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Cabrera, A. L. & Torres, M. A., 1970; Torres, M. A., 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 7305* (LP)].

Nassella yaviensis Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 3400–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 15357* (LP)].
Notas: Probablemente habite en Bolivia.

Nastus brunneus Desv. = **Chusquea bambusoides** (Raddi) Hack. var. **bambusoides**
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Nastus guadua (Humb. & Bonpl.) Spreng. = **Guadua angustifolia** Kunth
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Nastus productus (Pilg.) Holttum = **Chusquea quila** Kunth
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Neeragrostis hypnoides (Lam.) Bush = **Eragrostis hypnoides** (Lam.) Britton, Stern & Poggenb.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Neobouteloua Gould

Número de especies: 2, 1 endémica

Neobouteloua lophostachya (Griseb.) S. Gould
Sin.: *Bouteloua lophostachya* Griseb., *Bouteloua nana* Griseb.
Referencias: Gould, F. W., 1968; Parodi, L. R., 1919; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–900 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahun, E. 50* (SI)].
Notas: Citada para Chile sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Peterson et al., 2001).

Neobouteloua paucirracemosa M.G. López & Biurrun
Referencias: López, M. G. & Biurrun, F., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(LRI, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 4851* (CORD, CTES, SI)].

Nicoraella bomanii (Hauman) Torres = **Anatherostipa bomanii** (Hauman) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997c.

Nicoraella brevis Torres = **Anatherostipa brevis** (Torres) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Nicoraella henrardiana (Parodi) Torres = **Anatherostipa henrardiana** (Parodi) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Nicoraella mucronata (Griseb.) Torres = **Anatherostipa mucronata** (Griseb.) F. Rojas
Referencias: Rojas P., F. P., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Nicoraella obtusa (Nees & Meyen) Torres = **Anatherostipa obtusa** (Nees & Meyen) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Nicoraella rigidiseta (Pilg.) Torres = **Anatherostipa rigidiseta** (Pilg.) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Nicoraella venusta (Phil.) Torres = **Anatherostipa venusta** (Phil.) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Notodanthonia lechleri (Steud.) Veldkamp = **Rytidosperma lechleri** Steud.
Referencias: Baeza, C. M., 1996.

Notodanthonia picta (Nees & Meyen) Veldkamp = **Rytidosperma pictum** (Nees & Meyen) Nicora var. **pictum**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Notodanthonia picta (Nees & Meyen) Veldkamp var. *bimucronata* (Nicora) Veldkamp = **Rytidosperma pictum** (Nees & Meyen) Nicora var. **bimucronata** Nicora
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Notodanthonia sorianoi (Nicora) Veldkamp = **Rytidosperma sorianoi** Nicora
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Notodanthonia violacea (E. Desv.) Veldkamp = **Rytidosperma violaceum** (E. Desv.) Nicora
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Notodanthonia virescens (E. Desv.) Veldkamp = **Rytidosperma virescens** (E. Desv.) Nicora var. **virescens**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Notodanthonia virescens (E. Desv.) Veldkamp var. *parvispicula* (Nicora) Veldkamp = **Rytidosperma virescens** (E. Desv.) Nicora var. **parvispicula** Nicora
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Notodanthonia virescens (E. Desv.) Veldkamp var. *patagonica* (Speg.) Veldkamp = **Rytidosperma virescens** (E. Desv.) Nicora var. **virescens**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Nowodworskya agrostoides J. Presl = **Polypogon elongatus** Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Nowodworskya imberbis Phil. = **Polypogon imberbis** (Phil.) Johow
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Olyra L.

Número de especies: 5

Olyra arundinacea Kunth = **Olyra latifolia** L.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Olyra axillaris Lam. = **Lithachne pauciflora** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Olyra brevifolia Schumach. = **Olyra latifolia** L.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Olyra ciliatifolia Raddi
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Stutz, L. C., 1983.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CAA, CAN, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14703* (SI), *Ekman, E. L. 675* (S, US)]; BRA[*Swallen, J. R. 9001* (US)]; PRY[*Zardini, E. M. 9983* (MO)].

Olyra corcovadensis Warwa = **Olyra glaberrima** Raddi
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Olyra cordifolia Kunth = **Olyra latifolia** L.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Olyra fasciculata Trin.
Sin.: *Olyra heliconia* Lindm.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soderstrom, T. R. & Zuloaga, F. O., 1989.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 8635* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 16713* (HBR, US)]; PRY[*Schinini, A. 31505* (CTES)].

Olyra glaberrima Raddi
Sin.: *Olyra corcovadensis* Warwa, *Olyra obliqua* Desv., *Olyra semiovata* Trin., *Olyra semiovata* Trin. var. *pubescens* Hack., *Olyra semiovata* Trin. var. *pubiflora* Hack.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soderstrom, T. R. & Zuloaga, F. O., 1989.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 5782* (US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5299* (US, W)].

Olyra glaberrima Raddi var. *humilis* (Nees) Mez = **Olyra humilis** Nees
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Renvoize, S. A., 1988.

Olyra heliconia Lindm. = **Olyra fasciculata** Trin.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Olyra humilis Nees
Sin.: *Olyra glaberrima* Raddi var. *humilis* (Nees) Mez, *Olyra humilis* Nees var. *angustifolia* Döll, *Olyra humilis* Nees var. *latifolia* Döll, *Olyra semiovata* Trin. var. *humilis* (Nees) Hack.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soderstrom, T. R. & Zuloaga, F. O., 1989.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 11028* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 12892* (HBR, R, US)]; PRY[*Hassler, E. 12051* (US)].

Olyra humilis Nees var. *angustifolia* Döll = **Olyra humilis** Nees
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Olyra humilis Nees var. *latifolia* Döll = **Olyra humilis** Nees
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Olyra latifolia L.
Sin.: *Olyra arundinacea* Kunth, *Olyra brevifolia* Schumach., *Olyra cordifolia* Kunth, *Olyra latifolia* L. var. *arundinacea* (Kunth) Griseb., *Olyra latifolia* L. var. *gabriuscula* Döll, nom. superfl., *Olyra latifolia* L. var. *pubescens* Döll, *Olyra latifolia* L. var. *vestita* Henrard, *Olyra media* Desv., *Olyra paniculata* Sw., *Olyra pubescens* Raddi, *Olyra scabra* Nees
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soderstrom, T. R. & Zuloaga, F. O., 1989.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1218* (SI), *Keller, H. A. 18* (CTES)]; BRA[*Gaudichaud-Beaupré, C. s.n.* (P)]; PRY[*Múlgura de Romero, M. E. 3520* (CTES, FCQ, SI)].

Olyra latifolia L. var. *arundinacea* (Kunth) Griseb. = **Olyra latifolia** L.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Olyra latifolia L. var. *gabriuscula* Döll, nom. superfl. = **Olyra latifolia** L.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Olyra latifolia L. var. *pubescens* Döll = **Olyra latifolia** L.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Olyra latifolia L. var. *vestita* Henrard = **Olyra latifolia** L.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Olyra media Desv. = **Olyra latifolia** L.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Olyra micrantha Kunth = **Parodiolyra micrantha** (Kunth) Davidse & Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O. & Davidse, G., 1999.

Olyra micrantha Kunth var. *decalvata* Döll = **Parodiolyra micrantha** (Kunth) Davidse & Zuloaga

Olyra micrantha Kunth var. *dioecia* Döll = **Parodiolyra micrantha** (Kunth) Davidse & Zuloaga

Olyra micrantha Kunth var. *lanceolata* Döll = **Parodiolyra micrantha** (Kunth) Davidse & Zuloaga

Olyra micrantha Kunth var. *subvelutina* Döll = **Parodiolyra micrantha** (Kunth) Davidse & Zuloaga

Olyra obliqua Desv. = **Olyra glaberrima** Raddi
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Olyra paniculata Sw. = **Olyra latifolia** L.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Olyra pauciflora Sw. = **Lithachne pauciflora** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Olyra pubescens Raddi = **Olyra latifolia** L.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Olyra scabra Nees = **Olyra latifolia** L.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Olyra semiovata Trin. = **Olyra glaberrima** Raddi
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Olyra semiovata Trin. var. *humilis* (Nees) Hack. = **Olyra humilis** Nees
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Olyra semiovata Trin. var. *pubescens* Hack. = **Olyra glaberrima** Raddi
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Olyra semiovata Trin. var. *pubiflora* Hack. = **Olyra glaberrima** Raddi
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Olyra urvillei Steud. = **Parodiolyra micrantha** (Kunth) Davidse & Zuloaga

Olyra ventricosa Nees = **Parodiolyra micrantha** (Kunth) Davidse & Zuloaga

Oplismenopsis Parodi

Número de especies: 1 endémica

Oplismenopsis najada (Hack. & Arechav.) Parodi
Sin.: *Echinochloa najada* (Hack. & Arechav.) Parodi, *Oplismenus najada* (Hack. & Arechav.) Parodi, *Panicum amadryadum* Arechav. ex Hicken, nom. nud., *Panicum najadum* Hack. & Arechav.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Cabrera, A. L., 1970a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba palustre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, SFE); URY(COL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 7991* (CTES), *Zuloaga, F. O. 7030* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 1083* (MVFA)].

Oplismenus P. Beauv., nom. cons.

Número de especies: 1

Oplismenus colonus (L.) Kunth = **Echinochloa colonum** (L.) Link
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Oplismenus crus-pavonis Kunth = **Echinochloa crus-pavonis** (Kunth) Schult.
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994d; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv. subsp. **hirtellus**
Sin.: *Orthopogon loliaceus* (Lam.) Spreng., *Panicum hirtellum* L., *Panicum setarium* Lam.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Cialdella, A. M., 1994b; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1987; Renvoize, S. A., 1988; Scholz, U., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1932* (SI), *Schwindt, E. 3244* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 18811* (MBM)]; PRY[*Woolston, A. L. 109* (BAA, SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 10823* (MVFA)].

Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv. subsp. **setarius** (Lam.) Mez ex Ekman
Sin.: *Oplismenus setarius* (Lam.) Roem. & Schult., *Orthopogon setarius* (Lam.) Spreng.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Cialdella, A. M., 1994b; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4501* (SI), *Schwindt, E. 3244* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 11100* (HBR)]; PRY[*Brunner, D. R. 1750* (MO)]; URY[*Rosengurtt, B. 5078* (MVFA)].

Oplismenus minarum Nees = **Echinolaena minarum** (Nees) Pilg.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Oplismenus najada (Hack. & Arechav.) Parodi = **Oplismenopsis najada** (Hack. & Arechav.) Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Oplismenus oplismenoides (Speg.) Speg. = **Pseudechinolaena polystachya** (Kunth) Stapf
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Oplismenus polystachyus Kunth = **Echinochloa polystachya** (Kunth) Hitchc. var. **polystachya**
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994d; Pfitcher, E. M. & Barreto, I. L., 1976.

Oplismenus setarius (Lam.) Roem. & Schult. = **Oplismenus hirtellus** (L.) P. Beauv. subsp. **setarius** (Lam.) Mez ex Ekman
Referencias: Cialdella, A. M., 1994b.

Oplismenus tenuis J. Presl = **Ichnanthus tenuis** (J. Presl) Hitchc. & Chase
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994f; Zuloaga, F. O., 1981a.

Oplismenus zelayensis Kunth = **Echinochloa crusgalli** (L.) P. Beauv. var. **zelayensis** (Kunth) Hitchc.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1942.

Oreiostachys producta Pilg. = **Chusquea quila** Kunth
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Ortachne Nees ex Steud.

Número de especies: 2, 1 endémica

Ortachne breviseta Hitchc.
Sin.: *Stipa breviseta* (Hitchc.) Martic. & Quezada, hom. illeg., *Stipa yatesensis* Martic. & Quezada
Referencias: Roig, F. A., 1978d; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 4240* (BAB)]; CHL[*Werdermann, E. 669* (CONC, GH, MO)].

Ortachne rariflora (Hook. f.) Hughes
Sin.: *Muhlenbergia rariflora* Hook. f., *Ortachne retorta* Nees ex Steud., *Stipa rariflora* (Hook. f.) Benth., *Stipa retorta* (Nees ex Steud.) Mez
Referencias: Roig, F. A., 1978d; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(RNE, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5923* (BAA)]; CHL[*Pisano, E. 3901* (CONC)].

Ortachne retorta Nees ex Steud. = **Ortachne rariflora** (Hook. f.) Hughes
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Orthoclada P. Beauv.

Número de especies: 1

Orthoclada laxa (Rich.) P. Beauv.
Sin.: *Aira laxa* Rich., *Orthoclada rariflora* (Lam.) P. Beauv., *Orthoclada rariflora* (Lam.) P. Beauv. var. *lanceolata* Döll, *Orthoclada rariflora* (Lam.) P. Beauv. var. *sesquitertia* Döll, *Panicum rariflorum* Lam., *Poa rariflora* (Lam.) Roem. & Schult., *Poa subumbellata* Roem. & Schult.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Mueller, F. J. H. s.n.* (*)].

Orthoclada rariflora (Lam.) P. Beauv. = **Orthoclada laxa** (Rich.) P. Beauv.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Orthoclada rariflora (Lam.) P. Beauv. var. *lanceolata* Döll = **Orthoclada laxa** (Rich.) P. Beauv.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Orthoclada rariflora (Lam.) P. Beauv. var. *sesquitertia* Döll = **Orthoclada laxa** (Rich.) P. Beauv.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Orthopogon loliaceus (Lam.) Spreng. = **Oplismenus hirtellus** (L.) P. Beauv. subsp. **hirtellus**
Referencias: Scholz, U., 1981.

Orthopogon setarius (Lam.) Spreng. = **Oplismenus hirtellus** (L.) P. Beauv. subsp. **setarius** (Lam.) Mez ex Ekman

Oryza L.

Número de especies: 3, 2 introducidas

Oryza alta Swallen = **Oryza latifolia** Desv.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Oryza hexandra (Sw.) Döll = **Leersia hexandra** Sw.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Oryza hexandra (Sw.) Döll var. *grandiflora* Döll = **Leersia hexandra** Sw.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Oryza latifolia Desv.
Sin.: *Oryza alta* Swallen, *Oryza latifolia* Desv. var. *grandispiculis* A. Chev., *Oryza sativa* L. var. *latifolia* (Desv.) Döll
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Tateoka, T., 1963.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE); BRA(PAR, SCA); PRY(APY, CON, COA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Stuckert, T. T. J. V. 18950* (CORD)]; BRA[*Klein, R. M. 8251* (FLOR, HBR, US)]; PRY[*Vanni, R. O. 2565* (CTES)].

Oryza latifolia Desv. var. *grandispiculis* A. Chev. = **Oryza latifolia** Desv.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Oryza mexicana (Kunth) Döll = **Leersia hexandra** Sw.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Oryza monandra (Sw.) Döll var. *grandiflora* Döll = **Leersia ligularis** Trin. var. **grandiflora** (Döll) Pyrah
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Soreng, R. J. & Davis, J. I., 2000.

Oryza paraguayensis Wedd. ex E. Fourn. = **Oryza rufipogon** Griff.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Oryza rufipogon Griff.
Sin.: *Oryza paraguayensis* Wedd. ex E. Fourn., *Oryza sativa* L. var. *paraguayensis* Parodi, *Oryza sativa* L. var. *savannae* Körn., *Oryza sativa* L. var. *sundensis* Körn.
Referencias: Bragadin, E. A., 1964; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, MIS); PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 7985* (BAA)]; PRY[*Weddell, H. A. 3259* (US)].

Oryza sativa L.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.
Hierba. Anual. Introducida. 0–600 m.
Países: BRA(RGS, SCA); CHL(VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reis, A. 53* (HBR, US)]; CHL[*Looser, G. s.n.* (CONC)].

Oryza sativa L. var. *latifolia* (Desv.) Döll = **Oryza latifolia** Desv.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Oryza sativa L. var. *paraguayensis* Parodi = **Oryza rufipogon** Griff.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Oryza sativa L. var. *savannae* Körn. = **Oryza rufipogon** Griff.

Oryza sativa L. var. *sundensis* Körn. = **Oryza rufipogon** Griff.

Oryza subulata Nees = **Rhynchoryza subulata** (Nees) Baill.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Oryzopsis bicolor (Vahl) Speg. = **Piptochaetium bicolor** (Vahl) E. Desv.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Oryzopsis bicolor (Vahl) Speg. var. *major* Speg. = **Piptochaetium ruprechtianum** E. Desv.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Oryzopsis bicolor (Vahl) Speg. var. *media* Speg. = **Piptochaetium medium** (Speg.) Torres
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Oryzopsis bicolor (Vahl) Speg. var. *minor* Speg. = **Piptochaetium bicolor** (Vahl) E. Desv.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Oryzopsis caespitosa (Griseb.) Ball = **Nassella caespitosa** Griseb.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Oryzopsis grisebachii Speg. = **Piptochaetium stipoides** (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**

Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Oryzopsis hackelii (Arechav.) Speg. = **Piptochaetium hackelii** (Arechav.) Parodi
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Mujica Sallés, J., 1996.

Oryzopsis lasiantha (Griseb.) Speg. = **Piptochaetium lasianthum** Griseb.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Oryzopsis lejocarpa Speg. = **Piptochaetium panicoides** (Lam.) E. Desv.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Oryzopsis lejocarpa Speg. var. *major* Speg. = **Piptochaetium panicoides** (Lam.) E. Desv.
Referencias: Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Oryzopsis lejopoda Speg. = **Piptochaetium lejopodum** (Speg.) Henrard
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Oryzopsis miliacea (L.) Benth. & Hook. ex Asch. & Schweinf. = **Piptatherum miliaceum** (L.) Coss.
Referencias: Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1987.

Oryzopsis montevidensis (Spreng.) Hauman = **Piptochaetium montevidense** (Spreng.) Parodi
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Oryzopsis montevidensis (Spreng.) Speg., comb. superfl. = **Piptochaetium montevidense** (Spreng.) Parodi
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Oryzopsis montevidensis (Spreng.) Speg. f. *brasiliensis* Speg. = **Piptochaetium montevidense** (Spreng.) Parodi
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Oryzopsis montevidensis (Spreng.) Speg. f. *trachycarpa* Speg. = **Piptochaetium montevidense** (Spreng.) Parodi
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Oryzopsis mucronata (Griseb.) Parodi = **Anatherostipa mucronata** (Griseb.) F. Rojas
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Oryzopsis napostaensis Speg. = **Piptochaetium napostaense** (Speg.) Hack.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Oryzopsis napostaensis Speg. var. *brachyphylla* Speg. = **Piptochaetium napostaense** (Speg.) Hack.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Oryzopsis napostaensis Speg. var. *brachysperma* Speg. = **Piptochaetium brachyspermum** (Speg.) Parodi
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Oryzopsis napostaensis Speg. var. *macrophylla* Speg. = **Piptochaetium napostaense** (Speg.) Hack.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Oryzopsis ovata (Trin.) Speg. = **Piptochaetium panicoides** (Lam.) E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Oryzopsis panicoides (Lam.) Speg. = **Piptochaetium panicoides** (Lam.) E. Desv.
Referencias: Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Oryzopsis rigidiseta Pilg. = **Anatherostipa rigidiseta** (Pilg.) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 1996; Torres, M. A., 1997c.

Oryzopsis ruprechtiana (E. Desv.) Speg. = **Piptochaetium ruprechtianum** E. Desv.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Mujica Sallés, J., 1996.

Oryzopsis setacea A. Rich. = **Piptochaetium panicoides** (Lam.) E. Desv.
Referencias: Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Oryzopsis setifolia (J. Presl) Henrard = **Piptochaetium panicoides** (Lam.) E. Desv.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Oryzopsis stipoides (Trin. & Rupr.) Speg. = **Piptochaetium stipoides** (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Oryzopsis trichotoma (Nees) Druce = **Nassella trichotoma** (Nees) Hack. ex Arechav.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Oryzopsis tuberculata (E. Desv.) Speg. = **Piptochaetium montevidense** (Spreng.) Parodi
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Oryzopsis uruguayensis (Griseb.) Speg. = **Piptochaetium uruguense** Griseb.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Oryzopsis verrucosa (Phil.) Speg. = **Piptochaetium montevidense** (Spreng.) Parodi
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Oryzopsis verruculosa (Phil.) Speg. = **Piptochaetium montevidense** (Spreng.) Parodi
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Otachyrium Nees

Número de especies: 1

Otachyrium truncatum (Nees) Pilg., comb. superfl. = **Otachyrium versicolor** (Döll) Henrard
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994h; Sendulsky, T. & Soderstrom, T. R., 1984.

Otachyrium versicolor (Döll) Henrard
Sin.: *Otachyrium truncatum* (Nees) Pilg., comb. superfl., *Panicum truncatum* Nees, hom. illeg., *Panicum versicolor* Döll
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994h; Renvoize, S. A., 1988; Sendulsky, T. & Soderstrom, T. R., 1984; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 4891* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 23070* (MBM)]; PRY[*Woolston, A. L. 97* (BAA, SI)].

Panicularia antarctica (Speg.) Macloskie = **Puccinellia magellanica** (Hook. f.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Panicularia fuegiana (Speg.) Macloskie = **Puccinellia magellanica** (Hook. f.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Panicularia glaucescens (Phil.) Kuntze = **Puccinellia glaucescens** (Phil.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Panicularia latifolia (Phil.) Kuntze = **Catabrosa werdermannii** (Pilg.) Nicora & Rúgolo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Panicularia leptostachya (Speg.) Macloskie = **Puccinellia biflora** (Steud.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Panicularia magellanica (Hook. f.) Kuntze = **Puccinellia magellanica** (Hook. f.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Panicularia magellanica (Hook. f.) Macloskie, hom. illeg. = **Puccinellia magellanica** (Hook. f.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Panicularia tenuifolia (J. Presl) Kuntze = **Puccinellia preslii** (Hack.) Ponert
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Panicum L.

Número de especies: 54, 10 endémicas, 2 introducidas

Panicum acutatum Steud. = **Dichanthelium sabulorum** (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **sabulorum**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum adhaerans Forssk. = **Setaria adhaerans** (Forssk.) Chiov.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Panicum adscendes Kunth = **Digitaria ciliaris** (Retz.) Koeler
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001.

Panicum adspersum Trin. = **Urochloa adspersa** (Trin.) R.D. Webster
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum adspersum Trin. var. *exile* Lindm. = **Urochloa adspersa** (Trin.) R.D. Webster
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum adspersum Trin. var. *neesi* Lindm. = **Urochloa adspersa** (Trin.) R.D. Webster
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum adustum Nees = **Digitaria phaeotrix** (Trin.) Parodi var. **adusta** (Nees) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b.

Panicum adustum Nees var. *leianthum* Hack. = **Digitaria leiantha** (Hack.) Parodi
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1970, 1994b.

Panicum adustum Nees var. *leucotrichum* Hack. = **Digitaria phaeotrix** (Trin.) Parodi var. **adusta** (Nees) Rúgolo
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b.

Panicum adustum Nees var. *mattogrossense* Pilg. = **Digitaria mattogrossensis** (Pilg.) Henrard
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994b.

Panicum adustum Nees var. *phaeothrix* (Trin.) Hack. = **Digitaria phaeotrix** (Trin.) Parodi var. **phaeotrix**
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum aequiglume Hack. & Arechav. = **Digitaria aequiglumis** (Hack. & Arechav.) Parodi var. **aequiglumis**
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1969, 1974, 1994b.

Panicum agrostoides Spreng., nom. illeg. = **Panicum rigidulum** Bosc ex Nees
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum albospiculatum Swallen = **Panicum rude** Nees
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991.

Panicum amadryadum Arechav. ex Hicken, nom. nud. = **Oplismenopsis najada** (Hack. & Arechav.) Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum amplexicaule Rudge = **Hymenachne amplexicaulis** (Rudge) Nees
Referencias: Burkart, A., 1969a; Cabrera, A. L., 1970a; Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994e.

Panicum antidotale Retz.
Referencias: Zuloaga, F. O., 1981b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7091* (SI)].

Panicum apricum Swallen = **Panicum rude** Nees
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991; Renvoize, S. A., 1988.

Panicum aquaticum Poir.
Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 41798* (PACA)].

Panicum argyrostachyum Steud. = **Digitaria ternata** (A. Rich.) Stapf
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001.

Panicum aristellum Döll = **Canastra aristella** (Döll) Zuloaga & Morrone

Panicum arrectum Hack. ex T. Durand = **Urochloa arrecta** (Hack. ex T. Durand & Schinz) Morrone & Zuloaga
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1999.

Panicum bambusiflorum Trin. = **Ichnanthus bambusiflorus** (Trin.) Döll
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum bambusoides Speg. ex Arechav., hom. illeg. = **Panicum tricholaenoides** Steud. var. **tricholaenoides**
Referencias: Zuloaga, F. O., 1981b.

Panicum barbinode Trin. = **Urochloa mutica** (Forssk.) T.Q. Nguyen
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum bergii Arechav. f. *convoluta* R.A. Palacios = **Panicum bergii** Arechav. var. **bergii**
Referencias: Zuloaga, F. O., 1989.

Panicum bergii Arechav. var. **bergii**
Sin.: *Panicum bergii* Arechav. f. *convoluta* R.A. Palacios, *Panicum burkartii* Zuloaga, *Panicum pilcomayense* Hack.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 1996; Zuloaga, F. O., 1989, 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SDE, SFE, TUC); BRA(RGS); PRY(APY, CEN, CON, MIE, PAI, PHA); URY(CAS, CLA, FLO, MAL, PAY, ROC, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 1889* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 2545* (ICN)]; PRY[*Balansa, B. 12* (G), *Zuloaga, F. O. 7331* (SI)]; URY[*Mujica Sallés, J. 922* (MVFA)].

Panicum bergii Arechav. var. *leiophyllum* Hack. & Lindm. = **Panicum peladoense** Henrard
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum bergii Arechav. var. **pilosissimum** Zuloaga
Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Zuloaga, F. O., 1978, 1989.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3271* (SI)]; BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 1897* (BLA, ICN)].

Panicum boliviense Hack. = **Panicum polygonatum** Schrad.
Referencias: Zuloaga, F. O., Ellis, R. P. & Morrone, O., 1992.

Panicum brachytrichum Steud. ex Lechl., nom. nud. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **brachytricha** Pensiero
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Panicum bresolini L.B. Sm. & Wassh.
Referencias: Zuloaga, F. O., Ellis, R. P. & Morrone, O., 1992; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 7360* (FLOR, HBR, US)].

Panicum brizanthum Hochst. ex A. Rich. = **Urochloa brizantha** (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1999.

Panicum burkartii Zuloaga = **Panicum bergii** Arechav. var. **bergii**
Referencias: Zuloaga, F. O., 1989.

Panicum caaguazuense Henrard
Referencias: Zuloaga, F. O., 1989, 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 5459* (BAA)]; PRY[*Balansa, B. 22* (BAA, G, P, US)].

Panicum caatingense Renvoize = **Panicum stramineum** Hitchc. & Chase
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 1995.

Panicum californicum Benth. = **Digitaria californica** (Benth.) Henrard var. **californica**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum campestre Nees ex Trin.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., 1987.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1400 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 12294* (MBM)].

Panicum capillare L.
Referencias: Parodi, L. R., 1961; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 1996; Zuloaga, F. O., 1989; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, LPA, NEU, RNE, SFE, SLU); CHL(IV, V, VII, VIII, IX, X, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4348* (SI)]; CHL[*Garaventa, A. 2847* (CONC)]; URY[*Felippone, F. s.n.* (SI)].

Panicum cayennense Lam. var. *quadriglume* Döll = **Panicum quadriglume** (Döll) Hitchc.
Referencias: Zuloaga, F. O., 1989, 1994.

Panicum ceresia Kuntze = **Paspalum ceresia** (Kuntze) Chase
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., 1974.

Panicum cervicatum Chase
Referencias: Zuloaga, F. O., 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Morrone, O. 529* (SI)].

Panicum chacoense Parodi = **Panicum hirsutum** Sw.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 1996; Zuloaga, F. O., 1983; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum chasiae Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Sin.: *Panicum ghiesbreghtii* auct. non E. Fourn.
Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Mujica Sallés, J., 1996; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 1996; Zuloaga, F. O., 1989.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE); BRA(RGS); URY(MAL, RIV, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rosengurtt, B. 10804* (SI)]; BRA[*Swallen, J. R. 7467* (PEL)]; URY[*Montoro Guarch, A. 2947* (MVFA)].

Panicum chloroleucum Griseb.
Sin.: *Panicum urvilleanum* Kunth var. *chloroleucum* (Griseb.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., 1979.
Hierba. Perenne. Endémica. 1800–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 460* (SI)].

Panicum chloroticum Nees ex Trin. = **Panicum dichotomiflorum** Michx.

Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum ciliare Retz. = **Digitaria ciliaris** (Retz.) Koeler
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1976, 1994b.

Panicum cinerascens Döll = **Paspalum cinerascens** (Döll) A.G. Burm. & C.N. Bastos
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum colonum L. = **Echinochloa colonum** (L.) Link
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994d; Mujica Sallés, J., 1996; Pfitcher, E. M. & Barreto, I. L., 1976.

Panicum colonum L. f. *maculatum* Arechav. = **Echinochloa colonum** (L.) Link
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Panicum columbiense Kuntze = **Axonopus scoparius** (Flüggé) Kuhlm.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Panicum commelinifolium Rudge = **Panicum nervosum** Lam.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum condensatum Bertol.
Referencias: Zuloaga, F. O., Ellis, R. P. & Morrone, O., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 9966* (US)].

Panicum connivens Trin. = **Digitaria connivens** (Trin.) Henrard var. **connivens**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum cordifolium Steud., nom. superfl. = **Dichanthelium sciurotis** (Trin.) Davidse
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum cordovense E. Fourn.
Sin.: *Panicum dusenii* Hack.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Sáenz, A. A. & Morrone, O., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 2100 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, TUC); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4401* (SI), *Zuloaga, F. O. 4959* (SI)]; BRA[*Mattos, J. R. 8312* (HBR)].

Panicum corynotrichum Hack. = **Digitaria corynotricha** (Hack.) Henrard
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum crus-galli L. = **Echinochloa crusgalli** (L.) P. Beauv. var. **crusgalli**
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994d; Pfitcher, E. M. & Barreto, I. L., 1976.

Panicum crus-galli L. var. *grandiflorum* Döll = **Echinochloa oryzoides** (Ard.) Fritsch
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum crus-galli L. var. *mite* Pursh = **Echinochloa crusgalli** (L.) P. Beauv. var. **mitis** (Pursh) Peterm.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1942; Nicora, E. G., 1978.

Panicum crus-galli L. var. *sabulicola* (Nees) Trin. = **Echinochloa crus-pavonis** (Kunth) Schult.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1942.

Panicum cuyabense Trin. = **Digitaria cuyabensis** (Trin.) Parodi
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b.

Panicum cyanescens Nees ex Trin.
Sin.: *Panicum vinnulum* Swallen
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 12451* (MBM)]; PRY[*Morrone, O. 531* (SI)].

Panicum dactylon L. = **Cynodon dactylon** (L.) Pers. var. **dactylon**

Panicum dasyurum Willd. ex Nees = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum debile Phil., nom. illeg. = **Digitaria aequiglumis** (Hack. & Arechav.) Parodi var. **aequiglumis**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974.

Panicum debile Desf. var. *aequiglume* (Hack. & Arechav.) Hack. = **Digitaria aequiglumis** (Hack. & Arechav.) Parodi var. **aequiglumis**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974.

Panicum decipiens Nees ex Trin. = **Steinchisma decipiens** (Nees ex Trin.) W.V. Br.

Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum decipiens Nees ex Trin. var. *parviflorum* Döll = **Steinchisma decipiens** (Nees ex Trin.) W.V. Br.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum deltae Parodi ex Burkart = **Dichanthelium sabulorum** (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **polycladum** (Ekman) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum demissum Trin. = **Dichanthelium sabulorum** (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **polycladum** (Ekman) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum dichotomiflorum Michx.
Sin.: *Panicum chloroticum* Nees ex Trin., *Panicum proliferum* Lam. var. *chloroticum* (Nees ex Trin.) Hack., *Panicum proliferum* Lam. var. *xanthochlorum* Hack. ex Bertoni, nom. nud.
Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., 1989, 1994.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VI, VII, VIII, RME); PRY(APY, APA, AMA, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE); URY(ART, MON, PAY, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3277* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 45220* (MBM)]; CHL[*Rodríguez Ríos, R. 2318* (CONC)]; PRY[*Woolston, A. L. 110* (K, NY, SI, SP)]; URY[*Burkart, A. 1137* (SI)].

Panicum divaricatum L. = **Lasiacis divaricata** (L.) Hitchc. var. **divaricata**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum doellii Mez = **Panicum hylaeicum** Mez
Referencias: Zuloaga, F. O., Ellis, R. P. & Morrone, O., 1992.

Panicum donacifolium Raddi = **Hymenachne donacifolia** (Raddi) Chase
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994e.

Panicum dusenii Hack. = **Panicum cordovense** E. Fourn.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum echinulatum Mez = **Urochloa adspersa** (Trin.) R.D. Webster
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum echinulatum Mez var. *boliviense* Henrard = **Urochloa adspersa** (Trin.) R.D. Webster
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum elephantipes Nees ex Trin.
Sin.: *Digitaria megapotamica* Mez
Referencias: Burkart, A., 1969a; Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Zuloaga, F. O., 1989, 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN, CON, COA, PHA); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 1882* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 4004* (ICN)]; PRY[*Hassler, E. 12747* (G, SI)]; URY[*Arechavaleta, J. s.n.* (RB)].

Panicum enneaneurum Griseb. = **Panicum ovuliferum** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O., Sáenz, A. A. & Morrone, O., 1986.

Panicum equinum Salzm. ex Steud. = **Urochloa mutica** (Forssk.) T.Q. Nguyen
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum eruciforme Sm. = **Moorochloa eruciformis** (Sm.) Veldkamp
Referencias: Veldkamp, J., 2004.

Panicum excavatum Henrard = **Acroceras excavatum** (Henrard) Zuloaga & Morrone
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994a; Zuloaga, F. O., Morrone, O. & Sáenz, A. A., 1988.

Panicum excelsum Nees = **Hymenachne pernambucense** (Spreng.) Zuloaga
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991.

Panicum exiguum Mez
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 1996; Zuloaga, F. O., 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Brunner, D. R. 1780* (G, MO)].

Panicum fasciculatum Sw. = **Urochloa fusca** (Sw.) B.F. Hansen & Wunderlin
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum ferrugineum Trin. = **Mesosetum ferrugineum** (Trin.) Chase
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Panicum fiebrigii Hack. = **Digitaria fiebrigii** (Hack.) A. Camus
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994b.

Panicum filiforme L. = **Digitaria filiformis** (L.) Koeler
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b.

Panicum flavomarginatum Mez = **Panicum tricholaenoides** Steud. var. **flavomarginatum** (Mez) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., 1994.

Panicum flavum Nees = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum friesii Hack. ex R.E. Fr. = **Digitaria californica** (Benth.) Henrard var. **californica**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum frondescens G. Mey. = **Panicum stoloniferum** Poir.
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1991; Zuloaga, F. O. & Sendulsky, T., 1988.

Panicum fultum Hack. = **Dichanthelium sabulorum** (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **sabulorum**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum fuscum Sw. = **Urochloa fusca** (Sw.) B.F. Hansen & Wunderlin
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum geniculatum Poir. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum gerdesii Hack. = **Digitaria gerdesii** (Hack.) Parodi
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994b.

Panicum gerdesii Hack. f. *pleostachyum* Hack. = **Digitaria bonplandii** Henrard
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994b.

Panicum ghiesbreghtii auct. non E. Fourn. = **Panicum chasiae** Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Panicum glabrinoide Hack. = **Paspalum glabrinode** (Hack.) Morrone & Zuloaga
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1989; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Panicum glabripes Döll
Sin.: *Panicum glabripes* Döll subsp. *subjunceum* (Ekman) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Panicum subjunceum* Ekman
Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., 1981b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(PAY, RNO, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 30232* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 35527* (MBM)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Panicum glabripes Döll subsp. *subjunceum* (Ekman) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Panicum glabripes** Döll
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum glaucescens Nees, hom. illeg. = **Digitaria bicornis** (Lam.) Roem. & Schult.
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001.

Panicum glaucum L. = **Setaria glauca** (L.) P. Beauv.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Panicum globuliferum Steud. = **Setaria globulifera** (Steud.) Griseb.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Panicum glutinosum Sw. = **Homolepis glutinosa** (Sw.) Zuloaga & Soderstr.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 1994a; Zuloaga, F. O. & Soderstrom, T. R., 1985.

Panicum gouinii E. Fourn.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., 1981b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7047* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 47654* (MBM)]; URY[*Alonso Paz, E. 3614* (MVFQ)].

Panicum gracilipes Hack. = **Panicum missionum** Ekman
Referencias: Zuloaga, F. O., Sáenz, A. A. & Morrone, O., 1986.

Panicum grumosum Nees = **Hymenachne grumosa** (Nees) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum guaraniticum Speg. = **Lasiacis sorghoidea** (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase
Referencias: Davidse, G., 1978[1979].

Panicum gynerioides (Griseb.) Pilg. = **Panicum prionitis** Nees
Referencias: Zuloaga, F. O., 1989.

Panicum hackelii (Arechav.) Arechav. = **Digitaria phaeotrix** (Trin.) Parodi var. **hackelii** (Arechav.) Henrard
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum hagenbeckianum Kuntze = **Axonopus suffultus** (J.C. Mikan ex Trin.) Parodi

Panicum hebotes Trin. = **Dichanthelium hebotes** (Trin.) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum helobium Mez ex Henrard = **Panicum schwackeanum** Mez
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991; Zuloaga, F. O., 1989.

Panicum helodes (Hack.) Hauman = **Echinochloa helodes** (Hack.) Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum hemignostum Steud. = **Ichnanthus pallens** (Sw.) Munro ex Benth. var. **pallens**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum hians Elliott = **Steinchisma hians** (Elliott) Nash
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum hirsutum Sw.
Sin.: *Panicum chacoense* Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 1996; Zuloaga, F. O., 1989; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(CHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 12138* (BAA, SI)].

Panicum hirtellum L. = **Oplismenus hirtellus** (L.) P. Beauv. subsp. **hirtellus**
Referencias: Burkart, A., 1969a; Cialdella, A. M., 1994b.

[Panicum hirticaule J. Presl]
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 1995, 1996.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Panicum horizontale (Willd.) G. Mey. = **Digitaria horizontalis** Willd.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b.

Panicum humboldtianum (Flüggé) Kuntze = **Paspalum humboldtianum** Flüggé
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., 1974.

Panicum humidicolum Rendle = **Urochloa humidicola** (Rendle) Morrone & Zuloaga
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1999; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum hylaeicum Mez
Sin.: *Panicum doellii* Mez, *Panicum laxum* Sw. var. *amplissimum* Hack.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., 1994; Zuloaga, F. O., Ellis, R. P. & Morrone, O., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR); PRY(CEN, CON, COA, ÑEE, PHA); URY(ART, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 327* (SI), *Zuloaga, F. O. 6789* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15801* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4689* (G, K, US)]; URY[*Berro, M. B. 4361* (MVFA)].

Panicum imberbe Poir. var. *dasyurum* (Willd. ex Nees) Döll = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Panicum inconstans Trin. ex Nees = **Ichnanthus inconstans** (Trin. ex Nees) Döll
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994f; Zuloaga, F. O., 1981a.

Panicum insulare (L.) G. Mey. var. *sacchariflorum* (Nees) Hack. = **Digitaria sacchariflora** (Nees) Henrard
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1970, 1974.

Panicum insulare (L.) Mez var. *tenerrimum* (Kunth) Hack. = **Digitaria tenuis** (Nees) Henrard
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum insulare (L.) G. Mey. var. *typicum* Hack., nom. inval. = **Digitaria insularis** (L.) Fedde
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1970, 1974.

Panicum ischaemum Schreb. = **Digitaria ischaemum** (Schreb. ex Schweigg.) Schreb. ex Muhl.
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum italicum L. = **Setaria italica** (L.) P. Beauv.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Panicum juergensii Hack. = **Thrasyopsis juergensii** (Hack.) Soderstr. & A.G. Burm.
Referencias: Burman, A. G., 1983.

Panicum junceum Nees, hom. illeg. = **Panicum tricholaenoides** Steud. var. **tricholaenoides**
Referencias: Palacios, R. A., 1969.

Panicum junceum Nees var. *subnutans* Döll = **Panicum tricholaenoides** Steud. var. **tricholaenoides**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum kleinii Swallen = **Panicum rude** Nees
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991; Renvoize, S. A., 1988.

Panicum knuthii Herter = **Hymenachne grumosa** (Nees) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., 1989; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum lachneum Nees = **Setaria lachnea** (Nees) Kunth
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Panicum latiglume Döll = **Dichanthelium sabulorum** (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **sabulorum**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum latiglume Döll var. *decalvatum* Döll = **Dichanthelium sabulorum** (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **sabulorum**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum laxum Sw. = **Steinchisma laxa** (Sw.) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum laxum Sw. f. *minor* Hack., nom. nud. = **Steinchisma laxa** (Sw.) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum laxum Sw. var. *amplissimum* Hack. = **Panicum hylaeicum** Mez
Referencias: Zuloaga, F. O., Ellis, R. P. & Morrone, O., 1992; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum laxum Sw. var. *pubescens* Döll, p.p. = **Steinchisma laxa** (Sw.) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Ellis, R. P. & Morrone, O., 1992.

Panicum laxum Sw. var. *vestitum* L.B. Sm. & Wassh. = **Steinchisma laxa** (Sw.) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum leiocarpon Spreng. = **Ichnanthus leiocarpus** (Spreng.) Kunth
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum leptachne Döll
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Ellis, R. P. & Morrone, O., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13727* (MBM)].

Panicum leucophaeum Kunth = **Digitaria insularis** (L.) Fedde
Referencias: Schumann, K. M. & Fedde, F. K. G., 1903.

Panicum lilloi Hack. = **Setaria oblongata** (Griseb.) Parodi
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Panicum longipedicellatum Swallen
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6101* (HBR)].

Panicum longissimum (Mez) Henrard
Sin.: *Sacciolepis longissima* Mez
Referencias: Zuloaga, F. O., 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 2935* (G, K, US)].

Panicum lorentzianum Mez = **Urochloa lorentziana** (Mez) Morrone & Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum macranthum Trin. = **Streptostachys macrantha** (Trin.) Zuloaga & Soderstr.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum magnispicula Zuloaga, Morrone & Valls
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O. & Valls, J. F. M., 1993[1992].
Hierba. Perenne. Endémica. 1200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Valls, J. F. M. 11521* (CEN, SI)].

Panicum malacophyllum (Trin.) Kuntze, hom. illeg. = **Paspalum malacophyllum** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum malacophyllum (Trin.) Kuntze var. *cordobense* Kuntze = **Paspalum malacophyllum** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum malacophyllum (Trin.) Kuntze var. *elongatum* (Griseb.) Kuntze = **Paspalum malacophyllum** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum maximum Jacq. = **Megathyrsus maximus** (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs var. **maximus**
Referencias: Simon, B. K. & Jacobs, S. W. L., 2003.

Panicum maximum Jacq. var. *pubiglume* K. Schum. = **Megathyrsus maximus** (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs var. **pubiglumis** (K. Schum.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs
Referencias: Simon, B. K. & Jacobs, S. W. L., 2003.

Panicum maximum Jacq. var. *trichoglume* Rob. = **Megathyrsus maximus** (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs var. **pubiglumis** (K. Schum.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs
Referencias: Simon, B. K. & Jacobs, S. W. L., 2003.

Panicum megaphyllum Steud. = **Setaria megaphylla** (Steud.) T. Durand & Schinz

Panicum megapotamicum Spreng. = **Steinchisma hians** (Elliott) Nash
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum megiston Schult. = **Panicum mertensii** Roth
Referencias: Zuloaga, F. O., 1979.

Panicum mertensii Roth
Sin.: *Panicum megiston* Schult.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., 1979, 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1852* (SI), *Zuloaga, F. O. 2291* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15800* (MBM)]; PRY[*Rojas, T. 2793* (BAA, US)].

Panicum miliaceum L.
Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., 1989; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); URY(CLA, COL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3606* (SI)]; BRA[*Simas, V. 132* (BLA)]; URY[*Bardier, M. s.n.* (MVFA)].

Panicum milioides Nees ex Trin. = **Steinchisma hians** (Elliott) Nash
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum milioides Nees ex Trin. var. *filifolium* R.A. Palacios = **Steinchisma hians** (Elliott) Nash
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum millegrana Poir.
Sin.: *Panicum rugulosum* Trin., *Panicum rugulosum* Trin. f. *effusum* Hack., *Panicum rugulosum* Trin. var. *subvelutinum* Döll, *Panicum subglobosum* Hack.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991; Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., 1979, 1989, 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 15* (SI), *Zuloaga, F. O. 618* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 13802* (MBM)]; PRY[*Woolston, A. L. 29* (BAA, K)].

Panicum missionum Mez, hom. illeg. = **Dichanthelium surrectum** (Chase ex Zuloaga & Morrone) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum missionum Ekman
Sin.: *Panicum gracilipes* Hack., *Panicum unilineatum* Mez
Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Zuloaga, F. O., 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003; Zuloaga, F. O., Sáenz, A. A. & Morrone, O., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, ITA); URY(MAL, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 2125* (MO, SI, US)]; BRA[*Valls, J. F. M. 3065* (ICN)]; PRY[*Balansa, B. 16* (G, K, P)]; URY[*Rosengurtt, B. 9974a* (US)].

Panicum molle Sw. = **Urochloa mollis** (Sw.) Morrone & Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum monostachyum Kunth = **Paspalum pilosum** Lam.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Panicum montanum (Griseb.) B.D. Jacks. ex Lillo = **Pennisetum montanum** (Griseb.) Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum montevidense Spreng. ex Döll = **Panicum racemosum** (P. Beauv.) Spreng.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum mosambicense Hack. = **Urochloa mosambicensis** (Hack.) Dandy
Referencias: Sulekic, A. A., 2004.

Panicum muticum Forssk. = **Urochloa mutica** (Forssk.) T.Q. Nguyen
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum myriostachyum Hack. = **Digitaria myriostachya** (Hack.) Henrard
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001.

Panicum najadum Hack. & Arechav. = **Oplismenopsis najada** (Hack. & Arechav.) Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum nemorale Schrad. = **Ichnanthus nemoralis** (Schrad.) Hitchc. & Chase
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum nemorosum Sw. = **Ichnanthus nemorosus** (Sw.) Döll
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994f; Zuloaga, F. O., 1981a.

[Panicum nervosum Lam.]
Sin.: *Panicum commelinifolium* Rudge
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Panicum nitidum auct. non Lam. = **Dichanthelium sabulorum** (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **polycladum** (Ekman) Zuloaga

Panicum nitidum Hack. & Arechav., hom. illeg. = **Panicum repens** L.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum oblongatum Griseb. = **Setaria oblongata** (Griseb.) Parodi
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Panicum oligistachyum Steud. = **Relchela panicoides** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Panicum olyroides Kunth var. **hirsutum** Henrard
Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Zuloaga, F. O., 1979, 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAU, COA); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7195* (SI)]; BRA[*Cervi, A. C. 3234* (NY)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 436* (G, P)]; URY[*Izaguirre, P. 21400* (MVFA)].

Panicum olyroides Kunth var. **olyroides**
Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., 1979, 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, GUA, MIE, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 9775* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 12994* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4642* (G)].

Panicum onurus Willd. ex Trin. = **Setaria vaginata** Spreng. var. **vaginata**
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Panicum oryzoides Ard. = **Echinochloa oryzoides** (Ard.) Fritsch
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum oryzoides Sw., hom. illeg. = **Acroceras zizanioides** (Kunth) Dandy
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O. & Sáenz, A. A., 1988.

Panicum ovuliferum Trin.
Sin.: *Panicum enneaneurum* Griseb., *Panicum ovuliferum* Trin. var. *intermedium* L.B. Sm. & Wassh.

Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., 1975, 1994; Zuloaga, F. O., Sáenz, A. A. & Morrone, O., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2400 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CEN, COA, MIE, PAI, SPE); URY(CLA, LAV, MAL, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4403* (SI), *Zuloaga, F. O. 2112* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 44850* (MBM)]; PRY[*Woolston, A. L. 90* (BAA, K, NY, SI, US)]; URY[*Mujica Sallés, J. 395* (MVFA)].

Panicum ovuliferum Trin. var. *intermedium* L.B. Sm. & Wassh. = **Panicum ovuliferum** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum pallens Sw. = **Ichnanthus pallens** (Sw.) Munro ex Benth. var. **pallens**
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994f; Stieber, M. T., 1987; Zuloaga, F. O., 1981a.

Panicum pallens Sw. var. *majus* Nees = **Ichnanthus pallens** (Sw.) Munro ex Benth. var. **majus** (Nees) Stieber
Referencias: Stieber, M. T., 1987.

Panicum paludivagum Hitchc. & Chase = **Paspalidium geminatum** (Forssk.) Stapf
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum pantrichum Hack.
Sin.: *Panicum protractum* Mez, *Panicum warmingii* Mez
Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., 1994; Zuloaga, F. O., Sáenz, A. A. & Morrone, O., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CON, COA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1439* (SI), *Zuloaga, F. O. 2392* (SI)]; BRA[*Davidse, G. 11054* (MO, SP)]; PRY[*Montes, J. E. 3320* (BAA, K, SI), *Zuloaga, F. O. 7272* (SI)].

Panicum paraguayense Steud. ex Döll, nom. inval. = **Urochloa mutica** (Forssk.) T.Q. Nguyen
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum parvifolium Lam.
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., 1989, 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 25732* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 14320* (MBM)]; PRY[*Woolston, A. L. 129* (K, NY), *Zuloaga, F. O. 7280* (SI)].

Panicum patagonicum Hieron. = **Panicum urvilleanum** Kunth
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum paucispicatum Morong = **Urochloa paucispicata** (Morong) Morrone & Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum pedersenii Zuloaga
Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Zuloaga, F. O., 1978, 1981b, 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(RGS); PRY(CEN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6926* (SI)]; BRA[*Bueno, O. L. 1594* (ICN)]; PRY[*Hassler, E. 3652* (G, K, NY, P, W)].

Panicum peladoense Henrard
Sin.: *Panicum bergii* Arechav. var. *leiophyllum* Hack. & Lindm.
Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 1996; Zuloaga, F. O., 1989, 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(COR, COS, JUJ, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CON, GUA, PAI); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3447* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 14726* (MBM)]; PRY[*Rojas, T. 2784* (BAA, US)]; URY[*Cabrera, A. L. 32388* (MO, SI, US)].

Panicum pencanum Phil. = **Dichanthelium sabulorum** (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **polycladum** (Ekman) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum penicillatum Willd. ex Nees, hom. illeg. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum penicilligerum (Speg.) Hack. = **Digitaria sacchariflora** (Nees) Henrard
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974.

Panicum perforatum Nees = **Anthaenantiopsis perforata** (Nees) Parodi
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994b.

Panicum pernambucense (Spreng.) Mez ex Pilg. = **Hymenachne pernambucense** (Spreng.) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum petrosum Trin. = **Paspalum foliiforme** S.S. Denham
Referencias: Denham, S. S., 2005.

Panicum phaeotrix Trin. = **Digitaria phaeotrix** (Trin.) Parodi var. **phaeotrix**
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001.

Panicum pilcomayense Hack. = **Panicum bergii** Arechav. var. **bergii**
Referencias: Zuloaga, F. O., 1989, 1994.

Panicum pilgeri Herter, nom. illeg. = **Panicum tricholaenoides** Steud. var. **tricholaenoides**
Referencias: Zuloaga, F. O., 1981b.

Panicum pilosum Sw.
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., 1989, 1994; Zuloaga, F. O., Ellis, R. P. & Morrone, O., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 2303* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 12458* (MBM)]; PRY[*Balansa, B. 2944* (BAF, G, K, P)].

Panicum pilosum Sw. var. *polygonatum* (Schrad.) Döll = **Panicum polygonatum** Schrad.
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991.

Panicum plantagineum Link = **Urochloa plantaginea** (Link) R.D. Webster
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum platense (Spreng.) Kuntze = **Paspalum dilatatum** Poir. subsp. **dilatatum**
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Panicum platycaule Hack. & Stuck., nom. nud. = **Setaria cordobensis** R.A.W. Herrm.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum platyphyllum Munro ex C. Wright = **Urochloa platyphylla** (Munro ex C. Wright) R.D. Webster
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum plicatulum (Michx.) Kuntze = **Paspalum plicatulum** Michx.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Panicum poaemorphum J. Presl = **Poidium poimorphum** (J. Presl) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Panicum poiretianum Schult. = **Setaria sulcata** Raddi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum polycladum Ekman = **Dichanthelium sabulorum** (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **polycladum** (Ekman) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum polygonatum Schrad.
Sin.: *Panicum boliviense* Hack., *Panicum pilosum* Sw. var. *polygonatum* (Schrad.) Döll, *Panicum potamium* Trin., *Panicum subpetiolatum* Hack. ex Bertoni, nom. nud.
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., 1979, 1994; Zuloaga, F. O., Ellis, R. P. & Morrone, O., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2186* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 13817* (MBM)]; PRY[*Woolston, A. L. 95* (K, SI)].

Panicum polystachion L. = **Pennisetum polystachion** (L.) Schult.

Panicum potamium Trin. = **Panicum polygonatum** Schrad.
Referencias: Zuloaga, F. O., 1989, 1994; Zuloaga, F. O., Ellis, R. P. & Morrone, O., 1992.

Panicum prionitis Nees
Sin.: *Coleataenia gynerioides* Griseb., *Panicum gynerioides* (Griseb.) Pilg., *Panicum prionitis* Nees subsp. *gynerioides* (Griseb.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Panicum prionitis* Nees var. *pallidum* Kuntze, *Panicum prionitis* Nees var. *varium* Kuntze
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., 1989, 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA); URY(ART, FLA, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 867* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 28404* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4762* (G, K)]; URY[*Herter, W. G. F. 987* (LIL)].

Panicum prionitis Nees var. *pallidum* Kuntze = **Panicum prionitis** Nees
Referencias: Zuloaga, F. O., 1994.

Panicum prionitis Nees var. *varium* Kuntze = **Panicum prionitis** Nees
Referencias: Zuloaga, F. O., 1994.

Panicum prionitis Nees subsp. *gynerioides* (Griseb.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Panicum prionitis** Nees
Referencias: Zuloaga, F. O., 1989; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum procurrens Nees ex Trin. = **Ichnanthus procurrens** (Nees ex Trin.) Stieber var. **procurrens**
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994f; Stieber, M. T., 1987; Zuloaga, F. O., 1981a.

Panicum procurrens Nees ex Trin. var. *subaequiglume* Hack. = **Ichnanthus procurrens** (Nees ex Trin.) Stieber var. **subaequiglume** (Hack.) Killeen & Kirpes
Referencias: Killeen, T. J. & Kirpes, C. C., 1991; Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994f.

Panicum proliferum Lam. var. *chloroticum* (Nees ex Trin.) Hack. = **Panicum dichotomiflorum** Michx.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum proliferum Lam. var. *xanthochlorum* Hack. ex Bertoni, nom. nud. = **Panicum dichotomiflorum** Michx.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum prostratum Lam. = **Urochloa reptans** (L.) Stapf
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum protractum Mez = **Panicum pantrichum** Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Sáenz, A. A. & Morrone, O., 1986.

Panicum pseudisachne Mez
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 29254* (MBM)].

Panicum psilanthum Steud. = **Steinchisma laxa** (Sw.) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum pumilum Poir. = **Setaria glauca** (L.) P. Beauv.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Panicum purpurascens Raddi = **Urochloa mutica** (Forssk.) T.Q. Nguyen
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum pycnanthum Steud. = **Hymenachne grumosa** (Nees) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., 1989.

Panicum quadriglume (Döll) Hitchc.
Sin.: *Panicum cayennense* Lam. var. *quadriglume* Döll
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 1996; Zuloaga, F. O., 1989, 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwindt, E. 1154* (LIL, MO, US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5102* (F, G, GH, M)].

Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng.
Sin.: *Monachne racemosa* P. Beauv., *Panicum montevidense* Spreng. ex Döll, *Thalasium montevidense* Spreng.
Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Palacios, R. A., 1969; Zuloaga, F. O., 1979; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(BAI, ERI); BRA(RGS, SCA); CHL(VIII, IX, X); URY(COL, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 2057* (SI)]; BRA[*Guglieri, A. 102* (ICN)]; CHL[*Hollermayer, A. 229* (CONC)]; URY[*Alonso Paz, E. 3717* (MVFQ)].

Panicum ramosissimum Trin. = **Dichanthelium sabulorum** (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **polycladum** (Ekman) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum ramosum Arechav., hom. illeg. = **Digitaria aequiglumis** (Hack. & Arechav.) Parodi var. **aequiglumis**
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001.

Panicum rariflorum Lam. = **Orthoclada laxa** (Rich.) P. Beauv.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Panicum recalvum (Nees) Kunth = **Digitaria laxa** (Rchb. ex A. Spreng.) Parodi
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001.

Panicum repandum Nees ex Trin. = **Thrasyopsis repanda** (Nees ex Trin.) Parodi
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Panicum repens L.
Sin.: *Panicum nitidum* Hack. & Arechav., hom. illeg.
Referencias: Palacios, R. A., 1969; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., 1981b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21661* (SI)]; BRA[*Bresolin, A. 1174* (HBR)].

Panicum reptans L. = **Urochloa reptans** (L.) Stapf

Panicum reversipilum Steud. = **Panicum urvilleanum** Kunth
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum rhizogonum Hack.
Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Zuloaga, F. O., 1994; Zuloaga, F. O., Sáenz, A. A. & Morrone, O., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 6352* (SI)]; BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 6029* (ICN)].

[Panicum rigidulum Bosc ex Nees]
Sin.: *Panicum agrostoides* Spreng., nom. illeg.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Panicum rivulare Trin. = **Hymenachne pernambucense** (Spreng.) Zuloaga
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991; Zuloaga, F. O., 1989.

Panicum rivulare Trin. var. *grumosum* (Nees) Hack. = **Hymenachne grumosa** (Nees) Zuloaga
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991; Zuloaga, F. O., 1989.

Panicum rude Nees
Sin.: *Panicum albospiculatum* Swallen, *Panicum apricum* Swallen, *Panicum kleinii* Swallen, *Panicum secundum* Trin., *Panicum semitectum* Swallen, hom. illeg.
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991; Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Sendulsky, T., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14934* (MBM)].

Panicum rugulosum Trin. = **Panicum millegrana** Poir.
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991.

Panicum rugulosum Trin. f. *effusum* Hack. = **Panicum millegrana** Poir.
Referencias: Zuloaga, F. O., 1979, 1989, 1994.

Panicum rugulosum Trin. var. *condensatum* Hack. = **Panicum sellowii** Nees
Referencias: Zuloaga, F. O., 1979, 1989.

Panicum rugulosum Trin. var. *subvelutinum* Döll = **Panicum millegrana** Poir.
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991.

Panicum sabulorum Lam. = **Dichanthelium sabulorum** (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **sabulorum**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum sabulorum Lam. var. *cordatum* Zuloaga & Morrone = **Dichanthelium sabulorum** (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **cordatum** (Zuloaga & Morrone) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum sabulorum Lam. var. *polycladum* (Ekman) R.A. Palacios = **Dichanthelium sabulorum** (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **polycladum** (Ekman) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum sanguinale L. = **Digitaria sanguinalis** (L.) Scop.
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b.

Panicum sanguinale L. var. *digitatum* (Sw.) Hack. ex Urb. = **Digitaria nuda** A. Schumach.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

[Panicum sanguinale L. var. longiglume Döll]
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Panicum sanguinale L. var. *vulgare* (Schrad.) Döll = **Digitaria sanguinalis** (L.) Scop.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974.

Panicum scabrifolium Nees = **Setaria scabrifolia** (Nees) Kunth
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Panicum schenckii Hack. = **Steinchisma spathellosa** (Döll) Renvoize
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum schroederi Herter = **Hymenachne grumosa** (Nees) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., 1989; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum schwackeanum Mez
Sin.: *Panicum helobium* Mez ex Henrard
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991; Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., 1989, 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, SPE); URY(CAS, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5227* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 13758* (MBM)]; PRY[*Rojas, T. 3629* (BAA)]; URY[*Rosengurtt, B. 11287* (CTES, LIL)].

Panicum sciurotis auct. non Trin. = **Dichanthelium sciurotoides** (Zuloaga & Morrone) Davidse

Panicum sciurotis Trin. = **Dichanthelium sciurotis** (Trin.) Davidse
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum sciurotis Trin. var. *breviglume* Döll = **Dichanthelium sciurotis** (Trin.) Davidse
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum sciurotis Trin. var. *scabriusculum* Döll = **Dichanthelium sciurotis** (Trin.) Davidse
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum sciurotoides Zuloaga & Morrone = **Dichanthelium sciurotoides** (Zuloaga & Morrone) Davidse
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum secundum Trin. = **Panicum rude** Nees
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991; Renvoize, S. A., 1988.

Panicum sellowii Nees
Sin.: *Panicum rugulosum* Trin. var. *condensatum* Hack.
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991; Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Zuloaga, F. O., 1979, 1989.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1600 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE); URY(TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1036* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 14269* (MBM)]; PRY[*Woolston, A. L. 70* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 4819* (PACA)].

Panicum semitectum Swallen, hom. illeg. = **Panicum rude** Nees
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum setarium Lam. = **Oplismenus hirtellus** (L.) P. Beauv. subsp. **hirtellus**
Referencias: Cialdella, A. M., 1994b.

Panicum setosum Sw. = **Setaria setosa** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Panicum sorghoideum Desv. ex Ham. = **Lasiacis sorghoidea** (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase
Referencias: Davidse, G., 1978[1979]; Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994g.

Panicum spathellosum Döll = **Steinchisma spathellosa** (Döll) Renvoize
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum spectabile Nees ex Trin. = **Echinochloa polystachya** (Kunth) Hitchc. var. **spectabilis** (Nees) Mart. Crov.
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994d; Renvoize, S. A., 1988.

Panicum spectabile Nees ex Trin. var. *gracile* Kuntze ex Hicken = **Echinochloa helodes** (Hack.) Parodi

Panicum spectabile Nees ex Trin. var. *helodes* Hack. = **Echinochloa helodes** (Hack.) Parodi
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1942; Sánchez, E. A., 1969.

Panicum stigmosum Trin. = **Dichanthelium stigmosum** (Trin.) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum stoloniferum Poir.
Sin.: *Panicum frondescens* G. Mey.
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Barreto, I. L., 1981; Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., 1981b, 1989.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 620* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 13239* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4706* (F, G)].

Panicum stramineum Hitchc. & Chase
Sin.: *Panicum caatingense* Renvoize
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 1995; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL); PRY(APY, CON, COA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4654* (SI), *Zuloaga, F. O. 412* (LP)]; PRY[*Hahn, W. J. 1911* (SI)].

Panicum subglobosum Hack. = **Panicum millegrana** Poir.
Referencias: Zuloaga, F. O., 1994.

Panicum subjunceum Ekman = **Panicum glabripes** Döll
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Panicum subpetiolatum Hack. ex Bertoni, nom. nud. = **Panicum polygonatum** Schrad.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum subtiliracemosum Renvoize = **Dichanthelium hebotes** (Trin.) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum subtipaniculatum Renvoize, nom. nud. = **Dichanthelium hebotes** (Trin.) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum sulcatum auct. non Raddi = **Setaria megaphylla** (Steud.) T. Durand & Schinz
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Panicum superatum Hack. = **Dichanthelium superatum** (Hack.) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum surrectum Chase ex Zuloaga & Morrone = **Dichanthelium surrectum** (Chase ex Zuloaga & Morrone) Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum tenax A. Rich. = **Setaria tenax** (A. Rich.) Desv.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Panicum trachystachyum Nees = **Anthaenantiopsis trachystachya** (Nees) Pilg.
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994b.

Panicum trichanthum Nees
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., 1989, 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE); URY(ART, PAY, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4470* (SI), *Zuloaga, F. O. 2217* (MO, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 14309* (MBM)]; PRY[*Brunner, D. R. 1719* (G, MO)]; URY[*Del Puerto, O. 2054* (MVFA)].

Panicum trichidiachne Döll
Referencias: Zuloaga, F. O., 1979, 1985, 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA, AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 13* (LP)]; BRA[*Swallen, J. R. 8758* (US)]; PRY[*Bertoni 5820* (BA)].

Panicum trichoides Sw.
Referencias: Zuloaga, F. O., 1975, 1981b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4465* (SI)].

Panicum tricholaenoides Steud. var. **flavomarginatum** (Mez) Zuloaga
Sin.: *Panicum flavomarginatum* Mez
Referencias: Zuloaga, F. O., 1991, 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAU, CAA, CEN, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 10* (B, G, K, P)].

Panicum tricholaenoides Steud. var. **tricholaenoides**
Sin.: *Panicum bambusoides* Speg. ex Arechav., hom. illeg., *Panicum junceum* Nees var. *subnutans* Döll, *Panicum junceum* Nees, hom. illeg., *Panicum pilgeri* Herter, nom. illeg.

Referencias: Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Palacios, R. A., 1969; Zuloaga, F. O., 1981b, 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(APA, AMA, PHA, SPE); URY(ART, DUR, PAY, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 330* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 632* (IAN, R)]; PRY[*Rojas, T. 10491* (SI, US)]; URY[*Rosengurtt, B. 11327* (NY)].

Panicum tridactylum Phil. = **Digitaria aequiglumis** (Hack. & Arechav.) Parodi var. **aequiglumis**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974.

Panicum truncatum Nees, hom. illeg. = **Otachyrium versicolor** (Döll) Henrard
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Panicum turfosum Mez = **Steinchisma spathellosa** (Döll) Renvoize
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum unilineatum Mez = **Panicum missionum** Ekman
Referencias: Zuloaga, F. O., Sáenz, A. A. & Morrone, O., 1986.

Panicum unispicatum Scribn. & Merr. = **Paspalum unispicatum** (Scribn. & Merr.) Nash
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum urticans L.B. Sm. & Wassh. = **Hymenachne pernambucense** (Spreng.) Zuloaga
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991.

Panicum urvilleanum Kunth
Sin.: *Monachne urvilleana* (Kunth) Herter, *Panicum patagonicum* Hieron., *Panicum reversipilum* Steud., *Panicum urvilleanum* Kunth f. *subpilosum* Kuntze, *Panicum urvilleanum* Kunth var. *versicolor* Kuntze
Referencias: Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Zuloaga, F. O., 1979; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vanni, R. O. 4363* (CTES)]; CHL[*Matthei, O. R. 275* (CONC)].

Panicum urvilleanum Kunth f. *subpilosum* Kuntze = **Panicum urvilleanum** Kunth
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum urvilleanum Kunth var. *chloroleucum* (Griseb.) Kuntze = **Panicum chloroleucum** Griseb.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum urvilleanum Kunth var. *versicolor* Kuntze = **Panicum urvilleanum** Kunth
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum validum Mez
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O. & Dubcovsky, J., 1989; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); BRA(SCA); URY(PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7032* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 15722* (HBR)]; URY[*Rosengurtt, B. 3798* (BAA, LIL, SP)].

Panicum velutinosum Nees f. *violascens* Stuck. = **Urochloa lorentziana** (Mez) Morrone & Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum velutinosum Nees f. *viride* Stuck. = **Urochloa lorentziana** (Mez) Morrone & Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum versicolor Döll = **Otachyrium versicolor** (Döll) Henrard
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994h; Renvoize, S. A., 1988; Sendulsky, T. & Soderstrom, T. R., 1984.

Panicum verticillatum L. = **Setaria verticillata** (L.) P. Beauv.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Panicum verticillatum L. var. *parviflorum* Döll = **Setaria adhaerans** (Forssk.) Chiov.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Panicum villaricense Mez = **Homolepis villaricensis** (Mez) Zuloaga & Soderstr.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 1994a; Zuloaga, F. O. & Soderstrom, T. R., 1985.

Panicum villosum Lam. = **Urochloa villosa** (Lam.) T.Q. Nguyen
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum vilvoides Trin. = **Sacciolepis vilvoides** (Trin.) Chase
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Panicum vinnulum Swallen = **Panicum cyanescens** Nees ex Trin.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Panicum violascens (Link) Kunth = **Digitaria violascens** Link
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001.

Panicum viride L. = **Setaria viridis** (L.) P. Beauv.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Panicum vulpisetum Lam. = **Setaria vulpiseta** (Lam.) Roem. & Schult. var. **vulpiseta**
Referencias: Pensiero, J. F., 1999; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Panicum warmingii Mez = **Panicum pantrichum** Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Panicum wettsteinii Hack.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16231* (US)].

Panicum zizanioides Kunth = **Acroceras zizanioides** (Kunth) Dandy
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1994a; Zuloaga, F. O., Morrone, O. & Sáenz, A. A., 1988.

Pantathera avenacea Phil. ex Hemsl., nom. nud. = **Megalachne berteroana** Steud.
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Pantathera fernandeziana Phil. = **Megalachne berteroana** Steud.
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002.

Pappophorum Schreb.

Número de especies: 7, 2 endémicas

Pappophorum alopecuroideum Vahl = **Pappophorum pappiferum** (Lam.) Kuntze
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

[Pappophorum alopecuroideum Vahl f. coerulescens Stuck.]
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Notas: Nombre dudoso.

Pappophorum caespitosum R.E. Fr.
Referencias: Pensiero, J. F., 1986; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 257* (SI), *Ragonese, A. E. 3011* (BAA, BAB, SF)]; PRY[*Vanni, R. O. 2610* (CTES)].

Pappophorum elongatum Spreng. = **Pappophorum pappiferum** (Lam.) Kuntze
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Pappophorum eutrianoides Trin. ex Nees = **Bouteloua megapotamica** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Pappophorum hassleri Hack.
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Pensiero, J. F., 1986; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: PRY(CAU, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4456* (BM)].

Pappophorum krapovickasii Roseng.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Pensiero, J. F., 1986; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR, LRI, SAL); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 14027* (BAA)]; PRY[*Degen, R. 3231* (CTES, FCQ, MO)].

Pappophorum macrospermum Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Pensiero, J. F., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(RGS); URY(RNO, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 17363* (CTES)]; BRA[*Valls, J. F. M. 2975* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 6080* (MVFA)].

Pappophorum megapotamicum Spreng. = **Bouteloua megapotamica** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Pappophorum mucronulatum Nees f. *elatior* Stuck. = **Pappophorum vaginatum** Buckley
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Pappophorum mucronulatum Nees f. *intermedia* Hack. = **Pappophorum phillippianum** Parodi
Referencias: Pensiero, J. F., 1986.

Pappophorum mucronulatum Nees var. *subsimplex* Hack. = **Pappophorum phillippianum** Parodi
Referencias: Pensiero, J. F., 1986.

Pappophorum mucronulatum Nees var. *vaginatum* (Phil.) Hack. = **Pappophorum phillippianum** Parodi
Referencias: Pensiero, J. F., 1986.

Pappophorum pappiferum (Lam.) Kuntze
Sin.: *Pappophorum alopecuroideum* Vahl, *Pappophorum elongatum* Spreng., *Pappophorum saccharoides* Griseb., *Saccharum pappiferum* Lam.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Pensiero, J. F., 1986; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 1600–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); PRY(APY, CEN, PHA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 387* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 6095* (FCQ, SI)].

Pappophorum phillippianum Parodi
Sin.: *Pappophorum mucronulatum* Nees f. *intermedia* Hack., *Pappophorum mucronulatum* Nees var. *subsimplex* Hack., *Pappophorum mucronulatum* Nees var. *vaginatum* (Phil.) Hack., *Pappophorum vaginatum* Phil., hom. illeg.
Referencias: Pensiero, J. F., 1986; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 24545* (CTES, LP), *Cialdella, A. M. 197* (SI)].

Pappophorum saccharoides Griseb. = **Pappophorum pappiferum** (Lam.) Kuntze
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Pappophorum subbulbosum Arechav. = **Pappophorum vaginatum** Buckley
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Pappophorum vaginatum Phil., hom. illeg. = **Pappophorum phillippianum** Parodi
Referencias: Pensiero, J. F., 1986.

Pappophorum vaginatum Buckley
Sin.: *Pappophorum mucronulatum* Nees f. *elatior* Stuck., *Pappophorum subbulbosum* Arechav.
Referencias: Pensiero, J. F., 1986; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Reeder, J. R. & Toolin, L. J., 1989.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, LPA, LRI, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, CON); URY(MON, PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz 3863* (BAA, BAB, CTES)]; PRY[*Rojas, T. 2775* (BAA)]; URY[*Herter, W. G. F. 540* (LIL, SI)].

Parapholis C.E. Hubb.

Número de especies: 2 introducidas

Parapholis incurva (L.) C.E. Hubb.
Sin.: *Aegilops incurva* L., *Lepturus incurvatus* (L.) Trin., *Pholiurus incurvus* (L.) Schinz & Thell.
Referencias: Greuter, W. R. & Rechinger, K. H., 1967; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, ERI, LPA, RNE, SCR, SFE); CHL(IV, V, VIII); URY(MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Piccinini, B. 1196* (BAB)]; CHL[*Jiles P., C. 2696* (CONC)]; URY[*Osten, C. 5629* (SI)].

Parapholis strigosa (Dumort.) C.E. Hubb.
Sin.: *Lepturus strigosus* Dumort.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–200 m.
Países: CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Montero, G. 4364* (CONC)].

Parodiochloa flabellata (Lam.) C.E. Hubb. = **Poa flabellata** (Lam.) Raspail
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Parodiochloa trachyantha (Phil.) A.M. Molina = **Rostraria trachyantha** (Phil.) Tzvelev
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Parodiolyra Soderstr. & Zuloaga

Número de especies: 1

Parodiolyra micrantha (Kunth) Davidse & Zuloaga
Sin.: *Olyra micrantha* Kunth, *Olyra micrantha* Kunth var. *decalvata* Döll, *Olyra micrantha* Kunth var. *dioecia* Döll, *Olyra micrantha* Kunth var. *lanceolata* Döll,

Olyra micrantha Kunth var. *subvelutina* Döll, *Olyra urvillei* Steud., *Olyra ventricosa* Nees

Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soderstrom, T. R. & Zuloaga, F. O., 1989; Zuloaga, F. O. & Davidse, G., 1999.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAN, PAI).

Ejemplares de referencia: ARG[*Renvoize, S. A. 3232* (SI, US)]; BRA[*Reitz, P. R. 2201* (HBR, NY)]; PRY[*Jiménez, B. 1393* (BM, CTES, MO, PY)].

Paspalidium Stapf

Número de especies: 1

Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf

Sin.: *Panicum paludivagum* Hitchc. & Chase, *Paspalidium geminatum* (Forssk.) Stapf var. *paludivagum* (Hitchc. & Chase) Gould, *Paspalidium paludivagum* (Hitchc. & Chase) Henrard, comb. superfl., *Paspalidium paludivagum* (Hitchc. & Chase) Parodi, *Paspalidium pilgeri* Herter

Referencias: Burkart, A., 1969a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, LPA, SFE, TUC); BRA(RGS); URY(MON, ROC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 322* (SI)]; BRA[*Sacco, J. C. 742* (US)]; URY[*Alonso Paz, E. 2150* (MVFQ)].

Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf var. *paludivagum* (Hitchc. & Chase) Gould = **Paspalidium geminatum** (Forssk.) Stapf

Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalidium paludivagum (Hitchc. & Chase) Henrard, comb. superfl. = **Paspalidium geminatum** (Forssk.) Stapf

Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalidium paludivagum (Hitchc. & Chase) Parodi = **Paspalidium geminatum** (Forssk.) Stapf

Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalidium pilgeri Herter = **Paspalidium geminatum** (Forssk.) Stapf

Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum L.

Número de especies: 107, 26 endémicas, 1 introducida

Paspalum abstrusum Trin. = **Paspalum hyalinum** Nees ex Trin.

Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum acuminatum Raddi

Sin.: *Paspalum serratum* Hitchc. & Chase

Referencias: Burkart, A., 1969a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., 1974.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CON, COA, ITA).

Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz 11512* (BAA, G, SI), *Zuloaga, F. O. 7038* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 8* (RB)]; PRY[*Hassler, E. 11930* (G, SI, US)].

Paspalum agnesiae L.B. Sm. & Wassh. = **Paspalum juergensii** Hack.

Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum album Swallen = **Paspalum erianthum** Nees ex Trin.

Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum alcalinum Mez

Referencias: Cabrera, A. L., 1970a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.

Países: ARG(CHA, COS, DFE, FOR, SAL, SDE, SFE); PRY(APY, PHA).

Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 2564* (BAA, LIL, US)]; PRY[*Rojas, T. 2778* (BAA, G, US), *Zuloaga, F. O. 7319* (SI)].

Paspalum almum Chase

Sin.: *Paspalum hexastachyum* Parodi, *Paspalum ovale* Nees ex Steud. var. *apiculatum* Hack.

Referencias: Quarín, C. L., 1974; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, CEN, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA); URY(ART, PAY).

Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 20901* (BAA, CTES, G, LIL, SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 4634* (ICN)]; PRY[*Quarín, C. L. 4049* (CTES, G, SI), *Zuloaga, F. O. 7336* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 3667* (BAA, LIL)].

Paspalum ambustum Swallen = **Paspalum ovale** Nees ex Steud.

Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum ammodes Trin.
Referencias: Morrone, O., Denham, S. & Zuloaga, F. O., 2004; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16025* (G, MA, P, SI)]; PRY[*Balansa, B. 71* (BM, G, K, P, US)].

Paspalum approximatum Döll
Sin.: *Paspalum parinervium* Mez
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15056* (BAA, US)]; PRY[*Rojas, T. 3996* (BAA, CTES)].

Paspalum arechavaletae Hack. = **Paspalum exaltatum** J. Presl
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum arenarium Schrad.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 12730* (K, MBM)].

Paspalum arenicolum Herter, hom. illeg. = **Paspalum nicorae** Parodi
Referencias: Burkart, A., 1969a; Cabrera, A. L., 1970a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

[Paspalum arundinaceum Poir.]
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Paspalum arundinellum Mez
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); PRY(APY, CAU, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6810* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 22* (BM, G, K, P, US), *Zuloaga, F. O. 7326* (SI)].

Paspalum atratum Swallen
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: PRY(AMA, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Quarín, C. L. 4096* (CTES)]; PRY[*Norrmann, G. A. 153* (MO), *Zuloaga, F. O. 7252* (SI)].

Paspalum axicilium Steud. = **Ischaemum minus** J. Presl
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum barbatum Nees ex Trin., hom. illeg. = **Axonopus siccus** (Nees) Kuhlm.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum barbatum Nees ex Trin. var. *glabrum* Döll = **Axonopus siccus** (Nees) Kuhlm.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum barbatum Nees ex Trin. var. *laxius* Döll = **Axonopus siccus** (Nees) Kuhlm.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum barbatum Nees ex Trin. var. *scabrum* Pilg. = **Axonopus siccus** (Nees) Kuhlm.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum barbigerum Kunth = **Axonopus siccus** (Nees) Kuhlm.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum barretoi Canto-Dorow, Valls & Longhi-Wagner = **Paspalum minus** E. Fourn.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.

Paspalum bertonii Hack.
Sin.: *Paspalum niederleinii* Mez, *Paspalum potamophilum* Renvoize
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Türpe, A. M., 1967[1966]; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA, CAN, MIE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Quarín, C. L. 3448* (SI, US)]; BRA[*Hatschbach, G. 39824* (CTES, MO)]; PRY[*Bertoni 1705* (G, LIL, P, US)].

Paspalum bicilium Mez = **Paspalum polyphyllum** Nees ex Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum bicorne Lam. = **Digitaria bicornis** (Lam.) Roem. & Schult.
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974, 1994b.

Paspalum boscianum Flüggé = **Paspalum scrobiculatum** L.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum brasiliense (Spreng.) Hack. = **Axonopus brasiliensis** (Spreng.) Kuhlm.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum brunneum Mez = **Paspalum coryphaeum** Trin.
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 15332* (SI), *Montes, J. E. 9727* (LIL)].

Paspalum buckleyanum Vasey = **Paspalum hartwegianum** E. Fourn.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum caespitosum auct. non Flüggé = **Paspalum commune** Lillo
Referencias: Parodi, L. R., 1928a.

Paspalum candidum (Humb. & Bonpl. ex Flüggé) Kunth
Sin.: *Paspalum lineispatha* Mez, *Paspalum scabrum* Scribn., *Paspalum vinosum* Mez, *Reimaria candida* Humb. & Bonpl. ex Flüggé
Referencias: Morrone, O., Zuloaga, F. O. & Carbono, E., 1995; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Anual. Nativa. 1000–4600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4426* (SI)]; CHL[*Gunther 33* (US)].

Paspalum caperatum Swallen = **Paspalum glaucescens** Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum carinatum Humb. & Bonpl. ex Flüggé
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 17934* (K, US)].

Paspalum ceresia (Kuntze) Chase
Sin.: *Panicum ceresia* Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4386* (SI), *Venturi, S. 8320* (K, LIL, MO, P, SI, W)].
Notas: Cita dudosa para el Paraguay (Denham et al., 2002).

Paspalum chacoense Parodi
Referencias: Türpe, A. M., 1967[1966]; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(FOR); PRY(APY, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 8476* (BAA, K, US)]; PRY[*Rojas, T. 2737* (US)].

Paspalum chaseanum Parodi
Referencias: Barreto, I. L., 1954; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Parodi, L. R., 1932; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 8391* (BAA, K, SI, US)]; PRY[*Krapovickas, A. 45457* (CTES, G, LIL)].

Paspalum chepica Steud. = **Paspalum distichum** L.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum chinense Nees = **Digitaria violascens** Link
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001.

Paspalum ciliatum Kunth, hom. illeg. = **Paspalum humboldtianum** Flüggé
Referencias: Chase, A., 1929; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum ciliocinctum Mez = **Paspalum ellipticum** Döll
Referencias: Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.

Paspalum cinerascens (Döll) A.G. Burm. & C.N. Bastos
Sin.: *Panicum cinerascens* Döll, *Thrasya cinerascens* (Döll) Judz.
Referencias: Denham, S. S., 2005; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 8813* (US)]; PRY[*Zuloaga, F. O. 7305* (SI)].

Paspalum comans Trin. ex Döll = **Axonopus comans** (Trin. ex Döll) Kuhlm.
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994; Renvoize, S. A., 1988.

Paspalum commune Lillo
Sin.: *Paspalum caespitosum* auct. non Flüggé, *Paspalum virgatum* L. f. *oligostachyum* Hack., nom. nud.
Referencias: Türpe, A. M., 1967[1966]; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 19* (SI), *Krapovickas, A. 30357* (BAA, CTES, G, SI)].

Paspalum commutatum Nees = **Paspalum scrobiculatum** L.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum compressifolium Swallen
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CEN, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1682* (SI)]; BRA[*Swallen, J. R. 8012* (US)]; PRY[*Hassler, E. 10749* (BM, G, LIL, P, W), *Kiesling, R. 9766* (G, PY, SI)].

Paspalum compressum (Sw.) Nees, comb. superfl. = **Axonopus compressus** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970.

Paspalum compressum (Sw.) Raspail = **Axonopus compressus** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Chase, A. & Niles, C. D., 1962; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum compressum (Sw.) Raspail var. *arenarium* Bertoni = **Axonopus fissifolius** (Raddi) Kuhlm.
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum concavum Renvoize = **Paspalum glabrinode** (Hack.) Morrone & Zuloaga
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum conduplicatum Canto-Dorow, Valls & Longhi-Wagner
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Barreto, I. L. s.n.* (CEN, ICN)].

Paspalum conjugatum Bergius
Sin.: *Paspalum renggeri* Steud.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 686* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13539* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 8188* (BM, G, K, LIL, MO, P)].

Paspalum conspersum Schrad.
Sin.: *Paspalum virgatum* L. var. *conspersum* (Schrad.) Döll
Referencias: Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Quarín, C. L., 1977; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, COA, ÑEE, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz 16411* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 24151* (K)]; PRY[*Rojas, T. 8022* (BAA, US)].

Paspalum corcovadense Raddi
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 43611* (MBM, MO), *Krapovickas, A. 43523* (CTES)].

Paspalum cordatum Hack.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 3248* (G, US, W)].

[Paspalum coryphaeum Trin.]
Sin.: *Paspalum brunneum* Mez
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Paspalum crispatum Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 10789* (B, BM, G, K, LIL, P, US)].

Paspalum cristatum Trin. = **Paspalum flavum** J. Presl
Referencias: Morrone, O., Zuloaga, F. O. & Carbono, E., 1995; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum cromyorrhizon Trin. ex Döll
Sin.: *Paspalum notatum* Flüggé var. *cromyorrhizon* (Trin. ex Döll) Herter, *Paspalum notatum* Flüggé var. *eriorrhizon* Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS); URY(CLA, DUR, MON, RNO, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 21675* (BAA, CTES, G, LIL)]; BRA[*Burkart, A. 25051* (SI)]; URY[*Parodi, L. R. 732* (BAA)].

Paspalum cumingii Nees ex Steud. = **Paspalum dasypleurum** Kunze ex E. Desv.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum dasypleurum Kunze ex E. Desv.
Sin.: *Paspalum cumingii* Nees ex Steud., *Paspalum pachyrrhizum* Steud., *Paspalum paradisiacum* Steud.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Macaya, J. & Faúndez Y., L., 1996a; Nicora, E. G., 1978; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 476* (BAA)]; CHL[*Aravena 281* (CONC), *Quarín, C. L. 4065* (CTES), *Zuloaga, F. O. 7241* (SI)].

Paspalum dasytrichum Dusén ex Swallen
Sin.: *Paspalum dasytrichum* Dusén ex Swallen var. *glabrum* L.B. Sm. & Wassh.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15700* (G, K, US)].

Paspalum dasytrichum Dusén ex Swallen var. *glabrum* L.B. Sm. & Wassh. = **Paspalum dasytrichum** Dusén ex Swallen
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum decumbens Sw.
Referencias: Denham, S. S., 2005; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 11702* (US)].

Paspalum dedeccae Quarín
Sin.: *Paspalum doellii* Chase ex Dedecca, nom. inval., *Paspalum doellii* Chase ex Filg.
Referencias: Quarín, C. L., 1974; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CAN, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 16974* (SI)]; BRA[*Swallen, J. R. 8381* (US)]; PRY[*Rojas 3993* (BAA, CTES)].

Paspalum delochei Steud. = **Paspalum fasciculatum** Willd. ex Flüggé
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum densiflorum Döll = **Paspalum umbrosum** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum densum auct. non Poir. = **Paspalum millegrana** Schrad.

Paspalum densum Poir. var. *eliptico-oblongum* Hack. ex Stuck. = **Paspalum intermedium** Munro ex Morong & Britton
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum dentatosulcatum Arechav. = **Anthaenantia lanata** (Kunth) Benth.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum denticulatum Trin.
Sin.: *Paspalum hieronymii* Hack., *Paspalum jujuyense* Zuloaga, *Paspalum lividum* Trin. ex Schltdl., *Paspalum proliferum* Arechav.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, CEN, PHA); URY(CAS, COL, MON, PAY, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14473* (SI)]; BRA[*Swallen, J. R. 9214* (US)]; PRY[*Rojas, T. 2733* (BAA, US), *Zuloaga, F. O. 7330* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 1006* (SI)].

Paspalum depressum Steud. = **Axonopus compressus** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum devincenzii Parodi = **Paspalum durifolium** Mez
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum dilatatum Poir. f. *paucispica* Hack. = **Paspalum dilatatum** Poir. subsp. **dilatatum**
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., 1974.

Paspalum dilatatum Poir. var. *pauciciliatum* Parodi = **Paspalum pauciciliatum** (Parodi) Herter
Referencias: Burkart, A., 1969a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum dilatatum Poir. var. *sacchariferum* Arechav. = **Paspalum dilatatum** Poir. subsp. **dilatatum**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., 1974.

Paspalum dilatatum Poir. subsp. **dilatatum**
Sin.: *Panicum platense* (Spreng.) Kuntze, *Paspalum dilatatum* Poir. f. *paucispica* Hack., *Paspalum dilatatum* Poir. var. *sacchariferum* Arechav., *Paspalum eriophorum* Schult., *Paspalum lanatum* Spreng., hom. illeg., *Paspalum ovatum* Nees ex Trin., *Paspalum ovatum* Nees ex Trin. var. *grandiflorus* Nees, *Paspalum pedunculare* J. Presl, *Paspalum platense* Spreng.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Mujica Sallés, J., 1996; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, IDE, RME); PRY(PAI); URY(ART, COL, MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5503* (LIL)]; BRA[*Davidse, G. 11014* (MO)]; CHL[*Barros, E. 3970* (BAA)]; PRY[*Zardini, E. M. 25207* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 334* (MO, SI)].
Notas: Subespecie introducida en Chile.

Paspalum dilatatum Poir. subsp. **flavescens** Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS); BRA(RGS, SCA); URY(MAL, MON).

Ejemplares de referencia: ARG[*Quarín, C. L. 3961* (MO)]; BRA[*Quarín, C. L. 4070* (MO, SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 11301* (LIL)].

Paspalum dissitiflorum Trin. = **Axonopus brasiliensis** (Spreng.) Kuhlm.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum distichophyllum auct. non Kunth = **Paspalum polyphyllum** Nees ex Trin.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a.

Paspalum distichum L.
Sin.: *Anastrophus paspaloides* (Michx.) Nash, *Paspalum chepica* Steud., *Paspalum distichum* L. var. *digitaria* (Poir.) Hack., *Paspalum fernandezianum* Colla, *Paspalum paspalodes* (Michx.) Scribn.
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005; Nicora, E. G., 1978; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; de Koning, R. & Sosef, M. S. M., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(II, V, VIII, IX, IJF); PRY(APY, CEN, ITA, PHA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4341* (SI), *Zuloaga, F. O. 6935* (SI)]; BRA[*Barreto, I. L. 1432* (SI)]; CHL[*Barros, E. 653* (CONC)]; PRY[*Hassler, E. 12452* (BM, G, K, MO, SI, US)]; URY[*Osten, C. 5972* (SI)].

Paspalum distichum L. var. *digitaria* (Poir.) Hack. = **Paspalum distichum** L.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum doellii Chase ex Dedecca, nom. inval. = **Paspalum dedeccae** Quarín
Referencias: Quarín, C. L., 1975; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum doellii Chase ex Filg. = **Paspalum dedeccae** Quarín
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum durifolium Mez
Sin.: *Paspalum devincenzii* Parodi
Referencias: Barreto, I. L., 1966; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, SFE); BRA(RGS); PRY(APA, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 1072* (BAA, CTES, LIL, MO, SI)]; BRA[*Dutra, J. 661* (ICN, US)]; PRY[*Balansa, B. 68* (B, G, P, US)]; URY[*Arechavaleta, J. 4989a* (BAA, MVM, P, US)].

Paspalum dusenii Hack. = **Paspalum erianthoides** Lindm.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum eburneum Henrard = **Paspalum maculosum** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.

Paspalum ekmanianum Henrard
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–2200 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4414* (SI)].

Paspalum ellipticum Döll
Sin.: *Paspalum ciliocinctum* Mez, *Paspalum proximum* Mez
Referencias: Quarín, C. L., 1975; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1300 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3233* (MO, SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 16047* (BM, G, K, SI)]; PRY[*Balansa, B. 69* (BAA, G, K, P, US)].

Paspalum elongatum Griseb. = **Paspalum malacophyllum** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum enode Hack. ex Arechav. = **Digitaria enodis** (Hack. ex Arechav.) Parodi
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001.

Paspalum epilis Parodi = **Paspalum ovale** Nees ex Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum equitans Mez
Sin.: *Paspalum fasciculatum* Willd. ex Flüggé var. *paraguayense* Hack., *Paspalum pruinosum* Hack., hom. illeg.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Türpe, A. M., 1967[1966]; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAU, CON, GUA, MIE, SPE); URY(CAS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 4181* (BAA)]; BRA[*Quarín, C. L. 1721* (BAA, CTES)]; PRY[*Hassler, E. 10779* (BM, G, LIL, P, US, W)]; URY[*Rosengurtt, B. 8* (BAA)].

Paspalum erianthoides Lindm.
Sin.: *Paspalum dusenii* Hack.
Referencias: Quarín, C. L., 1975; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CEN, GUA).

Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3066* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 10885* (BM, G, K, W)]; PRY[*Balansa, B. 72* (BM, G, K, P, S, US)].

Paspalum erianthum Nees ex Trin.
Sin.: *Paspalum album* Swallen
Referencias: Morrone, O., Denham, S. & Zuloaga, F. O., 2004; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA); URY(ART, MON, PAY).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 17409* (G, MO, P, SI)]; PRY[*Hassler, E. 10765a* (BM, K, US)]; URY[*Rosengurtt, B. 6614b* (MVFA)].

Paspalum eriophorum Schult. = **Paspalum dilatatum** Poir. subsp. **dilatatum**
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum eucomum Nees, hom. illeg. = **Paspalum eucomum** Nees ex Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum eucomum Nees ex Trin.
Sin.: *Paspalum eucomum* Nees, hom. illeg., *Paspalum splendens* Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 18065* (BM, MA, MO, P, SI)].

Paspalum exaltatum J. Presl
Sin.: *Paspalum arechavaletae* Hack.
Referencias: Barreto, I. L., 1966; Burkart, A., 1969a; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SFE, SLU); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, COA); URY(CAS, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5346* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 5385* (LIL, US)]; PRY[*Rosengurtt, B. 5352* (BAA, K, US)]; URY[*Rosengurtt, B. 713* (BAA, SI)].

Paspalum falcatum Nees ex Steud.
Sin.: *Paspalum falcatum* Nees ex Steud. subsp. *microcarpum* Ekman, *Paspalum leucotrichum* Steud.
Referencias: Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Türpe, A. M., 1967[1966]; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 1100–1300 m.
Países: ARG(CHA, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(CAA, ITA); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14770* (SI, US)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 16401* (BAA, MO, SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 4381* (BAA, K)]; URY[*Arechavaleta, J. s.n.* (BAA)].

Paspalum falcatum Nees ex Steud. subsp. *microcarpum* Ekman = **Paspalum falcatum** Nees ex Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum fasciculatum Willd. ex Flüggé
Sin.: *Paspalum delochei* Steud., *Paspalum orizaeforme* Steud.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE, TUC); PRY(CEN, PHA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3320* (MO, SI)]; PRY[*Balansa, B. 100* (BM, G, P, US, W)]; URY[*Deloche s.n.* (M)].

Paspalum fasciculatum Willd. ex Flüggé var. *paraguayense* Hack. = **Paspalum equitans** Mez
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum fernandezianum Colla = **Paspalum distichum** L.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum ferrugineum Trin. = **Paspalum quadrifarium** Lam.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum filiculme Nees ex Miq. = **Digitaria violascens** Link
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001.

Paspalum filifolium Nees ex Steud.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 900–1900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 15796* (R, SI, US)].

Paspalum filostachyum A. Rich. ex Steud. = **Axonopus compressus** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum fissifolium Raddi = **Axonopus fissifolius** (Raddi) Kuhlm.
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994; Okada, K. A., 1969; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum flaccidum Nees
Sin.: *Paspalum vescum* Swallen
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 2321* (BM, G, MO, R, US, W)]; PRY[*Balansa, B. 84* (BM, G, K, P, US, W)].

Paspalum flavum J. Presl
Sin.: *Paspalum cristatum* Trin.
Referencias: Morrone, O., Zuloaga, F. O. & Carbono, E., 1995; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Anual. Nativa.
Países: CHL(sin localidad).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cuming, H. 1054* (K, US, W)].
Notas: Coleccionada en Chile sin indicar localidad precisa.

Paspalum flexile Mez = **Axonopus purpusii** (Mez) Chase
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum foliiforme S.S. Denham
Sin.: *Panicum petrosum* Trin., *Thrasya petrosa* (Trin.) Chase
Referencias: Denham, S. S., 2005; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 200 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zuloaga, F. O. 7275* (SI)].

Paspalum furcatum Flüggé = **Axonopus furcatus** (Flüggé) Hitchc.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum furcatum Flüggé var. *grandiflorum* Döll = **Axonopus obtusifolius** (Raddi) Chase
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum furcatum Flüggé var. *parviflorum* Döll = **Axonopus compressus** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum fuscescens J. Presl = **Digitaria fuscescens** (J. Presl) Henrard
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001.

Paspalum gardnerianum Nees
Sin.: *Paspalum gardnerianum* Nees var. *oligostachyum* Döll
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11904* (BM, G, K, P, SI, US), *Zuloaga, F. O. 7306* (SI)].

Paspalum gardnerianum Nees var. *oligostachyum* Döll = **Paspalum gardnerianum** Nees
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum gayanum Desv. = **Paspalum vaginatum** Sw.
Referencias: Cabrera, A. L., 1970a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum giganteum Arechav., hom. illeg. = **Paspalum rufum** Nees ex Steud.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum giganteum Kuntze = **Axonopus scoparius** (Flüggé) Kuhlm.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum glabriflorum (Hack.) Herter = **Paspalum inaequivalve** Raddi
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum glabrinode (Hack.) Morrone & Zuloaga
Sin.: *Brachiaria glabrinodis* (Hack.) Henrard, *Panicum glabrinoide* Hack., *Paspalum concavum* Renvoize
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1989; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(CHA, MIS); BRA(PAR); PRY(ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6809* (BAA, SI, US)]; BRA[*Hatschbach, G. 15859* (K)]; PRY[*Jiménez 21* (BAA)].

Paspalum glaucescens Hack.
Sin.: *Paspalum caperatum* Swallen, *Paspalum pannuceum* Swallen, *Paspalum paranaense* Swallen, *Paspalum viale* Swallen, *Paspalum yaguaronense* Henrard
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Parodi, L. R., 1943a; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE); URY(RIV, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 15363a* (SI, US)]; BRA[*Davidse, G. 11396* (MO)]; PRY[*Hassler, E. 8339* (BM, G, K, LIL, MO, P, US)]; URY[*Diaz, M. 7011* (IAC)].

Paspalum gracielae Sulekic
Referencias: Sulekic, A. A., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–1600 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sulekic, A. A. 3123* (SI)].

Paspalum guaraniticum Parodi = **Paspalum ionanthum** Chase
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.

Paspalum guaraniticum Parodi var. *crovettoi* Burkart = **Paspalum ionanthum** Chase
Referencias: Quarín, C. L. & Normann, G. A., 1987; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.

Paspalum guenoarum Arechav. var. **guenoarum**
Sin.: *Paspalum guenoarum* Arechav. var. *vestitum* Henrard, *Paspalum plicatulum* Michx. subsp. *guenoarum* (Arechav.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Paspalum plicatulum* Michx. var. *robustum* Hack.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 4877* (SI)]; BRA[*Barreto, I. L. 1436* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 8003* (BAA, CTES, G, MO)]; URY[*Cabrera, A. L. 32394* (SI, US)].

Paspalum guenoarum Arechav. var. **rojasii** (Hack.) Parodi ex Burkart
Sin.: *Paspalum indutum* Swallen, hom. illeg., *Paspalum rhodopedum* L.B. Sm. & Wassh., *Paspalum rojasii* Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 27648* (MO)]; BRA[*Burkart, A. 25052* (SI)]; PRY[*Morrone, O. 300* (SI)].

Paspalum guenoarum Arechav. var. *vestitum* Henrard = **Paspalum guenoarum** Arechav. var. **guenoarum**
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

[Paspalum guttatum Trin.]
Referencias: Morrone, O., Denham, S. & Zuloaga, F. O., 2004; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Paspalum hartwegianum E. Fourn.]
Sin.: *Paspalum buckleyanum* Vasey
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Paspalum hassleri Hack. = **Paspalum rufum** Nees ex Steud.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum haumanii Parodi
Sin.: *Paspalum haumanii* Parodi var. *genuinum* Parodi, nom. inval., *Paspalum haumanii* Parodi var. *macranthum* Parodi, *Paspalum haumanii* Parodi var. *pilosum* Parodi, *Paspalum multiflorum* Döll, *Paspalum multiflorum* Döll f. *abbreviatum* Hack. ex Stuck.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, COA, SPE); URY(FLA, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 20326* (CTES, LIL), *Zuloaga, F. O. 7213* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13802* (BM, K, SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 17134* (MO, SI)]; URY[*Cabrera, A. L. 4592* (SI)].

Paspalum haumanii Parodi var. *genuinum* Parodi, nom. inval. = **Paspalum haumanii** Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum haumanii Parodi var. *macranthum* Parodi = **Paspalum haumanii** Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum haumanii Parodi var. *pilosum* Parodi = **Paspalum haumanii** Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum hexastachyum Parodi = **Paspalum almum** Chase
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum hieronymii Hack. = **Paspalum denticulatum** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum humboldtianum Flüggé
Sin.: *Panicum humboldtianum* (Flüggé) Kuntze, *Paspalum ciliatum* Kunth, hom. illeg., *Paspalum humboldtianum* Flüggé var. *stuckertii* (Hack.) Hack., *Paspalum stuckertii* Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 1600–2300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4375* (SI), *Zuloaga, F. O. 3011* (SI)].

Paspalum humboldtianum Flüggé var. *stuckertii* (Hack.) Hack. = **Paspalum humboldtianum** Flüggé
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum hyalinum Nees ex Trin.
Sin.: *Paspalum abstrusum* Trin.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–1500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16312* (G, SI)]; PRY[*Morrone, O. 561* (MO, SI)].

Paspalum hydrophilum Henrard = **Paspalum wrightii** Hitchc. & Chase
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum inaequiglume Parodi = **Paspalum usteri** Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum inaequivalve Raddi
Sin.: *Paspalum glabriflorum* (Hack.) Herter, *Paspalum inaequivalve* Raddi var. *glabriflorum* Hack.

Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Türpe, A. M., 1967[1966]; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CEN, COA, ITA, PAI, PHA); URY(PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3173* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 17733* (MO)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 658* (G, P, SI, US, W)]; URY[*Rosengurtt, B. 3825* (P)].

Paspalum inaequivalve Raddi var. *glabriflorum* Hack. = **Paspalum inaequivalve** Raddi
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum indecorum Mez
Sin.: *Paspalum stramineum* Ekman, hom. illeg.
Referencias: Quarín, C. L., 1975; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(GUA); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5783* (MO, SI)]; BRA[*Kappel, A. s.n.* (BLA)]; PRY[*Montes, J. E. 16444* (LIL)]; URY[*Quarín, C. L. 3639* (MO)].

Paspalum indutum Swallen, hom. illeg. = **Paspalum guenoarum** Arechav. var. **rojasii** (Hack.) Parodi ex Burkart
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum intermedium Munro ex Morong & Britton
Sin.: *Paspalum densum* Poir. var. *eliptico-oblongum* Hack. ex Stuck., *Paspalum intermedium* Munro ex Morong & Britton var. *goyensis* Burkart
Referencias: Barreto, I. L., 1966; Burkart, A., 1969a; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PHA, SPE); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5790* (SI)]; BRA[*Swallen, J. R. 7794* (US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4225* (BM, G, K, SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 7215* (SI)].

Paspalum intermedium Munro ex Morong & Britton var. *goyensis* Burkart = **Paspalum intermedium** Munro ex Morong & Britton
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum ionanthum Chase
Sin.: *Paspalum guaraniticum* Parodi, *Paspalum guaraniticum* Parodi var. *crovettoi* Burkart, *Paspalum ionanthum* Chase subsp. *guaraniticum* (Parodi) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Quarín, C. L. & Normann, G. A., 1987; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); BRA(RGS); PRY(APY, CAU, CEN, COA, MIE, PAI); URY(RIV, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Quarín, C. L. 1752* (CTES, G, LIL), *Zuloaga, F. O. 7112* (SI)]; BRA[*Orth 2734* (BAA, LIL, MO)]; PRY[*Rojas, T. 14022* (BAA, LIL)]; URY[*Rosengurtt, B. 6416* (SI)].

Paspalum ionanthum Chase subsp. *guaraniticum* (Parodi) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Paspalum ionanthum** Chase
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.

Paspalum iridaceum Mez = **Axonopus suffultus** (J.C. Mikan ex Trin.) Parodi
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994; Okada, K. A., 1969; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum jesuiticum Parodi
Sin.: *Paspalum perspicinervium* Renvoize
Referencias: Parodi, L. R., 1969; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 239* (BAA, BAB)]; BRA[*Reitz, P. R. 5708* (G)].

Paspalum juergensii Hack.
Sin.: *Paspalum agnesiae* L.B. Sm. & Wassh.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Türpe, A. M., 1967[1966]; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 6107* (SI)]; BRA[*Davidse, G. 11071* (MO)]; URY[*Rosengurtt, B. 4823* (MA)].

Paspalum jujuyense Zuloaga = **Paspalum denticulatum** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum lachneum Nees ex Steud.
Sin.: *Anthaenantiopsis racemosa* Renvoize, *Paspalum obscurum* Nees ex Steud., *Paspalum verrucosum* Hack.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 1737* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 3944* (US)].

Paspalum lagascae Roem. & Schult. = **Paspalum tenellum** Willd.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum lanatum Kunth = **Anthaenantia lanata** (Kunth) Benth.
Referencias: Cialdella, A. M., 1994c; Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum lanatum Spreng., hom. illeg. = **Paspalum dilatatum** Poir. subsp. **dilatatum**
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum lanuginosum Nees = **Digitaria lanuginosa** (Nees) Henrard
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum larrañagai Arechav. = **Paspalum urvillei** Steud.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

[Paspalum laxum Lam.]
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Paspalum lenticulare Kunth f. *intumescens* (Döll) Killeen = **Paspalum plicatulum** Michx.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum leptostachyum Flüggé = **Axonopus leptostachyus** (Flüggé) Hitchc.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum leucotrichum Steud. = **Paspalum falcatum** Nees ex Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum lilloi Hack.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Türpe, A. M., 1967[1966]; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5226* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 23168* (CTES, K)]; PRY[*Chodat, R. H. s.n.* (G)].

Paspalum limbatum Henrard
Referencias: Quarín, C. L., 1975; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 10212* (SI)]; PRY[*Soria, N. 4318* (MO)].

Paspalum lineare Trin.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Türpe, A. M., 1967[1966]; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(CHA, MIS); BRA(PAR); PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Muello s.n.* (BAA, US)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 17432* (MO)]; PRY[*Hassler, E. 10775* (BM, CTES, G, LIL, P, US, W)].

Paspalum lineispatha Mez = **Paspalum candidum** (Humb. & Bonpl. ex Flüggé) Kunth
Referencias: Morrone, O., Zuloaga, F. O. & Carbono, E., 1995; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum lividum Trin. ex Schltdl. = **Paspalum denticulatum** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum longiflorum Retz. = **Digitaria longiflora** (Retz.) Pers.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum lorentzianum Mez = **Paspalum pygmaeum** Hack.
Referencias: Morrone, O., Zuloaga, F. O. & Carbono, E., 1995; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum macranthecium Parodi
Sin.: *Eriochloa castanea* Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Morrone, O. 430* (MO, SI)].

Paspalum macroblepharum Hack. = **Paspalum polyphyllum** Nees ex Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum maculosum Trin.
Sin.: *Paspalum eburneum* Henrard, *Paspalum maculosum* Trin. var. *multinode* Barreto
Referencias: Barreto, I. L., 1957; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, SPE); URY(MON, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14747* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 13772* (K, P, SI)]; PRY[*Hassler, E. 11428* (BM, G, K, MO, P, US)]; URY[*Cabrera, A. L. 32401* (SI)].

Paspalum maculosum Trin. var. *multinode* Barreto = **Paspalum maculosum** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum malacophyllum Trin.
Sin.: *Anachyris paspaloides* Nees, *Panicum malacophyllum* (Trin.) Kuntze var. *cordobense* Kuntze, *Panicum malacophyllum* (Trin.) Kuntze var. *elongatum* (Griseb.) Kuntze, *Panicum malacophyllum* (Trin.) Kuntze, hom. illeg., *Paspalum elongatum* Griseb., *Paspalum malacophyllum* Trin. f. *parviflora* Hack., *Paspalum malacophyllum* Trin. var. *genuinum* Döll, nom. inval., *Paspalum malacophyllum* Trin. var. *longipilum* Hack.,

Paspalum quadrifarium Lam. var. *elongatum* (Griseb.) Hack.
Referencias: Morrone, O., Denham, S. S., Aliscioni, S. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR); PRY(APY, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4332* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 16870* (G, K, MO, SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5180* (BM, G, K, W)].

Paspalum malacophyllum Trin. f. *parviflora* Hack. = **Paspalum malacophyllum** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum malacophyllum Trin. var. *genuinum* Döll, nom. inval. = **Paspalum malacophyllum** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum malacophyllum Trin. var. *linearifolium* Hack. = **Paspalum simplex** Morong
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum malacophyllum Trin. var. *longipilum* Hack. = **Paspalum malacophyllum** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum mandiocanum Trin. var. **mandiocanum**
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Türpe, A. M., 1967[1966]; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(MIS, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAN, GUA); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5505* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 15907* (G, MO)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5875* (G, SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 4690* (US)].

Paspalum mandiocanum Trin. var. *stenocarpum* Döll = **Paspalum regnellii** Mez
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum mandiocanum Trin. var. **subaequiglume** Barreto
Referencias: Quarín, C. L., 1975; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 47* (SI), *Zuloaga, F. O. 5697* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 12797* (P, SI)]; PRY[*Hassler, E. 12481* (G, K, LIL, US)].

Paspalum marginatum Trin. = **Axonopus marginatus** (Trin.) Chase
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994, 1995.

Paspalum marginatum Trin. var. *longecilium* Hack. = **Axonopus marginatus** (Trin.) Chase
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994, 1995.

[Paspalum maritimum Trin.]
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Paspalum maritimum auct. non Trin. = **Paspalum umbrosum** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

[Paspalum meyerianum Spreng.]
Notas: Nombre dudoso. Probablemente *Eriochloa* sp.

[Paspalum millegrana Schrad.]
Sin.: *Paspalum densum* auct. non Poir.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Paspalum minus E. Fourn.
Sin.: *Paspalum barretoi* Canto-Dorow, Valls & Longhi-Wagner
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(X); PRY(CEN); URY(CAS, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 2686* (SI)]; BRA[*Davidse, G. 11048a* (MO)]; CHL[*Boelcke, O. 324* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 12546* (BM, G, K, SI, US)]; URY[*Rosengurtt, B. 6045* (LIL, MA)].

Paspalum minutiflorum Steud. = **Digitaria violascens** Link
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001.

Paspalum modestum Mez
Referencias: Burkart, A., 1969a; Quarín, C. L., 1983; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, SFE); BRA(RGS); PRY(CEN, PAI); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6925* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 22928* (CTES, LIL)]; PRY[*Hassler, E. 111* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 6957* (MVFA)].

[Paspalum molle Poir.]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Paspalum montevidense Spreng. = **Paspalum plicatulum** Michx.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum multiflorum Döll = **Paspalum haumanii** Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum multiflorum Döll f. *abbreviatum* Hack. ex Stuck. = **Paspalum haumanii** Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum nicorae Parodi
Sin.: *Paspalum arenicolum* Herter, hom. illeg., *Paspalum plicatulum* Michx. var. *arenarium* Arechav.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Cabrera, A. L., 1970a; Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(CEN, COA, GUA, SPE); URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 10131* (SI)]; BRA[*Swallen, J. R. 9283* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 9245a* (SI, US)]; URY[*Herter, W. G. F. 136* (G, MO, SI)].

Paspalum niederleinii Mez = **Paspalum bertonii** Hack.
Referencias: Türpe, A. M., 1967[1966]; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum nitidum Swallen = **Paspalum pumilum** Nees
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum notatum Flüggé var. *cromyorrhizon* (Trin. ex Döll) Herter = **Paspalum cromyorrhizon** Trin. ex Döll
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum notatum Flüggé var. *eriorrhizon* Griseb. = **Paspalum cromyorrhizon** Trin. ex Döll
Referencias: Burkart, A., 1969a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum notatum Flüggé var. *latiflorum* Döll = **Paspalum notatum** Flüggé var. **notatum**
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum notatum Flüggé var. **notatum**
Sin.: *Paspalum notatum* Flüggé var. *latiflorum* Döll, *Paspalum notatum* Flüggé var. *typicum* Parodi, nom. inval., *Paspalum saltense* Arechav., *Paspalum uruguayense* Arechav.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA); URY(MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwartz 7563* (LIL, MO)]; BRA[*Hatschbach, G. 44577* (MO)]; PRY[*Hassler, E. 8243* (BM, G, MO, P, W)]; URY[*Herter, W. G. F. 327* (G, MO, SI)].

Paspalum notatum Flüggé var. **saurae** Parodi
Sin.: *Paspalum saurae* (Parodi) Parodi
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–1700 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, LRI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(CAA, CEN, ITA, MIE); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2797* (SI)]; BRA[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 1675* (MO)]; PRY[*Balansa, B. 81* (G, P, US)]; URY[*Lombardo, A 49* (MVJB)].

Paspalum notatum Flüggé var. *typicum* Parodi, nom. inval. = **Paspalum notatum** Flüggé var. **notatum**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum nutans Lam.
Referencias: Denham, S. S., 2005; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 44577* (MO)].

Paspalum obscurum Nees ex Steud. = **Paspalum lachneum** Nees ex Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum obtusifolium Raddi = **Axonopus obtusifolius** (Raddi) Chase
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1995; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum orbiculatum Poir.
Sin.: *Paspalum pusillum* Vent. ex Flüggé
Referencias: Türpe, A. M., 1967[1966]; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS); PRY(CAA, COA, ITA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1888* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 412* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 27719* (CTES)].

Paspalum orizaeforme Steud. = **Paspalum fasciculatum** Willd. ex Flüggé
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum oryzoides Mez = **Paspalum planum** Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum ostenii Herter = **Paspalum rufum** Nees ex Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum ovale Nees ex Steud.
Sin.: *Paspalum ambustum* Swallen, *Paspalum epilis* Parodi, *Paspalum parodianum* Henrard

Referencias: Türpe, A. M., 1967[1966]; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(ITA, MIE, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 543* (BAA, CTES, K, US, W)]; BRA[*Quarín, C. L. 4004* (CTES, LIL, MO)]; PRY[*Pedersen, T. M. 9561* (P)].

Paspalum ovale Nees ex Steud. var. *apiculatum* Hack. = **Paspalum almum** Chase
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum ovatum Nees ex Trin. = **Paspalum dilatatum** Poir. subsp. **dilatatum**
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum ovatum Nees ex Trin. var. *grandiflorus* Nees = **Paspalum dilatatum** Poir. subsp. **dilatatum**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum oxyanthum Steud. = **Digitaria horizontalis** Willd.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum pachyrrhizum Steud. = **Paspalum dasypleurum** Kunze ex E. Desv.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum palustre Mez
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 24323* (CTES, LIL, SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 2575* (SI)].

Paspalum paniculatum L.
Referencias: Quarín, C. L., 1977; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAN, CEN, GUA, ITA, MIE, PAI); URY(ART, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5498* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 2648* (US)]; PRY[*Hassler, E. 10738* (BM, G, K, LIL, P, US, W)]; URY[*Rosengurtt, B. 8401* (MVFA)].

Paspalum paniculatum L. subsp. *umbrosum* (Trin.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Paspalum umbrosum** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum pannuceum Swallen = **Paspalum glaucescens** Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum paradisiacum Steud. = **Paspalum dasypleurum** Kunze ex E. Desv.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum paranaense Swallen = **Paspalum glaucescens** Hack.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum parinervium Mez = **Paspalum approximatum** Döll
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.

Paspalum parodianum Henrard = **Paspalum ovale** Nees ex Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum paspalodes (Michx.) Scribn. = **Paspalum distichum** L.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Paspalum pauciciliatum (Parodi) Herter
Sin.: *Paspalum dilatatum* Poir. var. *pauciciliatum* Parodi
Referencias: Burkart, A., 1969a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, PAI); URY(ART, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 15284* (MO, SI)]; BRA[*Barreto, I. L. 1519* (SI)]; PRY[*Schwartz 12055* (LIL)]; URY[*Rosengurtt, B. 11317* (LIL)].

Paspalum paucifolium Swallen
Referencias: Burkart, A., 1969a; Morrone, O., Denham, S. & Zuloaga, F. O., 2004; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS); PRY(AMA, GUA, PAI); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26195* (SI)]; BRA[*Swallen, J. R. 7643* (US)]; PRY[*Balansa, B. 73* (G, K, P)]; URY[*Rosengurtt, B. 10513* (CTES)].

Paspalum pectinatum Nees, hom. illeg. = **Paspalum pectinatum** Nees ex Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum pectinatum Nees ex Trin.
Sin.: *Anastrophus pectinatus* (Nees ex Trin.) Schltdl. ex B.D. Jacks., *Paspalum pectinatum* Nees, hom. illeg.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16057* (MO, P, SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 51117* (MO)].

Paspalum pedunculare J. Presl = **Paspalum dilatatum** Poir. subsp. **dilatatum**
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum pellitum Nees ex Trin. = **Axonopus pellitus** (Nees ex Trin.) Hitchc. & A. Chase

Paspalum perspicinervium Renvoize = **Paspalum jesuiticum** Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum pilosum Lam.
Sin.: *Panicum monostachyum* Kunth
Referencias: Denham, S. S., 2005; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 14925* (BM, MO)].

Paspalum planum Hack.
Sin.: *Paspalum oryzoides* Mez
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9647* (BAA, BM, G, K, P, US, W)].

Paspalum platense Spreng. = **Paspalum dilatatum** Poir. subsp. **dilatatum**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., 1974.

Paspalum platycaulon Poir. var. *gracilius* Döll = **Axonopus purpusii** (Mez) Chase
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum platycualon Poir. var. *parviflorum* Döll = **Axonopus purpusii** (Mez) Chase
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum platyphyllum Griseb., hom. illeg. = **Urochloa platyphylla** (Munro ex C. Wright) R.D. Webster
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum plenum Chase
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL); PRY(AMA, CAN, CEN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6790* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 27527* (MO, SI), *Zuloaga, F. O. 7255* (SI)].

Paspalum plicatulum Michx.
Sin.: *Panicum plicatulum* (Michx.) Kuntze, *Paspalum lenticulare* Kunth f. *intumescens* (Döll) Killeen, *Paspalum montevidense* Spreng., *Paspalum plicatulum* Michx. subsp. *montevidense* (Spreng.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Paspalum plicatulum* Michx. var. *genuinum* Parodi, nom. inval., *Paspalum plicatulum* Michx. var. *glabrum* Arechav., *Paspalum plicatulum* Michx. var. *intumescens* Döll, *Paspalum plicatulum* Michx. var. *longipilum* Hack., *Paspalum plicatulum* Michx. var. *villosissimum* Pilg., *Paspalum ramosum* Swallen
Referencias: Burkart, A., 1969a; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE); URY(MAL, MON, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 369* (SI), *Schwindt, E. 2321* (LIL, MO, W)]; BRA[*Smith, L. B. 12097* (P, US)]; PRY[*Morrone, O. 482* (SI)]; URY[*Cabrera, A. L. 32341* (SI)].

Paspalum plicatulum Michx. var. *arenarium* Arechav. = **Paspalum nicorae** Parodi
Referencias: Burkart, A., 1969a; Cabrera, A. L., 1970a; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum plicatulum Michx. var. *genuinum* Parodi, nom. inval. = **Paspalum plicatulum** Michx.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum plicatulum Michx. var. *glabrum* Arechav. = **Paspalum plicatulum** Michx.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum plicatulum Michx. var. *intumescens* Döll = **Paspalum plicatulum** Michx.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum plicatulum Michx. var. *longipilum* Hack. = **Paspalum plicatulum** Michx.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum plicatulum Michx. var. *multinode* Hack. = **Paspalum wrightii** Hitchc. & Chase
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum plicatulum Michx. var. *robustum* Hack. = **Paspalum guenoarum** Arechav. var. **guenoarum**
Referencias: Burkart, A., 1969a; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum plicatulum Michx. var. *villosissimum* Pilg. = **Paspalum plicatulum** Michx.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum plicatulum Michx. subsp. *guenoarum* (Arechav.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Paspalum guenoarum** Arechav. var. **guenoarum**
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum plicatulum Michx. subsp. *montevidense* (Spreng.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Paspalum plicatulum** Michx.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum plumosum Henrard = **Axonopus uninodis** (Hack.) G.A. Black
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum polyphyllum Nees, hom. illeg. = **Paspalum polyphyllum** Nees ex Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum polyphyllum Nees ex Trin.
Sin.: *Paspalum bicilium* Mez, *Paspalum distichophyllum* auct. non Kunth, *Paspalum macroblepharum* Hack., *Paspalum polyphyllum* Nees, hom. illeg.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, PAI, SPE); URY(ART, CLA, PAY, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 1959* (LIL, MO)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 14489* (G, MO)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6222* (BAA, BM, G, LIL, SI, US)]; URY[*Rosengurtt, B. 3197* (LIL, US)].

Paspalum potamophilum Renvoize = **Paspalum bertonii** Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum pressum Nees ex Steud. = **Axonopus pressus** (Steud.) Parodi
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994; Renvoize, S. A., 1988.

Paspalum procurrens Quarín
Referencias: Morrone, O., Denham, S. S., Aliscioni, S. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Quarín, C. L., 1993; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Quarín, C. L. 4060* (MO, SI, US)].

Paspalum proliferum Arechav. = **Paspalum denticulatum** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum proximum Mez = **Paspalum ellipticum** Döll
Referencias: Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.

Paspalum pruinosum Hack., hom. illeg. = **Paspalum equitans** Mez
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum pumilum Nees
Sin.: *Paspalum nitidum* Swallen
Referencias: Burkart, A., 1969a; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G., 1978; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN); URY(CAS, MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 1943* (G, MO, P)]; BRA[*Smith, L. B. 15848* (K, MO)]; PRY[*Rosengurtt, B. 6154* (MA)]; URY[*Berro, M. B. 6733* (W)].

Paspalum purpusii Mez = **Axonopus purpusii** (Mez) Chase
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum pusillum Vent. ex Flüggé = **Paspalum orbiculatum** Poir.
Referencias: Chase, A., 1929; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum pygmaeum Hack.
Sin.: *Paspalum lorentzianum* Mez, *Paspalum pygmaeum* Hack. var. *genuinum* Hack., nom. inval.
Referencias: Morrone, O., Zuloaga, F. O. & Carbono, E., 1995; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., 1974.
Hierba. Anual. Nativa. 2600–4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11670* (BAA, SI)].

Paspalum pygmaeum Hack. var. *genuinum* Hack., nom. inval. = **Paspalum pygmaeum** Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum quadrifarium Lam.
Sin.: *Paspalum ferrugineum* Trin., *Paspalum quadrifarium* Lam. var. *ferrugineum* (Trin.) Herter, *Paspalum quadrifarium* Lam. var. *major* Döll

Referencias: Burkart, A., 1969a; Cabrera, A. L., 1970a; Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SDE, SFE, SLU); BRA(RGS, SCA); PRY(COA); URY(ART, MAL, MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6774* (SI)]; BRA[*Jürgens, C. 200* (US)]; PRY[*Burkart, A. 18598* (SI)]; URY[*Quarín, C. L. 3613* (MO)].

Paspalum quadrifarium Lam. var. *elongatum* (Griseb.) Hack. = **Paspalum malacophyllum** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum quadrifarium Lam. var. *ferrugineum* (Trin.) Herter = **Paspalum quadrifarium** Lam.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum quadrifarium Lam. var. *major* Döll = **Paspalum quadrifarium** Lam.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum quarinii Morrone & Zuloaga
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 2000; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, COA, GUA, ITA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 25693* (BAA, CTES, SI), *Zuloaga, F. O. 7165* (SI)]; BRA[*Quarín, C. L. 2411* (BAA, CTES, LIL, SI)]; PRY[*Rojas, T. 12756* (BAA, LIL)].

Paspalum ramboi Barreto
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 11097* (MBM)].

Paspalum ramosum Swallen = **Paspalum plicatulum** Michx.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum redondense Swallen
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Swallen, J. R. 8837* (MO, US)].

Paspalum regnellii Mez, nom. nud. = **Paspalum regnellii** Mez
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum regnellii Mez
Sin.: *Paspalum mandiocanum* Trin. var. *stenocarpum* Döll, *Paspalum regnellii* Mez, nom. nud.
Referencias: Barreto, I. L., 1954; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(CHA, ERI, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CAN, GUA, ITA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 706* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 12295* (R, US)]; PRY[*Schinini, A. 27992* (CTES, G)].

Paspalum remotum J. Remy
Sin.: *Paspalum scrobiculatum* L. var. *pubigluma* Hicken
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 1100–2100 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27346* (BAA, SI)].

Paspalum renggeri Steud. = **Paspalum conjugatum** Bergius
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum repens Bergius
Referencias: Burkart, A., 1969a; Cabrera, A. L., 1970a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PAI, PHA); URY(COL, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3601* (SI), *Schulz 3327* (CTES, G, MO)]; BRA[*Orth, C. 2738* (MO)]; PRY[*Balansa, B. 111* (G, P, US)]; URY[*Rosengurtt, B. 3055be* (MVFA)].

Paspalum rhodopedum L.B. Sm. & Wassh. = **Paspalum guenoarum** Arechav. var. **rojasii** (Hack.) Parodi ex Burkart
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

[Paspalum riedelii Mez]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Paspalum rojasii Hack. = **Paspalum guenoarum** Arechav. var. **rojasii** (Hack.) Parodi ex Burkart
Referencias: Burkart, A., 1969a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum rufum Nees ex Steud.
Sin.: *Paspalum giganteum* Arechav., hom. illeg., *Paspalum hassleri* Hack., *Paspalum ostenii* Herter

Referencias: Barreto, I. L., 1954; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE); BRA(RGS); PRY(CAU, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE); URY(FLA, PAY, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3246* (SI)]; BRA[*Swallen, J. R. 7548* (US)]; PRY[*Hassler, E. 1313* (BM, G, P)]; URY[*Berro, M. B. 7371* (P)].

Paspalum saltense Arechav. = **Paspalum notatum** Flüggé var. **notatum**
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., 1974.

Paspalum saurae (Parodi) Parodi = **Paspalum notatum** Flüggé var. **saurae** Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Pensiero, J. F. & Morrone, O., 2004.

Paspalum scabrum Scribn. = **Paspalum candidum** (Humb. & Bonpl. ex Flüggé) Kunth
Referencias: Morrone, O., Zuloaga, F. O. & Carbono, E., 1995.

Paspalum scoparium Flüggé = **Axonopus scoparius** (Flüggé) Kuhlm.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum scrobiculatum L.
Sin.: *Paspalum boscianum* Flüggé, *Paspalum commutatum* Nees
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Anual. Introducida. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Marques de Lima 475* (K)].

Paspalum scrobiculatum L. var. *pubigluma* Hicken = **Paspalum remotum** J. Remy
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum serratum Hitchc. & Chase = **Paspalum acuminatum** Raddi
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum siccus Nees = **Axonopus siccus** (Nees) Kuhlm.
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum simplex Morong
Sin.: *Paspalum malacophyllum* Trin. var. *linearifolium* Hack.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Cabrera, A. L., 1970a; Morrone, O., Denham, S. S., Aliscioni, S. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE); PRY(APY, APA, CEN, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 36* (SI), *Pedersen, T. M. 4560* (MO, P, SI)]; PRY[*Rojas, T. 13445* (LIL, MO, US)]; URY[*Rosengurtt, B. 7142* (MA, P, SI, US)].

Paspalum splendens Hack. = **Paspalum eucomum** Nees ex Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum stellatum Humb. & Bonpl. ex Flüggé
Sin.: *Paspalum stellatum* Humb. & Bonpl. ex Flüggé f. *hirsuta* Hack.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI); URY(ART, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 1953* (G, LIL, P, US, W), *Zuloaga, F. O. 4906* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 4023* (BM, LIL, SI, US)]; PRY[*Hassler, E. 11058* (BM, G, K, P, US, W)]; URY[*Del Puerto, O. 1895* (MVFA)].

Paspalum stellatum Humb. & Bonpl. ex Flüggé f. *hirsuta* Hack. = **Paspalum stellatum** Humb. & Bonpl. ex Flüggé
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum stramineum Ekman, hom. illeg. = **Paspalum indecorum** Mez
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum stuckertii Hack. = **Paspalum humboldtianum** Flüggé
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum suffultum J.C. Mikan ex Trin. = **Axonopus suffultus** (J.C. Mikan ex Trin.) Parodi
Referencias: Morrone, O., Anton, A. M. & Zuloaga, F. O., 1994; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum telmatum Swallen
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8247* (BM, G, US)].

[Paspalum tenellum Willd.]
Sin.: *Paspalum lagascae* Roem. & Schult.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Paspalum tridentatum Trin. = **Eriochloa tridentata** (Trin.) Kuhlm.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum tripinnatum Mez = **Axonopus scoparius** (Flüggé) Kuhlm.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum tristachyon Lam. = **Axonopus compressus** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum ulei Hack. = **Axonopus siccus** (Nees) Kuhlm.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum umbrosum Trin.
Sin.: *Paspalum densiflorum* Döll, *Paspalum maritimum* auct. non Trin., *Paspalum paniculatum* L. subsp. *umbrosum* (Trin.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1913* (SI)]; BRA[*Davidse, G. 11159* (MO)]; PRY[*Schinini, A. 8066* (CTES, G)]; URY[*Rosengurtt, B. 8401* (MVFA)].

Paspalum uniflorum Salzm. ex Steud. = **Axonopus compressus** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.

Paspalum uninode Hack. = **Axonopus uninodis** (Hack.) G.A. Black
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Paspalum unispicatum (Scribn. & Merr.) Nash
Sin.: *Panicum unispicatum* Scribn. & Merr.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Denham, S. S., 2005; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); PRY(APY, CON, GUA, PHA); URY(PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4344* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2313* (SI, US)]; URY[*Rosengurtt, B. 3253* (US)].

Paspalum uruguayense Arechav. = **Paspalum notatum** Flüggé var. **notatum**
Referencias: Cabrera, A. L., 1970a; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum urvillei Steud.
Sin.: *Paspalum larrañagai* Arechav.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., 1974.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IV, VII, VIII, IX, X); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE); URY(RIV, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 3370* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 17459* (K, MO)]; CHL[*Matthei, O. R. 46* (CONC)]; PRY[*Hassler, E. 9170* (BM, G, K, P)]; URY[*Herter, W. G. F. 2209* (MO)].
Notas: Especie introducida en Chile.

Paspalum usteri Hack.
Sin.: *Paspalum inaequiglume* Parodi, *Paspalum usteri* Hack. var. *villosum* Kuhlm.
Referencias: Morrone, O., Denham, S. S., Aliscioni, S. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Quarín, C. L., 1975; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); PRY(GUA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 1954* (G, LIL, US), *Zuloaga, F. O. 6588* (SI)]; PRY[*Montes, J. E. 16180* (CTES, K, US)].

Paspalum usteri Hack. var. *villosum* Kuhlm. = **Paspalum usteri** Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum vaginatum Sw.
Sin.: *Paspalum gayanum* Desv.
Referencias: Cabrera, A. L., 1970a; Nicora, E. G., 1978; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SFE, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, II, III, IV, V, VII, X, RME); PRY(CEN, COA); URY(MON, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14229* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13783* (BM, SI)]; CHL[*Marticorena, A. 499* (CONC)]; PRY[*Pavetti, C. V. M. 10380* (US)]; URY[*Osten, C. 6452* (SI)].
Notas: Especie introducida en Chile.

Paspalum verrucosum Hack. = **Paspalum lachneum** Nees ex Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum vescum Swallen = **Paspalum flaccidum** Nees
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum viale Swallen = **Paspalum glaucescens** Hack.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum vinosum Mez = **Paspalum candidum** (Humb. & Bonpl. ex Flüggé) Kunth
Referencias: Morrone, O., Zuloaga, F. O. & Carbono, E., 1995.

Paspalum virgatum L.
Sin.: *Paspalum wettsteinii* Hack.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); BRA(PAR); PRY(APY, AMA, CEN, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4542* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 43658* (MBM)]; PRY[*Rosengurtt, B. 5489* (BAA, CTES, P, US), *Zuloaga, F. O. 7273* (SI)].

Paspalum virgatum L. f. *oligostachyum* Hack., nom. nud. = **Paspalum commune** Lillo
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005; Zuloaga, F. O., 1974.

Paspalum virgatum L. var. *conspersum* (Schrad.) Döll = **Paspalum conspersum** Schrad.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum virgatum L. var. *subplicatum* Hack. = **Paspalum wrightii** Hitchc. & Chase
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum volcanensis Zuloaga, Morrone & S.S. Denham
Referencias: Morrone, O., Denham, S. S., Aliscioni, S. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Zuloaga, F. O., Morrone, O. & Denham, S. S., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 2100–2300 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 5170* (MO, SI), *Morrone, O. 4374* (SI)].

Paspalum wettsteinii Hack. = **Paspalum virgatum** L.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Paspalum wrightii Hitchc. & Chase
Sin.: *Paspalum hydrophilum* Henrard, *Paspalum plicatulum* Michx. var. *multinode* Hack., *Paspalum virgatum* L. var. *subplicatum* Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE); PRY(APY, ÑEE, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz 18414* (CTES, G, SI)]; PRY[*Rojas, T. 2755* (BAA, US)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o material de referencia (Rosengurtt et al., 1970).

Paspalum yaguaronense Henrard = **Paspalum glaucescens** Hack.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Pennisetum Rich.

Número de especies: 10, 2 endémicas, 3 introducidas

Pennisetum bambusiforme auct. non (E. Fourn.) Hemsl. ex B.D. Jacks. = **Pennisetum tristachyum** (Kunth) Spreng.
Referencias: Türpe, A. M., 1995.

Pennisetum chilense (E. Desv.) B.D. Jacks. ex R.E. Fr.
Sin.: *Gymnotrix chilensis* E. Desv., *Pennisetum chilense* (E. Desv.) B.D. Jacks. ex R.E. Fr. var. *macrophyllum* Parodi
Referencias: Türpe, A. M., 1983; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 2100–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC); CHL(I, II, III, IV, V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 235* (SI)]; CHL[*Jiles, C. 1101* (CONC), *Martin, H. C. 284* (SI)].

Pennisetum chilense (E. Desv.) B.D. Jacks. ex R.E. Fr. var. *macrophyllum* Parodi = **Pennisetum chilense** (E. Desv.) B.D. Jacks. ex R.E. Fr.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Pennisetum ciliare (L.) Link = **Cenchrus ciliaris** L.
Referencias: Filgueiras, T. S., 1984.

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov.
Sin.: *Pennisetum longistylum* Hochst. var. *clandestinum* (Hochst. ex Chiov.) Leeke
Referencias: Burkart, A., 1969a; Renvoize, S. A., 1988; Türpe, A. M., 1983; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, SFE); BRA(PAR, RGS); CHL(III, IV, V, IDE, RME); PRY(CEN); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 9248* (SI)]; BRA[*Lindeman, J. C. 29* (NY)]; CHL[*Matthei, O. R. 107* (CONC)]; PRY[*Pavetti, C. V. M. 1742* (AS, MO)]; URY[*Rosengurtt, B. 4835pe* (MVFA)].

Pennisetum frutescens Leeke
Sin.: *Pennisetum pilcomayense* Mez
Referencias: Türpe, A. M., 1983; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6791* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 61* (US)].

Pennisetum latifolium Spreng.
Sin.: *Gymnotrix latifolia* (Spreng.) Schult., *Gymnotrix tristachya* auct. non Kunth

Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Türpe, A. M., 1983; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 1200–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(APY); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4427* (SI), *Zuloaga, F. O. 1910* (SI)]; BRA[*Jönsson, G. 22a* (SI)]; PRY[*Vanni, R. O. 2597* (CTES)]; URY[*Felippone, F. 2437* (SI)].

Pennisetum longistylum Hochst. var. *clandestinum* (Hochst. ex Chiov.) Leeke = **Pennisetum clandestinum** Hochst. ex Chiov.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Pennisetum montanum (Griseb.) Hack.
Sin.: *Hymenachne montana* Griseb., *Panicum montanum* (Griseb.) B.D. Jacks. ex Lillo
Referencias: Türpe, A. M., 1983.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–2100 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4368* (SI)].

Pennisetum myosuroides (Kunth) Spreng. = **Cenchrus myosuroides** Kunth var. **myosuroides**
Referencias: Caro, J. A. & Sánchez, E. A., 1967.

Pennisetum nervosum (Nees) Trin.
Sin.: *Gymnotrix nervosa* Nees
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Türpe, A. M., 1983.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE); BRA(PAR); PRY(APY, PHA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1091* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 3858* (MBM)]; PRY[*Mereles, F. 5591* (CTES, FCQ, SI), *Zuloaga, F. O. 7327* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 7316b* (MVFA)].

Pennisetum pilcomayense Mez = **Pennisetum frutescens** Leeke
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

[Pennisetum polystachion (L.) Schult.]
Sin.: *Panicum polystachion* L.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Pennisetum purpureum K. Schum.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Renvoize, S. A., 1988; Türpe, A. M., 1983; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(PAI); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7012* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15856* (MBM)]; PRY[*Zardini, E. M. 5674* (FCQ, MO)]; URY[*Rosengurtt, B. 6021b* (MVFA)].

Pennisetum rigidum (Griseb.) Hack.
Sin.: *Gymnotrix rigida* Griseb., *Pennisetum rigidum* (Griseb.) Hack. var. *longisetum* (Griseb.) Stuck.
Referencias: Türpe, A. M., 1983.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–1200 m.
Países: ARG(CAT, COR, MEN, SAL, SDE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Stuckert, T. T. J. V. 678* (SI)].

Pennisetum rigidum (Griseb.) Hack. var. *longisetum* (Griseb.) Stuck. = **Pennisetum rigidum** (Griseb.) Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Pennisetum tristachyum (Kunth) Spreng.
Sin.: *Gymnotrix tristachya* Kunth, *Pennisetum bambusiforme* auct. non (E. Fourn.) Hemsl. ex B.D. Jacks.
Referencias: Türpe, A. M., 1983, 1995; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Marconi, P. s.n.* (CORD, MCNS)].

Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen.
Sin.: *Cenchrus longisetus* M.C. Johnst.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Türpe, A. M., 1983; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–4000 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, JUJ, MIS, SFE); CHL(RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Negritto, M. A. 439* (CORD, CTES, SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. s.n.* (CONC)]; URY[*Herter, W. G. F. 1338* (SI)].

Phalaridium peruvianum Nees & Meyen = **Dissanthelium peruvianum** (Nees & Meyen) Pilg.
Referencias: Anton, A. M. & Negritto, M. A., 1997.

Phalaris L., nom. cons.

Número de especies: 10, 2 endémicas, 6 introducidas

Phalaris amethystina Trin.
Sin.: *Phalaris berteroniana* Steud., *Phalaris colchaguensis* Phil.
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero 534* (LE, P)].

Phalaris angusta Nees ex Trin.
Sin.: *Phalaris angusta* Nees ex Trin. f. *macra* Hack., *Phalaris chilensis* J. Presl
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Burkart, A., 1969a; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G., 1978; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Valencia, J. I., 1937.
Hierba. Anual. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MIS, RNE, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(V, VIII, IX, X, IJF); PRY(PHA); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1292* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 32796* (MBM)]; CHL[*Hollermayer, A. 1273* (CONC)]; PRY[*Schinini, A. 26703* (MO)]; URY[*Mujica Sallés, J. 221* (MVFA)].

Phalaris angusta Nees ex Trin. f. *macra* Hack. = **Phalaris angusta** Nees ex Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Phalaris aquatica L.
Sin.: *Phalaris aquatica* L. var. *stenoptera* (Hack.) Burkart, *Phalaris stenoptera* Hack., *Phalaris tuberosa* L. var. *stenoptera* (Hack.) Hitchc.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, SFE); BRA(RGS); CHL(I, IV, V, VI, VIII, IX, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. s.n.* (SI)]; CHL[*Zöllner, O. 2174* (CONC)]; URY[*Rosengurtt, B. 5850* (MVFA)].
Notas: Citada para Brasil sin indicar localidad o material de referencia (Soreng et al., 2003).

Phalaris aquatica L. var. *stenoptera* (Hack.) Burkart = **Phalaris aquatica** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Phalaris arechavaletae Herter, nom. superfl. = **Phalaris platensis** Henrard ex Heukels
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Phalaris arundinacea L.
Referencias: Covas, G., 1970a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 15397* (SI)]; URY[*Marchesi, L. s.n.* (MVJB)].

Phalaris berteroniana Steud. = **Phalaris amethystina** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Phalaris canariensis L.
Referencias: Covas, G., 1970a; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, SCR, SFE, TDF, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(V, VII, VIII, IX, X, XII, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 798* (CORD)]; BRA[*Klein, R. M. 11255* (HBR, US)]; CHL[*Garaventa, A. 2454* (CONC)]; URY[*Herter, W. G. F. 558b* (SI)].

Phalaris caroliniana Walter
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 2837* (CONC)].

Phalaris chilensis J. Presl = **Phalaris angusta** Nees ex Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Phalaris coerulescens Desf.
Referencias: Covas, G., 1970a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); URY(COL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 293* (SI)]; URY[*Burkart, A. 9140* (SI)].

Phalaris colchaguensis Phil. = **Phalaris amethystina** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Phalaris intermedia Bosc f. *platensis* Arechav. = **Phalaris platensis** Henrard ex Heukels
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Phalaris intermedia Bosc var. *platensis* (Arechav.) Speg. = **Phalaris platensis** Henrard ex Heukels
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Phalaris minor Retz.
Referencias: Covas, G., 1970a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE); CHL(IV, VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 17692* (SI)]; CHL[*Jiles, C. 3038* (CONC)].

Phalaris paradoxa L.
Referencias: Covas, G., 1970a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Botallone 14* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 559* (SI)].

Phalaris platensis (Arechav.) Parodi ex Valencia, nom. illeg. = **Phalaris platensis** Henrard ex Heukels
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Phalaris platensis Henrard ex Heukels
Sin.: *Phalaris arechavaletae* Herter, nom. superfl., *Phalaris intermedia* Bosc f. *platensis* Arechav., *Phalaris intermedia* Bosc var. *platensis* (Arechav.) Speg., *Phalaris platensis* (Arechav.) Parodi ex Valencia, nom. illeg.
Referencias: Auquier, P. H., 1980; Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, SFE); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 3350* (SI)]; URY[*Mujica Sallés, J. 335* (MVFA)].

Phalaris semiverticillata Forssk. = **Polypogon viridis** (Gouan) Breistr.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Phalaris stenoptera Hack. = **Phalaris aquatica** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Phalaris tuberosa L. var. *stenoptera* (Hack.) Hitchc. = **Phalaris aquatica** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Phalaris zizanioides L. = **Chrysopogon zizanioides** (L.) Roberty

Pharus P. Browne
Número de especies: 2

Pharus angustifolius (Nees) Döll = **Pharus lappulaceus** Aubl.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Pharus brasiliensis Raddi = **Pharus lappulaceus** Aubl.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Pharus glaber Kunth = **Pharus lappulaceus** Aubl.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Pharus glaber Kunth var. *pubescens* Döll = **Pharus lappulaceus** Aubl.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Pharus lancifolius Desv. ex Ham. = **Pharus lappulaceus** Aubl.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Pharus lappulaceus Aubl.
Sin.: *Pharus angustifolius* (Nees) Döll, *Pharus brasiliensis* Raddi, *Pharus glaber* Kunth, *Pharus glaber* Kunth var. *pubescens* Döll, *Pharus lancifolius* Desv. ex Ham., *Pharus micranthus* Schrad. ex Nees
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Judziewicz, E. J., 1987; Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Lourteig, A., 1983a; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CAN, PAI); URY(ART, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4521* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 5303* (HBR, US)]; PRY[*Zardini, E. M. 13197* (MO)]; URY[*Berro, M. B. 2679* (MVFA)].

Pharus latifolius L.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 29661* (MBM)].

Pharus micranthus Schrad. ex Nees = **Pharus lappulaceus** Aubl.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Phippsia (Trin.) R. Br.

Número de especies: 1 endémica

Phippsia werdermanii Pilg. = **Catabrosa werdermannii** (Pilg.) Nicora & Rúgolo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Phippsia werdermanii Pilg. f. *major* Pilg. = **Catabrosa werdermannii** (Pilg.) Nicora & Rúgolo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Phippsia werdermanii Pilg. f. *minor* Pilg. = **Catabrosa werdermannii** (Pilg.) Nicora & Rúgolo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Phippsia wilczekii Hack.
Referencias: Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1987.
Hierba. Perenne. Endémica. 3100 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Wilczek, E. 564* (B, BAA, US, W)].

Phleum L.

Número de especies: 2, 1 introducida

Phleum alpinum L.
Sin.: *Phleum commutatum* Gaudin
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Moore, D. M., 1983; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, TDF, TUC); CHL(IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 260* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92126* (CONC, SGO)].

Phleum commutatum Gaudin = **Phleum alpinum** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Phleum pratense L.
Referencias: Kämpf, A. N., 1975; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, NEU, RNE, SCR, TDF); BRA(RGS); CHL(VII, VIII, IX, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2328* (BAA, SI)]; BRA[*Arzivenco, L. s.n.* (BLA)]; CHL[*Pisano, E. 7480* (CONC)]; URY[*Rosengurtt, B. 5387* (MVFA)].
Notas: Cultivada en Uruguay.

Pholiurus incurvus (L.) Schinz & Thell. = **Parapholis incurva** (L.) C.E. Hubb.

Phragmites Adans.

Número de especies: 1

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
Sin.: *Arundo australis* Cav., *Arundo occidentalis* Sieber ex Schult., *Arundo phragmites* L., *Phragmites chilensis* Steud., nom. nud., *Phragmites communis* Trin., *Phragmites communis* Trin. var. *flavescens* Custer, *Phragmites communis* Trin. var. *genuina* Stuck., nom. inval., *Phragmites dioica* Hack. ex Conert, hom. illeg., *Phragmites fissifolius* Steud., *Phragmites hispanicus* Nees, *Phragmites maximus* (Forssk.) Chiov., *Phragmites phragmites* (L.) H. Karst., nom. inval., *Phragmites phragmites* (L.) Speg., nom. inval.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Nicora, E. G., 1970c; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SJU, TUC); CHL(II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, RME); URY(SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 1815* (CORD)]; CHL[*Ricardi, M. 2992* (CONC)]; URY[*Herter, W. G. F. 1648a* (SI)].

Phragmites chilensis Steud., nom. nud. = **Phragmites australis** (Cav.) Trin. ex Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Phragmites communis Trin. = **Phragmites australis** (Cav.) Trin. ex Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Phragmites communis Trin. var. *flavescens* Custer = **Phragmites australis** (Cav.) Trin. ex Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Phragmites communis Trin. var. *genuina* Stuck., nom. inval. = **Phragmites australis** (Cav.) Trin. ex Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Phragmites dioica Hack. ex Conert, hom. illeg. = **Phragmites australis** (Cav.) Trin. ex Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Phragmites fissifolius Steud. = **Phragmites australis** (Cav.) Trin. ex Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Phragmites hispanicus Nees = **Phragmites australis** (Cav.) Trin. ex Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Phragmites maximus (Forssk.) Chiov. = **Phragmites australis** (Cav.) Trin. ex Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Phragmites phragmites (L.) H. Karst., nom. inval. = **Phragmites australis** (Cav.) Trin. ex Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Phragmites phragmites (L.) Speg., nom. inval. = **Phragmites australis** (Cav.) Trin. ex Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Piptatherum P. Beauv.

Número de especies: 1

Piptatherum elegans P. Beauv., nom. nud. = **Piptochaetium panicoides** (Lam.) E. Desv.
Referencias: Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Piptatherum lindleyanum Nees = **Nassella chilensis** (Trin.) E. Desv.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Piptatherum macrantherum Nees ex B.D. Jacks. = **Nassella trichotoma** (Nees) Hack. ex Arechav.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Piptatherum miliaceum (L.) Coss.
Sin.: *Agrostis miliacea* L., *Oryzopsis miliacea* (L.) Benth. & Hook. ex Asch. & Schweinf.
Referencias: Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1987; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(BAI, DFE, LPA); CHL(V, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. s.n.* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 52000* (CONC)].

Piptatherum obtusum Nees & Meyen = **Anatherostipa obtusa** (Nees & Meyen) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Piptatherum panicoides Gibert, nom. nud. = **Piptochaetium panicoides** (Lam.) E. Desv.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptatherum ramosum Nees = **Nassella chilensis** (Trin.) E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Piptatherum stipoides Gibert, nom. nud. = **Piptochaetium stipoides** (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium J. Presl, nom. cons.

Número de especies: 24, 16 endémicas

Piptochaetium alpinum L.B. Sm.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Cialdella, A. M. & Giussani, L. M., 2002; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 7710* (HBR, US)].

Piptochaetium angolense Phil.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(IV, V, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz-Schick, M. 903* (SGO)].

Piptochaetium bicolor (Vahl) E. Desv.
Sin.: *Oryzopsis bicolor* (Vahl) Speg., *Oryzopsis bicolor* (Vahl) Speg. var. *minor* Speg., *Piptochaetium bicolor* (Vahl) E. Desv. var. *minor* (Speg.) Parodi, *Piptochaetium bicolor* (Vahl) E. Desv. var. *typicum* Parodi, nom. inval., *Stipa bicolor* Vahl, *Stipa intermedia* Trin. & Rupr., *Stipa megalantha* Steud., *Urachne grandiflora* Steud. & Hochst., nom. nud.
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Mujica Sallés, J., 1996; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE); BRA(RGS); CHL(V, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); URY(CAS, FLA, LAV, MAL, MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 18130* (SI)]; BRA[*Mattos, J. R. 7135* (BLA)]; CHL[*Muñoz-Pizarro, C. 2718* (SGO)]; URY[*Mujica Sallés, J. 202* (MVFA)].

Piptochaetium bicolor (Vahl) E. Desv. var. *minor* (Speg.) Parodi = **Piptochaetium bicolor** (Vahl) E. Desv.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium bicolor (Vahl) E. Desv. var. *typicum* Parodi, nom. inval. = **Piptochaetium bicolor** (Vahl) E. Desv.

Piptochaetium brachyspermum (Speg.) Parodi
Sin.: *Oryzopsis napostaensis* Speg. var. *brachysperma* Speg.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. 42b* (LPS)].

Piptochaetium brevifolium Phil. = **Piptochaetium hirtum** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Piptochaetium burkartianum Parodi
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Parodi, L. R., 1944.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 123291/2* (BAA)].

Piptochaetium cabrerae Parodi
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Parodi, L. R., 1944.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 13771* (BAA)].

Piptochaetium calvescens Parodi
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Parodi, L. R., 1944.
Hierba. Perenne. Endémica. 600 m.
Países: ARG(BAI); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 10343* (BAA)]; URY[*Rosengurtt, B. 7790b* (BAA)].

Piptochaetium chaetophorum Griseb. = **Piptochaetium stipoides** (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium collinum Phil. = **Nassella laevissima** (Phil.) Barkworth
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium confusum Parodi
Referencias: Burkart, A., 1969b; Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Parodi, L. R., 1944; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); URY(ART, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 3950* (BAA)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 2369* (MVFA)].

Piptochaetium cucullatum Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Cialdella, A. M. & Giussani, L. M., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: URY(PAY, SAO).
Ejemplares de referencia: URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 1512* (BAA)].

Piptochaetium cuspidatum Phil. = **Piptochaetium stipoides** (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Piptochaetium erianthum Balansa = **Piptochaetium lasianthum** Griseb.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Piptochaetium gibbum Phil. = **Nassella gibba** (Phil.) M. Muñoz
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium granulatum Phil. = **Piptochaetium montevidense** (Spreng.) Parodi
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Piptochaetium grisebachii (Speg.) Herter = **Piptochaetium stipoides** (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium hackelii (Arechav.) Herter, comb. superfl. = **Piptochaetium hackelii** (Arechav.) Parodi
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium hackelii (Arechav.) Parodi
Sin.: *Oryzopsis hackelii* (Arechav.) Speg., *Piptochaetium hackelii* (Arechav.) Herter, comb. superfl., *Stipa hackelii* Arechav., *Stipa tandilensis* Kuntze
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Mujica Sallés, J., 1996; Parodi, L. R., 1944.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA); URY(MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 10375* (SI)]; URY[*Mujica Sallés, J. 223* (MVFA)].

Piptochaetium hirtum Phil.
Sin.: *Piptochaetium brevifolium* Phil.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (K, SGO)].

Piptochaetium humile Phil. = **Piptochaetium montevidense** (Spreng.) Parodi
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Piptochaetium indutum Parodi
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Parodi, L. R., 1944.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2438* (SI), *Venturi, S. 8414* (BAA, US)].

Piptochaetium jubatum Henrard
Referencias: Cialdella, A. M. & Giussani, L. M., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(CAS, MON, RIV).
Ejemplares de referencia: URY[*Gallinal 2198* (BAA, L)].

Piptochaetium laeve (Nees) Pilg. = **Nassella meyeniana** (Trin. & Rupr.) Parodi

Piptochaetium laevissimum Phil. = **Nassella laevissima** (Phil.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Piptochaetium lasianthum Griseb.
Sin.: *Oryzopsis lasiantha* (Griseb.) Speg., *Piptochaetium erianthum* Balansa
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Mujica Sallés, J., 1996; Parodi, L. R., 1944; Zanin, A., 2001a; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); URY(ART, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, RNO, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7141* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 15790* (HBR)]; URY[*Costa 6605* (MVFA)].

Piptochaetium leiocarpum (Speg.) Hack. = **Piptochaetium panicoides** (Lam.) E. Desv.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Parodi, L. R., 1944; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Piptochaetium leiocarpum (Speg.) Hack. f. *subpapillosum* Hack. = **Piptochaetium panicoides** (Lam.) E. Desv.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium lejopodum (Speg.) Henrard
Sin.: *Oryzopsis lejopoda* Speg.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Cialdella, A. M. & Giussani, L. M., 2002; Parodi, L. R., 1944.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); URY(LAV, MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 5444* (BAA, SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 6374* (MVFA)].

Piptochaetium macrocarpa Benth. var. *plurifoliata* Hoehne = **Anadenanthera colubrina** (Vell.) Brenan var. **cebil** (Griseb.) Altschul

Piptochaetium macrocarpum Phil. = **Piptochaetium setosum** (Trin.) Arechav.
Referencias: Cialdella, A. M. & Giussani, L. M., 2002.

Piptochaetium medium (Speg.) Torres
Sin.: *Oryzopsis bicolor* (Vahl) Speg. var. *media* Speg.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Cialdella, A. M. & Giussani, L. M., 2002; Torres, M. A., 1970e.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MIS); BRA(RGS); URY(FLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 18085* (SI)]; BRA[*Sallés, M. 141* (MO)]; URY[*Gallinal 3188* (SI)].

Piptochaetium moelleri Phil. = **Piptochaetium montevidense** (Spreng.) Parodi
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Piptochaetium montevidense (Spreng.) Herter, comb. superfl. = **Piptochaetium montevidense** (Spreng.) Parodi
Referencias: Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Piptochaetium montevidense (Spreng.) Parodi
Sin.: *Caryochloa montevidensis* Spreng., *Caryochloa montevidensis* Spreng. var. *brasiliensis* (Trin. & Rupr.) Döll ap. Ekman, *Oryzopsis montevidensis* (Spreng.) Hauman, *Oryzopsis montevidensis* (Spreng.) Speg. f. *brasiliensis* Speg., *Oryzopsis montevidensis* (Spreng.) Speg. f. *trachycarpa* Speg., *Oryzopsis montevidensis* (Spreng.) Speg., comb. superfl., *Oryzopsis tuberculata* (E. Desv.) Speg., *Oryzopsis verrucosa* (Phil.) Speg., *Oryzopsis verruculosa* (Phil.) Speg., *Piptochaetium granulatum* Phil., *Piptochaetium humile* Phil., *Piptochaetium moelleri* Phil., *Piptochaetium montevidense* (Spreng.) Herter, comb. superfl., *Piptochaetium tuberculatum* Desv., *Piptochaetium verrucosum* Phil., *Stipa panicoides* Nees, nom. illeg., *Urachne depressa* Steud., *Urachne panicoides* Trin., *Urachne panicoides* Trin. var. *brasiliensis* Trin. & Rupr.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Cialdella, A. M. & Giussani, L. M., 2002; Mujica Sallés, J., 1996; Parodi, L. R., 1944; Renvoize, S. A., 1988; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X); PRY(MIE, PAI); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1789* (SI)]; BRA[*Hagelund, K. 14766* (ICN)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 994895* (CONC)]; PRY[*Arbo, M. M. s.n.* (CTES)]; URY[*Izaguirre de Artuccio, P. 54* (MVFA)].

Piptochaetium mucronatum Griseb. = **Anatherostipa mucronata** (Griseb.) F. Rojas
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Piptochaetium napostaense (Speg.) Hack.
Sin.: *Oryzopsis napostaensis* Speg., *Oryzopsis napostaensis* Speg. var. *brachyphylla* Speg., *Oryzopsis napostaensis* Speg. var. *macrophylla* Speg., *Stipa capillifolia* Hack., *Stipa hypogona* Hack.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Parodi, L. R., 1944; Torres, M. A., 1970e.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, MEN, RNE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 55* (SI), *Ragonese, A. E. 9420* (BAB)].

[Piptochaetium ovatum (Trin.) Desv.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Piptochaetium ovatum (Trin.) Desv. f. *atrata* Hack. = **Piptochaetium stipoides** (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium ovatum (Trin.) Desv. var. *chaetophorum* (Griseb.) Hack. = **Piptochaetium stipoides** (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium ovatum (Trin.) Desv. var. *purpurascens* Hack. = **Piptochaetium stipoides** (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium pallidum Phil. ex Griseb., p.p. = **Piptochaetium setosum** (Trin.) Arechav.
Referencias: Cialdella, A. M. & Giussani, L. M., 2002.

Piptochaetium pallidum Phil. ex Griseb., p.p. = **Piptochaetium stipoides** (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium palustre Mujica-Sallés & Longhi-Wagner
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Cialdella, A. M. & Giussani, L. M., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 1600 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Valls, J. F. M. 8083* (CEN, ICN)].

Piptochaetium panicoides (Lam.) E. Desv.
Sin.: *Oryzopsis lejocarpa* Speg., *Oryzopsis lejocarpa* Speg. var. *major* Speg., *Oryzopsis ovata* (Trin.) Speg., *Oryzopsis panicoides* (Lam.) Speg., *Oryzopsis setacea* A. Rich., *Oryzopsis setifolia* (J. Presl) Henrard, *Piptatherum elegans* P. Beauv., nom. nud., *Piptatherum panicoides* Gibert, nom. nud., *Piptochaetium leiocarpum* (Speg.) Hack., *Piptochaetium leiocarpum* (Speg.) Hack. f. *subpapillosum* Hack., *Piptochaetium panicoides* (Lam.) E. Desv. f. *subpapillosum* (Hack.) Parodi, *Piptochaetium panicoides* (Lam.) E. Desv. var. *subpapillosum* (Hack.) Petetin, *Piptochaetium setifolium* J. Presl, *Piptochaetium subnudum* Phil., *Stipa lineolata* Mez, *Stipa panicoides* Lam., *Stipa setifolia* (J. Presl) Kunth, *Urachne simplex* Trin. var. *peruviana* Trin. & Rupr.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3700 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, JUJ, NEU, SAL, TUC); BRA(RGS); CHL(IV, VI, VII, VIII, IX, X); URY(CAS, COL, MAL, MON, RNO, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3777* (SI)]; BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 1752* (ICN)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 994933* (CONC)]; URY[*Rosengurtt, B. 6750* (MVFA)].

Piptochaetium panicoides (Lam.) E. Desv. f. *subpapillosum* (Hack.) Parodi = **Piptochaetium panicoides** (Lam.) E. Desv.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium panicoides (Lam.) E. Desv. var. *subpapillosum* (Hack.) Petetin = **Piptochaetium panicoides** (Lam.) E. Desv.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium purpuratum Phil. = **Piptochaetium setosum** (Trin.) Arechav.
Referencias: Cialdella, A. M. & Giussani, L. M., 2002.

Piptochaetium ruprechtianum E. Desv.
Sin.: *Oryzopsis bicolor* (Vahl) Speg. var. *major* Speg., *Oryzopsis ruprechtiana* (E. Desv.) Speg., *Stipa bicolor* auct. non Vahl, *Stipa bicolor* Vahl var. *major* Speg., *Stipa ruprechtiana* (E. Desv.) Herter
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Mujica Sallés, J., 1996; Parodi, L. R., 1944; Renvoize, S. A., 1988; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(ART, DUR, LAV, MAL, MON, RIV, SOR).

Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 1435* (BAA)]; BRA[*Hatschbach, G. 30757* (MBM), *Rúgolo de Agrasar, Z. E. 1499* (SI)]; URY[*Izaguirre de Artuccio, P. 39* (MVFA), *Seijo, G. J. 2458* (CTES, SI)].

Piptochaetium setifolium J. Presl = **Piptochaetium panicoides** (Lam.) E. Desv.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium setosum (Trin.) Arechav.
Sin.: *Piptochaetium macrocarpum* Phil., *Piptochaetium pallidum* Phil. ex Griseb., p.p., *Piptochaetium purpuratum* Phil., *Stipa pallida* (Phil. ex Griseb.) Kuntze, *Urachne fusca* Nees ex Steud., *Urachne setosa* Trin., nom. superfl.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Cialdella, A. M. & Giussani, L. M., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 953* (BAA)].

Piptochaetium stipoides (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. *chaetophorum* (Griseb.) Parodi = **Piptochaetium stipoides** (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium stipoides (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **echinulatum** Parodi
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Cialdella, A. M. & Giussani, L. M., 2002; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, LPA, SLU); BRA(RGS); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 13759* (BAA)]; BRA[*Swallen, J. R. 7669* (PEL)]; URY[*Del Puerto, O. 336* (SI)].

Piptochaetium stipoides (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. *genuinum* Parodi, nom. inval. = **Piptochaetium stipoides** (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium stipoides (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. *parviflorum* Parodi = **Piptochaetium stipoides** (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium stipoides (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. *purpurascens* (Hack.) Parodi = **Piptochaetium stipoides** (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium stipoides (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**
Sin.: *Oryzopsis grisebachii* Speg., *Oryzopsis stipoides* (Trin. & Rupr.) Speg., *Piptatherum stipoides* Gibert, nom. nud., *Piptochaetium chaetophorum* Griseb., *Piptochaetium cuspidatum* Phil., *Piptochaetium grisebachii* (Speg.) Herter, *Piptochaetium ovatum* (Trin.) Desv. f. *atrata* Hack., *Piptochaetium ovatum* (Trin.) Desv. var. *chaetophorum* (Griseb.) Hack., *Piptochaetium ovatum* (Trin.) Desv. var. *purpurascens* Hack., *Piptochaetium pallidum* Phil. ex Griseb., p.p., *Piptochaetium stipoides* (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. *chaetophorum* (Griseb.) Parodi, *Piptochaetium stipoides* (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. *genuinum* Parodi, nom. inval., *Piptochaetium stipoides* (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. *parviflorum* Parodi, *Piptochaetium stipoides* (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. *purpurascens* (Hack.) Parodi, *Piptochaetium stipoides* (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. *verruculosum* (Mez) Parodi, *Piptochaetium verruculosum* (Mez) Henrard, *Piptochaetium verruculosum* (Mez) Herter, comb. superfl., *Stipa verruculosa* Mez, *Urachne stipoides* Trin. & Rupr.
Referencias: Burkart, A., 1969b; Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Cialdella, A. M. & Giussani, L. M., 2002; Mujica Sallés, J., 1996; Parodi, L. R., 1944; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, RNE, SFE); BRA(RGS, SCA); CHL(IV, V, VII, VIII, IX, RME); URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1731* (SI)]; BRA[*Mattos, J. R. 17421* (HAS)]; CHL[*Barros, E. 128* (BAA)]; URY[*Mujica Sallés, J. 288* (MVFA)].

Piptochaetium stipoides (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. *verruculosum* (Mez) Parodi = **Piptochaetium stipoides** (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium subnudum Phil. = **Piptochaetium panicoides** (Lam.) E. Desv.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium trichotomum (Nees) Griseb. = **Nassella trichotoma** (Nees) Hack. ex Arechav.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Piptochaetium tuberculatum Desv. = **Piptochaetium montevidense** (Spreng.) Parodi
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Piptochaetium uruguense Griseb.
Sin.: *Oryzopsis uruguayensis* (Griseb.) Speg., *Piptochaetium uruguense* Griseb. var. *genuinum* Parodi, nom. inval., *Piptochaetium uruguense* Griseb. var. *microcarpum* Parodi
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Torres, M. A., 1970e; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SAL, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(GUA, MIE); URY(CLA, FLO, FLA, PAY, RIV, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 437* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 15545* (HBR, R)]; PRY[*Widhausen 4894* (BAA)]; URY[*Gallinal s.n.* (MVFA, PE)].

Piptochaetium uruguense Griseb. var. *genuinum* Parodi, nom. inval. = **Piptochaetium uruguense** Griseb.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium uruguense Griseb. var. *microcarpum* Parodi = **Piptochaetium uruguense** Griseb.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium verrucosum Phil. = **Piptochaetium montevidense** (Spreng.) Parodi
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Piptochaetium verruculosum (Mez) Henrard = **Piptochaetium stipoides** (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Piptochaetium verruculosum (Mez) Herter, comb. superfl. = **Piptochaetium stipoides** (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Pleopogon setosum Nutt. = **Lycurus setosus** (Nutt.) C. Reeder
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Poa L.

Número de especies: 81, 50 endémicas, 9 introducidas

Poa acinaciphylla E. Desv.
Sin.: *Poa villaroelii* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2200 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. 1119* (P, US)].

Poa acrochaeta Hack. = **Poa andina** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa acutifolia Hauman = **Poa planifolia** Kuntze
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa acutissima Pilg. = **Poa robusta** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa aequigluma Tovar
Referencias: Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 2800–3000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez 11* (BAA, CORD)].

Poa airoides (Nees) Kunth, hom. illeg. = **Eragrostis airoides** Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Mujica Sallés, J., 1996.

Poa alopecurus (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **alopecurus**
Sin.: *Arundo alopecuros* Gaudich. ex Mirb., *Arundo antarctica* d'Urv., *Calamagrostis macloviana* Steud., *Festuca alopecurus* (Gaudich. ex Mirb.) Brongn., nom. superfl., *Festuca antarctica* (d'Urv.) Kunth, hom. illeg., *Festuca arundo* Hook. f., *Poa antarctica* (d'Urv.) Pilg., nom. illeg., *Poa antarctica* (d'Urv.) Raspail, *Poa antarctica* (d'Urv.) St.-Yves, comb. superfl., *Poa flabellata* (Lam.) Raspail var. *alopecurus* (Gaudich. ex Mirb.) Raspail, *Poa flabellata* (Lam.) Raspail var. *antarctica* (d'Urv.) Raspail, *Poa magellanica* (Phil.) Speg., *Poa rigidifolia* Steud.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Giussani, L. M., 2000; Moore, D. M., 1983; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 139* (SI)]; CHL[*Roig, F. A. 2838* (BAA), *Soreng, R. J. 7366* (SI, US)].

Poa alopecurus (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **fuegiana** (Hook. f.) Moore & Doggett
Sin.: *Aira superbiens* Steud., *Deyeuxia vivipara* Phil., *Festuca fuegiana* Hook. f., *Festuca fuegiana* Hook. f. var. *vivipara* Hook., nom. inval., *Festuca pogonantha* Franch., *Poa fuegiana* (Hook. f.) Hack., *Poa fuegiana* (Hook. f.) Hack. var. *involucrata* Hack., *Poa pogonantha* (Franch.) Parodi, *Poa superbiens* (Steud.) Hauman & Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–800 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF); CHL(X, XI, XII).

Ejemplares de referencia: ARG[*Savatier 1844* (BAA, P, US), *Soriano, A. 5662* (BAA)]; CHL[*Lechler, W. 1194* (BAA, P, US, W), *Moore, D. M. 1575* (BAB), *Soreng, R. J. 7230* (SI, US)].

Poa alopecurus (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **prichardii** (Rendle) Giussani & Soreng
Sin.: *Festuca shuka* Speg., *Poa commersonii* Franch., *Poa prichardii* Rendle, *Poa shuka* (Speg.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 5663* (BAA)]; CHL[*Henriquez 223* (CONC)].

Poa amabilis L. = **Eragrostis amabilis** (L.) Wight & Arn. ex Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Poa ampla Merr. = **Poa secunda** J. Presl subsp. **juncifolia** (Scribn.) Soreng
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa andina Trin.
Sin.: *Poa acrochaeta* Hack., *Poa aristata* Phil., *Poa straminea* Steud.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1300–2100 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 184a* (SI)]; CHL[*Burkart, A. 9497* (SI)].

Poa androgyna Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 3400–4200 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Peterson, P. M. 15710* (CONC)].

Poa anfamensis Negritto & Anton = **Poa scaberula** Hook. f.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa angustata (Griseb.) Parodi = **Poa parviceps** Hack. var. **parviceps**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa angustifolia L. = **Poa pratensis** L. subsp. **angustifolia** (L.) Lej.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa annua L.
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Mujica Sallés, J., 1996; Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Nicora, E. G., 1978; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Anual. Introducida. 0–3800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, TDF, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IDE, IJF, RME); PRY(MIE); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Llamas, A. s.n.* (SI)]; BRA[*Camargo, L. 723* (PACA)]; CHL[*Jiles P., C. 2603* (CONC)]; PRY[*Pedersen, T. M. 6588* (SI)]; URY[*Mujica Sallés, J. 275* (MVFA)].

Poa anomala Kunth = **Poidium uniolae** (Nees) Matthei
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa antarctica (d'Urv.) Pilg., nom. illeg. = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **alopecurus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa antarctica (d'Urv.) Raspail = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **alopecurus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa antarctica (d'Urv.) St.-Yves, comb. superfl. = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **alopecurus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa antarctica (Hook. f.) Stapf, comb. superfl. = **Poa darwiniana** Parodi
Referencias: Parodi, L. R., 1937c.

Poa araucana Phil. = **Poa denudata** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa arctica R. Br.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Nicora, E. G., 1988.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Konopacki, E. s.n.* (BAA)].

Poa arechavaletae Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.

Países: URY(MON).
Ejemplares de referencia: URY[*Arechavaleta, J. 473/4* (MVM)].

Poa arenicola St.-Yves = **Poa robusta** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa argentina Speg. = **Festuca argentina** (Speg.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa ariguensis Steud. = **Poa trivialis** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa aristata Phil. = **Poa andina** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa articulata Schrank = **Eragrostis articulata** (Schrank) Nees
Referencias: Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Poa asperiflora Hack. = **Poa kurtzii** R.E. Fr.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa atacamensis Parodi = **Poa laetevirens** R.E. Fr.
Referencias: Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000.

Poa atropidiformis Hack. var. **atropidiformis**
Sin.: *Dissanthelium atropidiforme* (Hack.) Soreng
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., 1998, 1999; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 141* (SI)]; CHL[*Ansorge, B. s.n.* (B, BAA, US, W)].

Poa atropidiformis Hack. var. **patagonica** (Parodi) Nicora
Sin.: *Dissanthelium atropidiforme* (Hack.) Soreng var. *patagonica* (Parodi) Soreng, *Dissanthelium patagonicum* Parodi
Referencias: Nicora, E. G., 1973a, 1978; Soreng, R. J., 1999; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dauber, L. 180* (BA, SI, US)].

Poa ayseniensis Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: CHL(XI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Dusén, P. K. H. 514* (*)].

Poa barrosiana Parodi = **Poa bergii** Hieron.
Referencias: Giussani, L. M., 2000.

Poa bergii Hieron.
Sin.: *Poa barrosiana* Parodi
Referencias: Giussani, L. M., 2000; Nicora, E. G., 1978; Torres, M. A., 1970f.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, RNE); URY(COL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (BAB)]; URY[*Cabrera, A. L. 3872* (BAA)].

Poa bergii Hieron. var. *chubutensis* Speg. = **Poa lanuginosa** Poir.
Referencias: Giussani, L. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa berningeri Pilg. = **Poa chonotica** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa boecheri Parodi = **Poa lanuginosa** Poir.
Referencias: Giussani, L. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa boelckei Nicora = **Poa obvallata** Steud.
Referencias: Giussani, L. M., 2000.

Poa boliviensis Hack. = **Poa pratensis** L. subsp. **pratensis**
Referencias: Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000.

Poa bonariensis (Lam.) Kunth
Sin.: *Festuca bonariensis* Lam., *Poa montevidensis* Arechav., *Poa pallens* Poir., *Schenodorus bonariensis* (Lam.) Roem. & Schult.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Giussani, L. M., 2000; Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Parodi, L. R., 1936a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, ERI, LPA, NEU, SFE, TUC); BRA(RGS); CHL(II, III, IV, V, VIII, IX, RME); URY(MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 18132* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 1565* (ICN)]; CHL[*Ricardi, M. 1875* (CONC)]; URY[*Rosengurtt, B. 2294* (BAA)].

[Poa bonariensis (Lam.) Kunth f. scabrifolia Hack.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Poa borchersii Phil. = **Poa chonotica** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa bradei Pilg.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 2200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Valla, J. J. 2876* (ICN)].

Poa breviculmis Pilg. = **Poa yaganica** Speg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa buchtienii Hack. = **Poa calchaquiensis** Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa bulbosa L.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Nicora, E. G., 1988.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–300 m.
Países: ARG(SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Molina s.n.* (CRP, SI)]; CHL[*Elvebakk, A. 635* (CONC)].

Poa cabreriana Anton & Ariza
Sin.: *Poa serotina* Ehrh. var. *purpurea* Griseb.
Referencias: Anton, A. M. & Ariza Espinar, L., 1980; Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–5000 m.
Países: ARG(CAT, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 19258* (CORD)].

Poa caespitosa (G. Forst.) Hook. ex Speg. = **Poa flabellata** (Lam.) Raspail
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa calamagrostoidea Hack., nom. nud. = **Poa dolichophylla** Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa calchaquiensis Hack.
Sin.: *Poa buchtienii* Hack.
Referencias: Giussani, L. M., 2000; Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Parodi, L. R., 1961; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 3200–4200 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 20477* (SI), *Morrone, O. 3278* (SI)].

Poa calotheca (Trin.) Kunth = **Poidium calotheca** (Trin.) Matthei
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987.

Poa carinata Poir. = **Eragrostis hypnoides** (Lam.) Britton, Stern & Poggenb.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Poa chamaeclinos Pilg.
Referencias: Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 3800–4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11879* (BAA, SI)].

Poa chilensis Moris, hom. illeg. = **Eragrostis mexicana** (Hornem.) Link subsp. **mexicana**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Poa chilensis Trin. = **Poa holciformis** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Poa chilensis Trin. f. gerthii Hicken]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

[Poa chilensis Trin. var. desvauxii Hauman]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Poa chilensis Trin. var. *planifolia* (Kuntze) Hauman = **Poa planifolia** Kuntze
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa chilensis Trin. var. *robustior* Phil. = **Poa holciformis** J. Presl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa chiloensis Phil. = **Poa denudata** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa chonotica Phil.
Sin.: *Deschampsia latifolia* Phil., hom. illeg., *Poa berningeri* Pilg., *Poa borchersii* Phil., *Poa chubutensis* Speg., *Poa latifolia* Phil., *Poa robusta* Phil., hom. illeg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 188a* (SI)]; CHL[*Reichert s.n.* (SI)].

Poa chorizantha E. Desv. = **Poa stenantha** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa chrysantha Lindm. = **Poa yaganica** Speg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa chubutensis Speg. = **Poa chonotica** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa cilianensis All. = **Eragrostis cilianensis** (All.) Vignolo ex Janch.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980.

Poa ciliaris L. = **Eragrostis ciliaris** (L.) R. Br.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980.

Poa commersonii Franch. = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **prichardii** (Rendle) Giussani & Soreng
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa compressa L.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE); CHL(IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10724* (BAA)]; CHL[*Magens, O. s.n.* (CONC)].

Poa conceptionis Steud. = **Eragrostis polytricha** Nees
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Poa conformis Nees ex Steud. = **Poa cumingii** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa controversa Steud. = **Poa flabellata** (Lam.) Raspail
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa controversa Steud. var. *minor* Steud. = **Poa flabellata** (Lam.) Raspail
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa cumingii Trin.
Sin.: *Distichlis ammobia* Phil., *Distichlis volckmannii* Phil., *Poa conformis* Nees ex Steud., *Poa curva* Nees ex Steud., *Poa dialystostachya* Phil., *Poa phalaroides* Nees ex Steud., *Poa stachyodes* Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(V, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Landbeck s.n.* (SGO, US, W), *Pfister, A. s.n.* (CONC)].

Poa curva Nees ex Steud. = **Poa cumingii** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa curvula Schrad. = **Eragrostis curvula** (Schrad.) Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Poa dactyliformis Steud. = **Poa scaberula** Hook. f.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Poa danthonioides Steud.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Poa darwiniana Parodi
Sin.: *Poa antarctica* (Hook. f.) Stapf, comb. superfl., *Sieglingia antarctica* (Hook. f.) Macloskie ex A.J. Scott, *Triodia antarctica* Hook. f.
Referencias: Parodi, L. R., 1937a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 7346* (BAA)]; CHL[*Darwin, C. R. 1833* (BAA)].

Poa decolorata Pilg. = **Poa resinulosa** Nees ex Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa denudata Steud.
Sin.: *Koeleria rigidula* Steud., *Poa araucana* Phil., *Poa chiloensis* Phil., *Poa eligulata* Hack., *Poa fonkii* Phil., *Poa nahuelhuapiensis* Nicora, *Poa vaginiflora* Steud.
Referencias: Giussani, L. M., 2000; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 3190* (BAA)]; CHL[*Lechler, W. 578* (BAA)].

Poa denudata Steud. var. *minor* Ball, nom. nud. = **Poa ligularis** Nees ex Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa dialystostachya Phil. = **Poa cumingii** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa dolichophylla Hack.
Sin.: *Poa calamagrostoidea* Hack., nom. nud., *Poa pilcomayensis* Hack. var. *calamagrostoidea* Hack.
Referencias: Giussani, L. M., 2000; Hackel, E., 1911; Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–2300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 126b* (SI)].

Poa durifolia Giussani, Nicora & F.A. Roig
Sin.: *Poa ligularis* Nees ex Steud. var. *stricta* Nicora & F.A. Roig
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2100 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 7086* (SI)].

Poa dusenii Hack. = **Poa spiciformis** (Steud.) Hauman & Parodi var. **ibari** (Phil.) Giussani
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa eligulata Hack. = **Poa denudata** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa eragrostis L. = **Eragrostis minor** Host
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Poa eremophila Phil. = **Puccinellia frigida** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Nicora, E. G., 1999a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa erinacea Speg.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CHU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2434* (BAA, SI)].

[Poa eriophora Steud.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Poa expansa (Link) Kunth = **Eragrostis bahiensis** Schrad. ex Schult.

Poa fallens Pilg. = **Poa secunda** J. Presl subsp. **secunda**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa flabellata (Lam.) Hook. f., comb. superfl. = **Poa flabellata** (Lam.) Raspail
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa flabellata (Lam.) Raspail
Sin.: *Dactylis caespitosa* G. Forst., *Festuca antarctica* Spreng., *Festuca flabellata* Lam., *Festuca urvilleana* Steud., *Parodiochloa flabellata* (Lam.) C.E. Hubb., *Poa caespitosa* (G. Forst.) Hook. ex Speg., *Poa controversa* Steud., *Poa controversa* Steud. var. *minor* Steud., *Poa flabellata* (Lam.) Hook. f., comb. superfl., *Poa forsteri* Steud., nom. superfl., *Sesleria americana* Nees ex Steud.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Parodi, L. R., 1953; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 503* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 5269* (CONC)].

Poa flabellata (Lam.) Raspail var. *alopecurus* (Gaudich. ex Mirb.) Raspail = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **alopecurus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa flabellata (Lam.) Raspail var. *antarctica* (d'Urv.) Raspail = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **alopecurus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Poa flabellata (Lam.) Raspail var. mucronulata Hack. ex Dusén]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Poa fonkii Phil. = **Poa denudata** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Poa forsteri Phil., hom. illeg.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Poa forsteri Steud., nom. superfl. = **Poa flabellata** (Lam.) Raspail
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa fuegiana (Hook. f.) Hack. = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **fuegiana** (Hook. f.) Moore & Doggett
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa fuegiana (Hook. f.) Hack. var. *involucrata* Hack. = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **fuegiana** (Hook. f.) Moore & Doggett
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa fulvescens Trin. = **Poa secunda** J. Presl subsp. **secunda**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa gayana E. Desv.
Sin.: *Poa patagonica* Phil. var. *neuquina* Nicora
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1100–3000 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 20315* (BAA)]; CHL[*Jiles, C. 4815* (CONC)].

Poa glauca Vahl
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–900 m.
Países: ARG(CHU, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12708* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Ricardi, M. 5040* (CONC)].

Poa glomerifera Hack. = **Poa plicata** Hack.
Referencias: Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa gracillima Vasey = **Poa secunda** J. Presl subsp. **secunda**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa grisebachii R.E. Fr.
Sin.: *Poa holciformis* auct. non J. Presl
Referencias: Fries, R. E., 1905; Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–3700 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. 11412* (BAA, CORD, S, W)].

Poa gymnantha Pilg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8355* (BAA)]; CHL[*Peterson, P. M. 15730* (SI)].

Poa hachadoensis Nicora var. **hachadoensis**
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII, VIII, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Valla, J. J. s.n.* (BAA, SI)]; CHL[*Burkart, A. 9510* (SI)].

Poa hachadoensis Nicora var. **pilosa** Nicora
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–2700 m.
Países: ARG(CHU, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 14160½* (BAA)].

Poa hieronymi Hack.
Referencias: Hackel, E., 1902; Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Perenne. Endémica. 1200–3300 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 654* (BAA, CORD, LIL, US, W)].

Poa holciformis auct. non J. Presl = **Poa grisebachii** R.E. Fr.
Referencias: Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000.

Poa holciformis J. Presl
Sin.: *Festuca elliotii* Hack., *Koeleria poaeoides* Nees ex Steud., *Poa chilensis* Trin., *Poa chilensis* Trin. var. *robustior* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Giussani, L. M., 2000; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1900–3800 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SAL, SJU); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 9720* (BAB, SI), *Giussani, L. M. 176a* (SI)]; CHL[*Elliott, S. 467* (US, W)].

Poa hubbardiana Parodi
Referencias: Giussani, L. M., 2000; Parodi, L. R., 1937a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1400–2100 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 219a* (SI), *Parodi, L. R. 7501* (BAA)].

Poa huecu Parodi
Sin.: *Poa indigesta* Parodi
Referencias: Giussani, L. M., 2000; Parodi, L. R., 1950; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3900 m.
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 9818* (BAB), *Giussani, L. M. 166b* (SI)].

Poa humillima Pilg.
Referencias: Anton, A. M., 1978; Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000–4600 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 2999* (BAA)]; CHL[*Peterson, P. M. 15525* (CONC)].

Poa hypnoides Lam. = **Eragrostis hypnoides** (Lam.) Britton, Stern & Poggenb.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Poa hypsophila Phil. = **Puccinellia frigida** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Nicora, E. G., 1999a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa ianthoides Roiv. = **Poa pratensis** L. subsp. **pratensis**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa ibari Phil. = **Poa spiciformis** (Steud.) Hauman & Parodi var. **ibari** (Phil.) Giussani
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa indigesta Parodi = **Poa huecu** Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa infirma Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 3290* (CONC)].

Poa iridifolia Hauman
Sin.: *Poa lanigera* Nees var. *tandilensis* Hack.
Referencias: Giussani, L. M., 2000; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1970f.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. 40* (SI), *Hunziker, J. H. 13212* (SI)].

Poa japonica Thunb. = **Eragrostis japonica** (Thunb.) Trin.

Poa julietii Phil. = **Poa obvallata** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa juncifolia Scribn. = **Poa secunda** J. Presl subsp. **juncifolia** (Scribn.) Soreng
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa koelerioides Trin. = **Gymnachne koelerioides** (Trin.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa kurtzii R.E. Fr.
Sin.: *Poa asperiflora* Hack., *Poa munozensis* Hack., *Poa pflanzii* Pilg.
Referencias: Anton, A. M., 1978; Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 3200–4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2481* (SI)]; CHL[*Peterson, P. M. 15750* (CONC)].

Poa laetevirens R.E. Fr.
Sin.: *Poa atacamensis* Parodi, *Poa nana* Phil., hom. illeg., *Puccinellia atacamensis* (Parodi) Soreng
Referencias: Fries, R. E., 1905; Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4800 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL); CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fries, R. E. 806* (BAA, CORD, S)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (BAA, CORD, SGO)].

Poa lanigera Nees
Sin.: *Poa lanigera* Nees var. *vaginata* Döll, *Poa vaginata* (Döll) Herter
Referencias: Giussani, L. M., 2000; Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1970f.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS); PRY(APA); URY(DUR, MAL, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22437* (BAA, SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 2431* (ICN)]; PRY[*Bertoni, M. S. 1706* (BAA, SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 2226* (ICN), *Sello s.n.* (BAA)].

Poa lanigera Nees var. *stuckertii* Hack. = **Poa stuckertii** (Hack.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa lanigera Nees var. *tandilensis* Hack. = **Poa iridifolia** Hauman
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa lanigera Nees var. *vaginata* Döll = **Poa lanigera** Nees
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa lanuginosa Poir.
Sin.: *Festuca lanata* Spreng., *Poa bergii* Hieron. var. *chubutensis* Speg., *Poa boecheri* Parodi, *Poa magellanica* Phil. ex Macloskie, nom. nud., *Poa patagonica* Phil.
Referencias: Giussani, L. M., 2000; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF); CHL(IV, V, VIII, XII); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 129* (SI)]; CHL[*Soreng, R. J. 7362* (SI, US)]; URY[*Herter, W. G. F. 116* (SI)].
Notas: Citada para Brasil sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Soreng et al., 2003).

[Poa lanuginosa Poir. var. elata Speg.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Poa latifolia Phil. = **Poa chonotica** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Poa lepida Nees ex Steud., hom. illeg.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Poa ligularis Nees ex Steud.
Sin.: *Poa denudata* Steud. var. *minor* Ball, nom. nud.
Referencias: Giussani, L. M., 2000; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU); CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 2097* (SI)]; CHL[*Mihoc 3121* (CONC)].

Poa ligularis Nees ex Steud. var. *stricta* Nicora & F.A. Roig = **Poa durifolia** Giussani, Nicora & F.A. Roig
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa lilloi Hack.
Referencias: Anton, A. M., 1978; Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 3200–5000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); CHL(I).

Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 5619* (BAA, CORD, GH, LIL, SI, W)]; CHL[*Marticorena, C. 132* (CONC)].

Poa limicola Pilg. = **Poa yaganica** Speg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Poa lobata Hack., nom. inval.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Poa lugens (Nees) Kunth = **Eragrostis lugens** Nees
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Poa magellanica (Phil.) Speg. = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **alopecurus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa magellanica Phil. ex Macloskie, nom. nud. = **Poa lanuginosa** Poir.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa magensiana Potztal = **Poa pratensis** L. subsp. **pratensis**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Poa malabarica L.]
Sin.: *Diplachne malabarica* (L.) Merr.
Referencias: Snow, N. & Davidse, G., 1998.
Notas: Nombre dudoso.

Poa maullinica Phil. = **Poa trivialis** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa maypurensis Kunth = **Eragrostis maypurensis** (Kunth) Steud.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Nicora, E. G., 1998b.

[Poa megalantha (Parodi) Herter]
Sin.: *Poa stuckertii* (Hack.) Parodi var. *megalantha* Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Poa megastachya Koeler = **Eragrostis cilianensis** (All.) Vignolo ex Janch.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Poa mendocina Nicora & F.A. Roig
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 3100 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 16894* (BAA, MERL, SI)].

Poa mexicana Hornem. = **Eragrostis mexicana** (Hornem.) Link subsp. **mexicana**

Poa micranthera Hack., nom. nud. = **Poa scaberula** Hook. f.
Referencias: Soreng, R. J., 1998.

Poa microstachya Link = **Eragrostis bahiensis** Schrad. ex Schult.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Poa modesta Phil., hom. illeg. = **Poa trivialis** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa monandra Hack. = **Poidium monandrum** (Hack.) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa montevidensis Arechav. = **Poa bonariensis** (Lam.) Kunth
Referencias: Giussani, L. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa monticola Phil. = **Festuca monticola** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa montufari Kunth = **Eragrostis pastoensis** (Kunth) Trin.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Poa munozensis Hack. = **Poa kurtzii** R.E. Fr.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa myriantha Hack.
Referencias: Anton, A. M., 1978; Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–3500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 3656* (BAA, CORD, LIL, W)].

Poa nahuelhuapiensis Nicora = **Poa denudata** Steud.
Referencias: Giussani, L. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa nana Phil., hom. illeg. = **Poa laetevirens** R.E. Fr.
Referencias: Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa neesii (Trin.) Kunth = **Eragrostis neesii** Trin. var. **neesii**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Poa nemoralis L.
Sin.: *Agrostis alba* L.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 3364* (BAA)]; CHL[*Dollenz, O. 208* (CONC)].

Poa nigricans Kunth = **Eragrostis nigricans** (Kunth) Steud. var. **nigricans**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Poa obvallata Steud.
Sin.: *Deyeuxia vulcanica* Phil., *Poa boelckei* Nicora, *Poa julietii* Phil., *Poa pachypogon* Nees ex Steud., *Poa subaristata* Phil., *Poa tristigmatica* E. Desv.
Referencias: Giussani, L. M., 2000; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–2100 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Villamil, C. B. 2236* (SI)]; CHL[*Gay, C. 49* (BAA), *Soreng, R. J. 7100* (SI, US)].

Poa oligeria Steud. = **Poa pratensis** L. subsp. **pratensis**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa oresigena Phil. = **Puccinellia frigida** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Hitchcock, A. S., 1927; Nicora, E. G., 1999a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa pachypogon Nees ex Steud. = **Poa obvallata** Steud.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa pallens Poir. = **Poa bonariensis** (Lam.) Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa palustris L.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(V, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, D. 11769* (BAA)].
Notas: Citada para Chile sin mencionar ejemplar de referencia (Soreng et al., 2003).

Poa paposana Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–900 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Soreng, R. J. 7075* (CONC)].

Poa parviceps Hack. var. **jujuyensis** Parodi ex Nicora
Referencias: Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Nicora, E. G., 1995a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 3200–5000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11912* (SI)].

Poa parviceps Hack. var. **parviceps**
Sin.: *Festuca angustata* Griseb., *Poa angustata* (Griseb.) Parodi, *Poa scaberula* Hook. f. f. *nudiflora* Hauman
Referencias: Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 3200–4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, TUC); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 11474* (BAA, SI, W)]; CHL[*Peterson, P. M. 15575* (MO, US)].

Poa pastoensis Kunth = **Eragrostis pastoensis** (Kunth) Trin.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Poa patagonica Phil. = **Poa lanuginosa** Poir.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa patagonica Phil. var. *neuquina* Nicora = **Poa gayana** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa pearsonii Reeder
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 4200–4600 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 1146* (CONC)].

Poa pectinacea Michx. = **Eragrostis pectinacea** (Michx.) Nees var. **pectinacea**
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Nicora, E. G., 1998b.

Poa pedersenii Nicora
Referencias: Giussani, L. M., 2000; Nicora, E. G., 1995c; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Pedersen, T. M. 15049* (SI)].

Poa perligulata Pilg.
Sin.: *Catabrosa burkartii* Hitchc.
Referencias: Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1981a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 4200–5400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11881* (BAA, SI)]; CHL[*Peterson, P. M. 15729* (CONC)].

Poa peruviana Jacq. = **Eragrostis peruviana** (Jacq.) Trin.
Referencias: Nicora, E. G., 1998b; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa pflanzii Pilg. = **Poa kurtzii** R.E. Fr.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa phalaroides Nees ex Steud. = **Poa cumingii** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa philippii Steud. = **Gymnachne koelerioides** (Trin.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa phragmites Phil. = **Cortaderia pilosa** (d'Urv.) Hack.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Poa pilcomayensis Hack.
Referencias: Giussani, L. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1970f.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, ERI, SFE); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 18064* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 279a* (US, W)]; URY[*Berro, M. B. 7380* (MVFA)].
Notas: Citada para Brasil sin indicar localidad o material de referencia (Soreng et al., 2003).

Poa pilcomayensis Hack. var. *calamagrostoidea* Hack. = **Poa dolichophylla** Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa pilosa L. = **Eragrostis pilosa** (L.) P. Beauv.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Poa planifolia Kuntze
Sin.: *Colpodium planifolium* (Kuntze) K. Schum., *Poa acutifolia* Hauman, *Poa chilensis* Trin. var. *planifolia* (Kuntze) Hauman
Referencias: Kuntze, C. E. O., 1898; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Endémica. 2800–3100 m.
Países: ARG(MEN); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hauman, L. L. 2386* (BAA, US), *Hauman, L. L. s.n.* (BA, SI)]; CHL[*Soreng, R. J. 7164* (CONC)].

Poa plicata Hack.
Sin.: *Poa glomerifera* Hack.
Referencias: Hackel, E., 1902; Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 3300–4200 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 393* (BAA, CORD, W)].

Poa poecila Phil. = **Poa spiciformis** (Steud.) Hauman & Parodi var. **spiciformis**
Referencias: Giussani, L. M., 1993; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa pogonantha (Franch.) Parodi = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **fuegiana** (Hook. f.) Moore & Doggett
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa poidium Döll = **Poidium brasiliensis** Nees ex Steud.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa polytricha (Nees) Kunth = **Eragrostis polytricha** Nees
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Poa pratensis L. var. *angustifolia* (L.) Gaudin = **Poa pratensis** L. subsp. **angustifolia** (L.) Lej.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa pratensis L. subsp. **alpigena** (Lindm.) Hiitonen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: CHL(XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 1100* (CONC)].

Poa pratensis L. subsp. **angustifolia** (L.) Lej.
Sin.: *Poa angustifolia* L., *Poa pratensis* L. var. *angustifolia* (L.) Gaudin
Referencias: Nicora, E. G., 1978.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, DFE, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10857* (BAA, BAB, SI)].

Poa pratensis L. subsp. **pratensis**
Sin.: *Poa boliviensis* Hack., *Poa ianthoides* Roiv., *Poa magensiana* Potztal, *Poa oligeria* Steud.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Longhi-Wagner, H. M., 1987; Macaya, J. & Faúndez Y., L., 1996; Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997; Torres, M. A., 1970f.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–3800 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); BRA(RGS); CHL(III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XII, IJF, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 255* (SI)]; BRA[*Araújo, A. A. s.n.* (BLA)]; CHL[*Faúndez, L. 05-067* (AGUCH), *Lechler, W. 1192* (BAA)]; URY[*Berro, M. B. 3546* (MVFA)].

Poa prichardii Rendle = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **prichardii** (Rendle) Giussani & Soreng
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa prostrata Kunth = **Distichlis spicata** (L.) Greene var. **stricta** (Torr.) Scribn.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Poa psammodes (Trin.) Kunth = **Eragrostis bahiensis** Schrad. ex Schult.

Poa pumila Phil. = **Puccinellia frigida** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Nicora, E. G., 1999a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa pungionifolia Speg.
Referencias: Nicora, E. G., 1977; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 140* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 6586* (CONC)].

Poa purpurascens Spreng. = **Eragrostis purpurascens** (Spreng.) Schult.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Boechat, S. C., 1980.

Poa pycnantha Phil. = **Eragrostis pycnantha** (Phil.) Parodi ex Nicora
Referencias: Nicora, E. G., 1998b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Poa racemosa Vahl = **Eragrostis maypurensis** (Kunth) Steud.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Poa ragonesei Nicora
Referencias: Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Nicora, E. G., 1995a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 272* (BA, BAA, SI)].

Poa rariflora (Lam.) Roem. & Schult. = **Orthoclada laxa** (Rich.) P. Beauv.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Poa reitzii Swallen
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Valls, J. F. M. 1891* (ICN)].

Poa resinulosa Nees ex Steud.
Sin.: *Poa decolorata* Pilg., *Trisetum rigidulum* (Steud.) Domin
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Giussani, L. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1970f.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SFE, SLU, TUC); CHL(VIII, XII, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 791* (SI), *Cialdella, A. M. 150* (SI)]; CHL[*Mihoc 3119* (CONC)]; URY[*Lombardo, A. 2627* (MVJB)].

Poa rigida L. = **Catapodium rigidum** (L.) Dony
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa rigidifolia Steud. = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **alopecurus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa rigidifolia Steud. var. *ibari* (Phil.) Giussani = **Poa spiciformis** (Steud.) Hauman & Parodi var. **ibari** (Phil.) Giussani
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa robusta Phil., hom. illeg. = **Poa chonotica** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa robusta Steud.
Sin.: *Festuca arenaria* Lam., *Poa acutissima* Pilg., *Poa arenicola* St.-Yves
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1088* (SI)]; CHL[*Lechler, W. 1191* (BAA, G, K, LE, P, US, W)].

Poa scaberula Hook. f.
Sin.: *Poa anfamensis* Negritto & Anton, *Poa dactyliformis* Steud., *Poa micranthera* Hack., nom. nud.
Referencias: Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 1100–2200 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF, TUC); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 583* (CORD, SI)]; CHL[*Soreng, R. J. 7304* (CONC)].

Poa scaberula Hook. f. f. *nudiflora* Hauman = **Poa parviceps** Hack. var. **parviceps**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Poa scaberula Hook. f. var. gracillima Speg.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Poa schizantha Parodi
Referencias: Giussani, L. M., 2000; Parodi, L. R., 1940; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 13672* (BAA, LP, SI, US)].

Poa schoenoides Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, O. s.n.* (SGO, US)].

Poa scoparia Kunth = **Distichlis scoparia** (Kunth) Arechav. var. **scoparia**

Poa secunda J. Presl subsp. **juncifolia** (Scribn.) Soreng
Sin.: *Poa ampla* Merr., *Poa juncifolia* Scribn.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Molina 2565crp* (BAA)]; CHL[*Boelcke, O. 7382* (BAA)].

Poa secunda J. Presl subsp. **secunda**
Sin.: *Festuca patagonica* Phil., *Festuca spaniantha* Phil., *Poa fallens* Pilg., *Poa fulvescens* Trin., *Poa gracillima* Vasey
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–2700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(V, VI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10444* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Pisano, E. 2554* (CONC)].

Poa sellowii Nees
Sin.: *Poa umbrosa* auct. non Trin.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Endémica. 700–1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PHA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 15550* (FLOR, HBR, R, US)]; PRY[*Comisión argentino-paraguaya de límites 279a* (BM)].

Poa seminuda (Trin.) Kunth = **Eragrostis seminuda** Trin.

Poa serotina Ehrh. var. *purpurea* Griseb. = **Poa cabreriana** Anton & Ariza
Referencias: Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa shuka (Speg.) Parodi = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **prichardii** (Rendle) Giussani & Soreng
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa solida (Nees) Kunth = **Eragrostis solida** Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Poa spegazziniana Parodi, nom. nud. = **Poa subenervis** Hack. var. **spegazziniana** Nicora
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa spiciformis (Steud.) Hauman & Parodi var. **ibari** (Phil.) Giussani
Sin.: *Poa dusenii* Hack., *Poa ibari* Phil., *Poa rigidifolia* Steud. var. *ibari* (Phil.) Giussani
Referencias: Giussani, L. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 159a* (SI), *Soriano, A. 1915* (BAA)]; CHL[*Ibar s.n.* (BAA)].

Poa spiciformis (Steud.) Hauman & Parodi var. **spiciformis**
Sin.: *Aira spiciformis* Steud., *Koeleria sterilis* Steud., *Poa poecila* Phil.
Referencias: Giussani, L. M., 1993; Moore, D. M., 1983; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lutz, A. 360* (CTES)]; CHL[*Lechler, W. 1068b* (K, P, US)].

Poa squarrosa Salzm. ex Steud. = **Eragrostis maypurensis** (Kunth) Steud.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Poa stachyodes Phil. = **Poa cumingii** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa stenantha Trin.
Sin.: *Poa chorizantha* E. Desv.
Referencias: Moore, D. M., 1983; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2200 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 13856* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Pfister, A. s.n.* (CONC)].

Poa stepparia Nicora
Referencias: Nicora, E. G., 1977; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, D. 1268* (BAA)].

Poa straminea Steud. = **Poa andina** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa stuckertii (Hack.) Parodi
Sin.: *Poa lanigera* Nees var. *stuckertii* Hack.
Referencias: Giussani, L. M., 2000; Parodi, L. R., 1932; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 217b* (SI)].

Poa stuckertii (Hack.) Parodi var. *megalantha* Parodi = **Poa megalantha** (Parodi) Herter
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa subaristata Phil. = **Poa obvallata** Steud.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa subenervis Hack. var. **spegazziniana** Nicora
Sin.: *Poa spegazziniana* Parodi, nom. nud.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–2000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Luti 10001* (SI)].

Poa subenervis Hack. var. **subenervis**
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 800 m.
Países: ARG(MEN, SCR, SJU); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gómez, R. 5827* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 434* (CONC)].

Poa subumbellata Roem. & Schult. = **Orthoclada laxa** (Rich.) P. Beauv.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Poa superata Hack.
Referencias: Hackel, E., 1911; Marticorena, C., com. pers.; Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2800–4300 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 5604* (BAA, CORD, LIL, W)].

Poa superbiens (Steud.) Hauman & Parodi = **Poa alopecurus** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. **fuegiana** (Hook. f.) Moore & Doggett
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa taltalensis Pilg. = **Puccinellia frigida** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Nicora, E. G., 1999a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa tef Zuccagni = **Eragrostis tef** (Zuccagni) Trotter
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Poa tenella L. = **Eragrostis amabilis** (L.) Wight & Arn. ex Nees
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Poa tenuiculmis Steud. = **Gymnachne koelerioides** (Trin.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa tenuifolia A. Rich. = **Eragrostis tenuifolia** (A. Rich.) Hochst. ex Steud.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 2001.

Poa trachyantha Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(XI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Dusén, P. K. H. 568* (US, W)].

Poa tricolor Nees ex Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cuming, H. 468* (B, BAA, CGE, K, US)].

Poa tristigmatica E. Desv. = **Poa obvallata** Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa trivialis L.
Sin.: *Poa ariguensis* Steud., *Poa maullinica* Phil., *Poa modesta* Phil., hom. illeg.
Referencias: Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1970f.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–4000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, NEU, RNE, SAL, TDF); CHL(V, VIII, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 14917* (SI)]; CHL[*Lechler, W. 719* (K, US, W)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o material de referencia (Soreng et al., 2003).

Poa tucumana Parodi
Referencias: Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000; Parodi, L. R., 1962; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3500 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hjerting, J. P. K. 9486* (BAA, C, CORD)].

Poa tumidula Steud. = **Rhombolytrum rhomboideum** Link
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa umbrosa Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 13501* (SI)].
Notas: Citada para Paraguay y Uruguay sin indicar material de referencia (Soreng et al., 2003).

Poa umbrosa auct. non Trin. = **Poa sellowii** Nees
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Poa uninervia (J. Presl) Kunth = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth subsp. **uninervia** (J. Presl) N. Snow
Referencias: Snow, N., 1998c.

Poa uruguayensis Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(MON).
Ejemplares de referencia: URY[*Arechavaleta, J. 42.5* (BAA, MVM)].

Poa vaginata (Döll) Herter = **Poa lanigera** Nees
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa vaginiflora Steud. = **Poa denudata** Steud.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Poa valdiviana Phil.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Poa villaroelii Phil. = **Poa acinaciphylla** E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Poa virescens (J. Presl) Kunth = **Eragrostis mexicana** (Hornem.) Link subsp. **virescens** (J. Presl) S.D. Koch & Sanchéz Vega
Referencias: Boechat, S. C., 1980; Mujica Sallés, J., 1996.

Poa yaganica Speg.
Sin.: *Poa breviculmis* Pilg., *Poa chrysantha* Lindm., *Poa limicola* Pilg.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(CHU, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Albov, N. M. 1054* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 7615* (CONC)].

Podagrostis (Griseb.) Scribn.

Número de especies: 1 endémica

Podagrostis sesquiflora (E. Desv.) Nicora
Sin.: *Agrostis sesquiflora* E. Desv., *Briza sesquiflora* (Desv.) Pilg., *Deyeuxia sesquiflora* (E. Desv.) Benth. & Hook. f. ex W.D. Jacks.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2300–2500 m.
Países: ARG(MEN, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11569* (BAA)]; CHL[*Pfister, A. 8763* (CONC)].

Podophorus Phil.

Número de especies: 1 endémica

Podophorus bromoides Phil.
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Germain, F. s.n.* (K, SGO, SGO, US)].

Podosaemum angustatum J. Presl = **Muhlenbergia angustata** (J. Presl) Kunth

Podosaemum ciliatum Kunth = **Muhlenbergia ciliata** (Kunth) Trin.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Podosaemum rigidum Kunth = **Muhlenbergia rigida** (Kunth) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Podosaemum tenellum Kunth = **Muhlenbergia tenella** (Kunth) Trin.

Pogochloa brasiliensis S. Moore = **Gouinia brasiliensis** (S. Moore) Swallen

Poidium Nees

Número de especies: 8, 1 endémica

Poidium brachychaetum (Ekman) Matthei
Sin.: *Briza brachychaeta* Ekman, *Microbriza brachychaete* (Ekman) Parodi ex Nicora & Rúgolo
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 13300* (L, S, W)].

Poidium brasiliensis Nees ex Steud.
Sin.: *Briza brasiliensis* (Nees ex Steud.) Ekman, *Poa poidium* Döll
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1981b; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sampaio, M. T. S. 183* (ICN)].

Poidium calotheca (Trin.) Matthei

Sin.: *Briza calotheca* (Trin.) Hack., *Briza neesii* Döll, *Briza poa* Nees ex Steud., *Briza scabra* Nees ex Steud., nom. nud., *Eragrostis calotheca* Trin., *Eragrostis crassa* Jedwabn., *Poa calotheca* (Trin.) Kunth

Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1981b; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(MIE, SPE); URY(FLA, MON, RIV, SOR, TAC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14331* (SI), *Montes, J. E. 15235* (SI), *Zuloaga, F. O. 545* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15067* (MBM), *Smith, L. B. 13035* (SI)]; PRY[*Woolston, A. L. 47* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 8430* (MVFA)].

Poidium juergensii (Hack.) Matthei

Sin.: *Briza juergensii* Hack.

Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1558* (PACA)].

Poidium monandrum (Hack.) Matthei

Sin.: *Briza lilloi* Parodi, *Briza mandoniana* (Griseb.) Henrard, *Briza mandoniana* (Griseb.) Henrard var. *herzogiana* Henrard, *Briza mandoniana* (Griseb.) Henrard var. *tuberculata* Henrard, *Briza mandoniana* (Griseb.) Henrard var. *vallegrandensis* Henrard, *Briza monandra* (Hack.) Pilg., *Briza stricta* (Hook. & Arn.) Steud. var. *mandoniana* (Griseb.) Hauman, *Calotheca stricta* Hook. & Arn. var. *mandoniana* Griseb., *Poa monandra* Hack.

Referencias: Matthei, O. R., 1975; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1981b; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Perenne. Nativa. 1000–1800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30814* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15424* (F, MBM, US)].

Poidium poimorphum (J. Presl) Matthei

Sin.: *Briza hackelii* (Lindm.) Ekman, *Briza hackelii* (Lindm.) Ekman f. *pseudisachne* Ekman, *Briza poimorpha* (J. Presl) Henrard, *Isachne hackelii* Lindm., *Microbriza poimorpha* (J. Presl) Parodi ex Nicora & Rúgolo, *Panicum poaemorphum* J. Presl

Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1981b; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CLA, COL, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1347* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 15582* (HBR, R, US)]; URY[*Mujica Sallés, J. 269* (MVFA)].

Poidium rufum (J. Presl) Matthei

Sin.: *Briza glomerata* Hack. & Arechav., *Briza glomerata* Kuntze, hom. illeg., *Briza rufa* (J. Presl) Steud., *Briza rufa* (J. Presl) Steud. var. *sparsipilosa* Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Briza scabra* auct. non (Nees ex Steud.) Ekman, *Chascolytrum rufum* J. Presl, *Lombardochloa rufa* (J. Presl) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Lombardochloa rufa* (J. Presl) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. var. *sparsepilosa* (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1981b; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CLA, FLO, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, TYT).

Ejemplares de referencia: ARG[*Eyerdam, W. J. 23639* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 13320* (HBR, US)]; URY[*Herter, W. G. F. 50479* (SI), *Rosengurtt, B. 6696* (MVFA)].

Poidium uniolae (Nees) Matthei

Sin.: *Briza flava* Desv., *Briza spicigera* (J. Presl) Steud., *Briza uniolae* (Nees) Nees ex Steud., *Briza uniolae* (Nees) Nees ex Steud. var. *modestior* Döll, *Briza uniolae* (Nees) Nees ex Steud. var. *robustior* Döll, *Chascolytrum spicigerum* J. Presl, *Eragrostis uniolae* Nees, *Poa anomala* Kunth

Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1981b; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CEN, GUA); URY(CAS, MAL, MON, RIV, SJO, TYT).

Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3466* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 10214* (HBR, R, US)]; PRY[*Rojas, T. 9251* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 9667* (MVFA)].

Polypogon Desf.

Número de especies: 11, 2 endémicas, 2 introducidas

Polypogon australis Brongn.

Sin.: *Polypogon chonoticus* Hook. f., *Polypogon crinitus* Trin., hom. illeg., *Polypogon elongatus* Kunth var. *patagonica* Speg., *Polypogon interruptus* Kunth var. *crinitus* (Trin.) Hack., *Polypogon purpurascens* Phil., *Polypogon radicans* Steud.

Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TUC); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 144* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996048* (CONC)].

Polypogon brachyatherus Phil. = **Polypogon interruptus** Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon breviaristatus Phil. = **Polypogon interruptus** Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon cachinalensis Phil. = **Polypogon interruptus** Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon chaetotropis Trin. = **Polypogon chilensis** (Kunth) Pilg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon chilensis (Kunth) Pilg.
Sin.: *Agrostis pectinata* Hack. & Arechav., *Chaetotropis chilensis* Kunth, *Chaetotropis latifolia* Phil., *Polypogon chaetotropis* Trin.
Referencias: Kämpf, A. N., 1975; Nicora, E. G., 1970b, 1978; Renvoize, S. A., 1988; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, MIS, RNE, SDE, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(II, III, VII, VIII, X, IJF, RME); PRY(GUA); URY(MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 46* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 335* (SI)]; CHL[*Barros, E. 373* (SI)]; PRY[*Kurtz, F. 132* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 8309* (MVFA)].

Polypogon chonoticus Hook. f. = **Polypogon australis** Brongn.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon crinitus Trin., hom. illeg. = **Polypogon australis** Brongn.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon elongatus Kunth
Sin.: *Chaetotropis elongata* (Kunth) Björkman, *Chaetotropis elongata* (Kunth) Björkman var. *longearistata* Nicora, *Nowodworskya agrostoides* J. Presl, *Polypogon elongatus* Kunth var. *strictus* E. Desv., *Raspailia agrostoides* J. Presl
Referencias: Kämpf, A. N., 1975; Marticorena, C., com. pers.; Nicora, E. G., 1978; Renvoize, S. A., 1988; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VII, X, RME); URY(MAL, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 172* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 28363* (MBM)]; CHL[*Villagran, C. 7095* (CONC)]; URY[*Rosengurtt, B. 11282* (MVFA)].

Polypogon elongatus Kunth f. *minor* Hack. = **Polypogon imberbis** (Phil.) Johow
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon elongatus Kunth var. *muticus* Hack. = **Polypogon imberbis** (Phil.) Johow
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon elongatus Kunth var. *patagonica* Speg. = **Polypogon australis** Brongn.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon elongatus Kunth var. *strictus* E. Desv. = **Polypogon elongatus** Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon exasperatus (Trin.) Renvoize
Sin.: *Agrostis asperigluma* Steud., *Agrostis exasperata* Trin., *Agrostis exasperata* Trin. var. *purpurascens* Kuntze, nom. nud., *Agrostis exasperata* Trin. var. *viridis* Kuntze, nom. nud., *Agrostis hackelii* R.E. Fr., *Agrostis hackelii* R.E. Fr. f. *viridiflora* Hack., *Agrostis patagonica* Phil., *Agrostis santacruzensis* Speg., *Agrostis speeiana* Mez, *Chaetotropis araucana* Phil., *Chaetotropis asperigluma* (Steud.) Nicora, *Chaetotropis hackelii* (R.E. Fr.) Björkman

Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & De Paula de Brooks, M. E., 1978; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Molina, A. M., 1992, 1997; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, NEU, RNE, SCR, TUC); BRA(SCA); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 568* (SI)]; BRA[*Swallen, J. R. 5175* (PEL)]; CHL[*Klenner, L. s.n.* (CONC), *Marticorena, A. 979* (CONC)].

Polypogon imberbis (Phil.) Pilg., comb. superfl.
= **Polypogon imberbis** (Phil.) Johow
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon imberbis (Phil.) Johow
Sin.: *Agrostis tehuelcha* Speg., *Chaetotropis imberbis* (Phil.) Björkman, *Chaetotropis imberbis* (Phil.) Björkman var. *bonariensis* Nicora, *Chaetotropis rioplatensis* (Herter) Björkman, *Nowodworskya imberbis* Phil., *Polypogon elongatus* Kunth f. *minor* Hack., *Polypogon elongatus* Kunth var. *muticus* Hack., *Polypogon imberbis* (Phil.) Johow f. *aristata* Skottsb., *Polypogon imberbis* (Phil.) Pilg., comb. superfl., *Polypogon rioplatensis* Herter, *Polypogon rioplatensis* Herter f. *elegans* Herter, *Polypogon rioplatensis* Herter f. *robusta* Herter
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Kämpf, A. N., 1975; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SCR, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(VII, IX, X, IJF); URY(DUR, MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rosa, E. B. 1583* (SI)]; BRA[*Freitas, J. M. s.n.* (BLA)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO, US)]; URY[*Barreto, I. L. s.n.* (BLA)].

Polypogon imberbis (Phil.) Johow f. *aristata* Skottsb.
= **Polypogon imberbis** (Phil.) Johow
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon interruptus Kunth
Sin.: *Alopecurus interruptus* (Kunth) Poir., *Polypogon brachyatherus* Phil., *Polypogon breviaristatus* Phil., *Polypogon cachinalensis* Phil., *Polypogon interruptus* Kunth var. *breviaristata* Desv., *Polypogon interruptus* Kunth var. *longearistata* E. Desv., *Polypogon microstachys* Phil., *Polypogon tarapacanus* Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Türpe, A. M., 1975a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6105* (SI)]; CHL[*Garaventa, A. 2841* (CONC)].

Polypogon interruptus Kunth var. *breviaristata* Desv.
= **Polypogon interruptus** Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon interruptus Kunth var. *crinitus* (Trin.) Hack.
= **Polypogon australis** Brongn.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon interruptus Kunth var. *longearistata* E. Desv.
= **Polypogon interruptus** Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon linearis Trin.
Sin.: *Polypogon longiflorus* Nees ex Steud., hom. illeg., *Polypogon longiflorus* Nees ex Steud., nom. nud., *Polypogon longiflorus* Nees ex Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 0–3900 m.
Países: CHL(I, II, V, VI, VII, VIII, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 5288* (CONC)].

Polypogon longiflorus Nees ex Steud., hom. illeg.
= **Polypogon linearis** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon longiflorus Nees ex Steud., nom. nud.
= **Polypogon linearis** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon longiflorus Nees ex Trin. = **Polypogon linearis** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon maritimus Willd.
Sin.: *Alopecurus maritimus* (Willd.) Poir.
Referencias: Kämpf, A. N., 1975; Nicora, E. G., 1970d; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS); CHL(V, VIII); URY(MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Daguerre, J. B. 187* (BAA)]; BRA[*Valls, J. F. M. 2330* (ICN)]; CHL[*Parra, O. 77* (CONC)]; URY[*Herter, W. G. F. 569a* (SI)].

Polypogon microstachys Phil. = **Polypogon interruptus** Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
Sin.: *Agrostis alopecuroides* Lam., *Alopecurus aristatus* Huds. var. *monspeliensis* (L.) Huds., *Alopecurus monspeliensis* L., *Polypogon monspeliensis* (L.) Desf. f. *argentinus* Hack., *Polypogon monspeliensis* (L.) Desf. f. *nana* Stuck.
Referencias: Kämpf, A. N., 1975; Müller, C., 1985; Nicora, E. G., 1970d; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; San Martín, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–3100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 231* (SI)]; BRA[*Kappel, A. s.n.* (BLA)]; CHL[*Garaventa, A. 3281* (CONC)]; URY[*Rosengurtt, B. 11124* (MVFA)].

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. f. *argentinus* Hack. = **Polypogon monspeliensis** (L.) Desf.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. f. *nana* Stuck. = **Polypogon monspeliensis** (L.) Desf.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Polypogon monspeliensis (L.) Desf. var. interrupta Trin.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Polypogon parvulus Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Sin.: *Chaetotropis parvula* (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Nicora
Referencias: Kämpf, A. N., 1975; Nicora, E. G., 1993; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SFE); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 2544* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 216* (BLA, MVFA)].

Polypogon purpurascens Phil. = **Polypogon australis** Brongn.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon radicans Steud. = **Polypogon australis** Brongn.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon rioplatensis Herter = **Polypogon imberbis** (Phil.) Johow
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon rioplatensis Herter f. *elegans* Herter = **Polypogon imberbis** (Phil.) Johow
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon rioplatensis Herter f. *robusta* Herter = **Polypogon imberbis** (Phil.) Johow
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon semiverticillatus (Forssk.) Hyl. = **Polypogon viridis** (Gouan) Breistr.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon spicatus Spreng. = **Gymnopogon spicatus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1990; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Polypogon tarapacanus Phil. = **Polypogon interruptus** Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Polypogon viridis (Gouan) Breistr.
Sin.: *Agrostis semiverticillata* (Forssk.) C. Chr., *Agrostis verticillata* Vill., *Agrostis viridis* Gouan, *Phalaris semiverticillata* Forssk., *Polypogon semiverticillatus* (Forssk.) Hyl.
Referencias: Müller, C., 1985; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II, IV, V, VIII, IX, X, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6223* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 4157* (CONC)]; URY[*Felippone, F. 622* (SI)].

Pseudechinolaena Stapf

Número de especies: 1

Pseudechinolaena helodes (Hack.) Herter = **Echinochloa helodes** (Hack.) Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf
Sin.: *Echinolaena polystachya* Kunth, *Lappago oplismenoides* Speg., *Oplismenus oplismenoides* (Speg.) Speg.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Cabrera, A. L., 1970a; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI); URY(CLA, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6798* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 16120* (MBM)]; PRY[*Hahn, W. J. 2023* (MO, PY)]; URY[*Del Puerto, O. 11093* (MVFA)].

Pseudechinolaena spectabilis (Nees ex Trin.) Herter = **Echinochloa polystachya** (Kunth) Hitchc. var. **spectabilis** (Nees) Mart. Crov.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Puccinellia Parl., nom. cons.

Número de especies: 10, 8 endémicas

Puccinellia antarctica (Speg.) Parodi = **Puccinellia magellanica** (Hook. f.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Puccinellia argentinensis (Hack.) Parodi
Sin.: *Atropis argentinensis* Hack.
Referencias: Nicora, E. G., 1999a; Parodi, L. R., 1937a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2200–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU); CHL(III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Botta, S. M. 659* (SI)]; CHL[*Johnston, I. M. 6081* (BAA)].

Puccinellia atacamensis (Parodi) Soreng = **Poa laetevirens** R.E. Fr.
Referencias: Negritto, M. A. & Anton, A. M., 2000.

Puccinellia battandieri (Speg.) Ponert, nom. illeg. = **Puccinellia festuciformis** (Host) Parl. subsp. **tenuifolia** (Boiss. & Reut.) W.E. Hughes
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Puccinellia biflora (Steud.) A. Camus, nom. illeg. = **Puccinellia biflora** (Steud.) Parodi

Puccinellia biflora (Steud.) Parodi
Sin.: *Atropis biflora* (Steud.) St.-Yves & A. Camus, *Festuca biflora* Steud., *Glyceria leptostachys* Speg., *Panicularia leptostachya* (Speg.) Macloskie, *Puccinellia biflora* (Steud.) A. Camus, nom. illeg.
Referencias: Miante, A. M., 1978; Moore, D. M., 1983; Nicora, E. G., 1999a; Parodi, L. R., 1937a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. 7616* (BAA, SI)]; CHL[*Pisano, E. 2421* (CONC)].

Puccinellia blomii Jansen = **Puccinellia mendozina** (Hack.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Puccinellia festuciformis (Host) Parl. subsp. tenuifolia (Boiss. & Reut.) W.E. Hughes]
Sin.: *Atropis battandieri* Speg., *Glyceria tenuifolia* Boiss. & Reut., *Puccinellia battandieri* (Speg.) Ponert, nom. illeg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Subespecie excluida del área del proyecto.

Puccinellia frigida (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Catabrosa frigida* Phil., *Poa eremophila* Phil., *Poa hypsophila* Phil., *Poa oresigena* Phil., *Poa pumila* Phil., *Poa taltalensis* Pilg., *Puccinellia hypsophila* (Phil.) Nicora, *Puccinellia hypsophila* (Phil.) Parodi ex Spinosa, nom. illeg., *Puccinellia oresigena* (Phil.) Hitchc.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Nicora, E. G., 1995a, 1999a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 3200–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruthsatz, B. 9272* (SI)]; CHL[*Ruthsatz, B. 8202* (SI)].

Puccinellia glaucescens (Phil.) Parodi
Sin.: *Atropis osteniana* Pilg., *Catabrosa glaucescens* Phil., *Glyceria glaucescens* (Phil.) Benth., *Panicularia glaucescens* (Phil.) Kuntze, *Puccinellia glaucescens* (Phil.) Parodi var. *osteniana* (Pilg.) Parodi, *Puccinellia johnstonii* Muñoz, *Puccinellia osteniana* (Pilg.) Herter

Referencias: Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1981a; Nicora, E. G., 1999a; Parodi, L. R., 1937a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SCR, SFE, SJU, TDF); CHL(IV, V, VIII, X, XI, XII, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 2845* (SI)]; CHL[*Barros, E. 467* (SI)]; URY[*Arechavaleta, J. 244* (MVM)].

Puccinellia glaucescens (Phil.) Parodi var. *osteniana* (Pilg.) Parodi = **Puccinellia glaucescens** (Phil.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Puccinellia hypsophila (Phil.) Nicora = **Puccinellia frigida** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Nicora, E. G., 1999a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Puccinellia hypsophila (Phil.) Parodi ex Spinosa, nom. illeg. = **Puccinellia frigida** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Nicora, E. G., 1999a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Puccinellia johnstonii Muñoz = **Puccinellia glaucescens** (Phil.) Parodi
Referencias: Nicora, E. G., 1999a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Puccinellia laxa (Pilg.) Parodi = **Puccinellia magellanica** (Hook. f.) Parodi
Referencias: Nicora, E. G., 1999a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Puccinellia magellanica (Hook. f.) Parodi
Sin.: *Atropis laxa* Pilg., *Atropis magellanica* (Hook. f.) Desv., *Catabrosa magellanica* Hook. f., *Glyceria antarctica* Speg., *Glyceria fuegiana* Speg., *Glyceria magellanica* (Hook. f.) Benth., *Panicularia antarctica* (Speg.) Macloskie, *Panicularia fuegiana* (Speg.) Macloskie, *Panicularia magellanica* (Hook. f.) Kuntze, *Panicularia magellanica* (Hook. f.) Macloskie, hom. illeg., *Puccinellia antarctica* (Speg.) Parodi, *Puccinellia laxa* (Pilg.) Parodi
Referencias: Miante, A. M., 1978; Moore, D. M., 1983; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1981a; Nicora, E. G., 1999a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 3282* (BAA)]; CHL[*Eyerdam 23931* (US)].

Puccinellia mendozina (Hack.) Parodi
Sin.: *Atropis argentinensis* Hack. f. *mendozina* Hack., *Atropis convoluta* Griseb. var. *mendozina* Hack., *Puccinellia blomii* Jansen
Referencias: Miante, A. M., 1978; Nicora, E. G., 1999a; Parodi, L. R., 1937a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, SAL, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*O'Donell, C. A. 3441* (BAA, LIL)].

Puccinellia oresigena (Phil.) Hitchc. = **Puccinellia frigida** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b; Hitchcock, A. S., 1927; Nicora, E. G., 1999a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Puccinellia osteniana (Pilg.) Herter = **Puccinellia glaucescens** (Phil.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Puccinellia parodii Nied., nom. superfl. = **Puccinellia preslii** (Hack.) Ponert
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Puccinellia parviflora (Hack. ex Dusén) Parodi = **Puccinellia pusilla** (Hack.) Parodi
Referencias: Nicora, E. G., 1999a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Puccinellia parvula Hitchc.
Referencias: Nicora, E. G., 1999a; Parodi, L. R., 1937a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4400 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 10352* (BAA)].

Puccinellia preslii (Hack.) Ponert
Sin.: *Aira tenuifolia* (J. Presl) Steud., *Atropis preslii* Hack., *Atropis tenuifolia* (J. Presl) Hauman, hom. illeg., *Atropis tenuifolia* (J. Presl) Speg., hom. illeg., *Catabrosa tenuifolia* J. Presl, *Glyceria tenuifolia* (J. Presl) Steud., *Panicularia tenuifolia* (J. Presl) Kuntze, *Puccinellia parodii* Nied., nom. superfl., *Puccinellia tenuifolia* (J. Presl) Parodi, nom. illeg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1600–1700 m.
Países: ARG(CHU, MEN, SCR, SJU); CHL(III, IV).

Ejemplares de referencia: ARG[*Soria, N. 2815* (BAA)]; CHL[*Barros, E. 4668* (BAA)].

Puccinellia pusilla (Hack.) Parodi
Sin.: *Atropis parviflora* Hack. ex Dusén, *Atropis preslii* Hack. subsp. *breviculmis* Hack., *Atropis preslii* Hack. subsp. *pusilla* Hack., *Puccinellia parviflora* (Hack. ex Dusén) Parodi
Referencias: Miante, A. M., 1978; Nicora, E. G., 1999a; Parodi, L. R., 1937a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12990* (SI)]; CHL[*Boelcke, O. s.n.* (SI)].

Puccinellia skottsbergii (Pilg.) Parodi
Sin.: *Atropis skottsbergii* Pilg.
Referencias: Miante, A. M., 1978; Moore, D. M., 1983; Nicora, E. G., 1999a; Parodi, L. R., 1937a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soria, N. 4555* (BAA, BAB)]; CHL[*Moore, D. M. 378* (US)].

Puccinellia tenuifolia (J. Presl) Parodi, nom. illeg.
= **Puccinellia preslii** (Hack.) Ponert
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Rabdochloa dubia (Kunth) Kuntze ex Stuck.
= **Leptochloa dubia** (Kunth) Nees
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Raimundochloa trachyantha (Phil.) A.M. Molina
= **Rostraria trachyantha** (Phil.) Tzvelev
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Raspailia agrostoides J. Presl = **Polypogon elongatus** Kunth

Reimaria actua Flüggé = **Reimarochloa acuta** (Flüggé) Hitchc.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Reimaria candida Humb. & Bonpl. ex Flüggé
= **Paspalum candidum** (Humb. & Bonpl. ex Flüggé) Kunth
Referencias: Morrone, O., Zuloaga, F. O. & Carbono, E., 1995; Zuloaga, F. O. & Morrone, O., 2005.

Reimaria laxa Rchb. ex A. Spreng. = **Digitaria laxa** (Rchb. ex A. Spreng.) Parodi
Referencias: Parodi, L. R., 1928a; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994b.

Reimarochloa Hitchc.
Número de especies: 1

Reimarochloa acuta (Flüggé) Hitchc.
Sin.: *Agrostis brasiliensis* Spreng., *Reimaria actua* Flüggé, *Reimarochloa brasiliensis* (Spreng.) Hitchc.
Referencias: Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1987; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Indefinido. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR, MIS); PRY(APY, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14547* (BAA)]; PRY[*Rojas, T. 2795* (AS, MO)].

Reimarochloa brasiliensis (Spreng.) Hitchc.
= **Reimarochloa acuta** (Flüggé) Hitchc.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Reitzia Swallen
Número de especies: 1

Reitzia smithii Swallen
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 6123* (US)].

Relchela Steud.
Número de especies: 1 endémica

Relchela panicoides Steud.
Sin.: *Agrostis asperula* Phil., *Agrostis corralensis* Phil., *Agrostis limonias* Phil., *Panicum oligistachyum* Steud.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(V, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19833* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 994860* (CONC)].

Rettbergia bambusoides Raddi = **Chusquea bambusoides** (Raddi) Hack. var. **bambusoides**
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Rettbergia capitata Döll, nom. inval. = **Chusquea capitata** Nees
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Rhipidocladum McClure

Número de especies: 2

Rhipidocladum neumannii Sulekic, Rúgolo & L.G. Clark
Referencias: Sulekic, A. A., Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Clark, L. G., 1999.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 400–1800 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Núñez 417* (SI)].

Rhipidocladum racemiflorum (Steud.) McClure
Sin.: *Arthrostylidium racemiflorum* Steud.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Sulekic, A. A., Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Clark, L. G., 1999.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2730* (SI)].

Rhombolytrum Link

Número de especies: 2 endémicas

Rhombolytrum berteroanum E. Desv. = **Gymnachne koelerioides** (Trin.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Rhombolytrum monandrum (Hack.) Nicora & Rúgolo
Sin.: *Briza bidentata* Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Eragrostis monandra* Hack.
Referencias: Long, M. A., 2002; Longhi-Wagner, H. M., 1987; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS); URY(RIV, TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rosengurtt, B. 9089* (ICN, MVFA)]; URY[*Rosengurtt, B. 6488* (MVFA)].

Rhombolytrum quinquenervium Phil. = **Rhombolytrum rhomboideum** Link
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Rhombolytrum rhomboideum Link
Sin.: *Poa tumidula* Steud., *Rhombolytrum quinquenervium* Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: CHL(V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 2523* (CONC)].

Rhynchelytrum repens (Willd.) A. Berger = **Melinis repens** (Willd.) Zizka
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Rhynchelytrum roseum (Nees) Stapf & C.E. Hubb. = **Melinis repens** (Willd.) Zizka

Rhynchoryza Baill.

Número de especies: 1

Rhynchoryza subulata (Nees) Baill.
Sin.: *Oryza subulata* Nees
Referencias: Burkart, A., 1969a; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SFE); BRA(RGS); PRY(CEN, COA, PAI); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22251* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 4650* (ICN)]; PRY[*Balansa, B. 270* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 6962b* (SI)].

Rhytachne Desv.

Número de especies: 1 introducida

Rhytachne rottboellioides Desv. ex Ham.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 9077* (ICN)].

Rhytachne subgibbosa (Winkl. ex Hack.) Clayton = **Mnesithea subgibbosa** (Winkl. ex Hack.) de Koning & Sosef
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Rostraria Trin.

Número de especies: 2, 1 introducida

Rostraria cristata (L.) Tzvelev
Sin.: *Festuca cristata* L., *Festuca phleoides* Vill., *Koeleria campestris* Phil., *Koeleria cristata* (L.) Bertol., *Koeleria phleoides* (Vill.) Pers., *Lophochloa cristata* (L.) Hyl., *Lophochloa phleoides* (Vill.) Pers., *Trisetum minutiflorum* Phil.

Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997; Tzvelev, N. N., 1971.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1700 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, LPA, SFE, TUC); BRA(RGS); CHL(I, IV, V, VI, VII, XII, RME); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Villamil, C. B. 6577* (SI)]; BRA[*Sacco, J. C. 414* (NY)]; CHL[*Barros, E. 736* (SI)]; URY[*Izaguirre, P. 61* (MVFA)].

Rostraria trachyantha (Phil.) Tzvelev
Sin.: *Koeleria trachyantha* Phil., *Parodiochloa trachyantha* (Phil.) A.M. Molina, *Raimundochloa trachyantha* (Phil.) A.M. Molina
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Nativa.
Países: CHL(I, II, III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (BAA, SGO)].

Rottboellia L. f., nom. cons.

Número de especies: 1 introducida

Rottboellia altissima Poir. = **Hemarthria altissima** (Poir.) Stapf & C.E. Hubb.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Rottboellia aurita Steud. = **Mnesithea aurita** (Steud.) de Koning & Sosef
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Rottboellia balansae Hack. = **Mnesithea balansae** (Hack.) de Koning & Sosef
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton
Sin.: *Rottboellia exaltata* L. f., nom. inval., *Stegosia cochinchinensis* Lour.
Referencias: Clayton, W. D., 1981; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 600 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4441* (SI)].

Rottboellia compressa L. f. *fasciculata* (Lam.) Hack. = **Hemarthria altissima** (Poir.) Stapf & C.E. Hubb.

Rottboellia cylindrica Willd. = **Hainardia cylindrica** (Willd.) Greuter

Rottboellia exaltata L. f., nom. inval. = **Rottboellia cochinchinensis** (Lour.) Clayton
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Rottboellia loliacea Bory & Chaub. = **Lolium rigidum** Gaudin subsp. **lepturoides** Sennen & Mauricio
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Rottboellia loricata Trin. subsp. *subgibbosa* Winkl. ex Hack. = **Mnesithea subgibbosa** (Winkl. ex Hack.) de Koning & Sosef
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Rottboellia parodiana (Henrard) Burkart = **Mnesithea parodiana** (Henrard) de Koning & Sosef
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Rottboellia salzmannii Trin. ex Steud. = **Schizachyrium salzmannii** (Trin. ex Steud.) Nash
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Rottboellia sanguinea Retz. = **Schizachyrium sanguineum** (Retz.) Alston
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Rottboellia selloana Hack. = **Mnesithea selloana** (Hack.) de Koning & Sosef
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Rytidosperma Steud.

Número de especies: 6 endémicas

Rytidosperma glabrum (Phil.) Nicora = **Rytidosperma lechleri** Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Rytidosperma lechleri Steud.
Sin.: *Danthonia glabra* Phil., *Notodanthonia lechleri* (Steud.) Veldkamp, *Rytidosperma glabrum* (Phil.) Nicora
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Baeza, C. M., 1996; Grun, S., 1993; Nicora, E. G., 1973a, 1978; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE); CHL(IV, V, VII, VIII, IX, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11201* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92303* (CONC)].

Rytidosperma pictum (Nees & Meyen) Nicora var. **bimucronata** Nicora
Sin.: *Notodanthonia picta* (Nees & Meyen) Veldkamp var. *bimucronata* (Nicora) Veldkamp
Referencias: Baeza, C. M., 1996; Nicora, E. G., 1973a, 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 313* (BAA)].

Rytidosperma pictum (Nees & Meyen) Nicora var. **pictum**
Sin.: *Danthonia picta* Nees & Meyen, *Notodanthonia picta* (Nees & Meyen) Veldkamp
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Baeza, C. M., 1996; Nicora, E. G., 1973a, 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–2600 m.
Países: ARG(COR, MEN, NEU, RNE); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10293* (BAA, SI)]; CHL[*Boelcke, O. 2360* (BAA)].

Rytidosperma quirihuense Baeza
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–400 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Baeza, C. M. 2112* (CONC, SGO)].

Rytidosperma sorianoi Nicora
Sin.: *Notodanthonia sorianoi* (Nicora) Veldkamp
Referencias: Baeza, C. M., 1996; Grun, S., 1993; Nicora, E. G., 1973a, 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 4490* (BAA)].

Rytidosperma violaceum (E. Desv.) Nicora
Sin.: *Danthonia violacea* E. Desv., *Notodanthonia violacea* (E. Desv.) Veldkamp
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., 1996; Grun, S., 1993; Nicora, E. G., 1973a, 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–2700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 13737* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20117* (CONC, SGO)].

Rytidosperma virescens (E. Desv.) Nicora var. **parvispicula** Nicora
Sin.: *Notodanthonia virescens* (E. Desv.) Veldkamp var. *parvispicula* (Nicora) Veldkamp
Referencias: Baeza, C. M., 1996; Nicora, E. G., 1973a, 1978; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1200 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12632* (BAA, SI)].

Rytidosperma virescens (E. Desv.) Nicora var. *patagonica* (Speg.) Nicora = **Rytidosperma virescens** (E. Desv.) Nicora var. **virescens**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Rytidosperma virescens (E. Desv.) Nicora var. **virescens**
Sin.: *Danthonia andina* Phil., *Danthonia picta* Nees & Meyen var. *patagonica* Speg., *Danthonia virescens* E. Desv., *Danthonia werdermanni* Pilg., *Notodanthonia virescens* (E. Desv.) Veldkamp, *Notodanthonia virescens* (E. Desv.) Veldkamp var. *patagonica* (Speg.) Veldkamp, *Rytidosperma virescens* (E. Desv.) Nicora var. *patagonica* (Speg.) Nicora
Referencias: Baeza, C. M., 1996; Grun, S., 1993; Nicora, E. G., 1973a, 1978; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3400 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11010* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Burkart, A. 27452* (CONC, SI), *Pedersen, T. M. 14372* (C, MO)].

Saccharum L., nom. cons.

Número de especies: 4

Saccharum angustifolium (Nees) Steud.
Sin.: *Erianthus angustifolius* Nees, *Erianthus biaristatus* (Hack.) Swallen, *Erianthus divaricatus* (L.) Hitchc. var. *angustifolius* (Nees) Hack., *Erianthus saccharoides* Michx. subsp. *angustifolius* (Nees) Hack.
Referencias: Molina, A. M., 1981; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(PHA); URY(DUR, MAL, MON, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Quarín, C. L. 159* (BAA)]; BRA[*Hatschbach, G. 21428* (MBM)]; PRY[*Ramírez 275* (BAA)]; URY[*Rosengurtt, B. 4711* (BAA, MVM)].

Saccharum asperum (Nees) Steud.
Sin.: *Erianthus asper* Nees, *Erianthus asper* Nees var. *brasilianus* (Trin.) Hack., *Erianthus asper* Nees var. *typicus* Hack., nom. inval., *Erianthus brasilianus* (Trin.) Anders, *Saccharum brasilianum* Trin.
Referencias: Molina, A. M., 1981; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(ERI, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(MIE); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 4909* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13704* (SI)]; PRY[*Rosengurtt, B. 5775* (MVM)]; URY[*Rosengurtt, B. 8423* (MVM)].

Saccharum balansae (Hack.) Roberty = **Saccharum villosum** Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Saccharum brasilianum Trin. = **Saccharum asperum** (Nees) Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Saccharum cayennense (P. Beauv.) Benth. = **Eriochrysis cayennensis** P. Beauv.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Saccharum contractum Kunth = **Imperata contracta** (Kunth) Hitchc.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Saccharum filiforme Hack. = **Eriochrysis filiformis** (Hack.) Filg.
Referencias: Filgueiras, T. S. & Lerina, R., 2001a.

Saccharum giganteum (Walter) C.E. Hubb.
Sin.: *Anthoxanthum giganteum* Walter, *Erianthus giganteus* (Walter) Muhl.
Referencias: Molina, A. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15490* (SI), *Zuloaga, F. O. 6532* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 4035* (BA)].

Saccharum holcoides (Nees) Hack. = **Eriochrysis holcoides** (Nees) Kuhlm.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Saccharum holcoides (Nees) Hack. var. *brevipilum* Hack. = **Eriochrysis holcoides** (Nees) Kuhlm.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Saccharum holcoides (Nees) Hack. var. *penicillare* Hack. = **Eriochrysis holcoides** (Nees) Kuhlm.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Saccharum pappiferum Lam. = **Pappophorum pappiferum** (Lam.) Kuntze

Saccharum repens Willd. = **Melinis repens** (Willd.) Zizka
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Saccharum sagittatum Aubl. = **Gynerium sagittatum** (Aubl.) P. Beauv.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Saccharum ternatum Spreng. = **Andropogon ternatus** (Spreng.) Nees
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Saccharum trinii (Hack.) Renvoize = **Saccharum villosum** Steud.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Saccharum villosum Steud.
Sin.: *Erianthus balansae* Hack., *Erianthus clandestinus* Swallen, nom. inval., *Erianthus glabrinodes* (Hack.) Swallen, *Erianthus purpureus* Swallen, *Erianthus saccharoides* Michx. var. *trinii* Hack., *Erianthus trinii* (Hack.) Hack., *Saccharum balansae* (Hack.) Roberty, *Saccharum trinii* (Hack.) Renvoize
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(CAU, GUA); URY(RIV, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 4986* (SI)]; BRA[*Swallen, J. R. 8467* (MO, US)]; PRY[*Balansa, B. 301* (BAA, BAB, SI), *Jörgensen, P. 4090* (BAB)]; URY[*Osten, C. 21857* (BA, BAA)].

Sacciolepis Nash

Número de especies: 1

Sacciolepis campestris (Nees) Parodi ex Burkart, comb. superfl. = **Sacciolepis vilvoides** (Trin.) Chase
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Sacciolepis campestris (Nees) Parodi ex Nicora = **Sacciolepis vilvoides** (Trin.) Chase
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Sacciolepis longissima Mez = **Panicum longissimum** (Mez) Henrard
Referencias: Zuloaga, F. O., 1994.

Sacciolepis vilvoides (Trin.) Chase
Sin.: *Hymenachne campestris* Nees, *Panicum vilvoides* Trin., *Sacciolepis campestris* (Nees) Parodi ex Burkart, comb. superfl., *Sacciolepis campestris* (Nees) Parodi ex Nicora
Referencias: Judziewicz, E. J., 1990; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, COA, PAI); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15464* (BAA, SI)]; BRA[*Carneiro, A. M. 259* (ICN), *Hatschbach, G. 23976* (MBM)]; PRY[*Balansa, B. 113* (BM)]; URY[*Rosengurtt, B. 7062* (MVFA)].

Savastana antarctica (Labill.) Speg. = **Anthoxanthum redolens** (Vahl) P. Royen
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Schedonnardus Steud.

Número de especies: 1

Schedonnardus paniculatus (Nutt.) Trel.
Sin.: *Lepturus paniculatus* Nutt., *Schedonnardus texanus* Steud.
Referencias: Cabrera, A. L., 1970a; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual o perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, LPA, SFE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 1054* (SI)].

Schedonnardus texanus Steud. = **Schedonnardus paniculatus** (Nutt.) Trel.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Schedonorus P. Beauv.

Número de especies: 2 introducidas

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.
Sin.: *Bromus arundinaceus* (Scherb.) Roth, *Festuca arundinacea* Schreb., *Festuca elatior* L., *Festuca elatior* L. subsp. *arundinacea* (Schreb.) Hack., *Festuca elatior* L. var. *arundinacea* (Schreb.) Wimm., *Lolium arundinaceum* (Schreb.) Darbysh.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Matthei, O. R., 1982; Nicora, E. G., 1978; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, ERI, LPA, NEU, RNE, TDF); BRA(RGS, SCA); CHL(VII, VIII, X, XII, IJF, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10598* (BAA)]; BRA[*Smith, L. B. 15533* (HBR, R, US)]; CHL[*Marticorena, C. 1778* (CONC)]; URY[*Izaguirre, P. 1335* (MVFA)].

Schedonorus pratensis (Huds.) P. Beauv.
Sin.: *Festuca elatior* L. subsp. *pratensis* (Huds.) Hack., *Festuca pratensis* Huds.
Referencias: Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1988; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, MEN, RNE, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barros, M. 1815* (BAA)].

Schedonorus unioloides (Kunth) Roem. & Schult. = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Schenodorus bonariensis (Lam.) Roem. & Schult. = **Poa bonariensis** (Lam.) Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Schenodorus lanatus (Kunth) Roem. & Schult. = **Bromus lanatus** Kunth

Schismus P. Beauv.

Número de especies: 2 introducidas

Schismus arabicus Nees
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 1704* (SI)]; CHL[*Jiles, C. 774* (CONC)].

Schismus barbatus (L.) Thell.
Sin.: *Festuca barbata* L.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1100 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE); CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19080* (SI)]; CHL[*Garaventa, A. 5663* (CONC)].

Schismus patens J. Presl = **Leptochloa dubia** (Kunth) Nees

Schizachyrium Nees

Número de especies: 11, 1 introducida

Schizachyrium biciliatum Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Schizachyrium sanguineum** (Retz.) Alston
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Schizachyrium bimucronatum Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Schizachyrium condensatum** (Kunth) Nees

Schizachyrium brevifolium (Sw.) Nees ex Büse
Sin.: *Andropogon brevifolius* Sw.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Sulekic, A. A., 1998; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 1500–2000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sulekic, A. A. 816* (SI)].

Schizachyrium condensatum (Kunth) Nees
Sin.: *Andropogon condensatus* Kunth, *Andropogon condensatus* Kunth f. *lacitiflorus* Hack., nom. nud., *Andropogon condensatus* Kunth subsp. *corymbosus* Hack., *Andropogon condensatus* Kunth var. *genuinus* Hack., nom. inval., *Andropogon condensatus* Kunth var. *paniculatus* (Kunth) Hack., *Andropogon lhotskyi* Steud., *Andropogon paniculatus* Kunth, hom. illeg., *Andropogon plumiger* Ekman, *Andropogon scoparius* J. Presl, hom. illeg., *Schizachyrium bimucronatum* Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Schizachyrium lactiflorum* (Hack.) Herter, *Schizachyrium mucronatum* Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Schizachyrium paniculatum* (Kunth) Herter, *Schizachyrium plumigerum* (Ekman) Parodi, *Sorghum condensatum* (Kunth) Kuntze var. *lactiflorum* (Hack.) Hack. ex Kuntze
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Türpe, A. M., 1984.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, GUA, PAI, PHA); URY(MAL, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1465* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 38062* (MBM)]; PRY[*Pedersen, T. M. 11173* (SI)]; URY[*Mujica Sallés, J. 407* (MVFA), *Osten, C. 5309* (SI)].

Schizachyrium gracilipes (Hack.) A. Camus
Sin.: *Andropogon gracilipes* Hack.
Referencias: Peichoto, M. C., 2006; Renvoize, S. A., 1988; Türpe, A. M., 1984; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(GUA); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 5329* (K, US)]; BRA[*Smith, L. B. 10967* (NY)]; PRY[*Balansa, B. 278* (K, P, US, W)]; URY[*Rosengurtt, B. 8535* (MVFA)].

Schizachyrium hatschbachii Peichoto
Referencias: Peichoto, M. C., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16140* (C, K, MBM)].

Schizachyrium hirtiflorum Nees = **Schizachyrium sanguineum** (Retz.) Alston
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Schizachyrium imberbe (Hack.) A. Camus = **Schizachyrium salzmannii** (Trin. ex Steud.) Nash
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Schizachyrium intermedium Nees = **Schizachyrium spicatum** (Spreng.) Herter
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Schizachyrium lactiflorum (Hack.) Herter = **Schizachyrium condensatum** (Kunth) Nees
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Schizachyrium microstachyum (Desv. ex Ham.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Sin.: *Andropogon condensatus* Kunth subsp. *elongatus* (Hack.) Hack., *Andropogon microstachyus* Desv. ex Ham., *Andropogon paniculatus* Lam. var. *elongatus* (Hack.) Hack., *Schizachyrium microstachyum* (Desv. ex Ham.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. subsp. *elongatum* (Hack.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, APA); URY(MAL, RIV, SAO, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 59* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13806* (SI)]; PRY[*López, M. G. 361* (CTES)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 1048* (SI)].

Schizachyrium microstachyum (Desv. ex Ham.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. subsp. *elongatum* (Hack.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Schizachyrium microstachyum** (Desv. ex Ham.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Schizachyrium mucronatum Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Schizachyrium condensatum** (Kunth) Nees
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Schizachyrium paniculatum (Kunth) Herter = **Schizachyrium condensatum** (Kunth) Nees
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Schizachyrium plumigerum (Ekman) Parodi
= **Schizachyrium condensatum** (Kunth) Nees
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Schizachyrium riedelii (Trin.) A. Camus
= **Schizachyrium sanguineum** (Retz.) Alston
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Schizachyrium salzmannii (Trin. ex Steud.) Nash
Sin.: *Andropogon imberbis* Hack. var. *genuinus* Hack., nom. inval., *Andropogon imberbis* Hack. var. *muticus* Hack., *Andropogon imberbis* Hack., hom. illeg., *Andropogon salzmannii* (Trin. ex Steud.) Hack., *Andropogon salzmannii* (Trin. ex Steud.) Hack. var. *aristatus* Hack., *Apogonia glabrata* E. Fourn., *Rottboellia salzmannii* Trin. ex Steud., *Schizachyrium imberbe* (Hack.) A. Camus
Referencias: Cantero, J. J., Núñez, C. O., Geymonat, M. & Chiacchiera, G., 1996; Mujica Sallés, J., 1996; Türpe, A. M., 1984.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, LRI, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(CAU); URY(CAS, LAV, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1614* (SI)]; BRA[*Swallen, J. R. 8185* (US)]; PRY[*Balansa, B. 292* (G), *Rojas, T. 14235* (SI)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 1298* (MVFA)].

Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston
Sin.: *Andropogon caespitosus* Phil., *Andropogon hirtiflorus* (Nees) Kunth, *Andropogon hirtiflorus* (Nees) Kunth var. *genuinus* Hack., nom. inval., *Andropogon luxurians* Ekman, *Andropogon riedelii* Trin., *Andropogon schotti* Rupr. ex Hack., *Andropogon semiberbis* (Nees) Kunth var. *incertus* Hack., *Rottboellia sanguinea* Retz., *Schizachyrium biciliatum* Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Schizachyrium hirtiflorum* Nees, *Schizachyrium riedelii* (Trin.) A. Camus, *Schizachyrium semiberbe* Nees
Referencias: Cantero, J. J., Núñez, C. O., Geymonat, M. & Chiacchiera, G., 1996; Mujica Sallés, J., 1996; Türpe, A. M., 1984; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS, TUC); BRA(SCA); CHL(V, VIII, RME); PRY(AMA, CAU, COA, GUA, PAI); URY(MAL, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5333* (SI)]; BRA[*Davidse, G. 11146* (MO)]; CHL[*Zöllner, O. 14504* (CONC)]; PRY[*Morrone, O. 556* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 6892* (MVFA)].

Schizachyrium scabriflorum (Rupr. ex Hack.) A. Camus
Sin.: *Andropogon scabriflorus* Rupr. ex Hack.
Referencias: Peichoto, M. C., 2002; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS); PRY(AMA, CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vanni, R. O. 4603* (CTES)]; BRA[*Valls, J. F. M. 14237* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 12032* (G)].

Schizachyrium scoparium (Michx.) Nash
Sin.: *Andropogon scoparius* Michx.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 700 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Junge, C. s.n.* (CONC)].

Schizachyrium semiberbe Nees = **Schizachyrium sanguineum** (Retz.) Alston
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Schizachyrium spicatum (Spreng.) Herter
Sin.: *Andropogon consanguineus* Kunth, *Andropogon consanguineus* Kunth var. *genuinus* Hack., nom. inval., *Andropogon consanguineus* Kunth var. *humilior* Hack., *Deyeuxia spicata* Spreng., *Schizachyrium intermedium* Nees, *Schizachyrium spicatum* (Spreng.) Herter var. *breviarticulatum* Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Sorghum condensatum* (Kunth) Kuntze var. *intermedium* (Nees) Kuntze, *Sorghum consanguineum* (Kunth) Kuntze
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); PRY(APY, AMA); URY(ART, DUR, MAL, MON, SAO, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1737* (SI)]; PRY[*Vanni, R. O. 1914* (CTES)]; URY[*Burkart, A. 15771* (SI), *Rosengurtt, B. 7974* (MVFA)].

Schizachyrium spicatum (Spreng.) Herter var. *breviarticulatum* Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
= **Schizachyrium spicatum** (Spreng.) Herter
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Schizachyrium tenerum Nees
Sin.: *Andropogon tener* (Nees) Kunth, *Andropogon tener* (Nees) Kunth var. *filiformis* (Nees) Hack.
Referencias: Burkart, A. & Toursarkissian, M., 1969; Renvoize, S. A., 1988; Türpe, A. M., 1984; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SDE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, GUA, PAI); URY(ART, LAV, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 8838* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 12464* (MBM)]; PRY[*Balansa, B. 2980* (BM)]; URY[*Pedersen, T. M. 13878* (SI)].

Sclerochloa P. Beauv.

Número de especies: 1 introducida

Sclerochloa dura (L.) P. Beauv.
Sin.: *Cynosurus durus* L.
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1980; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 835* (SI), *Schelotto 8* (SI)].

Scleropoa rigida (L.) Griseb. = **Catapodium rigidum** (L.) Dony
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Scleropogon Phil.

Número de especies: 1

Scleropogon brevifolius Phil.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Roig, F. A., 1997[1996].
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(CAT, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4679* (SI)].

Serrafalcus commutatus (Schrad.) Bab. = **Bromus commutatus** Schrad.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Serrafalcus patulus (Mert. & Koch) Parl. = **Bromus japonicus** Thunb. ex A. Murray
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Serrafalcus racemosus (L.) Parl. = **Bromus racemosus** L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Sesleria americana Nees ex Steud. = **Poa flabellata** (Lam.) Raspail
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Setaria P. Beauv.

Número de especies: 36, 7 endémicas, 9 introducidas

Setaria adhaerans (Forssk.) Chiov.
Sin.: *Panicum adhaerans* Forssk., *Panicum verticillatum* L. var. *parviflorum* Döll, *Setaria depauperata* Phil.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Pensiero, J. F., 1999; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.
Hierba. Anual. Introducida. 0–2600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); BRA(SCA); CHL(I, III); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bartlett, H. H. 20317* (LIL, SI, US)]; BRA[*Valls, J. F. M. 1164* (ICN)]; CHL[*Barros, M. 815* (BAA)]; URY[*Rosengurtt, B 11373* (MVFA)].

Setaria alonsoi Pensiero & Anton
Sin.: *Setaria onurus* (Willd. ex Trin.) Griseb. f. *grandiflora* Hack.
Referencias: Pensiero, J. F. & Anton, A. M., 1994; Pensiero, J. F., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(COR, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 24982* (CORD)].

Setaria anceps Stapf var. *sericea* Stapf = **Setaria sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E. Hubb. var. **sericea** (Stapf) Clayton
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria argentina R.A.W. Herrm. = **Setaria lachnea** (Nees) Kunth
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria barretoi Boldrini = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **pilosissima** (Hack.) Pensiero
Referencias: Pensiero, J. F., 1999

Setaria berroi Hack. = **Setaria globulifera** (Steud.) Griseb.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria brachytricha (Steud. ex Lechl.) Mez, nom. illeg. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **brachytricha** Pensiero
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria caespitosa Hack. & Arechav. = **Setaria vaginata** Spreng. var. **vaginata**
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria caudata (Lam.) Roem. & Schult. = **Setaria setosa** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria caudata (Lam.) Roem. & Schult. f. *ramosa* Hack. = **Setaria pampeana** Parodi ex Nicora
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria commutata Hack. = **Setaria leucopila** (Scribn. & Merr.) K. Schum.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria cordobensis R.A.W. Herrm.
Sin.: *Panicum platycaule* Hack. & Stuck., nom. nud., *Setaria platycaulis* Hack.

Referencias: Pensiero, J. F., 1988, 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27536* (SI)].

Setaria depauperata Phil. = **Setaria adhaerans** (Forssk.) Chiov.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria discolor Hack. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria dura R.A.W. Herrm. = **Setaria globulifera** (Steud.) Griseb.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999; Renvoize, S. A., 1988.

Setaria fiebrigii R.A.W. Herrm.
Sin.: *Setaria onurus* (Willd.) Griseb. f. *ramulosa* Hack.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CAA, CEN, CON, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA); URY(ART, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, PAY, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2889* (SI), *Zuloaga, F. O. 7134* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 3598* (NY, US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4581a* (BAA)]; URY[*Rosengurtt, B. 5905* (BAA, US)].

Setaria flava (Nees) Kunth = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria geniculata P. Beauv. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria geniculata P. Beauv. var. *pauciseta* Desv. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria glauca (L.) P. Beauv.
Sin.: *Panicum glaucum* L., *Panicum pumilum* Poir., *Setaria lutescens* (Weigel) F.T. Hubb., *Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult.
Referencias: Nicora, E. G., 1968a, 1978; Pensiero, J. F., 1999; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Anual. Introducida. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, LPA, MEN, RNE, SFE, SJU, SLU); CHL(I, III, V, VII, VIII, RME); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 26* (SI)]; CHL[*Barros, E. 8236* (BAA), *Zöllner, O. 13252* (CONC)]; PRY[*Vanni, R. O. 2256* (CTES)].

Setaria glauca (L.) P. Beauv. var. *imberbis* (Poir.) Griseb. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria glauca (L.) P. Beauv. var. *penicillata* (Willd.) Griseb. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria globulifera (Steud.) Griseb.
Sin.: *Panicum globuliferum* Steud., *Setaria berroi* Hack., *Setaria dura* R.A.W. Herrm., *Setaria paucifolia* (Morong) Lindm. var. *planifolia* Hack.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999; Renvoize, S. A., 1988; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CAA, CEN, ITA, ÑEE, SPE); URY(CLA, DUR, RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bertoni, M. S. 2313* (LIL, US)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 7355* (NY, US)]; PRY[*Rojas, T. 9303* (BAA, US)]; URY[*Osten, C. 19539* (US)].

Setaria gracilis Kunth = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria gracilis Kunth f. *breviglumis* Hack. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria gracilis Kunth f. *breviseta* Hack. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria gracilis Kunth f. *brevispica* Hack. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria gracilis Kunth f. *flaviseta* Hack. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria gracilis Kunth f. *longiseta* Hack. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria gracilis Kunth f. *megalantha* Stuck. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria gracilis Kunth f. *purpurascens* (Kunth) Hack. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria gracilis Kunth f. *radicans* Hack. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria gracilis Kunth var. *glauco-caesia* Arechav. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria gracilis Kunth var. *pilosissima* Hack. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **pilosissima** (Hack.) Pensiero
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria gracilis Kunth var. *purpurascens* (Kunth) Arechav. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

[Setaria grisebachii E. Fourn.]
Sin.: *Chaetochloa grisebachii* (E. Fourn.) Scribn.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Setaria hassleri R.A.W. Herrm., hom. illeg. = **Setaria hassleri** Hack.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria hassleri Hack.
Sin.: *Setaria hassleri* R.A.W. Herrm., hom. illeg.
Referencias: Nicora, E. G., 1968a; Pensiero, J. F., 1999; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, COS, FOR, MIS, SAL, SDE, TUC); BRA(RGS); PRY(AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwindt, E. 4074* (CORD, CTES, LIL)]; BRA[*Isabelle, A. s.n.* (NY)]; PRY[*Hassler, E. 3565* (G, K), *Morrone, O. 124* (SF, SI)].

Setaria hassleri Hack. var. *aequalis* Hack. = **Setaria pampeana** Parodi ex Nicora
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria hunzikeri Anton
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Pensiero, J. F., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2400 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY, CEN, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 12388* (CORD)]; PRY[*Burkart, A. 18330* (SI)].

Setaria imberbis (Poir.) Roem. & Schult. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**

Setaria imberbis (Poir.) Roem. & Schult. f. *brevispica* Hack. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria imberbis (Poir.) Roem. & Schult. f. *flaviseta* Hack. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria imberbis (Poir.) Roem. & Schult. f. *longiseta* Hack. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria imberbis (Poir.) Roem. & Schult. f. *radicans* Hack. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria imberbis (Poir.) Roem. & Schult. f. *setis-longioribus* Hack. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria imberbis (Poir.) Roem. & Schult. f. *uberior* Hack., nom. nud. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria imberbis (Poir.) Roem. & Schult. var. *genuina* Hack., nom. inval. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria imberbis (Poir.) Roem. & Schult. var. *gracilis* (Kunth) Hack. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria imberbis (Poir.) Roem. & Schult. var. *purpurascens* (Kunth) Hack. = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria inopinata Toolin = **Setaria macrostachya** Kunth
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria italica (L.) P. Beauv.
Sin.: *Panicum italicum* L.
Referencias: Nicora, E. G., 1968a; Pensiero, J. F., 1999; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, DFE, FOR, LPA, MEN, MIS, SFE, SLU); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 15141* (BAA)]; BRA[*Palacios 394* (LIL)].
Notas: Especie Europea, suele encontrarse escapada de cultivo.

Setaria italica (L.) P. Beauv. subsp. *viridis* (L.) Thell. = **Setaria viridis** (L.) P. Beauv.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria kuntzeana R.A.W. Herrm. = **Setaria mendocina** Phil.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria lachnea (Nees) Kunth
Sin.: *Chaetochloa argentina* (R.A.W. Herrm.) Hitchc., *Panicum lachneum* Nees, *Setaria argentina* R.A.W. Herrm., *Setaria leiantha* Hack., *Setaria setosa* (Sw.) P. Beauv. f. *leianthina* Hack., *Setaria setosa* (Sw.) P. Beauv. f. *microstachya* Hack.
Referencias: Chase, A., 1941; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Pensiero, J. F., 1993, 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, SCA); PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI); URY(COL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6758* (SI)]; BRA[*Swallen, J. R. 8552* (US)]; PRY[*Jörgensen, P. 3552b* (BA, BAA, LIL, LP, SI, US)]; URY[*Del Puerto, O. 5730* (BAA, US)].

Setaria lancifolia R.A.W. Herrm. = **Setaria vulpiseta** (Lam.) Roem. & Schult. var. **vulpiseta**
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria leiantha Hack. = **Setaria lachnea** (Nees) Kunth
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria leiantha Hack. f. *subhirsuta* Hack. = **Setaria verticillata** (L.) P. Beauv.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria leiocarpa R.A.W. Herrm. = **Setaria oblongata** (Griseb.) Parodi
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria leucopila (Scribn. & Merr.) K. Schum.
Sin.: *Chaetochloa leucopila* Scribn. & Merr., *Setaria commutata* Hack.
Referencias: Nicora, E. G., 1968b, 1970e, 1978; Pensiero, J. F., 1999; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15807* (SI)].

Setaria liebmanii E. Fourn. f. *trichorhachis* Hack. = **Setaria vulpiseta** (Lam.) Roem. & Schult. var. **vulpiseta**
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria lutescens (Weigel) F.T. Hubb. = **Setaria glauca** (L.) P. Beauv.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria macrostachya Kunth
Sin.: *Chaetochloa macrostachya* (Kunth) Scribn. & Merr., *Setaria inopinata* Toolin
Referencias: Pensiero, J. F., 1988, 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1900 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY, CEN, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1859* (SI), *Parodi, L. R. 14573* (BAA, US)]; PRY[*Mereles, F. 2633* (SI)].

Setaria magna Griseb.
Referencias: Nicora, E. G., 1968a; Pensiero, J. F., 1999.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1200 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2890* (LIL, MO, SI, US)]; BRA[*Irgang, B. E. s.n.* (ICN, MO)].

Setaria megaphylla (Steud.) T. Durand & Schinz
Sin.: *Panicum megaphyllum* Steud., *Panicum sulcatum* auct. non Raddi
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 23972* (MBM)].

Setaria mendocina Phil.
Sin.: *Setaria kuntzeana* R.A.W. Herrm., *Setaria villiglumis* Hicken
Referencias: Nicora, E. G., 1970e; Pensiero, J. F., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 9731* (BAA, US)].

Setaria nicorae Pensiero
Referencias: Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pensiero, J. F., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, SAL, SDE, SFE); PRY(APY, CEN, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Millán, A. R. 413* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2359* (BAA, LIL, SI, US)].

Setaria oblongata (Griseb.) Parodi
Sin.: *Chaetochloa oblongata* (Griseb.) Hitchc., *Panicum lilloi* Hack., *Panicum oblongatum* Griseb., *Setaria leiocarpa* R.A.W. Herrm., *Setaria setosa* (Sw.) P. Beauv. f. *interrupta* Stuck.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999; Türpe, A. M., 1973.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19064* (CTES, LP)].

Setaria onurus (Willd. ex Trin.) Griseb. = **Setaria vaginata** Spreng. var. **vaginata**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria onurus (Willd. ex Trin.) Griseb. f. *grandiflora* Hack. = **Setaria alonsoi** Pensiero & Anton
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria onurus (Willd.) Griseb. f. *ramulosa* Hack. = **Setaria fiebrigii** R.A.W. Herrm.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria pampeana Parodi ex Nicora
Sin.: *Setaria caudata* (Lam.) Roem. & Schult. f. *ramosa* Hack., *Setaria hassleri* Hack. var. *aequalis* Hack.
Referencias: Cantero, J. J. & Bianco, C. A., 1986; Nicora, E. G., 1968b; Pensiero, J. F., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 230* (SI), *Giussani, L. M. 325* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 918* (BAA, US)].

Setaria paraguayensis Pensiero
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Pedersen, T. M. 4142* (BAA, CTES)].

Setaria parodii Nicora
Referencias: Nicora, E. G., 1968b; Pensiero, J. F., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SFE); BRA(RGS); URY(CLA, FLO, FLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 5058* (BAA, SI)]; BRA[*Pedersen, T. M. 11515* (CTES, MO, NY)]; URY[*Gallinal 1301* (SI, US)].

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen var. **brachytricha** Pensiero
Sin.: *Panicum brachytrichum* Steud. ex Lechl., nom. nud., *Setaria brachytricha* (Steud. ex Lechl.) Mez, nom. illeg.
Referencias: Pensiero, J. F., 1993, 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU); CHL(VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Villamil, C. B. 2885* (SF)]; CHL[*Gunckel, L. H. 7347* (CONC, LIL)].

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Sin.: *Cenchrus parviflorus* Poir., *Panicum dasyurum* Willd. ex Nees, *Panicum flavum* Nees, *Panicum geniculatum* Poir., *Panicum imberbe* Poir. var. *dasyurum* (Willd. ex Nees) Döll, *Panicum penicillatum* Willd. ex Nees, hom. illeg., *Setaria discolor* Hack., *Setaria flava* (Nees) Kunth, *Setaria geniculata* P. Beauv., *Setaria geniculata* P. Beauv. var. *pauciseta* Desv., *Setaria glauca* (L.) P. Beauv. var. *imberbis* (Poir.) Griseb., *Setaria glauca* (L.) P. Beauv. var. *penicillata* (Willd.) Griseb., *Setaria gracilis* Kunth, *Setaria gracilis* Kunth f. *breviglumis* Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *breviseta* Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *brevispica* Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *flaviseta* Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *longiseta* Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *megalantha* Stuck., *Setaria gracilis* Kunth f. *purpurascens* (Kunth) Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *radicans* Hack., *Setaria gracilis* Kunth var. *glauco-caesia* Arechav., *Setaria gracilis* Kunth var. *purpurascens* (Kunth) Arechav., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *brevispica* Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *flaviseta* Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *longiseta* Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *radicans* Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *setis-longioribus* Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *uberior* Hack., nom nud., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. var. *genuina* Hack., nom. inval., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. var. *gracilis* (Kunth) Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. var. *purpurascens* (Kunth) Hack., *Setaria penicillata* (Willd.) J. Presl. *Setaria purpurascens* Kunth
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Mujica Sallés, J., 1996; Pensiero, J. F., 1993, 1999; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IDR, IJF); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA); URY(ART, COL, FLA, MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1045* (SI), *Pozner, R. 263* (CTES, SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 11339* (NY, US)]; CHL[*Barros, E. 9923* (BAA)]; PRY[*Rojas, T. 13860* (LIL)]; URY[*Castellanos, A. 18415* (LIL)].

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen var. **pilosissima** (Hack.) Pensiero
Sin.: *Setaria barretoi* Boldrini, *Setaria gracilis* Kunth var. *pilosissima* Hack.
Referencias: Pensiero, J. F., 1993, 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, RGS); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Swallen, J. R. 7742* (US)]; PRY[*Hassler, E. 10353* (G, US, W)].

Setaria paucifolia (Morong) Lindm.
Sin.: *Chamaeraphis paucifolia* Morong
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Pensiero, J. F., 1988, 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 11577* (LIL, US), *Zuloaga, F. O. 4916* (SI)]; BRA[*Jürgens, C. 260* (CORD, US)]; PRY[*Pedersen, T. M. 9430* (SI)].

Setaria paucifolia (Morong) Lindm. var. *planifolia* Hack. = **Setaria globulifera** (Steud.) Griseb.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria penicillata (Willd.) J. Presl = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria pflanzii Pensiero
Referencias: Pensiero, J. F., 1995, 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–400 m.
Países: ARG(SAL); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Saravia Toledo, C. 1297* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2362* (US)].

Setaria platycaulis Hack. = **Setaria cordobensis** R.A.W. Herrm.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria poiretiana (Schult.) Kunth = **Setaria sulcata** Raddi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria pratensis Phil. = **Setaria verticillata** (L.) P. Beauv.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. = **Setaria glauca** (L.) P. Beauv.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria purpurascens Kunth = **Setaria parviflora** (Poir.) Kerguélen var. **parviflora**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria rariflora J.C. Mikan ex Trin. = **Setaria setosa** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Setaria reversipila R.A.W. Herrm. = **Setaria vulpiseta** (Lam.) Roem. & Schult. var. **reversipila** (R.A.W. Herrm.) Pensiero
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria rosengurtii Nicora var. **rosengurtii**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G., 1970e; Pensiero, J. F., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS); URY(MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28724* (LP, SI)]; BRA[*sin colector s.n.* (BAB, BLA)]; URY[*Parodi, L. R. 3231* (BAA)].

Setaria rosengurtii Nicora var. **uruguayensis** Pensiero
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(ART, MON, RIV).
Ejemplares de referencia: URY[*Felippone, F. 4920* (LIL, SI, US)].

Setaria scabrifolia (Nees) Kunth
Sin.: *Panicum scabrifolium* Nees
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Pensiero, J. F., 1988, 1999; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Araujo, D. 60* (SI)]; PRY[*Solomon, J. C. 6936* (PY)].

Setaria scandens Schrad. ex Schult.
Sin.: *Chaetochloa scandens* (Schrad. ex Schult.) Scribn., *Setaria scandens* Schrad. ex Schult. var. *sphacelata* Hack.
Referencias: Nicora, E. G., 1968a; Pensiero, J. F., 1999; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, JUJ, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5113* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 16699* (BAA, SI, US)]; PRY[*Schwarz, G. J. 12000* (BAF, LIL)].

Setaria scandens Schrad. ex Schult. var. *sphacelata* Hack. = **Setaria scandens** Schrad. ex Schult.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria setosa (Sw.) P. Beauv.
Sin.: *Panicum setosum* Sw., *Setaria caudata* (Lam.) Roem. & Schult., *Setaria rariflora* J.C. Mikan ex Trin., *Setaria setosa* (Sw.) P. Beauv. f. *typica* Stuchlik, nom. inval., *Setaria setosa* (Sw.) P. Beauv. var. *aestiva* Hack. ex Bertoni, nom. nud.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 33565* (MBM)]; PRY[*Rojas, T. 13871* (BAA, LIL)].

Setaria setosa (Sw.) P. Beauv. f. *interrupta* Stuck. = **Setaria oblongata** (Griseb.) Parodi
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria setosa (Sw.) P. Beauv. f. *leianthina* Hack. = **Setaria lachnea** (Nees) Kunth
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria setosa (Sw.) P. Beauv. f. *microstachya* Hack. = **Setaria lachnea** (Nees) Kunth
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria setosa (Sw.) P. Beauv. f. *typica* Stuchlik, nom. inval. = **Setaria setosa** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria setosa (Sw.) P. Beauv. var. *aestiva* Hack. ex Bertoni, nom. nud. = **Setaria setosa** (Sw.) P. Beauv.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E. Hubb. var. **sericea** (Stapf) Clayton
Sin.: *Setaria anceps* Stapf var. *sericea* Stapf
Referencias: Pensiero, J. F., 1999; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA, CAN, ITA); URY(FLA, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7222* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 18158* (US)]; PRY[*Morrone, O. 565* (SF, SI)]; URY[*Gallinal 5494* (US)].

Setaria sphaerocarpa (Salzm.) C.E. Hubb. = **Setaria tenax** (A. Rich.) Desv.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria stolonifera Boldrini
Referencias: Pensiero, J. F., 1993, 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SFE); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pensiero, J. F. 2264* (SF)]; BRA[*Araújo, A. A. s.n.* (BLA)].

Setaria sulcata Raddi
Sin.: *Agrostis flabellata* Salzm. ex Steud., nom. nud., *Chaetochloa poiretiana* (Schult.) Hitchc., *Panicum poiretianum* Schult., *Setaria poiretiana* (Schult.) Kunth
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Nicora, E. G., 1970e; Pensiero, J. F., 1999; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4548* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 11606* (SI, US)]; PRY[*Morrone, O. 281* (SF, SI)].

Setaria tenax (A. Rich.) Desv.
Sin.: *Panicum tenax* A. Rich., *Setaria sphaerocarpa* (Salzm.) C.E. Hubb.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CEN, CON, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 5364* (US)]; PRY[*Palacios, R. A. 1910* (MO)].

Setaria vaginata Spreng. var. **bonariensis** Nicora
Referencias: Nicora, E. G., 1970e; Pensiero, J. F., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(RGS); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 9384* (BAA, SI)]; BRA[*Santos 3176* (R)]; URY[*Castellanos, A. 17291* (LIL)].

Setaria vaginata Spreng. var. **tandilensis** Nicora
Referencias: Nicora, E. G., 1970e; Pensiero, J. F., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 14459* (BAA, US)].

Setaria vaginata Spreng. var. **vaginata**
Sin.: *Panicum onurus* Willd. ex Trin., *Setaria caespitosa* Hack. & Arechav., *Setaria onurus* (Willd. ex Trin.) Griseb.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G., 1978; Pensiero, J. F., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, PAI); URY(ART, CAS, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14402* (SI), *Zuloaga, F. O. 7131* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 15647* (NY, SI, US)]; PRY[*Zardini, E. M. 15380* (MO)]; URY[*Herter, W. G. F. 82684* (BAB, MO, NY, SI)].

Setaria verticillata (L.) P. Beauv.
Sin.: *Panicum verticillatum* L., *Setaria leiantha* Hack. f. *subhirsuta* Hack., *Setaria pratensis* Phil.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Pensiero, J. F., 1999.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, FOR, LRI, MEN, NEU, RNE, SDE, SJU, SLU); BRA(PAR); CHL(V, VIII, RME); URY(MON, PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 188* (CORD, LIL)]; BRA[*Araujo, D. 116* (BAA)]; CHL[*Gunckel, L. H. 25600* (CONC)]; URY[*Lombardo, A. 1938* (BAA)].

Setaria verticilliformis Dumort.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, LPA, MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 1234* (BAA, SI)].

Setaria villiglumis Hicken = **Setaria mendocina** Phil.
Referencias: Pensiero, J. F., 1999.

Setaria viridis (L.) P. Beauv.
Sin.: *Panicum viride* L., *Setaria italica* (L.) P. Beauv. subsp. *viridis* (L.) Thell.
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Pensiero, J. F., 1999; Troncoso, N. S., 1969.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SFE, SJU); BRA(RGS); CHL(III, V, VIII, IJF, RME); URY(SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 3435* (SI)]; BRA[*Barreto, I. L. s.n.* (BAB, BLA)]; CHL[*Gunckel, L. H. 19194* (CONC)]; URY[*Lombardo, A. 1138* (BAA)].
Notas: Originaria de Europa, introducida en Sudamérica.

Setaria vulpiseta (Lam.) Roem. & Schult. var. **reversipila** (R.A.W. Herrm.) Pensiero
Sin.: *Setaria reversipila* R.A.W. Herrm.
Referencias: Pensiero, J. F., 1993, 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, A. 3531* (CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 8814* (US)]; PRY[*Schinini, A. 28234* (CTES), *Zuloaga, F. O. 7263* (SI)].

Setaria vulpiseta (Lam.) Roem. & Schult. var. **vulpiseta**
Sin.: *Chaetochloa vulpiseta* (Lam.) Hitchc. & Chase, *Chamaeraphis composita* (Kunth) Kuntze, *Panicum vulpisetum* Lam., *Setaria lancifolia* R.A.W. Herrm., *Setaria liebmanii* E. Fourn. f. *trichorhachis* Hack.
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Nicora, E. G., 1968a, 1978; Pensiero, J. F., 1988, 1999; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1086* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 11682* (R, US)]; PRY[*Morrone, O. 290* (SF, SI)].

Sieglingia antarctica (Hook. f.) Macloskie ex A.J. Scott = **Poa darwiniana** Parodi

Sieglingia argentina Kuntze = **Erioneuron pilosum** (Buckley) Nash var. **longearistatum** (Kurtz) Anton

Sieglingia aristulata (Döll) Kuntze = **Aulonemia aristulata** (Döll) McClure
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Sieglingia latifolia (Griseb.) Kuntze = **Gouinia latifolia** (Griseb.) Vasey

Sieglingia paraguayensis Kuntze = **Gouinia paraguayensis** (Kuntze) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Sieglingia spicata (Nees) Kuntze ex Stuck. = **Tripogon spicatus** (Nees) Ekman
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Sorghastrum Nash
Número de especies: 7

Sorghastrum agrostoides (Speg.) Hitchc. = **Sorghastrum setosum** (Griseb.) Hitchc.
Referencias: Dávila, P., 1988.

Sorghastrum albescens (Hack.) A.I.P. Flores = **Sorghastrum pellitum** (Hack.) Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Sorghastrum balansae (Hack.) Dávila
Sin.: *Andropogon balansae* (Hack.) Hack., *Sorghum balansae* Hack.
Referencias: Dávila, P., 1988, 1989.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CEN, MIE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Pedersen, T. M. 3287* (US)].

Sorghastrum flexuosum Swallen = **Sorghastrum pellitum** (Hack.) Parodi
Referencias: Dávila, P., 1988; Flores, A. I. P. & Valls, J. F. M., 1993[1992].

Sorghastrum francavillanum (E. Fourn.) Hitchc. = **Sorghastrum setosum** (Griseb.) Hitchc.
Referencias: Dávila, P., 1988.

Sorghastrum minarum (Nees) Hitchc.
Sin.: *Andropogon minarum* (Nees) Kunth, *Chrysopogon minarum* (Nees) Benth., *Chrysopogon stipoides* Trin., nom. superfl., *Sorghum minarum* (Nees) Hack., *Trachypogon minarum* Nees
Referencias: Dávila, P., 1988; Flores, A. I. P. & Valls, J. F. M., 1993[1992]; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6812* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 4024* (US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 779* (F, SI, US)].

[Sorghastrum nutans (L.) Nash]
Sin.: *Andropogon nutans* L., *Andropogon nutans* L. var. *avenaceus* (Michx.) Hack., *Holcus nutans* (L.) Kuntze ex Stuck., *Holcus nutans* (L.) Kuntze ex Stuck. var. *avenaceus* Stuck., *Sorghum nutans* (L.) A. Gray var. *genuinum* Hack., nom. illeg.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Sorghastrum nutans (L.) Nash subsp. *albescens* (Hack.) Burkart = **Sorghastrum pellitum** (Hack.) Parodi
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Sorghastrum nutans (L.) Nash subsp. *pellitum* (Hack.) Burkart = **Sorghastrum pellitum** (Hack.) Parodi
Referencias: Dávila, P., 1988; Flores, A. I. P. & Valls, J. F. M., 1993[1992]; Mujica Sallés, J., 1996.

Sorghastrum parviflorum (Desv.) Hitchc. & Chase = **Sorghastrum setosum** (Griseb.) Hitchc.
Referencias: Dávila, P., 1988; Flores, A. I. P. & Valls, J. F. M., 1993[1992].

Sorghastrum pellitum (Hack.) Parodi
Sin.: *Andropogon nutans* L. var. *albescens* (Hack.) Hack., *Andropogon nutans* L. var. *pellitus* (Hack.) Hack., *Andropogon pellitus* (Hack.) Herter, *Andropogon saccharoides* Sw. var. *polytrichus* Griseb., *Sorghastrum albescens* (Hack.) A.I.P. Flores, *Sorghastrum flexuosum* Swallen, *Sorghastrum nutans* (L.) Nash subsp. *albescens* (Hack.) Burkart, *Sorghastrum nutans* (L.) Nash subsp. *pellitum* (Hack.) Burkart, *Sorghastrum pilgeri* Herter, *Sorghum nutans* (L.) A. Gray subsp. *albescens* Hack., *Sorghum nutans* (L.) A. Gray subsp. *pellitum* Hack.
Referencias: Dávila, P., 1988; Flores, A. I. P. & Valls, J. F. M., 1993[1992]; Mujica Sallés, J., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 1600–1700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA); URY(ART, FLA, MAL, ROC, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28698* (SI), *Zuloaga, F. O. 516* (SI)]; BRA[*Rosengurtt, B. 9051* (US)]; PRY[*Pavetti, C. V. M. 10651* (US)]; URY[*Herter, W. G. F. 984* (MO)].

Sorghastrum pilgeri Herter = **Sorghastrum pellitum** (Hack.) Parodi
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Sorghastrum scaberrimum (Nees) Herter
Sin.: *Andropogon nutans* L. var. *scaberrimus* (Nees) Hack., *Andropogon scaberrimus* (Nees) Kunth, *Sorghum nutans* (L.) A. Gray subsp. *scaberrimum* (Nees) Hack., *Trachypogon scaberrimum* Nees
Referencias: Dávila, P., 1988; Flores, A. I. P. & Valls, J. F. M., 1993[1992].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10794* (NY, US)].

Sorghastrum setosum (Griseb.) Hitchc.
Sin.: *Andropogon agrostoides* Speg., *Andropogon francavillanus* E. Fourn., *Andropogon nutans* L. var. *agrostoides* (Speg.) Hack., *Andropogon nutans* L. var. *submuticus* (Hack.) Hack., *Andropogon setosus* Griseb., *Sorghastrum agrostoides* (Speg.) Hitchc., *Sorghastrum francavillanum* (E. Fourn.) Hitchc., *Sorghastrum parviflorum* (Desv.) Hitchc. & Chase, *Sorghastrum stipoides* (Kunth) Nash subsp. *agrostoides* (Speg.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Sorghum nutans* (L.) A. Gray var. *submuticum* Hack., *Sorghum parviflorum* Desv. ex Ham., nom. illeg.
Referencias: Dávila, P., 1988; Flores, A. I. P. & Valls, J. F. M., 1993[1992]; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CEN, CON, GUA); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 208* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 12233* (US)]; PRY[*Rosengurtt, B. 5490* (US)]; URY[*Rosengurtt, B. 7117* (MVFA)].

Sorghastrum stipoides (Kunth) Nash
Sin.: *Andropogon humboldtianum* Steud., nom. superfl., *Andropogon nutans* L. var. *burchellii* Hack., *Andropogon nutans* L. var. *stipoides* (Kunth) Hack., *Andropogon rufidulus* Steud., *Andropogon stipoides* Kunth, *Sorghum nutans* (L.) A. Gray var. *stipoides* Hack.
Referencias: Dávila, P., 1988; Flores, A. I. P. & Valls, J. F. M., 1993[1992]; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU); URY(DUR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bertoni 2728* (US)]; BRA[*Hatschbach, G. 15242* (F, MO)]; PRY[*Zardini, E. M. 25569* (AS, MO)]; URY[*Millot 1267* (US)].

Sorghastrum stipoides (Kunth) Nash subsp. *agrostoides* (Speg.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Sorghastrum setosum** (Griseb.) Hitchc.
Referencias: Dávila, P., 1988.

Sorghastrum viride Swallen
Referencias: Dávila, P., 1988; Flores, A. I. P. & Valls, J. F. M., 1993[1992].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, COA, GUA, MIE, SPE); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 7010* (BAB)]; BRA[*Swallen, J. R. 8617* (US)]; PRY[*Hassler, E. 11075* (US)]; URY[*Rosengurtt, B. 8433* (US)].

Sorghum Moench

Número de especies: 1 introducida

Sorghum balansae Hack. = **Sorghastrum balansae** (Hack.) Dávila
Referencias: Dávila, P., 1988.

Sorghum condensatum (Kunth) Kuntze var. *intermedium* (Nees) Kuntze = **Schizachyrium spicatum** (Spreng.) Herter
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Sorghum condensatum (Kunth) Kuntze var. *lactiflorum* (Hack.) Hack. ex Kuntze = **Schizachyrium condensatum** (Kunth) Nees
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Sorghum consanguineum (Kunth) Kuntze = **Schizachyrium spicatum** (Spreng.) Herter
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Sorghum halepense (L.) Pers.
Sin.: *Andropogon halepensis* (L.) Brot., *Andropogon sorghum* (L.) Brot. var. *halepensis* (L.) Hack., *Holcus halepensis* L., *Sorghum halepense* (L.) Pers. f. *muticum* (Hack.) C.E. Hubb., *Sorghum halepense* (L.) Pers. var. *genuinum* Hack., nom. inval., *Sorghum halepense* (L.) Pers. var. *muticum* (Hack.) Hayek, *Sorghum halepense* (L.) Pers. var. *muticum* (Hack.) Parodi, comb. superfl.
Referencias: Parodi, L. R., 1946a; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–2100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SFE, TUC); BRA(RGS); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII, IDE, RME); PRY(CEN); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1805* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 1600* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 51012* (CONC)]; PRY[*Zardini, E. M. 33394* (AS, MO)]; URY[*Felippone, F. 621* (SI)].

Sorghum halepense (L.) Pers. f. *muticum* (Hack.) C.E. Hubb. = **Sorghum halepense** (L.) Pers.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Sorghum halepense (L.) Pers. var. *genuinum* Hack., nom. inval. = **Sorghum halepense** (L.) Pers.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Sorghum halepense (L.) Pers. var. *muticum* (Hack.) Hayek = **Sorghum halepense** (L.) Pers.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Sorghum halepense (L.) Pers. var. *muticum* (Hack.) Parodi, comb. superfl. = **Sorghum halepense** (L.) Pers.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Sorghum leptocladum (Hack.) Kuntze = **Agenium leptocladum** (Hack.) Clayton
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Sorghum minarum (Nees) Hack. = **Sorghastrum minarum** (Nees) Hitchc.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Sorghum nutans (L.) A. Gray var. *genuinum* Hack., nom. illeg. = **Sorghastrum nutans** (L.) Nash
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Sorghum nutans (L.) A. Gray var. *stipoides* Hack. = **Sorghastrum stipoides** (Kunth) Nash
Referencias: Dávila, P., 1988.

Sorghum nutans (L.) A. Gray var. *submuticum* Hack. = **Sorghastrum setosum** (Griseb.) Hitchc.
Referencias: Dávila, P., 1988.

Sorghum nutans (L.) A. Gray subsp. *albescens* Hack. = **Sorghastrum pellitum** (Hack.) Parodi
Referencias: Dávila, P., 1988; Mujica Sallés, J., 1996.

Sorghum nutans (L.) A. Gray subsp. *pellitum* Hack. = **Sorghastrum pellitum** (Hack.) Parodi
Referencias: Dávila, P., 1988; Mujica Sallés, J., 1996.

Sorghum nutans (L.) A. Gray subsp. *scaberrimum* (Nees) Hack. = **Sorghastrum scaberrimum** (Nees) Herter
Referencias: Dávila, P., 1988; Flores, A. I. P. & Valls, J. F. M., 1993[1992].

Sorghum parviflorum Desv. ex Ham., nom. illeg. = **Sorghastrum setosum** (Griseb.) Hitchc.
Referencias: Dávila, P., 1988; Flores, A. I. P. & Valls, J. F. M., 1993[1992].

Sorghum saccharoides (Sw.) Kuntze = **Bothriochloa saccharoides** (Sw.) Rydb.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Vega, A. S., 2000.

Sorghum saccharoides (Sw.) Kuntze subsp. *laguroides* (DC.) Kuntze = **Bothriochloa laguroides** (DC.) Herter subsp. **laguroides**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Spartina Schreb.

Número de especies: 5

Spartina alterniflora Loisel.
Sin.: *Spartina brasiliensis* Raddi, *Spartina maritima* (Curtis) Fernald var. *brasiliensis* (Raddi) St.-Yves
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 2001b; Nicora, E. G., 1978; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Santos, M. & Almeida, S. L., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, RNE); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15804* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 20865* (MBM)]; URY[*Herter, W. G. F. 330* (SI)].

Spartina argentinensis Parodi = **Spartina spartinae** (Trin.) Merr. ex Hitchc.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Spartina brasiliensis Raddi = **Spartina alterniflora** Loisel.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Spartina ciliata Brongn.
Sin.: *Spartina coarctata* Trin.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Giacobbo, E. O. & Boechat, S. C., 1988; Lamberto, S. A., Valle, A. F., Aramayo, E. M. & Andrada, A. C., 1997; Longhi-Wagner, H. M., 2001b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Santos, M. & Almeida, S. L., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 2682* (LP)]; BRA[*Giacobbo, E. O. s.n.* (ICN)]; URY[*Rosengurtt, B. 6467* (BLA)].

Spartina coarctata Trin. = **Spartina ciliata** Brongn.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Spartina densiflora Brongn.
Sin.: *Chauvinia chilensis* Steud., *Spartina juncea* Willd. var. *laxiflora* St.-Yves, *Spartina juncea* Willd. var. *montevidensis* (Arechav.) St.-Yves, *Spartina montevidensis* Arechav., *Spartina patagonica* Speg.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Longhi-Wagner, H. M., 2001b; Nicora, E. G., 1978; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Santos, M. & Almeida, S. L., 2000; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, DFE, LPA, RNE, SCR, SFE, SLU); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VIII, IX, X); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 1645* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 14085* (MBM)]; CHL[*d'Urville, J. S. C. D. s.n.* (BAA)]; URY[*Rosengurtt, B. 5691* (BLA)].

Spartina densiflora Brongn. var. *obtusa* Hack. = **Spartina spartinae** (Trin.) Merr. ex Hitchc.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Spartina juncea Willd. var. *laxiflora* St.-Yves = **Spartina densiflora** Brongn.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Spartina juncea Willd. var. *montevidensis* (Arechav.) St.-Yves = **Spartina densiflora** Brongn.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Spartina longispica Hauman & Parodi
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA); URY(CAS, MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 5030* (SI, US)]; URY[*Rosengurtt, B. 10874* (MVFA)].

Spartina maritima (Curtis) Fernald var. *brasiliensis* (Raddi) St.-Yves = **Spartina alterniflora** Loisel.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Spartina montevidensis Arechav. = **Spartina densiflora** Brongn.
Referencias: Giacobbo, E. O. & Boechat, S. C., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Spartina patagonica Speg. = **Spartina densiflora** Brongn.
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Spartina spartinae (Trin.) Merr., nom. inval. = **Spartina spartinae** (Trin.) Merr. ex Hitchc.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Spartina spartinae (Trin.) Merr. ex Hitchc.
Sin.: *Spartina argentinensis* Parodi, *Spartina densiflora* Brongn. var. *obtusa* Hack., *Spartina spartinae* (Trin.) Merr., nom. inval., *Vilfa spartinae* Trin.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Parodi, L. R., 1919; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, SFE); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Job, M. M. 1106* (SI)]; PRY[*Vanni, R. O. 2145* (CTES)].

Sporobolus R. Br.

Número de especies: 22, 7 endémicas, 1 introducida

Sporobolus acuminatus (Trin.) Hack. var. **acuminatus**
Sin.: *Vilfa accuminata* Trin.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1987.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1003* (SI), *Zuloaga, F. O. 5705* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 11928* (US)].

Sporobolus acuminatus (Trin.) Hack. var. **longispiculis** Boechat & Longhi-Wagner
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Quarín, C. L. 3484* (BAA, SI, US)]; BRA[*Lindeman, J. C. 4411* (NY, US)].

Sporobolus adustus (Trin.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Sin.: *Sporobolus aeneus* (Trin.) Kunth var. *subbulbosum* (Arechav.) Parodi, *Sporobolus subbulbosum* Arechav., *Vilfa adusta* Trin.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Mujica Sallés, J., 1996; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(DUR, FLO, LAV, MAL, PAY, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 15591* (US)]; URY[*Mujica Sallés, J. 348* (MVFA)].
Notas: Citada para Argentina y Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Boechat et al., 2001).

Sporobolus aeneus (Trin.) Kunth
Sin.: *Sporobolus aeneus* (Trin.) Kunth f. *parviflora* Parodi, *Sporobolus aeneus* (Trin.) Kunth var. *barbicollis* Hack., *Sporobolus sprengelii* Kunth, *Vilfa aenea* Trin., *Vilfa aenea* Trin. var. *angustifolia* Döll, *Vilfa aenea* Trin. var. *latifolia* Döll, *Vilfa elatior* Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Burkart, A., 1969a; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR); PRY(AMA, COA); URY(DUR, LAV, MAL, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, D. 48* (BAA, BAF)]; BRA[*Hatschbach, G. 19137* (MBM)]; PRY[*Nicora, E. G. 9858* (SI)]; URY[*Costa 6692* (MVFA)].

Sporobolus aeneus (Trin.) Kunth f. *parviflora* Parodi = **Sporobolus aeneus** (Trin.) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Sporobolus aeneus (Trin.) Kunth var. *angustifolius* auct. non Döll = **Sporobolus camporum** Swallen
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Sporobolus aeneus (Trin.) Kunth var. *barbicollis* Hack. = **Sporobolus aeneus** (Trin.) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Sporobolus aeneus (Trin.) Kunth var. *subbulbosum* (Arechav.) Parodi = **Sporobolus adustus** (Trin.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Sporobolus argutus (Nees) Kunth = **Sporobolus pyramidatus** (Lam.) Hitchc.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Sporobolus argutus (Nees) Kunth f. *purpurascens* Hack. = **Sporobolus pyramidatus** (Lam.) Hitchc.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Sporobolus argutus (Nees) Kunth var. *tuberculatus* (Hack.) Hack. = **Sporobolus pyramidatus** (Lam.) Hitchc.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Sporobolus arundinaceus (Griseb.) Kuntze = **Sporobolus rigens** (Trin.) E. Desv. var. **rigens**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Sporobolus asperifolius (Nees & Meyen ex Trin.) Nees = **Muhlenbergia asperifolia** (Nees & Meyen ex Trin.) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Sporobolus berteroanus (Trin.) Hitchc. & Chase = **Sporobolus indicus** (L.) R. Br.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.

Sporobolus brasiliensis (Raddi) Hack. = **Eragrostis airoides** Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995, 2001; Boechat, S. C., 1980; Mujica Sallés, J., 1996.

Sporobolus camporum Swallen
Sin.: *Sporobolus aeneus* (Trin.) Kunth var. *angustifolius* auct. non Döll
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1991; Boechat, S. C., Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2001; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 6358* (ICN)]; BRA[*Hatschbach, G. 13994* (MBM)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o material de referencia (Boechat et al., 2001).

Sporobolus ciliatus J. Presl
Sin.: *Sporobolus rupestris* Kunth, *Vilfa ciliata* (J. Presl) Trin. var. *grandiflora* Döll, *Vilfa ciliata* (J. Presl) Trin. var. *parviflora* Döll, *Vilfa ciliata* (J. Presl) Trin., nom. illeg., *Vilfa rupestris* Trin.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.
Hierba. Anual. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Valls, J. F. M. 11378* (CEN, ICN)].

Sporobolus copiapinus Phil. = **Muhlenbergia asperifolia** (Nees & Meyen ex Trin.) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Sporobolus cryptandrus (Torr.) A. Gray
Sin.: *Agrostis cryptandra* Torr., *Sporobolus subinclusus* Phil., *Sporobolus subinclusus* Phil. var. *expansus* (Stuck.) Parodi, *Vilfa cryptandra* (Torr.) Torr. ex Trin.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Roig, F. A., 1971.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, RNE, SFE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Clos, E. C. 3480* (BAA, BAB)].

Sporobolus deserticolus Phil. = **Muhlenbergia asperifolia** (Nees & Meyen ex Trin.) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Sporobolus distichophyllus Phil. = **Muhlenbergia asperifolia** (Nees & Meyen ex Trin.) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Sporobolus exilis Renvoize, hom. illeg. = **Sporobolus linearifolius** Nicora
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Boeckeler, J. O., 1896; Nicora, E. G., 1993.

Sporobolus eximius (Nees ex Trin.) Ekman var. **eximius**
Sin.: *Vilfa eximia* Nees ex Trin.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Parodi, L. R., 1925; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Martínez Crovetto, R. 9843* (BAA), *Parodi, L. R. 4257* (BAA)]; BRA[*Hatschbach, G. 18837* (MBM)].

Sporobolus eximius (Nees ex Trin.) Ekman var. **latifolius** Boechat & Longhi-Wagner
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Valls, J. F. M. 11269* (CEN, ICN)].

Sporobolus fastigiatus J. Presl = **Muhlenbergia fastigiata** (J. Presl) Henrard
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Sporobolus gaudichaudii (Steud.) Albov = **Agrostis stolonifera** L. var. **stolonifera**

Sporobolus indicus (L.) R. Br.
Sin.: *Agrostis indica* L., *Axonopus poiretii* Roem. & Schult., *Sporobolus berteroanus* (Trin.) Hitchc. & Chase, *Sporobolus indicus* (L.) R. Br. var. *exilis* (Trin.) T. Koyama, *Sporobolus minor* Trin. ex Kunth, *Sporobolus poiretii* (Roem. & Schult.) Hitchc., *Vilfa berteroanana* Trin., *Vilfa exilis* Trin.

Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1991; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G., 1978; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, V, VI, VII, VIII, IX, X, IDE, RME); PRY(AMA, CEN, COA, GUA); URY(MAL, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 713* (SI), *Múlgura de Romero, M. E. 1669* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 23965* (MBM)]; CHL[*Gunckel, L. H. 10143* (CONC)]; PRY[*Morrone, O. 94* (SI)]; URY[*Mujica Sallés, J. 390* (MVFA)].

Sporobolus indicus (L.) R. Br. var. *exilis* (Trin.) T. Koyama = **Sporobolus indicus** (L.) R. Br.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.

Sporobolus indicus (L.) R. Br. var. *pyramidalis* (P. Beauv.) Veldkamp = **Sporobolus pyramidalis** P. Beauv.

Sporobolus jacquemontii Kunth = **Sporobolus pyramidalis** P. Beauv.

Sporobolus ligularis Hack. = **Muhlenbergia ligularis** (Hack.) Hitchc.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Sporobolus linearifolius Nicora
Sin.: *Sporobolus exilis* Renvoize, hom. illeg.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Nicora, E. G., 1993; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 45699* (MBM)]; PRY[*Schinini, A. 20558* (SI)].

Sporobolus maximus Hauman
Referencias: Hauman, L. L., 1921b; Parodi, L. R., 1928b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 1700–1900 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 216* (SI)].

Sporobolus mendocinus E. Méndez
Referencias: Méndez, E., 1994; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 1800–1900 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Méndez, E. 4269* (MERL, SI)].

Sporobolus metallicolus Longhi-Wagner & Boechat
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Swallen, J. R. 8836* (PEL)].

Sporobolus minor Trin. ex Kunth = **Sporobolus indicus** (L.) R. Br.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.

Sporobolus monandrus Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1991; Burkart, A., 1969a; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE); BRA(RGS); PRY(APY); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28570* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 9763* (ICN)]; PRY[*Vanni, R. O. 2309* (CTES)]; URY[*Rosengurtt, B. 6200* (ICN)].

Sporobolus multinodis Hack.
Sin.: *Sporobolus multinodis* Hack. var. *exasperatum* Hack.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1991.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: BRA[*Jürgens, C. 153* (W)]; URY[*Rosengurtt, B. 7074* (ICN)].

Sporobolus multinodis Hack. var. *exasperatum* Hack. = **Sporobolus multinodis** Hack.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1991.

Sporobolus nudiramus Boechat & Longhi-Wagner
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1994, 1995; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Davidse, G. 11354* (MO, SP)].

Sporobolus phleoides Hack.
Referencias: Parodi, L. R., 1928b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Piccinini, B. 1984* (BAB)].

[Sporobolus piliferus (Trin.) Kunth]
Sin.: *Vilfa pilifera* Trin.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Sporobolus platensis Parodi
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1991; Parodi, L. R., 1928b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE); BRA(RGS); URY(FLA, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*León, R. 1839* (BAA, ICN)]; BRA[*Boechat, S. C. 9756* (ICN)]; URY[*Rosengurtt, B. 5935* (BLA, ICN)].

Sporobolus poiretii (Roem. & Schult.) Hitchc. = **Sporobolus indicus** (L.) R. Br.

Sporobolus pseudairoides Parodi
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1991; Parodi, L. R., 1928b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29201* (SI)]; BRA[*Swallen, J. R. 8588* (PEL)]; PRY[*Rojas, T. 5696* (AS, MO)].

Sporobolus pyramidalis P. Beauv.
Sin.: *Sporobolus indicus* (L.) R. Br. var. *pyramidalis* (P. Beauv.) Veldkamp, *Sporobolus jacquemontii* Kunth, *Vilfa jacquemontii* (Kunth) Trin.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Clayton, W. D. 4226* (PKDC)].

Sporobolus pyramidatus (Lam.) Hitchc.
Sin.: *Agrostis pyramidata* Lam., *Sporobolus argutus* (Nees) Kunth, *Sporobolus argutus* (Nees) Kunth f. *purpurascens* Hack., *Sporobolus argutus* (Nees) Kunth var. *tuberculatus* (Hack.) Hack., *Sporobolus tuberculatus* Hack., *Vilfa arguta* Nees
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Torres, M. A., 1970d.
Hierba. Perenne. Nativa. 1800–1900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY); URY(CAS, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 209* (SI)]; PRY[*Degen, R. 3102* (FCQ)]; URY[*Rosengurtt, B. 5193b* (SI)].

Sporobolus ramulosus (Kunth) Kunth = **Muhlenbergia ramulosa** (Kunth) Swallen
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Sporobolus rigens (Trin.) E. Desv. f. *atacamensis* Parodi = **Sporobolus rigens** (Trin.) E. Desv. var. **atacamensis** (Parodi) Asteg.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Sporobolus rigens (Trin.) E. Desv. var. **atacamensis** (Parodi) Asteg.
Sin.: *Sporobolus rigens* (Trin.) E. Desv. f. *atacamensis* Parodi
Referencias: Astegiano, M. E., 1995; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–3800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31727* (SI)].

Sporobolus rigens (Trin.) E. Desv. var. **expansa** E. Méndez
Referencias: Méndez, E., 1994; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. A. 9508* (MERL)].

Sporobolus rigens (Trin.) E. Desv. var. **rigens**
Sin.: *Diachyrium arundinaceum* Griseb., *Diachyrium rigens* (Trin.) Mez, *Epicampes arundinacea* (Griseb.) Hack., *Epicampes rigens* (Trin.) Phil., hom. illeg., *Sporobolus arundinaceus* (Griseb.) Kuntze, *Vilfa rigens* Trin.
Referencias: Astegiano, M. E., 1995; Nicora, E. G., 1978; Parodi, L. R., 1928b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 463* (SI), *Hunziker, A. T. 13186* (CORD)].

Sporobolus rupestris Kunth = **Sporobolus ciliatus** J. Presl
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.

Sporobolus sarmentosus Griseb. = **Muhlenbergia asperifolia** (Nees & Meyen ex Trin.) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Sporobolus scaber Phil. = **Eragrostis attenuata** Hitchc.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Sporobolus sprengelii Kunth = **Sporobolus aeneus** (Trin.) Kunth
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.

Sporobolus subbulbosum Arechav. = **Sporobolus adustus** (Trin.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Mujica Sallés, J., 1996.

Sporobolus subinclusus Phil. = **Sporobolus cryptandrus** (Torr.) A. Gray
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Sporobolus subinclusus Phil. var. *expansus* (Stuck.) Parodi = **Sporobolus cryptandrus** (Torr.) A. Gray
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Sporobolus tenuispica Hack. = **Eragrostis spicata** Vasey
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Sporobolus tuberculatus Hack. = **Sporobolus pyramidatus** (Lam.) Hitchc.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Sporobolus virginicus (L.) Kunth
Sin.: *Agrostis littoralis* Lam., *Agrostis virginica* L., *Vilfa virginica* (L.) P. Beauv.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1991; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15588* (MBM)]; CHL[*Peterson, P. M. 15683* (CONC)].

Stegosia cochinchinensis Lour. = **Rottboellia cochinchinensis** (Lour.) Clayton

Steinchisma Raf.

Número de especies: 4, 1 endémica

Steinchisma decipiens (Nees ex Trin.) W.V. Br.
Sin.: *Panicum decipiens* Nees ex Trin., *Panicum decipiens* Nees ex Trin. var. *parviflorum* Döll
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., 1989, 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Vega, A. S. & Giussani, L. M., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, COS, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI); URY(MAL, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 544* (SI, US)]; BRA[*Hatschbach, G. 12888* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4507* (G, K)]; URY[*Mujica Sallés, J. 400* (MVFA)].

Steinchisma hians (Elliott) Nash
Sin.: *Panicum hians* Elliott, *Panicum megapotamicum* Spreng., *Panicum milioides* Nees ex Trin., *Panicum milioides* Nees ex Trin. var. *filifolium* R.A. Palacios
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Mujica Sallés, J., 1996; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Zuloaga, F. O., 1989, 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Vega, A. S. & Giussani, L. M., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE); URY(ART, CLA, DUR, FLA, MAL, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pensiero, J. F. 3191* (SI), *Zuloaga, F. O. 2330* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 19315* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5093* (F, G, US, W)]; URY[*Rosengurtt, B. 5076* (MVFA)].

Steinchisma laxa (Sw.) Zuloaga
Sin.: *Panicum laxum* Sw., *Panicum laxum* Sw. f. *minor* Hack., nom. nud., *Panicum laxum* Sw. var. *pubescens* Döll, p.p., *Panicum laxum* Sw. var. *vestitum* L.B. Sm. & Wassh., *Panicum psilanthum* Steud.
Referencias: Cavalheiro, E. M. & Longhi-Wagner, H. M., 1991; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Guglieri, A. & Longhi-Wagner, H. M., 2000; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., 1989, 1994; Zuloaga, F. O., Ellis, R. P. & Morrone, O., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE); URY(SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3383* (SI), *Zuloaga, F. O. 2298* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15358* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4316* (G)]; URY[*Rosengurtt, B. 4957* (P)].

Steinchisma spathellosa (Döll) Renvoize
Sin.: *Panicum schenckii* Hack., *Panicum spathellosum* Döll, *Panicum turfosum* Mez
Referencias: Renvoize, S. A., 1988; Zuloaga, F. O., 1981b, 1989, 1994; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Vega, A. S. & Giussani, L. M., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 462* (LP, MO, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 14946* (MBM)]; PRY[*Sparre, B. B. 508* (LIL)].

Stenotaphrum Trin.

Número de especies: 1

Stenotaphrum americanum Schrank = **Stenotaphrum secundatum** (Walter) Kuntze

Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongn. var. *americanum* (Schrank) Hack. = **Stenotaphrum secundatum** (Walter) Kuntze
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Stenotaphrum glabrum Trin. = **Stenotaphrum secundatum** (Walter) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze
Sin.: *Ischaemum secundatum* Walter, *Stenotaphrum americanum* Schrank, *Stenotaphrum dimidiatum* (L.) Brongn. var. *americanum* (Schrank) Hack., *Stenotaphrum glabrum* Trin.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Burkart, A., 1969a; Renvoize, S. A., 1988; Sauer, J. D., 1972; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, VIII, X); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 2074* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 13619* (MBM)]; CHL[*Matthei, O. R. 431* (CONC)]; URY[*Alonso Paz, E. 3690* (MVFQ)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Zuloaga et al., 2001).

Stipa academica Hicken = **Jarava academica** (Hicken) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa airoides Ekman = **Nassella airoides** (Ekman) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E., 1990; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa airoides Mez, hom. illeg. = **Nassella pubiflora** (Trin. & Rupr.) E. Desv. var. **pubiflora**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa ambigua Speg. = **Amelichloa ambigua** (Speg.) Arriaga & Barkworth
Referencias: Arriaga, M. O. & Barkworth, M. E., 2006.

Stipa ameghinoi Speg. = **Jarava ameghinoi** (Speg.) Peñailillo var. **ameghinoi**
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa ameghinoi Speg. var. *digona* Parodi = **Jarava ameghinoi** (Speg.) Peñailillo var. **digona** (Parodi) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa ameghinoi Speg. var. *precordillerana* F.A. Roig = **Jarava ameghinoi** (Speg.) Peñailillo var. **precordillerana** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa amethystina Steud. = **Nassella poeppigiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa amphicarpa Phil. = **Amelichloa caudata** (Trin.) Arriaga & Barkworth
Referencias: Arriaga, M. O. & Barkworth, M. E., 2006.

Stipa andina F.A. Roig = **Jarava leptostachya** (Griseb.) F. Rojas
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa annua Mez = **Jarava annua** (Mez) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa araucana Phil. = **Nassella poeppigiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa arcaënsis Speg. = **Nassella arcaënsis** (Speg.) Torres
Referencias: Torres, M. A., 1997a.

Stipa arcuata R.E. Fr. = **Nassella arcuata** (R.E. Fr.) Torres
Referencias: Torres, M. A., 1997a.

Stipa arechavaletae Speg. = **Nassella arechavaletae** (Speg.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E., 1990.

Stipa arenicola F.A. Roig = **Jarava arenicola** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa argentea Hitchc. = **Jarava psylantha** (Speg.) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa argentina Speg. = **Nassella tenuis** (Phil.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa argentinensis Speg. = **Nassella argentinensis** (Speg.) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa atacamensis Parodi = **Jarava atacamensis** (Parodi) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa axilliflora Parodi, nom. nud. = **Jarava scirpea** (Speg.) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa barbinodis Phil. = **Nassella duriuscula** (Phil.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa barrrancaensis F.A. Roig = **Jarava barrancaensis** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa bavioensis Speg. = **Nassella philippii** (Steud.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa bavioensis Speg. var. *minor* Speg. = **Nassella philippii** (Steud.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa bella Phil. = **Jarava neaei** (Nees ex Steud.) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa bertrandii Phil. = **Amelichloa caudata** (Trin.) Arriaga & Barkworth
Referencias: Arriaga, M. O. & Barkworth, M. E., 2006.

Stipa bicolor auct. non Vahl = **Piptochaetium ruprechtianum** E. Desv.
Referencias: Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Stipa bicolor Vahl = **Piptochaetium bicolor** (Vahl) E. Desv.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Stipa bicolor Vahl var. *major* Speg. = **Piptochaetium ruprechtianum** E. Desv.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Stipa bomanii Hauman = **Anatherostipa bomanii** (Hauman) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa bonariensis Henrard & Parodi = **Nassella melanosperma** (J. Presl) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa brachychaeta Godr. = **Amelichloa brachychaeta** (Godr.) Arriaga & Barkworth
Referencias: Arriaga, M. O. & Barkworth, M. E., 2006.

Stipa brachychaeta Godr. var. *major* Speg. = **Amelichloa caudata** (Trin.) Arriaga & Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa brachychaeta Godr. var. *minor* Speg., nom. nud. = **Jarava academica** (Hicken) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa brachychaetoides Speg. = **Nassella brachychaetoides** (Speg.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa brachyphylla Hitchc. = **Nassella brachyphylla** (Hitchc.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997a.

Stipa brasiliensis A. Zanin & Longhi-Wagner = **Nassella brasiliensis** (A. Zanin & Longhi-Wagner) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 1998.

Stipa braun-blanquetii F.A. Roig = **Jarava braun-blanqueti** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa breviculmis Hitchc. = **Nassella laevissima** (Phil.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa brevifolia Phil. = **Jarava frigida** (Phil.) F. Rojas var. **frigida**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa brevipes E. Desv. = **Amelichloa brevipes** (E. Desv.) Arriaga & Barkworth
Referencias: Arriaga, M. O. & Barkworth, M. E., 2006.

Stipa breviseta (Hitchc.) Martic. & Quezada, hom. illeg. = **Ortachne breviseta** Hitchc.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa breviseta Caro & E.A. Sánchez = **Jarava breviseta** (Caro & E.A. Sánchez) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa buchtienii Hack. = **Jarava pogonathera** (E. Desv.) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa burkartii Torres = **Nassella burkartii** (Torres) Barkworth & Torres
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa cacheutensis Speg. = **Jarava vaginata** (Phil.) F. Rojas var. **vaginata**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa caespitosa (Griseb.) Speg. = **Nassella caespitosa** Griseb.
Referencias: Torres, M. A., 1997a.

Stipa caespitosa (Griseb.) Speg. var. *elata* Speg. = **Nassella elata** (Speg.) Torres
Referencias: Torres, M. A., 1997a.

Stipa caespitosa (Griseb.) Speg. var. *lilloi* Hack. = **Nassella inconspicua** (J. Presl) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa caespitosa (Griseb.) Speg. var. *subelata* Speg. = **Nassella inconspicua** (J. Presl) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa caespitosa (Griseb.) Speg. var. *subtypica* Speg. = **Nassella caespitosa** Griseb.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa calchaquia Speg. = **Nassella nardoides** (Phil.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa capillifolia Hack. = **Piptochaetium napostaense** (Speg.) Hack.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Stipa capilliseta Hitchc. = **Jarava leptostachya** (Griseb.) F. Rojas
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa carettei Hauman = **Nassella carettei** (Hauman) Torres
Referencias: Torres, M. A., 1997a.

Stipa castellanosii F.A. Roig = **Jarava castellanosii** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa caudata Trin. = **Amelichloa caudata** (Trin.) Arriaga & Barkworth

Stipa ceresiensis Kuntze = **Nassella filiculmis** (Delile) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa charruana Arechav. = **Nassella charruana** (Arechav.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa chrysophylla E. Desv. = **Jarava chrysophylla** (E. Desv.) Peñailillo var. **chrysophylla**
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa chrysophylla E. Desv. f. *minuta* F.A. Roig = **Jarava chrysophylla** (E. Desv.) Peñailillo f. **minuta** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa chrysophylla E. Desv. f. *modica* F.A. Roig = **Jarava chrysophylla** (E. Desv.) Peñailillo f. **modica** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa chrysophylla E. Desv. var. *cordillerarum* Parodi = **Jarava chrysophylla** (E. Desv.) Peñailillo var. **cordillerarum** (Parodi) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa chrysophylla E. Desv. var. *crispula* (Kuntze) Parodi = **Jarava chrysophylla** (E. Desv.) Peñailillo var. **crispula** (Kuntze) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa chrysophylla E. Desv. var. *major* E. Desv. = **Jarava chrysophylla** (E. Desv.) Peñailillo var. **chrysophylla**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa chrysophylla E. Desv. var. *minor* Desv. = **Jarava chrysophylla** (E. Desv.) Peñailillo var. **chrysophylla**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa chubutensis Speg. = **Jarava chubutensis** (Speg.) Peñailillo var. **chubutensis**
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa chubutensis Speg. var. *hirsutissima* F.A. Roig = **Jarava chubutensis** (Speg.) Peñailillo var. **hirsutissima** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa clarazii Ball = **Nassella clarazii** (Ball) Barkworth
Referencias: Torres, M. A., 1997a.

Stipa clarazii Ball var. *bulbosa* Speg. = **Nassella clarazii** (Ball) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa clarazii Ball var. *typica* Speg., nom. inval. = **Nassella clarazii** (Ball) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa collina Phil. = **Nassella laevissima** (Phil.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa contracta Phil. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa coquimbensis Matthei = **Nassella coquimbensis** (Matthei) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 1998.

Stipa cordobensis Mez, hom. illeg. = **Jarava academica** (Hicken) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa cordobensis Speg. = **Nassella cordobensis** (Speg.) Barkworth
Referencias: Torres, M. A., 1997a.

Stipa cordobensis Speg. var. *tuberculata* F.A. Roig = **Nassella cordobensis** (Speg.) Barkworth
Referencias: Torres, M. A., 1997a.

Stipa crassiflora Roseng. & B.R. Arrill. = **Nassella crassiflora** (Roseng. & B.R. Arrill.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E., 1990.

Stipa cumingiana Trin. = **Nassella lachnophylla** (Trin.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa cumingiana Trin. var. *lachnophylla* (Trin.) Trin. & Rupr. = **Nassella lachnophylla** (Trin.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa curamalalensis Speg. = **Nassella curamalalensis** (Speg.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa curicoana Phil. = **Nassella poeppigiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa curviseta Hitchc. = **Nassella curviseta** (Hitchc.) Barkworth
Referencias: Torres, M. A., 1997a.

Stipa dasyantha Speg. = **Jarava psylantha** (Speg.) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa dasycarpa Hitchc. = **Nassella dasycarpa** (Hitchc.) Torres
Referencias: Torres, M. A., 1997a.

Stipa dasycnemis Speg. = **Jarava chubutensis** (Speg.) Peñailillo var. **chubutensis**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa debilis Mez = **Nassella sanluisensis** (Speg.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa debilis Mez var. *papillosa* Caro = **Nassella sanluisensis** (Speg.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa delilei Steud. = **Jarava plumosa** (Spreng.) S.W.L. Jacobs & J. Everett
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa depauperata Pilg. = **Nassella depauperata** (Pilg.) Barkworth var. **depauperata**
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b; Torres, M. A., 1997a.

Stipa depauperata Pilg. var. *glabrata* Pilg. = **Nassella depauperata** (Pilg.) Barkworth var. **glabrata** (Pilg.) Torres
Referencias: Torres, M. A., 1997a.

Stipa depauperata Pilg. var. *humilis* Pilg. = **Nassella depauperata** (Pilg.) Barkworth var. **depauperata**
Referencias: Torres, M. A., 1997a.

Stipa durifolia Parodi ex Torres = **Jarava durifolia** (Parodi ex Torres) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa duriuscula Phil. = **Nassella duriuscula** (Phil.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa dusenii Hitchc. = **Amelichloa ambigua** (Speg.) Arriaga & Barkworth
Referencias: Arriaga, M. O. & Barkworth, M. E., 2006.

Stipa eminens Nees, hom. illeg. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa eminens Cav. f. *viridis* Kuntze = **Amelichloa brachychaeta** (Godr.) Arriaga & Barkworth
Referencias: Arriaga, M. O. & Barkworth, M. E., 2006.

Stipa eminens Cav. var. *sellowiana* (Nees ex Trin. & Rupr.) Kuntze = **Nassella sellowiana** (Nees ex Trin. & Rupr.) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa entrerriensis Burkart = **Nassella entrerriensis** (Burkart) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa eriostachya Kunth = **Jarava ichu** Ruiz & Pav.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa fernandeziana Phil., hom. illeg. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa filiculmis Delile = **Nassella filiculmis** (Delile) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa filiculmis Delile var. *major* Speg. = **Nassella filiculmis** (Delile) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa filiculmis Delile var. *minor* Speg. = **Nassella filiculmis** (Delile) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa filifolia Nees = **Jarava megapotamica** (Spreng.) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa flexibarbata Mez = **Jarava juncoides** (Speg.) Peñailillo
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa formicarum Delile = **Nassella formicarum** (Delile) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa formosa Phil. = **Jarava vaginata** (Phil.) F. Rojas var. **vaginata**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa frigida Phil. = **Jarava frigida** (Phil.) F. Rojas var. **frigida**
Referencias: Rojas P., F. P., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Torres, M. A., 1997b.

Stipa frigida Phil. var. *parvispicula* Parodi = **Jarava frigida** (Phil.) F. Rojas var. **parvispicula** (Parodi) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa geniculata Phil. = **Nassella tenuissima** (Trin.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa gilliesii Hitchc. = **Nassella paramilloensis** (Speg.) Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa gracilis (Speg.) Speg. = **Austrostipa plumigera** (Hughes) S.W.L. Jacobs & J. Everett
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa gynerioides Phil. = **Jarava ichu** Ruiz & Pav.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa hackelii Arechav. = **Piptochaetium hackelii** (Arechav.) Parodi
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Mujica Sallés, J., 1996.

Stipa henrardiana Parodi = **Anatherostipa henrardiana** (Parodi) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa hieronymusii Pilg. = **Jarava hieronymusii** (Pilg.) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa hirta Phil. = **Nassella lachnophylla** (Trin.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa hirtiflora Hack. = **Amelichloa brevipes** (E. Desv.) Arriaga & Barkworth
Referencias: Arriaga, M. O. & Barkworth, M. E., 2006.

Stipa hirtifolia Hitchc. = **Nassella hirtifolia** (Hitchc.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa hispida Phil. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa holwayii Hitchc. = **Nassella holwayii** (Hitchc.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa humilis Cav. = **Jarava humilis** (Cav.) Peñailillo var. **humilis**
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa humilis Cav. f. *chrysophylla* (Desv.) Kuntze = **Jarava chrysophylla** (E. Desv.) Peñailillo var. **chrysophylla**
Referencias: Torres, M. A., 1997b.

Stipa humilis Cav. f. *crispula* Kuntze = **Jarava chrysophylla** (E. Desv.) Peñailillo var. **crispula** (Kuntze) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa humilis Cav. f. *major* Speg. = **Jarava humilis** (Cav.) Peñailillo var. **humilis**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa humilis Cav. f. *minor* Speg. = **Jarava speciosa** (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **speciosa**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa humilis Cav. var. *decrescens* Kuntze = **Jarava humilis** (Cav.) Peñailillo var. **decrescens** (Kuntze) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa humilis Cav. var. *intermedia* Kuntze = **Jarava humilis** (Cav.) Peñailillo var. **humilis**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa humilis Cav. var. *ruiziana* Parodi = **Jarava humilis** (Cav.) Peñailillo var. **ruiziana** (Parodi) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa humilis Cav. var. *speciosa* (Trin. & Rupr.) Kuntze = **Jarava speciosa** (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **speciosa**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa hunzikeri Caro = **Nassella hunzikeri** (Caro) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa hyalina Nees = **Nassella hyalina** (Nees) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa hypogona Hack. = **Piptochaetium napostaense** (Speg.) Hack.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa hypsophila Speg. = **Jarava hypsophila** (Speg.) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa hystricina Speg. = **Jarava hystricina** (Speg.) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa ibarii Phil. = **Jarava ibarii** (Phil.) Peñailillo var. **ibarii**
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa ibarii Phil. f. *pallescens* Parodi = **Jarava ibarii** (Phil.) Peñailillo f. **pallescens** (Parodi) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa ibarii Phil. var. *anomala* Parodi = **Jarava ibarii** (Phil.) Peñailillo var. **anomala** (Parodi) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth = **Jarava ichu** Ruiz & Pav.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth f. *interrupta* Hack. = **Jarava ichu** Ruiz & Pav.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth var. *gyneroides* (Phil.) Hack. = **Jarava ichu** Ruiz & Pav.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth var. *pungens* (Nees & Meyen) Kuntze = **Jarava pungens** (Nees & Meyen) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa illimanica Hack. = **Jarava illimanica** (Hack.) F. Rojas
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa inconspicua J. Presl = **Nassella inconspicua** (J. Presl) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa intermedia Trin. & Rupr. = **Piptochaetium bicolor** (Vahl) E. Desv.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Stipa juergensii Hack. = **Nassella juergensii** (Hack.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa jujuyensis Speg. = **Anatherostipa obtusa** (Nees & Meyen) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa juncoides Speg. = **Jarava juncoides** (Speg.) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa kurtzii Mez = **Jarava chrysophylla** (E. Desv.) Peñailillo var. **chrysophylla**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa lachnophylla Trin. = **Nassella lachnophylla** (Trin.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa laevis (Trin. & Rupr.) Parodi, comb. superfl. = **Nassella meyeniana** (Trin. & Rupr.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa laevissima (Phil.) Speg. = **Nassella laevissima** (Phil.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa lahittei Parodi = **Nassella laevissima** (Phil.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

[Stipa landbeckii Phil.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Stipa latifolia Hack. ex Arechav., hom. illeg. = **Nassella megapotamica** (Spreng. ex Trin.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Barkworth, M. E., 1990.

Stipa latifolia Hack. ex Arechav. var. *grandiflora* Hack. = **Nassella poeppigiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

[Stipa latifolia Hack. ex Arechav. var. pallens Hack.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Stipa latissimifolia Kuntze = **Nassella megapotamica** (Spreng. ex Trin.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa laxa E. Desv. = **Nassella lachnophylla** (Trin.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa leiocarpa Nees ex Steud. = **Nassella lachnophylla** (Trin.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa lenta Hitchc. = **Nassella philippii** (Steud.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa leptocoronata Roseng. & B.R. Arrill. = **Nassella leptocoronata** (Roseng. & B.R. Arrill.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa leptostachya Griseb. = **Jarava leptostachya** (Griseb.) F. Rojas
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa leptostachya Griseb. var. *capilliseta* (Hitchc.) Parodi = **Jarava leptostachya** (Griseb.) F. Rojas
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa leptostachya Griseb. var. *subaristata* Matthei = **Jarava subaristata** (Matthei) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa leptothera Speg. = **Nassella leptothera** (Speg.) Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa leptothera Speg. var. *atroviolacea* Hack. = **Nassella depauperata** (Pilg.) Barkworth var. **depauperata**
Referencias: Torres, M. A., 1997a.

Stipa leucogluma Steud. = **Nassella filiculmis** (Delile) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa ligularis (Griseb.) Speg. = **Nassella ligularis** (Griseb.) Barkworth & Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa linearifolia E. Fourn. = **Nassella linearifolia** (E. Fourn.) R. W. Pohl

Stipa lineolata Mez = **Piptochaetium panicoides** (Lam.) E. Desv.
Referencias: Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Stipa litoralis Phil. = **Amelichloa caudata** (Trin.) Arriaga & Barkworth
Referencias: Arriaga, M. O. & Barkworth, M. E., 2006.

Stipa longicoronata Roseng. & B.R. Arrill. = **Nassella longicoronata** (Roseng. & B.R. Arrill.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa longicylindrica Kuntze = **Nassella charruana** (Arechav.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa longiflora Steud. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa longiglumis Phil. = **Nassella longiglumis** (Phil.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa lorentziana Griseb. = **Amelichloa brachychaeta** (Godr.) Arriaga & Barkworth
Referencias: Arriaga, M. O. & Barkworth, M. E., 2006.

Stipa macrathera Phil. = **Nassella macrathera** (Phil.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa macrathera Speg., hom. illeg. = **Nassella trichotoma** (Nees) Hack. ex Arechav.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa maeviae F.A. Roig = **Jarava maeviae** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa malalhuensis F.A. Roig = **Jarava malalhuensis** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa manicata E. Desv. = **Nassella manicata** (E. Desv.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa manicata E. Desv. var. *latifolia* Speg. = **Nassella megapotamica** (Spreng. ex Trin.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa manicata E. Desv. var. *media* Speg. = **Nassella megapotamica** (Spreng. ex Trin.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa manicata E. Desv. var. *typica* Speg., nom. inval. = **Nassella poeppigiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa media (Speg.) Caro = **Jarava media** (Speg.) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa megalantha Steud. = **Piptochaetium bicolor** (Vahl) E. Desv.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Stipa megapotamica Spreng. ex Trin. = **Nassella megapotamica** (Spreng. ex Trin.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa megapotamica Spreng. ex Trin. var. *juncoides* (Speg.) Speg. = **Jarava juncoides** (Speg.) Peñailillo
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa megapotamica Spreng. ex Trin. var. *latiflora* Roseng. & Izag. = **Nassella poeppigiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa megapotamica Spreng. ex Trin. var. *pauciciliata* Roseng. & Izag. = **Nassella pauciciliata** (Roseng. & Izag.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa megapotamica Spreng. ex Trin. var. *typica* Speg., nom. inval. = **Jarava juncoides** (Speg.) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa melanosperma J. Presl = **Nassella melanosperma** (J. Presl) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa melanosperma J. Presl var. *erythrina* Hack. = **Nassella melanosperma** (J. Presl) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa mendocina Phil. = **Nassella tenuissima** (Trin.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa mexicana Hitchc. = **Nassella mexicana** (Hitchc.) Pohl
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa meziana Hicken = **Nassella pubiflora** (Trin. & Rupr.) E. Desv. var. **pubiflora**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa molfinoi Speg. = **Nassella sellowiana** (Nees ex Trin. & Rupr.) Peñailillo
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa montana Phil. = **Nassella poeppigiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa mucronata Kunth = **Nassella mucronata** (Kunth) Pohl
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa nana Speg. = **Jarava nana** (Speg.) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa nardoides (Phil.) Hack. ex Hitchc. = **Nassella nardoides** (Phil.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa neaei Nees ex Steud. = **Jarava neaei** (Nees ex Steud.) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa neesiana Kuntze, hom. illeg. = **Nassella tenuis** (Phil.) Barkworth

Stipa neesiana Trin. & Rupr. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Torres, M. A., 1997a.

Stipa neesiana Trin. & Rupr. f. *contorta* Hack. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa neesiana Trin. & Rupr. f. *depauperata* Hack. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa neesiana Trin. & Rupr. var. *chilensis* Trin. & Rupr. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa neesiana Trin. & Rupr. var. *fernandeziana* Trin. & Rupr. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

[Stipa neesiana Trin. & Rupr. var. formicarioides Burkart]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Stipa neesiana Trin. & Rupr. var. *glabrata* Arechav. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Stipa neesiana Trin. & Rupr. var. gracilior Burkart]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Stipa neesiana Trin. & Rupr. var. *hirsuta* Arechav. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa neesiana Trin. & Rupr. var. *hispidula* (Speg.) Hack. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa neesiana Trin. & Rupr. var. *ligularis* Griseb. = **Nassella ligularis** (Griseb.) Barkworth & Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa neesiana Trin. & Rupr. var. *longiaristata* Arechav. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa neesiana Trin. & Rupr. var. *sublaevis* (Speg.) Speg. ex Caro = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa neesiana Trin. & Rupr. var. *sublaevis* (Speg.) Speg., comb. superfl. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa neesiana Trin. & Rupr. var. *virescens* Hack. = **Nassella argentinensis** (Speg.) Peñailillo
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa nicorae F.A. Roig = **Jarava nicorae** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa nidulans Mez = **Nassella nidulans** (Mez) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa niduloides Caro = **Nassella niduloides** (Caro) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa nubicola Speg. = **Nassella nubicola** (Speg.) Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa nutans Hack. = **Nassella nutans** (Hack.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa nutans Hack. var. *quinqueciliata* Roseng. & Izag. = **Nassella quinqueciliata** (Roseng. & Izag.) Barkworth & Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa obtusa (Nees & Meyen) Hitchc. = **Anatherostipa obtusa** (Nees & Meyen) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa oreophila Speg. = **Nassella tenuissima** (Trin.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa pallida (Phil. ex Griseb.) Kuntze = **Piptochaetium setosum** (Trin.) Arechav.
Referencias: Cialdella, A. M. & Giussani, L. M., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa pampagrandensis Speg. = **Nassella pampagrandensis** (Speg.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa pampeana Speg. = **Nassella pampeana** (Speg.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa panicoides Lam. = **Piptochaetium panicoides** (Lam.) E. Desv.
Referencias: Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Stipa panicoides Nees, nom. illeg. = **Piptochaetium montevidense** (Spreng.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa paniculata Hitchc. = **Nassella arcaënsis** (Speg.) Torres
Referencias: Torres, M. A., 1997a.

Stipa papillosa (Hack.) Hitchc. = **Nassella cordobensis** (Speg.) Barkworth
Referencias: Torres, M. A., 1997a.

Stipa papposa Nees, nom. illeg. = **Jarava plumosa** (Spreng.) S.W.L. Jacobs & J. Everett
Referencias: Jacobs, S. W. L. & Everett, J., 1997.

Stipa papposa Nees f. *major* Speg. = **Jarava plumosa** (Spreng.) S.W.L. Jacobs & J. Everett

Stipa papposa Nees f. *minor* Speg. = **Jarava plumosa** (Spreng.) S.W.L. Jacobs & J. Everett

Stipa paramilloensis Speg. = **Nassella paramilloensis** (Speg.) Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa parodiana F.A. Roig = **Jarava parodiana** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa parodii Matthei = **Nassella parodii** (Matthei) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa patagonica Speg. = **Jarava patagonica** (Speg.) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa pauciciliata (Roseng. & Izag.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. = **Nassella pauciciliata** (Roseng. & Izag.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa perrigida Speg. = **Nassella paramilloensis** (Speg.) Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa pfisteri Matthei = **Nassella pfisteri** (Matthei) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa philippii Steud. = **Nassella philippii** (Steud.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa plagiostephana Speg. = **Nassella caespitosa** Griseb.
Referencias: Torres, M. A., 1997a.

Stipa planaltina A. Zanin & Longhi-Wagner = **Nassella planaltina** (A. Zanin & Longhi-Wagner) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 1998.

Stipa plumigera Hughes = **Austrostipa plumigera** (Hughes) S.W.L. Jacobs & J. Everett
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa plumosa Trin. = **Jarava plumosula** (Nees ex Steud.) F. Rojas
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa plumosa Trin. var. *gracilis* Speg. = **Austrostipa plumigera** (Hughes) S.W.L. Jacobs & J. Everett
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa plumosa Trin. var. *media* Speg. = **Jarava media** (Speg.) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa plumosa Trin. var. *micrura* Speg. = **Jarava plumosula** (Nees ex Steud.) F. Rojas
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa plumosula Nees ex Steud. = **Jarava plumosula** (Nees ex Steud.) F. Rojas
Referencias: Rojas P., F. P., 1998; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa poeppigiana Trin. & Rupr. = **Nassella poeppigiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

[Stipa poeppigiana Trin. & Rupr. var. pubescens F.A. Roig]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Stipa pogonathera E. Desv. = **Jarava pogonathera** (E. Desv.) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa polyclada Hack. = **Jarava polyclada** (Hack.) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa pratensis Phil. = **Nassella poeppigiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa pseudoichu Caro = **Jarava pseudoichu** (Caro) F. Rojas
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa pseudopampagrandensis Caro = **Nassella pseudopampagrandensis** (Caro) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa psittacorum Speg. = **Nassella psittacorum** (Speg.) Peñailillo
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Peñailillo, P. B., 1998.

Stipa psylantha Speg. = **Jarava psylantha** (Speg.) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa pubiflora (Trin. & Rupr.) M. Muñoz = **Nassella pubiflora** (Trin. & Rupr.) E. Desv. var. **pubiflora**
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa puelches Speg. = **Nassella tenuis** (Phil.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa pulchella Munro ex Ball, nom. nud. = **Jarava neaei** (Nees ex Steud.) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa pungens Nees & Meyen = **Jarava pungens** (Nees & Meyen) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa pungionata Caro & E.A. Sánchez = **Jarava pungionata** (Caro & E.A. Sánchez) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa quadrifaria Kuntze = **Nassella clarazii** (Ball) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa quinqueciliata (Roseng. & Izag.) A. Zanin & Izag. = **Nassella quinqueciliata** (Roseng. & Izag.) Barkworth & Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa quinquenervis Hack. = **Nassella megapotamica** (Spreng. ex Trin.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa rariflora (Hook. f.) Benth. = **Ortachne rariflora** (Hook. f.) Hughes
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa retorta (Nees ex Steud.) Mez = **Ortachne rariflora** (Hook. f.) Hughes
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa rhizomata A. Zanin & Longhi-Wagner = **Nassella rhizomata** (A. Zanin & Longhi-Wagner) Peñailillo
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Peñailillo, P. B., 1998.

Stipa rigidiseta (Pilg.) Hitchc. = **Anatherostipa rigidiseta** (Pilg.) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 1996; Torres, M. A., 1997c.

Stipa rosengurttii Chase = **Nassella rosengurttii** (Chase) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa rudolphii Speg., nom. illeg. = **Nassella macrathera** (Phil.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa ruiz-lealii F.A. Roig = **Jarava ruiz-lealii** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa rupestris Phil. = **Nassella rupestris** (Phil.) Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa ruprechtiana (E. Desv.) Herter = **Piptochaetium ruprechtianum** E. Desv.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Stipa saltensis Kuntze = **Anatherostipa mucronata** (Griseb.) F. Rojas
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa sanluisensis Speg. = **Nassella sanluisensis** (Speg.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa sanluisensis Speg. var. *longispicula* Caro = **Nassella sanluisensis** (Speg.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa scabrifolia Torres = **Jarava scabrifolia** (Torres) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa scirpea Speg. = **Jarava scirpea** (Speg.) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa sellowiana Nees ex Trin. & Rupr. = **Nassella sellowiana** (Nees ex Trin. & Rupr.) Peñailillo
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa semperiana F.A. Roig = **Jarava semperiana** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa setifolia (J. Presl) Kunth = **Piptochaetium panicoides** (Lam.) E. Desv.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Stipa setigera auct. non J. Presl = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth

Stipa setigera J. Presl = **Nassella mucronata** (Kunth) Pohl
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa setigera J. Presl f. *pallida* Speg. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth

Stipa setigera J. Presl f. *purpurascens* Speg. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth

Stipa setigera J. Presl f. *versicolor* Speg. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth

Stipa setigera J. Presl var. *glabrata* (Arechav.) Speg. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa setigera J. Presl var. *hispidula* Speg. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa setigera J. Presl var. *longiaristata* (Arechav.) Roseng. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa skottsbergii Pilg. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa sorianoi Parodi = **Jarava sorianoi** (Parodi) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa speciosa Trin. & Rupr. = **Jarava speciosa** (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **speciosa**
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa speciosa Trin. & Rupr. f. *abscondita* F.A. Roig = **Jarava speciosa** (Trin. & Rupr.) Peñailillo f. **abscondita** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa speciosa Trin. & Rupr. f. *atuelensis* F.A. Roig = **Jarava speciosa** (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **atuelensis** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa speciosa Trin. & Rupr. f. *horrida* F.A. Roig = **Jarava speciosa** (Trin. & Rupr.) Peñailillo f. **horrida** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa speciosa Trin. & Rupr. f. *major* Speg. = **Jarava speciosa** (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **major** (Speg.) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa speciosa Trin. & Rupr. f. *minor* Speg. = **Jarava speciosa** (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **speciosa**

Stipa speciosa Trin. & Rupr. var. *andina* Hauman, nom. nud. = **Jarava chrysophylla** (E. Desv.) Peñailillo var. **chrysophylla**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa speciosa Trin. & Rupr. var. *atuelensis* (F.A. Roig) F.A. Roig = **Jarava speciosa** (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **atuelensis** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa speciosa Trin. var. *breviglumis* Parodi = **Jarava speciosa** (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **breviglumis** (Parodi) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa speciosa Trin. var. *ciliata* F.A. Roig = **Jarava speciosa** (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **ciliata** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa speciosa Trin. & Rupr. var. *gymnostachya* Hauman = **Jarava chrysophylla** (E. Desv.) Peñailillo var. **chrysophylla**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa speciosa Trin. & Rupr. var. *major* (Speg.) Parodi = **Jarava speciosa** (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **major** (Speg.) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa speciosa Trin. & Rupr. var. *manqueclensis* F.A. Roig = **Jarava speciosa** (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **manqueclensis** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa speciosa Trin. & Rupr. var. *media* Torres = **Jarava speciosa** (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **media** (Torres) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa speciosa Trin. & Rupr. var. *parva* F.A. Roig = **Jarava speciosa** (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **parva** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa speciosa Trin. & Rupr. var. *rhomalea* F.A. Roig = **Jarava speciosa** (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **major** (Speg.) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa speciosa Trin. & Rupr. subsp. *chrysophylla* (E. Desv.) Dusén = **Jarava chrysophylla** (E. Desv.) Peñailillo var. **chrysophylla**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa spegazzini Arechav. = **Nassella spegazzinii** (Arechav.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa spicata L. f. = **Trachypogon spicatus** (L. f.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Stipa stuckertii Hack. = **Nassella stuckertii** (Hack.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa subaristata (Matthei) Caro & E.A. Sánchez = **Jarava subaristata** (Matthei) Matthei
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa sublaevis Speg. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa subnitida Roseng. & B.R. Arrill. = **Jarava subnitida** (Roseng. & B.R. Arrill.) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa subplumosa Hicken ex F.A. Roig = **Jarava subplumosa** (Hicken ex F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa tandilensis Kuntze = **Piptochaetium hackelii** (Arechav.) Parodi
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Stipa tehuelches Speg. = **Jarava speciosa** (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. **speciosa**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa tenuiculmis Hack. = **Nassella tenuiculmis** (Hack.) Peñailillo
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Peñailillo, P. B., 1998.

Stipa tenuiflora Phil. = **Jarava plumosa** (Spreng.) S.W.L. Jacobs & J. Everett
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa tenuis Phil. = **Nassella tenuis** (Phil.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa tenuis Phil. var. *argentina* (Speg.) Speg. = **Nassella tenuis** (Phil.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa tenuis Phil. var. *papillosa* Hack. = **Nassella cordobensis** (Speg.) Barkworth
Referencias: Torres, M. A., 1997a.

Stipa tenuissima Trin. = **Nassella tenuissima** (Trin.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

[Stipa tenuissima Trin. f. colorata F.A. Roig]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

[Stipa tenuissima Trin. f. nana Parodi]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Stipa tenuissima Trin. var. *curamalalensis* (Speg.) Hack. = **Nassella curamalalensis** (Speg.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa tenuissima Trin. var. *oreophila* (Speg.) Speg. = **Nassella tenuissima** (Trin.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa tenuissima Trin. var. *planicola* Speg. = **Nassella tenuissima** (Trin.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa torquata Speg. = **Nassella torquata** (Speg.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa tortuosa E. Desv. = **Jarava tortuosa** (E. Desv.) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa trachysperma Phil. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa trichocaulos Phil. = **Nassella filiculmis** (Delile) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa trichotoma Nees = **Nassella trichotoma** (Nees) Hack. ex Arechav.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa tucumana Parodi = **Nassella tucumana** (Parodi) Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa uruguaycola Speg. = **Nassella spegazzinii** (Arechav.) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa uspallatensis Hack., hom. illeg. = **Jarava pogonathera** (E. Desv.) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa uspallatensis Speg. = **Nassella uspallatensis** (Speg.) Torres
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Stipa vaginata Phil. = **Jarava vaginata** (Phil.) F. Rojas var. **vaginata**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa vaginata Phil. f. *contracta* F.A. Roig = **Jarava vaginata** (Phil.) F. Rojas f. **contracta** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa vaginata Phil. f. *inmersa* F.A. Roig = **Jarava vaginata** (Phil.) F. Rojas f. **immersa** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa vaginata Phil. f. *laevis* F.A. Roig = **Jarava vaginata** (Phil.) F. Rojas f. **laevis** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa vaginata Phil. f. *rigida* F.A. Roig = **Jarava vaginata** (Phil.) F. Rojas f. **rigida** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa vaginata Phil. var. *argyroidea* F.A. Roig = **Jarava vaginata** (Phil.) F. Rojas var. **argyroidea** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa vaginata Phil. var. *dilatata* F.A. Roig = **Jarava vaginata** (Phil.) F. Rojas var. **dilatata** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Stipa vallsii A. Zanin & Longhi-Wagner = **Nassella vallsii** (A. Zanin & Longhi-Wagner) Peñailillo
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Peñailillo, P. B., 1998.

Stipa vatroensis F.A. Roig = **Jarava vatroensis** (F.A. Roig) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 2002.

Stipa ventanicola Cabrera & Torres = **Nassella ventanicola** (Cabrera & Torres) Barkworth
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Stipa venusta Phil. = **Anatherostipa venusta** (Phil.) Peñailillo
Referencias: Peñailillo, P. B., 1996; Torres, M. A., 1997c.

Stipa verruculosa Mez = **Piptochaetium stipoides** (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Stipa violacea Hitchc. = **Nassella caespitosa** Griseb.
Referencias: Torres, M. A., 1997a.

Stipa yatesensis Martic. & Quezada = **Ortachne breviseta** Hitchc.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Streptochaeta Schrad.

Número de especies: 1

Streptochaeta spicata Schrad. ex Nees
Sin.: *Lepideilema lanciflorum* Trin.
Referencias: Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X. & Stern, M. J., 1999; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Solomon, A. 6864* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 2736* (ICN, US)]; PRY[*Solomon, J. C. 6869* (SI)].

Streptostachys Desv.

Número de especies: 1

Streptostachys macrantha (Trin.) Zuloaga & Soderstr.
Sin.: *Panicum macranthum* Trin.
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1991; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10115* (BAA, G)].

Stylagrostis chrysantha (J. Presl) Mez = **Deyeuxia chrysantha** J. Presl var. **chrysantha**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Villavicencio, X., 1998.

Stylagrostis erythrostachya (E. Desv.) Mez = **Deyeuxia erythrostachya** E. Desv. var. **erythrostachya**
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 2006.

Syntherisma aequiglumis (Hack. & Arechav.) Hitchc. = **Digitaria aequiglumis** (Hack. & Arechav.) Parodi var. **aequiglumis**
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001.

Syntherisma hackelii (Hack.) Chase = **Digitaria phaeotrix** (Trin.) Parodi var. **hackelii** (Arechav.) Henrard
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001.

Taeniatherum Nevski

Número de especies: 1 introducida

Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski
Sin.: *Elymus caput-medusae* L.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: CHL(VI, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 784* (CONC)].

[Tetrapogon spathaceus (Benth.) Hack.]
Sin.: *Cryptochloris spathacea* Benth.
Notas: Cita dudosa.

Thalasium montevidense Spreng. = **Panicum racemosum** (P. Beauv.) Spreng.

Themeda Forssk.

Número de especies: 1 introducida

Themeda quadrivalvis (L.) Kuntze
Sin.: *Andropogon quadrivalvis* L., *Anthistiria ciliata* L. f., nom. nud.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Parodi, L. R., 1961.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pire, S. M. 1333* (SI)].

Thinopyrum A. Löve

Número de especies: 1 introducida

[Thinopyrum elongatum (Host) D.R. Dewey]
Sin.: *Agropyron elongatum* (Host) P. Beauv., *Elytrigia elongata* (Host) Nevski, *Lophopyrum elongatum* (Host) A. Löve, *Triticum elongatum* Host
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Thinopyrum ponticum (Podp.) Barkworth & D.R. Dewey
Sin.: *Triticum ponticum* Podp.
Referencias: Barkworth, M. E. & Dewey, D. R., 1985; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE, SAL, SFE, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goodall, N. 4275* (BAB, NA)].

Thrasya cinerascens (Döll) Judz. = **Paspalum cinerascens** (Döll) A.G. Burm. & C.N. Bastos
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Thrasya petrosa (Trin.) Chase = **Paspalum foliiforme** S.S. Denham
Referencias: Denham, S. S., 2005.

Thrasyopsis Parodi

Número de especies: 2, 1 endémica

Thrasyopsis juergensii (Hack.) Soderstr. & A.G. Burm.
Sin.: *Panicum juergensii* Hack., *Thrasyopsis rawitscheri* Parodi
Referencias: Burman, A. G., 1983; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.
Hierba. Perenne. Endémica. 600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Jürgens, C. 412* (US, W)].

Thrasyopsis rawitscheri Parodi = **Thrasyopsis juergensii** (Hack.) Soderstr. & A.G. Burm.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Thrasyopsis repanda (Nees ex Trin.) Parodi
Sin.: *Panicum repandum* Nees ex Trin.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 12825* (MBM)].

Torresia utriculata Ruiz & Pav. = **Anthoxanthum utriculatum** (Ruiz & Pav.) Y. Schouten & Veldkamp
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trachynia distachya (L.) Link = **Brachypodium distachyon** (L.) P. Beauv.

Trachypogon Nees

Número de especies: 2

Trachypogon canescens Nees = **Trachypogon spicatus** (L. f.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Trachypogon densus Swallen = **Trachypogon spicatus** (L. f.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Trachypogon filifolius (Hack.) Hitchc. = **Trachypogon macroglossus** Trin.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Trachypogon laguroides (DC.) Nees = **Bothriochloa laguroides** (DC.) Herter subsp. **laguroides**
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Trachypogon macroglossus Trin.
Sin.: *Trachypogon filifolius* (Hack.) Hitchc.
Referencias: Flores, A. I. P., 1990; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Valls, J. F. M. 4247* (ICN)].

Trachypogon minarum Nees = **Sorghastrum minarum** (Nees) Hitchc.
Referencias: Dávila, P., 1988; Flores, A. I. P. & Valls, J. F. M., 1993[1992].

Trachypogon mollis Nees = **Trachypogon spicatus** (L. f.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Trachypogon montufari (Kunth) Nees var. *mollis* (Nees) Burkart, comb. superfl. = **Trachypogon spicatus** (L. f.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Trachypogon montufarii (Kunth) Nees = **Trachypogon spicatus** (L. f.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Trachypogon plumosus (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Nees = **Trachypogon spicatus** (L. f.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Trachypogon polymorphus Hack. var. *montufari* (Kunth) Hack. = **Trachypogon spicatus** (L. f.) Kuntze
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996.

Trachypogon rigidifolius Swallen = **Trachypogon spicatus** (L. f.) Kuntze
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Trachypogon rufus Nees = **Hyparrhenia rufa** (Nees) Stapf
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Trachypogon scaberrimum Nees = **Sorghastrum scaberrimum** (Nees) Herter
Referencias: Dávila, P., 1988; Flores, A. I. P. & Valls, J. F. M., 1993[1992].

Trachypogon spicatus (L. f.) Kuntze
Sin.: *Andropogon montufarii* Kunth, *Stipa spicata* L. f., *Trachypogon canescens* Nees, *Trachypogon densus* Swallen, *Trachypogon mollis* Nees, *Trachypogon montufari* (Kunth) Nees var. *mollis* (Nees) Burkart, comb. superfl., *Trachypogon montufarii* (Kunth) Nees, *Trachypogon plumosus* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Nees, *Trachypogon polymorphus* Hack. var. *montufari* (Kunth) Hack., *Trachypogon rigidifolius* Swallen
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Flores, A. I. P., 1990; Mujica Sallés, J., 1996; Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 286* (SI), *Montes, J. E. 15223* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 28562* (MBM)]; PRY[*Schinini, A. 28213* (CTES)]; URY[*Mujica Sallés, J. 427* (MVFA)].

Tragus Haller

Número de especies: 4, 1 endémica, 2 introducidas

Tragus andicola Zapater & Sulekic
Hierba. Anual. Endémica. 3300–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 457* (SI), *Sulekic, A. A. 2698* (SI)].

Tragus australianus Blake
Referencias: Anton, A. M., 1981; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Anual. Introducida.
Países: ARG(JUJ, LPA, LRI, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 8780* (SI), *Pozner, R. 225* (CTES, SI)].

Tragus berteronianus Schult.
Sin.: *Lappago aliena* Spreng.
Referencias: Anton, A. M., 1981; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Hierba. Anual. Nativa. 600–2300 m.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6060* (SI)].

Tragus racemosus (L.) All.
Sin.: *Cenchrus racemosus* L.
Referencias: Anton, A. M., 1981; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gautier, E. D. 3095* (LP)].

Tragus unioloides (Willd.) Panz ex B.D. Jacks., nom. nud. = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trichachne affinis Swallen = **Digitaria similis** Beetle ex Gould
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994b.

Trichachne berteroniana Schult. = **Arundinella berteroniana** (Schult.) Hitchc. & Chase

Trichachne californica (Benth.) Chase = **Digitaria californica** (Benth.) Henrard var. **californica**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Trichachne ferruginea Nees = **Digitaria phaeotrix** (Trin.) Parodi var. **phaeotrix**
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Trichachne insularis (L.) Nees = **Digitaria insularis** (L.) Fedde
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001; Cavalheiro, E. M. & Barreto, I. L., 1981; Renvoize, S. A., 1988.

Trichachne penicilligera (Speg.) Parodi = **Digitaria sacchariflora** (Nees) Henrard
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Trichachne sacchariflora Nees = **Digitaria sacchariflora** (Nees) Henrard
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994b.

Trichachne sellowii Müll. Hal. = **Digitaria sellowii** (Müll. Hal.) Henrard
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Trichachne sericea Swallen, hom. illeg. = **Digitaria swalleniana** Henrard
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001; Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1994b.

Trichachne tenuis Nees = **Digitaria tenuis** (Nees) Henrard

Trichloris Benth.

Número de especies: 2

Trichloris blanchardiana E. Fourn. ex Scribn. = **Trichloris crinita** (Lag.) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Trichloris crinita (Lag.) Parodi
Sin.: *Chloris crinita* Lag., *Chloris mendocina* Phil., *Chloropsis blanchardiana* (E. Fourn. ex Scribn.) Kuntze, *Chloropsis crinita* (Lag.) Kuntze, *Chloropsis mendocina* (Phil.) Kuntze, *Trichloris blanchardiana* E. Fourn. ex Scribn., *Trichloris crinita* (Lag.) Parodi var. *triflora* Parodi, *Trichloris crinita* (Lag.) Parodi var. *typica* Parodi, nom. inval., *Trichloris mendocina* (Phil.) Kurtz, *Trichloris mendocina* (Phil.) Kurtz ex Seckt, hom. illeg., *Trichloris mendocina* (Phil.) Kurtz f. *blanchardiana* (E. Fourn. ex Scribn.) Kurtz
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Parodi, L. R., 1947b; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 580* (SI)]; PRY[*Degen, R. 3081* (FCQ)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].
Notas: Citada para Chile sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Peterson et al., 2001).

Trichloris crinita (Lag.) Parodi var. *triflora* Parodi = **Trichloris crinita** (Lag.) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Trichloris crinita (Lag.) Parodi var. *typica* Parodi, nom. inval. = **Trichloris crinita** (Lag.) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Trichloris lilloi Parodi = **Trichloris pluriflora** E. Fourn. f. **pluriflora**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Trichloris mendocina (Phil.) Kurtz = **Trichloris crinita** (Lag.) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Trichloris mendocina (Phil.) Kurtz ex Seckt, hom. illeg. = **Trichloris crinita** (Lag.) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Trichloris mendocina (Phil.) Kurtz f. *blanchardiana* (E. Fourn. ex Scribn.) Kurtz = **Trichloris crinita** (Lag.) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Trichloris pluriflora E. Fourn. f. **macra** Hack.
Referencias: Parodi, L. R., 1919; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Stuckert, T. T. J. V., 1911.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1100 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rosa, E. B. s.n.* (UNSL)].

Trichloris pluriflora E. Fourn. f. **pluriflora**
Sin.: *Chloris pluriflora* (E. Fourn.) Clayton, *Chloropsis pluriflora* (E. Fourn.) Kuntze, *Trichloris lilloi* Parodi
Referencias: Anton, A. M., 1975; Cabrera, A. L., 1970a; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Urbani, M. H. 20* (CTES)]; PRY[*Vanni, R. O. 1801* (CTES)].

Trichodium glabrum J. Presl = **Agrostis glabra** (J. Presl) Kunth var. **glabra**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trichodium nanum J. Presl = **Agrostis breviculmis** Hitchc.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Tricholaena insularis (L.) Griseb. = **Digitaria insularis** (L.) Fedde
Referencias: Canto-Dorrow, T. S., 2001.

Trichoneura Andersson

Número de especies: 1

Trichoneura weberbaueri Pilg.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 1400 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 60* (CONC)].

Tricuspis latifolia Griseb. = **Gouinia latifolia** (Griseb.) Vasey
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Tridens Roem. & Schult.

Número de especies: 4, 2 endémicas

Tridens avenacea (Kunth) Hitchc. var. *kurtziana* Parodi = **Erioneuron avenaceum** (Kunth) Tateoka var. **kurtzianum** (Parodi) Anton
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Tridens avenacea (Kunth) Hitchc. var. *longiglumis* Parodi = **Erioneuron avenaceum** (Kunth) Tateoka var. **longiglume** (Parodi) Anton
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Tridens avenacea (Kunth) Hitchc. var. *pygmaea* (Hack.) Parodi = **Erioneuron avenaceum** (Kunth) Tateoka var. **pygmaeum** (Hack.) Anton
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Tridens brasiliensis (Nees ex Steud.) Parodi
Sin.: *Triodia brasiliensis* (Nees ex Steud.) Lindm., *Triodia figueirae* Arechav., *Uralepis brasiliensis* Nees ex Steud.
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1986a; Burkart, A., 1969a; Cabrera, A. L., 1970a; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE); BRA(RGS); PRY(CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA, SPE); URY(FLA, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 329* (SI), *Burkart, A. 14329* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 4274* (ICN)]; PRY[*Woolston, A. L. 150g* (SI)]; URY[*Cabrera, A. L. 32433* (SI)].

Tridens hackelii (Arechav.) Parodi
Sin.: *Triodia hackelii* Arechav.
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1986a; Burkart, A., 1969a; Parodi, L. R., 1937c; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); BRA(RGS); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Báez, F. 266* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 4702* (ICN)]; URY[*Herter, W. G. F. 82749* (SI)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Peterson et al., 2001).

Tridens nicorae Anton
Sin.: *Antonella nicorae* (Anton) Caro
Referencias: Anton, A. M., 1977; Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1986a; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Anderson 2428* (CORD)].

Tridens pilosus (Buckley) Hitchc. var. *argentina* (Kuntze) Parodi = **Erioneuron pilosum** (Buckley) Nash var. **longearistatum** (Kurtz) Anton
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Tridens pilosus (Buckley) Hitchc. var. *mendocina* Parodi = **Erioneuron pilosum** (Buckley) Nash var. **mendocinum** (Parodi) Nicora
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Tridens riograndensis Acedo & Llamas
Referencias: Acedo, C. & Llamas, F., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Acedo, C. 51* (LEB)].

Triodia antarctica Hook. f. = **Poa darwiniana** Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Triodia argentina (Kuntze) K. Schum. = **Erioneuron pilosum** (Buckley) Nash var. **longearistatum** (Kurtz) Anton
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Triodia avenacea Kunth = **Erioneuron avenaceum** (Kunth) Tateoka var. **avenaceum**

Triodia avenacea Kunth var. *breviaristata* Kurtz = **Erioneuron avenaceum** (Kunth) Tateoka var. **avenaceum**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Triodia avenacea Kunth var. *longearistata* Kurtz = **Erioneuron pilosum** (Buckley) Nash var. **longearistatum** (Kurtz) Anton
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Triodia avenacea Kunth var. *pygmaea* Hack. = **Erioneuron avenaceum** (Kunth) Tateoka var. **pygmaeum** (Hack.) Anton
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Triodia brasiliensis (Nees ex Steud.) Lindm. = **Tridens brasiliensis** (Nees ex Steud.) Parodi
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1986a.

Triodia figueirae Arechav. = **Tridens brasiliensis** (Nees ex Steud.) Parodi
Referencias: Boechat, S. C. & Valls, J. F. M., 1986a.

Triodia hackelii Arechav. = **Tridens hackelii** (Arechav.) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Triodia paraguayensis (Kuntze) Hack. = **Gouinia paraguayensis** (Kuntze) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

[Triodia tridenticulata Nees]
Notas: Nombre dudoso.

Triplasis setacea Griseb. = **Tripogon spicatus** (Nees) Ekman
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Tripogon Roem. & Schult.

Número de especies: 3, 1 endémica

Tripogon ekmanii Nicora & Rúgolo
Referencias: Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1991; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Vega, A. S., 2004.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA); URY(TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 829* (SI), *Parodi, L. R. 4516b* (BAA)]; PRY[*Hassler, E. 12053* (BAF, G, SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 6484b-* (SI)].

Tripogon nicorae Rúgolo & A.S.Vega
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Vega, A. S., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 2900–3600 m.
Países: ARG(CAT, LRI); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 5167* (BAA, SI)]; CHL[*Matthei, O. R. 316* (CONC)].

Tripogon spicatus (Nees) Ekman
Sin.: *Bromus spicatus* Nees, *Diplachne spicata* (Nees) Döll, *Sieglingia spicata* (Nees) Kuntze ex Stuck., *Triplasis setacea* Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1969a; Cabrera, A. L., 1970a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Renvoize, S. A., 1988; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Vega, A. S., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LRI, MEN, MIS, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS); CHL(I); PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, ITA, PAI, SPE); URY(ART, FLO, LAV, MAL, MON, RNO, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2235* (SI), *Parodi, L. R. 4516a* (BAA)]; BRA[*Hatschbach, G. 15894* (MBM)]; CHL[*Peterson, P. M. 15690* (CONC)]; PRY[*Mereles, F. 4520* (FCQ, SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 78506* (CONC)].

Tripsacum L.

Número de especies: 1

Tripsacum australe H.C. Cutler & E.S. Anderson
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 200 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Múlgura de Romero, M. E. 3694* (CTES, FCQ, SI)].

Triraphis hieronymi Kuntze = **Lamprothyrsus hieronymi** (Kuntze) Pilg.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Triraphis hieronymi Kuntze var. *jujuyensis* Kuntze = **Lamprothyrsus hieronymi** (Kuntze) Pilg.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Trisetobromus hirtus (Trin.) Nevski = **Bromus berteroanus** Colla

Trisetum Pers., nom. cons.

Número de especies: 16, 12 endémicas

Trisetum airiformis Steud. = **Deschampsia airiformis** (Steud.) Benth. & Hook. f.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum ambiguum Rúgolo & Nicora
Referencias: Finot, V. L., 2002; Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Soreng, R. J. & Matthei, O. R., 2005; Rúgolo de Agrasar, Z. E. & Nicora, E. G., 1988; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–900 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 4847* (BAA, BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 9276* (CONC)].

Trisetum andicola Louis-Marie = **Trisetum longiglume** Hack. var. **longiglume**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum andinum Phil., hom. illeg. = **Trisetum spicatum** (L.) K. Richt. var. **spicatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum araeanthum Phil. = **Leptophyllochloa micrathera** (E. Desv.) C.E. Calderón ex Nicora
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum barbatum Steud. = **Bromus berteroanus** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum barbinode Trin. var. **barbinode**
Referencias: Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Soreng, R. J. & Matthei, O. R., 2005; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–3500 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, D. 15649* (BAA), *Rúgolo de Agrasar, Z. E. 12341* (SI)]; CHL[*Poeppig, E. F. 1828* (BAA), *Schlegel, F. 3475* (CONC)].

Trisetum barbinode Trin. var. **hirtiflorum** (Hack.) Louis-Marie
Sin.: *Trisetum hirtiflorum* Hack.
Referencias: Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Matthei, O. R. & Soreng, R. J., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pfister, A. s.n.* (CONC, SGO)].

Trisetum barbinode Trin. var. **sclerophyllum** (Hack.) Finot
Sin.: *Trisetum sclerophyllum* Hack.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1100–1700 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 23170* (LP)].

Trisetum berteroanum Kunth = **Deschampsia berteroana** (Kunth) Trin.
Referencias: Finot, V. L. & Matthei, O. R., 2001[2000].

Trisetum biflorum Phil., hom. illeg. = **Trisetum dianthemum** (Louis-Marie) Finot
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum brachyatherum Phil. = **Leptophyllochloa micrathera** (E. Desv.) C.E. Calderón ex Nicora
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum buchtienii Hack. = **Trisetum preslei** (Kunth) E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum bulbosum Hitchc.
Sin.: *Helictotrichon bulbosum* (Hitchc.) Parodi
Referencias: Cabrera, A. L., 1970a; Parodi, L. R., 1949b; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(BAI); CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Calderón 878* (BAA)]; CHL[*Joseph, F. C. 4607* (US)].

Trisetum caudulatum Trin. var. **caudulatum**
Sin.: *Koeleria caudulata* (Trin.) Griseb., *Koeleria grisebachii* Domin, nom. superfl., *Koeleria lechleri* Steud., *Trisetum chiloense* Phil., *Trisetum chromostachyum* Desv., *Trisetum heterogamum* Steud., *Trisetum heteronymum* Steud., *Trisetum lechleri* (Steud.) Nicora, *Trisetum malacophyllum* Steud., *Trisetum monticola* Phil., *Trisetum ochrostachyum* Phil., *Trisetum splendidulum* Steud., *Trisetum variabile* E. Desv., *Trisetum variabile* E. Desv. var. *chiloense* (Phil.) Louis-Marie, *Trisetum variabile* E. Desv. var. *flavescens* E. Desv., *Trisetum variabile* E. Desv. var. *vidalii* (Phil.) Louis-Marie, *Trisetum variabile* E. Desv. var. *virescens* E. Desv., *Trisetum vidalii* Phil.
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Soreng, R. J. & Matthei, O. R., 2005; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10725* (BAA, SI), *Krapovickas, A. 3933* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996367* (CONC), *Johnston, I. M. 5539* (BAA)].

Trisetum caudulatum Trin. var. **correae** Nicora
Referencias: Finot, V. L., 2002; Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Soreng, R. J. & Matthei, O. R., 2005; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(V, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 4334* (BAA)]; CHL[*Pfister, A. s.n.* (CONC)].

Trisetum cernuum Trin.
Sin.: *Avena cernua* (Trin.) Kunth, *Avena leptostachya* Hook. f., *Trisetum fraudulentum* Steud.
Referencias: Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Soreng, R. J. & Matthei, O. R., 2005; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF); CHL(IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 5751* (BAA, SI)]; CHL[*Lechler, W. 1283* (BAA)].

Trisetum chiloense Phil. = **Trisetum caudulatum** Trin. var. **caudulatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum chromostachyum Desv. = **Trisetum caudulatum** Trin. var. **caudulatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum cumingii (Nees ex Steud.) Parodi ex Nicora = **Trisetum spicatum** (L.) K. Richt. var. **cumingii** (Nees ex Steud.) Finot
Referencias: Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Soreng, R. J. & Matthei, O. R., 2005.

Trisetum cumingii (Nees ex Steud.) Parodi ex Nicora var. *santacrucense* Nicora = **Trisetum spicatum** (L.) K. Richt. var. **cumingii** (Nees ex Steud.) Finot
Referencias: Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Soreng, R. J. & Matthei, O. R., 2005.

Trisetum depauperatum Phil. = **Leptophyllochloa micrathera** (E. Desv.) C.E. Calderón ex Nicora
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum dianthemum (Louis-Marie) Finot
Sin.: *Trisetum biflorum* Phil., hom. illeg., *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. var. *dianthemum* Louis-Marie
Referencias: Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Soreng, R. J. & Matthei, O. R., 2005; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(CHU); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 9610* (SI)]; CHL[*Hollermayer, A. 1252* (CONC)].

Trisetum dozei Franch. = **Deschampsia laxa** Phil.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Sin.: *Avena flavescens* L.
Referencias: Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Matthei, O. R. & Soreng, R. J., 2005; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 463* (BAA, SI)].
Notas: Citada para Chile sin indicar material de referencia (Finot et al., 2005).

Trisetum floribundum Pilg. = **Dielsiochloa floribunda** (Pilg.) Pilg.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum fraudulentum Steud. = **Trisetum cernuum** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum fuegianum Gand. = **Trisetum spicatum** (L.) K. Richt. var. **spicatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum heterogamum Steud. = **Trisetum caudulatum** Trin. var. **caudulatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum heteronymum Steud. = **Trisetum caudulatum** Trin. var. **caudulatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum hirsutum Phil., hom. illeg. = **Trisetum phleoides** (d'Urv.) Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum hirtiflorum Hack. = **Trisetum barbinode** Trin. var. **hirtiflorum** (Hack.) Louis-Marie

Trisetum hirtum Trin. = **Bromus berteroanus** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum juergensii Hack.
Sin.: *Deschampsia juergensii* (Hack.) Valencia
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. s.n.* (PACA, US)].

Trisetum kurtzii (Hack.) Zotov = **Koeleria kurtzii** Hack. ex Kurtz

Trisetum lasiolepis E. Desv. = **Trisetum preslei** (Kunth) E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum laxiflorum Phil. = **Leptophyllochloa micrathera** (E. Desv.) C.E. Calderón ex Nicora
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum laxum Phil. = **Leptophyllochloa micrathera** (E. Desv.) C.E. Calderón ex Nicora
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum lechleri (Steud.) Nicora = **Trisetum caudulatum** Trin. var. **caudulatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum litorale Phil. = **Bromus berteroanus** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum longiglume Hack. var. **glabratum** Nicora
Referencias: Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Matthei, O. R. & Soreng, R. J., 2005; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11674½* (BAA)].

Trisetum longiglume Hack. var. **longiglume**
Sin.: *Deschampsia andicola* (Louis-Marie) Valencia, *Trisetum andicola* Louis-Marie
Referencias: Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Soreng, R. J. & Matthei, O. R., 2005; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–4000 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 13932* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Martin 1873* (BAA)].

Trisetum malacanthum Steud. = **Danthonia malacantha** (Steud.) Pilg.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Trisetum malacophyllum Phil., hom. illeg. = **Trisetum spicatum** (L.) K. Richt. var. **cumingii** (Nees ex Steud.) Finot
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum malacophyllum Steud. = **Trisetum caudulatum** Trin. var. **caudulatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum mattheii Finot
Referencias: Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Soreng, R. J. & Matthei, O. R., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 4000–4100 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 86* (CONC)].

Trisetum micratherum E. Desv. = **Leptophyllochloa micrathera** (E. Desv.) C.E. Calderón ex Nicora
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum minutiflorum Phil. = **Rostraria cristata** (L.) Tzvelev
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum mollifolium Louis-Marie = **Trisetum spicatum** (L.) K. Richt. var. **cumingii** (Nees ex Steud.) Finot
Referencias: Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Soreng, R. J. & Matthei, O. R., 2005.

Trisetum monticola Phil. = **Trisetum caudulatum** Trin. var. **caudulatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum nancaguense Finot
Referencias: Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Soreng, R. J. & Matthei, O. R., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Lammers, T. G. 7894* (CONC)].

Trisetum nemorosum Phil. = **Leptophyllochloa micrathera** (E. Desv.) C.E. Calderón ex Nicora
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum ochrostachyum Phil. = **Trisetum caudulatum** Trin. var. **caudulatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum oreophilum Louis-Marie var. **johnstoni** Louis-Marie
Referencias: Finot, V. L., 2002; Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Soreng, R. J. & Matthei, O. R., 2005; Louis-Marie, O. C., 1928; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2900–4600 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU); CHL(III, IV, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnston, I. M. 6097* (GH, SGO, US)]; CHL[*Marticorena, C. 83462b* (CONC)].

Trisetum parvulum (Hook. f.) Speg. = **Deschampsia parvula** (Hook. f.) E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum phleoides (d'Urv.) Kunth
Sin.: *Avena phleoides* d'Urv., *Trisetum hirsutum* Phil., hom. illeg., *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. var. *phleoides* (d'Urv.) Macloskie, *Trisetum subspicatum* (L.) P. Beauv. subsp. *phleoides* (d'Urv.) Hack.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arroyo, S. C. 491* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92554* (CONC)].

Trisetum preslei (Kunth) E. Desv.
Sin.: *Avena pilosa* J. Presl, hom. illeg., *Avena preslei* Kunth, *Deschampsia lasiantha* Phil., *Trisetum buchtienii* Hack., *Trisetum lasiolepis* E. Desv., *Trisetum preslei* (Kunth) E. Desv. var. *buchtienii* (Hack.) Louis-Marie, *Trisetum preslei* (Kunth) E. Desv. var. *lasianthum* (Phil.) Louis-Marie
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Soreng, R. J. & Matthei, O. R., 2005; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1800–4000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SJU); CHL(IV, V, VIII, IX, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 14085* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Haenke, T. P. X. s.n.* (BAA)].

Trisetum preslei (Kunth) E. Desv. var. *buchtienii* (Hack.) Louis-Marie = **Trisetum preslei** (Kunth) E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum preslei (Kunth) E. Desv. var. *lasianthum* (Phil.) Louis-Marie = **Trisetum preslei** (Kunth) E. Desv.

Trisetum pyramidatum Louis-Marie ex Finot
Referencias: Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Soreng, R. J. & Matthei, O. R., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(RNE); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Buchtien, O. s.n.* (US)]; CHL[*Barros, M. 5706* (US)].

Trisetum rigidulum (Steud.) Domin = **Poa resinulosa** Nees ex Steud.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum sclerophyllum Hack. = **Trisetum barbinode** Trin. var. **sclerophyllum** (Hack.) Finot
Referencias: Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Matthei, O. R. & Soreng, R. J., 2005.

Trisetum spicatum (L.) K. Richt. var. **cumingii** (Nees ex Steud.) Finot
Sin.: *Koeleria cumingii* Nees ex Steud., *Trisetum cumingii* (Nees ex Steud.) Parodi ex Nicora, *Trisetum cumingii* (Nees ex Steud.) Parodi ex Nicora var. *santacrucense* Nicora, *Trisetum malacophyllum* Phil., hom. illeg., *Trisetum mollifolium* Louis-Marie
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Matthei, O. R. & Soreng, R. J., 2005; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(V, VIII, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 2821* (BAA, BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92112* (CONC, SGO), *Pisano, E. 5198* (CONC)].

Trisetum spicatum (L.) K. Richt. var. *dianthemum* Louis-Marie = **Trisetum dianthemum** (Louis-Marie) Finot
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum spicatum (L.) K. Richt. var. *fuegianum* (Hack.) Louis-Marie = **Trisetum spicatum** (L.) K. Richt. var. **spicatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum spicatum (L.) K. Richt. var. *phleoides* (d'Urv.) Macloskie = **Trisetum phleoides** (d'Urv.) Kunth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum spicatum (L.) K. Richt. var. **spicatum**
Sin.: *Aira spicata* L., *Trisetum andinum* Phil., hom. illeg., *Trisetum fuegianum* Gand., *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. var. *fuegianum* (Hack.) Louis-Marie, *Trisetum subspicatum* (L.) P. Beauv. var. *breviglume* Hack., *Trisetum subspicatum* (L.) P. Beauv. var. *fuegianum* Hack., *Trisetum subspicatum* (L.) P. Beauv. var. *glabrifolium* Hack. ex Macloskie, *Trisetum subspicatum* (L.) P. Beauv., nom. superfl.
Referencias: Finot, V. L., Peterson, P. M., Zuloaga, F. O., Soreng, R. J. & Matthei, O. R., 2005; Moore, D. M., 1983; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4700 m.
Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(II, V, VII, VIII, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 261* (SI)]; CHL[*Barros, E. 3982* (LP)].

Trisetum splendidulum Steud. = **Trisetum caudulatum** Trin. var. **caudulatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum subspicatum (L.) P. Beauv., nom. superfl. = **Trisetum spicatum** (L.) K. Richt. var. **spicatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum subspicatum (L.) P. Beauv. var. *breviglume* Hack. = **Trisetum spicatum** (L.) K. Richt. var. **spicatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum subspicatum (L.) P. Beauv. var. *fuegianum* Hack. = **Trisetum spicatum** (L.) K. Richt. var. **spicatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum subspicatum (L.) P. Beauv. var. *glabrifolium* Hack. ex Macloskie = **Trisetum spicatum** (L.) K. Richt. var. **spicatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum subspicatum (L.) P. Beauv. subsp. *phleoides* (d'Urv.) Hack. = **Trisetum phleoides** (d'Urv.) Kunth

Trisetum toluccense Kunth var. *tomentosum* E. Desv. = **Koeleria fuegina** C.E. Calderón ex Nicora
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum tomentosum (E. Desv.) Nicora = **Koeleria fuegina** C.E. Calderón ex Nicora
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum trinii (Trin.) Louis-Marie = **Bromus berteroanus** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum trinii (Trin.) Louis-Marie var. *effusum* (E. Desv.) Louis-Marie = **Bromus berteroanus** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum trinii (Trin.) Louis-Marie var. *litorale* (Phil.) Louis-Marie = **Bromus berteroanus** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum trinii (Trin.) Louis-Marie var. *manicatum* (E. Desv.) Louis-Marie = **Bromus berteroanus** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum trinii (Trin.) Louis-Marie var. *micrantherum* (E. Desv.) Louis-Marie = **Bromus berteroanus** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum trinii (Trin.) Louis-Marie var. *pallidiflora* (E. Desv.) Louis-Marie = **Bromus berteroanus** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum trinii (Trin.) Louis-Marie var. *strictum* (E. Desv.) Louis-Marie = **Bromus berteroanus** Colla
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum variabile E. Desv. = **Trisetum caudulatum** Trin. var. **caudulatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum variabile E. Desv. var. *chiloense* (Phil.) Louis-Marie = **Trisetum caudulatum** Trin. var. **caudulatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum variabile E. Desv. var. *flavescens* E. Desv. = **Trisetum caudulatum** Trin. var. **caudulatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

[Trisetum variabile E. Desv. var. intonsum Louis-Marie]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Trisetum variabile E. Desv. var. *vidalii* (Phil.) Louis-Marie = **Trisetum caudulatum** Trin. var. **caudulatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum variabile E. Desv. var. *virescens* E. Desv. = **Trisetum caudulatum** Trin. var. **caudulatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Trisetum vidalii Phil. = **Trisetum caudulatum** Trin. var. **caudulatum**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Tristachya chrysothrix Nees = **Loudetiopsis chrysothryx** (Nees) Conert
Referencias: Renvoize, S. A., 1998.

Tristachya chrysothrix Nees f. *pallida* Hack. = **Loudetiopsis chrysothryx** (Nees) Conert
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Tristachya Nees

Número de especies: 1

Tristachya leiostachya Nees
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Morrone, O. 514* (SI)].

Triticum attenuatum Kunth = **Elymus cordilleranus** Davidse & Pohl
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Triticum condensatum (J. Presl) Kunth = **Elymus scabrifolius** (Döll) J.H. Hunz.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Triticum elongatum Host = **Thinopyrum elongatum** (Host) D.R. Dewey
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Triticum fuegianum Speg. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Triticum fuegianum Speg. var. *patagonicum* Speg. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Triticum glaucum auct. non Desf. ex DC. & Lam. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve

Triticum magellanicum (E. Desv.) Speg. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Triticum magellanicum (E. Desv.) Speg. var. *condensata* (J. Presl) Speg. = **Elymus scabrifolius** (Döll) J.H. Hunz.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Triticum magellanicum (E. Desv.) Speg. var. *festucoides* Speg. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Triticum magellanicum (E. Desv.) Speg. var. *glabrivalva* Speg. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Triticum magellanicum (E. Desv.) Speg. var. *lasiopoda* Speg. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Triticum magellanicum (E. Desv.) Speg. var. *patagonica* (Speg.) De Wild. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Triticum magellanicum (E. Desv.) Speg. var. *pubiflorum* (Steud.) Speg. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Triticum magellanicum (E. Desv.) Speg. var. *secundum* (J. Presl) Speg. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Triticum ponticum Podp. = **Thinopyrum ponticum** (Podp.) Barkworth & D.R. Dewey
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Triticum pubiflorum Steud. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Triticum repens L. = **Elymus repens** (L.) Gould
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Triticum repens L. var. *magellanicum* E. Desv. = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Triticum repens L. var. *scabrifolium* Döll = **Elymus scabrifolius** (Döll) J.H. Hunz.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Triticum repens L. var. *subulatum* Nees = **Elymus repens** (L.) Gould
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Triticum secundum (J. Presl) Kunth = **Elymus magellanicus** (E. Desv.) A. Löve
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Triticum trachycaulum Link = **Elymus trachycaulus** (Link) Gould ex Shinners

Uniola scoparia (Kunth) Steud. = **Distichlis scoparia** (Kunth) Arechav. var. **scoparia**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Uniola spicata L. = **Distichlis spicata** (L.) Greene var. **spicata**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Uniola stricta Torr. = **Distichlis spicata** (L.) Greene var. **stricta** (Torr.) Scribn.
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Urachne aemulans Steud. ex Lechl. = **Nassella gigantea** (Steud.) M. Muñoz
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Urachne chilensis Trin. = **Nassella chilensis** (Trin.) E. Desv.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001.

Urachne depressa Steud. = **Piptochaetium montevidense** (Spreng.) Parodi
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Urachne fusca Nees ex Steud. = **Piptochaetium setosum** (Trin.) Arechav.
Referencias: Cialdella, A. M. & Giussani, L. M., 2002.

Urachne gigantea Steud. = **Nassella gigantea** (Steud.) M. Muñoz
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Urachne grandiflora Steud. & Hochst., nom. nud. = **Piptochaetium bicolor** (Vahl) E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Urachne laevis Trin. & Rupr. = **Nassella meyeniana** (Trin. & Rupr.) Parodi
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Urachne longiflora Steud., nom. nud. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Urachne macranthera Nees ex Steud. = **Nassella trichotoma** (Nees) Hack. ex Arechav.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Urachne major Trin. = **Nassella chilensis** (Trin.) E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Urachne melanocarpa Phil. = **Nassella gigantea** (Steud.) M. Muñoz
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Urachne meyeniana Trin. & Rupr. = **Nassella meyeniana** (Trin. & Rupr.) Parodi
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Urachne panicoides Trin. = **Piptochaetium montevidense** (Spreng.) Parodi
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Urachne panicoides Trin. var. *brasiliensis* Trin. & Rupr. = **Piptochaetium montevidense** (Spreng.) Parodi
Referencias: Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Urachne pubiflora Trin. & Rupr. = **Nassella pubiflora** (Trin. & Rupr.) E. Desv. var. **pubiflora**
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Urachne ramosa Steud., nom. superfl. = **Nassella chilensis** (Trin.) E. Desv.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Urachne setosa Trin., nom. superfl. = **Piptochaetium setosum** (Trin.) Arechav.
Referencias: Cialdella, A. M. & Giussani, L. M., 2002.

[Urachne simplex Trin.]
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Notas: Nombre dudoso.

Urachne simplex Trin. var. *peruviana* Trin. & Rupr. = **Piptochaetium panicoides** (Lam.) E. Desv.
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998.

Urachne stipoides Trin. & Rupr. = **Piptochaetium stipoides** (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**
Referencias: Cialdella, A. M. & Arriaga, M. O., 1998; Mujica Sallés, J., 1996; Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M., 1992.

Urachne trichotoma (Nees) Trin. = **Nassella trichotoma** (Nees) Hack. ex Arechav.
Referencias: Barkworth, M. E. & Torres, M. A., 2001; Torres, M. A., 1997a.

Uralepis brasiliensis Nees ex Steud. = **Tridens brasiliensis** (Nees ex Steud.) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Uralepis quadridentata Döll = **Amphibromus quadridentulus** (Döll) Swallen
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Urochloa P. Beauv.

Número de especies: 15, 9 introducidas

Urochloa adspersa (Trin.) R.D. Webster
Sin.: *Brachiaria adspera* (Trin.) Parodi, *Brachiaria echinulata* (Mez) Parodi, *Panicum adspersum* Trin., *Panicum adspersum* Trin. var. *exile* Lindm., *Panicum adspersum* Trin. var. *neesi* Lindm., *Panicum echinulatum* Mez, *Panicum echinulatum* Mez var. *boliviense* Henrard
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1992; Webster, R. D., 1988.
Hierba. Anual. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, CEN, CON, MIE, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4476* (SI)]; PRY[*Degen, R. 3129* (CTES, FCQ, MO), *Zuloaga, F. O. 7318* (SI)].

Urochloa arrecta (Hack. ex T. Durand & Schinz) Morrone & Zuloaga
Sin.: *Brachiaria arrecta* (Hack. ex T. Durand & Schinz) Stent, *Panicum arrectum* Hack. ex T. Durand
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1999; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2057* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 18165* (HBR)].

Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster
Sin.: *Brachiaria brizantha* (Hochst. ex A. Rich.) Stapf, *Panicum brizanthum* Hochst. ex A. Rich.
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1992, 1999; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–700 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2066* (SI)]; BRA[*Reis, A. 87* (HBR)]; PRY[*Vanni, R. O. 2109* (CTES)].

Urochloa decumbens (Stapf) R.D. Webster
Sin.: *Brachiaria decumbens* Stapf
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1992, 1995; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6877* (SI)]; BRA[*Ribas, O. S. 1862* (ICN)]; PRY[*Lurvey 44* (MO)].

Urochloa dictyoneura (Fig. & De Not.) Veldkamp
Sin.: *Brachiaria dictyoneura* (Fig. & De Not.) Stapf
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zuloaga, F. O. 7288* (SI)].

Urochloa fasciculata (Sw.) R.D. Webster = **Urochloa fusca** (Sw.) B.F. Hansen & Wunderlin
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Urochloa fusca (Sw.) B.F. Hansen & Wunderlin
Sin.: *Brachiaria fasciculata* (Sw.) Parodi, *Brachiaria fasciculata* (Sw.) S.T. Blake, comb. superfl., *Panicum fasciculatum* Sw., *Panicum fuscum* Sw., *Urochloa fasciculata* (Sw.) R.D. Webster
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1992; Webster, R. D., 1987.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); BRA(SCA); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2914* (SI)]; BRA[*Brixen s.n.* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 7177* (BAA)].

Urochloa humidicola (Rendle) Morrone & Zuloaga
Sin.: *Panicum humidicolum* Rendle
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1999; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7028* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 18162* (HBR)].

Urochloa lorentziana (Mez) Morrone & Zuloaga
Sin.: *Brachiaria lorentziana* (Mez) Parodi, *Panicum lorentzianum* Mez, *Panicum velutinosum* Nees f. *violascens* Stuck., *Panicum velutinosum* Nees f. *viride* Stuck.
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1992; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual. Nativa. 100–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4653* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 7129* (BAA)].

Urochloa maxima (Jacq.) R.D. Webster = **Megathyrsus maximus** (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs var. **maximus**

[Urochloa mollis (Sw.) Morrone & Zuloaga]
Sin.: *Brachiaria mollis* (Sw.) Parodi, *Panicum molle* Sw.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Urochloa mosambicensis (Hack.) Dandy
Sin.: *Panicum mosambicense* Hack.
Referencias: Sulekic, A. A., 2004.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–600 m.
Países: ARG(SAL, SDE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4641* (SI)].

Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen
Sin.: *Brachiaria mutica* (Forssk.) Stapf, *Brachiaria purpurascens* (Raddi) Henrard, *Panicum barbinode* Trin., *Panicum equinum* Salzm. ex Steud., *Panicum muticum* Forssk., *Panicum paraguayense* Steud. ex Döll, nom. inval., *Panicum purpurascens* Raddi
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1992; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Webster, R. D., 1987.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–600 m.
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4439* (SI), *Zuloaga, F. O. 7007* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 34360* (MBM)]; PRY[*Rojas, T. 2312* (SI)].

Urochloa panicoides P. Beauv.
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1992; Parodi, L. R., 1969; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Anual. Introducida. 300–700 m.
Países: ARG(COR, JUJ, LPA, SAL, SDE, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 556* (SI), *Morrone, O. 4564* (SI)].

Urochloa paucispicata (Morong) Morrone & Zuloaga
Sin.: *Acroceras paucispicata* (Morong) Henrard, *Brachiaria paucispicata* (Morong) Clayton, *Panicum paucispicatum* Morong
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1992.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); PRY(APY, CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 554* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5884* (CTES, FCQ, SI)].

Urochloa plantaginea (Link) R.D. Webster
Sin.: *Brachiaria plantaginea* (Link) Hitchc., *Panicum plantagineum* Link
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1992; Renvoize, S. A., 1988; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b; Webster, R. D., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CEN); URY(ART, RNO, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4349* (SI), *Zuloaga, F. O. 5703* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 10402* (HBR)]; PRY[*Lurvey 45* (CTES, MO)]; URY[*Majó, B. 17654* (MVFA)].

Urochloa platyphylla (Munro ex C. Wright) R.D. Webster
Sin.: *Brachiaria extensa* Chase, *Brachiaria platyphylla* (Munro ex C. Wright) Nash, *Panicum platyphyllum* Munro ex C. Wright, *Paspalum platyphyllum* Griseb., hom. illeg.
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1992; Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O., 1997.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(RGS); PRY(CEN); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rosa, E. B. s.n.* (UNSL)]; BRA[*Valls, J. F. M. 9672* (SI)]; PRY[*Bordas, E. 1204* (CTES)]; URY[*Rosengurtt, B. 7553b* (F, SI)].

[Urochloa reptans (L.) Stapf]
Sin.: *Panicum prostratum* Lam., *Panicum reptans* L.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Urochloa ruziziensis (R. Germ. & Evrard) Morrone & Zuloaga, comb. superfl. = **Urochloa ruziziensis** (R. Germ. & Evrard) Crins

Urochloa ruziziensis (R. Germ. & Evrard) Crins
Sin.: *Brachiaria ruziziensis* R. Germ. & Evrard, *Urochloa ruziziensis* (R. Germ. & Evrard) Morrone & Zuloaga, comb. superfl.
Referencias: Morrone, O. & Zuloaga, F. O., 1992; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1982b.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 18160* (HBR)].

[Urochloa villosa (Lam.) T.Q. Nguyen]
Sin.: *Brachiaria villosa* (Lam.) A. Camus
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Vahlodea Fr.

Número de especies: 1

Vahlodea atropurpurea (Wahlenb.) Fr. ex Hartmann
Sin.: *Aira atropurpurea* Wahlenb., *Aira atropurpurea* Wahlenb. var. *magellanica* (Hook. f.) Skottsb., *Aira magellanica* Hook. f., nom. nud., *Deschampsia atropurpurea* (Wahlenb.) Scheele
Referencias: Moore, D. M., 1983; Nicora, E. G., 1978; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 253* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Pisano, E. 2988* (CONC)].

Valota hitchcockii Chase = **Digitaria hitchcockii** (Chase) Stuck.
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Valota insularis (L.) Chase = **Digitaria insularis** (L.) Fedde
Referencias: Canto-Dorow, T. S., 2001, 2001; Cavalheiro, E. M. & Barreto, I. L., 1981.

Valota penicilligera (Speg.) Chase ex Parodi = **Digitaria sacchariflora** (Nees) Henrard
Referencias: Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1974.

Vetiveria zizanioides (L.) Nash = **Chrysopogon zizanioides** (L.) Roberty
Referencias: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J., 2003.

Vilfa accuminata Trin. = **Sporobolus acuminatus** (Trin.) Hack. var. **acuminatus**
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.

Vilfa adusta Trin. = **Sporobolus adustus** (Trin.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Mujica Sallés, J., 1996.

Vilfa aenea Trin. = **Sporobolus aeneus** (Trin.) Kunth
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Vilfa aenea Trin. var. *angustifolia* Döll = **Sporobolus aeneus** (Trin.) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981.

Vilfa aenea Trin. var. *latifolia* Döll = **Sporobolus aeneus** (Trin.) Kunth
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.

Vilfa arguta Nees = **Sporobolus pyramidatus** (Lam.) Hitchc.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995; Burkart, A., 1969a.

Vilfa asperifolia Nees & Meyen ex Trin. = **Muhlenbergia asperifolia** (Nees & Meyen ex Trin.) Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Vilfa berteroanana Trin. = **Sporobolus indicus** (L.) R. Br.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.

Vilfa ciliata (J. Presl) Trin., nom. illeg. = **Sporobolus ciliatus** J. Presl
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.

Vilfa ciliata (J. Presl) Trin. var. *grandiflora* Döll = **Sporobolus ciliatus** J. Presl
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.

Vilfa ciliata (J. Presl) Trin. var. *parviflora* Döll = **Sporobolus ciliatus** J. Presl
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.

Vilfa cryptandra (Torr.) Torr. ex Trin. = **Sporobolus cryptandrus** (Torr.) A. Gray

Vilfa elatior Nees = **Sporobolus aeneus** (Trin.) Kunth
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.

Vilfa elegans Kunth = **Agrostis perennans** (Walter) Tuck.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Vilfa exilis Trin. = **Sporobolus indicus** (L.) R. Br.
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.

Vilfa eximia Nees ex Trin. = **Sporobolus eximius** (Nees ex Trin.) Ekman var. **eximius**
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.

Vilfa jacquemontii (Kunth) Trin. = **Sporobolus pyramidalis** P. Beauv.

Vilfa magellanica (Lam.) P. Beauv. = **Agrostis magellanica** Lam.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Vilfa pilifera Trin. = **Sporobolus piliferus** (Trin.) Kunth
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Vilfa ramulosa Kunth = **Muhlenbergia ramulosa** (Kunth) Swallen
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Vilfa rigens Trin. = **Sporobolus rigens** (Trin.) E. Desv. var. **rigens**
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Vilfa rupestris Trin. = **Sporobolus ciliatus** J. Presl
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.

Vilfa spartinae Trin. = **Spartina spartinae** (Trin.) Merr. ex Hitchc.

Vilfa virginica (L.) P. Beauv. = **Sporobolus virginicus** (L.) Kunth
Referencias: Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M., 1995.

Vulpia C.C. Gmel.

Número de especies: 6, 2 endémicas, 2 introducidas

Vulpia antofagastensis Parodi = **Vulpia octoflora** (Walter) Rydb.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Vulpia antucensis Trin.
Sin.: *Festuca antucensis* (Trin.) Steud., *Festuca eriolepis* E. Desv., *Festuca eriolepis* E. Desv. var. *nana* Hieron., *Vulpia australis* (Nees ex Steud.) C.H. Blom var. *nana* (Hieron.) Parodi, *Vulpia eriolepis* (E. Desv.) C.H. Blom, *Vulpia eriolepis* (E. Desv.) C.H. Blom f. *glabrata* C.H. Blom, *Vulpia eriolepis* (E. Desv.) C.H. Blom f. *nana* (Hieron.) C.H. Blom, *Vulpia eriolepis* (E. Desv.) Henrard, comb. superfl.
Referencias: Nicora, E. G., 1978; Parodi, L. R., 1956a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(II, IV, V, VIII, IX, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 3231* (BAA, BAB), *Piccinini, B. 1213* (BAB)]; CHL[*Gay, C. 304* (P, US), *Jiles, C. 5666* (CONC)].

Vulpia australis (Nees ex Steud.) C.H. Blom
Sin.: *Festuca australis* Nees ex Steud., *Festuca delicatula* auct. non Lag., *Festuca tenella* auct. non Willd.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G., 1978; Parodi, L. R., 1956a; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 0–2300 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, LPA, SLU); BRA(RGS, SCA); URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. s.n.* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 15794* (HBR, US)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 1604* (MVFA)].

Vulpia australis (Nees ex Steud.) C.H. Blom var. *nana* (Hieron.) Parodi = **Vulpia antucensis** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Vulpia bromoides (L.) Gray
Sin.: *Bromus dertonensis* All., *Festuca bromoides* L., *Festuca dertonensis* (All.) Asch. & Graebn., *Festuca geniculata* Willd. var. *monandra* Döll, *Festuca sciuroides* Roth, *Vulpia dertonensis* (All.) Gola, *Vulpia sciuroides* (Roth) C.C. Gmel.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, NEU, RNE, SCR, SLU, TDF, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF, RME); URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 10101* (BAA)]; BRA[*Reitz, P. R. 7862* (HBR, US)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996062* (CONC), *Gunckel, L. H. 20383* (SQF)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 1300* (MVFA)].

Vulpia dertonensis (All.) Gola = **Vulpia bromoides** (L.) Gray
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Vulpia eriolepis (E. Desv.) C.H. Blom = **Vulpia antucensis** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Vulpia eriolepis (E. Desv.) Henrard, comb. superfl. = **Vulpia antucensis** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Vulpia eriolepis (E. Desv.) C.H. Blom f. *glabrata* C.H. Blom = **Vulpia antucensis** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Vulpia eriolepis (E. Desv.) C.H. Blom f. *nana* (Hieron.) C.H. Blom = **Vulpia antucensis** Trin.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Vulpia megalura (Nutt.) Rydb. = **Vulpia myuros** (L.) C.C. Gmel. var. **megalura** (Nutt.) Auquier
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Vulpia muralis (Kunth) Henrard, comb. superfl. = **Vulpia muralis** (Kunth) Nees

Vulpia muralis (Kunth) Nees
Sin.: *Festuca myuros* L. var. *muralis* Kunth ex Speg., *Vulpia muralis* (Kunth) Henrard, comb. superfl.
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1900 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 23852* (CONC)].
Notas: Citada para Argentina y Brasil sin mencionar localidad o ejemplar de referencia (Soreng et al., 2003).

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. f. *megalura* (Nutt.) Stace & R. Cotton = **Vulpia myuros** (L.) C.C. Gmel. var. **megalura** (Nutt.) Auquier
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. var. **hirsuta** Hack.
Referencias: Baeza, C. M., Stuessy, T. F. & Marticorena, C., 2002; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: CHL(II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pisano, E. 387* (CONC)].

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. var. **megalura** (Nutt.) Auquier
Sin.: *Festuca commutata* Steud., hom. illeg., *Festuca megalura* Nutt., *Vulpia megalura* (Nutt.) Rydb., *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. f. *megalura* (Nutt.) Stace & R. Cotton
Referencias: Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003; Stace, C. A. & Cotton, R., 1976.
Hierba. Anual. Introducida. 0–3800 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); URY(CLA, COL, DUR, FLO, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3413* (SI)]; BRA[*Swallen, J. R. 7365* (US)]; CHL[*Muñoz-Pizarro, C. 1305* (SGO)]; URY[*Izaguirre de Artuccio, P. 59b* (MVFA)].

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. var. **myuros**
Sin.: *Festuca muralis* Kunth, *Festuca myuros* L.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Longhi-Wagner, H. M., 1987; Mujica Sallés, J., 1996; Nicora, E. G., 1978; Parodi, L. R., 1956a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M., 1981; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–3400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, IDE, IJF, RME); URY(CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Calderón 273* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 13588* (HBR, R, US)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 994853* (CONC), *Vidal s.n.* (SGO)]; URY[*Costa 6602* (MVFA)].

Vulpia octoflora (Walter) Rydb.
Sin.: *Festuca octoflora* Walter, *Vulpia antofagastensis* Parodi
Referencias: Nicora, E. G., 1970h; Parodi, L. R., 1956a; Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, MEN); CHL(II, IV).

Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 10851* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 108* (CONC)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o material de referencia (Soreng et al., 2003).

Vulpia sciuroides (Roth) C.C. Gmel. = **Vulpia bromoides** (L.) Gray
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Willbleibia stolonifera (Parodi) Herter = **Willkommia texana** Hitchc. var. **stolonifera** Parodi
Referencias: Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001.

Willkommia Hack.

Número de especies: 1

Willkommia texana Hitchc. var. **stolonifera** Parodi
Sin.: *Craspedorhachis texana* (Hitchc.) Pilg. var. *stolonifera* (Parodi) Pilg., *Willbleibia stolonifera* (Parodi) Herter
Referencias: Herter, W. G. F., 1949–1956; Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J., 2001; Rosengurtt, B., Arrillaga de Maffei, B. R. & Izaguirre, P., 1970.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); URY(RNO, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 4975* (SI, US)]; URY[*Rosengurtt, B. 6951* (MVFA)].

Zerna unioloides (Kunth) Lindm. = **Bromus catharticus** Vahl var. **catharticus**
Referencias: Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O., 2003.

Zizania bonariensis Balansa & Poitr. = **Zizaniopsis bonariensis** (Balansa & Poitr.) Speg.
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000.

Zizania microstachya Nees ex Trin. = **Zizaniopsis microstachya** (Nees ex Trin.) Döll & Asch.
Referencias: Renvoize, S. A., 1988.

Zizaniopsis Döll & Asch.

Número de especies: 3, 1 endémica

Zizaniopsis bonariensis (Balansa & Poitr.) Speg.
Sin.: *Zizania bonariensis* Balansa & Poitr.
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Quarín, C. L., 1976.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE); BRA(RGS); URY(CLA, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 4338* (CTES)]; BRA[*Valls, J. F. M. 3024* (ICN)]; URY[*Rosengurtt, B. 7753b* (MVFA)].

Zizaniopsis microstachya (Nees ex Trin.) Döll & Asch.
Sin.: *Zizania microstachya* Nees ex Trin.
Referencias: Longhi-Wagner, H. M. & Lerina, R., 2001; Renvoize, S. A., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 28427* (MBM)].

Zizaniopsis villanensis Quarín
Referencias: Judziewicz, E. J., Soreng, R. J., Davidse, G., Peterson, P. M., Filgueiras, T. S. & Zuloaga, F. O., 2000; Quarín, C. L., 1976.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(CHA, COS, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Quarín, C. L. 2943* (BAA, CTES, K, SI, US)].

PONTEDERIACEAE

Autores: Horn, C. N. & Haynes, R. R.

3 géneros, 10 especies.

Buchosia aquatica Vell. = **Heteranthera reniformis** Ruiz & Pav.
Referencias: Castellanos, A., 1959; Horn, C. N., 1987.

Eichhornia Kunth

Número de especies: 3

Eichhornia azurea (Sw.) Kunth
Sin.: *Piaropus azureus* (Sw.) Raf., *Pontederia aquatica* Vell., *Pontederia azurea* Sw.
Referencias: Castellanos, A. & Klein, R. M., 1967; Castellanos, A., 1951a, 1959; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fernández Casas, F. J., 1988; Horn, C. N., 1987; Schulz, A. G., 1942.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA); URY(CAS, CLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 1680* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 16614* (HBR)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6141* (SI, US)]; URY[*Castellanos, A. 18623* (LIL)].

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
Sin.: *Eichhornia speciosa* Kunth, *Heteranthera formosa* Miq., *Piaropus mesomelas* Raf., *Pontederia crassipes* Mart.

Referencias: Castellanos, A. & Klein, R. M., 1967; Castellanos, A., 1951a, 1959; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fernández Casas, F. J., 1988; Horn, C. N., 1987; Schulz, A. G., 1942; Simpson, D. A. & Sanderson, H., 2002.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(III, IV, V, VIII); PRY(CEN, CON, GUA, PHA, SPE); URY(ART, CAS, MON, RNO, ROC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 1650* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 3641* (HBR)]; CHL[*Junge, C. 2766* (LIL)]; PRY[*Mereles, F. 1003* (SI), *Woolston, A. L. 1253* (US)]; URY[*Felippone, F. 3323* (SI)].

Eichhornia martiana Seub. = **Eichhornia paniculata** (Spreng.) Solms

Eichhornia meyeri A.G. Schulz
Sin.: *Eichhornia paniculata* auct. non (Spreng.) Solms
Referencias: Horn, C. N., 1998a, b; Schulz, A. G., 1942.
Hierba acuática. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, MIS, SAL); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 2640* (GH, SI)]; PRY[*Morong, T. 964* (MO, NY)].

Eichhornia paniculata auct. non (Spreng.) Solms = **Eichhornia meyeri** A.G. Schulz
Referencias: Horn, C. N., 1998a.

[Eichhornia paniculata (Spreng.) Solms]
Sin.: *Eichhornia martiana* Seub., *Eichhornia tricolor* Seub., *Pontederia paniculata* Spreng.
Referencias: Horn, C. N., 1994, 1998a.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Eichhornia speciosa Kunth = **Eichhornia crassipes** (Mart.) Solms
Referencias: Castellanos, A., 1959; Horn, C. N., 1987.

Eichhornia subovata Seub. = **Pontederia subovata** (Seub.) Lowden
Referencias: Horn, C. N., 1987; Lowden, R. M., 1973.

Eichhornia tricolor Seub. = **Eichhornia paniculata** (Spreng.) Solms

Heterandra reniformis P. Beauv. = **Heteranthera reniformis** Ruiz & Pav.
Referencias: Horn, C. N., 1987.

Heteranthera Ruiz & Pav.

Número de especies: 4

Heteranthera acuta Willd. = **Heteranthera reniformis** Ruiz & Pav.
Referencias: Horn, C. N., 1987.

Heteranthera alismoides Humb. ex Link = **Heteranthera limosa** (Sw.) Willd.
Referencias: Horn, C. N., 1987.

Heteranthera formosa Miq. = **Eichhornia crassipes** (Mart.) Solms
Referencias: Horn, C. N., 1987.

Heteranthera limosa (Sw.) Willd.
Sin.: *Heteranthera alismoides* Humb. ex Link, *Heteranthera limosa* (Sw.) Willd. f. *albiflora* Benke, *Leptanthus ovalis* Michx., *Lunania uniflora* Raf., nom. illeg., *Phrynium limosum* (Sw.) Kuntze, *Pontederia limosa* Sw., *Pontederia triandra* Banks ex Mart., *Schollera limosa* (Sw.) Raf., *Triexastima uniflora* Raf.
Referencias: Castellanos, A., 1951a, 1959; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Horn, C. N., 1987; Schulz, A. G., 1942.
Hierba acuática. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(RGS); PRY(APY, CEN, COA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3801* (SI)]; BRA[*Reineck, E. M. s.n.* (BAF)]; PRY[*Hassler, E. 12640* (BAF, BM, C, G, GH, MO, NY, S, US), *Hassler, E. 172* (G, SI)].

Heteranthera limosa (Sw.) Willd. f. *albiflora* Benke = **Heteranthera limosa** (Sw.) Willd.
Referencias: Horn, C. N., 1987.

Heteranthera multiflora (Griseb.) Horn
Sin.: *Heteranthera peduncularis* auct. non Benth., *Heteranthera reniformis* Ruiz & Pav. var. *multiflora* Griseb.
Referencias: Castellanos, A., 1959; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Horn, C. N., 1986, 1987.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, JUJ, SAL, SFE, TUC); BRA(RGS); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 1660* (LP, SI)]; BRA[*Rambo, B. 39380* (LIL)]; PRY[*Schinini, A. 14847* (CTES)].

Heteranthera osteniana Herter = **Heteranthera zosterifolia** Mart.
Referencias: Horn, C. N., 1987; Schulz, A. G., 1942.

Heteranthera peduncularis auct. non Benth. = **Heteranthera multiflora** (Griseb.) Horn
Referencias: Horn, C. N., 1986.

Heteranthera reniformis Ruiz & Pav.
Sin.: *Buchosia aquatica* Vell., *Heterandra reniformis* P. Beauv., *Heteranthera acuta* Willd., *Heteranthera virginica* (Pers.) Steud., *Leptanthus peruviana* Pers., *Leptanthus reniformis* (P. Beauv.) Michx., *Leptanthus virginica* Pers., *Phrynium reniformis* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Phrynium reniformis* (Ruiz & Pav.) Kuntze var. *acuta* (Willd.) Kuntze, *Schollera reniformis* (Ruiz & Pav.) Kuntze
Referencias: Castellanos, A. & Klein, R. M., 1967; Castellanos, A., 1951a, 1959; Fernández Casas, F. J., 1988; Horn, C. N., 1987; Schulz, A. G., 1942.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE); URY(CLA, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 99* (BAF, SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 4640* (HBR)]; PRY[*Pedersen, T. M. 7692* (A, C, S, SI), *Woolston, A. L. 604* (C, K, NY, S, U)]; URY[*Lombardo, A. s.n.* (MVM)].

Heteranthera reniformis Ruiz & Pav. var. *multiflora* Griseb. = **Heteranthera multiflora** (Griseb.) Horn
Referencias: Horn, C. N., 1986.

Heteranthera virginica (Pers.) Steud. = **Heteranthera reniformis** Ruiz & Pav.
Referencias: Horn, C. N., 1987.

Heteranthera zosterifolia Mart.
Sin.: *Heteranthera osteniana* Herter, *Schollera zosterifolia* (Mart.) Kuntze
Referencias: Castellanos, A. & Klein, R. M., 1967; Castellanos, A., 1951a, 1959; Herter, W. G. F., 1928; Horn, C. N., 1987; Schulz, A. G., 1942.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, PAI); URY(LAV, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1654* (SI), *Tur, N. M. 2005* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 34846* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 4728* (B, BM, LE)]; URY[*Herter, W. G. F. 1351* (SI)].

Leptanthus ovalis Michx. = **Heteranthera limosa** (Sw.) Willd.
Referencias: Castellanos, A., 1959; Horn, C. N., 1987.

Leptanthus peruviana Pers. = **Heteranthera reniformis** Ruiz & Pav.
Referencias: Horn, C. N., 1987.

Leptanthus reniformis (P. Beauv.) Michx. = **Heteranthera reniformis** Ruiz & Pav.
Referencias: Castellanos, A., 1959; Horn, C. N., 1987.

Leptanthus virginica Pers. = **Heteranthera reniformis** Ruiz & Pav.
Referencias: Horn, C. N., 1987.

Lunania uniflora Raf., nom. illeg. = **Heteranthera limosa** (Sw.) Willd.
Referencias: Horn, C. N., 1987.

Narukila cordata (L.) Nieuwl. = **Pontederia cordata** L. var. **cordata**
Referencias: Horn, C. N., 1987; Lowden, R. M., 1973.

Phrynium limosum (Sw.) Kuntze = **Heteranthera limosa** (Sw.) Willd.
Referencias: Castellanos, A., 1959.

Phrynium reniformis (Ruiz & Pav.) Kuntze = **Heteranthera reniformis** Ruiz & Pav.
Referencias: Castellanos, A., 1959; Horn, C. N., 1987.

Phrynium reniformis (Ruiz & Pav.) Kuntze var. *acuta* (Willd.) Kuntze = **Heteranthera reniformis** Ruiz & Pav.
Referencias: Horn, C. N., 1987.

Piaropus azureus (Sw.) Raf. = **Eichhornia azurea** (Sw.) Kunth
Referencias: Horn, C. N., 1987; Schulz, A. G., 1942.

Piaropus mesomelas Raf. = **Eichhornia crassipes** (Mart.) Solms
Referencias: Horn, C. N., 1987.

Pontederia L.

Número de especies: 3

Pontederia angustifolia Pursh = **Pontederia cordata** L. var. **cordata**
Referencias: Lowden, R. M., 1973.

Pontederia aquatica Vell. = **Eichhornia azurea** (Sw.) Kunth
Referencias: Horn, C. N., 1987.

Pontederia azurea Sw. = **Eichhornia azurea** (Sw.) Kunth
Referencias: Horn, C. N., 1987; Schulz, A. G., 1942.

Pontederia cordata L. f. *brasiliensis* Solms = **Pontederia cordata** L. var. **cordata**
Referencias: Lowden, R. M., 1973.

Pontederia cordata L. var. *angustifolia* (Pursh) Torr. = **Pontederia cordata** L. var. **cordata**
Referencias: Lowden, R. M., 1973.

Pontederia cordata L. var. **cordata**
Sin.: *Narukila cordata* (L.) Nieuwl., *Pontederia angustifolia* Pursh, *Pontederia cordata* L. f. *brasiliensis* Solms, *Pontederia cordata* L. var. *angustifolia* (Pursh) Torr., *Pontederia cordata* L. var. *lanceolata* Griseb., *Pontederia cordata* L. var. *lancifolia* (Muhl.) Torr., *Pontederia lanceolata* Nutt., *Pontederia lanceolata* Nutt. f. *brasiliensis* (Solms) Fernald, *Pontederia lancifolia* Muhl., *Pontederia nymphaeifolia* Kunth, *Pontederia rotundifolia* L. f. var. *nymphaeifolia* (Kunth) Solms, *Unisema cordata* (L.) Farw., *Unisema media* Raf.
Referencias: Castellanos, A., 1951a, 1959; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fernández Casas, F. J., 1988; Horn, C. N., 1987; Lowden, R. M., 1973.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MEN, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MAL, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 1648* (LP, SI)]; BRA[*Smith, L. B. 9468* (US)]; PRY[*Hassler, E. 7849* (MO, NY, S), *West, J. 8548* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 522* (F, GH, MO, NY, WIS)].

Pontederia cordata L. var. *lanceolata* Griseb. = **Pontederia cordata** L. var. **cordata**
Referencias: Horn, C. N., 1987.

Pontederia cordata L. var. *lancifolia* (Muhl.) Torr. = **Pontederia cordata** L. var. **cordata**
Referencias: Horn, C. N., 1987.

Pontederia cordata L. var. **ovalis** (Mart.) Solms
Sin.: *Pontederia lanceolata* Nutt. f. *ovalis* (Mart.) A. Cast., *Pontederia lanceolata* Nutt. var. *vichadensis* F.J. Herm., *Pontederia ovalis* Mart.
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; Horn, C. N., 1987; Lowden, R. M., 1973.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, RGS); PRY(CAN); URY(CAS, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ferrucci, M. S. 1233* (CTES)]; BRA[*Rambo, B. 40141* (GH, US)]; PRY[*Hassler, E. 5112* (G, GH, NY, S)]; URY[*Bartlett, H. H. 20865* (GH, US)].

Pontederia cordifolia Mart. = **Pontederia rotundifolia** L. f.
Referencias: Horn, C. N., 1987; Lowden, R. M., 1973.

Pontederia crassipes Mart. = **Eichhornia crassipes** (Mart.) Solms
Referencias: Castellanos, A., 1959; Horn, C. N., 1987.

Pontederia eriantha Miq. = **Pontederia rotundifolia** L. f.
Referencias: Horn, C. N., 1987; Lowden, R. M., 1973.

Pontederia lanceolata Nutt. = **Pontederia cordata** L. var. **cordata**
Referencias: Horn, C. N., 1987.

Pontederia lanceolata Nutt. f. *brasiliensis* (Solms) Fernald = **Pontederia cordata** L. var. **cordata**
Referencias: Lowden, R. M., 1973.

Pontederia lanceolata Nutt. f. *ovalis* (Mart.) A. Cast. = **Pontederia cordata** L. var. **ovalis** (Mart.) Solms
Referencias: Horn, C. N., 1987; Lowden, R. M., 1973.

Pontederia lanceolata Nutt. var. *vichadensis* F.J. Herm. = **Pontederia cordata** L. var. **ovalis** (Mart.) Solms
Referencias: Horn, C. N., 1987; Lowden, R. M., 1973.

Pontederia lancifolia Muhl. = **Pontederia cordata** L. var. **cordata**
Referencias: Horn, C. N., 1987.

Pontederia limosa Sw. = **Heteranthera limosa** (Sw.) Willd.
Referencias: Castellanos, A., 1959; Horn, C. N., 1987.

Pontederia nymphaeifolia Kunth = **Pontederia cordata** L. var. **cordata**
Referencias: Horn, C. N., 1987; Lowden, R. M., 1973.

[Pontederia oblonga Larrañaga]
Referencias: Lowden, R. M., 1973.
Notas: Nombre dudoso.

Pontederia ovalis Mart. = **Pontederia cordata** L. var. **ovalis** (Mart.) Solms
Referencias: Horn, C. N., 1987; Lowden, R. M., 1973.

Pontederia paniculata Spreng. = **Eichhornia paniculata** (Spreng.) Solms

Pontederia renniformis Larrañaga = **Pontederia rotundifolia** L. f.
Referencias: Lowden, R. M., 1973.

Pontederia rotundifolia L. f.
Sin.: *Pontederia cordifolia* Mart., *Pontederia eriantha* Miq., *Pontederia renniformis* Larrañaga, *Reussia grazielae* Machado, *Reussia rotundifolia* (L. f.) A. Cast.
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fernández Casas, F. J., 1988; Horn, C. N., 1987; Lowden, R. M., 1973; Schulz, A. G., 1942.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR); PRY(CEN, CON, COA, ÑEE, PHA); URY(CAS, LAV, MON, ROC, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 1658* (LP, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 8078* (US)]; PRY[*Hassler, E. 3693* (NY), *Mereles, F. 1191* (SI)]; URY[*Lombardo, A. 2416* (MVFA)].

Pontederia rotundifolia L. f. var. *nymphaeifolia* (Kunth) Solms = **Pontederia cordata** L. var. **cordata**
Referencias: Lowden, R. M., 1973.

Pontederia subovata (Seub.) Lowden
Sin.: *Eichhornia subovata* Seub., *Reussia subovata* (Seub.) Solms
Referencias: Castellanos, A., 1959; Fernández Casas, F. J., 1988; Horn, C. N., 1987; Lowden, R. M., 1973.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(APY, CEN, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 1665* (LP, SI)]; BRA[*Miguel, I. G. 23* (F, G, GH, SI, SI, US)]; PRY[*Hassler, E. 120* (G, SI), *Hassler, E. 7352* (G, NY, S)].

Pontederia triandra Banks ex Mart. = **Heteranthera limosa** (Sw.) Willd.
Referencias: Horn, C. N., 1987.

Reussia grazielae Machado = **Pontederia rotundifolia** L. f.
Referencias: Horn, C. N., 1987; Lowden, R. M., 1973.

Reussia rotundifolia (L. f.) A. Cast. = **Pontederia rotundifolia** L. f.
Referencias: Horn, C. N., 1987; Lowden, R. M., 1973.

Reussia subovata (Seub.) Solms = **Pontederia subovata** (Seub.) Lowden
Referencias: Horn, C. N., 1987; Lowden, R. M., 1973.

Schollera limosa (Sw.) Raf. = **Heteranthera limosa** (Sw.) Willd.
Referencias: Horn, C. N., 1987.

Schollera reniformis (Ruiz & Pav.) Kuntze = **Heteranthera reniformis** Ruiz & Pav.
Referencias: Horn, C. N., 1987.

Schollera zosterifolia (Mart.) Kuntze = **Heteranthera zosterifolia** Mart.
Referencias: Horn, C. N., 1987.

Triexastima uniflora Raf. = **Heteranthera limosa** (Sw.) Willd.
Referencias: Horn, C. N., 1987.

Unisema cordata (L.) Farw. = **Pontederia cordata** L. var. **cordata**
Referencias: Horn, C. N., 1987; Lowden, R. M., 1973.

Unisema media Raf. = **Pontederia cordata** L. var. **cordata**
Referencias: Horn, C. N., 1987.

POTAMOGETONACEAE

Autor: Haynes, R. R.

2 géneros, 12 especies, 2 especies endémicas, 1 especie introducida.

Coleogeton filiformis (Pers.) Les & R.R. Haynes = **Stuckenia filiformis** (Pers.) Börner subsp. **filiformis**
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 2003.

Coleogeton pectinatus (L.) Les & R.R. Haynes = **Stuckenia pectinata** (L.) Börner
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Coleogeton striatus (Ruiz & Pav.) Les & R.R. Haynes = **Stuckenia striata** (Ruiz & Pav.) Holub
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton L.

Número de especies: 9, 2 endémicas, 1 introducida

[Potamogeton amplifolius Tuck.]
Referencias: Tur, N. M., 1996; Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Potamogeton apicalis Hagstr. = **Potamogeton ferrugineus** Hagstr.
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton aschersonii A. Benn. = **Potamogeton pusillus** L.
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton aulacophyllum K. Schum. = **Stuckenia filiformis** (Pers.) Boehm. subsp. **alpina** (Blytt) R.R. Haynes, Les & M. Král
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton australis F. Phil. = **Stuckenia striata** (Ruiz & Pav.) Holub
Referencias: Tur, N. M., 1982; Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton badiovirens Hagstr. = **Potamogeton linguatus** Hagstr.
Referencias: Tur, N. M., 1982; Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton berteroanus Phil. = **Potamogeton pusillus** L.
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton burkartii Horn ex Tur = **Potamogeton gayi** A. Benn.
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton crispus L.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 2003; Tur, N. M., 1982; Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.
Hierba acuática. Anual o bianual. Introducida. 0–100 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 1881* (C)].

Potamogeton diffusus (Hagstr.) Herter = **Stuckenia pectinata** (L.) Börner
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton dissimilis A. Benn. = **Stuckenia striata** (Ruiz & Pav.) Holub
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

[Potamogeton diversifolius Raf.]
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Potamogeton dunicola Tur = **Potamogeton illinoensis** Morong
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton ferrugineus Hagstr.
Sin.: *Potamogeton apicalis* Hagstr., *Potamogeton illinoensis* Morong var. *ventanicolus* (Hicken) Horn ex Tur, *Potamogeton lucens* L. var. *ventanicolus* Hicken, *Potamogeton spoliatus* Hagstr.

Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 2003; Tur, N. M., 1969[1968], 1982; Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998; Wiegleb, G., 1988.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, RNE, SCR, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(XI); URY(COL, FLA, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4608* (SI)]; BRA[*Lindeman, J. C. 8570* (LP)]; CHL[*Donat, A. 518* (G)]; URY[*Berro, M. B. 844* (C)].

Potamogeton filiformis Pers. = **Stuckenia filiformis** (Pers.) Börner subsp. **filiformis**
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 2003.

[Potamogeton fluitans Roth subsp. americanus Cham. & Schltdl.]
Referencias: Tur, N. M., 1996.
Notas: Subespecie excluida del área del proyecto. Posible híbrido (Wiegleb & Kaplan, 1998).

[Potamogeton fluitans Roth subsp. fluitans]
Referencias: Tur, N. M., 1996.
Notas: Subespecie excluida del área del proyecto. Posible híbrido (Wiegleb & Kaplan, 1998).

[Potamogeton friesii Rupr.]
Sin.: *Potamogeton mucronatus* Schrad.
Referencias: Tur, N. M., 1996; Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Potamogeton gayi A. Benn.
Sin.: *Potamogeton burkartii* Horn ex Tur
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 2003; Tur, N. M., 1982, 1990; Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998; Wiegleb, G., 1988.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SFE); BRA(RGS, SCA); CHL(IX); PRY(CEN, MIE); URY(DUR, MON, ROC, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 34910* (SI)]; BRA[*Lindman, C. A. M. 821* (R, S, UPS, Z)]; CHL[*Middleton, D. J. s.n.* (S)]; PRY[*Hassler, E. 1* (SI), *Pedersen, T. M. 4343* (CTES)]; URY[*Arechavaleta, J. 2506* (SI)].

Potamogeton illinoensis Morong
Sin.: *Potamogeton dunicola* Tur, *Potamogeton pedersenii* Tur
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1986a, 2003; Tur, N. M., 1982; Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998; Wiegleb, G., 1988.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, RNE); BRA(PAR); CHL(V, IX, X, XII); PRY(CON); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 6993* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 4942* (US)]; CHL[*Kausel, E. M. L. 4177* (F, S)]; PRY[*Brunner, D. R. 1782* (MO)]; URY[*sin colector s.n.* (MVFA)].

Potamogeton illinoensis Morong var. *ventanicolus* (Hicken) Horn ex Tur = **Potamogeton ferrugineus** Hagstr.
Referencias: Tur, N. M., 1969[1968], 1990.

Potamogeton juncifolius A. Kern. ex C. Fritsch = **Stuckenia filiformis** (Pers.) Boehm. subsp. **alpina** (Blytt) R.R. Haynes, Les & M. Král
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton linguatus Hagstr.
Sin.: *Potamogeton badiovirens* Hagstr., *Potamogeton montanus* C. Presl, *Potamogeton natans* auct. non L.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 2003; Moore, D. M., 1974; Tur, N. M., 1982; Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998; Wiegleb, G., 1988.
Hierba acuática. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26452* (SI)]; CHL[*Borge, O. 116* (S, SI)].

[Potamogeton lucens L.]
Referencias: Tur, N. M., 1996; Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Potamogeton lucens L. var. *ventanicolus* Hicken = **Potamogeton ferrugineus** Hagstr.
Referencias: Tur, N. M., 1982.

Potamogeton marinus L. f. *alpinus* Blytt = **Stuckenia filiformis** (Pers.) Boehm. subsp. **alpina** (Blytt) R.R. Haynes, Les & M. Král

Potamogeton montanus C. Presl = **Potamogeton linguatus** Hagstr.
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton montevidensis A. Benn.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 2003; Tur, N. M., 1982; Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998; Wiegleb, G., 1988.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(COS); BRA(SCA); CHL(VIII); PRY(sin localidad); URY(SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 6504* (LP)]; BRA[*Ule, E. H. G. 1308* (HBG, P)]; CHL[*Reiche, C. F. s.n.* (SGO)]; PRY[*Legrand, C. M. D. E. 1367* (F)]; URY[*Arechavaleta, J. 2509* (SI)].

Potamogeton mucronatus Schrad. = **Potamogeton friesii** Rupr.
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

[Potamogeton natans L.]
Referencias: Tur, N. M., 1969[1968]; Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Potamogeton natans auct. non L. = **Potamogeton linguatus** Hagstr.
Referencias: Moore, D. M., 1974, 1983.

[Potamogeton obtusifolius Mert. & Koch]
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Potamogeton palustris Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d.
Notas: Nombre dudoso.

Potamogeton pectinatus L. = **Stuckenia pectinata** (L.) Börner
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton pectinatus L. var. *diffusus* Hagstr. = **Stuckenia pectinata** (L.) Börner
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton pectinatus L. var. *striatus* (Ruiz & Pav.) Hagstr. = **Stuckenia striata** (Ruiz & Pav.) Holub
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton pectinatus L. var. *ungulatus* Hagstr. = **Stuckenia striata** (Ruiz & Pav.) Holub
Referencias: Tur, N. M., 1982.

Potamogeton pedersenii Tur = **Potamogeton illinoensis** Morong
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton polygonus Cham. & Schltdl.
Sin.: *Potamogeton pseudopolygonus* Hagstr.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 2003; Tur, N. M., 1982; Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, SCA); URY(DUR, FLA, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Renvoize, S. A. 3188* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 10849* (G, GH, MO, NY, S)]; URY[*Burkart, A. 26528* (SI)].

Potamogeton pseudopolygonus Hagstr. = **Potamogeton polygonus** Cham. & Schltdl.
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton pusillus L.
Sin.: *Potamogeton aschersonii* A. Benn., *Potamogeton berteroanus* Phil., *Potamogeton pusillus* L. var. *argentinus* A. Benn., *Potamogeton pusillus* L. var. *longepedunculatus* Hicken, *Potamogeton tenuifolius* F. Phil., *Potamogeton uruguayensis* A. Benn. & Graebn.
Referencias: Bennett, A., 1908; Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1986a, 2003; Tur, N. M., 1969[1968], 1982; Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998; Wiegleb, G., 1988.
Hierba acuática. Anual o bianual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME); PRY(CEN); URY(FLO, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27763* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13703* (BM, S, US)]; CHL[*Ricardo, M. 8883* (S)]; PRY[*Hassler, E. 12426* (C, G, GH)]; URY[*Osten, C. 2890* (MVM, SI)].

Potamogeton pusillus L. var. *argentinus* A. Benn. = **Potamogeton pusillus** L.
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton pusillus L. var. *longepedunculatus* Hicken = **Potamogeton pusillus** L.
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

[Potamogeton pusillus L. var. sphaerocarpus K. Schum.]
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.
Notas: Nombre dudoso. Posible sinónimo de *Potamogeton pusillus* L.

[Potamogeton pusillus L. var. tenuifolius K. Schum.]
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.
Notas: Nombre dudoso. Posible sinónimo de *Potamogeton pusillus* L.

Potamogeton reniacoensis Sparre = **Potamogeton spirilliformis** Hagstr.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 2003.

Potamogeton spirilliformis Hagstr.
Sin.: *Potamogeton reniacoensis* Sparre
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 2003; Tur, N. M., 1982; Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.
Hierba acuática. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI); BRA(RGS); CHL(V); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 11734* (CTES)]; BRA[*Lindman, C. A. M. 1247* (SI)]; CHL[*Paulsen, F. s.n.* (SGO)]; URY[*Burkart, A. 19989* (SI)].

Potamogeton spoliatus Hagstr. = **Potamogeton ferrugineus** Hagstr.
Referencias: Tur, N. M., 1982; Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton striatus Ruiz & Pav. = **Stuckenia striata** (Ruiz & Pav.) Holub
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton strictus Phil. = **Stuckenia filiformis** (Pers.) Boehm. subsp. **alpina** (Blytt) R.R. Haynes, Les & M. Král
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton strictus Phil. var. *magellanicus* Hagstr. = **Stuckenia filiformis** (Pers.) Boehm. subsp. **alpina** (Blytt) R.R. Haynes, Les & M. Král
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton tenuifolius F. Phil. = **Potamogeton pusillus** L.
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Potamogeton uruguayensis A. Benn. & Graebn. = **Potamogeton pusillus** L.
Referencias: Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.

Stuckenia Börner

Número de especies: 3

Stuckenia filiformis (Pers.) Boehm. subsp. **alpina** (Blytt) R.R. Haynes, Les & M. Král

Sin.: *Potamogeton aulacophyllum* K. Schum., *Potamogeton juncifolius* A. Kern. ex C. Fritsch, *Potamogeton marinus* L. f. *alpinus* Blytt, *Potamogeton strictus* Phil., *Potamogeton strictus* Phil. var. *magellanicus* Hagstr.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Haynes, R. R., Les, D. H. & Král, M., 1998; Holub, J. L., 1997; Tur, N. M., 1982; Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 200–4000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC); CHL(II, III, IV, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31844* (SI)]; CHL[*Muñoz-Schick, M. 3863* (SGO), *Werdermann, E. 988* (SI)].

[Stuckenia filiformis (Pers.) Börner subsp. filiformis]
Sin.: *Coleogeton filiformis* (Pers.) Les & R.R. Haynes, *Potamogeton filiformis* Pers.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 2003.
Notas: Subespecie excluida del área del proyecto.

Stuckenia pectinata (L.) Börner
Sin.: *Coleogeton pectinatus* (L.) Les & R.R. Haynes, *Potamogeton diffusus* (Hagstr.) Herter, *Potamogeton pectinatus* L., *Potamogeton pectinatus* L. var. *diffusus* Hagstr.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 2003; Haynes, R. R., Les, D. H. & Král, M., 1998; Holub, J. L., 1997; Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(BAI, JUJ, MEN, RNE); CHL(V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 4085* (LP, SI)]; CHL[*Sparre, B. B. 11010* (SGO)].

Stuckenia striata (Ruiz & Pav.) Holub
Sin.: *Coleogeton striatus* (Ruiz & Pav.) Les & R.R. Haynes, *Potamogeton australis* F. Phil., *Potamogeton dissimilis* A. Benn., *Potamogeton pectinatus* L. var. *striatus* (Ruiz & Pav.) Hagstr., *Potamogeton pectinatus* L. var. *ungulatus* Hagstr., *Potamogeton striatus* Ruiz & Pav.
Referencias: Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1986a, 2003; Haynes, R. R., Les, D. H. & Král, M., 1998; Holub, J. L., 1997; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Tur, N. M., 1982, 1990; Wiegleb, G. & Kaplan, Z., 1998; Wiegleb, G., 1988.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(V, X, RME); PRY(PHA); URY(MON, PAY, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1653* (SI)]; CHL[*Mahu, M. 2364* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 398* (BAF, G)]; URY[*Fruchard, M. s.n.* (P)].

RESTIONACEAE

Autor: Linder, H. P.

1 género, 1 especie endémica.

Apodasmia B.G. Briggs & L.A.S. Johnson

Número de especies: 1 endémica

Apodasmia chilensis (Gay) B.G. Briggs & L.A.S. Johnson
Sin.: *Calopsis chilensis* (Gay) Steud., *Leptocarpus chilensis* (Gay) Mast., *Schoenodum chilense* Gay
Referencias: Briggs, B. G. & Johnson, L. A. S., 1998; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Lechler, W. 618* (P)].

Calopsis chilensis (Gay) Steud. = **Apodasmia chilensis** (Gay) B.G. Briggs & L.A.S. Johnson
Referencias: Briggs, B. G. & Johnson, L. A. S., 1998.

Leptocarpus chilensis (Gay) Mast. = **Apodasmia chilensis** (Gay) B.G. Briggs & L.A.S. Johnson
Referencias: Briggs, B. G. & Johnson, L. A. S., 1998.

[Lyginia montevidensis Spreng.]
Notas: Nombre dudoso.

Schoenodum chilense Gay = **Apodasmia chilensis** (Gay) B.G. Briggs & L.A.S. Johnson
Referencias: Briggs, B. G. & Johnson, L. A. S., 1998.

RUPPIACEAE

Autor: Haynes, R. R.

1 género, 3 especies.

Buccaferrea cirrhosa Petagna = **Ruppia cirrhosa** (Petagna) Grande
Referencias: Gamerro, J. C., 1968.

Potamogeton filifolius Phil. = **Ruppia filifolia** (Phil.) Skottsb.
Referencias: Gamerro, J. C., 1997; Skottsberg, C. J. F., 1916.

Ruppia L.

Número de especies: 3

Ruppia andina Phil. = **Ruppia filifolia** (Phil.) Skottsb.
Referencias: Gamerro, J. C., 1997; Skottsberg, C. J. F., 1916.

Ruppia brachypus J. Gay = **Ruppia maritima** L. var. **brevirostris** C. Agardh
Referencias: Gamerro, J. C., 1968; Reese, G., 1962.

Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande
Sin.: *Buccaferrea cirrhosa* Petagna, *Ruppia maritima* auct. non L., *Ruppia maritima* L. subsp. *spiralis* (L. ex Dumort.) Syme, *Ruppia spiralis* L. ex Dumort.
Referencias: Gamerro, J. C., 1968, 1997; Hunziker, A. T., 1984h.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, LPA, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 15955* (CTES, LP)].

Ruppia filifolia (Phil.) Skottsb.
Sin.: *Potamogeton filifolius* Phil., *Ruppia andina* Phil., *Ruppia obtusa* Hagstr., *Ruppia obtusa* Hagstr. var. *repens* Hagstr.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Gamerro, J. C., 1997; Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1986a; Moore, D. M., 1974, 1983; Skottsberg, C. J. F., 1916.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, NEU, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC); CHL(I, II, III, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8682* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 94047* (CONC)].

Ruppia maritima auct. non L. = **Ruppia cirrhosa** (Petagna) Grande
Referencias: Gamerro, J. C., 1968; Reese, G., 1962.

Ruppia maritima L. f. *aculeata* Hagstr. = **Ruppia maritima** L. var. **longipes** Hagstr.
Referencias: Gamerro, J. C., 1997.

Ruppia maritima L. f. *pectinata* (Rydb.) Hagstr. = **Ruppia maritima** L. var. **longipes** Hagstr.
Referencias: Gamerro, J. C., 1997.

Ruppia maritima L. var. *brachypus* (J. Gay) Garcke = **Ruppia maritima** L. var. **brevirostris** C. Agardh

[Ruppia maritima L. var. brevirostris C. Agardh]
Sin.: *Ruppia brachypus* J. Gay, *Ruppia maritima* L. var. *brachypus* (J. Gay) Garcke, *Ruppia rostellata* Koch ex Rchb. var. *brachypus* (J. Gay) Garcke
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Ruppia maritima L. var. **longipes** Hagstr.
Sin.: *Ruppia maritima* L. f. *aculeata* Hagstr., *Ruppia maritima* L. f. *pectinata* (Rydb.) Hagstr.
Referencias: Gamerro, J. C., 1997.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 835* (CTES, SI)].

Ruppia maritima L. var. **maritima**
Sin.: *Ruppia maritima* L. subsp. *rostellata* (Koch ex Rchb.) Asch. & Graebn., *Ruppia maritima* L. var. *rostrata* C. Agardh, *Ruppia rostellata* Koch ex Rchb.
Referencias: Gamerro, J. C., 1968, 1997; Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B., 1986a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., Matthei, O. R., Rodríguez Ríos, R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998; Oliveira F., E. C., Pirani, J. R. & Giulietti, A. M., 1983; Reese, G., 1962; Tur, N. M., 1990.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SDE, SJU); BRA(RGS, SCA); CHL(II, III, IV, V, IX); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cordini, R. I. 57* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 7296* (R)]; CHL[*Sparre, B. B. 11004* (CONC)]; PRY[*Rojas, T. 1953* (SI)].

Ruppia maritima L. var. *rostrata* C. Agardh = **Ruppia maritima** L. var. **maritima**
Referencias: Gamerro, J. C., 1968, 1997.

Ruppia maritima L. subsp. *rostellata* (Koch ex Rchb.) Asch. & Graebn. = **Ruppia maritima** L. var. **maritima**
Referencias: Gamerro, J. C., 1997.

Ruppia maritima L. subsp. *spiralis* (L. ex Dumort.) Syme = **Ruppia cirrhosa** (Petagna) Grande
Referencias: Gamerro, J. C., 1997.

Ruppia obtusa Hagstr. = **Ruppia filifolia** (Phil.) Skottsb.
Referencias: Gamerro, J. C., 1997; Skottsberg, C. J. F., 1916.

Ruppia obtusa Hagstr. var. *repens* Hagstr. = **Ruppia filifolia** (Phil.) Skottsb.
Referencias: Gamerro, J. C., 1997.

Ruppia rostellata Koch ex Rchb. = **Ruppia maritima** L. var. **maritima**
Referencias: Gamerro, J. C., 1968, 1997.

Ruppia rostellata Koch ex Rchb. var. *brachypus* (J. Gay) Garcke = **Ruppia maritima** L. var. **brevirostris** C. Agardh

Ruppia spiralis L. ex Dumort. = **Ruppia cirrhosa** (Petagna) Grande
Referencias: Gamerro, J. C., 1968, 1997.

RUSCACEAE

1 género, 1 especie introducida.

Cordyline Comm. ex R. Br., nom. cons.

Número de especies: 1 introducidas

Cordyline dracaenafolia Kunth, nom. illeg. = **Cordyline spectabilis** Kunth & Bouché
Referencias: Pirani, J. R. & Cordeiro, I., 2002.

Cordyline dracaenoides Kunth, nom. nud. = **Cordyline spectabilis** Kunth & Bouché
Referencias: Pirani, J. R. & Cordeiro, I., 2002.

Cordyline sellowiana Kunth = **Cordyline spectabilis** Kunth & Bouché
Referencias: Pirani, J. R. & Cordeiro, I., 2002.

Cordyline spectabilis Kunth & Bouché
Sin.: *Cordyline dracaenafolia* Kunth, nom. illeg., *Cordyline dracaenoides* Kunth, nom. nud., *Cordyline sellowiana* Kunth
Referencias: Devoto, F. E. & Rothkugel, M., 1942; Grisebach, A. H. R., 1879; Pirani, J. R. & Cordeiro, I., 2002.
Hierba. Perenne. Introducida. 200–300 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL); BRA(RGS); PRY(APA, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2885* (SI)]; PRY[*Jiménez, B. 1586* (CTES, PY)].
Notas: Citada para el sur de Brasil y Uruguay sin indicar localidad o material de referencia (Pirani & Cordeiro, 2002).

SMILACACEAE

Autores: Andreata, R. H., Guaglianone, E. R. & Gattuso, S.

1 género, 14 especies, 2 especies endémicas.

Smilax L.

Número de especies: 14, 2 endémicas

Smilax assumptionis A. DC.
Referencias: Gattuso, S. J., 1995; Guaglianone, E. R. & Gattuso, S., 1991.
Liana. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kermes, E. 354* (BAB, SI)]; PRY[*Woolston, A. L. 1000* (SI)].

[Smilax brasiliensis Spreng.]
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Smilax brasiliensis Spreng. var. *impresso-venosa* Mattos = **Smilax elastica** Griseb.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.

Smilax campestris Griseb.
Sin.: *Smilax campestris* Griseb. var. *marginulata* (Mart. ex Griseb.) A. DC., *Smilax campestris* Griseb. var. *rubiginosa* (Griseb.) A. DC., *Smilax marginulata* Mart. ex Griseb., *Smilax montana* Griseb., *Smilax rubiginosa* Griseb., *Smilax scalaris* Griseb., *Smilax viminea* Griseb.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1980, 1997; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Gattuso, S. J., 1995; Guaglianone, E. R. & Gattuso, S., 1991.
Liana. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI); URY(COL, FLO, FLA, MAL, RNO, ROC, SAO, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 6983* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 37339* (SI)]; PRY[*Hahn, W. J. 2700* (SI)]; URY[*Gamerro, J. C. s.n.* (SI)].

Smilax campestris Griseb. var. *marginulata* (Mart. ex Griseb.) A. DC. = **Smilax campestris** Griseb.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.

Smilax campestris Griseb. var. *rubiginosa* (Griseb.) A. DC. = **Smilax campestris** Griseb.
Referencias: Guaglianone, E. R. & Gattuso, S., 1991.

Smilax china Vell., hom. illeg. = **Smilax fluminensis** Steud.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997; Guaglianone, E. R. & Gattuso, S., 1991.

Smilax cognata Kunth
Sin.: *Smilax montevidensis* Hort ex Steud., nom. nud.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1980, 1997; Gattuso, S. J., 1995; Guaglianone, E. R. & Gattuso, S., 1991.
Liana. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, COA, GUA, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2483* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 44399* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 3864* (BAB)].

Smilax corcovadensis Kunth = **Smilax rufescens** Griseb.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.

[Smilax correntina Rojas Acosta]
Referencias: Guaglianone, E. R. & Gattuso, S., 1991.
Notas: Nombre dudoso.

Smilax elastica Griseb.
Sin.: *Smilax brasiliensis* Spreng. var. *impresso-venosa* Mattos, *Smilax elastica* Griseb. var. *aculeata* A. DC., *Smilax ficifolia* Griseb.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1980, 1997.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 6622* (GH, S), *Hatschbach, G. 754* (SI)].

Smilax elastica Griseb. var. *aculeata* A. DC. = **Smilax elastica** Griseb.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1980.

Smilax ficifolia Griseb. = **Smilax elastica** Griseb.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.

Smilax fluminensis Steud.
Sin.: *Smilax china* Vell., hom. illeg., *Smilax syringoides* Griseb., *Smilax syringoides* Griseb. var. *multiflora* Griseb.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1980, 1997; Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Gattuso, S. J., 1995; Guaglianone, E. R. & Gattuso, S., 1991.
Liana. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, MIE, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2488* (SI)]; BRA[*Francisco, I. A. s.n.* (FUEL)]; PRY[*Krapovickas, A. 45844* (SI)].

Smilax goyazana A. DC.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997; Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999, 2002.
Arbusto o liana. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 8886* (NY)].

Smilax havanensis Jacq. var. *dentata* (Humb. & Bonpl.) A. DC. = **Smilax rufescens** Griseb.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.

Smilax lappacea Willd.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.
Liana. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Plaumann, F. s.n.* (PACA)].

Smilax larvata Griseb.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.
Liana. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Cordeiro, J. 129* (MBM, RB)].

Smilax macropoda A. DC. = **Smilax polyantha** Griseb.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.

Smilax marginulata Mart. ex Griseb. = **Smilax campestris** Griseb.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.

Smilax medicinalis S. Moore = **Smilax polyantha** Griseb.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.

Smilax montana Griseb. = **Smilax campestris** Griseb.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.

Smilax montevidensis Hort ex Steud., nom. nud. = **Smilax cognata** Kunth
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997; Guaglianone, E. R. & Gattuso, S., 1991.

Smilax nitida Griseb. = **Smilax rufescens** Griseb.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.

Smilax pilcomayensis Guagl. & Gattuso
Referencias: Gattuso, S. J., 1995; Guaglianone, E. R. & Gattuso, S., 1991.
Liana. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); PRY(APY, CEN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2294* (SI)]; PRY[*Kiesling, R. 9555* (PY, SI)].

Smilax polyantha Griseb.
Sin.: *Smilax macropoda* A. DC., *Smilax medicinalis* S. Moore
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.
Liana. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dias, M. C. 11* (FUEL)]; PRY[*Bernardi, L. 19278* (BM)].

Smilax procera Griseb. = **Smilax quinquenervia** Vell.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.

Smilax quinquenervia Vell.
Sin.: *Smilax procera* Griseb., *Smilax tijucensis* A. DC., *Smilax tijucensis* A. DC. var. *gardneriana* A. DC., *Smilax tijucensis* A. DC. var. *pohliana* A. DC.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1980, 1997.
Liana. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1065* (PACA)].

Smilax robusta Griseb. = **Smilax staminea** Griseb.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.

Smilax rubiginosa Griseb. = **Smilax campestris** Griseb.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1980, 1997; Guaglianone, E. R. & Gattuso, S., 1991.

Smilax rufescens Griseb.
Sin.: *Smilax corcovadensis* Kunth, *Smilax havanensis* Jacq. var. *dentata* (Humb. & Bonpl.) A. DC., *Smilax nitida* Griseb.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.
Liana. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 49517* (MBM, RB)].

[Smilax salicifolia Griseb.]
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997; Guaglianone, E. R. & Gattuso, S., 1991.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Smilax scalaris Griseb. = **Smilax campestris** Griseb.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.

Smilax staminea Griseb.
Sin.: *Smilax robusta* Griseb.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.
Liana. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1754* (G, HB, HBR, PACA, R, S, US, US)].

Smilax stenophylla A. DC.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.
Liana. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1440* (PACA, S)].

Smilax syringoides Griseb. = **Smilax fluminensis** Steud.
Referencias: Guaglianone, E. R. & Gattuso, S., 1991; Sampaio, A. J. & Peckolt, O. L., 1943.

Smilax syringoides Griseb. var. *multiflora* Griseb. = **Smilax fluminensis** Steud.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1980; Guaglianone, E. R. & Gattuso, S., 1991.

Smilax tijucensis A. DC. = **Smilax quinquenervia** Vell.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.

Smilax tijucensis A. DC. var. *gardneriana* A. DC. = **Smilax quinquenervia** Vell.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.

Smilax tijucensis A. DC. var. *pohliana* A. DC. = **Smilax quinquenervia** Vell.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.

Smilax viminea Griseb. = **Smilax campestris** Griseb.
Referencias: Andreata, R. H. P., 1997.

TECOPHILAEACEAE

3 géneros, 9 especies, 8 especies endémicas.

Conanthera Ruiz & Pav.

Número de especies: 5 endémicas

Conanthera alba Grau = **Conanthera campanulata** Lindl.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Conanthera bifolia auct. non Ruiz & Pav. = **Conanthera campanulata** Lindl.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Conanthera bifolia Ruiz & Pav.
Sin.: *Conanthera passeriflora* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna f. *coelestis* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna f. *immaculata* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna f. *lilacina* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna f. *melananthera* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna f. *nocticolor* Ravenna, *Sisyrinchium illmu* Molina
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Muñoz-Schick, M., 2000a; Ravenna, P. F., 1991l.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: CHL(V, VI, VII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Moreira, S. s.n.* (SGO), *Werdermann, E. 524* (SI)].

Conanthera campanulata Lindl.
Sin.: *Conanthera alba* Grau, *Conanthera bifolia* auct. non Ruiz & Pav., *Conanthera sabulosa* Ravenna, *Conanthera simsii* Sweet, *Conanthera tenella* (Kunth) Ravenna, *Conanthera variegata* Fenzl ex Reichardt, *Cummingia campanulata* D. Don, *Cummingia tenella* D. Don
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Muñoz-Schick, M., 2000a; Ravenna, P. F., 1988g.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3200 m.
Países: CHL(I, II, IV, V, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz-Schick, M. 4012* (SGO), *Werdermann, E. 909* (SI)].

Conanthera johowii Espinosa = **Conanthera parvula** (Phil.) M. Muñoz
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Conanthera minima Grau = **Conanthera parvula** (Phil.) M. Muñoz
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Conanthera parvula (Phil.) M. Muñoz
Sin.: *Conanthera johowii* Espinosa, *Conanthera minima* Grau, *Cummingia parvula* Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Muñoz-Schick, M., 2000a.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–500 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Montero, G. 8855* (CONC), *Moreira, S. s.n.* (SGO)].

Conanthera passeriflora Ravenna = **Conanthera bifolia** Ruiz & Pav.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a; Ravenna, P. F., 1991l.

Conanthera passeriflora Ravenna f. *coelestis* Ravenna = **Conanthera bifolia** Ruiz & Pav.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a; Ravenna, P. F., 1991l.

Conanthera passeriflora Ravenna f. *immaculata* Ravenna = **Conanthera bifolia** Ruiz & Pav.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a; Ravenna, P. F., 1991l.

Conanthera passeriflora Ravenna f. *lilacina* Ravenna = **Conanthera bifolia** Ruiz & Pav.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a; Ravenna, P. F., 1991l.

Conanthera passeriflora Ravenna f. *melananthera* Ravenna = **Conanthera bifolia** Ruiz & Pav.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a; Ravenna, P. F., 1991l.

Conanthera passeriflora Ravenna f. *nocticolor* Ravenna = **Conanthera bifolia** Ruiz & Pav.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a; Ravenna, P. F., 1991l.

Conanthera sabulosa Ravenna = **Conanthera campanulata** Lindl.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Conanthera simsii Sweet = **Conanthera campanulata** Lindl.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Conanthera tenella (Kunth) Ravenna = **Conanthera campanulata** Lindl.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Conanthera trimaculata (D. Don) F. Meigen
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(V, VI, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 2087* (CONC)].

Conanthera urceolata Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1988g.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hoffmann, A. E. s.n.* (CONC)].

Conanthera variegata Fenzl ex Reichardt = **Conanthera campanulata** Lindl.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Cummingia campanulata D. Don = **Conanthera campanulata** Lindl.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Cummingia parvula Phil. = **Conanthera parvula** (Phil.) M. Muñoz
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Cummingia tenella D. Don = **Conanthera campanulata** Lindl.
Referencias: Muñoz-Schick, M., 2000a.

Tecophilaea Bertero ex Colla
Número de especies: 2 endémicas

Tecophilaea cyanocrocus Leyb.
Sin.: *Zephyra cyanocrocus* (Leyb.) Ravenna
Referencias: Eyzaguirre, M. T. & García de la Huerta, R., 2002; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–900 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (B, P)].

Tecophilaea violiflora Bertero ex Colla f. **violiflora**
Sin.: *Zephyra violiflora* (Bertero ex Colla) Ravenna
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 11* (SI)].

Tecophilaea violiflora Bertero ex Colla f. **polyantha** Skottsb.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV).
Notas: Citada para Chile sin mencionar ejemplar de referencia (C. Marticorena & Quezada, 1985).

Zephyra D. Don
Número de especies: 2, 1 endémica

Zephyra amoena D. Don = **Zephyra elegans** D. Don

Zephyra compacta C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 971147* (CONC, M, SGO)].

Zephyra cyanocrocus (Leyb.) Ravenna = **Tecophilaea cyanocrocus** Leyb.

Zephyra elegans D. Don
Sin.: *Zephyra amoena* D. Don
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 776* (SI)].

Zephyra violiflora (Bertero ex Colla) Ravenna = **Tecophilaea violiflora** Bertero ex Colla f. **violiflora**

TRIURIDACEAE

Revisor: Maas, P. J. M.

2 géneros, 2 especies.

Hexuris gardneri Miers, nom. illeg. = **Peltophyllum luteum** Gardner
Referencias: Maas, P. J. M. & Rübsamen, T., 1986.

Peltophyllum Gardner
Número de especies: 1

Peltophyllum luteum Gardner
Sin.: *Hexuris gardneri* Miers, nom. illeg., *Triuris lutea* (Gardner) Benth. & Hook., *Triuris macella* Bertoni, *Triuris mycoides* Fiebrig
Referencias: Maas, H. & Maas, P. J. M., 2002; Maas, P. J. M. & Rübsamen, T., 1986; Reitz, R., 1989.
Saprófita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); PRY(APA, CAA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kermes, E. s.n.* (*)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6667* (B)].

Sciaphila Blume
Número de especies: 1

Sciaphila schwackeana Johow
Referencias: Maas, H. & Maas, P. J. M., 2002; Maas, P. J. M. & Rübsamen, T., 1986; Reitz, R., 1989.
Saprófita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. s.n.* (US)].

Triuris lutea (Gardner) Benth. & Hook. = **Peltophyllum luteum** Gardner

Referencias: Maas, P. J. M. & Rübsamen, T., 1986; Reitz, R., 1989.

Triuris macella Bertoni = **Peltophyllum luteum** Gardner
Referencias: Maas, P. J. M. & Rübsamen, T., 1986; Reitz, R., 1989.

Triuris mycoides Fiebrig = **Peltophyllum luteum** Gardner
Referencias: Maas, P. J. M. & Rübsamen, T., 1986; Reitz, R., 1989.

TYPHACEAE

1 género, 4 especies.

Typha Juss.

Número de especies: 4

Typha angustifolia L.
Referencias: Crespo, S. & Pérez-Moreau, R. L., 1967, 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(CHA, RNE); CHL(I, V, VII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. L. 3541* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 35720* (CONC)].

Typha domingensis Pers.
Sin.: *Typha tenuifolia* Kunth
Referencias: Crespo, S. & Pérez-Moreau, R. L., 1967, 1969; Degen, R. & Mereles, F., 1996, 1999; Marticorena, C., Matthei, O. R., Rodríguez Ríos, R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pérez-Moreau, R. L. & Crespo, S., 1995; Reitz, R., 1984c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(SCA); CHL(I, II); PRY(APY, CEN, CON, COA, PAI, PHA); URY(CLA, COL, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. L. 3683* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 9828* (FLOR, HBR)]; CHL[*Ricardi, M. 3611* (CONC)]; PRY[*Hassler, E. 1190* (CTES, FCQ), *Woolston, A. L. 773* (SI)]; URY[*Bayce, D. s.n.* (MVFA)].

Typha latifolia L.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Crespo, S. & Pérez-Moreau, R. L., 1967; Degen, R. & Mereles, F., 1999; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Reitz, R., 1984c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, MIS, SFE, SJU); PRY(APA, AMA, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 23917* (SI)]; PRY[*Degen, R. 2339* (SI), *Mereles, F. 4349* (FCQ)].

Typha subulata Crespo & R.L. Pérez-Mor.
Referencias: Crespo, S. & Pérez-Moreau, R. L., 1967, 1969; Reitz, R., 1984c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SJU, SLU); URY(MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. 3536* (SI)]; URY[*Alonso Paz, E. 2409* (MVFQ)].

Typha tenuifolia Kunth = **Typha domingensis** Pers.
Referencias: Crespo, S. & Pérez-Moreau, R. L., 1967; Reitz, R., 1984c.

[Typha truxillensis Kunth]
Referencias: Crespo, S. & Pérez-Moreau, R. L., 1967.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

VELLOZIACEAE

2 géneros, 3 especies, 2 especies endémicas.

Aylthonia paranaensis (L.B. Sm.) N.L. Menezes = **Barbacenia paranaensis** L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B. & Ayensu, E. S., 1976.

Barbacenia Vand.

Número de especies: 1 endémica

Barbacenia boliviense (Baker) Hauman = **Barbaceniopsis boliviensis** (Baker) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B. & Ayensu, E. S., 1976; Smith, L. B., 1962.

Barbacenia castilloni Hauman = **Barbaceniopsis boliviensis** (Baker) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B. & Ayensu, E. S., 1976; Smith, L. B., 1962.

Barbacenia paranaensis L.B. Sm.
Sin.: *Aylthonia paranaensis* (L.B. Sm.) N.L. Menezes
Referencias: Smith, L. B. & Ayensu, E. S., 1976; Smith, L. B., 1962.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 5359* (MBM, US)].

Barbaceniopsis L.B. Sm.

Número de especies: 2, 1 endémica

Barbaceniopsis boliviensis (Baker) L.B. Sm.
Sin.: *Barbacenia boliviense* (Baker) Hauman, *Barbacenia castilloni* Hauman, *Vellozia boliviense* Baker, *Xerophyta boliviense* (Baker) N.L. Menezes
Referencias: Smith, L. B. & Ayensu, E. S., 1976; Smith, L. B., 1962.
Hierba. Perenne. Nativa. 1400–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 3614* (SI)].

Barbaceniopsis humahuaquensis Noher
Referencias: Noher de Halac, R. I., 1973; Smith, L. B. & Ayensu, E. S., 1976.

Hierba. Perenne. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Renvoize, S. A. 3436* (SI)].

Vellozia boliviense Baker = **Barbaceniopsis boliviensis** (Baker) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B. & Ayensu, E. S., 1976; Smith, L. B., 1962.

Xerophyta boliviense (Baker) N.L. Menezes = **Barbaceniopsis boliviensis** (Baker) L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B. & Ayensu, E. S., 1976.

XYRIDACEAE

Autor: Wanderley, M. G. L.

1 género, 24 especies, 4 especies endémicas.

Xyris L.

Número de especies: 24, 4 endémicas

Xyris asperula Mart.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1968; Wanderley, M. G. L., Costa e Silva, M. B. & Cerati, T., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 43551* (MBM)].

Xyris capensis Thunb.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1965, 1968; Wanderley, M. G. L., Costa e Silva, M. B. & Cerati, T., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 9066* (HBR, R, US)].

Xyris dissitifolia Kral & Wand.
Referencias: Kral, R. & Wanderley, M. G. L., 1988.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–1700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20752* (MBM, US)].

Xyris filifolia L.A. Nilsson
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1965, 1968.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10383* (HBR, US)].

Xyris guaranitica Malme
Referencias: Castellanos, A., 1945a; Molfino, J. F., 1922a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1965, 1968.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, COA, ITA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 24176* (CTES)]; BRA[*Reitz, P. R. 364* (NY)]; PRY[*Pedersen, T. M. 4382* (SI)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o material de referencia (Castellanos, 1945a; Smith & Downs, 1965).

Xyris guaranitica auct. non Malme = **Xyris regnellii** L.A. Nilsson
Referencias: Castellanos, A., 1945a.

Xyris hatschbachii L.B. Sm. & Downs
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1960, 1968.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 828* (US)].

Xyris hymenachne Mart.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1965, 1968; Wanderley, M. G. L., Costa e Silva, M. B. & Cerati, T., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 45459* (SI)].

Xyris jupicai Rich.
Sin.: *Xyris jupicai* Rich. var. *brachylepis* Malme, *Xyris jupicai* Rich. var. *major* (Mart.) L.B. Sm. & Downs, *Xyris laxifolia* Mart. var. *minor* Mart., *Xyris macrocephala* Vahl var. *minor* (Mart.) L.A. Nilsson, *Xyris sellowiana* Kunth f. *humilis* Kunth
Referencias: Castellanos, A., 1945a; Kral, R., 1988; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1965, 1968; Wanderley, M. G. L., Costa e Silva, M. B. & Cerati, T., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAN, COA, GUA); URY(CAS, CLA, COL, MAL, MON, RIV, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 29348* (SI)]; BRA[*Burkart, A. 25081* (SI)]; PRY[*Arenas, P. 1140* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 17742* (BA)].

Xyris jupicai Rich. var. *brachylepis* Malme = **Xyris jupicai** Rich.
Referencias: Kral, R., 1988; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1965, 1968.

Xyris jupicai Rich. var. *major* (Mart.) L.B. Sm. & Downs = **Xyris jupicai** Rich.
Referencias: Kral, R., 1988; Wanderley, M. G. L., Costa e Silva, M. B. & Cerati, T., 2003.

Xyris lacerata Pohl ex Seub.
Referencias: Castellanos, A., 1945a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 1474* (SI)].

Xyris laxifolia Mart.
Sin.: *Xyris laxifolia* Mart. var. *major* Mart., *Xyris macrocephala* Vahl

Referencias: Burkart, A., 1964a; Castellanos, A., 1945a; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1965, 1968; Wanderley, M. G. L., Costa e Silva, M. B. & Cerati, T., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CAN, PAI, SPE); URY(CAS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 785* (SI)]; BRA[*Bruxel, A. s.n.* (PACA)]; PRY[*Woolston, A. L. 1090* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 1810* (SI)].

Xyris laxifolia Mart. var. *major* Mart. = **Xyris laxifolia** Mart.
Referencias: Kral, R., 1988; Wanderley, M. G. L., Costa e Silva, M. B. & Cerati, T., 2003.

Xyris laxifolia Mart. var. *minor* Mart. = **Xyris jupicai** Rich.
Referencias: Kral, R., 1988; Wanderley, M. G. L., Costa e Silva, M. B. & Cerati, T., 2003.

Xyris lucida Malme
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1965, 1968; Wanderley, M. G. L. & Silva, M. B. C., 2000; Wanderley, M. G. L., Costa e Silva, M. B. & Cerati, T., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 8512* (HBR, NY, R, US)].

Xyris macrocephala Vahl = **Xyris laxifolia** Mart.
Referencias: Kral, R., 1988; Wanderley, M. G. L., Costa e Silva, M. B. & Cerati, T., 2003.

Xyris macrocephala Vahl var. *minor* (Mart.) L.A. Nilsson = **Xyris jupicai** Rich.
Referencias: Kral, R., 1988; Wanderley, M. G. L., Costa e Silva, M. B. & Cerati, T., 2003.

Xyris neglecta L.A. Nilsson
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1965, 1968.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 7454* (HBR, R, US)].

Xyris piraquarae L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1968.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1613* (HBR, US)].

Xyris regnellii L.A. Nilsson
Sin.: *Xyris guaranitica* auct. non Malme
Referencias: Castellanos, A., 1945a; Molfino, J. F., 1922a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1965, 1968; Wanderley, M. G. L., Costa e Silva, M. B. & Cerati, T., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CAN); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*de Llamas, A. s.n.* (BAF)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 2358* (R, S, SI, US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5654* (SI)]; URY[*Felippone, F. 3030* (SI)].

Xyris reitzii L.B. Sm. & Downs
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1960, 1965.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 7451* (HBR, R, US)].

Xyris rigida Kunth
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1965.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. s.n.* (PACA, US)].

Xyris savanensis Miq.
Sin.: *Xyris savanensis* Miq. var. *glabrata* Seub., *Xyris tenella* Molfino
Referencias: Castellanos, A., 1945a; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Kral, R., 1988; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1965, 1968; Wanderley, M. G. L., Costa e Silva, M. B. & Cerati, T., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, COA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hauman, L. L. s.n.* (BA)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 2336* (R, S, SI, US)]; PRY[*Hassler, E. 60* (SI)].

Xyris savanensis Miq. var. *glabrata* Seub. = **Xyris savanensis** Miq.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1965.

Xyris schizachne Mart.
Referencias: Castellanos, A., 1945a; Molfino, J. F., 1922a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1965, 1968; Wanderley, M. G. L., Costa e Silva, M. B. & Cerati, T., 2003.
Hierba. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 24744* (CTES)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 2513* (R, S, US)]; PRY[*Hassler, E. 121* (SI)].

Xyris sellowiana Kunth f. *humilis* Kunth = **Xyris jupicai** Rich.
Referencias: Kral, R., 1988; Wanderley, M. G. L., Costa e Silva, M. B. & Cerati, T., 2003.

Xyris sororia Kunth
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1965, 1968.
Hierba. Nativa. 1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6090* (HBR, US)].

Xyris stenophylla L.A. Nilsson
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1965, 1968; Wanderley, M. G. L., Costa e Silva, M. B. & Cerati, T., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 10423* (HBR, R, US)].

Xyris tenella Kunth
Referencias: Kral, R., 1988; Wanderley, M. G. L., Costa e Silva, M. B. & Cerati, T., 2003.
Hierba. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hoehne, F. C. 23452* (NY, S, SP)]; PRY[*Zardini, E. M. 24793* (AS, MO)].

Xyris tenella Molfino = **Xyris savanensis** Miq.
Referencias: Castellanos, A., 1945a.

Xyris teres L.A. Nilsson
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1965, 1968; Wanderley, M. G. L., Costa e Silva, M. B. & Cerati, T., 2003.
Hierba. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 11351* (HBR, R, US)].

Xyris tortula Mart.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1965, 1968; Wanderley, M. G. L., Costa e Silva, M. B. & Cerati, T., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 11618* (HBR, US)]; PRY[*Zardini, E. M. 24783* (AS, MO)].

Xyris vacillans Malme
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1965, 1968; Wanderley, M. G. L., Costa e Silva, M. B. & Cerati, T., 2003.
Hierba. Nativa. 200–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3920* (HBR, US)].

ZANNICHELLIACEAE

Revisor: Haynes, R. R.

1 género, 1 especie.

Zannichellia L.

Número de especies: 1

Zannichellia palustris L.
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; San Martín, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R., 2001; Tomlinson, P. B. & Posluszny, U., 1976; Torres, M. A., 1969[1968].
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–4400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, JUJ, LPA, MEN, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, TDF); CHL(II, III, IV, V, VI, VII, XII, RME); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1642* (SI)]; CHL[*Rodríguez Ríos, R. 3202* (CONC)]; URY[*Alonso Paz, E. 2144* (MVFQ)].

[Zannichellia palustris L. var. pedicellata Wahlenb. ex K. Schum.]
Referencias: Grisebach, A. H. R., 1879; Schumann, K. M., 1894.
Notas: Nombre dudoso.

ZINGIBERACEAE

Revisor: Maas, P. J. M.

1 género, 1 especie introducida.

Hedychium J. König

Número de especies: 1 introducida

Hedychium coronarium J. König
Referencias: Fabris, H. A., 1969[1968]a; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Novara, L. J., 1993c.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR); PRY(CAA, CAN, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 2846* (SI)]; BRA[*Pereira, M. L. 246* (CTES)]; PRY[*Jörgensen, P. 4471* (SI)].

ZOSTERACEAE

1 género,1 especie introducida.

Heterozostera (Setch.) Hartog

Número de especies: 1 introducida

Heterozostera chilensis J. Kuo
Referencias: Kuo, J., 2005.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–200 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 2313* (CONC)].

[Heterozostera tasmanica (G. Martens ex Asch.) Hartog]
Sin.: *Zostera tasmanica* G. Martens ex Asch.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Zostera tasmanica G. Martens ex Asch. = **Heterozostera tasmanica** (G. Martens ex Asch.) Hartog

BOLIVIA
REGIÓN CENTRAL-OESTE
BRASIL
(Central-Western Brazil)
PARAGUAY
SUR DE
BRASIL
(Southern
Brazil)
ARGENTINA
URUGUAY
CHILE
Área del Proyecto: Países
Project Area: Countries
20°
30°
40°
50°
80°
70°
60°
50°
40°
0 1000 2000km
N
O
E
S

Missouri Botanical Garden Library
Digitized
3 1753 00356 3332

Missouri Botanical Garden

IBODA
CONICET
ANCEFN

ISBN 978-1-930723-74-0

978-1-930723-74-0 (Volumen 1)
978-1-930723-70-2 (Obra completa)